

- γ . *micracantha* A. Br. (*Ch. equisetina* Ktz.).
 - δ . *gymnoteles* A. Br.
 - 9 (21). *Ch. crispa* Wallm.
 - 10 (22). *Ch. polyacantha* A. Br. (*Ch. hispida* var. *pseudocrinita* A. Br. Monogr.).
 - 4. *Crinitae*.
 - 11 (23). *Ch. crinita* Wallr.
 - 5. *Asperae*.
 - 12 (24). *Ch. aspera* Willd. (*Ch. hispida* Linné).
 - A) forma *marina* (*Ch. fallax* Ag.)
 - B) forma *stagualis* (*Ch. curta* Nolt.).
 - 6. *Ceratophyllae*.
 - 13 (25). *Ch. ceratophylla* Wallr. (*Ch. tomentosa* L.).
 - α . *microptila* A. Br. (*Ch. latifolia* Willd.).
 - β . *rejecta* Ag.
 - γ . *macroptila* A. Br.
 - B. *Steljken utan taggar*.
 - 7. *Fragiles*.
 - 14 (26.) *Ch. fragilis* Desv. (*Ch. pulchella* Wallr., *Ch. diffusa* Liljebl.).
 - β . *Hedwigii* (*Ch. Hedwigii* Ag.)
 - γ . *pulchella* Wallm.
 - * *longibracteata* (*Ch. pilifera* Ag., *Ch. capillacea* Wallm.).
 - β . *barbata* Ganterer (*Ch. fragilis* var. *foliolata* H.).
- §. 8.

Erbario crittogamico italiano pubblicato dai Signori Ardissoni, Baglietto, Beccari, Bicchi, Caldesi, Carestia, Cesati etc. etc. Fascicolo XXI. XXII. 1863. Genova.

In dieser 11. Centurie finden sich: 1001. *Nitella gracilis* var. *elongata* Rabenh., 1002. *Equisetum sylvaticum* L., 1003. *Asplenium acutum* Bory, 1004. *Athyrium filix femina*., 1005 bis 1021. *Laubmoose*, darunter bemerkenswerthe: *Homalothecium Philippeanum densum*, specie minus, fere inter *H. sericeum* et *Philippeanum medium*. Dioicum; dense caespitosum, rami conferti, fastigiati, in sicco teretiusculi, rigiduli; folia nervo excurvente praedita; pedunculus laevis; calyptra nuda. *Webera Tozeri* Schimp. *Hedwigia ciliata concolor* De Not. = *Hedw. cil. secunda* Schimp. (*Schistidium imbarbe* Garovagl. ex p.). — 1022 und 1023 *Lebermoose*, darunter *Oxymitra pyramidata* Bisch. — 1024 bis 1025. *Algen*: *Gyraudia sphacelarioides* Derb., *Schizymenia minor* J. Ag. (= *Iridaea minor* Ktz.), *Carpoblepharis? mediterranea* Ardiss. (*Enumer. Alg. N. 135. Conf. Hedwigia 1864 N. 2.*), *Bangia sicula* Ardiss. l. c.,

Ulothrix ligustica Dufour n. sp.: U. marina, trichomata adfixa, ab ortu tenuia $\frac{1}{100}$ mm. latit. vix æquantia, dein sensim incrassata $1\frac{1}{2}$, $\frac{2}{100}$ mm. latit. usque attingentia, subinde per tractum plurium articularum, articulis extenuatis, interrupta. Articuli in trichomatibus tenuioribus diametro æquales vel duplo longiores, in reliquis diametro æquales, vel breviores omnes gonidia læte viridia primum discoidea vel oblongata, demum rotundata foventes. *Stigeoclonium Bormianum* Anzi: S. fluitans, elongatum, fasciculatum ex olivaceo virescens. Trichomata tenuia, primaria vix $\frac{1}{100}$ mm. crassiora, remote ramosa, ramis plerumque alternis, erectis, rarissime oppositis, ultimis tenuissimis elongatis in filum hyalinum extenuatis, flagelliformibus. Articuli longitudine pervarii, vel diametro æquales, subindeque turgidi, vel duplo, 5-plove longiores, sine lege alternantes. 1036 bis 1066 fungi: Agaricus (Armillaria) Piopparello Viv. in agro Pisano, Peziza julacea Pers. Myc. europ. (Pez. amentacea Balb.), Octaviana mollis De Not., Hypoxylon bifrons De Not. Sferiac. I. p. 18. T. XV., Rosellinia Andurnensis De Not. ibid. Conf. Hedwigia 1863. p. 171. Diatrype hypoxylodes De Not. ibid. Valsa capistraria De Not. ibid. Cucurbitaria leptospora De Not. ibid. Puccinia Prunorum Armeniacæ Bicchi: sporæ articulo inferiore non raro sterilescente, contracto, stipitiformi fere uniloculares. 1067 bis 1100 Lichenes: Lecanora (Zeora) sulphurea tumidula Bagl. in Comm. critti ital., Thalloidima diffractum Mass. Mem., Sched. crit. et Lich. exs., Lecidæa ochromela Anzi Cat., Buellia Caldesiana Bagl. und dispersa Mass. Sched. crit., Biatora consanguinea Anzi Lich. langob. N. 351, Sporastatia morio coracina Rabenh. Lich. europ., Verrucaria cærulea geographica Bagl. herb., Synechoblastus labyrinthicus Anzi Cat. — Die Exemplare sind durchweg instructiv. L. R.

L. Rabenhorst, die Algen Europa's. Dec. 164 und 165 unter Mitwirkung der Herren Anzi, De Brébisson, W. Curnow, Dufour und Piccone gesammelt und herausgegeben. Dresden, 1864.

Enthält unter den 20 Nummern einige nicht gewöhnliche und in der Sammlung noch nicht ausgegebene Arten, als *Synedra capitata* Ehrb., *Cocconema lanceolatum* Ehrb., *Encyonema cæspitosum* Ktz., *Podosira Montagnei* Ktz., *Homœocladia Martiana* Ag., *Xanthidium Brébissonii* Ralfs, *Cosmarium pluviale* Bréb. nov. sp. C. sublæve, minus; hemisomatibus oblongo-rotundatis ad marginem leviter granulatis, subcrenulatis, connatis, vel sinu brevissimo separatis; gemma amylacea, solitaria, lata. *Leptothrix Dictyothrix* Ktz., *Jnomeria Brébissonii* Ktz., Cla-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1864

Band/Volume: [3_1864](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Erbario crittogamico italiano \(Buchbesprechung\) 104-105](#)