

12 Stunden in 2 ungleiche Hälften theilt, beide theilen sich wieder. Die specielle Schilderung des gesammten Entwicklungsganges solle in Pringsheim's Annalen veröffentlicht werden. J. M.

Westfalen's Laubmoose, gesammelt und herausgegeben von Dr. H. Müller in Lippstadt. Lieferung III und IV. Nr. 121—240.

Außer vielen gewöhnlichen Arten bringen diese Lieferungen auch eine Anzahl Seltenheiten und kritische Species, namentlich Sphagna, Hypna, Brya, Polytricha, Barbulae, Grimmiac; bemerkenswerth sind: *Sphagnum molle* Sulliv., *S. teres* Angstr., *S. fimbriatum* Wils., *S. laxifolium* C. M., *S. molluscum* Bruch., *Philonotis marchica* Synops., *Entosthodon ericetorum* DeNot., *Seligeria pusilla* und *tristicha*, *Barbula pulvinata* Jur., *inermis* Synops., *B. vinealis* Brid., *B. membranifolia* Hook., *B. latifolia* Br., *Zygodon viridissimus* Dicks., *Grimmia crinita* Brid., *Hypnum polygamum* Br. et Sch., *H. elodes* Spruce, *Dicranum viride* Sulliv. J. Milde.

Geographie der in Westfalen beobachteten Laubmoose von Dr. Hermann Müller in Lippstadt. Nebst 2 Karten.

Der Verfasser bespricht zuerst das Terrain mit seinen Eigenthümlichkeiten und zwar 1) die Ebene, 2) die Haar, 3) den Teutoburger Wald, 4) das Bergland zu beiden Seiten der Weser, 5) das Sauerland. Der Verfasser führt die bedeutende Zahl von 377 Arten für sein Gebiet auf. Unter diesen sind besonders drei Kategorien auffallend, nämlich diejenigen, welche man wegen der geringen Erhebungen, die, welche man wegen der nördlichen Lage, und die, welche man wegen der Entfernung vom Meere hier nicht erwarten sollte. Es verdienen demnach besonders hervorgehoben zu werden für die westfälische Ebene: *Ephemerella recurvifolia* Dicks., *Archidium alternifolium* Dicks., *Weisia mucronata* Campylopus *fragilis* Dicks., *C. brevipilus* Br. et Sch., *Fissidens Bloxami* Wils., *Pottia Heimii* Hdw., *Didymodon luridus* Hsch., *Cinclidotus fontinaloides* P. B., *Zygodon viridissimus* Dicks., *Entosthodon ericetorum* DeNot., *Bryum uliginosum* Bruch., *B. fallax* Milde, *B. Warneum* Bland., *B. lacustre* Brid., *Catoscopium nigrum* Brid., *Cryphaea*, *Neckera pumila* Hedw., *Pterogonium gracile* L., *Eurhynchium crassinervium* Tayl., *E. speciosum* Brid., *Rhynchostegium Teesdalii* Smith, *Rh. depressum* Br. *Plagiothecium latebricola* Wils., *P. Schimperii* Jur. et M., *Amblystegium confervoides* Brid., *Hypnum elodes* Spr., *H. polygamum* Br. Eur., *H. imponens* Hdw., *Sphagnum molle* Sulliv., *S. molluscum* Bruch.; für die Haar: *Dicranum viride* Sulliv., *Seligeria pusilla* und *tristicha*, *Eucla-*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1865

Band/Volume: [4_1865](#)

Autor(en)/Author(s): Milde Julius [Carl August]

Artikel/Article: [Buchbesprechung 15](#)