

dem Siebengebirge; 796. *Physcia medians* (Nyl.) ebenda her.; 797. *Thelidium absconditum* Arn. ebenda her.; 798. *Callopisma vitellinellum* Mudd. Man. p. 135. Exs. Arnold. 298. (Syn, *Gyalolechia vitellina* v. *coruscans* [Ach.] Anzi exs. Anzi lich. ital. min. rar. 147.) *Sporae hyalinae*, plerumque fabaeformes, utrinque obtusae, diblastae, 12—15 Mikr. long., 3—5 lat., 8 in ascis clavatis. Die Flechte von Anzi unterscheidet sich blos scheinbar durch kleinere, dicht gedrängt wachsende Apothecien, und findet sich auf Kalk. Innerlich ist sie bei mikroskopischer Untersuchung identisch mit obiger; 799. *Lecanora Hageni* Ach. var. *lithophila* W. Forma: margine thallode optime evoluto albido, von Sugenheim in Franken; 800. *Buellia saxatilis* (Schr.) Kbr. von Dietenhofen in Franken. — Eingeliefert wurden diese Beiträge von den Herren Baglietto, B. von Cesati, P. Dreesen, Th. Fries, Hepp, Jäck, C. Kalchbrenner, Kemmler, Lahm, Meßler, Münter, Rehm, Stizenberger.

L. R.

Sancto Garovaglo, Manzonia cantiana, novum Lichenum angiocarporum genus propositum atque descriptum.
(Mem. della Soc. ital. di sc. nat. Vol. II. Mediolani, 1866.)

Manzonia Garov. Monoica. *Apothecium immersum*, dupli instructum excipulo, altero thallode superficiali, hemisphaericō, tuberculoso, ad apicem circulariter aperto, pedentim evanescente, altero proprio (s. tunica), carnosō, cum nucleo coalito, exterius in fimbrias albicantes soluto, superne dehiscente; *nucleus* sphaericus i. e. verrucarioides, tandem nec semper, in speciem parvi disci depresso, quem tunica sursum connivens quaquaversus amplexatur, oraque nonnihil prominente plus minusve circumcingit; *paraphyses* crassae, nodoso-ramosae, perdurantes, apice implexae; *asci* rariusculi, elliptici obovative, octospori, fugaces; *sporae* uniloculares, subrotundae, episporio crasso obductae; *gelatina hymeneia* iodio rufescens; *spermogonia* periphærica, minuta, papillæformia; *sterigmata* simplicia; *spermatia* parva, recta, bacillaria. *Thallus* crustaceus, macularis, cum matrice conferruminatus. Penitiorum aequa ac externarum partium color dilute caeruleus. Hab. Verrucariae.

Manzonia Cantiana Garov. *Verrucaria hiascens* var. *caerulea* Garov. Lichenoth. ital. Ed. I. Dec. XXII. n. 7. (1839). Ej. Verruc. *rupestris* var. *hiascens* p. p. Catal. P. III. p. 40. Ej. Saggio in opere, Cattaneo *Notizie naturali e civili*, pag. 338. Ej. Verruc. *rupestris* var. *hiascens*, forma *caerulea* Lichenoth. ital. Ed. II. Dec. III. n. 8. 9. Verruc.

cacrulescens Flot. in litt. ad specimina mea (1847). *Verruc.*
hiascens Massal. Ricerch. pag. 177, f. 357 (pariter ad mea
specimina). Müller Classif. des lichens d. Genève, pag. 75
(fide Heppii). Hepp. Flecht. Europ. n. 939 (ex icone et Syn.,
nam specimen non vidi). — *Pyrenula hiascens* Schaer. Enum.
pag. 212. p. p., (quatenus a cl. auctore laudantur specimina
lariana). — *Hymenelia Prevostii* var. *γ. caerulescens* Krempelh.
in Flora pro a. 1852. pag. 25 (secundum specimina authentica
a cl. auctore benevole nobiscum communicata). *Hymenelia*
hiascens Massal. Geneac. lichen. pag 12. (1854) Körb. Syst.
pag. 329. Ej Parerg. pag. 114. Beltramini Lichen. bassan.
pag. 153. Lecidea *Prevostii* var. *caerulescens* Nyland. Prodr.
Lichenog. Galliae et Algeriae pag. 103 (ob laudatum synon.
Krempelhüberi). — *Thallo* tartareo, contiguo, maculari, lae-
vissimo, fere marmorato, plerumque nitido, caeruleo, ambitum
versus dealbato, tuberoso, tuberculis superficialibus, hemi-
sphaericis, sparsis vel per series distributis, dissitis vel approxi-
matis, corneo-pellucidis, primum clausis, dein pertusis, ore
circulari attenuato, tandem evanidis; *apotheciis* thalli tuberculis
demersis, subsidente tandem verruca magis conspicuis, obscure
cyaneis, fere atris, parvulis, diu verrucaeformibus, excipulo
proprio (tunica) simplici, carnoso, dense colorato, subtus in
fimbrias albicantes passim soluto, per rimam pedetentim latius
apertam, margineque integerrimo, tumido instructam, dehiscente;
nucleo gelatinoso, pellucido, dilute caeruleo, iodo rufescente,
primutus subgloboso, tandem supra leviter explanato, a tunica
sursum connivente diu suboccluso; *paraphysibus* crebris,
nodoso-ramosis, persistentibus, crassis, apicem versus caeruleis,
et intertextis; *accis* rariusculis, brevibus, subclavatis, obovatis
aut ellipticis, fundo nuclei infixis, hyalinis, octosporis; *sporis*
duplici vel triplici serie intra ascos confertis, mutuo se pre-
mendo deformibus, extra ascos eumorphis, s. subrotundis, uni-
locularibus, episporio crasso, Omm0099, ad Omm0128 aequa
longis ac latis, *spermogoniis* punctiformibus, numerosis, in
ambitu thalli sitis; *sterigmatibus* simplicibus; *spermatiis*
bacillaribus. — *Hab.* Speciosissimum inter lichenes angiocarpos,
multos jam ab hinc annos legi ad rupes septentrionem spectantes
alterius, proprie occidentalis, duorum Cantii montis cacuminum,
quibus *Cornua* vulgo nomen est. Species ut videtur satis rara,
cum ne in ditissimis quidem collectionibus a cl. viris Heppio,
Rabenhorstio, Anzio, Mougeottio, Flotowio, Leightonio editis,
praesto sit.

Q. R.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [6_1867](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Literaturbesprechung 156-157](#)