

tinalis squamosa, Hypnum sarmentosum c. fr., H. vernicosum, H. pallescens, Eurhynchium crassinervium, Pseudoleskeia catenulata, Thuidium Blandowii.

J. M.

C. E. Eiben, Systematisches Verzeichniß der Laubmoose Ostfrieslands. Separat-Abdruck aus dem Jahresberichte der naturhistorischen Gesellschaft in Emden. 1867.

Dasselbe führt 126 Arten, 6 in einem Nachtrag, also in Summa 132 Arten auf und zwar: Acrocarpi 72, Pleurocarpi 60, unter den letzteren sind 12 Sphagnaceen mit aufgeführt.

Bidrag till Skandinaviens Bryologi. Von. S. Berggren.

Leider ist auch diese Arbeit schwedisch geschrieben, und es können nur die neuen Arten mit ihren Diagnosen, welche hier beschrieben sind, mitgetheilt werden.

1. *Leskea rupestris* n. sp. Laxe intricato-caespitosa, olivacea vel fusco-viridis. Caulis repens rarius adscendens, rami elongati filiformes, plerumque subnitidi. Folia siccitate arcte imbricata, humida, erecto-patentia, ovato-lanceolata vel lanceolata, margine plano a medio usque ad apicem crenulata, costa plerumque tenui ad vel supra medium continua. Cellulae foliorum oblongae, ad marginem inferiorem et basin rotundato-quadratae. Knudshöe et Finshöe alp. Dovrefield.

2. *Dicranum glaciale*. (D. geniculatum Berggr. in lit.) Monoicum, flore masculo ad pedem feminei. Dense et late caespitosum, caespites superne virides, inferne fusci. Caulis 2–4 pollicaris, fere eradiculosus, parce dichotome ramosus, e basi plerumque procumbente et geniculato-flexuosa adscendens, fragilis. Folia erecto-patentia vel subsecunda lanceolato-subulata, superne convoluto-concava, integerrima vel in apice remote et minute dentata, sicca apice cirrato-tortilia, areolis lineali-elongatis, cellulis angularibus magnis, aurantio-rufis. Folia perigonalia externa e basi late ovata et vaginante subulata, interna ovato-rotundata, apice brevius acuminata, fulva. Perichaetalia e basi dilatata et convoluto-vaginante valde abrupte tenui-acuminata Capsula in pedicello brevi oblongo-cylindrica, incurva, sicca striata, solida, basi tumido-strumosa, operculo conico, longirostro, obliquo. Peristomii dentes purpurei laeves, haud papillosi, articulis distinctis. Kongsvold alp. Dovre.

3. *Radula alpestris* n. sp. Lindbergii. Caespites molles lutescentes, caulis procumbens vel saepius ascendens, flaccidus,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: [7_1868](#)

Autor(en)/Author(s): Eiben Christian Eberhard

Artikel/Article: [C.E. Eiben, Systematisches Bezeichniss der Laubmooose
Ostfrieslands 25](#)