

lares aggregata, vix prominula; sporae in ascis cylindrico-clavatis, creberrimis 8-nae, cuneatae, dyblastae, medio leviter constrictae, hyalinae, 0,012—15 mm. longae, 0,005—6 mm. latae. Bod färbt den Inhalt der Schläuche löwengelb. — Auf bituminösem Kalk.

*T. Leightonii* Mass. an Haselnussrinde: crusta hypophloeodes, fere obsoleta; apothecia minutissima, in pulvinulos convexiusculos aggregata, vix prominula, obsolete pertusa; sporae in ascis obovatis 8-nae, elliptico-cuneatae, medio leviter constrictae, constanter tetrablastae, hyalinae, 0,021—23 mm. longae, 0,007—8 mm. latae.

*Pyrenopsis haematopis* (Sommerf.) auf Granit.

*Cryptothele permiscens* (Nyl.) auf Granit.

L. R.

Erbario crittogramico italiano pubblicato dai Signori M. Anzi, F. Baglietto, L. Caldesi, A. Carestia, V. Cesati, G. De Notaris etc. etc. Serie II. Fasc. I. et II. No. 1—100. Genova, 1868.

Diese neue Serie enthält von 1 bis 100:

2 Isoëten: *J. Malinverniana* und *J. echinospora* Dur.

1 Farn: *Aspidium pallidum* Lk.

20 Moose: *Brachythecium lutescens* De N., *Limnobium subsphaericarpum* De N., *Amblystegium riparium abbreviatum* B. E., *Bryum torquescens* B. E., *Webera polymorpha curviseta* Schpr., *Meesia uliginosa alpina* et minor, *Grimmia procera* Bals. (*Racomitrium sudeticum* Schpr.), *Grimmia tergestina* Tomm., *Tortula inermis* Mont., *Dicranum falcatum* Hedw., *D. fulvellum* Sm., *Seligeria recurvata* Br. E., *Mnium orthorrhynchum* Brid., *Catascopium nigritum* Brid., *Grimmia sessitana* De Ntris. nov. sp. *Monoica*, habitus G. Donianae, folia flaccida margine vix recurvata, superiora comaliaque ovato-lanceolata, nervo excurrente piliformi aristata, reliqua lanceolata mutica; pedunculus curvatus folia comalia aequans; capsula ovata; operculum obtuse breviterque conoideum; annulus nullus; peristomii dentes apice foraminulosi; calyptre latere fissa lobataque vel cucullata. An quelligen Abhängen in Val Sesia. — *Desmatodon latifolius* muticus, *Tortula marginata* Wils.; *Trichostomum bericum* De Ntris. (= *Leptotrichum tenue* Schpr. Synops. ex p.), *Dicranum undulatum* B. D., *Andreaea Grimsulana* Bruch

19 Flechten: *Ramalina calicaris*, *R. fraxinea* Ach., *R. fastigiata* Ach., *R. pollinaria cetrarioides* Bagl. herb., *Hagenia intricata* De Ntris. (= *Evernia intricata* Fr.), *Hagenia pulverulenta epigea* Bagl. Mspt. (asci primum subcylindracei, tandem clavati 6—8-spori, paraphyses mediocres

subflexuosae, apice incrassato fuscescentes, sporidia juniora subglobosa, nucleolum unicum foventia, demum bilocularia, in quovis loculo sporidiolum cupulaeforme pedicello crasso praeditum gerentia, fuscescentia; auf der Erde und an Mauern in einem Garten auf der Insel Sardinien), *Pannaria craspedia* Körb. P., *Stereocaulon Soleirolii* Duf. (= *Chlorea Soleirolii* Nyl.), *St. vesuvianum* P., *Biatora rivulosa* corticola Fr., *Rhaphiospora viridescens* Mass., *Calicium quercinum brachypus* Bagl. (Th. tartareus, albidus; apoth. breviter crasseque stipitata, stipite atro, excipulum margine primitus pruinatum vix aequante, juniora, stipite computato, crasse clavulato — urceolata, dein infundibuliformi — turbinata, saepe sub ore leniter constricta, disco turgescens, atra, scabra; asci e basi tenuata teretiusculi 8-spori, cito evanescentes; paraphyses filiformes; spor. ovoidea vel ellipsoidea, bilocularia, ad dissepimentum saepe contracta, utroque apice interdum apiculata, fuligineo badia), *Stenocybe Mildeana* Körb., *Physcia parietina ectanea* Nyl., *Parmelia Acetabulum* Duby, *Callopisma aurantiacum velatum* Mass., *C. marmoratum* Bagl., *Lecanora Picconiana microcarpa* Bagl., *Diplotomma Caricae* Bagl.

25 Algen: *Chondriopsis coerulescens* J. Ag., *Lemania torulosa* K., *Bryopsis simplex versatilis* (Caespites densi, altitudine palmares, siccitate nitide ex olivaceo-virides; coelomata basi prostrata, ramentis deflexis, flexuosis radicantia, setacea, simplicia, vel alterne, parce, vase, vel secunde ramosa, vel conferte ramosissima; rami erecti coeloma primarium interdum subaequantes, simplices, nudi, vel, cum coelomate primario, saepe infra apicem nudo, producto, dense plumati; ramentis distichis, vel undique egredientibus. Cagliari. Canepa), *Rivularia Lens* Menegh., *Oedogonium ciliare* DNtris. (Trichomata, ad foliorum marginem, dense aggregata, dimidium centimetrum altitudine vix excedentia, callo scutiformi adfixa; articuli inferiores elongati, diametro 4—5 plo longiores, superiores validiores, diam.  $\frac{1}{1100}$  mm. paullo excidente, 2—3 plo longiores, terminalis obtusus; oogonia sphaeroidea  $2\frac{1}{2} \frac{3}{100}$  mm. diametro aequantia, articulo abbreviato transverse annulato saepe suffulta, discreta, vel 2—3-moniliformi adproximata; oosporae sphaericae, laete aurantiaceae, episporio crasso praeditae, granulis rotundatis aurantiis farctae. Parma. Passerini), *Microcystis olivacea* K., *Protococcus roseus* Menegh., *Micrasterias denticulata* Breb., *Euastrum verrucosum* Ehrb., *Gomphonema Lagenula* K., *Sphacelaria tribuloides* radicata De Ntris., *Ceramium gracillimum* Griff., *Botryophora dichotoma* Bomp. in Hedwigia 1867, *Neadelia fimbriata* Bomp. in Hedwigia 1867, *Cladophora moniliformis* Ard., *Ulothrix*

Braunii K., *Lyngbya aeruginosa ligurnica* Savi (trichomatibus nonnihil crassioribus,  $\frac{3}{100}$  mm. latit. aequantibus, vaginis tenuibus a *L. aerug.* typica recedit), *Oscillaria major* Vauch., *Gloeocapsa polydermatica* K., *Hyalosira rectangula* K., *Podosphenia communis* Heib., *Pinnularia Passerini* (exigua, vix  $\frac{2}{100}$  mm. longit. aequans, saepe brevior, a latere rectangularis, a fronte elliptico oblonga, costata, costis radiantibus discretis, nodulis subvalidis), *Nitzschia tenuis* Sm., *Achnanthidium lanceolatum* Breb., *Cyclotella Kützingiana* Thw.

32 Pilze: *Agaricus flaccidus* Sow., *Ag. hirneolus* Fr., *Ag. parilis* Fr., *Ag. tenacellus* P., *Ag. pudicus* Fr., *Ag. acutesquamosus* Weinm., *Ag. epipterygius* Scop., *Ag. vervacti* Fr., *Coprinus fimetarius* Fr., *Lenzites faventina* Cald., *Hexagona Marcucciana* Bagl. et de Ntris. (Ligneo-suberosa; pileus unguilatus, sessilis, superficie crustaceus, glaber, nitide umbrino vel piceo-fuscus, vix scruposus, ambitu obsolete zonatus, ex integro fere tubulis constans; trama compacte floccosa, umbrina; tubuli ampli lignei, stratosi, intus dilute fuscescentes, laeves, ore infuscato, hexagoni, pentagoni, varieve angulati, = H Mori Fung. Sard. in collect. Un. itin. 1866 vix Pollini), *Peziza bulgarioides* Rab., *Ipex fusco-violaceus* Fr., *Clavaria alutacea* Lasch, *Rhizopogon rubescens* Tul., *Didymium physaroides* Fr., *Trimmatostroma Salicis* Cda., *Blitridium Carestiae* De Ntris. (Ascomata patellulata, disco carnea, excipulo cellulis atris constipatis contexto, in sicco repando-inflexo-marginata; asci grandes 4—5-spori; paraphyses filiformes; sporidia grossa oblongata, nucleolis lutescentibus in series transversas parallele digestis foeta), *Dermatea Cerasi* Fr., *Trochila craterium* Tul., *Naevia Lauri* Cald., *Hypoderma virgultorum* Vincetoxicici Duby, *Lophodermium arundinaceum* Duby, *Dothidea Sambuci Hippophaëos* (Sporidia bilocularia, recta v. leniter curvula, loculis inaequalibus, superiore majore), *Aecidium Leuconii* Bals. et de Ntris., *Coniothyrium Pini* Corda, *Cerebella Andropogonis* Ces., *Puccinia coronata* Kl., *P. Calthae* cum Uredine, *P. Scirpi* cum Uredine, *P. Virgaureae* Lib., *Capitularia myelospora* Ces.

L. R.

---

L. Rabenhorst, *Fungi europaei exsiccati. Cent. XII.*  
Dresdae, 1868.

Enthält von Nr. 1101—1200 folgende seltner, mehr oder minder interessante, auch mehrere neue Pilzformen: *Agaricus Bloxami* B. et Br. aus England. *Marasmius carpaticus* Kalchbr. n. sp. In abieguo-rupestribus Scepusii (Hungar. boreal.) locis siccis, plus minus apricis, inter acus dejectas frequens. Gre-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: [7\\_1868](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Literaturbesprechung 119-121](#)