

bricata, semiverticalia, oblique semiovato-falcata, enervia, apice acute tridentata, dentibus divergentibus. Amphigastria libera, approximata, rotundato-quadrata, quartam foliorum partem magna, apice acute quadridentata, marginibus lateralibus revolutis. Perianthia ignota. — Neu-Seeland. An alten Stämmen in Wäldern um Coromandel; leg. v. Hochstetter.

Lophocolea Jelinekii Rehd. Caules repentes, ramosi, caespites extensos terrae adpressos formantes. Folia tenerima, e cellulis parvis leptodermis composita, applanata, apice emarginato bi-rarius unidentata, dentibus acuminatis; margines laterales integerrimi, dorsalis rectiusculus, ventralis rotundatus. Amphigastria parva, libera, bifida, sinu obtuso, laciniarum margines exteriores irregulariter dentati. Flores fructusque ignoti. — St. Paul. Häufig an feuchten, humusreichen Stellen; leg. Jelinek.

Plagiochila Nicobarensis Rehd. (Adiantoideae, cucullatae.) Caulis primarius repens; rami erecti, subsimplices vel furcati. Folia imbricata, horizontaliter patentia, semiovato-oblonga, apice rotundato; Margo ventralis longe dentato-ciliatus, basi cordatus, dorsalis breviter decurrens, denticulatus; amphigastria nulla. Flores masculi, feminei, fructusque ignoti. — Nikobaren. An den Stämmen von Baumfarnen; leg. Jelinek.

Plagiochila Fenzlii Rehd. (Vagae, distichae.) Caulis primarius filiformis, nudus, repens; rami ascendentes, flagelliformes, vage ramosi, laxe intricati et caespites extensos formantes. Folia remotiuscula, subverticalia, patentia, nitida, oblongo-lanceolata, acuta breviter decurrentia, marginibus lateralibus integerrimis, apice spinuloso-tridentata. Folia involucralia oblique ovata, dentato-ciliata, perianthio longiora. Perianthia obovato-clavata, ore dilatato compresso ciliata. Seta perianthio duplo longior, capsula valvis lineari-lanceolatis, utrinque attenuatis, atrofusis. Elateres fusiformes $\frac{1}{12}$ '' longi, bispiri. Sporae tetraëdrae, fuscae, granulatae, $\frac{1}{200}$ '' magnae. — Neu-Seeland. An alten Baumstämmen in Wäldern um Coromandel; leg. v. Hochstetter. L. R.

Erbario crittogamico italiano pubblicato da G. de Notaris e F. Baglietto. Serie II. Fasc. III. N. 101 bis 150. Genova, Dicembre 1868.

Rhizocarpeae 1: *Isoëtes Durieui* Bory.

Musci frondosi 11: *Amblystegium* (Cratoneuron) falcatum heteromallum De Ntris. Late confertum, decimetra 2 altit. met. — Caulis erectus, ramis solitariis, geminis, fasciculatisve innovans. Folia laxè imbricata, erecto-putula, vix in ramis horuotinis subsecunda, e basi constricta,

brevissime decurrente, late ovato-acuminata, integra, plica utrinque extante, concava, nervo valido, rufescente, ante apicem desinente instructa, in sicco corrugata. Paraphylla copiosissima, tenua, subulato-piliformia. In Valtellina gesammelt von M. Anzi. Das Moos ist reich besetzt mit Gomphonema Mustela Ehrenbg. Microgeol.

Fabronia octoblepharis Schw., Buxbaumia indusiata Brid., Bryum Donianum Grev., Webera Tozeri Schpr., Orthotrichum Lyellii H. et T., Tortula squarrosa De Ntris, Trichostomum Barbula Schw., Trich. strictum Br. E., Stylostegium caespiticium Br. E., Phascum rectum forma luxurians.

Hepaticae 1: Jungermannia divaricata rivularis.

Lichenes 8: Hagenia caesia Bagl., Dimaelena nimbose Th. Fries, Calloporisma aurantiacum holocarpum corticolum Arn., Scutula Wallrothii aggregata Bagl., Lecioglyphia nivalis Bagl., Arthonia coniangioides Bagl., Arthopyrenia Persoonii Lentisci Bagl., Leptogium tremelloides Fr.

Algae 14: Mesogloia Griffithsiana Grev., Lemania Daldinii nitidula Rabenh., Champia parvula Harv., Polysiphonia tenella J. Ag., Psichohormium Canepae De Ntris, laete olivaceo-virens, late intricatum, in sicco bombycinum, articulis valde pellucidis, $\frac{2}{100}$ mm. latitud. aequantibus, diametro 2—3plo longioribus, cingulis crassis, remisto pallescentibus, rotundatis, oblongatove-torosis. Dem Ps. cinereum und patavinum ähnlich, doch sind die Fäden stärker und deshalb passt es zu keinem von beiden.

Prasiola crispa Ktz., Spirogyra crassa Ktz., Staurospermum caerulescens aeruginosum, Cosmarium Naegelianum Breb., Melosira varians Ag. Epithemia ocellata Ktz., Navicula Gigas Castr. Gomphonema pulvinatum Braun, Rhodosphecia curvata Rabenh. stipite abbreviato!

Fungi 15: Agaricus griseus Fr., Ag. sementino Viv., Ag. auricomus Batsch, Craterellus lutescens Fr., Polyporus biennis rufescens (Pers.), Hypochnus Michelianus Cald., Hypoxylon repandum Fr., Hypox. Michelianum De Ntris, Diatrype aneirina Fr., Erysibe communis Link (Asci e basi contracta ovati, vel oblongi bispori; sporidia oblongata), Excipula Eryngii Corda, Exoascus deformans Beck., Fusarium lagenarium Passer. (Minutum, plerumque orbiculare, sub epidermide nascens; sporae tereti-oblongatae, rectae, vel curvulae, interdum oblongo-subclavatae, nucleo grumoso foetae, pallescentes, e basidiis brevissimis, densissimeque nascentes, epidermide rupta, cirrhose diffuentes, demum in acervos irregulares aurantiacos effusae.) Auf Früchten einer Lagenaria. Pileolaria Terebinthi Cast., Uredo caricina DeC. L. R.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [8_1869](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Erbario crittogamico italiano pubblicato da G. de Notaris e F. Baglietto. 30-31](#)