

bricata, semiverticalia, oblique semiovato-falcata, enervia, apice acute tridentata, dentibus divergentibus. Amphigastria libera, approximata, rotundato-quadrata, quartam foliorum partem magna, apice acute quadridentata, marginibus lateralibus revolutis. Perianthia ignota. — Neu-Seeland. An alten Stämmen in Wäldern um Coromandel; leg. v. Hochstetter.

*Lophocolea Jelinekii* Rchdt. Caules repentes, ramosi, caespites extensos terrae adpressos formantes. Folia tenerima, e cellulis parvis leptodermis composita, applanata, apice emarginato bi-rarius unidentata, dentibus acuminatis; margines laterales integerrimi, dorsalis rectiusculus, ventralis rotundatus. Amphigastria parva, libera, bifida, sinu obtuso, laciniarum margines exteriores irregulariter dentati. Flores fructusque ignoti. — St. Paul. Häufig an feuchten, humus-reichen Stellen; leg. Jelinek.

*Plagiochila Nicobarensis* Rchdt. (Adiantoideae, cucullatae.) Caulis primarius repens; rami erecti, subsimplices vel furcati. Folia imbricata, horizontaliter patentia, semiovato-oblonga, apice rotundato; Margo ventralis longe dentato-ciliatus, basi cordatus, dorsalis breviter decurrentis, denticulatus; amphigastria nulla. Flores masculi, feminei, fructusque ignoti. — Nikobaren. An den Stämmen von Baumfarnen; leg. Jelinek.

*Plagiochila Fenzlii* Rchdt. (Vagae, distichae.) Caulis primarius filiformis, nudus, repens; rami ascendentis, flagelliformes, vase ramosi, laxe intricati et caespites extensos formantes. Folia remotiuscula, subverticalia, patentia, nitida, oblongo-lanceolata, acuta breviter decurrentia, marginibus lateralibus integerrimis, apice spinuloso-tridentata. Folia involucralia oblique ovata, dentato-ciliata, perianthio longiora. Perianthia obovato-clavata, ore dilatato compresso ciliata. Seta perianthio duplo longior, capsula valvis linear-lanceolatis, utrinque attenuatis, atrofuscis. Elateres fusiformes  $\frac{1}{12}''$  longi, bispiri. Sporae tetraëdrae, fuscae, granulatae,  $\frac{1}{200}'''$  magnae. — Neu-Seeland. An alten Baumstämmen in Wäldern um Coromandel; leg. v. Hochstetter. L. R.

---

Erbario crittogramico italiano pubblicato da G. de Notaris e F. Baglietto. Serie II. Fasc. III. N. 101 bis 150. Genova, Dicembre 1868.

*Rhizocarpeae* 1: Isoëtes Durieui Bory.

*Musci frondosi* 11: *Amblystegium* (*Cratoneuron*) *falcatum heteromallum* De Ntris. Late confertum, decimatra 2 altit. met. — Caulis erectus, ramis solitariis, geminis, fasciculatisve innovans. Folia laxe imbricata, erecto-putula, vix in ramis hornotinis subsecunda, e basi constricta,

brevissime decurrente, late ovato-acuminata, integra, plica utrinque extante, concava, nervo valido, rufescente, ante apicem desinente instructa, in sicco corrugata. *Paraphylla* copiosissima, tenua, subulato-piliformia. In Valtellina gesammelt von M. Anzi. Das Moos ist reich besetzt mit *Gomphonema Mustela* Ehrenbg. *Microgeol.*

*Fabronia octoblepharis* Schw., *Buxbaumia indusiata* Brid., *Bryum Donianum* Grev., *Webera Tozeri* Schpr., *Orthotrichum Lyellii* H. et T., *Tortula squarrosa* De Ntris, *Trichostomum Barbula* Schw., *Trich. strictum* Br. E., *Stylostegium caespiticium* Br. E., *Phascum rectum* forma luxurians.

*Hepaticae* 1: *Jungermannia divaricata rivularis.*

*Lichenes* 8: *Hagenia caesia* Bagl., *Dimaelena nimbosa* Th. Fries, *Callopisma aurantiacum* holocarpum corticolum Arn., *Scutula Wallrothii aggregata* Bagl., *Leciographa nivalis* Bagl., *Arthonia coniangioides* Bagl., *Arthopyrenia Persoonii Lentisci* Bagl., *Leptogium tremelloides* Fr.

*Algae* 14: *Mesogloia Griffithsiana* Grev., *Lemania Daldinii nitidula* Rahenh., *Champia parvula* Harv., *Polysiphonia tenella* J. Ag., *Psichohormium Canepae* De Ntris, laete olivaceo-virens, late intricatum, in sicco bombycinum, articulis valde pellucidis,  $\frac{2}{100}$  mm. latitud. aequantibus, diametro 2—3plo longioribus, cingulis crassis, remisto pallescentibus, rotundatis, oblongatove-torosis. Dem Ps. cinereum und patavinum ähnlich, doch sind die Fäden stärker und deshalb passt es zu keinem von beiden.

*Prasiola crispa* Ktz., *Spirogyra crassa* Ktz., *Staurospermum caerulescens aeruginosum*, *Cosmarium Naegelianum* Breb., *Melosira varians* Ag. *Epithemia ocellata* Ktz., *Navicula Gigas* Castr. *Gomphonema pulvinatum* Braun, *Rhicosphenia curvata* Rabenh. stipite abbreviato!

*Fungi* 15: *Agaricus griseus* Fr., *Ag. sementino* Viv., *Ag. auricomus* Batsch, *Craterellus lutescens* Fr., *Polyporus biennis rufescens* (Pers.), *Hypochnus Michelianus* Cald., *Hypoxylon repandum* Fr., *Hypox. Michelianum* De Ntris, *Diatrype aneirina* Fr., *Erysibe communis* Link (Asci e basi contracta ovati, vel oblongi bispori; sporidia oblongata), *Excipula Eryngii* Corda, *Exoascus deformans* Beck., *Fusarium lagenarium* Passer. (Minutum, plerumque orbiculare, sub epidermide nascens; spora tereti-oblongatae, rectae, vel curvulae, interdum oblongo-subclavatae, nucleo grumoso foetae, pallescentes, e basidiis brevissimis, densissimeque nascestes, epidermide rupta, cirrhose diffuentes, demum in acervos irregulares aurantiacos effusae.) Auf Früchten einer *Lagenaria*. *Pileolaria Terebinthi* Cast., *Uredo caricina* DeC. L. R.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [8\\_1869](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Erbario crittogramico italiano pubblicato da G. de Notaris e E. Baglietto. 30-31](#)