

Da ich dieses Jahr längere Zeit meiner Gesundheit halber in Tirol verbrachte, so unterliess ich nicht, sie an dem ersten Fundorte (am Stuibenfalle bei Umhausen im Oetzthale) aufzusuchen. Hier lebt sie in handgrossen Rasen unterhalb des Wasserfalles in den Felsblöcken der Berglehne, oft gesellig mit *Sticta silvatica* und *Nephroma laevigatum* und *tomentosum*. Leider war es mir, trotz eifrigsten Suchens, nicht vergönnt, Früchte aufzufinden, sodass der Gattungscharakter nicht festgestellt werden konnte. Ich bin so glücklich, sie in Rabenhorst's *Lichenes europaei*, wenn auch nur in kleinen Räschen, ausgeben zu können, sodass die Herren Lichenologen Gelegenheit haben, selbst zu beurtheilen, ob sie bei *Cornicularia* verbleiben kann, oder vielleicht eine eigene Gattung bilde. So lange die Früchte noch unbekannt sind, dürfte letzteres als unräthlich erscheinen.

B. Auerswald.

Repertorium.

K. Kalchbrenner, a Spepesi Gombak Jegyzéke. Mit 6 colorirten Tafeln. II. Pest, 1868. (Aus den Verhandlungen der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Pest besonders abgedruckt.)

Es ist dies ein Verzeichniss von 1334 Pilzen, von denen 1 bis 962 bereits früher mitgetheilt worden sind. Leider sind alle beigegebenen Notizen, ausser der Diagnosen der neuen Arten, in ungarischer, uns nicht zugänglicher Sprache.

Agaricus Collyb. caesiellus n. spec. Stipes curtus, cartilagineus, fistulosus, sursum attenuatus, fuscolilacinus, ad basim floccoso-farinaceus. Pileus e convexo planus, obtusus, margine inflexus 4—5''' latus, siccus, impolitus, caesius, vel cyaneo-griseus. Lamellae rotundato-adnatae latae, subdistantes, lilacino-griseae, nunquam pulverulentae et decolorantes ut in *Ag. laccato*.

Ag. Mycena elegans Pers. b hyperboreus. Stipes curtus, fistulosus, lividus, basi fibrillis flavis vestitus. Pileus vix uncialis, olivaceo-umbrinus. Lamellae fumosae, vel omnino nigricantes, acie laete cinnabarinae.

Ag. Nolan. piceus nov. sp. Stipes cartilagineus, fistulosus, aequalis, nudus glaber 1—1½'' longus, lineam crassus, purpurascens-fuscus. Pileus membranaceus, e campanulato explanatus, centro papillatus, 4—5''' latus, glaber, pellucide striatus, fuligineus, haud expallens. Lamellae adnatae, secedentes, distantes, venoso-connexae, atropurpureae.

Ag. Lampas nov. subsp. Stipes fibrilloso farctus, demum cavus, elasticus, tenax, subaequalis, basi breviter et acute radicans 2—3" longus 3—4"" crassus, flavus, infra annulum superum, cortinaeformem, floccosum, nonnunquam pendulum, striatum, sed facile disparentem, — squamulis floccosis adpressis vel subsquarrosis parce vestitus, supra annulum dilutior, floccis concoloribus (flavis) punctatus vel laevis. Pileus e convexo planus, umbonatus, margine primum involutus, 1½—2" latus, viscosus, squamis obscurioribus, raris, adglutinis variegatus, vel iisdem evanescentibus glaber, aureo fulvus. Caro stipitis et pilei albo-flavescens. Lamellae 2—3" latae, emarginatae, adnatae, aquose argillaceae, dein cinnamomeo fusciscentes. Odor parum notabilis, at haud gratus. — Ag. adiposum in mentem revocat, a quo tenuitate omnium partium et stipite vix viscoso diversus.

Ag. Lepturus nov. subsp. Stipes omnino farctus, tenax, genuflexus, 1—2" altus, 2—3"" crassus, deorsum ad 3—4" incrassatus, basi truncatus, et radícula tenui, circiter unciali caudiculatus, totus albido-flavescens, fibrilloso-striatus, versus basim squamoso-lacerus, exoletus e fusco fulvescens. Annulus floccosus, fugax. Pileus carnosus, compactus, convexus, obtusus, margine deflexo plerumque repando 1½—3 latus, adiposo-viscidus, flaventivelaurantiaco-fulvus, in squamas disruptus, squamis in disco colliculosis, versus marginem subimbricatis vel fibrillosis, adpressis, senio demum deplanatis et plus minus disparentibus. Caro stipitis et pilei concolor, flavescens. Lamellae sinuato-adnexae, denti brevi striato — decurrentes, 2—3"" latae, acie integrae, primum pallidae, subtestaceae, dein aquose cinnamomeo-fuscae. Odor debilis at gratus. Sapor subnullus. — Pileo rimose squamoso ad Ag. heteroclitum revergit, at hic odore Armoraceae, stipite crasso, albo etc. omnino heterogenea species.

Marasmius carpathicus n. spec. Fries in litt. Stipes fistulosus, subincurvus, curtus, 1—2" longus 1"" et ultra crassus, subaequalis, laevis, versus apicem nudus, pallidus ceterum badio-fusciscentes, supra basim radicantem albido villosus-tomentosulus. Pileus carnosulus, e convexo-planus, subumbonatus, circa umbonem parum depressus, uncialis et minor, hygrophanus, subviscidus, in udis pallidus at disco plerumque obscurior, aquose rufo-fuscus, margine tenui, recto, breviter et irregulariter striatulus, — siccus candicans, margine subrugulosus. Lamellae ventricosae, rotundato adnexae, secedentes, quaternatae, in fundo venose connexae, subconfertae, pallidae, exsiccando demum pileo obscuriores. Odor debilis, alliaceus. Sapor mitis. — Omnino inter Terginos locandus, M. putillo proximus, at colore albido, imo et can-

dido diversus. Stipes primito albus, exsiccando, a basi ad medium fuscescit simulque tenuior fit.

Panus Hoffmanni n. sp. Fries in litt. Subfasciculatus, totus alutaceo-albidus vel rarius griseus, substantia coriaceo-lenta. Stipes excentricus vel omnino lateralis, curtus, 2'''—1½'' longus, 1—3''' crassus, aequalis, cylindricus vel, ex statione compressus, setulis fasciculatis albido-strigosus. Pileus integer, orbicularis centro depressus vel umbilicatus, vel dimidiatus, oblique porrectus, lobatus, varieque flexus, margine deflexus vel involutus, setulis fasciculatis stigosis et praesertim versus marginem fimbriatus. Lamellae decurrentes, simplices, subconfertae, angustae, acie integerrimae, senio ligneo-pallentes.

Pan. carpaticus n. sp. Solitarius, totus, albus. Stipes lateralis, curtus, ½'' longus vel brevior, aut obliteratus, 3''' crassus vel crassior, pubescens. Pileus tenuis, sed compactus et tenax, dimidiatus horizontaliter porrectus, e convexo planus postice coarctatus, et cum stipite confluent, sinuatus lobatusve 2—3'' longus et latus, laevis, glaber, margine primum arcte involutus. Lamellae longe decurrentes, simplice vel passim ramosae 1½''—2'' latae, exsiccando ligneo pallentes, subconfertae, acie integerrimae. — Multis notis cum *Ag. lignatili* congruit; at lamellae omnino lentae decurrentes, latiores et minus confertae, quapropter ex sensu Friesii omnino ad *Panos* referendus.

Polyporus scutiger. nov. spec. Stipes subaequalis, vix unciam longus, 3''' crassus, tenax, ferrugineo-pulverulentus. Pileus disciformis, convexo-planus, strato tomentoso molli vestitus, centro subscrobiculatus, ceterum concentricè zonatus et radiatim rugosus, concolor, fulvo-ferrugineus, 2'' latus. Sub strato pilei tomentoso, 1''' circiter crasso, adest aliud stratum coriaceum nec spongioso suberosum, aequè crassum. Pori minutuli, integri, vix ultra lineam longi, inaequales, fusco-grisei. Contextus ferrugineo-fuscus. — Differt igitur a *Pol. circinato* statura multo minori, stipite tenui, contextu haud suberoso, et pilio zonato et radiatim rimoso. Convenit vero strato pilei dulpici. A *Pol. perenni* differt pileo multo duriori, plano-convexo nec unquam infundibuliformi, et poris minutis, haud laceris.

Pol. Evonymi n. sp. Imbricatus vel subsolitarius, pileo suberoso-lignoso, effuso-reflexo, tenui, plano-convexo, passim excrescentiis tuberosis deformato, zonato griseo-fusco, tomentoso, exoleto demum glabrato, dense concentricè sulcato, nigricante, margine concolori, acuto, poris curtis, minutis, fulventibus. Contexto fulvo. — Eximie analogus *Pol. Loni-*

cerae et *P. Ribis*, at a primo colore, a posteriore duritie diversus, et nonnisi in radicibus *Evonymi* obvius.

Pol. pallescens. Carnoso-lento-suberosus, substantia alba intus zonata. Pileis effuso-reflexis, imbricatis vel subsolitariis, tenuibus, 2—4''' crassis, 3—4'' latis, ad 2'' porrectis, planis, inaequalibus, sublobatis, ad marginem acutum subundulatis, azonis, indumento tenui molli vestitis, glabris, laevibus, alutaceis vel ligneo-pallentibus, hincinde lutescentibus vel — attritione — fusco rufescentibus. Poris curtis, minimis, subrotundis, planis, pileo concoloribus, pallidis, hincinde lutescentibus, et senio dilute umbrinis. Caro primum lenta quidem, ad mox a larvis perfossa, friabilis. Pori decurrunt.

Pol. spadiceus nov. sp. A *Pol. subspadiceo*, cui proximus, bene distinctus. Effusus, concolor, absque margine byssino. Poris, in statu juvenili curtis, demum vero ad 2''' elongatis, subaequalibus, mediocribus, angulatis, ore subintegris, absque membrana intermedia ligno appositis, obscure spadiceis.

Trametes Kalchbrenneri nov. spec. Fries in litt. Solitarius, amplus, suberosus. — Pileo semiorbiculari, pulvinatopiano, pestice gibboso, 4'' lato, 3'' porrecto, 2'' crasso, versus marginem acutum valde attenuato, pubescente, obsolete zonato, albido, margine et zonis dilute fuscescentibus. Poris angustis, sublinearibus, variis, passim sublabyrinthiformibus, albidis, demum dilute rufidulo-carneis (nec unquam fuscis). Caro alba. Odorem non observavi.

Pez. costata nov. sp. Stipes curtus, maxime inaequalis, terrae infossus, extus intusque lacunosus cavernosusque, candidus, in venas crassas, ramosas, costiformes candidas divisus, quibus insidet cupula tenuis, fragillima, concava, 1½—2'' lata, intus extusque fumoso-cinerea. Sporae globosae, plasmate hyalino repletae, episporio crasso, elliptico limbatae.

Pez. bulgarioides. Rbh. mspt. Cupula extus viridipruinosa, disco margine undulato, vegeto olivaceo nigrescente, ruguloso, velutino micante, ascis paraphysibus intermixtis, sporis octonis vi elastica vehemente prosilientibus, foetis. (Rbh.)

Dothidea Visci n. sp. Pyreniis dense gregariis confluentibusve, vertice complanatis, epidermide rupta cinctis, atris, nucleo albo, firmo. Ascis amplis, cylindricis, 8 sporis. Sporidiis magnis, ellipticis, fuscis, paraphysibus ramosis, contextis.

Amphisphaeria Lycii. a) Fungus conidifer: = *Coryneum* (*Seimatosporium*) *Lycii*. m. *Sporidesmium Lycii*: G.

von Niessl, *Stilbospora* Lyc. Hazslinszky, Beitrag zur Kenntniss der Sphaerien der Lyciums (Verhandl. der zool. bot. Gesellschaft in Wien. 1865).

Coryneum Nees. a) *legitimum*; Stromate opaco, sporidiis in discum stipatis. b) *Seimatosporium* (Corda) = *Sciniatosporium* Rchb. — Stromate laete colorato, sporidiis effusis.

Pyreniis simplicibus, gregariis, epidermide tectis eamque inflantibus, membranaceis, globosis, deplanatis, astomis, poro simplici, vertice lacerato dehiscentibus, ascis tenellis, diffluxibilibus, cylindricis, sporis 8, seriatis, didymis, fuscis. — Nucleus in immaturis — carneus.

Pseudovalsa Lycii. a) *Fungus pycnidifer*. = *Staurosperum* Lycii. Rbh. *Fung. eur.* *Clinterium* Lycii. b) *Fungus conidifer*. = *Fusarium* Lycii — mihi olim. Tuberculis primum tectis, dein erumpentibus, globosis, carneis, demum fuscis vel fusco nigris, rugulosis, e microstylosporidis curvatis, falciformibus conglutinatis. c) *Fungus ascophorus*. = *Pseudovalsa* Lycii (Duby).

Nachträge.

Ag. Armill. melleus Vahl. *Oedipus* nov. subsp. Stipes spongioso-farctus, elasticus, 2—4" longus, bulbose dilatatus, 1—1½" crassus et crassior, apicem versus attenuatus, supra annulum e lamellis decurrentibus sulcatus, junior tela arachnoidea albida obtextus, hac disparente pulverulentus argillaceus, ad basim olivaceo-fuscescens, plerumque nervis distantibus striatus. Velum bombycinum, primo cortinae-forme, expansum subtus haud raro squamulis flavidis rufisque eleganter variegatum, demum ad marginem pilei disparens, ad stipitem annulum sistens superum, paene apicalem. Pileus disco carnosus, stipiti contignus, ceterum tenuis, pulvinatus, obtusus, junior squamulis fibrosis squarrosis, pileo vix obscurioribus vestitus, ex argillaceo vel ochraceo rufescens, margine integer. Lamellae sinuato adnatae, decurrentes, subdistantes, brevioribus mixtae, pallidae e carneo albidae, demum rufescentes, haud, albo farinosae, nec caespites pulvere albo conspurcantes.

Boletinus n. gen. *Hymenophorum* celluloso lacunosum, ab hymenio non discretum, tramae instar inter cellulas descendens; hinc cellulae in carne pilei immutata nidulantes, et nec ab hoc, nec ab se invicem separabiles. *Fungus* carnosus, putrescens, stipite centrali velato. *Bolet* sp. auctt. — *Boletinus cavipes* (Opat). — In silvis montanis et inferalpinis ad terram, sed etiam in trunco muscoso lectus. — Stipes centralis elasticus, tenax, medulla molliori farctus et demum cavus, subaequalis velsursum attenuatus, 2—3" longus,

3—4''' crassus, basi dilatata radicoso appendiculatus, impositus vel fibrilloso squamulosus, fulventi brunneus. Cortina membranaceo — fibrosa, albida, partim margini pilei, partim apici stipitis adhaerens, demum penitus disparsa. Pileus e convexo planus vel depressus carnosus, lentus (haud fragilis) 1½—3" latus, siccus, fulvus squamulis fibrillosis vestitus. Hymenium pileo obscurius, fulvo- vel demum olivaceofuscum, celluloso-lacunosum porosumque, venis quibusdam prominentioribus, radiantibus, ramosis, anastomosantibus percursum. Lacunae a venis his interceptae et in cellulas, minores effiguratae, poros sistunt compositos, irregulares, sublabyrinthiformes, et in stipite decurrentes, rete superficiale formant. — Caro tenax at mollis, pilei flavescens, stipitis alba. Odor subnullus.

Sopra le Felci Denominate Struthiopteris e delle Loco piu' strette affini Memoria del Conte Vittore Trevisan. (Estr. dal Vol. XIV. Serie III. degli Atti dell' Istituto veneto die scienze, lettere ed arti.)

Vorliegender Aufsatz ist eines Auszuges nicht gut fähig. Ref. erlaubt sich daher nur auf das Allerwichtigste aufmerksam zu machen.

Der Verfasser bespricht zuerst die Geschichte der *Genera Struthiopteris, Osmunda, Blechnum* und der Verwandten und kommt dann rücksichtlich der *Blechnae Gaudich.* zu folgender Anordnung:

Lomaria Willd.	Sori marginal.	Folia biform.	} Sori medial.	} nervuli liberi	} Blechnae.			
Struthiopteris Weis.	Folia biform.							
Distaxia Presl.	Folia uniform.							
Blechnum L.	Folia uniform.							
Parablechnum Presl.	Folia biform.		} Sori costales					
Orthogramma Presl.	Folia biform.	} in disco praeter connexionem re- ceptacularem liberi	} ad marginem connexi	} Nervuli anastomosantes.				
	(Sori mediales)							
Salpinchlaena Sm.	Folia uniform.							
	(Sori costales)							
Sadleria Kaulf.	juxta costam areolas arcuatas formantes. (Sori subcostales.)							
	Folia uniformia.							
Blechnidium Moore	ad marginem liberi, in disco areolas angulares formantes. (Sori subcosta- les.)	Folia uniformia.						

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [8_1869](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Repertorium. K. Kalchbrenner, a Spepesi Gombak Jegyzeke. 114-119](#)