

**Notizblatt für kryptogamische Studien,
nebst Repertorium für kryptog. Literatur.**

Inhalt: Repertorium: Abbé Ravaud, Liste des nouv. espèces de Mousses observée dans la Dauphiné. — Eug. Fournier, Sur la valeur du Genre Aconiopteris. — Dr. Aug. Jaeger, Enumeratio Generum et Specierum Fissidentacearum adjectis nonnullis Adnotationibus de earum literatura et distributione geographica. — Dr. Jul. Milde, Bryologia Silesiaca. Laubmoos-Flora von Nord- und Mittel-Deutschland. — De Notaris, Epilogo della Briologia Italiana. — Kleinere Mittheilungen.

Repertorium.

Liste des nouv. espèces de Mousses observée dans la Dauphiné. Abbé Ravaud. (Bull. de la Soc. bot. de France. 28. Nov. 1867.)

Ausser einem Verzeichnisse von Arten werden auch einige neue Species aufgeführt und beschrieben.


Bryum tenue Ravaud. Caespites condensati, radiculis rufis inter se cohaerentes, supra laete virides, infra rubentes. Caulis 1—2 unciales vel longiores, simplices vel fastigiato-ramosi, filiformes, ramulis julaceis. Folia apice ramulorum ovato-lanceolata, acuminata, caulina breviora, late ovata, sensim acuminata, saepius submutica, omnia concava, margine integerrimo plano haud limbato, reti laxiore, nitenti-viridia. Capsula breviter pedicellata, subito pendula, solida, lutescens, sub ore paulum constricta, operculo mamillari nitido rufo. Peristomii dentes externi lutescentes, interni albicantes.

Quoad caespitum colorem et caules filiformes *B. tenue* satis refert *Anomobryum julaceum*, a quo foliorum reti omnino recedit.

Leider fehlen nähere Angaben über Blüthenstand und Peristom.

Hypnum curvatum Schimp. in lit.

Caespites incohaerentes, molles, supra lutescenti-virides, infra sordide straminei, foliis emortuis suberadiculosi. Caulis flexuoso-erectus, simplex aut parce ramulosus, ramulis brevibus, apice subito uncinato-curvatus. Folia secunda falcata, apicalia oblongo-lanceolata, plus vel minus acuminata, caulina breviora, ovato-oblonga, breviter acuminata vel submutica aut etiam mutica integerrima, ecostata, areolatione angustissima



vermiculari-lineari ut in *H. cupressiformi*, cui proximum quidem est, sed a quo tamen primo visu forma minus eleganti distinctum apparet, nec non et supra relatis characteribus. Blütenstand wird nicht erwähnt.

Bescherelle bemerkt in derselben Sitzung, dass *Barbula papillosa* Wils. wohl nur verkrüppelte Form der *B. laevipila* sei, eine Ansicht, die Ref. schon desshalb für ganz ungerechtfertigt hält, weil beide Arten ganz verschieden bekleidet sind, *B. papillosa* constant mit einfach zugespitzten, langen Papillen, *B. laevipila* mit kurzen, zweispitzigen Warzen.

Sur la valeur du Genre *Aconiopteris*. Eug. Fournier. (Bull. de la Soc. bot. de Fr. 27. Dec. 1867.)

Das Genus *Aconiopteris* wurde von Presl auf einige *Acrostichum*-Arten gegründet und ist characterisirt durch einen verdickten Blattrand, welcher die Nerven des Blattes aufnimmt. Nach Fée gehören hierher: *A. longifolia*, *A. gladiata*, *A. Richardi* Fée. Dieser Character der *Aconiopteris* ist aber in der Wirklichkeit nicht so leicht festzustellen. Fournier verwirft daher dieses Genus, ebenso das Geschlecht *Hymenodium*, welches die Tracht des *Acrostichum* und secundäre anastomosirende Nerven besitzt, welche letztere aber auch z. B. bei einer *Aconiopteris* (*A. gladiata*) vorkommen. Diese letztere Art hat folgende Synonymie:

Acrostichum gladiatum Bory herb. *A. dissimile* Kze. Pl. Poepp. in Linn. IX. 28. Fée Acr. p. 44. No. 49. *A. Sartorii* Liebm. Mexic. Bregner. p. 166 No. 6.

Aconiopteris gladiata Fée Acr. Eine monströse Form dieser Art hat dimorphe Blätter. Roze glaubt, dass Genera und Species der Farne auch durch Beschaffenheit der Prothallien characterisirt werden können, da diese Organe von sehr verschiedener Beschaffenheit vorkämen. J. M.

Enumeratio Generum et Specierum Fissidentacearum adjectis nonnullis Adnotationibus de earum literatura et distributione geographica Auctore Dr. Aug. Jaeger. Sangalli. 1869.

Der Verfasser stellt in der Vorrede eine Bearbeitung einer vollständigen Synopsis muscorum in Aussicht, in der Voraussetzung, er werde in seinem Unternehmen von allen Moosfreunden unterstützt werden. Als ein Beispiel, wie er die Sache zu behandeln gedenke, übergibt er dem botan. Publikum obige Aufzählung der Arten der Genera *Fissidens* und *Conomitrium*, die er beide im Schlimper'schen Sinne

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [8_1869](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Repertorium. Liste des nouv. especes de Mousses observee dans la Dauphine. Abbe Ravaud. 145-146](#)