

C. majus. 13) *Mastigothrix aeruginea* K. auf *Batrachospermum moniliforme*, auch zwischen *Chaetophora* und *Schizochlamys*. 14) *Sphaerososma pygmaeum* (Arch.) aus Schweden; 15) *Mastigocladus laminosus* (K.) Cohn; 16) ***Aphanocapsa Roeseana*** de Bary, thallo gelatinoso, molli, aquose et sordide aerugineo v. fusco-aerugineo irregulariter globoso, magnitudine pisi usque ad nucis, haud raro in massas irregulares, pedales usque, conglobato. Cellulae gelatina homogenea distinctae, aequidistantes late-ovales; plasma pallide aerugineum parietale, granulosum, liquorem achroum medium tenentem cingens. Cellularum adultarum diameter major = 7—8 μ ., minor = 5—6 μ . Von Reinhardtsbrunnen in Thüringen, gesammelt von Herrn A. Röse. 17) *Zonotrichia fluviatilis* (K.); 18) *Hypheotrix variegata* Näg. var.; 19) *Nostoc sphaericum* Vauch.; 20) *Nostoc piscinale* K. von Herrn Commandant Paris in Algier auf feuchtem Boden zwischen *Cactus Opuntia* und *Agave americana* gesammelt; 21) ***Oscillaria Pörzleriana*** Rabenh. ad inter. Eine unbeschriebene Form, die man auch mit *Osc. Frölichii* *formalaete aeruginea*, *breviarticulata* bezeichnen könnte. 22) *Oscillaria Frölichii* var. *dubia* (K.) forma *crassior*; 23) *Closterium fasciculatum* Rabenh., dem *Cl. gracile* de Bréb. am nächsten verwandt und kaum mehr als durch die in Bündel vereinigten Individuen verschieden; erinnert auch an *Cl. acutum* var. *Archer* in *Micr. Journ.* II. T. XII. und steht wohl in demselben Verhältniss zu *Cl. gracile*, wie jenes zu *Cl. acutum*. 24) *Closterium gracile* Bréb. var. mit *Cl. Dianae* Ehrb., *Staurastrum apiculatum* Bréb., *Arthrodesmus octocornis* Ehrh. etc. 25) Desmidiaceen-Gemisch. Enthält vorherrschend: *Staurastrum laeve* Ralfs., *St. brachiatum* Ralfs., *St. furcigerum* Ralfs., *St. multicornis* Grun., *Desmidium Swartzii* K., *Xanthidium armatum* Bréb., *Arthrodesmus octocornis* Ehrb., *Euastrum elegans* Bréb., *Euastrum binale* (Turp.), mit *Tabellaria fenestrata*, *Navicula crassinervis* etc. 26) *Cladophora callicoma* K. aus dem Rhein, von Herrn Bausch gesammelt; 27) *Clad. utriculosa* K. aus dem Mittelmeere; 28) *Gymnogongrus plicatus* (Turn.) von der Westküste Englands; 29) *Batrachospermum filamentosum* Al. Braun und 30) *Ulva Lactuca* L., die ächt typische Form.

L. R.

Erbario crittogamico italiano pubblicato da G. de Notaris e F. Baglietto. Serie II. Fascic. VI. No. 251—300. Genova, 1870.

Dieses Heft enthält:

1) Farn: *Phaegopteris polypodioides* Feé, *Ophioglossum lusitanicum* L.;

2) Charen: *Chara fragilis* Desv.;

3) Laubmoose: *Rhynchostegium confertum* Br. E., *Pogonatum urnigerum* P. B., *Bartramia striota* Bril., *Leptobryum pyriforme* Schpr., *Orthotrichum lejocarpum* B. E., *Coscinodon cribrosus* Spruc., *Grimmia Schultzii* Wils., *Campylopus Swartzii* Schpr., *Dicranum longifolium* Hedw., *D. virens* Hedw., *D. viride* Sull., *Pottia cavifolia* Ehrh.;

4) Lichenes: *Evernia vulpina* Ach., *Hagenia venusta* Bagl., *Ricasolia Gennarii* Bagl., *Rinodina turfacea depauperata* Th. Fr., *Lecanora varia symmicta* Körb., *Dirina repanda* Nyl., *Lecidea Laurerii* Anzi, *Buellia parasema* De Ntrs., *B. triphragmia lividescens* Bagl.;

5) Algen: *Dictyota intricata* K., *Halymenia floresia* Ag., *Lomentaria phalligera* J. Ag., *Ceramium ciliatum* Hystrix (K.), *Ceramium elegans* Ducl., *Ceramium fragile* Ardiss. nov. sp. frondibus capillaribus dichotomis, ramulis inaequalibus patentissimis subsecundis obsitis, segmentis terminalibus vix forcipatis; articulis inferioribus diametro triplo longioribus, super-aequalibus, brevioribusque, interstitiis plerumque pulchre violaceis longitudine zonas superantibus, zonis superioribus aliquando piligeris pilis elongatis rigidiusculis; *Ulva Linza* Harv., *Halimeda Tuna* Lamx., *Scenedesmus obtusus* Rab., *Surirella ovata* K., *Synedra affinis* K., *S. Ulna* Ehrb., *S. amphicephala* K.;

6) Fungi: *Peziza Carestiae* Ces. in Rabenh. herb. II., *Cucurbitaria pityophila* De Ntrs., *Amphisphaeria Podisoniae* De Ntrs., *Bertia moriformis* De Ntrs., *Sphaerella rhytismoides* De Ntrs., *Septoria Fraxini* Desm., *Tympanis Pinastri* Tul. (*Stylosporea*), *Peronospora Ficariae* Tul., *Per. Viciae* Casp., *Aecidium Ervi* Wallr., *Puccinia Gentianae* Lk., *Uromyces Prunorum* Fuck., *Uredo Rubigo vera*.

Fr. Arnold, Flechten des fränkischen Jura. Neue Folge. N. 399—427, mit zahlreichen Supplementen. Eichstätt, 1870.

Omphalaria intricata Arn. in Flora 1869, *Bryopogon bicolor* (Ehrh.), *Pannaria microphylla* Kbr., *Lecanora Hageni* var. *ocellulata* Massal., *Aspicilia tumida* Arn., *Hymenelia coerulea* Kbr. von zwei Standorten, *H. melanocarpa* Kremphbr., *Rehmlia coeruleo-alba* Kremphbr., *Psora conglomerata* (Ach.?), *Lecidea enclitica* Nyl. in Flora 1866, *Lec. sylvicola* Fw., *Lec. contigua* f. *alpina* Hepp., *Lecidella goniophila* var. *granulosa* Arn. von 2 Standorten, *Biatora picila* var. *alpestris* Arn., *B. alba* Hepp. var. *denigrata* Kbr., *Rinodina exigua* forma *Rhododendri*, *Biatora lenticella* Arn., *B. Gisleri* Anzi, *B. sylvana* Kbr., *B. vernalis*, *Opegrapha lithyrga* var. *ochracea*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: [9_1870](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous , Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Erbario critogamico italiano pubblicato da G. de Notaris e F. Baghetto. 74-75](#)