

2) Charen: *Chara fragilis* Desv.;

3) Laubmoose: *Rhynchostegium confertum* Br. E., *Pogonatum urnigerum* P. B., *Bartramia striota* Bril., *Leptobryum pyriforme* Schpr., *Orthotrichum lejocarpum* B. E., *Coscinodon cribrosus* Spruc., *Grimmia Schultzii* Wils., *Campylopus Swartzii* Schpr., *Dicranum longifolium* Hedw., *D. virens* Hedw., *D. viride* Sull., *Pottia cavifolia* Ehrh.;

4) Lichenes: *Evernia vulpina* Ach., *Hagenia venusta* Bagl., *Ricasolia Gennarii* Bagl., *Rinodina turfacea depauperata* Th. Fr., *Lecanora varia symmicta* Körb., *Dirina repanda* Nyl., *Lecidea Laurerii* Anzi, *Buellia parasema* De Ntrs., *B. triphragmia lividescens* Bagl.;

5) Algen: *Dictyota intricata* K., *Halymenia floresia* Ag., *Lomentaria phalligera* J. Ag., *Ceramium ciliatum* Hystrix (K.), *Ceramium elegans* Ducl., *Ceramium fragile* Ardiss. nov. sp. frondibus capillaribus dichotomis, ramulis inaequalibus patentissimis subsecundis obsitis, segmentis terminalibus vix forcipatis; articulis inferioribus diametro triplo longioribus, super-aequalibus, brevioribusque, interstitiis plerumque pulchre violaceis longitudine zonas superantibus, zonis superioribus aliquando piligeris pilis elongatis rigidiusculis; *Ulva Linza* Harv., *Halimeda Tuna* Lamx., *Scenedesmus obtusus* Rab., *Surirella ovata* K., *Synedra affinis* K., *S. Ulna* Ehrb., *S. amphicephala* K.;

6) Fungi: *Peziza Carestiae* Ces. in Rabenh. herb. II., *Cucurbitaria pityophila* De Ntrs., *Amphisphaeria Podisoniae* De Ntrs., *Bertia moriformis* De Ntrs., *Sphaerella rhytismoides* De Ntrs., *Septoria Fraxini* Desm., *Tympanis Pinastri* Tul. (Stylosporea), *Peronospora Ficariae* Tul., *Per. Viciae* Casp., *Aecidium Ervi* Wallr., *Puccinia Gentianae* Lk., *Uromyces Prunorum* Fuck., *Uredo Rubigo vera*.

Fr. Arnold, Flechten des fränkischen Jura. Neue Folge. N. 399—427, mit zahlreichen Supplementen. Eichstätt, 1870.

Omphalaria intricata Arn. in Flora 1869, *Bryopogon bicolor* (Ehrh.), *Pannaria microphylla* Kbr., *Lecanora Hageni* var. *ocellulata* Massal., *Aspicilia tumida* Arn., *Hymenelia coerulea* Kbr. von zwei Standorten, *H. melanocarpa* Kremphbr., *Rehmlia coeruleo-alba* Kremphbr., *Psora conglomerata* (Ach.?), *Lecidea enclitica* Nyl. in Flora 1866, *Lec. sylvicola* Fw., *Lec. contigua* f. *alpina* Hepp., *Lecidella goniophila* var. *granulosa* Arn. von 2 Standorten, *Biatora picila* var. *alpestris* Arn., *B. alba* Hepp. var. *denigrata* Kbr., *Rinodina exigua* forma *Rhododendri*, *Biatora lenticella* Arn., *B. Gisleri* Anzi, *B. sylvana* Kbr., *B. vernalis*, *Opegrapha lithyrga* var. *ochracea*

Kbr., *Arthonia dispersa* Lahm, *Pertusaria chiodectonoides* Bagl., *Verrucaria margacea applanata* Zw., *Amphoridium dolomiticum* Mass. forma: *obtectum*, *Microthelia analeptoides* Bagl., *Thelidium decipiens* var. *scrobiculare* Garov., *Polyblastia cupularis* Mass., *Polybl. succedens* Rehm in litt. Apoth. mollia, sporae incolores, gonidia hymenialia adsunt, *Polyblasta bacilligera* Arn. — Supplemente sind folgende zu frühern Nummern gehörig beigegeben: 4 b. *Callopisma citrinella* (Hepp.), 129c. *Lithoidea elaeomelaena* Mass. forma alpina Arn., 143 b. *Lecidea coerulea* Kremphbr., 215 c. *Siegertia calcarea* Kbr., 281 b. *Biatorina pyracea* var. *cumbata* Leight., 284 b. *Verrucaria disjuncta* Arn., 322 b. *Aspicilia flavida* var. *micrantha* Kbr., 341 b. *Aspicil. cinereo-rufescens* (Ach.), 358 b. *Lecidea petrosa* Arn., 360 b. *Lecidella immersa* (Web.), 392 c. *Polyblastia discrepans* Lahm. Die Exemplare sind vorzüglich. L. R.

Oversigt of Finska Vet. — Societetens Förhandlingar. XII. No. 2. 1869. Nya mossor. S. O. Lindberg.

1. *Mesochaete* n. gen. Lindb. *Perichaetium axillare*, bracteis accrescentibus. Capsula horizontalis, obliqua, pachydermis, jugata. Peristomium duplex, ciliis interni teneri maxime appendiculatis. Calyptra? Androecium gemmiforme, axillare. Dem *Rhizogonium* Brid. zunächststehend. Habitus fissidentoideus, folia quadrifaria, obliqua.

M. undulata Lindb. dioica, foliis undulatis. New-England, Nov. Holl. (herb. Melbourne).

2. *Leucodon immersus* n. sp. Lindb. dioicus; foliis secundis enervibus, bracteis perichaetii capsulam sessilem longe superantibus. Habitat ad pedem montis Ararat majoris Armeniae. (Cholzko.) Wie es scheint, identisch mit einem von Hausknecht in Kaukasien gesammelten.

3. *Forsströmia nitida* Lind. (*Leptodon nitidus* Lindb. *Neckera Macounii* Sull. Canad. Natur. II. Ser. II, pp. 79, 397 [1865].)

Belleville Canad. or. (Macoun.)

Autoica, ramis parce et irregulariter ramulosis, dense subtereti foliatis, foliis integerrimis, nervo bifurco, brevi, cellulis laevissimis, angularibus paucis, ceteris subrhombeis, capsula immersa, sessili, ovali, globosa, valde leptoderma, dentibus peristomii simplicis longis, angustissimis, operculo longitudine fere capsulae, obliquale apiculato.

Andere Arten desselben Genus sind: *F. trichomitria* Lindb., *F. ohioënsis* id.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: [9_1870](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Fr. Arnold, Flechten des fränkischen Jura. 75-76](#)