

Kbr., Arthonia dispersa Lahm, Pertusaria chiodectonoides Bagl., Verrucaria margacea appianata Zw., Amphoridium dolomiticum Mass. forma: obtectum, Microthelia analleptoides Bagl., Thelidium decipiens var. scrobiculare Garov., Polyblastia cupularis Mass., Polybl. succedens Rehm in litt. Apoth. mollia, sporae incolores, gonidia hymenalia adsunt, Polyblasta bacilligera Arn. — Supplemente sind folgende zu früheren Nummern gehörig beigegeben: 4 b. Callopisma citrinella (Hepp.), 129c. Lithoicea elaeomelaena Mass. forma alpina Arn., 143 b. Lecidea coerulea Kremphbr., 215 c. Siegertia calcarea Kbr., 281 b. Biatorina pyracea var. cumbata Leight., 284 b. Verrucaria disjuncta Arn., 322 b. Aspicilia flava var. micrantha Kbr., 341 b. Aspicil. cinereo-rufescens (Ach.), 358 b. Lecidea petrosa Arn., 360 b. Lecidella immersa (Web.), 392 c. Polyblastia discrepans Lahm. Die Exemplare sind vorzüglich.

L. R.

Oversigt af Finska Vet. — Societetens Förhandlingar. XII. No. 2. 1869. Nya mossor. S. O. Lindberg.

1. *Mesochaete* n. gen. Lindb. Perichaetium axillare, bracteis accrescentibus. Capsula horizontalis, obliqua, pachydermis, jugata. Peristomium duplex, ciliis interni teneri maxime appendiculatis. Calyptra? Androecium gemmiforme, axillare. Dem Rhizogonium Brid. zunächststehend. Habitus fissidentoideus, folia quadrifaria, obliqua.

M. undulata Lindb. dioica, foliis undulatis. New-England, Nov. Holl. (herb. Melbourne).

2. *Leucodon immersus* n. sp. Lindb. dioicus; foliis secundis enervibus, bracteis perichaetii capsulam sessilem longe superantibus. Habitat ad pedem montis Ararat majoris Armeniae. (Cholzko.) Wie es scheint, identisch mit einem von Hausknecht in Kasachien gesammelten.

3. *Forsströmia nitida* Lind. (*Leptodon nitidus* Lindb. *Neckera Macounii* Sull. Canad. Natur. II. Ser. II, pp. 79, 397 [1865].)

Belleville Canad. or. (Macoun.)

Autoica, ramis parce et irregulariter ramulosis, dense subtereti foliatis, foliis integerrimis, nervo bifurco, brevi, cellulis laevissimis, angularibus paucis, ceteris subrhombatis, capsula immersa, sessili, ovali, globosa, valde leptoderma, dentibus peristomii simplicis longis, angustissimis, operculo longitudine fere capsulae, obliquale apiculato.

Andere Arten desselben Genus sind: *F. trichomitria* Lindb., *F. ohioënsis* id.

Fontinalis fasciculata Lindb. Dioica, caule ramosissimo, ramulis fasciculatis, brevibus, acutissimis, tereti foliatis, foliis erectis, oblongis, canaliculatis. Algeria. (Durieu de Maisonneuve.)

F. dichelymoides id. Dioica, caule, distinete pinnato, valde remotifolio, ramulis apice acutis, leniter hamulosis, foliis trifariis, subsecundis, lanceolato-linearibus, profunde canaliculatis, superne vulgo convolutis et leniter tortis, integerrimis. Tavastia septentr. Fenniae, sociis *F. hypnoidi*, *antipyret.*, *Hypn. fluit.* (Brotherus.)

Phycotium articulatum Lindb. Dioecum, caule repente, ramis erectis, gracilibus fere semper simplicibus, innovatione repetita, sub inflorescentias egrediente, articulatis folio ventrali haud utriculari, sed profunde canaliculato, ad basin marginibus subrectangularibus duobus latissime inflexis et medio conniventibus, ibidemque extus, in latere ventrali convexo, cum margine ventrali folii dorsalis connato, apice acutiusculo et tridentato-ciliato, organo tubuloso, semper inani, spicas compositas subsecundas, apicales, et femineas et masculas terminante. Austral. or.-bor. trop., Queens-Land. (Dallachy.)

J. M.

Manipulus muscorum primus. S. O. Lindberg. (Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora fennica förhandlingar XI. 1870.)

1. *Bryum campestre* Lind. Dioecum, subgregarie crescens, humile, crassiusculum, julaceum, stramineum, nitidissimum, ramosum innovationibus sub perichaetio egredientibus, una-tribus, brevibus et leniter curvatis, densifolium, foliis paullo imbricato-appressis, ovato-ellipticis, obtusis, brevissime apiculatis, apiculo leniter recurvo, cymbiformi-concavis, margine superne minutissime et densissime serrulato, nervo longe infra apicem dissoluto, partem dimidiā superiorem constructis a cellulis subpleurenchymaticis, angustissimis, valde serpentinis et incrassatis, bracteis perichaetii distinctissimis, duplo longioribus quam foliis, erectis ovato-lanceolatis, acutiusculis, vix cucullatis, margine unius lateris medio recurvo, remote denticulatis, nervo in ultimo apice dissoluto, maximam partem constructis a cellulis serpentinis, seta gracili, superne cygneo-arcuata, capsula sat parva, horizontali, pallida, regulari, subclavato-oblonga, collo vix distincto, ore lato, leptodermi a cellulis sat minutis, irregulariter rhombeo quadratis, paullo incrassatis, dentibus peristomii parvi densissime trabeculatis, membrana basilari interioris pallido-aurantiaci rigida, altiore quam dimidium dentium, sporis sulphureo pallidis,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: [9_1870](#)

Autor(en)/Author(s): Milde Julius [Carl August]

Artikel/Article: [Oversigt of Finska Vet. - Societetens Förhandlingar. XII. 76-77](#)