

Kbr., *Arthonia dispersa* Lahm, *Pertusaria chiodectonoides* Bagl., *Verrucaria margacea applanata* Zw., *Amphoridium dolomiticum* Mass. forma: *obtectum*, *Microthelia analeptoides* Bagl., *Thelidium decipiens* var. *scrobiculare* Garov., *Polyblastia cupularis* Mass., *Polybl. succedens* Rehm in litt. Apoth. mollia, sporae incolores, gonidia hymenialia adsunt, *Polyblasta bacilligera* Arn. — Supplemente sind folgende zu frühern Nummern gehörig beigegeben: 4 b. *Callopisma citrinella* (Hepp.), 129c. *Lithoidea elaeomelaena* Mass. forma alpina Arn., 143 b. *Lecidea coerulea* Kremphbr., 215 c. *Siegertia calcarea* Kbr., 281 b. *Biatorina pyracea* var. *cumbata* Leight., 284 b. *Verrucaria disjuncta* Arn., 322 b. *Aspicilia flavida* var. *micrantha* Kbr., 341 b. *Aspicil. cinereo-rufescens* (Ach.), 358 b. *Lecidea petrosa* Arn., 360 b. *Lecidella immersa* (Web.), 392 c. *Polyblastia discrepans* Lahm. Die Exemplare sind vorzüglich. L. R.

Oversigt of Finska Vet. — Societetens Förhandlingar. XII. No. 2. 1869. Nya mossor. S. O. Lindberg.

1. *Mesochaete* n. gen. Lindb. *Perichaetium axillare*, bracteis accrescentibus. Capsula horizontalis, obliqua, pachydermis, jugata. Peristomium duplex, ciliis interni teneri maxime appendiculatis. Calyptra? *Androecium gemmiforme*, axillare. Dem *Rhizogonium* Brid. zunächststehend. Habitus fissidentoideus, folia quadrifaria, obliqua.

M. undulata Lindb. dioica, foliis undulatis. New-England, Nov. Holl. (herb. Melbourne).

2. *Leucodon immersus* n. sp. Lindb. dioicus; foliis secundis enervibus, bracteis perichaetii capsulam sessilem longe superantibus. Habitat ad pedem montis Ararat majoris Armeniae. (Cholzko.) Wie es scheint, identisch mit einem von Hausknecht in Kaukasien gesammelten.

3. *Forsströmia nitida* Lind. (*Leptodon nitidus* Lindb. *Neckera Macounii* Sull. *Canad. Natur.* II. Ser. II, pp. 79, 397 [1865].)

Belleville Canad. or. (Macoun.)

Autoica, ramis parce et irregulariter ramulosis, dense subtereti foliatis, foliis integerrimis, nervo bifurco, brevi, cellulis laevissimis, angularibus paucis, ceteris subrhombeis, capsula immersa, sessili, ovali, globosa, valde leptoderma, dentibus peristomii simplicis longis, angustissimis, operculo longitudine fere capsulae, obliquale apiculato.

Andere Arten desselben Genus sind: *F. trichomitria* Lindb., *F. ohioënsis* id.

Fontinalis fasciculata Lindb. Dioica, caule ramosissimo, ramulis fasciculatis, brevibus, acutissimis, tereti foliatis, foliis erectis, oblongis, canaliculatis. Algeria. (Durieu de Maisonneuve.)

F. dichelymoides id. Dioica, caule, distincte pinnato, valde remotifolio, ramulis apice acutis, leniter hamulosis, foliis trifariis, subsecundis, lanceolato-linearibus, profunde canaliculatis, superne vulgo convolutis et leniter tortis, integerrimis. Tavastia septentr. Fenniae, sociis *F. hypnoidi*, antipyret., Hypn. fluit. (Brotherus.)

Physcotium articulatum Lindb. Dioecum, caule repente, ramis erectis, gracilibus fere semper simplicibus, innovatione repetita, sub inflorescentias egrediente, articulatis folio ventrali haud utriculari, sed profunde canaliculato, ad basin marginibus subrectangularibus duobus latissime inflexis et medio conniventibus, ibidemque extus, in latere ventrali convexo, cum margine ventrali folii dorsalis connato, apice acutiusculo et tridentato-ciliato, organo tubuloso, semper inani, spicas compositas subsecundas, apicales, et femineas et masculas terminante. Austral. or.-bor. trop., Queens-Land. (Dallachy.) J. M.

Manipulus muscorum primus. S. O. Lindberg. (Notiser ur Sällskapetets pro Fauna et Flora fennica förhandlingar XI. 1870.)

1. *Bryum campestre* Lind. Dioecum, subgregarie crescens, humile, crassiusculum, julaceum, stramineum, nitidissimum, ramosum innovationibus sub perichaetio egredientibus, una-tribus, brevibus et leniter curvatis, densifolium, foliis paullo imbricato-appressis, ovato-ellipticis, obtusis, brevissime apiculatis, apiculo leniter recurvo, cymbiformi-concavis, margine superne minutissime et densissime serrulato, nervo longe infra apicem dissoluto, partem dimidiam superiorem constructis a cellulis subpleurenchymaticis, angustissimis, valde serpentinis et incrassatis, bracteis perichaetii distinctissimis, duplo longioribus quam foliis, erectis ovato-lanceolatis, acutiusculis, vix cucullatis, margine unius lateris medio recurvo, remote denticulatis, nervo in ultimo apice dissoluto, maximam partem constructis a cellulis serpentinis, seta gracili, superne cygneo-arcuata, capsula sat parva, horizontali, pallida, regulari, subclavato-oblonga, collo vix distincto, ore lato, leptodermi a cellulis sat minutis, irregulariter rhombeo quadratis, paullo incrassatis, dentibus peristomii parvi densissime trabeculatis, membrana basilari interioris pallido-aurantiaci rigida, altiore quam dimidium dentium, sporis sulphureo pallidis,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: [9_1870](#)

Autor(en)/Author(s): Milde Julius [Carl August]

Artikel/Article: [Oversigt of Finska Vet. - Societetens Förhandlingar. XII. 76-77](#)