

Nils Gerh. Wilh. Lagerstedt, om Alyslägtet Pra-siola. Försök till en monographi. (Akademische Abhandlung.) Upsala, 1869.

Durchweg in schwedischer Sprache geschrieben. Verf. hält nur *P. crispa* Menegh., *mexicana* J. Ag., *fluviatilis* Aresch., *furfuracea* Menegh., *leprosa* K., *stipitata* v. Suhr und *calophylla* Menegh. für in der Natur begründete Arten.

*P. crispa*, *mexicana*, *furfuracea* und *stipitata* sind  $\frac{220}{1}$  und  $\frac{300}{1}$  vergrößert abgebildet. L. R.

S. O. Lindberg, Utredning af Skandinaviens Porella-Former. Acta Soc. Scient. Fennic. Tom XI. 1869 pag. 329—345 in Quart.

Enthält eine sehr ausführliche, gründliche Arbeit über das Genus *Madotheca*, welches Verf. nach den Regeln der Priorität in *Porella* Dill. L. emend. umtaufen zu müssen glaubt. Es werden 6 Arten beschrieben, darunter eine neue.

Recherches Bryologiques. Extrait du Bullet. de la Soc. royale de Botanique de Belgique, tome VII. N. 1. 2. VIII. p. 109—135. 1868. 1879.

Ueber das Unternehmen des Herrn Professor L. Piré ist bereits in *Hedwigia* 1868 N. 7 p. 104 berichtet worden. In den vorliegenden drei Arbeiten giebt derselbe eine Uebersicht über die belgischen acrocarpischen und pleurocarpischen Moose. Herr Dr. Jäger in Freiburg i. Br., welcher eine Anzahl seltner Arten in Belgien gesammelt hat, würde gewiss gern dieses verdienstliche Unternehmen unterstützen. Ich erwähne nur beispielsweise *Rhynchostegium demissum*, *Lescurea striata*, *Pseudoleskea atrovirens*, von Jäger gesammelt, von Herrn Piré aber nicht aufgeführt. Auffallend ist das Fehlen vieler verbreiteter Arten, die gewiss aber noch entdeckt werden; von seltneren bemerkten wir *Leptodon Smithii* (Laroche bei Luxemburg), *Cryphaea*, *Anacamptodon*, *Hylocomium Oakesii*. *Hypnum fluitans*  $\delta$ . *purpurascens* dürfte höchst wahrscheinlich identisch mit *H. exannulatum* sein. Unter den acrocarpischen Moosen heben wir hervor: *Ephemerum stenophyllum*, *Gymnostomum tenue*, *Weisia denticulata*, *Cynodontium Bruntoni*, *Dicranella Grevillei*, *D. squarrosa*, *Didymodon cylindricus*, *Trichostomum convolutum*. Den Species und genera gehen analytische Uebersichten voran, zu den einzelnen Arten werden häufig Bemerkungen gemacht. Dem Ganzen wird Schimpers *Bryol. Europ.* zu Grunde gelegt. J. M.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: [9\\_1870](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Nils Gerh. Willi. Lagerstedt, om Aylslägtet Prasiola. Försök till en monographi. \(Akademische Abhandlung.\) Upsala, 1869. 96](#)