

Nº 7.

# HEDWIGIA.

1870.

## Notizblatt für kryptogamische Studien, nebst Repertorium für kryptog. Literatur.

**Inhalt:** Repertorium: P. A. Karsten, Monographia Pezizarum fennicarum. (Forts.) — Veit Brech. Wittrock, Anteckningar om Skandinaviens Desmidiacée. — Linnaea. Band 36. Heft 1. Reliquiae Mettenianaæ auctore M. Kuhn.

### Repertorium.

P. A. Karsten, Monographia Pezizarum fennicarum.  
Helsingfors, 1869.


(Fortsetzung.)

#### Sect. VIII. Mollisia.

(109.) *Peziza conformata* Karst. Apothecia sparsa, stipitata, cupula concaviuscula, pallida, latit. circiter 1 mm., stipite solido, flexuoso, concolore, deorsum fuscescente, altit. circiter 3 mm.; sporae monostichae, ellipsoideae vel oblongato-ellipsoideae, simplices, longit. 6—10 mmm., crassit. 4—5,5 mmm.; thecae numerosae, longit. circiter 80 mmm., crassit. 5—6 mmm., obturaculo iodo obsolete coerulescente; paraphyses filiformes, apicem versus leniter incrassatulae. Ad nervos foliorum Alni putridorum.

(110.) *Peziza pileata* Karst. Apothecia solitaria vel sparsa, stipitata, livido-pallentia. cupula convexa, margine deflexo et saepe repando-lobato, latit. circiter 2 mm., stipite sursum incrassatulo, altit. circiter 2 mm.; sporae fusoideo-elongatae, rectae vel curvulae. longit. 16—32 mmm., crassit. 2,5—4 mmm., guttulis 2- pluribus sparsis praeditae; thecae arcte confertae, longit. circiter 90 mmm.. crassit. 7—8 mmm., obturaculo iodo intense coerulescente; paraphyses gracilescentes, parcae. Ad culmos putridos et supra terram locis uliginosis.

(112.) *Peziza vasaënsis* Karst. Apothecia sparsa, breviter stipitata, cupula planiuscula brunneo-atra (saltem in statu sicco), latit. circiter 2 mm.; sporae fusoideo-oblongatae, utroqve apice acuminatae, simplices vel guttulis plerumqve 2 apicalibus praeditae. longit. 10—14 mmm., crassit. 3 mmm.; thecae cylindraceo-clavatae, crassit. circiter 8 mmm.; paraphyses filiformes, fulvo-granulosae. Supra Sphagna emortua. Thecae et paraphyses arcte confertae. Forsan melius ad Phialeam referenda.



(113.) *Peziza petasata* Karst. Apothecia sparsa, stipitata, dilute albida vel pallida convexa sublus concava, latit. 0,7—0,8 mm., stipite altit. circiter 0,7 mm.; sporae fusoideo-elongatae, rectiusculae simplices, longit. 10—15 mmm., crassit. 2—2,5 mmm. thecae subclavato-cylindraceae, apice attenuatae, longit. circiter 48—50 mmm., crassit. 4—5 mmm., obturaculo iodo vix vel obsoletissime coerulescente; paraphyses parcae, filiformes, apicem versus incrassatae. Ad culmos Phragmitis communis vetustos. Externa facie Pezizae culmigenae haud dissimilis.

(115.) *Peziza obstricta* Karst. Apothecia sparsa, sessilia vel substipitata, fuscescens-pallida, cupula planiuscula, repanda, epithecio pallido latit. circiter 4 mm.; sporae fusoideo-oblongatae, longit. 12—23 mmm., crassit. circiter 4—6 mmm., guttulis plerumque 2 apicalibus praeditae; thecae copiosae, longit. circiter 110 mmm., crassit. 8—11 mm., apice iodo non tinctae; paraphyses gracilescentes, crassit. circiter 2 mmm. Supra folia Populi tremulae putrescentia locis uidis. Priori, quacum quoque mixtim crescit, sat similis, sed partibus internis recedens.

(116.) *Peziza limosella* Karst. F. F. exs. 538. Apothecia sparsa, subsessilia pallide violacea vel pallide vinosa, demum fuligineo-vinosa vel rufescens cupula planiuscula, excipulo intus rufo-maculato, latit. circiter 1,5 mm., stipite brevissimo, crasso; sporae oblongatae vel fusoideo oblongatae, interdum subovoideae, oblique monostichae vel distichae, longit. 9—12 mmm., crassit. 3,5—4 mmm. plerumque guttulis 2 praeditae; thecae crassit. circiter 8 mmm., apice summo haud vel obsoletissime coerulescente; paraphyses graciles. Locis uidis umbrosis supra terram.

(117.) *Peziza lutiseda* Karst. F. F. exs. 539. Apothecia sparsa, sessilia, convexa, testacea vel subflava, demum obscuriora fulvo-fusca latit. circiter 1 mm.; sporae fusoideo-oblongatae, plerumque inaequilaterales longit. 13—21 mmm., crassit. 3,5—4 mmm., guttulis 2-pluribus praeditae; thecae longit. circiter 100 mmm., crassit. circiter 9—10 mmm., apice summo haud leviter coerulescentes; paraphyses graciles. Supra terram locis uliginosis. Praecedenti proxima, sed notis allatis mox dignota. Excipulum ceraceo-molle; paraphyses in statu vegeto intus fulvo-granulosae.

(119.) *Peziza merimaskuënsis* Karst. Apothecia sparsa, planiuscula, albida vel pallida, latit. circiter 2 mm., margine dentibus setaceis coronata; sporae ellipsoideo- vel ovoideo-oblongatae, rectae, distichae, longit. 8—10 mmm., crassit. 3—4 mmm., guttulis 2-pluribus praeditae; thecae longit.

circiter 95—100 mmm., crassit. 8—9 mmm. Ad folia Pini sylvestris putrida locis udis.

(120.) *Peziza ciliifera* Karst. F. F. exs. 546. Apothecia subgregaria, sessilia, albida vel pallida, margine pilis brevibus pallidis patentibus rariusculis obsessa, latit. 0.8—1,5 mm.; sporae fusoideo- vel ellipsoideo-oblongatae aut subellipsoideae, inaequilaterales vel curvulae, subinde rectiusculae, longit. 10—20 mmm., crassit. 4—6,5 mmm., guttulis plerumque pluribus minutis praeditae; thecae crassit. 8—10 mmm., apice iodo non tinctae; paraphyses sat numerosae, filiformes. graciles. Supra terram in uliginosis udis sat rara. Pili vel setae cupulae basi incrassati, fibrosi, absqve ullis articulis, longit. 0,2—0,4 mm.

(121.) *Peziza quisquiliaris* Karst. Apothecia gregaria vel conferta, sessilia, concaviuscula, albida, latit. circiter 2 mm.; sporae oblongatae vel oblongato-ellipsoideae, longit. 7—10 mmm., crassit. 3—4 mmm., guttulis plerumque 2 praeditae; thecae confertae, crassit. 7—8 mmm., obturaculo iodo haud tinctae; paraphyses parum notabiles. Supra folia, virgulta corporaque varia putrida.

(122.) *Peziza fennica* Karst. Apothecia sessilia, planiuscula, flavo-virescentia, subtus basin versus fuscescentia, latit. circiter 1 mm.; sporae cylindraceae vel cylindraceo-fusoideae, longit 7—12 mmm.. crassit. 1—2 mmm., hyalino-chlorinae; thecae cylindraceo-clavatae, longit. 50—80 mmm., crassit. 4—4,5 mmm., obturaculo minutissimo iodo leviter coerulescente; paraphyses graciles. Supra acus Pini sylvestris putrescentes.

(123.) *Peziza stellmata* Karst. F. F. exs. 548. Apothecia sessilia, planiuscula, subsulfurea, epithecio olivascente, latit. 0,3—0,4 mm.; sporae oblongatae, longit. 4—8 mmm., crassit. 1,5—2 mmm., guttulis praeditae; thecae cylindraceo-clavatae, longit. circiter 50 mmm., crassit. circiter 5 mmm., apice iodo non tinctae. Ad lignum betulinum. Externa facie Riederam Fr. S. V. Sc. p. 358 simulat, sed thecas prosilientes nondum vidi, qvare de loco vero incertus sum.

#### Sect. IX. Aleuriella.

(124.) *Peziza personata* Karst. Apothecia sparsa, livida, latit. 1—1,8 mm., stipite breviusculo, altit. circiter 0,5 mm.; sporae ellipsoideae vel oblongatae, longit. 110—120 mmm., crassit. 7—8 mmm., obturaculo iodo coerulescente; paraphyses crassit. 1,5—2 mmm. Supra corticem Betulae interiorem.

#### Sect. X. Apostemium.

(125.) *Peziza fiscella* Karst. Apothecia subgregaria, livido-pallida, granulis seriatis exiguis adnatis obsessa, epi-

thecio planiusculo pallescenti-livido, latit. 0,5—1 mm., altit. 0,3—0,5 mm.; thecae longit. circiter 200 mmm., crassit. 4—6 mmm., apice iodo non tinctae; paraphyses crassit. 1 mmm. Ad ramulos Alni incanae locis humidis dejectos.

Sect. XI. Nodularia.

(126.) *Peziza ramealis* Karst. Apothecia gregaria, subirregularia fusca vel rufofusca, epithecio planiusculo, livido-pallido, sicco ochraceo-pallente, latit. circiter 1 mm.; sporae fusoideo-cylindraceae, longit. 14—18 mmm., crassit. circiter 2 mmm; thecae longit. 75—90 mmm., crassit. 7—8 mmm., obturaculo iodo coerulescente. Ad ramulorum Betulae corticem.

Sect. XII. Clibanites.

(127.) *Peziza paradoxa* Karst. Apothecia gregaria, vulgo confluentia, tuberculosa, fulvo-testacea, sicca subtestacea, latit. 0,2—0,6 mm.; sporae longit. 6—10 mmm., crassit. 1—1,5 mmm.; thecae longit. 30—36 mmm., crassit. circiter 4 mmm. Supra lignum vetustum Quercus. Species admodum memorabilis, obiter visa formis quibusdam Myxosporii vel Myxonematis haud dissimilis.

Sect. XIII. Agyriopsis.

(128.) *Peziza prasinula* Karst. Apothecia sparsa, convexa, sicca planiuscula. viridia, sicca obscurata aut viridatra, epithecio ruguloso, latit. 0,2—0,4 mm.; sporae elongatae vel fusoideo-elongatae, di- vel tristichae, rectae, 3-septatae, longit. 8—12, plerumque 9—10 mmm., crassit. 3—4 mmm.; thecae length. 60—80 mmm., crassit. 8—10 mmm., apice iodo non tinctae; paraphyses flexuosae. Ad lignum putridum.

(Fortsetzung folgt.)

---

Veit Brech. Wittrock, Anteckningar om Skandinaviens Desmidiaceer. Med en Tafla. Upsala, 1869.

Geschrieben in schwedischer Sprache, doch sind die Diagnosen der beobachteten neuen Formen in lateinischer und auf der beigegebenen Tafel abgebildet.

In Summa giebt der Verfasser 94 Species an, nämlich:

1) Euastrum mit 10, darunter eine neue Var.

*E. venustum* Bréb.  $\beta$  *majus*, duplo fere majus quam forma  $\alpha$ ; longitudine cellulae tertia circa parte majore quam latitudo; semicellulis sinibus subrectangulis distincte trilobatis, lobis emarginatis, emarginaturis conformibus. Long. cell. 0,065 mm., lat. 0,046 mm., lat. isthmi 0,009 mm. — Fig 1.

2) Micrasterias Ag. mit 7 Arten.

*M. truncata* Bréb.  $\beta$  *Bahusiensis* nov. var. sinu semi-cellularum latiori; semicellulis semicircularibus, trilobatis, lobis sinu lato, obtusangulo inter se discretis, lobis polaribus

convexis, apice emarginatis, angulis uni- (raro bi-) dentatis; lobis lateralibus incisura obtusangula bilobulatis, lobulis quadridentatis; cytioidermate subtiliter punctato. Long. cell. 0,023—0,024 mm., lat. 0,020—0,021 mm. — fig. 2.

3) *Cosmarium* Corda mit 21 Arten.

*C. undulatum* Corda γ *minutum* nov. var. *C. parvum*, sexta parte longius quam latum, sinu linearis profunde constrictum, semicellulis ovali semicircularibus, et dorso et lateribus late rotundatis, margine undulato-crenatis, crenis 12—13; cytioidermate laevi. Long. cell. 0,005 mm. lat. 0,004—0,0045 mm.

*C. conspersum* Ralfs β *rotundatum* nov. var. *C. magnum*, quarta parte longius quam latum, sinu sublineari profunde constrictum; semicellulis rectangulari-reniformibus, dorso late rotundato, lateribus subrectis, margine crenato-verrucoso, cytioidermate dense verrucoso, verrucis truncatis, in series regulares decussatas dispositis. Long. cell. 0,104—0,098 mm., lat. 0,076—0,078; lat. isthmi 0,025 mm. — fig. 4.

4) *Arthrodesmus* Ehrb. mit 2 Arten.

*A. Incus*. Hass. β *intermedius* nov. var. fig. 6. *A. parvus*, tam longus quam latus vel paullulum longior; incisura in media cellula parva, obtusangula: semicellulis breviter cuneatis, angulis aculeatis, aculeis longis singulis divergentibus. Long. cell. (sine aculeis) 0,012—0,015 mm., lat. 0,011—0,013; acul. long. 0,007—0,008; lat. isthmi 0,008—0,009 mm.; crass. cell. 0,007—0,008.

5) *Staurastrum* Meyen mit 14 Arten. Neu:

*St. bidentatum* nov. sp. fig. 7. St. magnum, laeve, tam longum quam latum; sinu profundo, subrectangulari; semicellulis ellipticis dorso paullulum retuso utroque fine dentibus binis ornatis, a vertice triangularibus, lateribus leviter retusis, angulis dentibus singulis armatis; cytioidermate subtiliter punctato. Long. cell. 0,080—0,090 mm.. lat. (sine dentibus) 0,075—0,085 mm.; long. dent. 0,007—0,010; lat. isthmi 0,030.

*St. laeve* Ralfs β *Clevei* nov. var. fig. 9. St. laeve, tam longum quam latum, semicellulis sexradiatis, radiis longis divaricatis bifurcatis. Long. cell. (c. radiis) 0,053, lat. 0,050; long. radiorum 0,016; lat. isthmi 0,017 mm.

6) *Xanthidium* Ehrb. mit 4 Arten.

7) *Tetnemorus* Ralfs mit 2 Arten.

8) *Spirotaenia* Bréb mit einer Art.

9) *Penium* Bréb. mit 2 Arten.

10) *Docidium* Bréb. mit 5 Arten.

11) *Closterium* Nitzsch mit 14, darunter neu:

*C. calosporum* nov. sp. fig. 11. *C. parvum*, semilunare, medio non tumidum, gracile, 6—9 partibus longius quam latum, apicibus acuminatis, cytioidermate primum achroo lae-

vique, denique luteolo et longitudinaliter subtilissime striato, vesiculis chlorophyllaceis uniseriatis, 4—5 in quaque semi-cellula, laminis chlorophyllaceis 4—5; zygosporis luteo-fuseis, globosis, processibus conicis, apice rotundatis ornatis, in canali cupulationis mox evanescenti formatis. Long. cell. 0,070—0,095 mm., lat. 0,010—0,012; diam. zygosp. sine process. 0,020, c. prov. 0,030 mm.

*Asteroselene* nov. subgen. Closterii. Zygosporae globosae, processibus conisis, radiatim dispositis, ornatae.

C. acutum Bréb. und C. sataceum Ehrb.

12) Gonatozygon de By. mit einer Art.

13) Bambusina K. mit einer Art.

14) Desmidium Ag. mit 3 Arten.

15) Sphaerozozma Corda mit 4 Arten, darunter:

*Sph. Bambusinoides* nov. sp. fig. 12. S. minimum, seriebus cellularum fragilibus, tubo et isthmis destitutis, cellulis a fronte suborculaformibus, quarta parte longioribus quam latis, incisura mediana linearis, extrorsum paullum ampliata, a latere oblongo-ellipticis, utroque fine truncatis, medio leviter constrictis, a vertice ellipticis. Long. cell. 0,010—0,012 mm., lat. max. cell. 0,007—0,009, crassit. cell. 0,004—0,005 mm.

16) Hyalotheca Ehrb. mit 3 Arten.

*H. dubia* K.  $\beta$  *laevis* nov. var. fig. 13. H. major, seriebus cellularum firmis, vagina mucosa non circumdatis; cellulis rotundato-quadratis, arctissime conjunctis, vesiculis chlorophyllaceis binis magnis, cytiodermate laevi. Long. cell. 0,028—0,035 mm., lat. 0,035, diam. vesic. chloropl. 0,010 mm.

L. R.

---

Linnaea. Band 36. Heft I. Reliquiae Mettenianae  
auctore M. Kuhn.

*Acrostichum amygdalifolium* Mett. Rhizoma repens, elongatum, radicibus distichis, distantibus abbreviatis affixum, viride, paleis adpressis, membranaceis, rufescens, ovatis, obtusis s. acutis, irregulariter dentatis sparse obsitum; folia membranacea, disticha, 1" et ultra distantia, pellucida, pallide viridia, supra paleaceo-punctata, sessilia, phyllopedio 1'" longo paleaceo fulta, sterilia  $2\frac{1}{2}$ —5" longa, 6—10" lata, lanceolata, acuminata, basi subabruptim attenuata, integerima; nervi manifesti, furcati, subangulo 75° decurrentes, rami circiter  $1\frac{1}{2}$ " distantes, apice incrassato supra sub foveola manifeste intramarginali desinentes; fertilia  $3\frac{1}{2}$ " longa, 3" lata, linearia, basi longe, ac sensim attenuata brevius acuminata, infra sporangiis onusta. Costa Rica. (C. Hoffmann.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: [9\\_1870](#)

Autor(en)/Author(s): Rabenhorst Gottlob Ludwig

Artikel/Article: [Repertorium P. A. Karsten, Monographia Pezizarum fennicarum Helsingfors, 1869. 97-102](#)