

ovata vel oblonga, laciñiata, laciñiae subflabellatae, abbreviatæ, apice soriferae. Bolivia. (d'Orbigny 388.)

Ch. Thwaitesii Mett. Rhizoma ascendens abbreviatum cum basi petiolorum, paleis fuscis nitidis ovato-lanceolatis, acuminatis, dense squamosum, folia densa stricta, opaco-viridia, infra laxissime pulvere ceraceo pallido adspersa; petiolus 1" longus cum rachi rufescenti fuscus, validus, teres; rachis supra leviter sulcata; lamina 1' longa, linearis, utrinque attenuata, bipinnatisecta, segmenta primaria numerosa, subopposita, distantia ascendentia rachi subadpressa, media maxima $1\frac{1}{4}$ ' longa utrinque decrescentia infima vix $\frac{1}{3}$ " longa; secundaria 4—5 pleraque decurrenti-adnata, oblonga, obtusa, inferiora sessilia pinnatifida, sterilia minute sed argute dentata; nervi furcati, dorsum dentium adeuntes, sori angusti minimi, hinc inde confluentes; margine revoluto breviter attenuato angustissimo continuo vel interrupto vix velati. Cheil. varians Thwait. 387. Ch. laxa Moore. Ceylania. (Thwaites 1321.)

(Continuabitur.)

Kleinere Mittheilungen.

Von J. Milde.

1. *Bryum cyclophyllum* B. S. fand Geheeß fructificirend in der Rhön im Rothen Moore mit *B. uliginosum* B. S.; steril in unendlicher Menge mit *B. Klinggraeffii* Schimp. an einem See um Herischdorf bei Warmbrunn in Schlesien. (Milde.)

2. *Bryum Muehlenbeckii* B. S. Ist characteristisch für den Süd-Abhang des Westendes des Riesengebirges, so im Weisswasser und in der Elbe bei und oberhalb St. Peter. (Milde.) Im Kessel des Gesenkes vielfach gesammelt von Limpricht.

3. *Orthotrichum Shawii* Wils. entdeckte Ruthe sehr sparsam auf *Populus italicica* um Bärwalde in der Neumark.

4. *Grimmia sulcata* B. S. c. fr. sammelte Limpricht im Kessel des Gesenkes mit entschiedenen Uebergängen zu *G. alpestris* Schleich.

5. *Leptotrichum zonatum* Lorentz. (*Weisia*) erhielt ich von Herrn Fergusson aus Schottland (Clova Mountains).

6. *Plagiothecium latebricola* B. S. wurde neuerdings von Herrn Everken bei Grünberg entdeckt, *Dicranum viride* und *Zygodon viridissimus* von Fritze bei Rybnik.

7. *Sphagnum Lindbergii* Schpr. fand ich vor Kurzem in 2 kleinen Kolonieen um Nimkau bei Breslau, in der tiefsten Ebene.

J. Milde.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1870

Band/Volume: [9_1870](#)

Autor(en)/Author(s): Milde Julius [Carl August]

Artikel/Article: [Kleinere Mittheilungen, 144](#)