

- Trotter, A.** Prima comunicazione intorno alle galle (zoocecidi) del Portogallo. (Boletim da sociedade broteriana. XVI. 1899. Coimbra. p. 196—202.)
- Tubeuf, v.** Die Graphiola-Krankheit der Palmnblätter. (Gartenflora. 49. Jahrg. Heft 6. p. 148—150. 1 Textfig.)
- Utra, G. d'.** Monographia do arroz. (Boletim do Instituto agronomico do Estado de São Paulo em Campinas. Vol. X. [1899.] p. 612—625.)
- Wehmer, C.** Ueber Färbungen und Flecke der Rosenblätter. (Gartenflora. 49. Jahrg. 9. Heft. p. 225—229. 2 Taf.)
- Weiss.** Die Schwarzfleckigkeit der Roscn (Actinonema Rosac.) (Praktische Blätter für Pflanzenschutz. 1900. I. p. 3—4.)
- Wilfarth, H. und Wimmer, G.** Die Bekämpfung des Wurzelbrandes der Rüben durch Samenbeizung. (Zeitsch. Vercin d. deutsch. Zucker-Industr. 1900. Febr. p. 159—173.)
- Wortmann, J.** Zur Bekämpfung des Oidium Tuckeri. (Mittheilungen über Weinbau u. Kellcrwirthschaft. 1900. No. 1. p. 1—6.)

D. Sammlungen.

- Tilden, Jos. E.** American Algae. Centur. IV. Nr. 301—400. (1900.)
- Raciborski, M.** Cryptogamae parasiticae in insula Java lectae exsiccatae. Fasc. II. n. 51—100. Buitenzorg 1899 (G. Kolff & Co. Batavia). Vorliegender Fascikel enthält ausser anderen zahlreiche neue Arten und mehrere neue Gattungen des Herausgebers, von denen wir hier die interessanteren namhaft machen wollen. Siphoneae: Phyllosiphon Arisari Kühn, Phytophysa Treubii Weber v. Bosse. — Chroolepidae: Cephaleuros parasiticus et minimus Karst. — Ustilagineae: Ustilago Treubii Solms, Graphiola Arengae Rac. — Uredineae: Endophyllum Griffitsiae (P. Henn. sub Aecidio) Rac., Skierka Canarii Rac. n. g., Schroeteriaster Elettariae Rac., Puccinia Solmsii P. Henn., P. periodica Rac., P. Mapaniae Rac., P. Geophilae (P. Henn. sub uredine) Rac., Triphragmium pulchrum Rac., T. Thwaetusii B. et Br.; Caeoma Arundinae Rac., Uredo (Hemileia) Phaji Rac, U. (H.) Antidcsmae Rac., U. Vitis Thüm. (zu Phakopsora Vitis Syd. gehörig), U. Chonemorphae Rac., U. Cedrlae Rac. — Autobasidiomycetes: Exobasidium Symploci Rac.; Kordiana Tradescandiae (Pat.) Rac. n. g. — Protodiscineae: Elsinoë viticola ct E. Menispermarum Rac. n. g.; Phymatosphaeria Calami Rac. ist als Myriangium Calami (Rac.) zu bezeichnen. — Pilctascineae: Penicillopsis clavariiformis Solms, Aspergillus Penicillopsis (P. Henn.) Rac., Balladyna Gardniæ Rac. n. g. — Phaciidae: Halbania Cyathearum Rac. n. g., Cryptomyces Pongamiae B. et Br. — Hysteraceae: Schizophyrium Aceris (P. Henn. et Lind.) Rac., Lembosia javanica (Pat.) Rac. vielleicht besser n. gen.? Morenoella Nephrodii et M. Marattiae Rac. n. g., Parmularia discoidea Rac., Hysterostomella Alsophilac Rac., Nymanomyces Aceris laurini P. Henn. als Rhytisma (Criella) A. l. (Pat.) P. Henn. zu bezeichnen. — Anhella tristis Rac. n. g. von Myriangium wohl kaum verschieden. (P. H.)
- Vestergren, T.** Micromycetes rariores selecti. Fasc. XI, XII. Upsala 1900.
- Bauer, E.** Bryotheca Bohemica. II. Ccnt. 1890.
- Flora exsiccata Bavarica.** Fasc. III.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [Beiblatt 39 1900](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [D. Sammlungen. 111](#)