

- Trotter, A.** Prima comunicazione intorno alle galle (zoocecidii) del Portogallo. (Boletim da sociedade broteriana. XVI. 1899. Coimbra. p. 196—202.)
- Tubeuf, v.** Die Graphiola-Krankheit der Palmblätter. (Gartenflora. 49. Jahrg. Heft 6. p. 148—150. 1 Textfig.)
- Utra, G. d'.** Monographia do arroz. (Boletim do Instituto agronomico do Estado de São Paulo em Campinas. Vol. X. [1899.] p. 612—625.)
- Wehmer, C.** Ueber Färbungen und Flecke der Rosenblätter. (Gartenflora. 49. Jahrg. 9. Heft. p. 225—229. 2 Taf.)
- Weiss.** Die Schwarzfleckigkeit der Rosen (Actinonema Rosae.) (Praktische Blätter für Pflanzenschutz. 1900. I. p. 3—4.)
- Wilfarth, H. und Wimmer, G.** Die Bekämpfung des Wurzelbrandes der Rüben durch Samenbeizung. (Zeitsch. Verein d. deutsch. Zucker-Industr. 1900. Febr. p. 159—173.)
- Wortmann, J.** Zur Bekämpfung des Oidium Tuckeri. (Mittheilungen über Weinbau u. Kellerwirthschaft. 1900. No. 1. p. 1—6.)

D. Sammlungen.

- Tilden, Jos. E.** American Algae. Centur. IV. Nr. 301—400. (1900.)
- Raciborski, M.** Cryptogamae parasiticae in insula Java lectae exsiccatae. Fasc. II. n. 51—100. Buitenzorg 1899 (G. Kolff & Co. Batavia).
- Vorliegender Fascikel enthält ausser anderen zahlreiche neue Arten und mehrere neue Gattungen des Herausgebers, von denen wir hier die interessanteren namhaft machen wollen. Siphoneae: Phyllosiphon Arisari Kühn, Phytophysa Treubii Weber v. Bosse. — Chroolepideae: Cephaleuros parasiticus et minimus Karst. — Ustilagineae: Ustilago Treubii Solms, Graphiola Arengae Rac. — Uredineae: Endophyllum Griffithsiae (P. Henn. sub Aecidio) Rac., Skierka Canarii Rac. n. g., Schroeteriae Eleteria Rac., Puccinia Solmsii P. Henn., P. periodica Rac., P. Mapaniae Rac., P. Geophilae (P. Henn. sub uredine) Rac., Triphragmium pulchrum Rac., T. Thwaetsii B. et Br.; Caecoma Arundinae Rac., Uredo (Hemileia) Phaji Rac, U. (H.) Antidesmae Rac., U. Vitis Thüm. (zu Phakopsora Vitis Syd. gehörig), U. Chonemorphae Rac., U. Cedrae Rac. — Autobasidiomycetes: Exobasidium Symploci Rac.; Kordiana Tradescantiae (Pat.) Rac. n. g. — Protodiscineae: Elsinoë viticicola et E. Menispermorum Rac. n. g.; Phymatosphaeria Calami Rac. ist als Myriangium Calami (Rac.) zu bezeichnen. — Plectascineae: Penicillopsis clavariiformis Solms, Aspergillus Penicillopsis (P. Henn.) Rac., Balladyna Gardniae Rac. n. g. — Phacidiaecae: Halbania Cyathearum Rac. n. g., Cryptomyces Pongamiae B. et Br. — Hysteriaceae: Schizothyrium Aceris (P. Henn. et Lind.) Rac., Lembosia javanica (Pat.) Rac. vielleicht besser n. gen., Morenoella Nephrodii et M. Marattiae Rac. n. g., Parmularia discoidea Rac., Hysterostomella Alsophilae Rac., Nymanomyces Aceris laurini P. Henn. als Rhytisma (Criella) A. l. (Pat.) P. Henn. zu bezeichnen. — Anheila tristis Rac. n. g. von Myriangium wohl kaum verschieden. (P. H.)
- Vestergren, T.** Micromycetes rariores selecti. Fasc. XI, XII. Upsala 1900.
- Bauer, E.** Bryotheca Bohemica. II. Cent. 1890.
- Flora exsiccata Bavarica.** Fasc. III.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [Beiblatt 39 1900](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [D. Sammlungen. 111](#)