

A. Lophanthi P. Henn. n. sp.

Maculis fuscidulis; aecidiis hypophyllis, pseudoperidiis sparsis vel aggregatis, cupulatis, margine fimbriatis, flavidis vel pallidis, contextu cellulis polyedricis; aecidiosporis subglobosis, ellipsoideis polyedricis, flavidis $18-24 \times 17-23 \mu$.

Japan, Prov. Tosa pr. Sakawa, auf lebenden Blättern von *Lophanthus* spec. Juni 1900. T. Inouye.

Fleischige Pilze aus Japan.

Von P. Hennings.

Nachstehend verzeichnete Pilze wurden nach colorirten Abbildungen, die Herr Dr. Shirai nach lebenden Exemplaren an Ort und Stelle angefertigt hat, von mir bestimmt. Herr Dr. Shirai hatte die Freundlichkeit, die japanischen Namen diesem Verzeichniss beizufügen. Dasselbe dürfte ein nicht unwesentlicher Beitrag der im Gebiete vorkommenden, meist mit europäischen Arten völlig übereinstimmenden Pilze sein.

Thelephoraceae.

Craterellus cornucopioides Pers. Myc. Eur. 2. p. 5.

Nom. Jap. Usutake. Tokio.

Clavariaceae.

Clavaria rosea Fr. Syst. Myc. I. p. 482.

Nom. Jap. Senkōtake. Tokio.

Cl. Botrytis Pers. Syn. p. 587.

Nom. Jap. Murasakihōkitake.

Sparassis ramosa (Schaeff.) Schröt. Pilze Schles I. p. 449.

Nom. Jap. Maitake. Nord-Japan.

Polyporaceae.

Fomes amboinensis (Lam.) Fries Epicr. p. 442.

Nom. Jap. Saiwaitake. Tokio.

Polyporus caudicinus Schaeff. = *P. sulphureus* Fr.

Nom. Jap. Hokuchitake. Prov. Shinano.

P. frondosus (Fl. Dan.) Fries Syst. Myc. I. p. 355.

Nom. Jap. Hanabiratake. Nikko.

P. arcularius (Batsch.) Fries Syst. Myc. I. p. 342.

Nom. Jap. Amisugitake. Tokio.

Boletus scaber (Bull.) Fr. Syst. Myc. I. p. 293.

Nom. Jap. Motobutoiguchi. Nikko.

B. subtomentosus Linn. Swec. No. 1251.

Nom. Jap. Shibatake. Tokio.

B. sanguineus With. Arr. 4. p. 419.

Nom. Jap. Kōjitake. Nikko.

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. Outl. p. 236.

Nom. Jap. Oniiguchi. Tokio.

Agaricaceae.

Cantharellus cibarius Fries Syst. Myc. I. p. 318.

Nom. Jap. Komotake. Tokio.

- Paxillus atrotomentosus* (Batsch.) Fries Epicr. p. 317.
 Nom. Jap. Niwatake. Tokio.
- Lactaria piperata* (Scop.) Fries Epicr. p. 340.
 Nom. Jap. Tsuchikaburi. Tokio.
- Russula emetica* (Schaeff.) Fries Epicr. p. 357.
 Nom. Jap. Dokubenitake. Nikko.
- R. fragilis* (Pers.) Fries Epicr. p. 359.
 Nom. Jap. Uguisutake. Nikko.
- R. virescens* (Schaeff.) Fries Epicr. p. 355.
 Nom. Jap. Aitake. Tokio.
- Hygrophorus miniatus* (Scop.) Fries Epicr. p. 330.
 Nom. Jap. Akanumabenitake. Nikko.
- H. conicus* (Scop.) Fries Epicr. p. 331.
 Nom. Jap. Akayamatake. Tokio.
- Hypholoma fasciculare* (Huds.) Sacc. Syll. Fung. VI. p. 1029.
 Nom. Jap. Yanagitake. Tokio.
- H. lateritium* (Schaeff.) Schröt. Pilze Schles. I. p. 572.
 Nom. Jap. Kijitake. Tokio.
- Inocybe rimosa* (Bull.) Sacc. Syll. VI. p. 735.
 Nom. Jap. Dokusugitake. Tokio.
- Cortinarius* (Dermocybe) *sanguineus* (Wulf.) Fries Epicr. p. 288.
 Nom. Jap. Akatake. Tokio.
- C. (D.) cinnamomeus* (L.) Fries Epicr. p. 288.
 Nom. Jap. Sasatake. Tokio.
- Pleurotus ostreatus* (Jacq.) Sacc. Syll. VI. p. 355.
 Nom. Jap. Hiratake. Tokio.
- Pl. olearius* DC. Fl. Franc. VI. p. 44.
 Nom. Jap. Tsukiyotake. Nikko.
- Tricholoma bicolor* (Pers.) P. Henn. = *Tr. personatæ* (Fr.).
 Nom. Jap. Murakishimeji. Tokio.
- Tr. conglobatum* (Vitt.) Sacc. Syll. VI. p. 126.
 Nom. Jap. Numeritake. Prov. Shinano.
- Tr. Colossum* Fries Epicr. p. 38.
 Nom. Jap. Samatsudake. Nikko.
- Tr. Russula* (Schaeff.) Sacc. Syll. VI. p. 94.
 Nom. Jap. Mukuyenobenitake. Tokio.
- Cortinellus edodes* (Berk.) P. Henn.
 Nom. Jap. Matsutake. Kioto.
- Armillaria mellea* (Vahl) Sacc. Syll. VI. p. 80.
 Nom. Jap. Hariganetake. Nikko.
- Lepiota cristata* (Bolt.) Sacc. Syll. VI. p. 39.
 Nom. Jap. Kitsunenokarakasa. Tokio.
- Amanitopsis vaginata* (Bull.) Roze. form. alba Fr.
 Nom. Jap. Tsurutake. Tokio.
- Amanita caesaria* Scop. Carn. II. p. 419.
 Nom. Jap. Obenitake. Nikko.
- A. muscaria* (L.) Pers. Syst. Myc. I.
 Nom. Jap. Ashitakabenitake. Nikko.
- A. umbrina* Pers. = *A. pantherina* DC. Fl. Fr. VI. p. 52.
 Nom. Jap. Haikoroshi. Nikko.
- A. spissa* Fries Epicr. p. 9.
 Nom. Jap. Hebikinoko. Tokio.

Phallaceae.

- Mutinus caninus* (Huds.) Fries. S. V. Sc. II.
 Nom. Jap. Kitsunenoefude. Nikko.
Phallus impudicus Linn. Suec. 1261.
 Nom. Jap. Suppontake. Tokio.
Ph. aurantiacus (Mont.) E. Fisch.
 Nom. Jap. Hebinoando. Tokio.

Hymenogastraceae.

- Rhizopogon virens* (Alb. et Schw.) Schröt. Pilze Schles. I. p. 713.
 Nom. Jap. Shoro. Prov. Suruga.

Lycoperdaceae.

- Lycoperdon uteriforme* Bull. Ch. t. 950. f. I.
 Nom. Jap. Kitsunebukuro. Tokio.
L. gemmatum Batsch El. F. p. 147.
 Nom. Jap. Hokoritake. Tokio.
Geaster stellatus (Scop.) = *G. hygrometricus* (Pers.) Fr
 Nom. Jap. Chiyadaigoke. Tokio.

Sclerodermataceae.

- Scleroderma* spec.
 Nom. Jap. Awadango. Tokio.

Helvellaceae.

- Helvella crispa* (Scop.) Fr. Syst. Myc. II. p. 14.
 Nom. Jap. Noboririo. Tokio.
H. lacunosa Afzel. Act. Holm. 1783. p. 304.
 Nom. Jap. Kuroamugasatake. Tokio.
Morchella conica Pers. Champ. com. p. 257.
 Nom. Jap. Amigasatake. Tokio.

Bulgariaceae.

- Bulgaria polymorpha* (Fl. Dan.) Wettst. Zool. bot. Verh. 1886.
 p. 595.
 Nom. Jap. Kurokikurage. Nikko.

Pezizaceae.

- Humaria scutellata* (L.) Fuck. Symb. Myc. p. 321.
 Nom. Jap. Akajikurage. Tokio.
Macropodia macropus (Pers.) Fuck.
 Mimikusabira. Nikko.

B. Referate und kritische Besprechungen.

- Diels, L.** Die Flora von Central-China. Nach der vorhandenen Literatur und neu mitgetheiltem Original-Materiale. (Engler's Bot. Jahrbüch. XXIX. 1900. p. 169—320. Mit 4 Taf. Karten-Skizze u. 5 Fig. im Text.)

Die Abhandlung ist von besonderem Werthe, da bisher die Vegetation Central-Chinas eine floristische Darstellung und pflanzengeographische Be-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [Beiblatt 39 1900](#)

Autor(en)/Author(s): Hennings Paul Christoph

Artikel/Article: [Fleischige Pilze aus Japan. 155-157](#)