Illustrierte Flora von Mittel-Europa

Mit besonderer Berücksichtigung von Oesterreich, Deutschland und der Schweiz

Zum Gebrauche in den Schulen und zum Selbstunterricht

Von

Dr. phil. Gustav Hegi

früher a. o. Professor an der Universität München

VII. Band: Gesamtregister

bearbeitet von Dr. Gustav Hegi,
unter Mitwirkung von Dr. Hans Kugler,
Dr. Meta Lutz und Dr. Edwin Schlumpf

A. Pichler's Witwe & Sohn
Buchhandlung für pädagogische Literatur und Lehrmittelanstalt
Wien V, Margaretenplatz 2

II 3175

A 74' 6

Urheber und Verleger behalten sich alle Rechte an Text und Bildern, insbesondere das Recht der Uebersetzung, vor.

Oberösterreichisches
Landesmuseum Linz/D.
Bibliothek

Druck: Dr. F. P. Datterer & Cie., Freising-München.

Vorwort des Verlages zum Registerband

Mit dem Erscheinen des Registerbandes liegt nun die „Flora" endlich fertig vor. Es ist uns bei dieser Gelegenheit ein Bedürfnis, allen denen zu danken, die in den über 25 Jahren mühevoller Arbeit sich in den Dienst des Werkes gestellt haben. In erster Linie gebührt dieser Dank dem verdienten Herausgeber, Herrn Dr. Gustav Hegi, der mit nie erlahmendem Willen, mit unermüdlichem Eifer und schonungslos mit dem Einsatz seiner ganzen Arbeitskraft sein unerschöpfliches Wissen in den Dienst des Werkes gestellt hat. Auch schwere Krankheit konnte nur längere Unterbrechungen seiner Arbeit erzwingen. Sobald die schlimmste Leidenszeit überwunden war, hat er sich ohne jede Rücksicht immer wieder seinem Werke zur Verfügung gestellt. Nächst dem Herausgeber verdienen unseren Dank seine wissenschaftlichen Mitarbeiter, von denen leider so mancher, wie z. B. Albert Thellung und August von Hayek sich des vollendeten Werkes nicht mehr erfreuen dürfen, verdienen Dank die Maler und Zeichner, die ihr reiches Können dem Werke zur Verfügung gestellt haben. Aber auch unserer Bezieher sei an dieser Stelle gedacht. Es war für viele von ihnen gewiss keine kleine Geduldsprobe, die Vollendung des Werkes immer wieder hinausgerückt zu sehen und nicht wenige haben die Fertigstellung nicht erleben dürfen. Unsere Bezieher wissen, dass es weder an einer Saumseligkeit des Herausgebers, noch an mangelnder Teilnahme des Verlegers lag, daß das Werk über zwei Jahrzehnte zu seiner Vollendung brauchte. Die Fülle des Stoffes und der Wunsch des Herausgebers, sein Werk so vielseitig und vollständig wie nur irgend möglich zu gestalten, haben den ursprünglich vorgesehenen Rahmen gesprengt, die Jahre des Krieges und der Nachkriegszeit, in denen nicht einmal zeitbeständiges Papier und brauchbare Leinwand zu haben waren, haben weiter verzögernd gewirkt. Wir mussten mit dem Druck warten, bis das Werk wieder in friedensmässiger Ausstattung hergestellt werden konnte. Wir hoffen, dass die Geduld und Nachsicht, die unsere Bezieher uns bewiesen haben, nunmehr durch die Freude belohnt wird, die ihnen das vollständige Werk bereiten soll und wir danken ihnen für die Treue, mit der sie, vielfach trotz schwieriger wirtschaftlicher Verhältnisse, bis zum Abschluss durchgehalten haben.

Der Registerband hat allein zwei Jahre Arbeit beansprucht, eine Arbeit, von der sich offenhar viele Bezieher keinen Begriff gemacht haben. Wir begegneten öfter der Meinung, dass es doch keine grosse und langwierige Arbeit sein könne, die lateinischen Pflanzennamen aus den 12 Textbänden herauszuziehen. Hätte der Herausgeber nicht mehr bieten wollen, als diese Pflanzennamen, so könnte das Register allerdings längst fertig sein. Es schien aber doch dringend nötig mehr zu geben; denn die Namen allein sind kein hinreichender Führer durch ein derartig reichhaltiges und umfangreiches Werk. Es mussten vielmehr dem lateinischen Namenregister noch eine Reihe von anderen Nachschlagemöglichkeiten zur Seite gestellt werden, über die im Nachfolgenden noch einiges gesagt sei.

Das Register zerfällt in folgende Teile:

1. Bestimmungsschlüssel für die Familien. Dieser Schlüssel führt bis zur Feststellung, welcher Familie die gesuchte Pflanze angehört; von dort führen dann Verweisungen zu den Schlüsseln zur Bestimmung der Gattung in den Textbänden.

2. Erklärung botanischer Kunstausdrücke. Dieses Verzeichnis verweist auf die im ersten Band enthaltene „Allgemeine Botanik" und enthält ausserdem auch alle in den späteren Bänden vorkommenden neuen Begriffe.
3. Die Uebersicht über das Pflanzenreich ist gegliedert bis herab zu den Gattungen. Sie dient dem Ueberblick und auch als Unterlage für Pflanzensammlungen (Herbarien); deshalb sind auch die in den Textbänden nicht enthaltenen Kryptogamen kurz berücksichtigt. Diese Uebersicht enthält auch eine Reihe von Ergänzungen und Nachträgen zu den Textbänden, insbesondere sind neue Standorte, neue Bastarde und einzelne neue Hinweise auf die angewandte Botanik aufgenommen. Dieser Abschnitt enthält auch noch zahlreiche Ergänzungsabbildungen, die seinerzeit in den Textbänden keine Verwendung finden konnten.
4. Alphabetisches Verzeichnis der lateinischen Pflanzennamen, in dem auch alle in der Flora aufgeführten Synonyma enthalten sind.
5. Das Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen, insbesondere auch der volkstümlichen und mundartlichen Namen, mag für die Fachbotaniker von geringerer Bedeutung sein. Es schien aber doch richtig, die Tausende von mundartlichen Namen, die sonst im Werk unauffindbar wären, durch ein Register zugänglich zu machen. Wir hoffen, dass dieses Register vor allem dem Volksschullehrer und dem volkskundlichen Forscher Dienste leisten wird.
6. Verzeichnis der Kultur-, Nutz-, Arznei- und Zierpflanzen. Dieses Verzeichnis dient praktischen Zwecken. Es soll dem Landwirt und dem Gärtner Hinweise auf für sie wichtige Pflanzen geben, es soll aber auch, ja vor allem, dem Chemiker und allen pflanzenverarbeitenden Berufen die Möglichkeit geben, sich über praktisch für ihr Arbeitsgebiet nutzbare Pflanzen zu unterrichten. Vielleicht kann auf diese Weise sogar die eine oder andere in Vergessenheit geratene Pflanze wieder praktischer Verwendung zugeführt werden.
7. Verzeichnis der Pflanzenerzeugnisse, Inhaltsstoffe, Drogen und dergleichen, vor allem für die Zwecke der Apotheker, der Naturheilkundigen und der chemischen Industrie im weitesten Sinn. Es bildet die Ergänzung und Umkehrung des vorigen Verzeichnisses. Verzeichnis 6 gibt Pflanzen mit praktisch wichtigen Eigenschaften, während Verzeichnis 7 finden lässt, auf welche Pflanzen die einzelnen Erzeugnisse zurückgehen.
8. Sachverzeichnis zur Kulturgeschichte und Volkskunde. Dieses Verzeichnis enthält sowohl die Namen von Pflanzen, die Beziehungen zur Kulturgeschichte und Volkskunde, vor allem auch zu religiösen und abergläubischen Vorstellungen, haben. Es enthält neben den Pflanzennamen aber auch Begriffe aus diesen Sachgebieten, wie etwa Hexenwesen, Johannistag und dergleichen.
9. Verzeichnis der Botanikernamen, soweit diese in den Fussnoten der Textbände behandelt wurden (mit Ergänzungen).

Die Umlaute ä, ö, ü wurden grundsätzlich zerlegt und sind unter ae, oe und ue, nicht unter a, o, u, zu finden. Es ist also äg nicht unter a g, sondern unter a e g zu suchen.

Wir hoffen, mit dem Registerband alle irgend erfüllbaren Wünsche befriedigt zu haben. Auf manches musste verzichtet werden, um den Umfang nicht allzu stark anschwellen zu lassen. Das Register sollte kein Ergänzungsband werden, sondern der Schlüssel, mit dem es erst möglich ist, zu den in den Textbänden aufgespeicherten Wissensschätzen zu gelangen. Wir hoffen, dass diese Aufgabe innerhalb des möglichen gelungen ist.

München, Januar 1931.

Die Verlagsbuchhandlung.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	V
1. Bestimmungsschlüssel für die Familien .	1
2. Erklärung botanischer Kunstausdrücke	26
3. Systematische Uebersicht der Hauptgruppen des Pflanzenreiches	135
4. Alphabetisches Verzeichnis der lateinischen Pflanzennamen einschliesslich der Synonyma	214
5. Alphabetisches Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen, insbesondere auch der volkstümlichen und mundartlichen Namen	381
6. Kultur-, Nutz-, Arznei- und Zierpflanzen	470
a) Nährpflanzen (Getreide, Hülsenfrüchte, Knollen, Zucker usw.)	470
b) Obst (Beeren-, Kern-, Schalenobst, Nüsse, Südfrüchte usw.)	472
c) Gemüsepflanzen (Salate usw.)	475
d) Genußmittel, Gewürze	478
e) Ölpflanzen (aetherische und fette Öle, Talge, Wachs)	482
f) Pflanzen, die Farb- und Gerbstoffe, Gummi, Harze u. dgl. liefern	485
g) Faser-, Geflecht- und Gespinstpflanzen (Besen und Weidenruten, Scheuerkräuter)	488
h) Nutz- und Handelshölzer	490
i) Futter- und Düngerpflanzen (Gräser, Klee, Bienenfutterpflanzen usw.)	493
k) Arznei- und Giftpflanzen	498
l) Zierpflanzen	510
7. Verzeichnis der Pflanzenerzeugnisse, Inhaltsstoffe, Drogen usw.	529
8. Beziehungen der Pflanzen zur Kulturgeschichte, Volkskunde, Glaube und Aberglaube	549
9. Verzeichnis der Botaniker, die in den Fussnoten der Flora behandelt sind	556
Berichtigungen	562

Die einzelnen Bände erschienen in den Jahren:

Band I	(Pteridophyta bis Gramina)	1908
II	(Cyperaceae bis Orchidaceae)	1909
III	(Juglandaceae bis Ranunculaceae)	1912
IV/1	(Berberidaceae bis Resedaceae)	1919
IV/2	(Droseraceae bis Rosaceae)	1923
IV/3	(Leguminosae bis Tropaeolaceae)	1924
V/1	(Linaceae bis Violaceae)	1925
V/2	(Cactaceae bis Cornaceae)	1926
V/3	(Pirolaceae bis Verbenaceae)	1927
V/4	(Labiatae und Solanaceae)	1927
VI/1	(Scrophulariaceae-Compositae [bis Anthemis])	1918
VI/2	(Compositae [Achillea bis Hieracium])	1929
VII	(Gesamtregister)	1931

1. Familien-Bestimmungs-Schlüssel

Seite 1—25

Prof. Dr. GUSTAV HEGI

Alpenflora

Die verbreitetsten Alpenpflanzen von Deutschland, Österreich und der Schweiz. 7. durchgesehene Auflage. 1930. Mit 221 farb. Abbildungen auf Tafeln und 44 schwarzen Bildern. Taschenformat. In Leinen Mk. 7.—.

„Man darf an dem Werk seine helle Freude haben. Die Abbildungen sind künstlerisch vollendet. Textlich steht die „Alpenflora", was man nicht von allen bisher erschienenen Taschenfloren sagen kann, durchaus auf der Höhe." *(Deutsche Alpenzeitung.)*

J. F. LEHMANNS VERLAG / MÜNCHEN 2 SW

1. Bestimmungsschlüssel für die Familien.

1. Pflanzen ohne eigentliche Blüten und Samen, sich durch Sporen vermehrend. **Pteridophyta**, Leitbündel- oder Gefäßkryptogamen (Bd. I, pag. 2) . . . . . 2.

1*. Pflanzen mit vollständigen, meist aus der Blütenhülle (Perianth, den Staubblättern und den Fruchtblättern bestehenden Blüten, mit Samen. **Phanerogamae**, Anthophyta oder Spermatophyta, Blüten- oder Samenpflanzen . . . . . 11.

2. Stengel gegliedert, einfach oder quirlästig, an den Knoten von ringsum geschlossenen, gezähnten Scheiden (d. h. wirtelständigen, verwachsenen Blättern) umgeben, sonst blattlos. Fruchtbare Blätter klein, schildförmig, an der Spitze des Stengels (oft auch der Äste) wirtelständig, zu einer Ähre oder zu einem Zapfen vereinigt, auf der Unterseite die sackförmigen Sporenbehälter (Sporangien) tragend (Taf. 9, Fig. 3 b) . . . . **Equisetaceae.** Bd. I, pag. 51 (53).

2*. Stengel nicht gegliedert. Blätter nicht in Scheiden verwachsen . . . . . 3.

3. Pflanzen frei schwimmend. Sproß in 3-zähligen Quirlen, zwei Schwimmblätter und ein untergetauchtes, zerteiltes, wurzelähnliches Blatt tragend. Sporangienfrüchte zu 3 bis 8 am Grunde der Blätter geknäuelt, behaart . . . . . **Salviniaceae.** Bd. I, pag. 47.

3*. Pflanzen im Boden wurzelnd . . . . . 4.

4. Laubblätter schmal, lineal oder seltener langgestielt, kleeähnlich (mit 4 Teilblättchen) . . . . . 5.

4*. Laubblätter niemals lineal. Sporangien auf der Unterseite oder am Rande der gefiederten oder fiederschnittigen, seltener ungeteilten, im Knospenzustande schneckenförmig eingerollten Laubblätter . . . . . 8.

5. Sporangienfrüchte kugelig oder birnförmig, am Grunde der ungeteilten, binsenartigen oder 4-zähligen (kleeähnlichen) Laubblätter; letztere in der Jugend eingerollt . . . . . **Marsiliaceae.** Bd. I, pag. 48.

5*. Laubblätter einfach, schmal, nicht 4-zählig . . . 6.

6. Pflanzen meist untergetaucht, am Grunde von Seen, einem Grasbüschel ähnlich. Sproß unterirdisch, knollenförmig. Sporangien in den stark scheidig verbreiterten Grund der lineal-pfriemlichen (binsenartigen) Laubblätter eingeschlossen . . . . . **Isoëtaceae.** Bd. I, pag. 50.

6*. Pflanzen nicht untergetaucht. Stengel dicht mit kleinen, linealen oder schuppenförmigen, sparrig abstehenden oder einander dachziegelartig sich deckenden Laubblättern besetzt (Bd. VII, Fig. 966 a). Sporenbehälter achselständig, entweder in den Achseln von Laubblättern oder von Hochblättern (Sporophylle) und dann zu einer Ähre vereinigt 7.

7. Sporenblätter (und Sporen) von einerlei Art und Größe, nierenförmig, zahlreiche Sporen enthaltend. Stengel gabelig verzweigt. Laubblätter ohne Ligula . . . . . **Lycopodiaceae.** Bd. I, pag. 63 (64).



Fig. 966. Lycopodium complanatum L. var. Chamaecyparissus A.Br. *a* Fruchtbarer Sprossteil. *b* Geöffnetes Sporangium (vergröß.).

7*. Zarte, laubmoosähnliche Pflanzen (bei uns! Bd. VII, Fig. 1175) mit meist 4-zeilig stehenden Laubblättern; letztere mit Ligula. Sporenbehälter und Sporen von zweierlei Art und Größe (Taf. 1, Fig. 52—54); Makrosporangien meist 4-klappig aufspringend mit 4 Makrosporen, Mikrosporangien 2-klappig mit zahlreichen Mikrosporen . . . . . **Selaginellaceae.** Bd. I, pag. 69.

8. Pflanze (unsere Art) laubmoosähnlich, sehr zart, fast durchscheinend. Sporangienhäufchen (sori) am Rande von einem unterständigen, becherförmigen, 2-teiligen Schleier (Taf. 2, Fig. 1 b) umschlossen. Sporangien sitzend. . . . . **Hymenophyllaceae.** Bd. I, pag. 7.

8*. Blattfläche nicht durchscheinend. Sporangien meist lang gestielt . . . . . 9.

9. Laubblätter (Sporophylle) die Sporangienhäufchen auf der Unterseite (zuweilen von dem ungerollten Blattrand bedeckt) tragend; Sori punkt-, streifen- oder fleckenförmig (Bd. VII, Fig. 967), zuweilen die ganze Unterseite bedeckend. Sporangien klein, mit bloßem Auge kaum unterscheidbar . . . . . **Polypodiaceae.** Bd. I, pag. 8.

9*. Laubblätter fast immer in einen untern laubartigen, unfruchtbaren und in einen obern fruchtbaren Abschnitt gegliedert. Sporangien groß, von bloßem Auge deutlich wahrnehmbar . . . . . 10.



Fig. 967. Fiederchen (Unterseite) mit Sporangienhäufchen (Sori) von Aspidium montanum Aschers (stark vergrößert).

10. Pflanze stattlich (60 bis 150 cm hoch). Unfruchtbarer Blattabschnitt doppelt gefiedert, fruchtbarer einfach gefiedert, eine Rispe darstellend. Laubblätter im Knospenzustand eingerollt. **Osmundaceae.** Bd. I, pag. 42.

10*. Pflanzen höchstens 30 cm hoch. Unfruchtbarer Blattabschnitt ungeteilt oder einfach gefiedert, fruchtbarer eine gestielte Ähre oder Rispe darstellend, Laubblätter im Knospenzustand nicht eingerollt . . . . . **Ophioglossaceae.** Bd. I, pag. 43.

11. Blüten gewöhnlich nackt, d. h. ohne Blütenhülle (Perianth), eingeschlechtig, niemals zwitterig. Männliche Blüten in der Regel zapfen- oder ährenförmig, aus zahlreichen, spiralig angeordneten Staubblättern bestehend. Fruchtblätter offen. Griffel und Narbe fehlend. Holzgewächse mit meist nadelförmigen, 1-nervigen oder schuppenartigen Laubblättern und reich verästeltem Stamm **(Gymnospermae)** . . . . . 12.

11*. Blüten meist zwitterig, seltener eingeschlechtig, außer den Staub- und Fruchtblättern in der Regel noch eine Blütenhülle. Fruchtblätter geschlossen (nur selten oben offen), zu einem die Samenknospen einschließenden Gehäuse (Fruchtknoten) verwachsen. Griffel und Narbe (wenigstens die letztere) vorhanden. Nur bei wenigen Wasserpflanzen die Blüten unscheinbar oder selten ausgebildet **(Angiospermae)** . . . . . 15.

12. Gefäße im sekundären Holz fehlend, Harzgänge im Holz häufig vorhanden. Blüten ohne Perianth. Laubblätter nadel- oder schuppenförmig, seltener keil- bis fächerförmig . . 13.

12*. Gefäße im sekundären Holz vorhanden, Harzgänge fehlend. Unsere Art ein besenartiger Strauch (Bd. VII, Fig. 1135) mit gegliederten Zweigen und mit gegenständigen, häufiger paarweise zu stengelumfassenden Scheiden verwachsenen Laubblättern. Perianth vorhanden, verwachsen-blätterig (Bd. I, Fig. 32 b). Scheinfrucht beerenartig. **Ephedraceae.** Bd. I, pag. 75.

13. Laubblätter fächerförmig, in der Mitte eingeschnitten, daher zweilappig, mit gabelig verzweigten, Nerven. Samen steinfruchtartig, pflaumenähnlich, hellgrün bis gelblich, bis 3 cm im Durchmesser. . . . . **Ginkgoaceae.** Bd. I, pag. 74.

13*. Laubblätter verhältnismäßig klein, ungeteilt, nadel- oder schuppenförmig, 1-nervig. Samenschale meist hart; Samen zuweilen geflügelt oder von einem fleischigen Samenmantel (arillus) umgeben. **(Coniferae)** 14.

14. Nadeln schraubig angeordnet (an den Seitenzweigen in eine Ebene gedreht). Blüten 2-häusig, nicht zapfenähnlich. Weibliche Blüten sehr klein, knospenartig (Taf. 12, Fig. 57), mit einer einzigen Samenanlage. Samen mit becherförmiger, beerenartiger, roter Hülle. Harz (bei unserer Gattung) fehlend (Taf. 12, Fig. 59). . . . . **Taxaceae.** Bd. I, pag. 79.

14*. Harzgänge wenigstens in der Rinde und in den Nadeln vorhanden (Taf. 12, Fig. 17). Samen ohne fleischige Hülle. Blüten zapfenähnlich. . . . . **Pinaceae.** Bd. I, pag. 81 (82).



Fig. 968. Blütenteile einer Monokotyledonen (Scilla). *a* Blüte, *b* Fruchtknoten, *d* Querschnitt durch denselben. *c* Aufgesprungene Fruchtkapsel.

15. Blütenkreise meist 3-zählig[1]) (Bd. VII, Fig. 968). Laubblätter streifennervig, parallel- oder bogennervig, ohne stärkeren Mittelnerven, selten netzaderig. Stengel mit zerstreuten, geschlossenen Leitbündeln. Keimling fast stets nur mit einem, die Knospe scheidenartig umgebenden Keimblatt . . . . . **Monocotyledones** (Bd. I, pag. 109). 16.

15*. Blütenkreise meist 5- oder 4-zählig[2]). Laubblätter von wenigen, in der Regel in einen Kreis gestellten Leitbündeln durchzogen (Bd. VII, Fig. 969). Laubblätter meist fieder- oder fingernervig, netzaderig. Keimling gewöhnlich mit 2 gegenständigen Keimblättern. **Dicotyledones** (Bd. III, pag. 5). 41.

16. Kleine, schwimmende oder zeitweise etwas untergetauchte Wasserpflanzen ohne deutliche Gliederung in Stengel- und Laubblätter. Blüten selten ausgebildet. Laubglieder auseinander hervorsprossend (Bd. II, Fig. 261). . . . . **Lemnaceae**. Bd. II, pag. 137.

16*. Meist ansehnliche Land- und Sumpfpflanzen, seltener Wasserpflanzen, mit deutlicher Gliederung in Stengel und Laubblätter (letztere zuweilen schuppenförmig). . . . . 17.

17. Laubblätter in der Knospenlage gefaltet, Spreiten durch Zerreißen ± tief fieder- oder fächerförmig geteilt. Blütenstände kolben-, ähren- oder rispenförmig, von Scheiden umgeben. Holzgewächse (meist astlose Bäume) der Tropen und Subtropen. In Mitteleuropa kultiviert. **Palmae** Bd. II, pag. 130.

17*. Laubblätter in der Regel ungeteilt und nicht gefaltet. . . . . 18.

18. Blüten unregelmäßig, zygomorph (s. auch Commelinaceae). Fruchtknoten unterständig. . . . . 19.

18*. Blüten regelmäßig (VII, Fig. 972). Fruchtknoten ober- od. unterständig. 21.

19. Griffel fadenförmig mit verbreiterten Narben oder dick, mit den Staubblättern nicht verwachsen . . . . . 20.

19*. Griffel mit dem einen oder mit den beiden Staubbeuteln verwachsen (Fig. 971). Blüten öfters gespornt, das unpaare Perigonblatt des inneren Kreises zuweilen als Lippe ausgebildet. Pflanzen öfters mit Knollen (Bd. VII, Fig. 970) . . **Orchidaceae**. Bd. II, pag. 321 (324).



Fig. 969. *a* Stengelquerschnitt einer Dikotyledonen (Caltha). *b* Leitbündel freigelegt.

20. Alle Staubblätter fruchtbar. Blüten fast 2-lippig, meist purpurrot. Griffel fadenförmig. . . . . **Iridaceae** Gattung **Gladiolus**. Bd. II, pag. 302.

20*. Staubblätter z. T. staminodial, unten mit der Kronröhre vereint, nur ein Staubblatt und dieses nur zur Hälfte fruchtbar, zur Hälfte petaloid. Zierpflanzen. . . . . **Cannaceae**. Bd. II, pag. 320/321.

21. Einzelblüten unansehnlich, stets regelmäßig, nackt oder mit durchscheinender, mit grünlicher, weißlicher oder brauner, niemals blumenartig gefärbter Blütenhülle; diese oft nur als Haare, Borsten oder Schuppen ausgebildet. 22.

21*. Blüten ansehnlich. Alle Blütenhüllblätter oder doch die des inneren Kreises blumenartig, meist 6 (seltener 4 oder 8). 34.

22. Blüten mit 6 deutlichen Perigonblättern, kelch- oder kronblattartig, zuweilen in Kelch und Krone geschieden. 23.

22*. Blüten nackt (bei Potamogeton die Blütenhüllblätter fehlend und scheinbar durch die großen Mittelband- [Konnektiv-] schuppen der Staubbeutel ersetzt, s. Bd. VII, Fig. 974 und Taf. 16, Fig. 1a, 3a, 4a) oder mit kümmerlichem, öfters aus Borsten oder Haaren und meist aus weniger als 6 Blättern bestehendem Perigon . . 26.

23. Fruchtknoten unterständig. Stengel windend, mit gestielten, herzeiförmigen Laubblättern. Frucht eine Beere (bei unserer Art) oder eine Kapsel. Blüten zweihäusig. . . . . **Dioscoreaceae**. Bd. II, pag. 280.



Fig. 970. Wurzelknollen von Orchidaceen. *a* von Orchis globosus, *b* Platanthera bifolia, *c* Gymnadenia conopea, *d* Orchis latifolius.

[1]) Bei den meist auf dem Wasser schwimmenden Lemnaceae sind die am Rande der sprossenden Laubglieder selten auftretenden Blüten von bloßem Auge nicht wahrnehmbar.

[2]) Bei der zu den Droseraceae gehörenden wurzellosen schwimmenden Wasserpflanze Aldrovanda vesiculosa mit quirlständigen, borstigen Laubblättern (Taf. 139, Fig. 6a) werden die Blüten höchst selten ausgebildet.

23*. Fruchtknoten oberständig. . . . . 24.
24. Frucht eine Beere. Blüten zweihäusig. . . . . **Liliaceae** (z. T.). Bd. II, pag. 184 (187).
24*. Frucht trocken. Blüten zwitterig. . . . . 25.
25. Blüten in einfachen, endständigen Trauben. Laubblätter schmal, grasartig flach oder halbzylindrisch-rinnig. . **Juncaginaceae**. Bd. I, pag. 146/147
25*. Blüten einzeln oder zu Köpfchen vereinigt; diese meist rispig (spirrig) angeordnet. Laubblätter schmal, stielrund oder grasartig flach und dann oft lang bewimpert. Blütenhülle häutig. **Juncaceae**. Bd. II, pag. 144 (145).
26. Blüten einhäusig, in walzenförmigen (Kolben) oder in kugeligen Blütenständen, meist dicht gedrängt. . 27.
26*. Blüten in Ähren oder zu 1- bis mehrblütigen Ährchen vereinigt; diese zu sehr verschiedenartigen Gesamtblütenständen gruppiert; seltener bei einigen Wasserpflanzen in kurzgestielten Knäueln oder einzeln zwischen den Laubblättern. . . . . 29.



Fig. 971. *a* Blütendiagramm von Orchis, *b* von Cypripedium. (*l* = Lippe, *c* = Schuh, *s* = Staminodien).

27. Blüten einhäusig. Blütenstände zu 2 bis mehreren, walzlich oder kugelig; die männlichen Blütenstände an der Spitze des Stengels, die weiblichen tiefer stehend. Früchte nußartig. Laubblätter 2-zeilig angeordnet. . . . . 28.
27*. Blütenstände einzeln, walzlich, am Grunde von einem großen, kronblattartig gefärbten Hochblatt (spatha) umgeben, oder fingerförmig, scheinbar seitenständig und von dem bajonettförmigen, grünen Hochblatt überragt. Frucht eine saftlose Beere (VII, Fig. 1113). Laubblätter breit, herz- od. pfeilförmig, fußförmig geteilt oder aber schwertförmig. **Araceae**. Bd. II, pag. 131.
28. Blütenstände walzlich, die untern weiblichen den obern männlichen meist genähert. Blüten nackt, am Grunde mit Haaren (Taf. 15, Fig. 1a, 1b). Sumpf- und Uferpflanzen. **Typhaceae**. Bd. I, pag. 111.
28*. Blütenstände kugelig, die weiblichen morgensternartig. Perigon schuppenartig (Taf. 15, Fig. 4a). Sumpf- und Wasserpflanzen. **Sparganiaceae**. Bd. I, pag. 115.
29. Fruchtknoten unterständig (Bd. I, Fig. 75/10). Seltene, untergetauchte zweihäusige Wasserpflanze mit bandförmigen Laubblättern **Hydrocharitaceae**, Gattung **Vallisneria**. Bd. I, pag. 161.
29*. Fruchtknoten oberständig. . . . . 30.
30. Blüten zu wenigen bis vielen zu Blütenständen vereinigt. . . 31.
30*. Blüten einzeln, eingeschlechtig, zwischen den Laubblättern oder in den Achseln derselben. Untergetauchte, ziemlich seltene Wasserpflanzen. Laubblätter öfters gezähnt. . . . . 33.



Fig. 972. Blütendiagramme von Liliaceae. *a* von Majanthemum bifolium F. W. Schmidt (*t* Tragblatt), *b* von Tofieldia calyculata Wahlenb. (*v* Außenkelch), *c* von einer typischen Liliacee, *d* von Paris quadrifolius L.

31. Wasserbewohnende, untergetaucht flutende oder mit den obersten Teilen schwimmende, ausdauernde Krautgewächse. Blüten meist nackt, in Ähren; letztere zur Blütezeit aus dem Wasser herausragend. Staubblätter 4 (Bd. VII, Fig. 974) bis 1. Fruchtblätter fast immer frei (apokarp). . . . . **Potamogetonaceae** (z. T.). Bd. I, pag. 120.
31*. Blüten meist ohne deutliche Blütenhülle, mit 1 bis mehreren Tragblättern („Spelzen"), in 1- bis mehrblütigen Ährchen; diese zu Ähren, Rispen, Köpfchen oder Spirren vereinigt. Staubblätter meist 3. Frucht nußartig, öfters von Spelzen oder von dem Vorblatt eingeschlossen (s. Tafel 21). Laubblätter grasartig. „Spelzenblütler". . . . . 32.
32. Stengel deutlich knotig gegliedert, meist stielrund und hohl. Laubblätter mit offenen Scheiden, wie die Spelzen 2-zeilig angeordnet; Blatthäutchen deutlich. Ährchen ein- oder mehrblütig, am Grunde meist von 2 (selten 0, 1, 3 oder 4) Hüllspelzen eingeschlossen. Blüten in der Regel zwitterig (Bd. VII, Fig. 975) . . . . . **Gramina**. Bd. I, pag. 165 (173).

Fig. 973. Blütendiagramm von Triglochin maritimum L.

32*. Stengel selten knotig gegliedert, oft dreikantig, nicht hohl. Laubblätter 3-zeilig angeordnet, mit meist ringsum geschlossenen Scheiden. Blatthäutchen wenig ausgebildet. Ährchen am Grunde ohne Spelzen. Blüten zwitterig oder eingeschlechtig (Bd. VII, Fig. 976). Meist an feuchten Standorten . . . . . **Cyperaceae**. Bd. II, pag. 5 (9).
33. Pflanze ausdauernd. Blüten einhäusig, scheinbar zwitterig (Taf. 17, Fig. 6a). Fruchtknoten

getrennt, 2 bis 4, gestielt (Taf. 17, Fig. 6b). Laubblätter ganzrandig. Wasserpflanze. . . . . **Potamogetonaceae**, Gattung **Zanichellia**. Bd. I, pag. 140.

33*. Einjährige, zarte, ganz untergetaucht wachsende Pflanzen mit linealen, grob- oder feingezähnten, einander paarweise genäherten Laubblättern. Blüten eingeschlechtig, 1- oder 2-häusig, die männlichen mit Hülle (Taf. 18, Fig. 2d und Bd. I, Fig. 71/5). Weibliche Blüte nackt, mit einem 1-samigen Fruchtblatt. **Najadaceae**. Taf. I, pag. 144.



Fig. 974. Blüte (nackt mit 4 großen Konnektivschuppen) von Potamogeton.

34. Blüten eingeschlechtig. Äußere Perigonblätter kelchartig, innere kronenartig. . . . . 35.

34*. Blüten zwitterig. . . . . 36.

35. Untergetauchte oder freischwimmende Wasserpflanzen. Fruchtknoten unterständig. . . . . **Hydrocharitaceae** (z. T.). Bd. I, pag. 158.

35*. Im Boden wurzelnde Wasserpflanze. Stengel aufrecht. Fruchtknoten oberständig; Früchtchen frei, zahlreich. . . . . **Alismataceae**, Gattung **Sagittaria**. Bd. I, pag. 155.

36. Fruchtknoten oberständig. . . . . 37.

36*. Fruchtknoten unterständig. . . . . 40.

37. Fruchtknoten 1. . . . . 38.

37*. Fruchtknoten 6 bis viele, frei (Bd. I, Fig. 74/3). Sumpf- und Wasserpflanze . . . . 39.

38. Blütenhüllblätter der beiden Kreise in Form, Größe und Farbe nicht oder nur wenig verschieden, zuweilen am Grunde ± verwachsen. Größtenteils Zwiebel- und Knollengewächse. **Liliaceae** (z. T.). Bd. II, pag. 184 (187).

38*. Äußere Blütenhüllblätter kelchartig, innere kronblattartig. Stengel beblättert, knotig (Bd. VII, Fig. 1184). Laubblätter am Grunde scheidig umfassend. Zierpflanzen, zuweilen verwildernd. . . . . **Commelinaceae**. Bd. II, pag. 143.

39. Blütenstand stockwerkartig gegliedert, quirlig-doldig oder einzeln schwimmend. Staubblätter meist 6 (Bd. VII, Fig. 978 rechts). Trockene Schließfrüchte. . . **Alismataceae** (z. T.). Bd. I, pag. 150.

39*. Blütenstand eine endständige, einfache Scheindolde. Staubblätter (bei unserer Art) 9 (Bd. VII, Fig. 978 links). Balgfrüchte.



Fig. 975. Gramineen. *a* Ährchen vom Weizen zergliedert. *b* Aufriß eines 3-blütigen Gras-Ährchens. *H* = Hüllspelze, *D* = Deckspelze, *V* = Vorspelze.

. . . . . **Butomaceae**. Bd. I, pag. 157.

40. Staubblätter 3. Griffeläste zuweilen blumenblattartig verbreitert, gefärbt. Laubblätter oft schwertförmig. . . . . **Iridaceae** (z. T.) Bd. II, pag. 283 (284).

40*. Staubblätter 6. Laubblätter flach. Größtenteils Zwiebelpflanzen. . . . . **Amaryllidaceae**. Bd. II, pag. 306 (307).

41. Blütenhülle (Perianth) entweder fehlend oder einfach, d. h. nicht in Kelch und Krone gegliedert. 42.

41*. Blütenhülle doppelt (Bd. VII, Fig. 979b), d. h. in Kelch und Krone gegliedert. Kronblätter frei (Chori-, Eleuthero- oder Polypetalae) oder (wenigstens am Grunde) verwachsen (Gamo- oder Sympetalae. 95.



Fig. 976. Cyperaceen-Blüten. *a* Zwitterblüte, *b* männliche, *c* weibliche Blüte.

42. Holzgewächse (Bäume oder Sträucher[1])) . . 43.

42*. Kräuter oder Stauden, höchstens Halbsträucher. 60.

43. Laubblätter gegenständig. . . . . 44.

43*. Laubblätter wechselständig. . . . . 48.

44. Perianth groß, kronblattartig, 4- bis 8-blätterig, mit oder ohne Honigblätter. Nußfrüchte öfters vom bleibenden Griffel geschwänzt. **Ranunculaceae**, Gattung **Clematis**. Bd. III, pag. 507 u. 509.

[1]) Die meist mit Wickelranken kletternden Vitaceae besitzen einen unscheinbaren Kelch und 4 bis 5, öfters an der Spitze verwachsene Kronblätter (Fig. 1005).

44*. (siehe auch 44**). Perianth (bei unsern Arten) ziemlich unscheinbar oder fehlend. . 45.
44**. Perianthblätter zahlreich, kronblattartig. Staubblätter 5 bis 20. Früchtchen 1-samige Nüßchen, zahlreich, getrennt, in der hohlen Blütenachse eingeschlossen (Bd. IV/1, Fig. 726 d, e). Ziersträucher. . . . . **Calycanthaceae.** Bd. IV/1, pag. 14.
45. Auf Holzgewächsen schmarotzende, gabelig-verzweigte Sträucher. Frucht eine klebrige Scheinbeere. **Loranthaceae.** Bd. III, pag. 145.
45*. Nichtschmarotzende Holzgewächse. . . . . 46.
46. Laubblätter (bei unserer Art) ungeteilt, lederartig, wintergrün. Blütenstände kurz, blattachselständig. Blüten einhäusig. Staubblätter 4. Frucht eine 3-fächerige, fachspaltig aufspringende Kapsel (Bd. V/1, Fig. 1810 g, h). . . . . **Buxaceae.** Bd. V/1, pag. 202.
46*. Laubblätter sommergrün, unpaarig gefiedert. . . . . 47.
47. Staubblätter 2. Frucht mit einem Flügel. Knospen oft schwarz. . . . . **Oleaceae,** Gattung **Fraxinus.** Bd. III, pag. 1919/21.
47*. Staubblätter 3 bis 6. Frucht mit 2 Flügeln. Weibliche Blüten in hängenden Trauben (Bd. V/1, Fig. 1863 a). Angepflanzt. **Acer Negundo** L. Bd. V/1, pag. 293.

Fig. 977. Diagramm einer weiblichen Blüte von Helodea Canadensis L.

48. Laubblätter gefiedert[1]). . . . . 49.
48*. Laubblätter nicht gefiedert. . . . . 50.
49. Blüten 1-häusig; die männlichen in vielblütigen, hängenden Kätzchen, die weiblichen zu 1 bis 3 beieinander. Staubblätter zahlreich (Taf. 77, Fig. 1). Narben 2, groß (Taf. 77, Fig. 2) . . . . . **Juglandaceae.** Bd. III, pag. 6.
49*. Blüten 2-häusig, in Trauben oder Rispen. Staubblätter 3 bis 5. Narben 3 (Bd. V/1, Fig. 1823 e). Südeuropa (auch Südtirol, Krain). **Anacardiaceae,** Gattung **Pistacia.** Bd. V/1, pag. 229.
50. Laubblätter einfach, unterseits wie die jüngern Zweige durch silberweiße oder braune Schülfern goldenglänzend (Taf. 187, Fig. 1 und Bd. V/2, Fig. 2146 f, g). Staubblätter 4. Scheinsteinfrucht beerenähnlich. . **Elaeagnaceae.** Bd. V/2, pag. 727.



Fig. 978. Blütendiagramme von Butomus umbellatus L. (links) und von Alisma Plantago L. (rechts).

50*. Laubblätter ohne eine derartige Schülferbekleidung . . . . . 51.
51. Blüten in der Regel eingeschlechtig, die männlichen (zuweilen auch die weiblichen) in meist länglichen oder verlängerten, selten kugeligen „Kätzchen". . . . . 52.
51*. Blüten nicht in Kätzchen. . . . . 57.
52. Männliche und weibliche Blüten in Kätzchen. 53.
52*. Nur die männlichen Blüten in Kätzchen, die weiblichen einzeln oder zu wenigen beieinander oder aber in kurzen Büscheln. . . . . 56.
53. Blüten normal 2-häusig (nur ausnahmsweise 1-häusig oder gar zwitterig). Fruchtknoten 1-fächerig; Narben 2 . . . . . 54.
53*. Blüten 1-häusig . . . . . 55.
54. Aromatisch duftende Holzgewächse. Staubblätter meist 4 (VII, Fig. 980 m), fast sitzend. Narben fadenförmig (Taf. 77, Fig. 6). Frucht steinfruchtartig oft geflügelt (Taf. 78, Fig. 1 d und e). Samen ohne Haarschopf. **Myricaceae.** Bd. III, pag. 10.



Fig. 979. *a* Sympetale Krone mit Staubblättern von Thymus (Kelch entfernt). *b* Choripetale Blüte von Nasturtium officinale R. Br.

54*. Staubblätter 2 bis viele, meist mit deutlichen Staubfäden (Taf. 77, Fig. 9, 13). Narben kurz, zuweilen ausgerandet oder gespalten (Taf. 77, Fig. 8, 10). Frucht gewöhnlich eine 2-klappig aufspringende Kapsel. Samen zahlreich, am Grunde mit Haarschopf (Taf. 77, Fig. 19 bis 22). Blüten oft mit 1 bis 2 Honigdrüsen (Fig. 980 c, d) oder mit Diskus (Bd. VII, Fig. 980 g, h), jede Blüte von einem schuppenförmigen Tragblatt gestützt . . . . . **Salicaceae.** Bd. III, pag. 12.
55. Fruchtstand länglich-eiförmig, fleischig. Staubblätter 4. Blütenhüllblätter der weiblichen Blüten

[1]) Hieher gehört auch der im Mittelmeergebiet weitverbreitete Johannisbrotbaum (Ceratonia Siliqua L.) mit eingeschlechtigen Blüten und lederiger Bruchfrucht (s. Bd. IV/3, pag. 1132).

zur Reifezeit fleischig und zusammenschließend, eine Scheinfrucht bildend. . . . . **Moraceae**, Gattung **Morus**. Bd. III, pag. 127.

55*. Fruchtstand niemals fleischig. Frucht nussig, einsamig, öfters geflügelt (Taf. 84, Fig. 3d; Taf. 85, Fig. 1c). . . . . **Betulaceae** (z. T.). Bd. III, pag. 65 (66).

56. Weibliche Blüten einzeln oder zu 2 bis 5, von einer bleibenden, ring- oder becherförmigen, mitunter mit Dornen versehenen Hülle (cupula) umgeben (VII, Fig. 980f, 1050) **Fagaceae**. Bd. III, pag. 94.

56*. Frucht von einer häutigen, 3-lappigen, an der Spitze unregelmäßig zerschlitzten oder sackförmigen Hülle umgeben . . **Betulaceae** (z. T.). Bd. III, pag. 65 (66).

57. Männliche und weibliche Blüten im Innern eines birnförmigen, fleischigen Behälters (Rezeptakel) eingeschlossen. **Moraceae**, Gattung **Ficus**. Bd. III, pag. 125.

57*. Blüten frei, zwitterig oder eingeschlechtig, weder in Kätzchen noch in Rezeptakeln. Laubblätter meist einfach. . . . . 58.

58. Nebenblätter vorhanden, frühzeitig abfallend. Frucht eine breitgeflügelte Nuß (Bd. III, Fig. 495l, n) oder eine Steinfrucht (Fig. 497k, l). Blütenhülle 4- bis 8-blätterig (Taf. 86, Fig. 3b, 4b). Staubblätter meist 4 bis 8. Laubblätter meist rauh, oft am Grunde ungleichhälftig (Bd. VII, Fig. 981). **Ulmaceae**. Bd. III, pag. 117.

58*. (vgl. auch 58**). Nebenblätter öfters vorhanden Bd. IV/1, Fig. 724e, f). Blüten groß. Blütenhüllblätter 9 bis viele, korollinisch. Staubblätter und Fruchtknoten meist zahlreich, letztere an der verlängerten Blütenachse gewöhnlich schraubig angeordnet. Früchte oft zu zapfenartigen Sammelfrüchten vereinigt (Bd. VII S. 175, Fig. 1218). Zierbäume. **Magnoliaceae**. Bd. IV/1, pag. 13.

58**. Nebenblätter fehlend. Früchte nie geflügelt und nicht zu Sammelfrüchten vereinigt. Laubblätter zuweilen immergrün. . . . . 59.

59. Perianth (genauer Achsenbecher mit Kelchblättern) strahlig, meist röhrenförmig verlängert und blumenblattartig gefärbt. Blüten zwitterig oder vielehig. Staubblätter 8, kurz gestielt, dem Achsenbecher eingefügt (Taf. 187, Fig. 3b und 4a; Bd. VII, Fig. 982) . . . . . **Thymelaeaceae**. Bd. V/2, pag. 698 (702).

59* (siehe auch 59**). Perianth strahlig, 4- bis 9-spaltig, am Grunde verwachsen. Blüten 2-häusig. Staubblätter meist 12. Fruchtknoten oberständig. . . . . **Lauraceae**. Bd. IV/1, pag. 10.

59**. Perianth zygomorph, pfeifenkopfähnlich gekrümmt, langröhrig, grünlich-braun. Blüten einzeln oder zu 2 in den Blattachseln. Fruchtknoten unterständig. Sommergrüner, windender Strauch mit großen, herzförmigen Laubblättern. Häufig gezogen. **Aristolochia Sipho** (= A. macrophylla). III, pag. 162; VII S. 130, Fig. 1170).

60. Laubblätter quirlig oder scheinquirlig, d. h. Quirle aus Laubblättern u. blattartigen Nebenblättern gebildet[1]) 61.



Fig. 980. Blüten von Weiden und Kätzchenblütlern. *a* Männliche Blüte von Salix pentandra L. mit Tragblatt u. hinterer Honigdrüse. *b* Die gleiche Blüte, Staubblätter abgeschnitten; die vordere Honigdrüse ist nach vorn geschlagen. *c* Weibliche Blüte von Salix pentandra (*dr* = hintere Drüse). *d* Männliche, *e* weibliche Blüte von Salix alba L. *f* Längsschnitt durch den weibl. Blütenstand von Fagus silvatica L. (*c* = Cupula). *g* Weibl. Blüte von Populus alba L. (*d* = Drüsenbecher) *h* Männliche Blüte von Populus tremula L. *i* Männl. Blüte von Carpinu Betulus L. *k* Männl. Blüte mit Deckschuppe von Corylus Avellana L. *l* Weibliche Blütengruppe von Corylus. *m* Männliche Blüte von Myrica Gale L. *n* Männliche Blüte von Quercus sessiliflora Salisb.

60*. Laubblätter nicht quirlig. . . . . 64.

61. Laubblätter ungeteilt. Blüten meist zwitterig. Fruchtknoten unterständig. . . 62.

61*. Laubblätter geteilt. Blüten meist 1-häusig. Wasserpflanzen. . . . . 63.

62. Blütenhülle deutlich, 3- bis 6-spaltig. Staubblätter 4 oder 5 (selten 3), der Kronröhre angeheftet (VII, Fig. 983). Fruchtknoten 2-knöpfig, oft in 2 Nüsse zerfallend. **Rubiaceae**. Bd. VI/1, pag. 196.

[1]) Quirlig oder scheinquirlig angeordnete Laubblätter kommen gelegentlich auch bei Primulaceae (Lysimachia), Elatinaceae, Hypericaceae und Caryophyllaceae (Spergula) vor.

62*. Blüten sehr klein, einzeln in den Blattachseln. Staubblatt 1 (Bd. V/2, Fig. 2279d). Frucht steinfruchtartig, 1-samig. Wasserpflanze . . . . . **Hippuridaceae.** Bd. V/2, pag. 905.

63. Untergetauchte Laubblätter kammförmig-fiederteilig, schlaff. Blüten einzeln oder zu kleinen Trugdöldchen in den Achseln von Tragblättern zu einer aus dem Wasser herausragenden, unterbrochenen Ähre vereinigt (Bd. V/2, Fig. 2275). Fruchtknoten unterständig **Halorrhagidaceae** (z. T.), Gattung **Myriophyllum.** Bd. V/2, pag. 896.

63*. Laubblätter wiederholt gabelspaltig (Bd. III, Fig. 631), meist starr. Blüten einzeln in den Blattachseln. Fruchtknoten oberständig. Frucht nussig, langgeschnäbelt (Taf. 110, Fig. 1b). **Ceratophyllaceae.** Bd. III, pag. 449.

64. Wasserpflanzen (zuweilen auch im Uferschlamm wachsend). . . . 65.

64*. Landpflanzen oder am Ufer wachsende Pflanzen . . . . . 67.

65. Laubblätter gegenständig. Blüten unscheinbar, einzeln in den Blattachseln. . . . . 66.

65*. Laubblätter wechselständig. Blüten in einer zylindrischen Scheintraube. Blütenhülle rosa, 4- bis 5-spaltig. Staubblätter 5. Laubblätter am Grunde mit geschlossener Nebenblattscheide. . . . . **Polygonum amphibium.** Bd. III, pag. 197.

Fig. 981. Asymmetrisches Laubblatt von Ulmus.

66. Laubblätter lineal bis verkehrteiförmig, ohne Nebenblätter. Staubblätter 1 bis 2. Fruchtknoten oberständig, 4-fächerig. Griffel 2 (Bd. V/1, Fig. 1803). Im Wasser oder auf feuchtem Schlamm wachsend . . . . . **Callitrichaceae.** Bd. V/1, pag. 190.

66*. Laubblätter eiförmig, spitz, mit kleinen, warzigen Nebenblättern. Staubblätter 4. Griffel 1. Fruchtknoten unterständig, 4-fächerig (Bd. V/2, Fig. 2192) . . . . . **Oenotheraceae,** Gattung **Ludwigia.** Bd. V/2, pag. 804.

67. Fruchtknoten oberständig (zuweilen in den ausgehöhlten Blütenboden eingesenkt, aber nicht mit ihm verwachsen). . . . . 68.

67*. Fruchtknoten unterständig[1]) oder halbunterständig, d. h. in den ausgehöhlten Blütenboden eingesenkt und mit ihm (wenigstens in seinem unteren Teil) verwachsen (Bd. VII, Fig. 986). . . . . 87.



Fig. 982. Blüte von Daphne, aufgeschnitten.

68. Fruchtknoten 2 bis zahlreich (Bd. VII, Fig. 987). Perigonblätter frei, kronblattartig gefärbt. Staubblätter und Fruchtblätter auf dem kegelförmig gewölbten Blütenboden eingefügt (Bd. VII, Fig. 996a) . . . . . **Ranunculaceae** (z. T.). Bd. III, pag. 451.

68*. Fruchtknoten 1 (bis 3), 1- bis mehrfächerig. . . . . 69.

69. Laubblätter (wenigstens die unteren) gegenständig, mit oder ohne Nebenblätter. . . . 70.

69*. Laubblätter wechselständig oder grundständig, mit oder ohne Nebenblätter. . . . . 78.

70. Laubblätter ohne Nebenblätter. . . . . 71.

70*. Laubblätter mit Nebenblättern . . . . . 75.

71. Pflanzen mit reichlichem Milchsaft, einhäusig, mit Scheinblüten (männliche Blüten [scheinbar Staubblätter] und weibliche Blüte von einem Hüllbecher umgeben). (Bd. VII, Fig. 984c) . . . . . **Euphorbia.** Bd. V/1, pag. 134 (141).

71*. Pflanzen ohne Milchsaft . . . . . 72.

72. Blüten 6-zählig, einzeln in den Blattachseln sitzend. Kelchzähne 12, Staubblätter 6. Pflanze niedergestreckt, an den Knoten wurzelnd . . . . . **Peplis Portula.** Bd. V/2, pag. 749.

72*. Blüten nicht 6-gliederig. . . . . 73.



Fig. 983. Schnitt durch eine Rubiaceen-Blüte.

73. Staubblätter 8. Laubblätter rundlich, schwach buchtig gekerbt. . . . . **Chrysosplenium oppositifolium.** Bd. IV/2, pag. 633.

73*. Staubblätter meist 5 oder 10. . . . . 74.

74. Blüten einzeln in den Achseln der mittlern Laubblätter sitzend. Kelch rötlich petaloid. Stengel dicht beblättert. Halbsukkulente Salzpflanze. **Glaux maritima.** Bd. V/3, pag. 1865.

74*. Blüten klein, unscheinbar, teilweise perigyn, in zuweilen geknäuelten Trugdolden. Meist Schließfrüchte. . . . . **Caryophyllaceae** (z. T.). Bd. III, pag. 271 (436).

[1]) Bei vielen Cactaceae (Bd. V/2, pag. 679) gehen die Kelch- und Kronblätter unmerklich ineinander über.

75. Pflanzen mit Brennhaaren. Laubblätter meist grob gesägt. Blüten eingeschlechtig, einhäusig, in Scheinähren. Blütenhülle 4-teilig (Taf. 88, Fig. 2a). Staubblätter 4. Narbe groß, pinselförmig. . . . . **Urticaceae**, Gattung **Urtica**. Bd. III, pag. 137.

75*. Pflanzen ohne Brennhaare. . . . . 76.

76. Laubblätter (wenigstens teilweise) handförmig 5- bis 7-zählig geteilt, gelappt oder einfach. Blüten zweihäusig. Staubblätter 5. Narben 2 (Bd. III, Fig. 504b, c). Hohe, aufrechte oder windende Pflanzen . **Moraceae** (z. T.). Bd. III, . . . pag. 123 (124).

76*. Laubblätter ungeteilt, ganzrandig bis grobgesägt. . . . . 77.



Fig. 984. *a* Männliche, *b* weibliche Blüte von Mercurialis. *c* Cyathium (Scheinzwitterblüte) von Euphorbia Peplus L.

77. Pflanzen mit weißem Milchsaft und mit zwitterigen Scheinblüten (Bd. VII, Fig. 984c) . **Euphorbiaceae**, Gattung **Euphorbia**. . . . . Bd. V/1, pag. 134 (140).

77*. Pflanzen ohne Milchsaft und mit getrenntgeschlechtigen, zweihäusigen Blüten (VII, Fig. 984a, b). Blüten zu aufrechten, unterbrochenen Scheinähren vereinigt. **Euphorbiaceae**, Gattung **Mercurialis**. Bd. V/1, pag. 126.

78. Laubblätter mit deutlichen Nebenblättern bezw. am Grunde mit umfassender Nebenblattscheide (Bd. III, Fig. 521). . . 79.

78*. Laubblätter ohne Nebenblätter oder letztere klein, warzenförmig. . . . . 80.



Fig. 985. Nebenblattscheide (ochrea) von Polygonum Persicaria L. *e* Blattscheide, *o* Ochrea, *a* Hauptachse, *b* Seitensproß.



Fig. 986. *a* Blüte von Anemone silvestris L. mit oberständigem Fruchtknoten, *b* Blüte von Fuchsia mit unterständigem Fruchtknoten.

79. Laubblätter gefiedert oder fingerförmig-gespalten bezw. gelappt. Nebenblätter dem Blattstiel angewachsen (Bd. IV/2, Fig. 1191). Blütenhülle (Bd. IV/2, Fig. 1185f) 4- oder 8-blätterig (Bd. IV/2, Fig. 1195e) . **Rosaceae**: Gattungen **Sanguisorba**. Bd. IV/2, pag. 935 und **Alchemilla**. . . Bd. IV/2, pag. 943.

79*. Laubblätter meist ungeteilt, mit ganzrandiger, bewimperter oder zerschlitzter, häutiger Nebenblattscheide (Fig. 985 u. 1018). Blütenhüllblätter 3 bis 6. Frucht oft dreikantig. **Polygonaceae**. Bd. III, pag. 165 (166).



Fig. 987. Früchte und Samen von Ranunculaceae. *a* bis *c* von Helleborus foetidus L., von Eranthis hiemalis (L.) Salisb. *e*, *f* von Aquilegia vulgaris L.

80. Blüten einhäusig, mit zwitterigen Scheinblüten (Bd. VII, Fig. 984c). Laubblätter einfach oder handförmig gelappt. mit oder ohne weißem Milchsaft . . . . . **Euphorbiaceae**. Bd. V/1, pag. 113 (125).

80*. Blüten zwitterig oder vielehig. . . . . 81.

81. Laubblätter ungeteilt. . . . . 82.

81*. Laubblätter (wenigstens die untern) geteilt, fiederteilig oder gefiedert. . . . . 86.

82. Perianth röhrenförmig, oft blumenblattartig, mit 4-spaltigem Saum (Bd. VII, Fig. 982). Staubblätter 8, im Schlunde des Perianths befestigt. Griffel 1, sehr kurz. . . . . **Thymelaeaceae** (z. T.). Bd. V/2, pag. 698.

82*. Perianth nicht röhrenförmig[1]) . . . . . 83.

83. Staubblätter und Fruchtblätter 10. Frucht eine 10-furchige, dunkelrote, zuletzt schwarze Beere (Fig. 561). . . . . **Phytolaccaceae.** Bd. III, pag. 266.

83*. Staubblätter 1 bis 5[2]). Frucht meist trocken, öfters Scheinfrüchte. . . . . 84.

84. Blüten zu kurzen, gedrängten, blattwinkelständigen, knäuelförmigen Trugdolden vereinigt. Staubblätter 4, im Knospenzustande eingerollt, beim Aufblühen sich elastisch streckend. Staubfäden quergerippt (Bd. III, Fig. 510b, c). Narbe 1, sprengwedelförmig . . . . . **Urticaceae**, Gattung **Parietaria.** Bd. III, pag. 142.

84*. Blütenstände meist stark verzweigt, rispig oder ährig, seltener knäuelig in den Blattachseln. Narben 1 bis 4, nicht sprengwedelförmig (Taf. 95, Fig. 2a, 2b). Blüten oft von den Vor- und Tragblättern umgeben . . . . . 85.

85. Perianth krautig, grün oder rötlich, selten häutig (dann Laubblätter pfriemlich). Staubblätter am Grunde des Perianths eingefügt . . . . . **Chenopodiaceae.** Bd. III, pag. 210.

85*. Perianth trockenhäutig, weiß, grünlich oder lebhaft gefärbt, 3- bis 5-blätterig. Staubblätter dem Blütenboden eingefügt, oft am Grunde zu einem Ring verwachsen . . . . . **Amarantaceae.** Bd. III, pag. 260.

86. Staubblätter frei, meist 6, davon 4 (mediane) länger, 2 kürzer (Bd. VII, Fig. 1002). Blüten radiär (Bd. VII, Fig. 979b und 1021a). Kelch 4-blätterig . . . **Cruciferae.** Bd. IV, pag. 51.

86*. Staubblätter scheinbar 6 (eigentlich 4), zu 2 Bündeln verwachsen. Blüten (transversal-) zygomorph. Laubblätter mehrfach zusammengesetzt . . . . . **Papaveraceae** (z. T.). Bd. IV/1, pag. 16 (20).

87. Blüten eingeschlechtig, monoezisch, meist rot oder weiß, seltener gelb. Männliche Blüten mit 2- bis 4-blätterigem Perianth und mit zahlreichen Staubblättern. Weibliche Blüten mit 2 bis 5 Perianthblättern und mit meist 3-flügeligem, 2- bis 3- (6-) fächerigem Fruchtknoten (Bd. V/1, Fig. 2102d, e). Laubblätter oft asymmetrisch, mit Nebenblättern. Ausschließlich Zierpflanzen . . . . . **Begoniaceae.** Bd. V/1, pag. 663.



Fig. 988. Zusammengesetztes, fiederschnittiges Laubblatt einer Umbellifere.

87*. Blüten gewöhnlich zwitterig, nur selten eingeschlechtig und dann unscheinbar . . . . . 88.

88. Blüten zu dichten Köpfchen vereinigt, diese am Grunde oft von einer Hülle umgeben . . 89.

88*. Blüten nicht in Köpfen . . . . . 91.

89. Blüten zygomorph. Krone verwachsenblätterig, röhren-, faden- bis zungenförmig . . . 90.

89*. Blüten radiär (VII, Fig. 993a). Kronblätter 5, frei, Griffel 2. Frucht in 2 einsamige Teilfrüchte (Merikarpien) zerfallend (Bd. V/2, Fig. 2309c). **Umbelliferae** (z. T.). Bd. V/2, pag. 926 (1526).

90. Staubblätter 5. Staubbeutel in der Regel zu einer zylindrischen Röhre vereinigt (Bd. III, Fig. 203, 206d), selten frei und dann Blüten unscheinbar. Laubblätter meist wechsel-, seltener gegenständig . . . . . **Compositae.** Bd. VI/1, pag. 394; Bd. VI/2, pag. 135).

90*. Staubblätter 4 (VII, Fig. 1030; Bd. VI/1, Fig. 155c), der Perianth-(Kron-)röhre eingefügt. Laubblätter gegenständig . . . . . **Dipsacaceae.** Bd. VI/1, pag. 279.

91. Staubblätter 1 bis 3. Griffel. Blüten meist klein. Frucht nussig oder steinfruchtartig, 1-samig . . . . . 92.

91*. Staubblätter 4 bis 12 . . . . . 93.

92. Laubblätter gegenständig. Blütenstand meist gabelig-trugdoldig, die Zweige in Wickel endigend . . . . . **Valerianaceae.** Bd. VI/1, pag. 261 (262).

---

[1]) Vgl. auch die Gattung Impatiens (Bd. V/1, pag. 310), bei der von den 3 vorhandenen Kelchblättern das eine gespornte kronblattartig ausgebildet ist.

[2]) Vgl. auch das dioezische Sedum (Rhodiola) roseum mit 4 bis 5 getrennten (statt eines einzigen) Fruchtknoten (Bd. IV/2, Fig. 911b, d).

92*. Laubblätter (bei unseren Arten) wechselständig, schmal. Blütenstand ährig, traubig oder rispig. Blütenhülle trichterförmig-röhrig bis glockenförmig, 5- oder 4-spaltig (Taf. 89, Fig. 2a). Staubblätter der Perianthröhre eingefügt . . . . . **Santalaceae.** Bd. III, pag. 150.

93. Staubblätter 5, frei (VII, Fig. 993a). Blüten in einfachen oder in zusammengesetzten Dolden. Laubblätter selten einfach, meist fiederschnittig, geteilt oder gelappt, am Grunde gewöhnlich mit deutlichen Scheiden (Bd. VII, Fig 988, 994) . . . . . **Umbellifera.** Bd. V/2, pag. 926 (1526).

93*. Staubblätter 2, 4, 6, 8, 10 oder 12. Laubblätter meist ungeteilt . . . . . 94.

94. Staubblätter 8, zuweilen 4, 10 oder 2. Perigonblätter 4 (5). Griffel 2. Kapsel 2-schnäbelig, 1-fächerig. Laubblätter rundlich-nierenförmig . . **Chrysosplenium alternifolium.** Bd. IV/2, pag. 634.

94*. Staubblätter 6 oder 12, frei oder mit dem Griffel verwachsen. Blüten strahlig oder zygomorph. Fruchtknoten und Kapsel 6-fächerig . . . . . **Aristolochiaceae.** Bd. III, pag. 160.



Fig. 989. Sympetale Krone (aufgeschnitten) mit Staubblättern von Phacelia tanacetifolia Benth.

95. Blütenhülle in Kelch und Krone gegliedert. Kronblätter frei, seltener an der Spitze zusammenhängend oder am Grunde mit den Staubblättern verwachsen . . . . . 96.

95*. Kelch und Krone meist vorhanden. Kronblätter wenigstens am Grunde miteinander verwachsen (Bd. VII, Fig 989). . . . . 180.

96. Fruchtknoten halb- oder ganz unterständig . 97.

96*. Fruchtknoten oberständig (Kelch also unterständig), einzeln oder 2 bis viele, miteinander, aber nicht mit dem Blütenboden verwachsen . 112.

97. Bäume oder Sträucher . . . . . 98.

97*. Kräuter oder Stauden . . . . . 103.

98. Staubblätter zahlreich (Bd. VII, Fig. 996b). Kronblätter 5 bis 8 . . . . . 99.

98*. Staubblätter 5 . . . . . 100.



Fig. 990. Schematische Darstellung einer *a* hypogynen (Fruchtknoten oberständig), *b* einer epigynen (Fruchtknoten unterständig) und *c* einer perigynen (Fruchtknoten vom Achsenbecher eingeschlossen) Blüte.

99. Laubblätter mit Nebenblättern, gewöhnlich wechselständig **Rosaceae** (z. T.). Bd. IV/2, pag. 662 (669).

99* (vgl auch 99**). Laubblätter ohne Nebenblätter, meist gegenständig (nur an jungen Sprossen wechselständig), ohne Öldrüsen. Frucht eine apfelgroße, kugelige, mehrfächerige, vielsamige Scheinbeere mit dicklederiger, verholzender Schale . . **Punicaceae.** Bd. V/2, pag. 761.

99**. Laubblätter meist gegenständig, ohne Nebenblätter, mit Öldrüsen, oft durchscheinend punktiert. Pflanzen aromatisch duftend. Früchte verschiedenartig: Beeren (Bd. V/2, Fig. 2183e, f), Kapseln, Stein- oder Schließfrüchte . . **Myrtaceae.** Bd. V/2, pag. 733.

100. Laubblätter gegenständig. Frucht eine Kapsel- oder Steinfrucht . . . . . 101.

100*. Laubblätter wechselständig. Frucht eine Beere oder Steinfrucht . 102.

101. Kelch undeutlich, 4- bis 5-zähnig. Kronblätter und Staubblätter 4 oder 5 (Bd. VII, Fig. 991). Blütenstand doldig oder doldenrispig. Frucht eine Steinfrucht . . . . . **Cornaceae** (z. T.). Bd. V/2, pag. 1538.

Fig. 991. Blütendiagramm von Cornus mas L.

101*. Kelch- und Kronblätter 4 bis 5 (Bd. IV/2, Fig. 978). Staubblätter 20 bis 40. Blütenstand traubig. Blüten stark duftend. Frucht eine Kapsel. Sträucher (VII, Fig. 1224) **Saxifragaceae**, Gattung **Philadelphus.** IV/2, pag. 639.

102. Kelch undeutlich, 5-zähnig. Blütenstand meist doldig. Laubblätter oft wintergrün, lederartig. Zum Teil (unsere Art) Wurzelkletterer . . . . . **Araliaceae.** Bd. V/2, pag. 910.

102*. Kelch-, Kron- und Staubblätter 5, einer glockigen oder becherförmigen Blütenachse eingefügt (Bd. IV/2, Fig. 984h; VII, Fig. 1225). Blüten zu 1 bis 3 oder Blütenstand traubig. Laubblätter sommergrün, handförmig gelappt (Bd. IV/2, Fig. 979). Beeren von dem vertrockneten Kelch gekrönt . . **Saxifragaceae**, Gattung **Ribes.** Bd. IV/2, pag. 641 (645).

103. Wasserpflanzen. Kronblätter 4 . . . . . 104.

103*. Land- oder Sumpfpflanzen. Kronblätter 2 bis 6 . . . . . 105.

104. Pflanze ausdauernd. Untergetauchte Laubblätter kammförmig-fiederteilig. Blüten 1-häusig.

Staubblätter 8. Narben 4, groß (Bd. V/2, Fig. 2275 e), Griffel fehlend . . . . . **Halorrhagidaceae**, Gattung **Myriophyllum**. Bd. V/2, pag. 896.

104*. Einjährige Wasserpflanze mit Schwimmblattrosette. Schwimmblätter mit rautenförmiger Spreite und mit aufgeblasenem Stiel. Blüten zwitterig. Staubblätter 4. Griffel pfriemlich, mit kopfförmiger Narbe. Steinfrucht groß, oft gehörnt, 1-samig . . . . . **Hydrocaryaceae**. Bd. V/2, pag. 882.

105. Griffel 1, fadenförmig (Bd. V/2, Fig. 2598 c) . . 106.

105*. Griffel 2 . . . . . 110.

106. Staubblätter 5 (Bd. VII, Fig. 1035). Krone unterwärts geteilt, oberwärts verwachsen. Blüten zu einem Köpfchen oder zu einer dichtwalzlichen Ähre vereinigt . . . . . **Campanulaceae** (z. T.). Bd. VI/1, pag. 328 (330).

106*. Staubblätter 2 bis 8 (16). Kronblätter frei, nicht verwachsen . . . . . 107.



Fig. 992. Blütendiagramm von Oenothera (links) und von Circaea (rechts).

107. Kronblätter 5, zuweilen etwas ungleichgroß. Kelch meist 2-blätterig bezw. 2-spaltig. Frucht eine 1-fächerige Kapsel bezw. Deckkapsel (Bd. III, Fig. 563 b) mit zentralem, freiem Samenträger. Laubblätter oft fleischig. **Portulacaceae**. Bd. III, pag. 268.

107*. Kronblätter 2, 4, 6 oder 8 . . . . . 108.

108. Kelch- und Kronblätter 2 bis 4, bezw. 2- bis 4-zähnig . 109.

108*. Kronblätter meist 6, seltener 4 oder fehlend. Kelch (Achsenbecher) scheinbar röhrig verlängert, meist 12- oder 8-zähnig (Bd. V/2, Fig. 2166 c). Staubblätter gewöhnlich 12, seltener weniger. Frucht eine Kapsel . . . . . **Lythraceae**. Bd. V/2, pag. 741 (748).



Fig. 993. *a* Blüte, *b* junge Frucht einer Umbellifere.

109. Kronblätter 2 oder 4 . . . . . 110.

109*. Blüten klein, unscheinbar, in kleinen, einfachen Trugdolden; diese von 4 kronblattartigen, weißen oder blaßgelben Hüllblättern umgeben (Scheinblüten). Kron- und Staubblätter 4 (Bd. V/2, Fig. 2598). Steinfrucht eiförmig, rot. **Cornaceae** (z. T.). Bd. V/2, pag. 1538 (1542).

109**. Blüten einzeln, in Trauben oder Ähren. Hüllblätter fehlend. Kelch- und Kronblätter 2 bis 4 (Bd. VII, Fig. 992). Staubblätter 8 (Bd. V/2, Fig. 2243) oder 4, selten nur 2 (Bd. V/2, Fig. 2255 b bis d) oder 1. Frucht eine fachspaltige Kapsel, eine Nuß oder Beere. . . . . **Oenotheraceae**. Bd. V/2, pag. 797 (803).

110. Staubblätter 5 (VII, Fig. 993a). Blütenstand eine einfache oder zusammengesetzte Dolde. Frucht in 2 einsamige Teilfrüchte (Merikarpien) zerfallend (VII, Fig. 993 b). Laubblätter meist 2- bis 3-fach fiederschnittig, seltener einfach. Blattscheide meist deutlich (VII, Fig. 988, 994) . . **Umbelliferae** (z. T.). Bd. V/2, pag. 926 (1526).



Fig. 994. Zusammengesetztes Laubblatt mit Scheide einer Umbellifere.

110*. Staubblätter 10 bis 20. Kronblätter meist 5 . . 111.

111. Staubblätter 10 (selten 5, als gefranste Staminodien ausgebildet). Kapsel von den bleibenden Griffeln 2-hörnig, meist 2-fächerig, vielsamig (Bd. VII, Fig. 1025). . . . . **Saxifragaceae** (z. T.). Bd. IV/2, pag. 562 (654).

111*. Staubblätter 10 bis 20. Früchtchen unter sich frei, in einem hakig-stacheligen Achsenbecher (cupula) eingeschlossen. Blütenstand ährenförmig-traubig oder kurz doldentraubig. Blüten gelb. Laubblätter unterbrochen unpaarig gefiedert . . . . . **Rosaceae** Gattung **Agrimonia**. Bd. IV/2, pag. 930.

112. Fruchtknoten 2 bis viele (jeder mit 1 Griffel und Narbe) oder am Grunde etwas verwachsen (selten durch die Griffel verbunden) . . . . . 113.

112*. Fruchtknoten 1 oder mehrere in einen Fruchtknoten (mit einem oder mehreren Griffeln) verwachsen . . . . . 116.

113. Laubblätter dick und fleischig, flach bis stielrund, nervenlos, ungeteilt, ohne Scheide und ohne Nebenblätter. Blüten strahlig. Kronblätter 5 oder 4 (VII, Fig. 995) oder 6 bis 20. Staubblätter

10 bis 20, selten 5 oder 4. Fruchtblätter meist soviele wie Kronblätter. Balgkapseln auf der Innenseite aufspringend (Bd. IV/2, Fig. 924n). **Crassulaceae.** Bd. IV/2, pag. 511 (514).

113*. Laubblätter nicht fleischig . . . . . 114.

114. Baum mit unpaarig gefiederten Laubblättern und reichverzweigten Blütenrispen. Blüten zwitterig oder eingeschlechtig, gelblich. Staubblätter 5 oder 10. Fruchtblätter frei oder nur durch die Griffel verbunden. Teilfrüchte frei, beidseitig geflügelt (Bd. V/1, Fig. 1717). Gepflanzt oder verwildert . **Ailanthus glandulosa.** Bd. V/1, pag. 81.

114*. Laubblätter nicht gefiedert. Staubblätter oft zahlreich . . . . 115.



Fig. 995. Blüte von Sedum.

115. Perianth-(Kelch-)blätter getrennt, frei, oft kronblattartig. Staubblätter dem Blütenboden eingefügt (Bd. VII, Fig. 996a). Laubblätter ohne eigentliche Nebenblätter, meist mit Scheiden **Ranunculaceae** (z. T.). Bd. III, pag. 451 (453).

115*. Kelchblätter am Grunde verwachsen, zuweilen mit Außenkelch und dann der Kelch 10-zipfelig (Bd. VII, Fig. 1017). Staubblätter am innern Rande des Achsenbechers sitzend (Bd. VII, Fig. 996b). Nebenblätter meist vorhanden . . . **Rosaceae** (z. T.). Bd. IV/2, pag. 662 (669).

116. Krone zygomorph (Fig. 997a) . . . . . 117.

116*. Krone strahlig (radiär, aktinomorph; VII, Fig. 997b) 127.

117. Blütenhüllblätter z. T. mit Sporn (Bd. VII, Fig. 998) oder Höcker . . . . . 118.

117*. Blütenhüllblätter ohne Sporn und Höcker. . . 122.



Fig. 996. Längsschnitt durch die Blüte einer Ranunculacee (*a*) und einer Rosacee (*b*).

118. Staubblätter zahlreich (mehr als 5). Perianthblätter kronblattartig, das obere in einen langen, hohlen Sporn verlängert. Honig-(Kron-)blätter z. T. gespornt. Früchte mehrsamige Balgkapseln . . . . . **Ranunculaceae**, Gattung **Delphinium.** Bd. III, pag. 485.

118*. Staubblätter 5 bis 8 . . . . . 119.



Fig. 997. *a* Zygomorphe Blüte, *b* strahlige Blüte.

119. Laubblätter schildförmig, fingernervig, meist lang gestielt. Blüten einzeln, blattwinkelständig. Staubblätter 8. Fruchtknoten 3-knotig. Zierpflanzen . . . . . **Tropaeolaceae.** Bd. IV/3, pag. 1726.

119*. Laubblätter nicht schildförmig . . . . . 120.

120. Staubblätter 6 (eigentlich 4), in 2 Bündel verwachsen. Kelchblätter 2 oder fehlend, frühzeitig abfallend. Blüten quer zygomorph, in Trauben. Von den 2 äußeren Kronblättern beide oder eines lang gespornt (Bd. VII, Fig. 998), die beiden inneren kleiner. Frucht eine Kapsel oder Nuß. Laubblätter fiederteilig. . . . **Papaveraceae** (Corydalis, Fumaria, Dicentra). Bd. IV/1, pag. 16 (20).

120*. Staubblätter 5; Staubbeutel oft zusammenhängend. Laubblätter ungeteilt . . . . . 121.

121. Kelchblätter 5, grün, am Grunde mit krautigen Anhängseln. Kronblätter 5, das untere meist größer und gespornt (Bd. V/1, Fig. 2047a). Kapsel 1-fächerig. Laubblätter mit Nebenblätter (Bd. VII, Fig. 999). . . . . **Violaceae.** Bd. V/1, pag. 585.

121*. Kelchblätter 3, gefärbt, das hintere viel größer und gespornt. Kronblätter 5, das vordere groß. Kapsel 5-fächerig. Laubblätter ohne Nebenblätter, an deren Stelle zuweilen Nektarien (Bd. V/1, Fig. 1876g bis i) . . . . . **Balsaminaceae.** Bd. V/1, pag. 309.

Fig. 998. Gespornte Blüte mit Tragblatt von Corydalis solida (Mill.) Sw.

122. Staubblätter verschiedenartig miteinander verwachsen . . . 123.

122*. Staubblätter frei . . . . . 124.

123. Krone (bei unseren Arten) schmetterlingsförmig, d. h. aus einem oberen, unpaaren, größeren Blatt („Fahne"), 2 seitlichen Blättern („Flügel") und 2 unteren, verwachsenen Blättern („Schiffchen") bestehend (Bd. VII, Fig. 1000, 1001). Kelch verwachsen. Staubblätter 10, alle zu einer Röhre verwachsen oder das obere frei (Bd. IV/3, Fig. 1279e, f), Frucht eine trockene, seltener fleischige oder nußartige Kapsel („Hülse"). Nebenblätter meist vorhanden . . . . . **Leguminosae.** Bd. IV/3, pag. 1113 (1133 und 1639).

123*. Krone aus einem größeren, kahnförmigen mit Anhängseln versehenen „Kamm" und 2 kleineren Blättern gebildet (Bd. V/1, Fig. 1728b). Kelchblätter 5, getrennt, die 2 seitlichen größer, meist kronblattartig gefärbt („Flügel"). Staubblätter 8, oben zu je 4 in 2 Bündel

vereinigt oder frei. Blüten meist in Trauben oder Ähren. Frucht eine zuweilen geflügelte Kapsel (Bd. V/1, Fig. 1724 d) . . . . . **Polygalaceae.** Bd. V/1, pag. 86.

124. Staubblätter 6, 4 längere und 2 kürzere (VII, Fig. 1002). Kelch- und Kronblätter 4 (VII, Fig. 1021 a). **Cruciferae** (z.T.). Bd. IV/1, pag. 51 (477).

124*. Staubblätter 7 bis viele . . . . . 125.

125. Staubblätter 11 bis 40, einer unterweibigen, nach oben verbreiterten Scheibe eingefügt (Bd. IV/1, Fig. 888 b). Kronblätter 4 bis 8, alle oder teilweise zerschlitzt. Blüten in Ähren oder Trauben. Frucht eine oben offene, einfächerige Kapsel (Bd. IV/1, Fig. 888 n). **Resedaceae.** Bd. IV/1, pag. 482.

125*. Staubblätter 7 bis 10. Kronblätter nicht zerschlitzt, etwas ungleich 126.

126. Staude mit wechselständigen, unpaarig gefiederten, anscheinend punktierten Laubblättern, oberwärts drüsig. Staubblätter 10, nach vorn gebogen (Bd. VII, Fig. 1003; Bd. V/1, Fig. 1715 c, d). Frucht in 5 geschnäbelte, mehrsamige Teilfrüchte zerfallend (Bd. V/1, Fig. 1715 e) . . . . . **Rutaceae,** Gattung **Dictamnus.** Bd. V/1, pag. 74.

126*. Bäume mit gegenständigen, 5- bis 9-zählig gefingerten Laubblättern. Staubblätter 7 bis 8 (VII, Fig. 1004). Frucht eine fachspaltige, 1-, seltener 2- oder 3-fächerige, glatte oder stachelige Kapsel. Samen groß, mit derber Haut. Angepflanzt. **Hippocastanaceae.** Bd. V/1, pag. 296.

Fig. 999. Gartenstiefmütterchen. (Viola). Laubblättermit 2 fiederteiligen Nebenblättern.

127. Holzpflanzen . . . . . 128.

127*. Kräuter oder Stauden . . . . . 149.

128. Mit (Wickel-)Ranken kletternde Sträucher. Blüten klein, grünlich. Kronblätter zuweilen oben verbunden, als Haube vom Blütenboden sich loslösend (Bd. VII, Fig. 1005). Frucht eine Beere. Laubblätter gelappt oder gefingert . . . . . **Vitaceae.** Bd. V/1, pag. 350.

128*. Nichtkletternde Holzpflanzen . . . . . 129.

129. Wintergrüne Sträucher mit linealen Laubblättern . 130.

129*. Sommergrüne Bäume oder Sträucher . . . . . 131.

130. Laubblätter nadelförmig, erikoid, auf der Unterseite mit tiefer Längsfurche (Bd. V/3, Fig. 2627 h). Blüten unscheinbar, meist einzeln in den Blattachseln, gewöhnlich 2-häusig. Kelch und Krone 3-blätterig, dunkelrot. Staubblätter 3. Frucht eine kugelige, schwarzglänzende Steinbeere mit 6 bis 9 einsamigen Steinkernen . **Empetraceae.** Bd. V/3, pag. 1602.



Fig. 1000. Blütendiagramme. *e* von Laburnum, *f* von Vicia Faba L.

130*. Laubblätter lanzettlich, unterseits dicht rotbraun, filzig. Blütenstand doldentraubig. Blüten zwitterig. Krone 5- (selten 4-)blätterig, weiß, sternförmig ausgebreitet. Kapsel 5-klappig aufspringend, scheidewandspaltig . . . . . **Ericaceae**[1]), Gattung **Ledum.** Bd. V/3, pag. 1623.

131. Laubblätter sehr klein, schuppen- oder nadelförmig, 1-nervig (Bd. V/1, Fig. 2022 b). Blüten in einfachen oder rispig verzweigten Trauben. Staubblätter meist 10 (Bd. VII, Fig. 1006), ungleich lang und miteinander ± verwachsen (Bd. V/1, Fig. 2023 d). Kapsel fachspaltig, 3-klappig aufspringend (Bd. V/1, Fig. 2023 i). Samen mit Haarschopf (Bd. V/1, Fig. 2023 k) **Tamaricaceae.** Bd. V/1, pag. 544.



Fig. 1001. Blütenteile der Leguminosen. *a* Blüte (von der Seite) von Laburnum. *b* Fahne. *c* Flügel. *d* Schiffchen. *e* Staubfadenröhre (alle Staubblätter verwachsen). *f* Blüte von Lathyrus vernus. *g* Staubfadenröhre (9 Staubblätter verwachsen, 1 Staubblatt frei.)

131*. Laubblätter größer, mehrnervig, einfach oder zusammengesetzt . . . . . 132.

132. Laubblätter einfach, ganzrandig, gesägt oder gelappt 133.

132*. Laubblätter zusammengesetzt, gefiedert oder gedreit 143.

133. Staubblätter zahlreich (bis 80), mehr als 5 (Bd. V/1, Fig. 2045 b) . . . . . 134.

133*. Staubblätter 4 bis 8 . . . . . 138.

134. Laubblätter nadelförmig, lanzettlich bis eiförmig. Kelchblätter 5, die 2 äußeren oft kleiner (Bd. V/1, Fig. 2033 d) oder fehlend. Kronblätter hinfällig. Fruchtknoten meist 1-fächerig (VII, Fig. 1007). Kapsel vielsamig (V/1, Fig. 2028 h). **Cistaceae** (z. T.). V/1, pag. 552 (553).

[1]) Auch andere Ericaceae (z. B. Oxycoccus) besitzen eine scheinbar freiblätterige Krone.

134*. Laubblätter breiter . . . . . 135.

135. Kelch mit 6 bis 7 Außenkelchblättern. Staubblätter in ein Bündel vereinigt. Griffel 5. Kronblätter 5, rosarot, weiß, am Grunde öfters dunkel gefleckt. Laubblätter meist 3-lappig. Frucht eine vielsamige, fachspaltige Kapsel (Bd. V/1, Fig. 1969 e). Verbreiteter Zierstrauch, Herbstblütler . . . . **Hibiscus Syriacus.** Bd. V/1, pag. 459.

135*. Kelch ohne Außenhüllblätter. Staubblätter frei . . . . . 136.

136. Kelchblätter 4 oder 5 bezw. Kelch 5-spaltig. Kronblätter 5 . . . . . 137.

136*. Blütenhüllblätter groß, meist zahlreich, zum großen Teil korollinisch und nicht scharf in Kelch und Krone geschieden. Fruchtknoten meist zahlreich, oft an der verlängerten Blütenachse schraubig angeordnet. Früchte zuweilen zu zapfenartigen Sammelfrüchten vereinigt (Bd. VII S. 175, Fig. 1218) . . . . . **Magnoliaceae** (Magnolia, Liriodendron). Bd. IV/1, pag. 13.

137. Staubblätter frei. Frucht eine 1-fächerige Kapsel oder 1- bis 2-samige Nuß, Blütenstand (bei unsern Arten) geflügelt . . **Tiliaceae.** Bd. V/1, pag. 426.

137*. Staubblätter dem Innenrande des Achsenbechers eingefügt (Bd. VII, Fig. 996 b). Steinfrüchte . . . . **Rosaceae.** Bd. IV/2, pag. 662 (669).

138. Blüten klein, einhäusig, in kugeligen, hängenden Köpfchen. Kelch- und Kronblätter 3 bis 8. Früchtchen nussig, am Grunde mit Haarschopf (Bd. IV/2, Fig. 994 m), zu einer Sammelfrucht vereinigt. Bäume mit sich ablösender Schuppenborke. Laubblätter 3- bis 7-lappig, fingernervig, mit verwachsenen Nebenblättern . . . . . **Platanaceae.** Bd. IV/2, pag. 657.



Fig. 1002. Staubblätter und Fruchtknoten einer Crucifere.

138*. Blüten nicht zu kugeligen Köpfchen vereinigt . . . . . 139.

139. Kelch-, Kron- und Staubblätter je 6 (Bd. VII, Fig. 1008). Blüten gelb. Blütenstand traubig hängend. Staubfäden reizbar. Frucht eine längliche, rote Beere. Dornige Sträucher . . . . . **Berberidaceae,** Gattung **Berberis** (z. T.). Bd. IV/1, pag. 6.

139*. Staubblätter 4 bis 8. Kelch- und Kronblätter 4 oder 5. Blüten oft mit Diskus . . . . . 140.

140. Frucht meist in 2 geflügelte, 1-samige, trockene Teilfrüchte zerfallend. Griffel in 2 Narbenäste gespalten (Bd. V/1, Fig. 1862 d). Staubblätter 8 (Bd. VII, Fig. 1009), einem Drüsenring eingefügt (Bd. V/1, Fig. 1848 d, e). Laubblätter gegenständig, meist ± tief gelappt, seltener ungeteilt . . . **Aceraceae.** Bd. V/1, pag. 262.



Fig. 1003. Blüte von Dictamnus alba L. *a* Tragblatt. v_1, v_2 Vorblätter.

140*. Frucht nicht geflügelt. Staubblätter 4 bis 5 . . . . . 141.

141. Blütenstiele zuletzt perückenartig verlängert. Griffel 3. Laubblätter oval, ganzrandig . . . **Cotinus Coggygria.** Bd. V/1, pag. 226.

141*. Frucht eine Steinfrucht oder Kapsel . . . . . 142.

142. Staubblätter vor den Kronblättern stehend (VII, Fig. 1010; Bd. V/1, 1884 d und 1900 e). Griffel einfach oder 2- bis 5-spaltig. Frucht eine saftige oder trockene Steinfrucht oder Kapsel . . . . **Rhamnaceae.** Bd. V/1, pag. 320 (326).

142*. Staubblätter zwischen den Kronblättern stehend, einem polsterförmigen Diskus eingefügt (Bd. VII, Fig. 1011). Griffel einfach, Frucht meist eine klappig aufspringende Kapsel. Samen oft von einem lebhaft gefärbten Samenmantel umgeben. . . . . **Celastraceae.** Bd. V/1, pag. 243.

Fig. 1004. Diagramm von Aesculus Hippocastanum L.

Fig. 1005. Blüte von Vitis vinifera L. *a* Staubblätter. *b* Kronblätter.

143. Staubblätter 2 bis 5, selten 10 . . . . . 144.

143*. Staubblätter zahlreich, meist mehr als 10 . . . . 148.

144. Staubblätter 2. Kronblätter meist 4 (Bd. V/3, Fig. 2910 b). Frucht ein geflügeltes, 1-samiges Nüßchen . . . . . **Oleaceae,** Gattung **Fraxinus** (z. T.). Bd. V/3, pag. 1919.

144*. Staubblätter gewöhnlich 5 oder 6 . . . . . 145.

145. Staubblätter 6. Laubblätter lederartig, dornig gezähnt. Blüten in rispenartig zusammengedrängten Trauben. Beeren kugelig, blau, bereift . . . . . **Berberidaceae,** Gattung **Berberis** (z. T.). Bd. IV/1, pag. 6.

145*. Staubblätter meist 5. Laubblätter sommergrün . . . . . 146.

146. Frucht meist eine aufgeblasene, dünnhäutige, 2- bis 3-fächerige Kapsel. Griffel 2 bis 3, frei oder oben verbunden (Bd. V/1, Fig. 1837 g). Blüten oft in hängenden Trauben. Laubblätter (bei Staphylea) gegenständig . . . . . **Staphyleaceae.** Bd. V/1, pag. 256.

146*. Frucht eine Steinfrucht oder aus geflügelten Teilfrüchten gebildet. Blüten klein, zu reich verzweigten Rispen vereinigt. Laubblätter wechselständig . . . . . 147.

147. Teilfrüchte frei, beiderseitig geflügelt (Bd. V/1, Fig. 1717 d), Samen in der Mitte liegend . . . . . **Ailanthus glandulosa.** Bd. V/1, pag. 81.

147*. Steinfrüchte kugelig oder zusammengedrückt. Griffel 3 (Bd. V/1, Fig. 1818 e) . . . . . **Anacardiaceae,** Gattung **Rhus.** Bd. V/1, pag. 218.

148. Staubblätter dem Rande des Blütenbechers eingefügt (Bd. VII, Fig. 996 b) . . . . . **Rosaceae** (z. T.). Bd. IV/2, pag. 662 (669).

148*. Staubblätter meist mehr als 10, frei oder ± verbunden (Bd. IV/3, Fig. 1290 c, d). Früchte: Hülsen, zuweilen Bruchfrüchte oder trockene Schließfrüchte. Laubblätter z.T. mit blattartig verbreiteten Stielen (Phyllodien). **Leguminosae,** Unterfamilie **Mimosoideae.** Bd. IV/3, pag. 1113 (1114, 1123).

Fig. 1006. Blütendiagramm von Myricaria Germanica (L.) Desv.

Fig. 1007. Blütendiagramm von Helianthemum.

149. Pflanze weißlichgelb oder blaßrötlich (ohne Chlorophyll). Stengelblätter schuppenförmig. Kelch und Krone 4- bis 5-zählig (VII, Fig. 1012). Staubblätter 8 oder 10 (Bd. V/3, Fig. 2626 k, l). Blütentrauben anfangs nickend, später aufrecht . . . . . **Pirolaceae,** Gattung **Monotropa.** Bd. V/3, pag. 1596.

149*. Pflanzen mit Blattgrün . . . . . 150.

150. Wurzellose, schwimmende Wasserpflanze. Laubblätter dicht quirlständig, mit 4 bis 6 pfriemenförmigen Borsten und mit rundlich-nierenförmiger Spreite (Bd. IV/2, Fig. 896 a). Blüten selten vorhanden. **Aldrovanda vesiculosa.** Bd. IV/2, pag. 506.



Fig. 1008. Blütendiagramm von Berberis vulgaris L.

Fig. 1009. Blütendiagramm v. Acer Pseudoplatanus L.

150*. Bewurzelte Pflanzen . . . . . 151.

151. Staubblätter 10 bis viele (Bd. V/1, Fig. 2011 a) . 152.

151*. Staubblätter 2 bis 10 (12) . . . . . 158.

152. Staubblätter unter sich ± verwachsen (Bd. VII, Fig. 1013 b, 1015 b) . . . . . 153.

152*. Staubblätter frei . . . . . 154.

153. Staubblätter unten zu einer Röhre verbunden (Bd. VII, Fig. 1013 a). Laubblätter wechselständig, handförmig-gelappt bis geteilt, fingernervig. Früchte in zahlreiche, 1-samige Teilfrüchte zerfallend (Bd. VII, Fig. 1015 a; Bd. V/1, Fig. 1977 f) oder kapselig aufspringend (Bd. V/1, Fig. 1968 a). Kelch meist mit Außenkelch (Bd. VII, Fig. 1014). . . . **Malvaceae.** Bd. V/1, pag. 453.



Fig. 1010. Blüte (aufgeschnitten) und Diagramm von einer Rhamnacee.

153*. Staubblätter am Grunde in 3 (Bd. VII, Fig. 1015 b) oder 5 Bündel vereinigt (Taf. 183, Fig. 4 a). Laubblätter gegen- bezw. quirlständig, oft durchscheinend punktiert (Bd. V/1, Fig. 1996 a), ungeteilt, ganzrandig. Frucht eine 3-fächerige, vielsamige Kapsel (Taf. 183, Fig. 4 b und 5 c) oder Beere. **Hypericaceae.** Bd. V/1, pag. 498.

154. Kelch 2-blätterig, meist hinfällig. Kräuter oder Stauden mit Milchsaft. Frucht eine schotenförmige (Bd. IV/1, Fig. 728) oder unvollkommene, 4- bis 18-fächerige Kapsel (Fig. 734 c, d, f). **Papaveraceae** (z.T.). Bd. IV/1, pag. 16 (20).

Fig. 1011. Blüte von oben und im Längsschnitt von Evonymus (*d* = Diskus).

154*. Kelchblätter 4 bis 5 . . . . . 155.

155. Wasserpflanzen mit (bei unseren Arten) grundständigen, langgestielten, großen, kreisrundlich-eiförmigen Schwimmblättern und kriechender Grundachse (Bd. VII, Fig. 1097). Blüten groß, weiß oder gelb. Kronblätter zahlreich, allmählich in die Staubblätter übergehend. Fruchtknoten vielfächerig mit schildförmiger, strahliger Narbe (Taf. 109; Bd. III, Fig. 626 r). . . . . **Nymphaeaceae.** Bd. III, pag. 338.

155*. Landpflanzen . . . . . 156.

156. Staubblätter der schüsselförmigen, flachen oder gewölbten Blütenachse eingefügt (Bd. VII, Fig. 996 b, S. 100 Fig. 1129). Früchtchen oft zahlreich. Kelch zuweilen mit Außenkelch

(Fig. 1017). Laubblätter meist geteilt (fiederschnittig), gefingert oder gefiedert . . . . . **Rosaceae** (z. T.). Bd. IV/2, pag. 662 (669).

156*. Staubblätter dem Blütenboden eingefügt. Fruchtknoten ganz oder doch teilweise verwachsen . . . . . 157.

157. Laubblätter ungeteilt, lanzettlich. Frucht eine lederige, 1-fächerige, vielsamige, 3-klappig aufspringende Kapsel (Bd. V/1, Fig. 2028 g, h). **Cistaceae** (z. T.). Bd. V/1, pag. 552 (553).

157*. Laubblätter fiederteilig oder 1- bis 2-fach gefiedert. Teilfrüchte ganz oder doch unten verwachsen (Taf. 112, Fig. 2 b und Bd. III, Fig. 644 i) oder Frucht eine Beere. **Ranunculaceae** . . . Gattungen **Nigella** (Bd. III, pag. 474) . . . . . und **Actaea** (Bd. III, pag. 477).



Fig. 1012. Blütendiagramme (*k* einer Endblüte, *l* einer Seitenblüte) von Monotropa Hypopitys L.

158. Laubblätter wechselständig, mit ganzrandiger, bewimperter oder geschlitzter, häutiger Nebenblattscheide (Bd. VII, Fig. 985, 1018, 1211). Frucht oft 3-kantig. **Polygonaceae**. Bd. III, pag. 165 (166).

158*. Laubblätter ohne Nebenblattscheide . . . 159.

159. Laubblätter einfach, ungeteilt . . . . . 160.

159*. Laubblätter handförmig-gelappt bis geteilt oder zusammengesetzt . . . . . 173.

160. Kelch verwachsenblätterig. Laubblätter ganzrandig. 161.

160*. Kelch getrenntblätterig oder doch die Kelchblätter nur ganz am Grunde verwachsen . . . . . 164.

161. Kelch 2-spaltig, die beiden Zipfel zur Fruchtreife abfallend. Frucht eine 1-fächerige Kapsel bezw. Deckelkapsel mit zentralem Samenträger. Laubblätter oft ± fleischig . **Portulacaceae** (z. T.). Bd. III, pag. 268.

161*. Kelch 5- bis 12-zähnig . . . . . 162.

162. Griffel 1. Kronblätter meist 6, dem obersten Rande der Kelchröhre eingefügt. Staubblätter meist 12 . . . . . **Lythraceae**. Bd. V/2, pag. 741 (748).

Fig. 1013. *a* Staubfadenröhre mit Griffel von Malva. *b* Staubblattbündel von Hypericum.

162*. Griffel 2 bis 5 (selten mehr). Kronblätter 5. Staubblätter 5 oder 10 . . . . . 163.

163. Staubblätter meist 10. Griffel 2 bis 5 (III, Fig. 576 m, p), ausnahmsweise 6 oder 7. Kronblätter oft genagelt (VII, Fig. 1019) und mit Krönchen (Taf. 100, Fig. 3 a). Frucht eine Kapsel, Schließfrucht oder selten eine Beere. Laubblätter gegenständig. **Caryophyllaceae** (z. T.). Bd. III, pag. 271 (436).

163*. Staubblätter 5, vor den 5 (seltener 4) Kronblättern stehend. Kelch meist trockenhäutig und mit Grannen (VII, Fig. 1047). Griffel 5 (Taf. 213, Fig. 2 b). Laubblätter grundständig. **Plumbaginaceae**. Bd. V/3, pag. 1877 (1879).



Fig. 1014. Blüten mit Außenkelch. *a* Malva, *b* Althaea.

164. Staubblätter (Bd. VII, Fig. 1002) 6 (4 längere u. 2 kürzere), seltener nur 4 oder 2. Kelch- und Kronblätter 4 (Fig. 1021), letztere meist genagelt (Taf. 125, Fig. 1 bis 6). Blüten in meist tragblattlosen Trauben. Frucht 2-fächerig, kapselig (Schote oder Schötchen), 1- bis mehrsamig, seltener eine Bruch- oder Schließfrucht. Laubblätter fast stets wechselständig . . . . **Cruciferae** (z. T.). Bd. IV/1, pag. 51 (477).



Fig. 1015. *a* Sammelfrucht von Malva. *b* Blüte von Hypericum.

164*. Staubblätter gleichlang, 2 bis 10 . . . 165.

165. Laubblätter gegenständig . . . . . 166.

165*. Laubblätter wechselständig oder grundständig . . . . . 169.

166. Staubblätter am Grunde miteinander verwachsen. Kapsel scheinbar 10-fächerig (Bd. VII, Fig. 1022 und 1023). Blütenstand gabelig-wickelig . . **Linaceae** (z. T.). Bd. V/1, pag. 1 (2).

166*. Staubblätter frei . . . . . 167.

167. Fruchtknoten 1-fächerig . . . . . 168.

167*. Fruchtknoten 3- bis 4-fächerig (Bd. V/1, Fig. 2018 e). Kelchblätter 2 bis 4. Kronblätter 3 oder 4 (Bd. V/1, Fig. 2017 g, h). Nebenblätter klein. Unscheinbare, meist am oder im Wasser wachsende Pflanzen mit blattachselständigen Blüten . . **Elatinaceae.** Bd. V/1, pag. 535.

168. Kronblätter 5 oder 6, am Grunde kurz verbunden, goldgelb. Kelch einseitig aufgeschlitzt. Staubblätter 5, frei. Griffel 1. Narbe 2-lappig. Frucht eine 1-fächerige, vielsamige, 2-klappig aufspringende Kapsel . . . . . **Gentiana lutea.** Bd. V/3, pag. 1988.

168* (vgl. auch 168**). Kronblätter am Grunde kurz verbunden, bei unsern Arten goldgelb. Staubblätter 5 (bis 7), mit der Krone ± verbunden (Bd. V/3, Fig. 2861 d). Griffel 1. Kapsel meist an der Spitze mit 5 Klappen aufspringend (Bd. V/3, Fig. 2863 b) . . . . . **Primulaceae,** Gattung **Lysimachia.** Bd. V/3, pag. 1850.

168**. Kronblätter am Grunde frei, nicht goldgelb. Blütenstand gabelig-wickelig bis geknäuelt. Blüten oft klein, unscheinbar. Griffel 2 bis 5. Nebenblätter vorhanden oder fehlend . . . . . 169.

169. Laubblätter in grundständiger Rosette, am Rande und oberseits mit langen, roten Drüsenhaaren besetzt. Blütenstand scheintraubig. Kapsel vielsamig . . . **Droseraceae** (z. T.). Bd. IV/2, pag. 497 (498).

169*. Laubblätter ohne Drüsenhaare, zum großen Teil wechselständig . 170.

170. Staubblätter 8 bis 10 (Bd. VII, Fig. 1022), am Grunde untereinander verwachsen, oft ungleich lang. Griffel 4 oder 5. Kapsel scheinbar 10-fächerig (Bd. VII, Fig. 1023). Blütenstand gabelig-wickelig. . . . . **Linaceae** (z. T.). Bd. V/1, pag. 1 (2).

170*. Staubblätter frei . . . . . 171.



Fig. 1016. Frucht (Porenkapsel) von Papaver.

171. Narben 3, sehr klein, sitzend. Frucht eine 1-samige Schließfrucht. Laubblätter mit häutigen Nebenblättern . . . . . **Corrigiola litoralis.** Bd. III, pag. 427.

171*. Griffel 1, 2 oder fehlend und dann 4 sitzende Narben. Frucht eine Kapsel. Nebenblätter fehlend . . . 172.

172. Staubblätter 8 bis 10, alle fruchtbar. Griffel 1, mit einfacher oder gelappter Narbe. Staubbeutel oft mit Gipfelporen (Bd. V/3, Fig. 2606 a bis c). Kapsel 4- bis 5-fächerig (Bd. VII, Fig. 1024). Laubblätter wintergrün, oft ± lederig . . . . **Pirolaceae** (z. T.). Bd. V/3, pag. 1568 (1571).

172*. Staubblätter 10 (Bd. VII, Fig. 1025), entweder alle fruchtbar oder 5 davon als gefranste Staminodien ausgebildet (Taf. 143, Fig. 7 a). Griffel 2 oder fehlend und dann 4 sitzende Narben. Kapsel 1- oder 2-fächerig . . . . . **Saxifragaceae.** Bd. IV/2, pag. 562 (654).

173. Laubblätter durch Öldrüsen durchscheinend punktiert. Staubblätter am Grunde eines polsterförmigen Diskus eingefügt (Bd. V/1, Fig. 1070). Frucht bei unseren Arten eine 4- oder 5-klappige Kapsel, bei ausländischen Arten eine (große) Beere, eine Stein- oder Spaltfrucht . . . . . **Rutaceae.** Bd. V/1, pag. 44.

173*. Laubblätter nicht durchscheinend punktiert . . . 174.

174. Staubblätter 6 (4 längere und 2 kürzere). Kelch- und Kronblätter 4 (Bd. VII, Fig. 1002). Frucht eine 1- bis mehrsamige Kapsel (Schote, Schötchen) oder Schließfrucht (VII, Fig. 1021 c, d). **Cruciferae** (z. T.). Bd. IV/1, pag. 51 (477).

174*. Staubblätter oft 10, seltener 5 oder 4 . . . . . 175.

175. Laubblätter gefingert, mit oder ohne Nebenblätter . 176.

175*. Laubblätter gelappt oder ± tief geteilt, oder aber gefiedert, jedoch nicht gefingert . . . . . 177.

176. Teilblättchen am Grunde keilförmig. Nebenblätter mit dem Blattstiel verwachsen. Kelch mit Außenkelch. Kronblätter kürzer als der Kelch (Taf. 151, Fig. 6 a). Früchtchen meist 5. Rasenbildende Halbrosettenstaude . **Sibbaldia procumbens.** Bd. IV/2, pag. 893.

Fig. 1018. Junger Sproß (Laubblätter mit Ochrea) von Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc.

Fig. 1017. Kelch mit Außenkelch von Potentilla.

Fig. 1019. Kronblatt von Melandrium, in Platte und Nagel gegliedert. *n* Krönchen oder Nebenkrone.

176*. Laubblätter (bei unsern Arten) 3-zählig gefingert (kleeartig); Teilblättchen in der Mitte längsgefaltet. Nebenblätter fehlend oder vorhanden. Griffel 5. Kapsel eiförmig bis länglich (Fig. 1614c bis e), 5-klappig aufspringend (Bd. IV/3, Fig. 1611 l). **Oxalidaceae.** Bd. IV/3, pag. 1644.

177. Kapsel 2-schnäbelig, 2-fächerig. Griffel 2. Staubblätter 10 (Bd. VII, Fig. 1025). . . . . **Saxifragaceae.** Bd. IV/2, pag. 562 (654).

177*. Frucht nicht 2-schnäbelig . . . . . 178.

178. Staubblätter 4. Frucht eine schotenförmige Kapsel. Eingeschleppte Arten. . . **Papaveraceae,** Gattung **Hypecoum.** Bd. IV/1, pag. 18.

178*. Staubblätter 10, zuweilen 5, ohne Staubbeutel. Laubblätter meist gegenständig, mit Nebenblättern . . . . . 179.

179. Kronblätter 5, verschieden gefärbt, aber nie gelb. Staubblätter zuweilen am Grunde verbunden. Frucht in 5 langgeschnäbelte, meist 1-samige Teilfrüchte zerfallend (VII, Fig. 1026). Laubblätter gelappt, geteilt oder gefiedert (Bd. IV/3, Fig. 1625) . **Geraniaceae.** Bd. IV/3, pag. 1656.

179*. Kronblätter 5, bei unserer Art gelb. Frucht in 5 nußartige, dreiseitige, warzige oder dornige Teilfrüchte zerfallend (Bd. V/1, Fig. 1687) . . . . . **Zygophyllaceae,** Gattung **Tribulus.** Bd. V/1, pag. 42.

180. Stamm dickfleischig (sukkulent), walzenförmig, kugelig, säulenförmig, abgeflacht und eingeschnürt gegliedert, großenteils blattlos, oft mit Stachelbüscheln. Blüten radiär (Bd. V/2, Fig. 2114b) oder zygomorph (Bd. V/2, Fig. 2111 b, c). Perianthblätter gewöhnlich zahlreich, unten meist röhrenförmig verwachsen. Staubblätter zahlreich. Fruchtknoten unterständig, 1-fächerig . . . . . **Cactaceae.** Bd. V/2, pag. 679.

Fig. 1020. Blütenkopf von Statice (=Armeria).

180*. Stengel holzig oder krautig, stielrund oder kantig . . . . . 181.

181. Pflanzen ohne Blattgrün, gelblichweiß, gelblich, bläulich oder rötlich. Stengelblätter schuppenförmig oder verkümmert. Parasiten und Saprophyten . . . . . 182.

181*. Pflanzen (wenigstens vor der Verholzung) grün gefärbt mit grünen Laubblättern. 185.



Fig. 1021. Cruciferae. *a* Blüte. *b* Staubblätter und Fruchtknoten. *c* Schote. *d* Schötchen.

182. Stengel fadenförmig, gelblich oder rötlich, die Nährpflanze umwindend. Blüten in Knäueln (Bd. VII, Fig. 1027). Krone radiär, meist mit Schlundschuppen (Bd. V/3, Fig. 3064d). Narben 2 (3), länglich (Bd. V/3, Fig. 3064c) bis kugelig (Bd. V/3, Fig. 3073d). Frucht eine wenigsamige Kapsel (Bd. V/3, Fig. 3076) . . . . . **Convolvulaceae,** Gattung **Cuscuta.** Bd. V/3, pag. 2089.



Fig. 1022. Blütendiagramm von Linum Austricum L.

182*. Stengel nicht fadenförmig . . . . . 183.

183. Staubblätter 8 bis 10 (Bd. VII, Fig. 1012). Krone radiär. Kronblätter fast frei. Blütenstand nickend, erst zur Fruchtreife sich aufrichtend. Kapsel unvollkommen 4- bis 5-fächerig (Bd. VII, Fig. 1012). Saprophyt . . . . . **Pirolaceae,** Gattung **Monotropa.** Bd. V/3, pag. 1596.

183*. Staubblätter 4 (VII, Fig. 1028), davon 2 länger. Krone zygomorph, zweilippig (VII, Fig. 1043a, c). Kapsel 1-fächerig. Schmarotzerpflanzen 184.

184. Pflanze meist rötlichviolett. Blütenstand einseitswendig, zuerst überhängend. Grundachse weißlich, verzweigt, dicht mit fleischigen, schuppenförmigen, kreuzweise gegenständigen Niederblättern besetzt . . . . . **Scrophulariaceae,** Gattung **Lathraea.** Bd. VI/1, pag. 128.

184*. Pflanze gelb, bräunlich, bläulich oder rötlich. Stengel am Grunde (unter der Erde) ± knollig verdickt. Niederblätter nicht fleischig. Blütenstand allseitswendig . . . . . **Orobanchaceae.** Bd. VI/1, pag. 132.

185. Fruchtknoten unterständig, seltener halbunterständig . . . . . 186.

185*. Fruchtknoten völlig oberständig . . . . . 200.

186. Blüten zu Köpfen oder Ähren vereinigt, diese am Grunde von einer gemeinsamen Hülle umgeben[1]) . . . . . 187.



Fig. 1023. Fruchtkapsel von Linum, usitatissimum L., scheinbar 10-fächerig

[1]) Hier könnten einzelne Rubiaceen mit kopfartigem Blütenstand gesucht werden. Unsere Arten besitzen zu Scheinquirlen angeordnete Laubblätter u. einen 2-knöpfigen, meist in 2 nussige Teilfrüchte zerfallenden Fruchtknoten.

186*. Blütenstand nicht kopfig oder ährig oder wenigstens nicht von einer gemeinsamen Hülle umgeben . . . . . 191.

187. Rechtswindende Sträucher mit gegenständigen, ungeteilten Laubblättern. Oberlippe aus 4, Unterlippe aus 1 Zipfel gebildet. Staubblätter 5. Frucht eine wenigsame Beere . . **Caprifoliaceae**, Gattung **Lonicera** (z. T.). Bd. VI/1, ... pag. 249 (251).

187*. Kräuter oder Stauden . . . . . 188.

188. Staubblätter 3 (VII, Fig. 1029). Kelch in eine Federkrone auswachsend. Frucht nussig, 1-samig. Niedrige Alpenpflanzen **Valerianaceae**, Gattung **Valeriana**. Bd. VI/1, pag. 262 (268).

188*. Staubblätter 4 oder 5 . . . . . 189.

189. Staubblätter 4 (Bd. VII, Fig. 1030, 1043 b) frei. Blüten radiär oder die randständigen zuweilen strahlend. Kelch borstenartig mit meist trockenhäutigem Außenkelch (Bd. VI/1, Fig. 153 c, m). Krone 4- bis 5-teilig. Griffel mit ungeteilter oder wenig gelappter Narbe. Laubblätter gegenständig . . . . . **Dipsacaceae**. Bd. VI/1, pag. 279 (280).

189*. Staubblätter 5; Staubbeutel zuweilen verklebt. Griffel 2- oder 3-teilig, nach außen gerollt . . . . . 190.

190. Staubbeutel zu einer Röhre vereinigt, den Griffel einschließend (VII, Fig. 1031 a). Kelch in der Regel nicht kraut- oder blattartig, meist als Federkrone (Pappus), als Schuppen oder Krönchen ausgebildet. Griffel stets 2. Frucht eine trockene Schließfrucht. **Compositae**. Bd. VI, pag. 394; Bd. VI/2, 1351.

190*. Staubbeutel frei oder nur am Grunde schwach verbunden. Kelch krautartig, 5-teilig (Bd. VI/1, Fig. 197 f). Frucht eine 2- bis 3-fächerige Kapsel . . . . . **Campanulaceae** (z. T.). Bd. V/1, pag. 328 (330).



Fig. 1024. *a*, *b* Pirola im Fruchtzustand. *c*, *d* Kapsel von unten und von oben. *e*, *f* Blütendiagramme.

191. Kleinere oder größere, sommer- oder wintergrüne Halbsträucher oder Sträucher mit einfachen oder zusammengesetzten Laubblättern . . . . . 192.

191*. Kräuter oder Stauden . . . . . 193.

192. Laubblätter wechselständig, einfach. Staubblätter 8 oder 10; Staubbeutel 2-hörnig (Bd. VII, Fig. 1032). Frucht eine Beere . . . . **Ericaceae** (z. T.). Bd. V/3, pag. 1609 (1622).

192*. Laubblätter gegenständig, gelappt oder fiederschnittig. Nebenblätter fehlend oder vorhanden, zuweilen auf Drüsen, Haare oder Schüppchen reduziert (Bd. VI/1, Fig. 138 a). Staubblätter meist 5, der Krone eingefügt. Frucht eine Beere oder 1- bis mehrkernige Steinfrucht, selten auch eine Kapsel. **Caprifoliaceae**. Bd. VI/1, pag. 233 (235).


Fig. 1025. Längsschnitt durch die Blüte einer Saxifraga.

Fig 1026. Aufspringende Frucht von Geranium columbinum L.

193. Pflanzen mittelst einfacher oder zusammengesetzter Wickelranken kletternd oder am Boden liegend. Blüten 1- oder 2-häusig. Staubbeutel gewunden, paarweise oder alle verwachsen. Fruchtknoten 3-fächerig (Bd. VI/1, Fig. 171 e). Griffel säulenförmig, mit 3, meist gegabelten Narben. Frucht eine zuweilen sehr große Beere. **Cucurbitaceae**. Bd. VI/1, pag. 311 (316).

193*. Pflanzen ohne Wickelranken. Blüten gewöhnlich zwitterig . . . . . 194.

194. Staubblätter gespalten, 8 bis 10 (Bd. VI/1, Fig. 143 e, f). Blüten zu 5 bis 7 gehäuft. Krone radförmig, 4- bis 5-spaltig, grünlich. Fruchtknoten halbunterständig. Frucht steinfruchtartig . . **Adoxaceae**. Bd. VI/1, pag. 259.

194*. Staubblätter 1 bis 5 (6) . . . . . 195.

195. Laubblätter gegenständig oder quirlig . . . 196.



Fig. 1027. Cuscuta alba Presl. *a* Blütenknäuel. *b* Blüte.

195*. Laubblätter wechsel- oder grundständig . . . . . 198.

196. Laubblätter zu 4 bis 8 oder mehr scheinquirlig. Krone mit (3) 4 bis 5 Zipfeln, zuweilen mit langer Röhre (Taf. 247, Fig. 1a und 5a). Staubblätter 4 bis 5 (Bd. VII, Fig. 983). Fruchtknoten 2-fächerig (Taf. 247, Fig. 2a). Frucht 2-knöpfig, meist in 2 nussige Teilfrüchte zerfallend, seltener eine Beere . . . . **Rubiaceae.** Bd. VI/1, pag. 196 (197).

196*. Laubblätter gegenständig . . . . . 197.

197. Staubblätter bei unsern Arten 1 bis 3 (Bd. VII, Fig. 1029). Blütenstand meist gabelig-trugdoldig, die Zweige in Wickel endigend. Kelch 1- bis 6-zähnig, anfangs oft undeutlich, zuletzt zuweilen vergrößert und eine gefiederte Haarkrone bildend (Taf. 253, Fig. 2c, 2f). Krone meist 5-zipfelig, am Grunde zuweilen mit Höcker oder Sporn. Frucht nussig, 1-samig, oft vom Kelche gekrönt. . . . . **Valerianaceae.** Bd. VI/1, pag. 261 (262).

197*. Staubblätter 4 (Bd. VI/1, Fig. 138c). Blüten einzeln oder zu 2 (selten 3 oder 4) auf langen, aufrechten Stielen endständig. Kelch 5-teilig (VII, Fig. 1034). Krone etwas schief, 5-lappig. Fruchtknoten drüsig-behaart. **Linnaea borealis.** VI/1, pag. 245.

198. Krone zygomorph, 2-lippig (VII, Fig. 1043a). Oberlippe aus 2, Unterlippe aus 3Zipfeln gebildet. **Lobeliaceae.** VI/1, pag. 391.

198*. Blüten radiär . . . . . 199.

199. Griffel in meist 3 bis 5 Narben geteilt (VII, Fig. 1035; Bd. VI/1, Fig. 184c). Krone glockig, trichter- oder radförmig. Krone blau bis violett, seltener gelb oder weiß. Staubbeutel oft verklebt. Frucht eine ei- oder kreiselförmige oder lineal-längliche Kapsel . . . **Campanulaceae** (z. T.). Bd. VI/1, pag. 328 (330).

199*. Griffel kurz, mit kopfförmiger Narbe. Blütenstand traubig. Krone weiß, mit Schlundschuppen. Fruchtknoten halbunterständig (Bd. V/3, Fig. 2876c, d). Kapsel 1-fächerig . . **Samolus Valerandi.** Bd. V/3, pag. 1875.

200. Bäume, Sträucher oder Halbsträucher . . . 201.

200*. Kräuter oder Stauden . . . . . 209.

201. Laubblätter lederartig, glänzend, wintergrün, ungeteilt, meist dornig-gezähnt. Blüten 2-häusig, kurzgestielt, blattachselständig. Krone radförmig, tief 4-(5-)spaltig, weiß bis rötlichweiß. Frucht eine beerenartige Steinfrucht, mit 4 bis 5 Steinsamen (Bd. V/1, Fig. 1825i), korallenrot . . **Aquifoliaceae.** Bd. V/1, pag. 233.

201*. Laubblätter nicht dornig-gezähnt. Blüten zwitterig. 202.

202. Laubblätter gegenständig oder quirlig[1]) . . 203.

202*. Laubblätter wechselständig . . . . . 206.

203. Staubblätter 5, 8 oder 10. Laubblätter lineal, fast nadelförmig. Frucht eine Kapsel. Niedrige Sträucher. . . **Ericaceae** (z. T.). Bd. V/3, pag. 1609 (1622).

203* (siehe auch 203**). Staubblätter 5, im Kronschlunde befestigt. Krone präsentiertellerförmig, mit nach links gedrehten Zipfeln, blauviolett, leuchtend rot oder weiß, im Schlunde zuweilen mit zerschlitzten Schuppen (Bd. V/3, Fig. 3033g). Frucht aus 2 getrennten Teilfrüchten bestehend (Bd. V/3, Fig. 3033d). Laubblätter gegenständig zu 3 quirlig, mit starkem Mittelnerv. . **Apocynaceae** (z. T.). Bd. V/3, pag. 2048 (205).

203**. Staubblätter 2 (Bd. VII, Fig. 1036) oder 4 . 204.

204. Krone radiär, röhrig, trichterförmig, mit 4-spaltigem Saume. Staubblätter 2, der Krone eingefügt



Fig. 1028. Diagramm von Orobanche elatior Sutton.

Fig. 1030. Blüte von Dipsacus sativus Honckeny.



Fig. 1029. Blütendiagramm von Valeriana officinalis L.



Fig. 1031. Compositae. *a* Blüte einer Distel. *b* Blütenkopf von Senecio. *c*, *d* Früchte mit Haarkrone (Pappus).

[1]) Hier können auch einige bei uns als Zierpflanzen gehaltene sommer- oder wintergrüne Asclepiadaceen; so u. a. Periploca Graeca (V/3, Fig. 3041) und Hoya carnosa (V/3, Fig. 3040 und 3044) gesucht werden, ebenso die zu den Loganiaceen gehörenden sommergrünen Vertreter der Gattung Buddleia (Bd. V/3, Fig. 2933) mit rotvioletten Blüten.

(Bd. V/3, Fig. 2921 b und c). Fruchtknoten 2-fächerig (Bd. VII, Fig. 1036), mit einem kurzen Griffel und 2-lappiger Narbe (Bd. V/3, Fig. 2921 b und d). Frucht eine Kapsel (Bd. V/3, Fig. 2902 b), Beere oder Steinfrucht (Bd. V/3, Fig. 2921 f) . . . . . **Oleaceae** (z. T.). Bd. V/3, pag. 1901 (1908).

204*. Krone zygomorph. Staubblätter 4, 2-mächtig, oder 2 (VII, Fig. 1040). 205.

205. Frucht in 4 trockene, einsamige Nüßchen (Klausen) zerfallend. Krone 2-lippig. Meist aromatisch duftende Sträucher oder Halbsträucher . . . . . **Labiatae** (z. T.). Bd. V/4, pag. 2255 (2264).

205*. Fruchtknoten 2-fächerig. Frucht meist eine vielsamige Kapsel. Krone 5-spaltig, unregelmäßig. Samen meist geflügelt. Zierbäume oder Klettersträucher (Bd. VII, Fig. 1250/51) **Bignoniaceae**. Bd. VI/1, pag. 175.

206. Blüten zwitterig. Staubblätter 4, 5, 8 oder 10 . . . . . 207.

206*. Blüten zweihäusig, fast ungestielt, einzeln oder zu wenigen blattachselständig. Staubblätter 6 bis 16. Frucht beerig. **Ebenaceae**. Bd. V/3, pag. 1897.

207. Staubblätter 8 oder 10 . . . . . 208.

207* (vgl. auch 207**). Staubblätter 5 oder 4. Kletternde oder niederliegende Sträucher bezw. Halbsträucher mit hängenden, meist rutenartigen Zweigen. Blüten strahlig. Frucht eine eiförmige oder längliche, mehrsamige Beere. **Solanaceae** (z. T.). Bd. V/4, pag. 2548 (2560).



Fig. 1032. Längsschnitt durch die Blüte von Vaccinium.

207**. Staubblätter 4 (Bd. VII, Fig. 1037). Kleiner niedergestreckter Strauch. Laubblätter wintergrün. Krone zygomorph, ± tief 5-spaltig (Taf. 245, Fig. 5 d), 2-lippig, blaulila, selten weiß. Blütenstand ein endständiges Köpfchen. Frucht ein vom Kelch umschlossenes Nüßchen . . . **Globulariaceae** (z. T.). Bd. VI/1, pag. 171.



Fig. 1033. Diagramm von Viburnum Lantana L.



Fig. 1034. Diagramm von Linnaea borealis L.

208. Laubblätter meist wintergrün, seltener sommergrün. Krone 4- bis 5-zähnig, -spaltig oder -teilig, meist radiär, seltener zygomorph. Staubblätter 8 bis 10; Staubbeutel oft mit Anhängseln (Bd. V/3, Fig. 2666 d). Frucht eine Kapsel, Steinfrucht oder seltener eine Beere . . . . . **Ericaceae** (z. T.). Bd. V/3, pag. 1609 (1622).

208*. Laubblätter wintergrün, buchsähnlich. Blüten zygomorph, schmetterlingsförmig. Kelchblätter 5, davon 2 („Flügel") kronblattartig. Kronblätter 3, unter sich und mit den 8 Staubblättern verwachsen. Frucht eine flache, 2-fächerige, 2-samige, geflügelte Kapsel (Bd. V/1, Fig. 1723 d) . . . . . **Polygala Chamaebuxus**. Bd. V/1, pag. 91.



Fig. 1035. Diagramm von Campanula (links) und Phyteuma (rechts).

209. Fruchtknoten 4-teilig, zuletzt in meist 4 (seltener 2 oder 1) einsamige Teilfrüchte zerfallend (Bd. VII, Fig. 1038). Staubblätter 4 oder 5, selten 2 210.

209*. Fruchtknoten 2 oder 1, seltener mehrere freie Fruchtknoten . . . . . 212.

210. Laubblätter wechselständig, ungeteilt, meist ganzrandig. Blütenstand wickelig. Krone in der Regel radiär, trichter- oder tellerförmig, selten mit 5-lappigem Saum (Bd. V/3, Fig. 3141 b, d), häufig mit Schlundschuppen (VII, Fig. 1039). Staubblätter 5. Pflanzen borstig-steifhaarig, seltener ± kahl . . **Boraginaceae**. Bd. V/3, pag. 2122 (2129).

Fig. 1036. Diagramm von Syringa.



Fig. 1037. Diagramm von Globularia nudicaulis L.

210*. Laubblätter gegenständig. Blüten zygomorph. Staubblätter 4, zweimächtig, oder 2 (2-staminodial (Bd. VII, Fig. 1040). Stengel oft vierkantig . . . . . 211.

211. Griffel meist lang, am Grunde der 4 Teilfrüchtchen entspringend. Blütenstände meist blatt-

achselständige Scheinquirle oder kopfig gedrängt, seltener ährenförmig. Krone meist deutlich 2-lippig, Stengel in der Regel 4-kantig . . . **Labiatae** (z. T.). Bd. V/4, pag. 2255 (2264).

211*. Griffel auf der Spitze des Fruchtknotens stehend, mit 2-lappiger Narbe. Blütenstand end- und achselständig, ährig. Krone stieltellerförmig, stark zygomorph. **Verbenaceae.** Bd. V/3, pag. 2232

212. Fruchtknoten zahlreich (12 bis 40), frei (Bd. IV/2, Fig. 924n). Krone nur am Grunde verwachsen. Laubblätter dickfleischig, spitz; Grundblätter eine kugelige Rosette bildend . . . . . **Crassulaceae**, Gattung **Sempervivum.** Bd. IV/2, pag. 543.

212*. Fruchtknoten 2 oder 1 . . . . . 213.

213. Fruchtknoten 2, unterwärts frei, an der Spitze durch die gemeinsame Narbe verbunden. Krone oft mit Schuppen oder mit Nebenkrone (Bd. V/3, Fig. 3033 g). Staubblätter 5. Früchte meist Balgfrüchte (Bd. V/3, Fig. 3028 a, 3046 b, c). Laubblätter in der Regel gegenständig . . 214.

213*. Fruchtknoten 1, an der Spitze einen oder mehrere Griffel tragend 215.

214. Krone trichter- oder präsentiertellerförmig, mit gedrehten Zipfeln. Staubblätter frei, der Kronröhre eingefügt. Pollen pulverig. Unsere Arten wintergrün . . . . . **Apocynaceae.** Bd. V/3, pag. 2048.

214*. Krone rad- oder glockenförmig. Kronzipfel aufrecht oder zurückgeschlagen. Pollenballen je zweier benachbarter Staubbeutel durch einen Klemmkörper verbunden (Bd. V/3, Fig. 3045 g). Samen mit Haarschopf (Bd. V/3, Fig. 3046 g). **Asclepiadaceae.** Bd. V/3, pag. 2058.



Fig. 1038. Blüte von Pulmonaria (geöffnet), Früchtchen mit Griffel.

215. Staubblätter 2 oder 3. Laubblätter gegenständig . . . . . 216.

215*. Staubblätter 4 bis 10 . . . . . 217.

216. Fruchtbare Staubblätter 2 (Bd. VII, Fig. 1041). Krone radförmig (Taf. 237, Fig. 6 a) oder 2-lippig (Bd. VI/1, Fig. 386). Frucht eine 2-klappig aufspringende Kapsel (Taf. 237, Fig. 5 b) . . . . . **Scrophulariaceae** (z. T.). Bd. VI/1, pag. 5 (6).



Fig. 1039. Krone von innen mit Schlundschuppen(s) v. Symphytum tuberosum L.



Fig. 1040. Diagramm von *a* Lamium album L. und *b* Salvia pratensis L.

216*. Staubblätter 3. Kelch ungleich, 2-spaltig (Taf. 98, Fig. 1 b). Kronröhre auf einer Seite gespalten. Fruchtknoten 3-fächerig (Bd. III, Fig. 563 p). Kleine, wasserliebende Kräuter . . **Portulacaceae**, Gattung **Montia.** Bd. III, pag. 270.

217. Blüten zygomorph . . . . . 218.

217*. Blüten strahlig (radiär) . . . . . 224.

218. Staubblätter 8, 10 oder mehr . . . . . 219.

218*. Staubblätter 5, 4 oder 2 . . . . . 221.

219. Staubblätter 8 oder 10. Kronblätter unter sich und mit den Staubblättern ± verwachsen . . . . . 220.

219*. Staubblätter mehr als 10, frei, nach aufwärts gebogen. Blüten gespornt, blau. Frucht eine mehrsamige Balgkapsel (Bd. III, Fig. 649 c). Einjährige Kräuter mit geteilten Laubblättern **Ranunculaceae**, Gattung **Delphinium.** Bd. III, pag. 485.

220. Staubblätter 8, in 2 Bündel verwachsen. Seitliche Kelchblätter („Flügel") größer, blumenblattartig. Kronblätter 5, das vordere Kronblatt mit lappigem oder gefranstem Anhängsel. Frucht eine flache, 2-fächerige und 2-samige Kapsel (Bd. V/1, Fig. 1724 d). Laubblätter ungeteilt. Nebenblätter fehlend. **Polygalaceae** (z. T.). Bd. V/1, pag. 89.



Fig. 1041. Diagramm von Veronica Chamaedrys L. (links) und Verbascum Thapsus L. (rechts).

220*. Staubblätter 10 (9 verwachsen, 1 frei). Kelch verwachsen, 5-spaltig oder 5-zähnig. Frucht eine nicht oder nur wenig aufspringende, meist 1- bis 2-samige Hülse (Bd. IV/3, Fig. 1402 g). Laubblätter in der Regel 3-zählig. Nebenblätter gewöhnlich groß, oft mit dem Blattstiel verwachsen. **Leguminosae**, Gattung **Trifolium.** Bd. IV/3, pag. 1275.

221. Fruchtbare Staubblätter 4 oder 5 . . . . . 222.

221*. Staubblätter 2. Krone gespornt, 2-lippig (Bd. VII, Fig. 1042). Blütenstand locker, traubig oder Blüten einzeln, langgestielt Fruchtknoten 1-fächerig (Taf. 244, Fig. 3 c). Kapsel mit zentralem Samenträger, mehrsamig. Laubblätter ungeteilt, in grundständiger Rosette oder fein zerteilt und mit Schläuchen besetzt. Pflanzen feuchter Standorte. **Lentibulariaceae.** Bd. VI/1, pag. 155.

222. Blütenstand ein endständiges Köpfchen. Krone ± tief 5-spaltig (Taf. 245, Fig. 5 d), 2-lippig, blaulila, selten weiß. Staubblätter 4 (Bd. VII, Fig. 1037). Fruchtknoten 1-fächerig. Frucht ein 1-samiges, vom Kelch umschlossenes Nüßchen . . **Globulariaceae** (z. T.). Bd. VI/1, pag. 171.

222*. Blütenstand kein endständiges Köpfchen. Frucht eine wenig- bis vielsamige Kapsel . . . . 223.

223. Staubblätter 4 oder 5 (VII, Fig. 1041). Krone 2-lippig oder radförmig mit 5 etwas ungleichen Lappen. Frucht eine 2-klappig aufspringende, vielsamige Kapsel (Taf. 237, Fig. 5 b; VII S. 113, Fig. 1148) . . . **Scrophulariaceae** (z. T.). Bd. VI/1, pag. 5 (6).

223*. Staubblätter 4. Blüten zu steifen, dicken Ähren vereinigt, von großen, stachelig-gezähnten Tragblättern gestützt. Oberlippe fehlend. Fruchtkapsel wenig- (meist 3- bis 4-) samig. Zierpflanzen (VII, Fig. 1252). **Acanthaceae.** VI/1, pag. 177.

224. Staubblätter 10. Krone nur am Grunde etwas verwachsen. Fruchtknoten 5-fächerig. Frucht eine Kapsel . . . 225.

224*. Staubblätter 4 bis 8 . . . . . 226.

225. Laubblätter (bei unseren Arten) 3-zählig (kleeartig). Staubblätter verschieden lang. Griffel 5 (Bd. VII, Fig. 1044) . . . . . **Oxalidaceae.** Bd. IV/3, pag. 1644.

225*. Laubblätter wintergrün, einfach. Griffel 1, mit verbreiteter Narbe (Bd. V/3, Fig. 2606 a, b) . . . . . **Pirolaceae.** Bd. V/3, pag. 1568 (1571).

226. Staubblätter 4 (Taf. 246, Fig. 4 a, 6 a) . . . . 227.

226*. Staubblätter 5 bis 8 . . . . . 229.

227. Laubblätter grund- oder gegenständig . . . . . 228.

227*. Laubblätter wechselständig. Blüten einzeln in den Blattachseln. Frucht eine kugelige Deckelkapsel (Taf. 211, Fig. 6 b). Unscheinbares, einjähriges Pflänzchen . . . . . **Centunculus minimus.** Bd. V/3, pag. 1873.

228. Laubblätter meist grundständig, seltener stengel- und dann gegenständig. Blüten zwitterig, zu Ähren oder Köpfen vereinigt, oder einhäusig und dann die männlichen einzeln an langen Stielen und die weiblichen zu 2 oder 3 am Grunde dieser Stiele sitzend. Krone 4-, seltener 5-teilig (Bd. VII, Fig. 1045), trockenhäutig. Staubfäden lang. Griffel 1. Frucht eine 2- bis vielsamige Deckelkapsel (Taf. 246, Fig. 3 b) oder eine 1-samige Nuß. **Plantaginaceae.** Bd. VI/1, pag. 178.

228*. Laubblätter gegenständig. Staubblätter mit den Kronzipfeln abwechselnd (Bd. VII, Fig. 1046). Blüten einzeln an langen Stielen oder trugdoldig gebüschelt. Krone violett, blau oder gelb. Frucht eine 2-klappig aufspringende Kapsel . . . . . **Gentianaceae** (z. T.). Bd. V/3, pag. 1953 (1957).

229. Staubblätter 5 . . . . . 230.

229*. Staubblätter 6 bis 8. Stengelblätter gegenständig oder rosettig 237.

230. Laubblätter gegen-, quirl- oder grundständig (zuweilen die untern gegenständig) . . . . . 231.

230*. Laubblätter wechselständig . . . . . 233.

231. Griffel in 5 ± lange Narbenäste geteilt (Taf. 213, Fig. 2 a). Blütenstand kopfig (VII, Fig. 1020) oder doldenrispig. Laubblätter meist grundständig. Kelchblätter in der Regel trockenhäutig (VII, Fig. 1047). Frucht eine 1-samige Schließfrucht. **Plumbaginaceae.** Bd. V/3, pag. 1877 (1879).

231*. Narbe kopfig oder 2-lappig. Kronblätter oft eine ± lange Röhre bildend, mit rad- oder trichterförmigem Saum. Frucht meist kapselig, mit Zähnen (Bd. V/3, Fig. 2746 b), Klappen (Bd. V/3, Fig. 2820 b, g) oder mit einem Deckel aufspringend . . . . . 232.



Fig. 1042. Blütendiagramm von Utricularia vulgaris L. (links) und Pinguicula alpina L. (rechts).



Fig. 1043. Sympetale Blüten: *a* von Lobelia Dortmanna L., *b* Scabiosa Columbaria L., *c* Euphrasia, *d* Doppelblüte von Lonicera alpigena L.



Fig. 1044. Diagramm von Oxalis Acetosella L.

232. Staubblätter vor den Kronzipfeln stehend (Bd. VII, Fig. 1048). Griffel 1, Narbe kopfförmig. Fruchtknoten 1-fächerig (Taf. 209, Fig. 3c). Samenträger mittelständig (Bd. V/3, Fig. 2746c) . . . . . **Primulaceae.** Bd. V/3, pag. 1715 (1732).

232*. Staubblätter mit den Kronzipfeln abwechselnd (Bd. VII, Fig. 1046). Narbe 1 bis 2 (Bd. V/3, Fig. 2950d, 2980d). Fruchtknoten 1- bis 2-fächerig (Bd. V/3, Fig. 2949c; Taf. 216, Fig. 1d; Fig. 2980e) . . . . . **Gentianaceae** (z. T.). V/3, pag. 1953 (1957).

Fig. 1045. Diagramm von Plantago.



Fig. 1046. Diagramm von Gentiana verna L.

233. Griffel mit 3 fadenförmigen Narbenästen. Fruchtknoten 3-fächerig (Bd. V/3; Fig. 3083c). Krone fast radförmig, stielteller- oder glockenförmig. Laubblätter oft gefiedert, doch auch einfach . . . . . **Polemoniaceae.** Bd. V/3, pag. 2111 (2114).

233*. Griffel oder Narben 1 bis 2 . . . . . 234.

234. Laubblätter 3-zählig gefingert oder herzförmig-kreisrund und dann schwimmend. Frucht eine unregelmäßig zerreißende oder sich nicht öffnende Kapsel . . . . . **Gentianaceae,** Gattungen **Menyanthes** (Bd. V/3, pag. 1957) und . . . . . **Nymphoides** (Bd. V/3, pag. 1961).

234*. Laubblätter einfach, gelappt oder geteilt oder gefiedert . . 235.

235. Fruchtknoten 1- bis 2-fächerig (Taf. 218, Fig. 3b). Kapsel wenigsamig . . . . . 236.

235*. Fruchtknoten 2- bis unvollkommen 4-fächerig (Bd. VII, Fig. 1049; Bd. V/4, Fig. 3382; Taf. 232, Fig. 1d, 2a), mit zahlreichen Samenanlagen. Frucht meist eine vielsamige Beere oder Kapsel (zuweilen Deckelkapsel). Krone trichter- bis radförmig, in der Regel strahlig. Laubblätter ungeteilt, buchtiggelappt oder unterbrochen-fiederschnittig. . . . . **Solanaceae.** Bd. V/4, pag. 2548 (2560).

Fig. 1047. Blüten von der Grasnelke (Statice).

236. Krone groß, glockig-trichterförmig, in ein- oder wenigblütigen, blattachselständigen, trugdoldigen Blütenständen. Stengel oft (links-)windend . . . . . **Convolvulaceae.** Bd. V/3, pag. 2073 (2078).

236*. Krone fast radförmig, häufig in dichten, oft einseitswendigen und schneckenartig eingerollten Wickeln. Griffel tief 2-spaltig (Bd. V/3, Fig. 3086A). Laubblätter meist stark behaart, oft fiederschnittig oder fiederteilig . . . . . **Hydrophyllaceae.** Bd. V/3, pag. 2119.



Fig. 1048. Diagramme: *a* von Primula vulgaris Huds., *b* von Lysimachia thyrsiflora L.

237. Blütenstand fast doldentraubig. Krone gelb, 6- bis 8-zipfelig, mit kurzer Röhre (Bd. V/3, Fig. 2945d). Staubblätter 6 bis 8. Kapsel 2-klappig aufspringend (Bd. V/3, Fig. 2925e). Stengelblätter gegenständig, am Grunde miteinander verwachsen . . . . . **Blackstonia** (Chlora). Bd. V/3, pag. 1966.

237*. Blüten 1 bis 2, endständig. Krone radförmig, weiß, 7-zipfelig. Staubblätter 7. Kapsel mit 5 bis zum Grunde geteilten Klappen aufspringend. Obere Laubblätter in stengelständiger Rosette . . . . . **Trientalis Europaea.** Bd. V/3, pag. 1861.



Fig. 1049. Diagramme von Solanum tuberosum L. (links) und Datura Stramonium L. (rechts).

2. Erklärung botanischer Kunstausdrücke.

In der folgenden alphabetisch geordneten Übersicht sind alle wichtigen botanischen Kunst- und Fachausdrücke, die termini technici, soweit sie für die „Flora" in Betracht kommen, möglichst kurz und eindeutig erklärt. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, wird in vielen Fällen auf die im ersten Band gebrachte anatomisch-morphologisch-biologische Einführung in die „Allgemeine Botanik", in anderen Fällen direkt auf die in Frage kommende Stelle in den Bänden (I bis VII) verwiesen; die Teilbände sind als solche (z. B. IV/1, IV/2, IV/3, IV/4) bezeichnet. Allerdings mußten mit Rücksicht auf den zur Verfügung stehenden Raum viele Ausdrücke aus dem Gebiete der Kryptogamenkunde, Zytologie (Zellenlehre), Vererbungslehre, Artbildung, Pathologie, angewandten Botanik, Mikrotechnik und Palaeobotanik unberücksichtigt bleiben. Dagegen erschien es angezeigt, die heute auch in systematischen Büchern aus den Grenzdisziplinen der Geologie, Pflanzengeographie (Geobotanik), Biochemie, Bodenkunde, Klimatologie, Forstwissenschaft und Landwirtschaftslehre immer mehr in Erscheinung tretenden Kunst- und Fachausdrücke aufzunehmen. Für ausführliche Erklärungen (Definitionen) und Darstellungen sind die größeren Hand- und Lehrbücher zu Rate zu ziehen, so besonders C. K. Schneider's Illustriertes Handwörterbuch der Botanik (Leipzig, Engelmann), ferner das Handbuch der Naturwissenschaften (Jena, G. Fischer), die Arbeiten v. Goebel, Raunkiaer, Neger (Organographie, Morphologie, Oekologie), Kirchner, Loew und Schroeter (Lebensgeschichte der Blütenpflanzen von Mitteleuropa), A. F. W Schimper, Warming-Graebner, Drude, Braun-Blanquet, v. Hayek, C. Schroeter, Rübel, Brockmann, Gams, Lüdi, Diels, Cajander, Vierhapper u. a. (Pflanzengeographie und Soziologie), Ramann (Bodenkunde), Wiesner (Rohstoffe), C. O. Harz (Samenkunde), Kinzel (Keimung), Potonié-Gothan (Palaeobotanik), Wettstein, Lotsy, Goldschmid, Mez, Baur (Vererbungslehre, Stammesgeschichte), Küster, Ross, Penzig, Masters (Pathologie, Gallen, Teratologie) u. a.

Aasblumen — I/CXLV; V/3 2060.
Abänderungen — siehe Wuchsformen.
Abart — siehe Varietät.
Abblatten — V/2 1146.
Aberration (aberrátio) — heisst eine stark abweichende, auf dem Wege der Mutation entstandene Form ohne selbständiges Areal, zuweilen mit pathologischem Einschlag.
abfallend (decíduus) — heissen frühzeitig abfallende Pflanzenteile.
abgebissener Wurzelstock — dieser endigt plötzlich mit einer unebenen Fläche (VI/1 181).
abgeplatteter Spross — I/LXXXIV.
abgestutzte Blattspitze — I/XCV.
Ableger — I/CLVIII (siehe Vitis vinifera).
abnormer Holzkörper — siehe zerklüfteter Holzkörper.
Abort — Ausbleiben eines Organes.
Absenker — I/CLVIII.
Absorptionssystem — umfasst alle Gewebe und Zellen, die der direkten Aufnahme von Wasser und der in diesem gelösten Nährsalze dienen.
Abstammungsachse — I/CXXVI, CXXXV.
absteigende Knospendeckung — I/CXXXVI; IV/3 1113, 1135.
Absterbe-Ordnung — V/2 1135.
Abteilung (divísio) = systematische Einheit nach der Reihe.
abwechselnd — = alternierend.
abwechselnd gefiedert — I/XCVI.
abyssales Plankton — Schwebeflora (Plankton) der Tiefsee.
Acarodomatien — von Milben bewohnte Domatien.
Acarophilie — Anpassung der Pflanze an das Zusammenleben mit Milben.
accessorische Knospen — siehe Beiknospen.
Achaene — Nüsschen (besonders Schliessfrucht der Kompositen) (I/CL; VI/1 395).
Acheilarie — Unterdrückung des Labellums (vor allem bei Orchideen).
achlamydëische Blüten — nackte Blüten ohne Blütenhüllblätter (I/CXVIII).
Achse (Axe, Sprossachse) — nennt man den Spross (Stamm, Stengel) im Gegensatz zu den Laubblättern (I/LXIV).
Achsel — heisst der Winkel zwischen Stengel und Laubblatt oberhalb der Anheftungsstelle des Laubblattes.
Achselknospe — entsteht in der Achsel zwischen einem Blatt (Stütz-, Tragblatt) und dem Muttersprosse.
Achselschüppchen — I/CVI.

2. Botanische Kunstausdrücke

Seite 26—134

Prof. Dr. GUSTAV HEGI

Rebstock und Wein

Sonderdruck aus der Illustrierten Flora von Mitteleuropa.

80 Seiten mit 44 Abbildungen. Kart. Mk. 4.—, gebd. Mk. 5.—.

„Zweifellos wird diese eingehende Bearbeitung der Rebe weit über den Kreis der Bezieher der Flora Mitteleuropas hinaus auf Interesse stossen, denn jeder, der sich um den Weinstock und sein Erzeugnis kümmert, findet hier eine ausgezeichnete Einleitung, in die überaus umfangreiche Literatur, die sich mit der Rebe befasst. Jeder, der die Schrift liest, findet auf die verschiedensten, den Weinbau betreffenden Fragen Antwort." *(Weinbau und Kellerwirtschaft.)*

J. F. LEHMANNS VERLAG / MÜNCHEN 2 SW

Achsenbecher (Achsenkupula, Cupula) — heisst die becher- oder schüsselförmig ausgebildete Achse (I/CXXVIII; III 95, 102, 106; IV/2 662; V/2 703, 728, 752, 797; VII Fig. 1050). Siehe auch Fruchtbecher, Fruchthülle, Scheinfrucht.

Achsenfadenranker (Fadenranker) — Kletterpflanzen, bei denen die fadendünne, reizempfindliche Achse als Kletterorgan dient (I/LXXV).

Aciculignosa — = Nadelhölzer, Nadelwälder, Nadelholzgebüsche.

Ackerform — VI/104.

Acrosyncarpie — Verwachsung zweier Früchte (bezw. Mooskapseln) an ihrem Scheitel.

additionelle Wurzelsprosse — kommen normaler Weise (Gegensatz ist reparativ) bei verschiedenen Holzpflanzen und Stauden vor und dienen der Erhaltung und Vermehrung.

Adelphie — Vereinigung mehrerer Staubfäden.

Adelphogamie (Geschwisterkreuzung) — Fremdbestäubung zwischen Blüten verschiedener Individuen derselben Art naher Abkunft.

Adern — = Blattnerven (vénae) I/XCVII.

Adesmie (Dialysis) — getrennte Ausbildung von Organen, die normalerweise untereinander verwachsen sind.

Adhaesion — Verwachsung im allgemeinen Sinn; Verwachsung der Glieder verschiedener Wirtel in der Blüte (z. B. Staubblatt mit Fruchtblatt) im engeren Sinne.

Adnation — abnormale Verwachsung eines Organes oder eines Organteiles mit einem anderen auf grössere oder geringere Länge hin (V/4 2549).

adossiertes Vorblatt — I/CXXXIII.

Adventiv- (nothoxene) **Bastarde** — heissen solche Hybridogenen, die bei uns bereits als Kreuzungen eingeschleppt waren (Potentilla intermedia, Oxalis Dillenii).

adventive Bildungen — an ungewöhnlichen Stellen entstehende Organe.

Adventivkeimlinge (Adventivembryonen) — nicht aus der Eizelle des Embryosackes, sondern aus dem Nuzellargewebe sich entwickelnde Keimlinge.

Adventivknospen — heissen die an ungewöhnlichen Stellen entstehenden Knospen, u. a. auch auf Blättern (I/CLVII, CLVIII; III 411; IV/1 344 Fig. 820 k; V/1 665).

Adventivknospen, hypokotyle — V/3 1870.

Adventivpflanzen — ursprünglich nicht heimische, unter Mithilfe von Menschen oder Tieren eingeschleppte Arten.



Fig. 1050. Castanea sativa Miller (III, 101). *a* Zweig mit reifen Kastanien (Scheinfrüchten) und den Resten der männlichen Blüten. *b* Aufspringende Fruchthülle („Achsenkupula") mit 3 Früchten.

Adventivsprosse — an ungewöhnlichen Stellen entstehende Sprosse (z. B. an Wurzeln). Vgl. I/LXVI; IV/1 321; V/1 665.

Adventivwurzeln — sekundär an beliebigen Stellen sich entwickelnde Wurzeln (I/LX, LXI; IV/1 321; V/2 897).

Adynamandrie — Unfruchtbarkeit von Pollen auf der Narbe der eigenen Blüte (V/2 711).

Adynamogynie — Funktionsunfähigkeit weiblicher Geschlechtsorgane.

Aecidien — becherförmige Gebilde auf Organen höherer Pflanzen, in denen sich die Sporen parasitärer Pilze entwickeln (IV/1 8, Fig. 8).

Aehrchen (spícula) (Grasährchen) — ährenförmiger Teilblütenstand einer Aehre oder Rispe (I 167/168; VII Fig. 975).

Aehrchendrillinge — I 183, 396.

Aehre (spíca) — I/CXXXVII (siehe auch Kätzchen von Salix und Populus; ebenso die Dichasienähren).

Aehre (zusammengesetzte) — I/CXXXVIII.

Aehrenachse (Rhachis) — I/CXXXVII.

Aehrenfortsatz — Verlängerung der Aehrenachse über das oberste Aehrchen hinaus.

Aequinoktialblumen — öffnen und schliessen sich wiederholt (Gegensatz: ephemere Blumen).

Aërenchym — lockeres, an Zellzwischenräumen reiches Luftgewebe (bei Wasserpflanzen). Siehe V/2 753, 759; V/4 2256).

aërobe Atmung (Luft- oder Sauerstoffatmung) — Atmung im engern Sinne, charakterisiert durch die Aufnahme von molekularem Sauerstoff und Ausscheidung der Endprodukte der physiologischen Verbrennung (Kohlendioxyd und Wasser).

Aërobionten — Organismen verwerten den freien Sauerstoff der Luft.

Aërokarpie (Luftfrüchtler) — alle Früchte reifen über der Erde (Gegensatz ist Geo- und Amphikarpie, Pseudogeokarpie).

Aërophyten — = Luftpflanzen bezw. Epiphyten (Ueberpflanzen). Die ganze Pflanze befindet sich über dem Boden oder haftet auf anderen Pflanzen.

aestáti fruticéta — siehe Sommergebüsche.

aestáti sílvae — siehe Sommerwälder.

Aesthesie — Empfindlichkeit oder Sensibilität für ein reizauslösendes Agens.

Aestivale Form bezw. **Rasse** — frühblühende Rasse saisondimorph gegliederter Arten V/3 1983; VI/1 84.

aestivátio apérta — siehe offene Knospendeckung.

aestivátio contórta — I/CXXXV.

aestivátio imbricáta — I/CXXXV.

aestivátio quincunciális — I/CXXXV.

aestivátio valváta — I/CXXXV.

Aestivation (Knospendeckung) — I/CXXXV.

aetherische Oele — meist flüssige und farblose, oft stark riechende, in Alkohol und Aether leicht lösliche Substanzen, deren Fettfleck an der Luft wieder verschwindet. Viele gehören zur aliphatischen Reihe und sind Gemenge von Terpenen, andere enthalten neben den Kohlenwasserstoffen sauerstoffhaltige Körper, wie Aldehyde, Alkohole, Phenole, Ketone, Säuren, Laktone, Ester, seltener auch Schwefel.

Aetherisierungsverfahren — siehe Frühtreiben und Bd. V/3 1915.

Aethylalkohol — V/1 414.

Aetiologie (Pathogonie) — Lehre von den Krankheitsursachen.

Affentreppen — IV/3 1120.

Affinität, sexuelle — I/CXLII, CLVIII.

Afterblätter — siehe Nebenblätter.

Agamandroezie — Vorkommen geschlechtsloser und männlicher Blüten auf derselben Pflanze.

Agamogynoezie — Vorkommen geschlechtsloser und weiblicher Blüten auf derselben Pflanze (VI/2 689).

Agamogynomonoezie — Vorkommen geschlechtsloser, weiblicher und zwitteriger Blüten auf derselben Pflanze.

Agamomogonie — ungeschlechtliche Fortpflanzung im allgemeinen.

Agamomonoezie — Vorkommen zwitteriger und geschlechtsloser Blüten auf demselben Individuum (I/CXXXII; V/2 938).

agamotrope (nichtschlafende) **Blüten** — Blüten schliessen sich nach dem Aufblühen nicht mehr, sondern bleiben bis zum Verblühen offen (Pomoideen).

aiolostatisch — heissen Pflanzen, wenn sie beim Vorherrschen bestimmter Winde schief wachsen (IV/3 1398).

aitionem — siehe paratonisch.

aitionom — siehe autonom.

Akarodomatien (Milbenbärte) — von Milben bewohnte Domatien (siehe dort und IV/2 731; V/1 432).

Akarophilie — Anpassung von Pflanzen an das Zusammenleben mit Milben (siehe auch Gallen).

Akklimatisation — Gewöhnen einer Pflanze an andere klimatische Verhältnisse bezw. an eine abweichende Jahresperiode, was am besten durch Züchtung aus Samen geschieht.

Akklimatisationsrassen — entstehen durch Züchtung, sind aber nicht erblich und gehen beim Verbringen in die früheren Verhältnisse wiederum in die Stammform zurück.

Akladium — nicht verzweigtes, köpfchentragendes Ende des Stengels (bei Hieracium). Siehe VI/2 1185.

Akrogamie — der Pollenschlauch dringt durch die Spitze der Samenanlage (bei zugewachsener Mikropyle) ein.

akropetal (aufsteigend) — I/CXXXVII.

aktinomorphe Blüten — vollkommen strahliger (radiärer, regelmässiger) Bau bei Blüten (I/CXXXIV).

akzessorisch — I/LXIX.

akzessorische Arten — machen in einem Pflanzenverein 25 bis 50% aus.

álae (lat.) — heissen die zwei seitlichen, flügelartigen Kronblätter der Schmetterlingsblütler (IV/3 1135).

albicátio — siehe Panaschierung.

Albinos — heissen abnorm weisse Blütenhüllblätter, Samen (Leucospermie) usw. mit fehlendem Anthocyan (Pigmentverlust).

Albumen — I/XLVIII.

Aleuronkörner — I/XXII.

Algensymbiose — V/2 895.

Alkaloide — sind heterocyclische, stickstoffhaltige Pflanzenbasen mit ausgesprochen physiologischer Wirkung. Viele Alkaloide sind Derivate des Pyridins, Tropins, Chinolins, Isochinolins und Xanthins.

Alkoholase (Alkoholgärung) — V/1 400.

Allergie — Ueberempfindlichkeit gegen gewisse chemische, biologische und physikalische Stoffe (siehe Pollenallergie, Primeldermatitis V/1 219, Urticaria, Dermatitis).

Allerweltspflanzen — Kosmopoliten (z. B. Phragmites, Carex rostrata, Potentilla anserina).

Allochorie (Fremdverbreitung) — Früchte und Samen werden durch fremde Kräfte verbreitet.

allochorische Arten — heissen Pflanzen, die mehrere sich einander anschliessende Gesellschaften derselben einheitlichen Landschaften besiedeln (Drude).

Allogamie (Fremdbestäubung) — Bestäubung einer Narbe durch den Pollen einer anderen Blüte derselben Art (I/CXLI).

Allokarpie — Fruchtbildung als Folge der Allogamie.

allotrope Blumenbesucher — diesen fehlen besondere Anpassungen an die Bestäubung, weshalb sie für die letztere von geringem Wert sind.

allotrophe Pflanzen (= diatrophe, dichotrophe, heterotrophe Pflanzen) — sind chlorophyllfrei; sie nehmen die organische Nahrung von aussen auf (II 323).

Alluvionen — durch Vermittlung des Wassers zur Ablagerung gelangte Gesteinsbildungen.

Alluvium — siehe Geologische Formationen.

Alm (Almboden, Kalktuff) — ein an kohlensaurem Kalk sehr reicher Boden (bis 98%); ist oft in Wiesenmooren anzutreffen (V/4 2301).

Alp (Alm) — als solche wird im Gebirge ein meist oberhalb der Grenze der ständigen Wohnungen gelegener, grösstenteils aus Viehweide bestehender Landkomplex bezeichnet.

alpigene Arten — haben den Schwerpunkt ihrer Verbreitung oberhalb der Baumgrenze.

alpine (eualpine) **Stufe der Hochgebirge** — erstreckt sich von der oberen klimatischen Baumgrenze aufwärts bis zur klimatischen Schneegrenze. Unterstufen: a) Legföhren-, b) Zwergstrauch-, c) Wiesen- und d) subnivaler Pionierrasengürtel. (a und b fallen öfters zusammen und bilden mit dem Kampfgürtel den Strauchgürtel).

Alternieren der Staubblätter — I/CXXV.

alternierende Blattstellung — I/CXXVI.

altozeanisches (= australes) **Florenreich** — findet sich vorherrschend im antarktischen Waldgebiet von Südamerika, im südlichen Neuseeland, in Australien, im Kapland, auf Tristan d'Acunha, auf den Kerguelen usw.

Ambrosiagallen (Ambrosiapilze) — IV/3 1187.

Ameisenpflanzen (Ameisenwanderer) — I/CLIV; siehe auch Myrmekochoren.

améntum (lat.) — = Kätzchen (siehe auch Kätzchensucht).

aminoide Düfte — diesen liegen primäre, sekundäre oder tertiäre Amine zugrunde, Trimethylamin (Birnbaum, Weissdorn und andere Rosaceen, Schneeball usw.).

Aminoorganismen — ziehen insbesonders Asparagin dem Ammoniak (NH_3) vor.

Amitose (direkte Kernteilung) — I/XIX.

Ammoniakpflanzen — III 173 (siehe Lägerpflanzen).

Ammoniumbildung (Ammonifizierung) — erfolgt durch Spaltpilze (besonders Bacterium mycoides) und Pilze (Mucor, Aspergillus, Fusarium usw.) im durchlüfteten Boden. Als Produkt der Umsetzungen von ickstoffverbindungen entsteht das Ammoniumkarbonat [$(NH_4)_2CO_3$], welches das Ausgangsmaterial Nitrifikation (siehe dort) bildet.

amphibische Pflanzen bezw. **Formen** — leben im Wasser und auf dem Lande (V/1 537, Fig. 2016b).

Amphikarpie (Hypokarpie) — neben oberirdischen Früchten treten solche auf, die ihre Samen im Boden reifen (z. B. Cardamine chenopodiifolia IV/1 335; IV/3 1138).

amphikotyl (amphisynkotyl) — Keimblätter sind beiderseits ± miteinander verwachsen.

amphikribrales Leitbündel — siehe hadrozentrisches Leitbündel.

Amphimyxis (geschlechtliche Fortpflanzung) — Vereinigung von Vererbungssubstanzen zweier Individuen im Momente der Befruchtung.

amphistomatisch — heissen Laubblätter, die auf der Ober- und Unterseite Spaltöffnungen aufweisen.

amphitrope (krummläufige) **Samenanlage** — I/CXXXI.

Amphitrophie — Förderung eines Sprosses auf den Flanken.

amphivasales Leitbündel — siehe leptozentrisches Leitbündel.

Ampullen — VI/1 162.

Amygdalin — IV/2 1056, 1091.

Amyloid — I/XXIV

amylophylle Blätter — siehe Stärkeblätter.

an (lateinisch) — = ob?

Anabionten (= polykarpische Gewächse) — Dauerpflanzen, die mehrmals blühen und fruchten.

Anaërobionten — können ohne freien Sauerstoff leben; die obligaten Anaërobionten sind ausschliesslich auf ein Leben ohne freien Sauerstoff angewiesen.

analoge Organe (Analogie) — heissen Organe von verschiedenem morphologischen Charakter, die aber zufolge gleichsinniger Anpassung die gleiche Funktion ausführen und deshalb eine grosse Aehnlichkeit

besitzen (z. B. die Ranken von Vitis und Vicia). Siehe homologe Organe.

Ananasgallen (Kuckucksgallen) — kommen durch hyperplastische Veränderung zahlreicher nebeneinanderliegender Organe zustande (VII Fig. 1051).

Anaplasten — siehe Leukoplasten.

Anastomose — Verbindung von Blattnerven.

Anatomie — Lehre vom innern Bau der Organismen.

anatrope (umgewendete, gegenläufige) **Samenanlage** — I/CXXXI.

Ancyluszeit (postglazial) — folgt auf die Yoldiazeit mit subarktischem Klima. Durch Hebung des Landes wurde der Zugang der Ostsee zum Weissen Meer unterbrochen; die Ostsee wurde allmählich ausgesüsst und zum Ancylussee (benannt nach der Süsswasserschnecke Ancylus fluviátilis Müller).

Androdioezie — I/CXXXII.

androdynamisch — VI/2 680.

Androezeum — Gesamtheit der Staubblätter (I/CXXII).

Androezie — heisst das ausschliessliche Vorkommen von männlichen Blüten auf demselben Individuum.

Androgynie — männliche und weibliche Blüten befinden sich in einem und demselben Blütenstand (III 14).

Androgynophor — IV/1 490; V/1 490, 658.

Andromonoezie — I/CXXXII; V/2 938.

Androphor — stielartige Verlängerung der Blütenachse zwischen Blütenhülle und Androezeum (Capparidaceae, Passiflora).

anemochor-hydrochore Verbreitung — Früchte bezw. Samen derselben Art werden durch den Wind und das Wasser verbreitet (Alnus, Eriophorum, Typha).

anemochor-myrmekochore Verbreitung — Pflanzen sind gleichzeitig an die Verbreitung durch den Wind und Ameisen angepasst (Polygala-, Centaurea-, Cirsium-, Knautia-Arten usw.).

Anemochorie (Windfrüchtler) — I/CLIII; II 186.

Anemophilae (Anemogamae) Windblütler — I/CXLIII.

Angelhaare — IV/3 1617, 1626.

Angelhaken-Typus — IV/2 914.

Angergräser — siehe Hungergräser.

Anisokotylie — Ungleichblätterigkeit der Kotyledonen (V/2 889; VII Fig. 1052).

Anisophyllie — IV/2 545; V/1 261, 265; VI/1 178.

Anisostylie — Ausbildung kurz- und langgriffeliger Blüten bei derselben Art bei gleichzeitiger physiologischer Wirksamkeit beider Geschlechter.

Ankerhaare, zweizeilige — siehe Schiffchenhaare (VI/2 682, Fig. 339).

Ankerkletten — Klettfrüchte, deren ankerartige Fortsätze die Früchte im Schlammmboden befestigen (z. B. Trapa). Siehe auch Wasserkletten.

Ankömmlinge — siehe Ephemerophyten.

Anlaufen der Samen — Samen, die aufgehen bezw. künstlich zum Keimen gebracht werden.

Anlockungsantheren — IV/3 1131.

Fig. 1051. „Ananasgalle" an der Fichte verursacht durch Chermes (Adelges) abietis Kalt.



Fig. 1052. *a* Streptocarpus Wendlandi (Gesneriaceae) als Beispiel für „Anisokotylie" (eines der beiden Keimblätter wächst zu einem großen Assimilationsorgan heran). *b* Fruchtknoten mit Kelch.

Anlockungsmittel der Blumen — stehen im Dienste der Fremdbestäubung (Farbe, Duft, Pollen, Honig, Futterhaare usw.).

annuelle (einjährige) **Pflanzen** — I/LXVIII.

ánnulus (lat.) — Ring der Sporangien bei Farnpflanzen (I 5).

Anomalien der Blüte — III 507; VII Fig. 1053 (siehe Bildungsabweichungen, Verlaubung, Durchwachsung, Calycanthemie, Petalomanie, Synanthie usw.).

Anoxybiose — Leben ohne freien Sauerstoff.

Anpassungsmerkmale — lassen sich als erbliche, direkte Anpassungen an die Aussenwelt (lokale Verhältnisse) erkennen.

Ansiedler — absichtliche Einbürgerung fremder Pflanzen durch Aussaat, Anpflanzung (Fig. 1054) usw.; siehe Epoekophyten.

Antennen — VI/1 163.

anteponiert — die Blätter des inneren Kreises einer Blüte stehen vor jenen des äusseren.

anthéla — = Spirre (I/CXL; II 144).

anthéra basifíxa, erécta, dorsifíxa, versátilis — I/CXXIII.

Anthere (Staubbeutel, Staubkolben) — I/CXXII.

Antherenhälfte (théca) — I/CXXIII.

Antheridien — I 2.

Antherophyllie — Umbildung von Staubblättern in Blattspreiten.

Anthese — heisst die Entwicklung der Blütenorgane vom Ende des Knospenzustandes (Aufblühen) bis zum Eintritt des Verblühens.

Anthesmolyse — zentrale oder seitliche Durchwachsung von Blütenständen (besonders bei Dipsacaceen und Compositae).

Anthocyanblüte — siehe Mohrenblüte.

Anthocyane — Pflanzenfarbstoffe, sind im Zellsaft gelöst oder treten in Kristallform auf; selten sind sie an besonders geformte Inhaltskörper (Anthocyanophore) gebunden. Sie haben den Charakter von Glykosiden, sind stickstoffrei und als Oxoniumsalze basischer Natur (IV/2 770, 979; IV/3 1728; V/1 484, 590; V/2 979, 1548; VI/2 964).

Anthodialschuppen — VI/1 435.

Anthokarp — siehe Nyctaginaceae (III 266).

Antholyse — Auflösung der Blüte (bei Vergrünung).

Anthracophilie — Pflanzen zeigen eine Vorliebe für Brandkultur (IV/3 1699).

Anthropochoren — durch den Menschen bewusst oder unbewusst eingeführte Pflanzen (VII Fig. 1054, 1154, 1165).

anthropogene Faktoren (Kulturfaktoren) — heissen solche künstliche Einwirkungen, die durch den Menschen und die von ihm gehaltenen Haustiere herbeigeführt werden (Beweiden, Mähen, Düngen, Lauben, Brandkultur, Roden, Kahlschlag, Viehwirtschaft, Kunstrasen, Halbkulturen, Drainage, Trockenlegen von Mooren, Sümpfen usw.).

anthura — V/4 2259.

Antiapophiten — Pflanzen, die nicht oder doch selten in natürliche Gesellschaften übergehen (V/2 1064).

Antienzyme (Antifermente) — sind Antikatalysatoren von Enzymcharakter, welche auf bestimmte Enzyme eine spezifische hemmende Wirkung ausüben.

Fig. 1053. Abnorme, hemicyklische Blüte der Garten-Fuchsie. Kelchblätter z. T. verlaubt, z. T. petaloid, Petala z. T. mit Antheren versehen.

Fig. 1054. Saxifraga Cymbalaria L. (IV/2, 575), bei Oberhof im Thüringer Wald ca. 800 m angepflanzt, als Beispiel einer Anthropochoren. Phot. Curt Martin, Dresden.

Antigene — heissen Stoffe, auf deren Injektion der Organismus mit der Bildung von Antikörpern (Antitoxine, Agglutinine, Praezipitine usw.) antwortet.

antikline Wandrichtung — die Krümmung der Zellwände ist derjenigen der Oberfläche des Organes sowie den periklinen Krümmungen (siehe dort) entgegengesetzt.

Antipoden (Gegenfüssler) — I/CXLVII.
antizymotisch — V/3 1661.
Aperzeit — = schneefreie Zeit (vom Ausapern bis zum Einschneien).
apetale Blüten (Apetalie) — Blütenhülle fehlt.
Apfelsäure (Aepfelsäure) — IV/2 512 (siehe auch Säuren).
aphotische (dunkle) **Tiefenstufe der Wasservegetation** — in dieser vermögen nur noch nicht assimilierende Organismen zu leben.
aphotometrische Blätter — sind in ihrer Lage von der Richtung des einfallenden Lichtes unabhängig; sie sind öfters gezwungen, ein Uebermass von Licht, Reflexion, Absorption, Zerstreuung des Lichtes) abzuwenden.
Aphyllie — vollständige Unterdrückung der Laubblätter (siehe auch Rutensträucher und Succulenten).
Apicalöffnung an Laubblättern — I 150.
Apidenblumen — = Bienenblumen (I/CXLV).
Apilarie — Unterdrückung der Oberlippe bei normal zweilippigen Blüten.
Apogamie — Entstehung eines Sporophyten aus vegetativen Zellen (Nucellus) des Gametophyten (siehe Parthenogenese) (IV/2 804, 944; VI/1 456; VI/2 1079, 1146, 1187).
Apogamie der Pteridophyten — ist eine besondere Form der Adventivknospen-Bildung, die im wesentlichen in der adventiven Bildung kleiner Farnpflänzchen auf den Prothallien besteht (ohne dass bei der Entstehung derselben ein Befruchtungsakt vorausgeht).
Apogamie, generative — die Kerne der Mutterzellen des Sporophyten besitzen die haploïde Chromosomenzahl.
Apogamie, somatische — die Zelle bezw. der Zellkomplex, die den Sporophyten liefern, besitzt die diploïde Chromosomenzahl.
apokarpes Gynaeceum — I/CXXVII; VII Fig. 987.
Apomixis (Geschlechts- oder Zeugungsverlust) — Verlust der ursprünglich vorhanden gewesenen sexuellen Fortpflanzung, der durch einen nicht mit einer Kern- bzw. Zellverschmelzung verbundenen Vermehrungsprozess ersetzt worden ist (IV/2 181, 744, 982).
Apophyse — heisst die Verdickung der Zapfenschuppe bei Pinus-Arten (I 97).
Apophysis — vegetative, zentrale Durchwachsung eines Blütenstandes.
Apophyten (Abtrünnige) — ursprünglich einheimische, durch den Menschen aber verschleppte Arten (IV/1 69).
Aporogamie — der Pollenschlauch dringt nicht durch die Mikropyle ein (I/CXLVI).
Aposporie — Entstehung eines Gametophyten aus einem Sporophyten ohne Vermittelung von Sporen.
Apostasis — Verlängerung der Blütenachse und Uebergang der wirteligen Blattstellung in die spiralige; ferner die Trennung einzelner Blütenphyllome von den benachbarten gleichwertigen Gliedern.
apotrope Samenanlage — IV/1 25.
Appetitfärbung — I/CLIV.
apud (lateinisch) — = bei.
aquilonare Periode — siehe xerotherme Periode.
arcestída — siehe Beerenzapfen.
Archaeophyten — seit prähistorischer Zeit auf Kulturland und Ruderalstellen eingeschleppte fremde Pflanzen (V/2 942; V/3 2088).
Archegoniatae — I 2; VII 144.
Archegonium — I 2, 52, 72.
Archespor — innere Zellschichten der Mikrosporangienanlage (= Sporensack), aus denen sich die Pollenmutterzellen und weiter die Pollenkörner entwickeln (I/CXXIV, CXLVII).
Archichlamydeae — = Sympetalae (Gamopetalae, Monopetalae).
Areal — Wohngebiet, Wohnbezirk der Art bezw. Gattung.
Arealrelikt — IV/2 594.
Areolen der Cactaceen V/2 680.
Aretia-Typus — IV/2 570.
arid = dürr, trocken (Klimabezeichnung für Steppen und Wüsten).
Arillus (Samenmantel) — I/CLV; IV/3 1645 (siehe auch Scheinarillus).
arktotertiäre Disjunktion — IV/3 1115.
Armpalisaden — I/XCVIII.
Arretierungseinrichtungen bei Früchten — bezwecken eine verzögerte, jedoch für die Samenverbreitung erfolgreichere Entleerung der Früchte.
Artbastarde — durch Bastardierung von 2 verschiedenen Arten entstandene Formen (I/CXLII).
Asche (Aschensubstanz) — wird durch den unverbrennlichen Teil der Trockensubstanz gebildet.
Ascidien (Blattschläuche) — IV/1 31, 250; IV/3 1729; V/3 2059 Fig. 3037.
Ascus — schlauchförmige Zelle an einem Pilzgeflecht, die aus ihrem Innern in der Regel 8 Sporen entlässt.
asexuelle Nektarien — siehe extranuptiale Nektarien.

Aspekt (jahreszeitlicher) — Aussehen eines Pflanzenvereines zu einem bestimmten Zeitpunkte des Jahres (Frühjahr-, Sommer-, Herbst-, Winteraspekt).
Assimilationsgewebe — I LXXXV, XCVIII.
Assimilationsparenchym — I/XXXII.
Assimilationsprozess — I/XLI.
Assimilationssprosse — VI/1 247.
Assimilationsstärke — I/XIX.
Assimilationswurzel — I/LI.
Assoziation — Pflanzengesellschaft von bestimmter floristischer Zusammensetzung, einheitlichen Standortsbedingungen und einheitlicher Physiognomie.
Assoziationsgruppe — siehe Verband.
Astelie — siehe Schizostelie.
Astrosklereïden — siehe Sklereïden.
Asttod (akropetaler) — siehe Reinigung.
asymmetrische Blätter — I/XCV; V/1 663.
asymmetrische Blüten — I/CXXXV.
Asyngamie — als solche wird das ungleichzeitige Aufblühen verschiedener Individuen derselben Art bezeichnet.
Atavismus — Rückschlagserscheinungen auf die Jugend- bezw. auf die Stammform (IV/3 1162).
Atemwurzeln — I/LIX; V/2 799.

Fig. 1055. „Auenwald" in der Rheinpfalz mit Cardamine pratensis L. (IV/1, 345). Phot. G. Eigner, Speyer.

atlantische Periode — heisst die warm-feuchte, auf die boreale Zeit folgende Epoche der postglazialen Wärmezeit. Einwanderung der Buche.
atlantische Verbreitung (Arten) — das Zentrum der Verbreitung ist in den Küstenländern von Westeuropa gelegen (IV/2 836 Fig. 836; V/3 1872 Fig. 2873).
atlantisch-mediterrane Verbreitung — siehe V/3 1745.
Atmung — Energiegewinn des Organismus durch physiologische Oxydation (Dehydrierung, Verbrennung) von Nährstoffen mit Luftsauerstoff. Dementsprechend findet dabei Aufnahme von Sauerstoff und Abgabe von Kohlensäuregas statt (siehe auch intramolekulare Atmung).
Atmungshöhle — I/XXVIII.
Atmungspigment — V/2 1525.
atrope Samenanlage — I/CXXX.
Atrophie — kümmerliche Ausbildung (nicht Unterdrückung) eines Organes.
Auenwald — Bewaldung der flachen, fruchtbaren, nicht dauernd bewässerten Gebiete von Flüssen (VII Fig. 1055).
Auferstehungspflanzen (VII, Fig. 1056) — scheinen nach erfolgtem Eintrocknen bei Benetzung infolge Quellung und hygroskopischer Bewegungen zu neuem Leben zu erwachen (Rose von Jericho, Odontospermum, Selaginella lepidophylla usw.).
aufsteigende Knospendeckung — I/CXXXV.
Augen — I/LXXXI; V/4 2597.



Fig. 1056. Selaginella lepidophylla Spr. als Beispiel einer „Auferstehungspflanze", *a* nach Benetzung, *b* in getrocknetem Zustand.

Ausarten — Veränderungen in der Tracht, Behaarung usw. beim Wechsel der Lebensbedingungen (z. B. beim Verpflanzen vieler Alpenpflanzen in die Ebene).
ausdauernd (perennierend) — I/LXIX.
ausgebissen — Laubblätter sind unregelmässig gezähnt oder unregelmässig kleinbuchtig.
ausgerandete Blattspitze — I/XCV.

ausgeschweifte Laubblätter — sind mit seichten, bogenförmigen Zacken und Einschnitten versehen.
ausgesperrte Aeste — I/LXXXV.
Ausläufer (stolónes) — I/LXXXIII; V/4 2418, 2421; VI/2 1185; VII Fig. 1057 und 1103. Siehe auch ungeschlechtliche Vermehrung, Wurzelbrut usw.
Ausschlagvermögen — III 75.
Aussenkelch (calýculus, involúcrum) — Blattbildungen (paarweise verwachsene Nebenblätter der Kelchblätter oder Vor- bezw. Hochblätter), die dicht ausserhalb des Kelches gelegen sind (I/CXII, CXIX; VI/1 279).
Aussenrinde – I/XXXV, LXXXV.
australes Florenreich — siehe altozeanisches Florenreich.
Autoallogamie — manche Individuen einer Art sind für Autogamie, andere für Allogamie eingerichtet.
autochor — heissen solche Verbreitungseinheiten, deren Transport sich durch Eigenbewegungen vollzieht.
Autochorie (Selbstverbreitung) — Verbreitung der Früchte und Samen durch die Mutterpflanze ohne Mitwirkung anderer Kräfte.



Fig. 1057. Scirpus radicans Schkuhr mit oberirdischen, an der Spitze wurzelnden Ausläufern (Bd. II, 32). Phot. J. Plankenhorn, Dettingen an der Erms (Württemberg).

autochor-myrmekochore Pflanzen — neben der Myrmekochorie kommt Autochorie vor (Viola-, Euphorbia-, Mercurialis-Arten, Sarothamnus).
autochtone Pflanzen — im Gebiet urwüchsige, spontane, wilde Arten.
Autoekologie — Lebenshaushalt der Einzelart.
autoezische (autoxene) **Pilze** — diese machen ihre ganze Entwicklung auf einer Wirtspflanze durch (Gegensatz ist heteroezisch).
Autogamie (homokline Blüten, Selbstbestäubung) — I/CXLI.
Autokarpie — Fruchtansatz als Folge der autogamen Bestäubung.
autonom (autogen, spontan) — nennt man solche Vorgänge des Stoffwechsels, der Gestaltung oder Bewegung, welche durch die Eigentätigkeit des Organismus ausgeführt werden.
autonome Bewegungen — siehe Variations- und Schlafbewegung.
autonome Nutation — siehe Nutation.
Autoplasten — siehe Chloroplasten.
autotrophe Pflanzen (Autophyten) — sind chlorophyllhaltig, leben selbständig und decken normalerweise den ganzen Bedarf an organischer Nahrung durch Photosynthese.
Autumnalform (autumnale Rasse) — spätblühende Rasse saisondimorph gegliederter Arten (V/3 1983; VI/1 84).
Auxesis — ungleiche Organförderung (dorsiventrale Produktionstätigkeit).
axilläre Seitensprosse — I/LXIX.
Axillarblüte — diese gelangt im Gegensatz zur Terminalblüte in der Achsel eines Tragblattes zur Ausbildung.
Axillen der Kakteen — V/2 681.
azidiphile Arten bezw. Gesellschaften — sind kalkfliehend. Boden ist sauer. Wasserstoffzahlen 6,7 bis 3,8 <. Extrem azidiphile (pH 5 bis 3,8), mässig azidiphile (pH 6,2 bis 5) und schwach azidiphile (pH 6,7 bis 6,2) werden unterschieden.
azyklische Blüten — I/CXXXIV.

B.

bácca — Beere (I/CLI; VII Fig. 1059, 1066, 1113, 1160).
Bacillariaceae — Kieselalgen (Diatomaceen). Siehe VII 137.
Bakterienknöllchen — I/LVI; IV/3 1116, 1187 Fig. 1330; V/2 736; V/3 1715.
Bakteroiden — IV/3 1117.
Balausta — V/2 762.
Balg — Hüllspelzen (glúmae) der Gramineen (I 168).
Balgfrucht (follículus, follicárpium) — I/CL; III 453 Fig. 633

Ballisten — Pflanzen bezw. Früchte werfen, ohne einen selbsttätigen Schleudermechanismus zu besitzen, infolge eines äusseren Anstosses, die Samen auf einige Entfernung hinweg.

Balsame (Balsamharze, Weichharze, Terpentin) — in Pflanzen vorkommende Lösungen von Harzen in ätherischen Oelen, dickflüssig oder sirupdick, zuweilen an ätherischen Oelen reich und an Harzen arm (V/1 83).

Bandblatt (zosteroides Blatt) — Blatt bandförmig, an der Spitze abgerundet, ganzrandig; steht mit den Strömungen und der Tiefe des Wassers im Einklang (siehe Strömungsblätter).

Basalt — ist ein basisches, ziemlich schwer verwitterbares Ergussgestein mit einem Kieselsäuregehalt unter 55%.

basifixe Anthere — I/CXXIII.

basifugal — = akropetal I 137.

basipetal — I/CXXXIX.

basiphile (ausgesprochen) **Arten** bezw. Gesellschaften — Boden basisch. Wasserstoffzahlen $>7{,}5$ bis 7,0.

basiphil-neutrophile Arten bezw. Gesellschaften — Boden neutral bis basisch. Wasserstoffzahlen 7,5 bis 6,7.

Bastard (Hybride, Mischling) — wird das Produkt, welches aus der Kreuzung zweier oder mehrerer verschiedener Typen (reine Linie, Rasse, Varietät, Art, Gattung) hervorgeht, genannt. Siehe Tripel-, Quadrupel-, intermediärer, goneokliner Bastard, Blendling (I/CXLII; V/2 852; V/3 1727; VI/2 863, 906; VII Fig. 1058). Siehe auch Waisen, Halbwaisen, Garten-Bastard.



Fig. 1058. Betula nana L. (links) × Betula verrucosa Ehrh. (rechts) = B. Plettkei Junge (die beiden Zweige in der Mitte). Siehe Bd. III, 85. Phot. Dr. K. Magnus, Braunschweig.

Bastfasern — I/XLIII, XLIV.

Bastzellen — I/XXXVII; V/1 431.

bathybisches Plankton — Plankton der Tiefsee.

Bau des Holzkörpers — I/XC; III 508 Fig. 660.

Bauchnaht (sutúra ventrális) — heisst bei Früchten die samentragende, der Blütenachse zugekehrte Naht.

Bauchsammler — langrüsselige Bienen, bei denen sich der Pollen auf der Unterseite des Hinterleibes in den starren Borstenhaaren (Bauchbürste) sammelt. Siehe Schienensammler.

Bäume (siehe Gehölze) — sind Holzpflanzen von meist hohem Wuchs, die einen Hauptstamm besitzen; letzterer erneuert sich nur nach katastrophenartigen Eingriffen durch Aeste oder durch Wurzelbrut (I/LXIX).

Baumgrenze (obere) **im Gebirge** — Verbindungslinie der obersten hochwüchsigen Einzelbäume (siehe Krüppelzone); sie wird durch die Baumart, klimatisch, orographisch und wirtschaftlich bedingt.

Baumwürger — V/1 500.

Becher (cúpula) — I/CXII; VII Fig. 1050.

Becherrost — IV/1 8.

Bedeguar — siehe Schlafäpfel (VII Fig. 1140).

Beere (bácca) — I/CLI; VII Fig. 1059, 1066, 1113, 1160.

Fig. 1059. Cucumis sativus L., Gurke (VI/1 321), einjähriges Kletterkraut mit vielsamigen Beerenfrüchten. Phot. Dr. G. Hegi.

Beerenzapfen (gálbulus) — die paarig oder zu drei quirlig stehenden Deckschuppen des Zapfens verbinden sich völlig und bilden ein Fruchtfleisch, das bis 3 hartschalige Samen einschliesst (Wacholder, I 91).

Befall — siehe Infektion.

Befruchtung — I/CXLVI, CXLVIII.

Befruchtungssäule (gynostémium) — I/CXXIV; II 322.

behöfte Tüpfel — siehe Hoftüpfel (I/XXIV).

Beiknospen (accessorische Knospen) — mehrere Knospen treten in einer Blattachsel auf (I/LXIX).

Beiknospen, kollaterale — diese stehen in einer Blattachsel in einer Querreihe nebeneinander.

Beiknospen, seriale — diese stehen in einer Blattachsel übereinander (I/LXIX).

Beiwurzeln — siehe Adventivwurzeln (V/2 897).

Benthos — Vegetation des Wassers, die am Boden durch Haftorgane, Rhizoiden oder Wurzeln fixiert ist.

benzoloide Düfte — gehen von aromatischen Stoffen aus, von Derivaten des Benzols, in welchen der Wasserstoff des Benzolkernes durch die Aldehydgruppe, Aether- und Estergruppen ersetzt ist (Nelken-, Hyazinthen-, Waldmeister-, Flieder-, Vanille-, Geissblattduft).

bereift (pruinósus) — mit meist leicht abwischbarem Wachs überzogen.

Bernstein (Succinit) — ist ein fossiles erhärtetes Harz, das tierische und pflanzliche Einschlüsse enthalten kann. Der baltische oder Ostsee-Bernstein stammt von Pinus succinifera Conwentz (als Sammelart) der ältesten Tertiärzeit und enthält 3 bis 8% Bernsteinsäure.

Bernsteinsäure (Aethylenbernsteinsäure $C_4H_6O_4$) — gehört zu den Dikarbonsäuren und entsteht u. a. als Begleitprodukt bei der alkoholischen Gärung (V/1 400), so dass sie sich stets in Bier und Wein vorfindet.

Berührungsreiz — siehe Haptotropismus.

Bestäubung — I/CXLI (siehe auch Caprifikation und Kleistogamie).

Bestäubungstropfen — heisst der bei Gymnospermen aus der Mikropyle ausgeschiedene Flüssigkeitstropfen, der zum Auffangen der Pollenkörner dient.

Bestäubungsvermittler — I/CXVIII.

Bestockung — Bildung von Seitensprossen an den oberirdischen, dem Boden benachbarten Knoten (I 276, 374; IV/3 1421; V/2 1021).

Beulenbrand (Mais) — siehe Brand (VII Fig. 1068).

Beutelgallen — III 58, 118; VII Fig. 1060.

bewegliche Stärkekörner — siehe Statolithen.

Bewegung — siehe Nutation.

Bewegungsstarre — siehe Starrezustand.

bewehrt — mit Stacheln oder Dornen versehen.

biachænium — heisst die Frucht bezw. Doppelfrucht vieler Rubiaceen.

Biastrepsis — siehe Zwangsdrehung.

bibácca — siehe Doppelbeere (Lonicera-Arten).

Biegungsfestigkeit — I/XXXVIII.

Bienenblumen — I/CXLV.

biénnis (zweijährig) I/LXVIII.

bifazialer Blattbau — I/XCVIII.

bifollículus — siehe Doppelbalg.

bikollaterale Leitbündel — I/XLIII.

Bilabiolie — V/4 2263.

Bilabrie — V/4 2263.

Bilanzquotient — Verhältnis zwischen Wasseraufnahme durch die Wurzel und Wasserabgabe durch die verdunstenden Teile.



Fig. 1060. *a*, *b* Beutelgallen auf Buchenblättern, verursacht durch die große Buchengallenmücke Mikiola fagi Hartig. *c* Galle im Längsschnitt mit Larve.



Fig. 1061. Steinkerne von Juglans regia L. (III, 7) sind aus 3 Karpellen zusammengesetzt, zeigen 3 dorsale Dehiscenznähte und 3 Keimblätter.

bilateral — zweiseitig-symmetrisch.

Bildungsabweichungen — siehe Teratologie, Monstrositäten, Diaphyse, Durchwachsung, Vergrünung, Gallen, Fasciation, Panaschierung (VII, Fig. 1053, 1061, 1065, 1074, 1076, 1077, 1078, 1091, 1107, 1117, 1121, 1125, 1153, 1154, 114).

Bildungsgewebe (Cambium) — I/LXXXVI, siehe auch Meristeme.

biloméntum — Gliederschote.

binäre Bezeichnung — jede Art führt (seit Linné bezw. Caspar Bauhin) 2 Namen, den Gattungs- und einen Artnamen.

Binsenblatt — siehe junkoides Blatt.

Biocoenologie — Lehre von den Organismengesellschaften.

Biologie — im weiteren Sinne Sammelbegriff für die Lebewesen überhaupt; sie umfasst also auch die sämtlichen Sonderdisziplinen wie Anatomie, Cytologie, Morphologie, Abstammungslehre usw. Neuerdings wird Biologie meist enger gefasst und mit Oekologie identifiziert.

Bionomie — Oekologie auf experimenteller Grundlage.

Bioteknose (endokarpe Keimung) — Keimung innerhalb der Frucht (fälschlich auch als Viviparie bezeichnet).

biotische (organogene) **Faktoren** — Einflüsse der lebenden Umwelt (Pflanzen und Tiere) auf die Vegetation (Beschattung, Windschutz, Bodenbearbeitung durch Mikroben, Würmer usw., Bodenzersetzung und Stickstoffbildung durch Mikroben, Bestäubungsvermittler, Konkurrenz, zerstörende Schmarotzer).

bipolare Pflanzen — IV/2 891.
Bitterstoffe — Pflanzenstoffe schlecht- oder unbekannter Konstitution, sind wohl in glykosidische und nichtglykosidische zu trennen; alle besitzen einen bitteren Geschmack.
biziliate Pteridophyten — Spermatozoiden besitzen 2 (bis 3) Cilien (Lycopodium, Phylloglossum, Selaginella).
Blähfrüchte — IV/3 1404, 1457; V/1 261.
Blättchen (folíola) — Teilblatt eines zusammengesetzten (gefiederten, gefingerten usw.) Laubblattes (I/XCIV).
Blasen (der Utricularien) — I/CIX; VI/1 163.
Blasenflieger — Früchte bezw. Samen von annähernd kugeliger Gestalt, mit luftgefüllten Hohlräumen und deshalb von geringem spezifischem Gewicht.
Blasenfrüchte — der Luftraum liegt inner- oder ausserhalb der blasig aufgetriebenen Frucht (Physocarpus IV/2 680, Koelreuteria V/1 308, Cardiospermum V/1 307, Trifolium fragiferum, Ostrya, Astrantia).
Blasenhaare — III 225.
Blasenkelche — besorgen wohl zum Teil als Windfang die Verbreitung von Früchten (siehe V/4 2582).
Blasenzellen — siehe Gelenkzellen.
Blastomanie — siehe Kladomanie.
Blattabänderungen — I/CXV.
Blattadern (vénae) — I/XCVII; III 135, 25.
Blattbau — II 6, 146, 158, 171, 226; III 337, Fig. 592; V/1 506, 564; V/4 2519, 2551; VI/2 679.
blattbürtige Blüten — V/1 650; V/2 1539.
blattbürtige Knospen bezw. Adventivsprosse — I/LXX; IV/1 56, 321, 344 Fig. 820 k.
Blattdimorphismus — I/CXIV; I 130; IV/1 261; V/1 371.
Blattdivergenz — I/LXXII, LXXIII.
Blattdorn — I/CVI; IV/1 7; V/1 58.
Blattentwicklung — V/2 1016, Fig. 2376.



Fig. 1062. Sagina nodosa (L.) Fenzl (III, 388). Im Herbst bilden sich in den Blattachseln kleine Blattknospen (Kurztriebe) aus, die durch Absterben der heurigen Sprosse frei werden, überwintern und im Frühjahr zu neuen Pflänzchen heranwachsen.

Blattfläche (Blattspreite, lámina) — I/XCIV.
Blattformen (Blatt-Typen) — I/XCIV; III 451, 452; IV/2 641, Fig. 979; V/1 663, Fig. 2097.
Blattgelenke — siehe Gelenkpolster.
Blattgrün — I/XIX (siehe Chlorophyll).
Blattgrund (básis fólii) — I/XCV.
Blatthäutchen (lígula) — I 130 Fig. 58; I 167, 168; II 5.
Blattkeimer — siehe Dicotyledones (I 3; III 5; VII 74, Fig. 1109).
Blattkissen — I/XCIV.
Blattkletterer (Blattklimmer) — Teile (Stiel, Spreite, Spitze) des übrigens nicht modifizierten Laubblattes besitzen die zum Ranken erforderliche Reizbarkeit (I/CVII).
Blattknospen — I/LXIX; IV/2 727, Fig. 1053; VII Fig. 1062.
blattlose Sprosse — siehe Aphyllie.
Blattmosaik — Anordnung der Blätter eines Sprosssystems im Sinne einer möglichst geringen gegenseitigen Beschattung (Geum Trapa, Aristolochia usw.).
Blattnarbe — Insertion des Laubblattes an der Stengeloberfläche.
Blattnektarien — Sekretionsorgane an Blattgebilden (z. B. bei Pteridium).
Blattnervatur — I/XCVII.
Blattohren — V/1 665; VI/1 406.
Blattpolster — siehe Gelenkpolster.
Blattpolymorphismus — V/2 919 (siehe auch Heterophyllie).
Blattquirl — I/LXXII (siehe auch Scheinquirl).
Blattrand (márgo fólii) — I/XCVI.
Blattranker — das Blatt bezw. ein Teil desselben dient als Ranke (I/CVII); siehe auch Blattkletterer.
Blattrippe — siehe Blattnervatur.
Blattrosette — I/LXVII.
Blattscheide (vagína) — I/XCIII.
Blattscheidenranker — II 280.
Blattschläuche — siehe Ascidien und Kannenpflanzen.
Blattsegment (segménta foliórum) — heissen die Abschnitte bezw. Lappen einfacher Blätter.
Blattspitze (ápex) — I/XCV.
Blattspitzenkletterer — das Ranken erfolgt mit der Blattspitze.
Blattspreite — I/XCIV.

Blattspreitenkletterer — das Ranken erfolgt mit der Blattspreite bezw. Blattspindel (Fumaria, Adlumia).
Blattspurstränge — I/XLV.
Blattstacheln — V/1 240.
Blattsteckling — I/CLVIII; V/1 665.
Blattstellung, sekundäre — I/LXXIV; siehe auch V/2 2549.
Blattstellungslehre (Phyllotaxis) — I/LXXII.
Blattstiefel (óchrea) — I/CVI; VII 18, Fig. 1018.
Blattstiel (petíolus) — I/XCIII; siehe auch geflügelter Blattstiel (VII Fig. 1093).
Blattstielkletterer — das Ranken erfolgt mit dem Blattstiel (Clematis).
Blattstiel-Querschnitt — V/4 2385, 2390.
Blattsukkulenten — I/LXXVIII, CIII, CIV; VII Fig. 1063 und 1152.
Blattube (óchrea) — I/CVI; VII Fig. 1018.
Blattverschiebung — V/4 2549.
Blattzähne — I/C (siehe auch Sägeblatt).
Blauglanz — III 162; V/1 132, 252; V/3 1860.
Blausäure — III 587; IV/2 1056, 1091.
Bleicherdeböden — siehe Podsol.
Bleichsucht — = Chlorose.
Blender-(Plänter-)wald — zeigt im ganzen Bestand eine stetige Verjüngung ohne Unterbrechung. Eigentliche Verjüngungsflächen fehlen. Die Bäume werden dem Hochwald einzeln entnommen.
Blendling — Mischlingsprodukt von Varietäten (im Gegensatz zu Artbastarden).
Blockschutt — Blöcke haben einen Durchmesser von mehr als 25 cm.
Blüte — I/CXVI, CXVII.
Blütenanomalien — III 507; V/3 2011; VII Fig. 1053, 1065, 1071, 1073, 1074, 1121, 1125.
Blütenboden — I/CXVII.
Blütendiagramm — I/CXXXV.
Blütendimorphismus — VI/2 625.
Blütendüfte — werden durch ätherische Oele (siehe dort) bedingt, die von Drüsenhaaren oder interzellularen Exkretbehältern abgesondert werden.
Blütenfarbstoffe — siehe Anthocyane.
Blütenformel — I/CXXXV, CXXXVI.
Blütengrundriss — siehe Diagramm.
Blütenhülle (chlámys) — I/CXVIII.
Blütenknospe — I/LXIX; IV/2 727; V/3 1613; VII Fig. 1064.
Blütenkopf (capítulum) — I/CXXXVIII; VI/1 394, 396.
Blütenkorb (capítulum) — VI/1 394, 396.
Blütenkreis (Zyklus) — I/CXXXIV.
Blütenkrone — siehe Blumenkrone (I/CXIX).
Blütenmissbildungen — II 205, 206, 328; III 507; V/3 2011; VII Fig. 1053, 1065, 1069, 1071, 1073, 1074, 1087, 1124, 1152.
Blütenscheide — siehe Spatha.
Blütenstände (Infloreszenzen) — I/CXXXVI.
Blütenstände, gemischte — I/CXXXVII (siehe auch Dibotryen und Botryo-Cymen).
Blütenstandsstiel (pedúnculus) — siehe Blüte.
Blütenstaub (Pollen) — I/CXXIV; I 73, 142; V/1 1956.
Blütenstiel (pedicéllus) — I/CXXXIII.
Blumen — werden von Insekten oder Vögeln besucht und bestäubt; sie sind durch Färbung, Duft, Saftmale usw. ausgezeichnet. Blüte ist ein morphologischer Begriff.
Blumenkrone (corólla) — I/CXIX.
Blumengerüche — siehe Blütendüfte.

Fig. 1063. Mesembryanthemum acinaciforme L. (III, 267) auf Corsika, als Beispiel einer „Blattsukkulenten". Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.



Fig. 1064. Blütenknospe der Pfingstrose (Paeonia Moutan Sims), links von außen, rechts im Längsschnitt.

Blumenstetigkeit (Blumentreue) — gewisse Insekten haben eine grosse Vorliebe für ganz bestimmte Blumen oder besuchen diese ausschliesslich.

Blumenuhr — da das Oeffnen der Blüten bei gleicher Art zur gleichen, bei verschiedenen Arten aber zu verschiedenen Tageszeiten erfolgt, konnte Linné auf Grund der Oeffnungszeiten verschiedener Blüten eine „Blumenuhr" zusammenstellen.

Bluten (Tränen) — darunter versteht man das Hervorpressen von Wasser aus Wundstellen (siehe Guttation).

Bocksduft — rührt von Säuren, wie der Capronsäure [$CH_3(CH_2)_4COOH$] her (Himantoglossum).

Bodenazidität — hängt vom Gehalt an Wasserstoff-Ionen ab (siehe V/3 1618) und geht ihm parallel.

Bodenfaktoren — siehe edaphische Faktoren.

Bodenklimax — das klimatisch bedingte Schlussglied der Bodenentwicklung (V/3 1618).

Bodenläufer (Früchte) — VI/2 800.

Bodenmüdigkeit — ist da, wenn ein Boden sich für die Kultur einer bestimmten Pflanze als ungeeignet erweist (V/1 24).

Bodenroller — die zu Kugeln spiralig zusammengerollten Früchte verschiedener Hülsenfrüchtler (Medicago) lösen sich von ihren Fruchtstielen leicht los und werden von jedem Windstoss über den Boden fortgerollt. Siehe auch Bodenläufer.

bodenstete Pflanzen — halten sich streng an eine bestimmte mineralogische Unterlage.

bodenvage Pflanzen — sind bezüglich der Bodenart indifferent (III 402; IV/1 384).

Bodenverbesserer — IV/3 1143.

Bodenwiesen (terripráta) — werden im Gegensatz zu den Wasserwiesen vom Grundwasser nicht beeinflusst.

Bodenzeiger — Pflanzen bezw. Pflanzenvereine, die nur auf bestimmten Böden vorkommen.

bogennerviges Blatt — I/XCVII; VII Fig. 1066.

Bohnen, pythagoraeische — III 438.

Bohrfrüchte (Bohrkletten) — heissen solche Fruchtformen, die nadelartig zugespitzt und an der Pflanze so angeordnet sind, dass sie sich in die Haut vorüberstreifender Tiere bezw. in die Erde einbohren können (Carex-, Scirpus- und Rhynchospora-Arten, Triglochin, Stipa, Andropogon. Siehe auch Erodium IV/3 1724).

Bohrspitze geophiler Pflanzen (Fig. 1067a) — mehrere junge Blätter legen sich zu einem zugespitzt kegelförmigen Gebilde zusammen, mit dem sie den Waldboden durchstossen (besonders Monokotyledonen).

Bombardierpflanze — III 137.

Boragoid — V/3 2125.

boreale Periode — warmer und trockener, auf die subarktische (praeboreale) Periode folgender postglazialer Zeitabschnitt. Föhrenperiode.

Borke — Borken sind durch sekundäre (Folgeperiderm) Gewebe zum Absterben gebrachte Rindenteile, gleichgültig ob sie gesunden oder kranken Pflanzenteilen entstammen (IV/2 580). Siehe Ringel- und Schuppenborke.

Borkenbildung — I/XXXI.

Fig. 1065. „Verzweigte Aehren" vom Roggen (Secale cereale L.). Phot. Alfred Löwenfeld, Ludwigshafen a./Rh.



Fig. 1066. Polygonatum multiflorum (L.) All. (II, 270). *a* Fruchtender, plagiotroper Spross mit bogennervigen Laubblättern. *b* Beeren. *c* Beere geöffnet. *d* Samen.

borstenförmiges Blatt — I/CIII.
Borstenhaare der Boraginaceen — V/3 2125, 2178, 2185, 2187.
bóstryx — siehe Schraubel (I/CXXXIX).
Botryo-Cymen — heissen solche gemischte, zusammengesetzte Blütenstände, bei denen cymöse Infloreszenzen nach dem botrytischen Typus angeordnet sind (Köpfchendichasien, Köpfchensichel, Traubenwickel usw.).
botrytische Blütenstände — I/CXXXVII.
Brachyplast (Stauchspross, Kurztrieb) — I 93.
Brachysklereïden (Bracheïden) — Bezeichnung für Steinzellen (I/XXXVII).
brachystyl — I/CXLIII.
bráctea (Tragblatt) — I/LXIX.
bracteoïd — tragblattartig.
Bracteolen — V/4 2259.
Bracteomanie — V/1 104.
bradyspor (Brachysporie) — IV/2 811; V/4 2262.
Brand (Getreide-, Flug-, Staubbrand) — Brandpilze (Ustilaginaceae; VII 142) erzeugen krankhafte Erscheinungen, zerstören Pflanzenteile und bilden an ihrer Stelle eine schwarze, pulverige, aus Chlamydosporen bestehende Masse.
Brandbeulen (Beulenbrand) — heissen die bei der Maispflanze an den Blüten und vegetativen Teilen durch den Brandpilz Ustilago Maydis (DC.) Tul. (= U. Zéae [Beckm.] Unger) erzeugten augenfälligen Beulen (VII Fig. 1068).
Brennhaare — I/XXIX, XXX; III 138; V/1 661.
Bretterwurzeln — sind seitlich zusammengedrückt (enorme Epitrophie des Holzkörpers) und verlaufen z. T. über dem Boden. Sie dienen offenbar zur Verstrebung der Stammsäule (besonders bei tropischen Bäumen, doch auch bei der Pyramidenpappel, Weiden).
Bruchfrucht — = Gliederfrucht (I/CL).
Bruchwälder (Paludilignosa) — charakterisiert durch das höchste Mass von Bodennässe und Versumpfung.
Brutbecher — I/CLVII.
Brutknöllchen (Zwiebelbrut) — I/LXXXII; II Fig. 336b; IV/1 326; VII Fig. 1062, 1069; siehe auch Viviparie.
Brutknospen — I/CLVII; I 64; IV/1 53, 56.
Brutzwiebeln — siehe Brutknöllchen.
Bülten (Bulten, Hochmoorbulten) — Kuppen aus Sphagnum, oben oft trocken und Ericaceen oder Laubmoose tragend.



Fig. 1067. *a* Polygonatum multiflorum (L.) All. (II, 270). Rhizom mit austreibendem Spross („Bohrspitze"). — *b* Polygonatum verticillatum (L.) All. (II, 273). Junge Pflanzen.

Bürsteneinrichtung der Schmetterlingsblüten — IV/3 1136.
Büschel (fascículus) — I/CXL.
Büschelhaare — V/1 482, 484.
Bulben — Luftknollen der Orchidaceen (I/LXXX, Fig. 110).
Bulbillen-Typus — IV/2 570.
búlbus (Zwiebel) — I/LXXXII.
Buntsandstein (Trias) — siehe Geologische Formationen.
Buschweiden — werden Gebüschgruppen bezeichnet, die nicht rein klimatisch, sondern edaphisch und häufig biotisch (z. B. durch Beweiden) oder anthropogen bedingt sind.
Buttersäuregärung — ist ein Spaltungsprozess ohne Oxydation; aus verschiedenen Kohlehydraten, am besten bei 35°, kann durch bestimmte Bakterien Buttersäure, eine höhere Fettsäure [$CH_3 (CH_2)_2 COOH$], unter gleichzeitiger Bildung von Kohlensäure, Wasserstoff usw. entstehen.

C.

calcifug — kalkhaltigen Boden fliehend.
Calciumoxalat (oxalsaurer Kalk) — die meisten Kristallbildungen in der Zelle bestehen aus Calciumoxalat ($Ca C_2 O_4$ mit 1 oder 3 H_2O).
Callus — I 202.
Calycanthemie — Umbildung von Kelchblättern zu blumenblattartigen Gebilden (V/3 1731; VI/1 331).

calycinisch — Blütenhülle von kelchartigem Aussehen.
calyculus — III 145, 150.
Calyphyomie — Anwachsen einzelner oder aller Kelchblätter an den Rücken der Petalen.
cályx — siehe Kelch (I/CXVIII, CXIX).
Cambiformzellen — I/XLIII, XLIV.
Cambium (Teilungsgewebe) — I/XXVII, XLI, LXXXVI; III 210.
Cambium, tertiäres — III 210.
campylotrope (krummläufige) **Samenanlage** — I/CXXXI; III 271.
Cantharophilae — = Käferblumen.
capítulum (cáput) — I/CXXXVIII; VI/1 394, 396.
Caprification — III 126.
cápsula — = Kapsel (I/CL; VII Fig. 1070, 1075, 1108, 1115, 1148).
Carbon — siehe Geologische Formationen.
carcérulus — Bezeichnung für die Teilfrucht der Labiatae und Boraginaceae.
Carcinoma — = Krebs.
carína — = Schiffchen (I/CXXXI; IV/3 1135).
carinale Hauptrippen — V/2 932.
Carinalhöhlen — I 51.
carnivor — fleischfressend.
Carotin — I/XIX, XX; V/2 1525; s. a. Chlorophyll und Vitamine (VII 126).
Carpellomanie — sämtliche Blütenkreise bestehen aus Fruchtblättern (V/1 34).
Carpophor (Karpellträger) — I/CL.
Carpopodien — IV/3 1464.
Caruncula — I/CLV; II 174; V/1 116.
Caryopse — Frucht der Süssgräser (I 170).
Caspary'sche Punkte — I/LXII.
caúdex (Stock) — I/LXXXIV.
caudículae — siehe Orchideenblüte.
caulídium — Spross der niederen Pflanzen.
Cauliflorie — IV/2 753.
caúlis — Stengel, Spross, Trieb bezw. Hauptspross, Hauptachse.
caúlis intermédius — V/2 1096.
Cecidien — siehe Gallen und VII Fig. 1071.
céllula (Zelle) — I/XVIII.
Cellulose (Zellstoff) — siehe Zellulose.
Cenanthie — = Leerblütigkeit, d. h. Fehlen sämtlicher Sexualorgane in einer Blüte.
Centralplazenta—I/CXXX; III 271, 277, 301.
centrifugale Verdickung I/XXV.
centrifugale Wasserableitung — I/LVI.
centripetal (aufsteigend)—I/CXXXVII.
centripetale Verdickung—I/XXV.
centripetale Wasserableitung — I/LV.
Cephalium (Wollklappe d. Cactaceen) — V/2 680.
Ceratomanie — Umbildung von Phyllomen in röhrenförmige, sporn- oder hornartige, oft Nektar führende Organe.
Chalaza (Nabelfleck) — I/CXXX.
Chalazogamie — III 6, 83 (Fig. 480 r, s), 118; IV/2, 944, 949.
Chamaephyten (Oberflächenpflanzen, Zwergpflanzen) — die Erneuerungsknospen liegen wenig über der Erdoberfläche (IV/2 512; VII, Fig. 1072).

Fig. 1068. Brandbeulen vom Mais, verursacht durch den Brandpilz Maydis Ustilago (DC.), Tul. (= U. Zea [Beckm.] Unger).

Fig. 1069. Allium vineale L. (II, 217). Kopf in der Mitte mit Blüten, Kopf rechts mit Blüten und einzelnen auswachsenden Brutzwiebelchen, Kopf links nur mit ausgewachsenen Brutzwiebelchen. Phot. Dr. Fr. Kollmann, Weilheim (Oberbayern).

Chaptalisieren — V/1 401.
chasmogam (chasmopetal, offenblütig) I/CXLII; V/1 591.
chasmantherische Cleistogamie — IV/3 1549.
Chasmophyten (Chamochomophyten) — wachsen in mit humushaltigem Detritus gefüllten Felsspalten (IV/2 823; V/1 339; VII, Fig. 1147).
Cheilomanie — zygomorphe Blüten besitzen statt des einen Labellums mehrere Lippen.
chemosynthetische Kohlensäureassimilation — Kohlensäureassimilation erfolgt ohne Licht und Chlorophyll durch Salpeterbakterien. Die nötige Energie wird durch die Oxydation von Stickstoffverbindungen erzeugt.
Chemotaxis — freie Ortsbewegung auf chemische Reize hin.
Chenophyllie — Verlaubung von Phyllomen (VII Fig. 1073).
Chersophyten — Pflanzengesellschaften auf Oedland.
Chimären — siehe Pfropfbastarde.
Chimophyten — = Detrituspflanzen.
chinochor — Verbreitung durch Schneegestöber.
chinophile Pflanzen — siehe Schneeschützlinge.
chinophobe Pflanzen — siehe Schneeflüchtlinge.
Chiropterophilae — Fledermausblumen.
chlámys (Blütenhülle) — I/CXVIII.
Chloranthie (VII Fig. 1074) — Vergrünung sämtl. Kreise von Blüten (VII Fig. 1074); vgl. auch Verlaubung I/CXVII.
Chlorenchym — im engeren Sinne Mesophyll, im weiteren Sinne gleichbedeutend mit grünem Assimilationsgewebe.
Chlorophyll — grüner Farbstoff der Pflanzen. Es besteht aus 2 gelben, dem orangeroten Carotin ($C_{40}H_{56}$) und dem gelben Xanthophyll ($C_{40}H_{56}O_2$) und zwei grünen Farbstoffen, dem Chlorophyll a und b. Beides sind Tricarbonsäuren, deren eine Carboxylgruppe mit Methylalkohol, die zweite mit Phytol (ungesättigter hochmolekularer Alkohol) verestert sind, während die dritte an Stickstoff gebunden ist. Chlorophyll a: $(MgN_4\ C_{32}\ H_{30}\ O)\ CO_2\ CH_3\ CO_2\ C_{20}\ H_{39}$; Chlorophyll b: $(MgN_4\ C_{32}\ H_{28}\ O_2)\ CO_2\ CH_3\ CO_2\ C_{20}\ H_{39}$.



Fig. 1070. Kapselfrüchte (*a*) und Samen (*b*) von Hemerocallis flava L. (II, 205).

Fig. 1071. *a* Gallbildung (verursacht durch Ustilago luzulae Sacc.) von Luzula luzulina Dalla Torre et Sarnth. (= L. flavescens Gaud.). An Stelle der Blüten sind büschelförmige Schöpfe schmaler Blättchen vorhanden. *b* Normale Blüte.

Chlorophyllkörner — I/XIX.
Chloroplasten (Chloroplastiden, Autoplasten) — I/XIX.
Chlorose, Bleichsucht (Ikterus) — ist vor allem durch Eisenmangel bedingt.
Cholesterin — ist ein einwertiger Alkohol ($C_{26}H_{43}OH$), findet sich in Pflanzen-Oelen und Fetten.
Chomophyten — Erdwurzler, Detrituspflanzen.
choripetal (freikronblätterig) — I/CXXI; III 6.
Choripetalae — III 6.
chorisepal — Kelchblätter sind nicht verwachsen.
Chorise — Spaltung (laterale und seriale) eines Organes (IV/2 637).
Chromatophoren (Farbstoffträger) — I/XIX, XXI.
Chromoretine — Farbharze, welche gefärbte Harzsubstanzen enthalten (z. B. Gummigutti).
Chromosomen — I/XVIII.
Chylocaulen (Stammsaftpflanzen) — I/LXXVII.
Chylophyllen — = Blattsaftpflanzen (VII Fig. 1063 und 1152).
Chymase — siehe Labferment.
cicatrícula — Keimmund.

Cilien (Geisseln) — I/XVIII; siehe auch Spermatozoiden.
Cimaruoli — siehe Caprifikation (III 126).
cincínnus — siehe Wickel.
circumpolar — heissen Arten, die, von Unterbrechungen abgesehen, über die nördliche Halbkugel (Europa, Asien und Nordamerika) verbreitet sind.
círrhus — siehe Ranke.
Cladodien (Flachsprosse) — I/LXXVI.
Cleistogamie — I/CXLII; IV/3 1549, 1652; V/1 591; V/3 1652, 2218; V/4 2454; VI/1 367. Siehe auch Pseudocleistogamie.
Cleistokarpie — siehe Kleistokarpie.
Climax (der) — klimatisches Endstadium einer Pflanzengesellschaft.
cochleare Aestivation — ein Blatt liegt ganz nach aussen, eines ganz nach innen, die drei andern halb aussen, halb innen.
Coenobien — Zellkolonien von einzelligen, gleichwertigen Individuen (I/XVII).
Coenocarpium — I/CXLVIII; V/2 1543.
Coenomonoezie — I/CXXXII.
Coleoptile (Keimblattscheide) — I 170.
Coleorrhiza (Wurzelscheide) — I 170.
collaterale Beiknospen — siehe Beiknospen.
collaterales Leitbündel — I/XLIII; I 166 Fig. 76.
colline Stufe — = Hügelstufe.
Collodium (Klebäther) — ist eine Auflösung von Collodiumwolle in Alkohol und Aether (V/1 462).
Collodiumwolle — hauptsächlich Dinitrozellulose, in Aether-Alkohol löslich.
Coma (Haarschopf) — V/2 812; siehe auch Flughaare.
Commissuralfurche — I 51.
Concauleszenz — V/4 2549.
Conilignósa — siehe Aciculignósa.
conjunctum — = Chalaza.
Connectivfortsatz — I 120.
cónus — siehe Zapfen.
Cormophyten (cormóphyta) = Pflanzen mit typischem Sprossbau (wie die Archegoniaten, Pteridophyten, Gymnospermen und Angiospermen).
córmus — Stamm.
corólla — siehe Krone.
corólla personáta — I/CXX.
Corolliflórae — = Sympetalae.
Coryophyllie — abnormales Auftreten eines absolut terminalen Blattes, das unmittelbar aus einem Sprossvegetationspunkt hervorgeht.
cósta — = Rippe (siehe Nervatur).
cóstae — siehe Merikarpium (V/2 927).
Cotyledo — Keimblatt I/XLVI.
craspédium (Rahmenhülse) — IV/3 1121.
cremocárpium — Bezeichnung für die Frucht der Umbelliferae.
Cribralprimanen — I/XLV.
Cribralteil (Siebröhrenteil) — I/XLI.
cúlmus — hohler, knotig gegliederter Halm der Gramineen (I 166).
Cumarin — I 198, 201; IV/2 1072; IV/3 1237, 1497; VI/1 202.
Cupula (Achsenbecher) — I/CXII; VII Fig. 1050.
Cuticula (äusserste Schicht der Oberhaut) — I/XXVI, XXVII.
Cyathienvergrünung — V/1 138.
Cyathium — I/CXII; V/1 114, 137; V/3 2187.
Cyma — V/4 2259.
cymöse Blütenstände — I/CXXXIX.
Cystolithen (Traubensteine) — I/XXVI; V/3 2187; VI/1 312.

Fig. 1072. Empetrum nigrum. L. (V/3, 1603), als Beispiel eines Chamaephyten.

Fig. 1073. Chenophyllie. Die Kelchblätter einer Garten-Rose sind laubblattartig ausgebildet

Fig. 1074. Vergrünung (Chloranthie) der Blüte von der Herbstzeitlose (Colchicum autumnale L.). Siehe Bd. II, 196.

D.

dachige Knospendeckung — I/CXXXV.

Dauergewebe — I/XXVII.
Deckblatt (bractéa) — I/LXIX, CXXXIII.
Deckelkapsel (pyxídium) — I/CLI; V/3 1871; VI/1 178.
Deckhaare — I/XXX.
Deckklappen — = Schlundschuppen (I/CXX; V/3 2123).
Deckschuppe — I 77
Deckspelzen — I 168.
Dédoublement (Chorise) — Spaltung eines Organes.
Deformation — allgemeiner Ausdruck für jede unregelmässige Ausbildung eines Organes bezw. eines Komplexes von Organen.
Degeneration — verkümmerte Ausbildung (Schwund) eines Organes, von Gewebe- oder Zellteilen, mit welcher eine Formveränderung oder die Bildung von Zersetzungsprodukten (Gummosis) einhergehen kann.
Dehiszenz (VII Fig. 1075) — Aufspringen kapselartiger Organe (Früchte, Antheren).
dekussierte (kreuzweise gegenständige) **Blattstellung** — I/LXXII; V/4 2255.
Denitrifikation — Nitrate werden durch Salpeter zerstörende Bakterien (Bacterium denitrificans, B. Stutzeri u. a.) in Nitrite, und diese wiederum in elementaren Stickstoff übergeführt
Dermatitis — Erkrankung (Ekzembildung) der Haut- und Schleimhäute durch reizende Stoffe (siehe Primeldermatitis [V/2 1721], Teakholzdermatitis, Sumachdermatitis [V/I 219/220], Pollenallergie, Urticaria).

Fig. 1075. Früchte von Diervilla florida Sieb. et Zucc. (VI/1 235) mit kapselartiger Dehiszenz.

Dermatogen (Protoderm) — heisst die äusserste Zellschicht des Vegetationsscheitels; aus ihr geht die Oberhaut im allgemeinen hervor (Hautbildungsgewebe).
Dermatokalyptrogen — Bildungsgewebe, das die Wurzelhaube und die Wurzelepidermis liefert.
Dextrine — siehe Kohlenhydrate.
Dextrose — siehe Zucker IV/2 648, 770, 774, 989, 1077.
Diadelphia (I/ CXXIII) — XVII. Klasse des Linné'schen Systems (Staubblätter bezw. Staubfäden in zwei Bündel verwachsen).
Diagramm (Blütengrundriss oder Horizontalprojektion) — I/CXXXV, CXXXVI.
Dialypétalae = Perianth (mit Ausnahme abgeleiteter Formen) doppelt (meist mit Kelch- und Kronblattkreis).
Dialysis — Trennung von normal vereinten, ihrer Natur nach homologen Organen.
Diamesogamae — heissen Pflanzen, deren Befruchtungskörper (Pollen) zur Uebertragung besonderer Vermittler bedürfen.
Diandria — II. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit 2 freien Staubblättern).
Diaphragma (Querwand) — I 51, 166.
Diaphyse — zentrale Durchwachsung von Blüten, wobei die durchwachsende Achse Blüten bezw. einen Blütenstand (floripare oder racemipare D.) oder Blätter (frondipare D.) tragen kann (VII Fig. 1076).
diaplektisches Leitbündel — wird das nicht radiale, sondern durchwobene Leitbündel von Lycopodium bezeichnet.
diarch (zweistrahlig) I/LXIII — heisst ein radiales Leitbündel mit zwei Xylemstrahlen (z. B. die Wurzelbündel von Lupinus, von Cruciferen).
Diastase — I/XX.
Diatomeen — = Kieselalgen (Bacillariaceae). Siehe Bd. VII 137.
diatrophe (dichotrophe) **Pflanzen** — sind chlorophyllfrei und nehmen die organische Nahrung von aussen auf.
Dibotryen — sind botrytische Blütenstände, bei denen die Seitenachsen wiederum (gleichartig oder ungleichartig) nach dem botrytischen Typus ausgebildet sind (zusammengesetzte Traube, Aehre und Dolde, Aehrentraube, Aehrenköpfchen, Köpfchentraube usw.).
Dichaenia — siehe Mericarpia (V/2 932).
Dichasienähre (Scheinähre) — III 65, 83 Fig. 480 q, r.
Dichasium (zweigabelige Trugdolde) — I/CXXXIX; V/1 135; V/4 2259.
dichlamydeïsche (diplochlamydeïsche) **Samenanlage** — I/CXXX.
Dichogamie — I/CXLI.
Dichotomie — siehe gabelige Verzweigung.
Dickblatt — = sukkulentes Blatt (IV/2 512; VII Fig. 1063).
Dickenwachstum — I/LXXXVI.

Fig. 1076. Durchwachsung (Diaphyse) bei Plantago lanceolata L. Die Blütenähre hat einen Blattschopf und zwei neue Aehren ausgebildet.

Dickenwachstum, sekundäres — I/XCII.
Didymanthie — an der Spitze eines normal einblütigen Blütenstieles treten zwei getrennte Blüten auf.
Didynamia — XIV. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit 6 freien, ungleich langen [zwei langen und zwei kurzen] Staubblättern).
Dientomologie — eine Gruppe von Individuen ist einer gewissen Insektenklasse, eine zweite einer anderen Abteilung angepasst (II 294; V/3 1758).
Diffusion — Uebertritt und Vermischung von Gasen oder Flüssigkeiten, die durch keine (oder durch eine indifferente, poröse) Wand geschieden sind.
digene Fortpflanzung — siehe geschlechtliche Fortpflanzung (I/CXLVI).
Digestionsdrüsen — = Verdauungsdrüsen (I/CVIII; IV/2 497; VI/1 156).
dikarpes Gynaezeum — Fruchtknoten besteht aus zwei Karpellen.
dikline (eingeschlechtige) **Blüten** — I/CXXXI.
Dikotyledonen — I/XLVI, XLVII, LII; III 5; VII 165.
Dikotylengürtel — siehe Polsterpflanzengürtel.
Dikotylenholz — I/XC.
Diluvialflora — siehe Glazialflora.
Diluvium (Eiszeit) — siehe Geologische Formationen.
Dimonoezie — die Blüten derselben Pflanze sind zweierlei Art.
Dimorphismus (Spross-, Blatt-, Frucht-Dimorphismus) — III 217; V/1 371, 494; V/2 919.
Dimorphismus der Blüte — VI/2 625.
Dimorphismus, geschlechtlicher — V/1 242; V/2 739; VI/2 681.
Dimorphismus, räumlicher — siehe Heterostylie.
Dimorphismus, zeitlicher — siehe Pleiontismus.
Dioezie (Zweihäusigkeit) — I/CXXXII; V/1 128.
Diosmose — I/XLVIII.
Diplasie — Spaltung eines Achsenorganes in zwei Teile.
diplekolober Keim — IV/1 56.
diploïd — ist der durch die Verschmelzung der beiden Geschlechtszellen entstandene Kern; er enthält die doppelte Chromosomenzahl.
Diploidgeneration — siehe Generationswechsel.
diplokaulisch — zweiachsige Pflanzen (IV/3 1119 Fig. 1283a).
Diplont — bezeichnet das ganze diploïde Stadium.
diplostemones Androezeum — I/CXXVI.
Dipterenblumen — siehe Fliegenblumen.
Disaccharide ($C_{12}H_{22}O_{11}$) — sind durch Kondensation unter Wasserabspaltung aus zwei Molekülen einfacher Zuckerarten entstanden.
disjunktes Areal — heisst ein zerstreutes, nicht zusammenhängendes Verbreitungsgebiet.
diskoide Formen — heterogame Korbblütler, denen die Zungen-(Rand-)blüten fehlen siehe Arnika, Senecio [VII Fig. 1077], Anthemis, Chrysanthemum).
Diskus — I/CXXXI; V/1 275.
Diskusdrüsen — III 13.
Dispersität — Zerteilungsgrad des Bodens, wonach Kristalloide und Kolloide (siehe dort) unterschieden werden.
Dispersoide — zerteilte Stoffe. Grobdisperse Stoffe mit Teilchendurchmesser $> {}^{5}/_{10\,000}$ mm, Mikronen genannt, hochdisperse Stoffe oder Kolloide mit Ultramikronen von ${}^{5}/_{10\,000}$ bis ${}^{1}/_{1\,000\,000}$ mm, molekulardisperse Stoffe mit Amikronen $< {}^{1}/_{1\,000\,000}$ mm.
Dissepimente — falsche Scheidewände der Frucht (I/CXXVIII; V/4 2560).
Dissimilation — sind Stoffwechselprozesse vom Charakter der Zersetzung (Abbauprozesse).
Dissymetrie, fluktuierende — V/2 1415.
Distrophie — ungleich grosse Ausbildung homologer Organe.
dithezische Antheren — zweifächerige Staubbeutel mit 4 Pollensäcken.
Divergenz — siehe Blattstellung (Phyllotaxis).
divísio — siehe Abteilung.
dizyklische Pflanzen — I/LXVIII.
Döldchen (umbéllula) — I/CXXXVIII; V/2 930; VII Fig. 1160.
Dogger (Brauner Jura) — siehe Geologische Formationen.
Dolde (umbélla) — I/CXXXVIII.
Dolde, zusammengesetzte — I/CXXXVIII; V/2 930; VII Fig. 1160.
Doldentraube — I/CXXXVII.
dolichostyle Blüten — I/CXLIII.
Dolomit — ist ein Gemenge von leichtlöslichem $CaCO_3$ und schwerlöslichem $MgCO_3$. Die Wirkung der Kalkionen scheint auf Dolomitsubstrat von überwiegendem Einfluss zu sein.



Fig. 1077. Diskoide Form von Senecio spathulaefolius (Gmel.) DC. (Bd. VI/2, 740).

Dolomitspezialisten — sind ausschliessliche Bewohner von Dolomitrohböden, z. T. Reliktendemismen (z. B. Asplenium Seelosii, Draba ladina, Sempervivum Dolomiticum, epi- und endolithische Algen).
Domatien — Milbenhäuschen (V/1 432).
dominante Eigenschaften — Eigenschaften, deren Anlagen nach Bastardierung unbekümmert um die betreffenden Eigenschaften des anderen Partners zur Entfaltung kommen (s. a. rezessive E.).
Donnerbesen — siehe Hexenbesen.
Doppelachaene — I/CL.
Doppelbalg (bifollículus) — Balgfrucht mit sich ablösenden Plazenten (Asclepiadaceae).
Doppelbeere (bibácca) — Frucht verschiedener Lonicera-Arten (VI/1 252).
Doppelbefruchtung — I/CXLVIII.
Doppelblätter — gehen aus einer Vereinigung zweier Blätter hervor.
Doppelblüte — II 205; III 493 Fig. 651.
Doppeldolde — V/2 930.
Doppelfrucht — V/1 54; VII Fig. 1078.
Doppelkapsel — V/3 1731.
Doppelknolle — I/LXXXI; III 493.
doppelt-dreizähliges Laubblatt — I/XCVI.
doppelt-fiederteiliges Laubblatt — I/XCVI.
doppelte Krone — I/CXVII.
doppeltes Nährgewebe — enthält Endosperm + Perisperm.
doppeltgefalteter Keim — IV/1 56.
Dornen — I/LXXXIV (siehe Spross-, Zweig-, Wurzel-, Blatt- und Nebenblattdornen).
Dornblätter — siehe Blattdornen.
Dornwurzel — I/LIX.
Dorsalseite — = Rückenseite (Gegensatz von Ventralseite).
dorsifixe Anthere — I/CXXIII.
dorsiventraler Bau — I/LII.
dorsiventraler Blattbau — I/XCVIII.
dorsiventrale Sprosse — I/LXXIV.



Fig. 1078. Doppelfrucht (Durchwachsung) der Orange (Citrus Aurantium L.).

Drehwalzenflieger — Schliess-, Kapsel- oder Spaltfrüchte (seltener auch Samen), deren Längskanten drei oder mehr häutige, an der Fruchtwand entspringende Flügel tragen (Rumex, Antigonum, Rheum, Combretum, Moringa).
Drehwüchsigkeit — III 105.
dreiachsige Pflanzen (triplokaulisch) — erst die Achse dritter Ordnung trägt Fortpflanzungsorgane (IV/3 1119).
dreibrüderige Staubblätter — I/CXXIII; V/1 Fig. 1997c und 2011 l, m.
dreifach-fiederschnittiges Blatt — I/XCVI.
dreizähliges Blatt — I/XCV.
dreizeilige Blattstellung — I/LXXIII.
drepánium — siehe Sichel.
Driftfrüchte — I/CLVI; IV/3 1587; V/1 500; V/3 2165 (siehe auch Herbstdrift).
Druckfestigkeit — I/XXXVIII, XL.
Drüsen — I/XXXIV (siehe auch Diskus-, Haut-, Zwischenwanddrüsen, Sekretionssystem).
Drüsenhaare — I/XXIX Fig. 31; V/1 76; V/3 1722 Fig. 2722; V/4 2258, 2259.
Drüsenschuppen — V/3 1628, 1644; V/4 2258.
drúpa (Steinfrucht) — I/CLI.
Dryasflora (fossile) — III 82; IV/2 926.
Dünenpflanzen — III 404; V/2 980.
düngerfliehende bezw. düngerfürchtende Arten — diese meiden den gedüngten Boden (Anthyllis Vulneraria, Nardus, Arnica, Orchidaceen, Ericaceen). Es sind Magerkeitszeiger.
düngerfordernde Arten — verlangen Düngung (Rumex alpinus, Poa annua).
düngerliebende Arten — sie kommen auch in ungedüngten Beständen vor, werden aber durch die Düngung begünstigt.
Düngerzeiger — sind bezeichnend für Fettwiesen.
Dürreresistenz (der Sonnenpflanzen) — Schutz gegen die schädlichen Folgen des Welkens; ist in erster Linie durch die starke Saugkraft der Zellen bedingt.
Duft — siehe Blütendüfte.
dunkelharte (dunkelstarre) **Samen** — verlieren durch andauernde Verdunkelung ihre Fähigkeit rasch im Licht zu keimen.
Dunkelkeimer — Samen keimen am besten im Dunkeln oder jedenfalls im Schatten (IV/1 335; V/2 922).
Dunkelstarre — in andauernder Dunkelheit wird die Fähigkeit des Blattes, Variationsbewegungen auszuführen, aufgehoben.

durchblätterter Blütenstand — ist von Laubblättern durchsetzt (z. B. Pedicularis foliosa).
durchbrechende (extravaginale) **Triebe** — I 166; II 52, Fig. 207 b.
Durchlasszellen — I/LVIII, LXII.
durchwachsenes Blatt — I/XCVI.
Durchwachsung (Diaphysis, Prolifikation) — I/CXVII; V/3 1732, Fig. 2734.
Durchwachsung von Blütenständen — Blütenstände schliessen ihr Spitzenwachstum nicht ab, sondern bilden über den Blüten einen vegetativen Blattschopf (Ananas, Eucomis, Callistemon, Primula; siehe V/3 1730).
Durilignosa — siehe Hartlaubgehölze.
Dynamik — Lehre von der Bewegung.
dynamogenetisch — V/3 1605.
dysgeogene Gesteine — liefern nur wenig Verwitterungsprodukte.
dysphotische (dämmerige) **Tiefenstufe** der Wasservegetation — die meisten im abgeschwächten Lichte vorkommenden Makrophyten vermögen nur kümmerlich oder gar nicht mehr zu leben, während genügsame Mikrophyten (besonders Diatomeen) noch fortkommen.

E.

e, ex (latein.) — = nach oder bei.
Ebenstrauss (corýmbus) — I/CXL.
echte Parasiten — siehe Holoparasiten.
Ectoparasiten — leben an der Oberfläche des Wirtes.
edaphisch — auf den Boden bezüglich.
edaphische Faktoren — = chemisch-physikalische Eigenschaften des Bodens, die z. B. den Standort bedingen, so Wassergehalt des Bodens, Wasserkapazität, Bodentemperatur, Durchlässigkeit, Porenvolumen, mechanische Gemengteile (nach ihrer Grösse), Gehalt an mineralischen Nährstoffen, an Gift- und Humusstoffen) (vgl. auch pH-Faktor).
Edaphon — umfasst die mikroskopische Bodenflora.
Edelaugen — I/CLVIII.
Edelfäule — V/1 399.
Edelreis — I/CLVIII.
Eichen (óvula) — I/CXXIX.
Eichengallen — III 107.
Eichenkratt — siehe Kratt.
Eichenrose — gehört zu den Knospengallen (VII Fig. 1079).
Eihülle (integuméntum) — I/CXXX.
Eikern — I/CXXX.
einachsig — siehe Sprossverkettung.
einachsige Pflanze (haplokaulisch) — der aus dem Keim hervorgegangene Spross schliesst bereits mit einer Blüte ab.
Einblattkeimer — siehe Monocotyledones I/5 109; VII 152.
einbrüderige Staubblätter — I/CXXIII.
einfaches Laubblatt — I/XCIV.
einfächerig (monomér) — I/CXXVII.
einfrüchtig (monokarp) — I/CXXVII.
Einfussachse (Monopodium) — I/LXX.
eingeschlechtige (dikline) **Blüten** — I/CXXXI; V/2 897.
eingeschnittene Blattspitze — I/XCV.
Einhäusigkeit (Monoezie) — I/CXXXII.
einjährige Pflanzen — I/LXVIII; VII Fig. 1160.
einjährig-überwinternde Pflanzen — I/LXIX.
Einrollung des Fruchtstieles — V/3 1841.
einseitswendig — heissen Organe, die nach einer Seite hin gekehrt sind.
Eisodialöffnung — Eingang in den Vorhof des Spaltöffnungsapparates.
Eiszeit — siehe Geologische Formationen.
Eiweiss (Albumen, Proteïn) — I/XXII.

Fig. 1079. Eichenrose (Knospengalle) verursacht durch die Gallwespe Andricus fecundatrix Hart. *a* Zweig mit mehreren lärchenzapfenähnlichen Anschwellungen. *b* Galle. *c* Galle im Längsschnitt *d* Larve. *e* Innere Kammer der Galle.

Eiweissfäulnis — siehe Fäulnis.
Eiweisskörper (Eiweiss-Stoffe, Proteïne) bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel. Die zusammengesetzten Eiweiss-Stoffe (Proteïde) enthalten sehr oft auch Phosphor. Sie haben grosse Moleküle und dürften durch Kondensation verschiedener einfacher Verbindungen gebildet worden sein. Durch Spaltung (z. B. Hydrolyse) entstehen leicht lösliche Amide (Säure-Amide und Aminosäuren), wie Asparagin, Leucin (Aminokapronsäure).
Eiweissorganismen — sind ausschliesslich auf Eiweiss-Stickstoff angewiesen.
Eiweissreaktion — IV/3 1644.
Eiweisschläuche der Cruciferen — IV/1 57.
Eiweisstoffe (Leitung) — I/XLI.
Eiweissverwandtschaft — IV/3 1643.
Eizelle — I/CXLVII.
Ekblastesis — seitliche Durchwachsung einer Blüte, d. h. Knospenbildung in der Achsel von Blütenorganen (siehe auch Diaphyse).
Ekelblumen — siehe Dipterenblumen.
Ektopie — abnorme Stellung eines Organes.
ektotrophe Mykorrhiza — I/LVI.
Elaioplasten — Oelbildner.
Elaiosom — ölhaltige Stellen bezw. Anhängsel (I/CLV) an Samen und Früchten (siehe Myrmekochorie).
Elateren (Schleuderzellen) — I 52.
Elektronastie — IV/3 1398.
Elemente, genetische — Arten gleicher Heimat und gleicher Herkunft.
Elemente, geographische — Summe der Arten gleicher oder wenigstens in den grossen Zügen ähnlicher Verbreitung.
Elemente, historische — Arten, die im gleichen Zeitraum der Florengeschichte im Gebiet entstanden oder eingewandert sind.
eleutheropetal — = choripetal.
eleutherosepal — I/CXVIII.
eleutherotepal — I/CXVIII.
em. (latein.) — emendátio (Ausgabe).
Embryo (Keimling) — I/XLV; V/1 579.
Embryologie — Entwicklungsgeschichte des Einzelwesens (siehe Ontogenie).
embryonale Generation — = Sporophyt.
embryonale Zelle — I/XVIII.
Embryosack — I/CXXX; V/3 1601.
Embryosackhaustorien — vermitteln die Zuleitung der plastischen Nährstoffe aus dem Nuzellus und den Integumenten zum Embryo und Endosperm. Das Haustorium geht aus dem Embryosack, dem Suspensor, den Antipoden, den Synergiden oder aber meistens aus dem Endosperm hervor.
Emergenzen — I/XXX; III 14; IV/2 642; V/1 54.
emers — über dem Wasser lebend.
empfindliche Blätter — IV/3 1121.
empfindliche Staubblätter — IV/1 87; VI/2 964.
Emulsin — IV/2 1091; V/3 1993.
Enaliden (Seegräser) — leben im Salzwasser festsitzend im lockeren Boden; sie zeigen meist geselligen Wuchs und bilden unterseeische Wiesen.
Enantiostylie — Griffel und Narbe sind nach einer andern Seite gerichtet als die Staubblätter.
Enation (Enatie) — Bildung von Exkreszenzen (Auswüchsen) auf der Oberfläche anderer Organe (kleine Spreiten auf Laubblättern, petaloïde Lappen auf Petalen).
Endblättchen — das oberste Blättchen beim unpaarig gefiederten Laubblatt.
endemisch — wird eine Art bezw. Varietät für ein Gebiet bezeichnet, wenn sie einzig dort vorkommt.
Endemismus, konservativer (Relikt-Endemismus, Alt- oder Palaeo-Endemismus) — kommt dadurch zustande, dass eine alte Sippe in einem beschränkten Gebiete sich bis heute erhalten hat.
Endemismus, neogener, progressiver (Neu-Endemismus) — ist dadurch entstanden, dass in einem Gebiete infolge geänderter Lebensbedingungen aus einer Stammform sich jüngere Sippen abgespalten haben.
Endemit — eine nur in einem bestimmten Areal vorkommende Art (siehe Endemismus).
Endknospe — I/LXIX.
Endmakel — II 308.
Endochylen — das Wassergewebe liegt innerhalb des Mesophylls (siehe Perichylen).
Endodermhypodermis — siehe Intercutis.
Endodermis (Schutzscheide) — I/LVII Fig. 65; LXII Fig. 75.
Endokarp — I/CXLIX.
Endoparasiten — leben innerhalb des Wirtsgewebes (intramatrikal) in den Interzellularen (interzellular) oder durchwuchern die Zellen (intrazellular).

Endophyten — Innenpflanzen, d. h. im Pflanzen- oder im Tierkörper lebende Kryptogamen (sind oft Krankheitserreger).
Endosperm (Nährgewebe) — I/XLV, XLVIII, CXLVIII (siehe auch nukleäres und zelluläres Endosperm).
Endospermhaustorien — aus dem Endosperm (Nährgewebe) hervorgehenden Saugorgane.
Endospermkern, primärer — I/CXLVII.
Endospor — I/CXXV.
Endotesta — V/1 660.
Endothecium — I/CXXIV.
endotropes Wachstum des Pollenschlauches — der Pollenschlauch wächst nur eine Strecke weit oder auf dem ganzen Wege im Gewebe der Samenanlage.
endotrophe Mykorrhiza — I/LVI; II 323.
Endotrophismus — Bildung von Knollen innerhalb anderer (Kartoffel).
endozoische Verbreitung — Samen bezw. Früchte werden von pflanzenfressenden Tieren verschlungen und mit den Exkrementen wieder abgesetzt (IV/2 574).
endständiger Griffel — I/CXXIX.
Enneandria — IX. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit 9 freien Staubblättern).
Entfaltungsbewegungen — IV/3 1658, 1728.
Entomophilie (Entomogamie) — I/CXLIV.
Enzym — siehe Ferment.
Eogen — Alt-Tertiär.
Eozaen — siehe Geologische Formationen.
Epharmose (Epharmonie) — wird die gesamte Anpassung einer Pflanze, die Harmonie zwischen ihrem Bau und den äusseren Bedingungen, bezeichnet.
ephemer — kurzlebig.
ephemere Blüten — öffnen sich nur einmal.
ephemere Pflanzen — bilden im Jahr mehrere Generationen, d. h. sie bringen mehrmals Früchte hervor.
Ephemerophyten (Passanten) — Ankömmlinge, nur vereinzelt und vorübergehend und ausschliesslich in Kunstbeständen auftretende Pflanzen (IV/3 1329).
Ephydrogamicae — Wasserblütler, die sich auf dem Wasser bestäuben.
Epiblast — I 170.
Epiblem(a) — ältere Bezeichnung für die einschichtige Oberhaut der Wurzel (Wurzelepidermis).
Epidermis (Oberhaut) — I/XXVII, XCIX; II 336 Fig. 420; V/4 2375
epigaeische (epigäe) **Keimung** — Keimblätter treten über die Erde und assilimieren (IV/3 1122, 1630). Gegensatz: hypogaeische Keimung.
epigyne Blüten — I/CXXVIII.
Epikarp (Exokarp) — I/CXLIX.
Epikotyl — heisst das erste Stammglied bei der Keimpflanze (I 170).
Epilithen (Epipetren) — siehe Felshalter.
Epinastie — I/LXXIV; IV/2 545.
epinykte Blüten — sind ephemere Blüten, die sich in der Dämmerung oder in der Nacht öffnen (Mirabilis longiflora, Kakteen).
Epiontologie (genetische Pflanzengeographie) — beschäftigt sich mit der Entwicklung der Pflanzenverbreitung im Laufe der Zeit, mit ihrer geschichtlichen Bedingtheit.
epipetal — I/CXXXIV.
epipetale Stamina — I/CXXVI.
Epiphyllie — V/1 656; V/2 1453.
Epiphyten (Ueberpflanzen) — leben normal auf anderen Pflanzen, ohne diesen jedoch Nahrungsstoffe zu entnehmen (siehe auch Gelegenheitsepiphyten).
epiphytisch (auf anderen Pflanzen lebend) — I/LVII; III 16.
epiphytoide Halbschmarotzer — siehe Holzparasiten.
episepal — I/CXXXIV.
episepale Stamina — I/CXXVI.
epistomatisch — heissen Laubblätter, die nur auf der Oberseite Spaltöffnungen tragen.
Epistrophie — Rückschlag einer ziemlich konstant gewordenen Monstrosität in einzelnen Organen zu der normalen Form (Baumvarietäten).
Epithelzellen — sind sezernierend und kleiden als dünnwandige Schicht die schizogenen Sekretbehälter aus (siehe auch Tapetum).
Epithem — heisst das unter den Wasserspalten befindliche kleinzellige, farblose Gewebe.
Epithemhydathoden — IV/2 571.
epitrope Samenanlage — die Mikropyle ist nach der Spitze (griffelwärts) gerichtet.
Epitrophie — Förderung der Gewebe bezw. der Organe auf der morphologischen Oberseite.
epizoische Verbreitung — Samen bezw. Früchte hängen sich oberflächlich an vorübergehende Tiere an.

Epoekophyten (Ansiedler) — heissen die erst in historischer Zeit eingewanderten Arten, die auf künstliche, vom Menschen geschaffene Standorte angewiesen sind (V/2 942).

Erbfaktor — siehe Gen.

Erde — siehe Feinerde.

Erdfrüchte — siehe Geocarpie und Amphicarpie.

Erdhalbsträucher — Halbsträucher mit niedergestreckten, am Boden ausgebreiteten Hauptachsen.

Erdstock (mesocórmus) — IV/2 668; IV/3 1595.

Ergasiolipophyten (Kulturrelikte) — Ueberreste fremder Kulturpflanzen.

Ergasiophygophyten (Kulturflüchtlinge) — spontan verwildernde, ursprünglich fremde Kulturpflanzen (III 189).

Ergasiophyten — ursprünglich fremde Kultur-(Nutz- und Zier-)pflanzen. Eigentliche Kulturpflanzen.

Ergasiosyntrophophyten — Kulturlands-Unkräuter.

Ericilignosa (Ericifruticeta) — Heidegehölze (siehe auch Zwergstrauchheide).

ericoides Blatt — I/CII; V/3 1614.

Erineum — Filzgallen (werden durch Milben erzeugt).

Eriopodie — VI/2 717.

Erlenbruch — III 93; VII Fig. 1080.

Erlenknöllchen — III 83, 86.

Erneuerungsknospen — V/3 1716, 1867.

Erstlingsblätter (Primärblätter) — I/CXIV.

Erythrismus — IV/2 830.

Erythrophyll — = Phycoerythrin (I/XIX).

Erzblumen — IV/1 425; V/3 1890.

Espenperiode — siehe subarktische Periode.

Essiggärung (Essigstich) — Essigbakterien oxydieren (am raschesten bei 30—35°) den Alkohol unvollkommen zu Essigsäure (V/1 401).

Essigsäure — ist eine niedere Fettsäure [CH_3 COOH), die stark ätzend wirkt (siehe auch V/1 414).

Essigsäurebakterien — V/1 400.

Esterasen — fettspaltende Enzyme (z. B. Lipase).

Esterharze oder Tannolharze (Resinharze, Resinretine) — enthalten als bezeichneten Bestandteil des Reinharzes Ester (Benzoë, Storax).

Etagenwuchs (Schichtkronigkeit) der Holzgewächse — Krone der Bäume ist etagenförmig gegliedert (Araucaria, Fichte, VII Fig. 1081).

Etesiae — siehe Zeitstauden.

Etiolement (Vergeilen, Verspillern) — abnorm gesteigertes Längenwachstum infolge mangelhafter Beleuchtung oder gänzlichem Fehlen (bezw. Lichtabschluss) derselben (V/4 2600 Fig. 3420).

etioliert (vergeilt) — durch Krankheit (mangelhafte oder fehlende Beleuchtung) verlängern sich die Stengelglieder und Blätter übermässig; Blattgrün geht verloren (IV/3 1561).

= étum — wird zur Bezeichnung einer Pflanzengesellschaft von der Rangstufe einer Assoziation dem Gattungsnamen angehängt (caricétum [VII Fig. 1082]; nardétum [VII Fig. 1115]). Zuweilen wird noch der Artnamen im Genitiv (alnétum incánae) beigesetzt oder die bezeichnende Begleitflora wird als Adjektiv in den Bestandesnamen hinein aufgenommen (caricétum decíduae pratósum).



Fig. 1080. Erlenbruch am Chiemsee (Oberbayern). Phot. Dr. W. v. Leiningen, Wien.



Fig. 1081. Araucaria excelsa (Lam.) R. Br., Norfolk-Tanne, „Zimmertännchen", als Beispiel für Etagenwuchs. Phot. R. E. Pfenninger, München.

euephemere Blüten — öffnen und schliessen sich im Laufe von 24 Stunden.
eugeogene Gesteine — bilden reichliche Verwitterungsprodukte.
euphotische Tiefenstufe — siehe photische Tiefenstufe.
euphotometrische Blätter — heissen Blätter, deren unbewegliche (fixe) Lichtlage durch das stärkste diffuse Licht bestimmt wird.
eurasiatisch — über das gemässigte Asien und Europa verbreitete Pflanzenarten.
eurosibirisch — Arten, die in Europa und in der Westhälfte des gemässigten Asien (bis zum Altai) vorkommen.
eurosynusisch — gesellschaftsvag (IV/2 569).
euryözisch — standortsvag; d. h. unter sehr verschiedenen Aussenbedingungen gedeihend.
eurytop — Bezeichnung für weitverbreitete Arten. (Gegensatz ist stenotop).

Fig. 1082. Carex curvula All. (II, 70), Krumm-Seggen-Rasen (curvulétum) im Wallis ca. 2000 m. Phot. Dr. G. Hegi, München.

eustatische Pflanzen — V/3 1618.
eutrope Insekten — sind an Blumen vollkommen einseitig angepasst und für die Bestäubung sehr wichtig (langrüsselige Bienen und Schwärmer).
eutrophe Pflanzen — gedeihen in Böden mit reichem Gehalt an mineralischen Nährstoffen.
euzyklische Blüten — I/CXXXIV.
Evaporation — siehe relative Transpiration.
Evaporationskraft — = Verdunstungskraft.
Exantheme — als solche bezeichnete man bei Pflanzen früher scheinbare Hautkrankheiten (Aecidien, Erineumgallen usw.).
Exine — I/CXXV.
Exkrete — = Sekrete.
Exochomophyten — Oberflächenpflanzen; wachsen auf dem über die Oberfläche in dünner Schicht ausgebreiteten Detritus und Humus.
Exodermis — I/LVII.
Exokarp — = Epikarp (I/CXLIX).
Exospor — I/CXXV.
Exothecium — I/CXXIV.
Explodiflórae — losschnellende Windblütler (siehe Bombardierpflanzen III 137).
Explosionsblütler — V/1 128.
Explosionseinrichtung der Schmetterlingsblüten — IV/3 1137.
Explosionsfrüchte — siehe Schleuderfrüchte.
Exposition — Lage eines Bodens zur Himmelsrichtung.
extraaxillärer Spross — dieser steht ausserhalb der Blütenachse.
extrafloral — ausserhalb der Blüte befindlich.
extraflorale Schauapparate (V/3 2275; VII Fig. 1083 u. 1102) — liegen ausserhalb der eigentlichen Blüte bezw. des Blütenstandes. Siehe auch Spatha und Hochblätter.
extranuptiale (extraflorale, asexuelle) **Nektarien** — III 452; IV/2 1054, 1507, 1540; V/1 310, 459.



Fig. 1083. Bougainvillea spectabilis Willd., Drillingsblume (III, 266). *a* Blühender Zweig. *b* Blüte, von einem roten Hochblatt umgeben.

extrastaminaler Diskus — Drüsenring, liegt ausserhalb der Staubblätter (I/CXXXI).
extravaginale Triebe — I 166; II 52 Fig. 207 b.
extrors (Staubblätter) — I/CXXIII.

F.

f — Abkürzung für fórma (Form, Spielart, Gartenform).

fachspaltig aufspringende (loculicide) **Kapsel** — I/CL und VII Fig. 1115.

Fadenblüten — VI/1 436.

Fadenflieger — winzige kleine Samen verschiedener Gesneriaceen besitzen einen aus ganz wenigen fadenförmigen, aber sehr langen Haaren bestehenden Flugapparat.

fadenförmige Narbe — I 170.

fadenförmiges Blatt — I/CIII.

Fadenranker — siehe Achsenfadenranker.

Fächel (rhipídium) — I/CXL.

Fächer (Fruchtfächer, lóculi) — I/CXXVII.

Fällungskolloide — haben die Fähigkeit andere kolloidale Lösungen auszuflocken.

Fäule — als solche werden Krankheiten verschiedener Kulturpflanzen (V/4 2604), andrerseits Zersetzungserscheinungen des Holzes (Rot-, Weiss-, Trockenfäule) bezeichnet.

Fäulnis (Eiweissfäulnis) — ein zur Gärung im weiteren Sinn gehörender Vorgang, der besonders durch Spaltpilze (bezw. deren Enzyme) ohne Mitwirkung von atmosphärischem Sauerstoff den Abbau der Eiweissmoleküle unter Bildung übelriechender flüchtiger Stoffe vollzieht.

Fäulnispflanzen — siehe Saprophyten (VII Fig. 1136).

Fahne (vexíllum) — I/CXXI; IV/3 1136.

Fig. 1084. Fahnenwuchs der Fichte, am Arbergipfel (Bayerischer Wald). Phot. Dr. Franz Seitz-Ghisler, München.

Fahnenwuchs der Bäume — ist ein Produkt der scherenden Kräfte des Windes (siehe windgescherte Bäume VII Fig. 1084).

Fallfrüchte (piptocárpia, frúctus secedéntes) — Früchte geschlossen abfallend oder einzelne die Samen umschliessende Teile der Frucht abfallend.

Fallaubgehölze (Deciduilignosa) — bestehen aus Holzpflanzen, die ihr Laub regelmässig in der ungünstigen Jahreszeit abwerfen (Propophyten) und die in der Regel Knospenschutz besitzen (siehe Hartlaubwälder und Hartlaubgebüsche).

falsche Scheidewände — I/CXXVIII; I 163; V/4 2560.

Faltblatt — I/CIII.

Falterblumen — I/CXLV; VI/1 256.

Farbharze — siehe Chromoretine und Garcinia.

Farbhölzer — I/XC. Siehe auch Haematoxylon, Caesalpinia, Santalum, Pterocarpus, Mallotus, Quercus tinctoria, Chlorophora usw.

Farbspielarten — siehe pontentiell-polychrome Blüten.

Farbstoffe — siehe Anthocyan und Chlorophyll.

Farbstoffträger (Chromatophoren) — I/XIX.

Fasciation (Verbänderung) — I/LXXVII; III 261; IV/2 542; VI/2 876; VII Fig. 1085.

Fasciculararcambium — I/LXXXVI.

Faser — V/1 29, 461.

Faserborke — siehe Ringelborke.

Fasertracheïden — I/LXXXVIII.

faúx — = Schlund (I/CXIX).

Fazies — Unterabteilung der Assoziation.

Fechser — III 132; IV/1 307.

Fig. 1085. Fasciation (Verbänderung) vom Türkenbund (Lilium Martagon L.). Phot. H. Dopfer, München.

Federballfrüchte — Früchte tragen an ihrem obern Ende einen Kranz von meist nach aussen gekrümmten Flügeln, der die Früchte beim Abfallen in drehende Bewegung versetzt und dadurch den Fall bedeutend verlangsamt (Dipterocarpaceae, Shorea).

federförmige Narbe — I 169.

Federgrasflur (niederösterreichische) — I 204.

Federkrone — anemochores Verbreitungsorgan vieler Nussfrüchte (VI/1 398).

Federschweifflieger — das anemochore Verbreitungsorgan ist ein langer Schweif, der meist aus dem erhärteten, stark verlängerten Griffel gebildet wird (Clematis, Pulsatilla, Geum, Erodium).

Fegeapparat (Fegehaare) — VI/1 394, 398.

Fehlschlagen — siehe Abortus.

feilspa(h)nartige (feilstaubartige) **Samen** — I/CLIII.

Feinerde (Erde) — Körner haben eine Grösse von 2 mm.

Feinkies — siehe Feinschutt.

Feinsand — siehe Sand.

Feinschutt — enthält Körner von Kirschgrösse (etwa 2 cm) bis zu 2 mm (also bis zur Feinerde) herab. Grus besteht aus eckigen Stücken, Feinkies aus gerundeten.

Feldschicht — siehe Schichtung.

Fellkletten — Früchte, die an die Verbreitung durch das Fell oder Gefieder von Tieren angepasst sind (Xanthium, Arctium = Lappa).

Felsflora (Felspflanzen) — als ökologischer Begriff umfasst alle diejenigen auf Felswänden oder Blöcken wachsenden Arten, welche imstande sind, als erste unter ihresgleichen den Fels dauernd zu besiedeln und in der Verbreitung oder im Bau eine ± ausgeprägte Abhängigkeit vom Fels als Unterlage erkennen lassen (Oettli).

Felshafter (Epilithen, Epilithophythen, Epipetren, Exolithophyten) — Gesteinspflanzen, die keine besonderen Wurzelorgane besitzen, sondern mit der ganzen Oberfläche Nahrung aufnehmen (Steinalgen, Steinflechten).

Felswurzler (Rhizolithophyten, Rhizolithen) — Steinpflanzen, die von der Oberfläche aus mit Rhizoiden oder Würzelchen in den Fels eindringen.

Fennoskandinavien (Fennoskandien) — umfasst Skandinavien, Finnland und Lappland.

Fensterblüten — in der Nähe der Nektarien finden wir in den Blüten transparente Stellen, die den Insekten wohl als Wegweiser dienen (V/3 1840).

Fig. 1086. Luzula silvatica (Hudson) Gaud. (II, 177). Schattenpflanze mit Flachblatt. Phot. Forstrat O. Feucht, Stuttgart.

Fermentation — siehe Gärung.

Fermente (Enzyme) — sind Katalysatoren kolloidaler Natur, die von lebenden Zellen erzeugt werden. Sie beschleunigen (oder seltener verringern) die Reaktionsgeschwindigkeit gewisser chemischer Umsetzungen (I/LXXVIII; III 261; V/1 661; VI/2 876).

Fermentgifte (Hemmungskörper) — sind Substanzen, welche die Fermentreaktion verzögern oder aufheben. Die nicht spezifischen Hemmungskörper führen die Bezeichnung Paralysatoren.

fertil (lat. fértilis) — fruchtbar.

Festigungsgewebe — I/XXXVI.

Fettbäume — sind Bäume, bei denen besonders im Winter die Reserve-Stärke in Rinde und Holz in Fett übergeht (z. B. Kiefer, Fichte).

Fette und fette Oele (Talg, Pflanzenbutter) — sind Gemenge von mehreren Glyceriden, d. h. also Verbindungen von Fettsäuren und Glycerin, im allgemeinen von der Formel $C_3H_5(OOCR)_3$, wobei R einen einwertigen Kohlenwasserstoffrest bedeutet. Als Nebenstoffe enthalten sie auch Eiweisskörper, Farbstoffe usw.

Fettkörper — siehe Elaiosom.

Fettpflanzen — siehe Succulenten.

Fettwiesen (Fettmatten) — stehen seit Jahrhunderten unter dem ständigen Einfluss des Menschen, der Düngung (Stall- und Kunstdünger), oft auch der Bewässerung und werden 1 bis 4mal im Jahr geschnitten. Sie sind hauptsächlich aus Frischwiesen hervorgegangen (V/2 1021).

Fibrovasalstränge — I/XL.

Fiederblätter — Blätter bezw. Wedel vieler Farnpflanzen und Palmen.

fiederförmiges Blatt — I/XCV.

fiedernerviges Blatt — I/XCVII.

fiederschnittiges Blatt — I/XCVI.

Filament (Staubfaden) — I/CXXII.

Filzgallen — siehe Erineum.

filzige Behaarung (Filzhaare) — Pflanzenteile mit weicher, dicht stehender, durcheinandergewirkter Haarbekleidung (VI/1 452, Fig. 228).

fingerartige Blatteilung — I/XCIV.

fingerförmiges Blatt — I/XCV.

Fiori — siehe Kaprifikation (III 126).

Fission — Spaltung eines normal einfachen Organes.

Flachblätter (VII Fig. 1086) — besitzen zarte, dünne, horizontal ausgebreitete, ebenflächige Spreiten (z. B. viele Schattenpflanzen).

Flachmoor — siehe Wiesenmoor.

Flachpolster — III 295.

Flachspross — I/LXXVI.

Flagellaten-Typus — IV/2 570.

Flagellen — VI/2 1185.

fleischfressende (fleischverdauende) Pflanzen — I/CVIII; IV/2 497 usw.; VI/2 156; VII, Fig. 1157.

Fliegenblumen (Myiophilae) — I/CXLV.

Fliegen-Klemmfallenblume — VI/1 157.

Flocken — siehe Sternhaare (VI/2 1188).

Flora — Pflanzenliste, d. h. Liste der in einem bestimmten Gebiet vorkommenden Arten.

florale Schauapparate — gehören dem Bereiche der Blüte bezw. des Blütenstandes an (I/CX).



Fig. 1087. Garten-Schneeball (Viburnum Opulus L. f. roseum L.). Alle Blüten sind unfruchtbar (neutral). Phot. Walter Hirzel, Winterthur.

flore albo — Abänderung mit weissen Blüten (Taf. 124, Fig. 1 a).

flore pleno (VII Fig. 1087, 1094) — Abänderung mit gefüllten Blüten (siehe dort).

flore roseo — Abänderung mit rosaroten Blüten.

Florenreiche — heissen die primären Abteilungen der Flora der Erde.

floripare Durchwachsung — siehe Durchwachsung.

Florula obsidialis — IV/3 1251.

flottierend — auf dem Wasser schwimmend bezw. umhertreibend.

Flügel (der Blüte) — I/CXXI; IV/3 1133; V/1 89.

Flügelblatt — I/CXIII, siehe auch Tiliaceae.

Flügelfrüchte — I/CLIII; V/1 53, 82.

Flugbrand — siehe Brand, Brandbeulen.

Flugfeder-Typus — IV/2 914.

Flughaare — an die Verbreitung durch den Wind angepasste Haarbildungen an Früchten oder Samen, welche entweder die Samen bezw. die Früchte ganz umhüllen (Baumwolle) oder als Schopf (cóma) oder Fallschirm erscheinen.

Flussand — wird von langsamfliessenden Gewässern gebildet und besteht aus gleichmässigen, fein- bis mittelkörnigen Sanden, die oft reichlich (5—15%) humose Beimengungen enthalten.

Flysch (Macigno) — ist ein toniges, sandiges oder kalkiges Sedimentgestein von verschiedenem Alter (Kreide- und Tertiärflysch). Der alpine Flysch reicht bis ins Oligozaen und ist oft reich an Fucoiden (Meeresalgen).

Föhngebiete (Föhnkanäle) — Täler der Nordalpen, die dem Einfluss des warmen Föhnwindes besonders stark ausgesetzt sind.

Föhnpflanzen — VI/1 201.

Föhrenbezirk (-täler) der Alpen — Täler der Zentralalpen mit ausgesprochenem Kontinentalklima; Föhre ist der Charakterbaum.

Föhrenperiode — siehe boreale Periode.

fol. mac. — fóliis maculátis, geflecktblätterig.

fol. var. — fóliis variegátis, buntblätterig.

Fig. 1088. Junge Pflanze der Esche (Fraxinus excelsior L.), die Primär- und Folgeblätter zeigend.

folátio — = Aestivation.
Folgeblätter — V/2 783, 1160.
Folgecambium — III 210.
Folgeform — ist das auf die Jugendform folgende Entwicklungsstadium der Pflanzen (I/CXIV, VII Fig. 1088).
Folgemeristeme (sekundäre Meristeme) — I/XXVII; III 210.
foliátio — = Aestivation, Knospendekkung.
folíola (lat.) — Teilblättchen der zusammengesetzten Laubblätter.
fólium (lat). — = Laubblatt.
Forcieren — siehe Frühtreiben.
Form (fórma) — systematischer Ausdruck für eine Abweichung vom Typus, die auf gewisse Aussenbedingungen zurückzuführen ist (f. terréstris, alpína, montána usw.), oder gleichbedeutend mit Varietät (siehe auch Wuchsform).



Fig. 1089. Psaronius sp., fossile Farnstämme (wohl von einer Marattiacee). Phot. Prof. Dr. Leo Wehrli, Zürich.

Formation — wird aus mehreren oder vielen Vereinen (Synusien) mit einheitlicher Gesamtphysiognomie und ± einheitlichen Standortsansprüchen gebildet. Von der floristischen Zusammensetzung ist die Formation vollständig unabhängig (siehe Assoziation).
Formationsklassen und **Formationsgruppen** — sind soziologische Einheiten innerhalb der Vegetationstypen. So werden innerhalb des Vegetationstypus Prata die drei Formationsklassen Terri-, Aqui- und Sphagniprata unterschieden; die Terriprata werden weiter in drei Vegetationsgruppen Duri-, Semper-virenti- und Altoherbiprata gegliedert.
Formationsubiquisten — Pflanzen, die in verschiedenen Gesellschaften auftreten können (V/1 168, 529).
formative (morphogene) **Reize** — durch diese wird die Gestaltungstätigkeit in andere Bahnen gelenkt, so dass allgemein oder lokalisiert eine veränderte Gestaltung resultiert.
forníces — I/CXX.
Forst — heisst der gepflegte Kultur- bezw. Wirtschaftswald.
Fortpflanzung, geschlechtliche (sexuelle, digene) — I/CXLVI.
Fortpflanzung, ungeschlechtliche (vegetative, monogene) — I/CLVII; siehe auch Fechser, Uovoli, Turionen, Zwiebelbrut, Wurzelbrut.
fossil (als Zeitbegriff) — der geologischen Vorzeit angehörend, heute also ausgestorben.
Fossilien (VII Fig. 1089) — in Erdschichten erhalten gebliebene Reste oder Spuren vorzeitlicher Organismen (Versteinerungen oder Petrefakten).
fr. — Abkürzung für fructus (Frucht), Mehrzahl fructús.
Fragaria-Typus — IV/2 570.
Fremdbestäubung — I/CXLI.
Fremdlingsbastarde (xenonothe Bastarde) — beide Eltern sind eingeschleppte Arten.
Fremdverbreitung — siehe Allochorie.
Frischgewicht (Lebendgewicht) — ist das Gewicht der unversehrten Pflanze bezw. Pflanzenteile (s. Trockengewicht).
Frischwiesen — bedürfen eines Minimums von Feuchtigkeit.
Frondeszenz — = Verlaubung.
Frostkeimer — Samen (besonders von Alpenpflanzen) verlangen zur Keimung ein ein- bis mehrmaliges Durchfrieren.
Froststellung der Blätter — V/3 1625, 1632.
Frucht (fructus) — I/CXLVIII.
Fruchtbecher (Achsenbecher) — III 65; VII Fig. 1050.
Fruchtblatt (Karpell) — I/CXXVII und VII Fig. 1090.
Fruchtdimorphismus — III 217; VI/2 800.
Fruchtfleisch — I/CLI.
Fruchtformen — I/CXLIX.
Fruchthaare — II 16, 17.
Fruchthalter (Fruchtträger) — V/2 932, 933 (Fussnote 1)



Fig. 1090. Fruchtblätter von Cycas circinalis L. (Südindien) und von Cycas revoluta L. (südl. Japan). Siehe Bd. I, 73.

Fruchthaufen (sorósus) — siehe Schein- und Sammelfrucht.
Fruchthäufchen (sóri) — I 5.
Fruchthaut — siehe Perikarp.
Fruchtkelch — Kelch zur Zeit der Fruchtreife.
Fruchtknoten — I/CXXVII, CXXVIII.
Fruchtkopf (Fruchtstand) — zahlreiche Blüten bilden ein ± einheitliches Fruchtgebilde (siehe coenocárpium).
Fruchtmus — siehe Pulpa.
Fruchtnaht — = Verwachsungsnaht (Sutur).
Fruchtschale — siehe Perikarp.
Fruchtschlauch (utrículus) — schlauchförmiges, den Fruchtknoten einschliessendes Vorblatt (II 51).
Fruchtschuppe — I 77.
Fruchtstiel (Einrollung) — V/3 1841.
Fruchtwand (Pericarp) — I/CXLVIII.
Fruchtwarzen — V/4 2515.
Fruchtzucker — siehe Kohlenhydrate.
Früchtchen — siehe Teilfrüchte und apokarpes Gynaeceum.
Früchte, einfache (fructús símplices) — Früchte werden aus einer Blüte gebildet.
Früchte, zusammengesetzte (fructús polyanthocárpi) — Früchte werden aus 2 bis vielen Blüten gebildet (Ficus, Xanthium, Arctium, Rhus usw.).
Frühblüher — I/LXVI.
Frühjahrsholz — I/LXXXVIII.
Frühschliesser — Blüten (Blütenstände) öffnen sich am frühen Morgen und schliessen sich im Freien zwischen 9 und 12 Uhr (bei Verdunkelung des Himmels schon früher).
Frühtreiben (Forcieren) — die Ruheperiode wird durch verschiedene Verfahren (Warmbad, Aether- oder Chloroformnarkose, Formaldehyddämpfe usw.) abgekürzt, d. h. die Organe werden also künstlich zum frühzeitigen Austreiben gebracht (V/3 1915).
Fruktifikationssprosse — VI/1 247.
Frustranie — ältere Bezeichnung für Agamonoezie.
fruticéta — siehe Gebüsche.
Fühlpapillen (Fühlborsten) — I/XXX.
Fühltüpfel — I/XCIX.
Füllgewebe — siehe Plerom und Lentizelle.
Füllung — siehe gefüllte Blüten.
Füllzellen — I/XXXI.
fünfschichtige Aestivation — siehe quincunciale Knospenlage (I/XXXV).
Fugenfläche (commissúra) — V/2 933.
Fundort — siehe Lokalität.
fungoid — pilzähnlich, in der Tracht an gewisse höhere Pilze erinnernde Blütenpflanzen.
funículus (Samenknospenträger, Samenstiel, Nabelstrang) — I/CXXX, CXXXI; V/2 682.
fussförmiges Blatt — I/XCVI.
Futterantheren — IV/3 1131.
Futterhaare — VI/1 8; VI/2 1868.
Futterwiesen — werden gemäht oder beweidet, z. T. auch gedüngt, und liefern Rohfutter für Gross- und Kleinvieh.

G.

gabelästig — an der Spitze aus einem Punkt in zwei Aeste geteilt.
Gabelhaare — siehe Haarformen.
gabelige Verzweigung — die Sprossachse teilt sich an ihrer Spitze in 2 (Dichotomie), 3 (Trichotomie) oder mehrere (Polytomie) gleich kräftige Zweige, welche in anderer Richtung als die Hauptachse weiterwachsen und in der Regel gleich grosse Winkel mit der ursprünglichen Wachstumsrichtung bilden.
Gabelung (Gabelspaltung der Farnwedel bezw. Fiedern) — diese hat ihren Ursprung in der abnormen Spaltung der Scheitelzelle der Wedelspitze bezw. der primären und sekundären Fiedern (VII Fig. 1091).
Gärung (Fermentation im weitesten Sinn) — durch die Enzyme oder Fermente (siehe dort) von Mikroorganismen (ohne die Krankheitserreger) hervorgerufene chemische Umwandlung, die den Organismen Energie und Baumaterial liefert, unter bestimmten Bedingungen sehr lebhaft verlaufend, oft verbunden mit deutlicher Gasentwicklung.
Gärung (Fermentation im engeren Sinn) — durch Enzyme oder Fermente von bestimmten Mikroorganismen verursachte chemische Veränderung von Nichteiweisstoffen.
Gärungspilze — IV/1 400.
gálbulus (arcesthída) — siehe Beerenzapfen.
Galläpfel — III 58; V/3 1619, 1630.

Gallen (Cecidien, Zoocecidien) — durch tierische oder pflanzliche Organismen veranlasste Bildungsabweichungen, welche eine Wachstumsreaktion auf die von dem fremden Organismus ausgehenden Reize darstellen und zu welchen die fremden Organismen in irgendwelchen ernährungsphysiologischen Beziehungen stehen (V/1 214, 225; V/3 1944; VI/2 906; VII Fig. 1051, 1060, 1071, 1139.

Gallen, histioide — bei diesen gelangen abnorme Gewebe zur Ausbildung (Beutel-, Filzgallen, Pocken usw.).

Gallen, organoide — bei diesen werden abnorme Organe ausgebildet (siehe Hexenbesen [VII Fig. 1092], Wirrzöpfe usw.).

Gallenblüten — III 126.

Gallerte — kolloid-disperses System, das gleichzeitig Eigenschaften fester und flüssiger Körper zeigt. Gallerten entstehen durch Konzentrations- und Temperaturänderungen kolloider Systeme (Abkühlen konzentrierter Gelatine- oder Leimlösungen), durch Aenderung des Hydratationsgrades (Gelatinieren von Eiweis) und als Niederschlagsformen bei chemischen Reaktionen (Aluminiumhydroxydfällungen).

Gallisieren — V/1 401.

Gallwespenblumen — siehe Caprifikation.

Galmeipflanzen — V/1 607, 608; V/3 1890.

Gameten — heissen die Geschlechts- oder Sexualzellen, überhaupt alle geschlechtlich ungleichwertigen, kopulierenden Zellen.

Gametobiont — allgemein biologische Bezeichnung für Gametophyt.

Gametophyt — heisst die Geschlechtsorgane tragende Generation (siehe Generationswechsel).

Gammogenie — Verwachsung von Knospen.

Gamogonie — geschlechtliche Fortpflanzung im allgemeinen.

Gamopetalae — III 6; V/3 1567; VII 195.

gamopetale (sympetale) Blüten — I/CXVIII.

Gamophyllie — Verwachsung von Laub- und Blütenblättern.

gamotrope Bewegungen (Gamotropismus) — heissen solche Bewegungen der Blüte, die in verschiedener Form geeignet sind, die Fremdbestäubung herbeizuführen oder dem Schutze der Geschlechtsorgane dienen.

ganzrandiges Blatt — I/XCVI.

Ganzschmarotzer (Holoparasiten) — VI/1 129.

garigue (garrigue, garide) — ist ein offenes, auf trockenem, felsigem Kalkfelsboden, besonders im Mittelmeergebiet verbreitetes Gebüsch.

Gartenbastarde (kepogene Bastarde) — entstehen in der Kultur, spontan oder durch künstliche Bestäubung.

Gartenflüchtlinge — aus Gärten verwilderte Pflanzen (plántae hortifúgae).

Gattung (génus) — umfasst selten eine (monotypische Gattung), meist aber mehrere Arten.

Gattungsbastarde — V/1 681; V/2 1154.

Gault (Kreide) — siehe Geologische Formationen.

Gaumenblütler — siehe Maskenblütler.

Gebüsche (fruticéta) — heissen Gehölze (siehe dort), bei denen Sträucher vorherrschen.

gedrehte Knospendeckung — I/CXXXV.

Geest — heisst der Diluvialboden an der Meeresküste.

Gefässbündel (Leitbündel) — I/XL (siehe auch Stele).

Gefässbündelsystem — I/XL, LXXXVI.

Gefässe — siehe Tracheen (I/XL)

Gefässteil (Holzteil) — — I/XLI.

gefiedertes Blatt — I/XCV.

gefingertes Blatt — I/XCV.

geflügelter Blattstiel (petíolus alátus) — I/XCIII; VII, Fig. 1093.

geflügelter Spross bezw. Blütenstandsachse — I/LXXXV; IV/3 1197; V/3 1881; VI/1 494.

gefüllte Blüten — Siehe III 319, 482; IV/2 564, 666 Fig. 1001 b, 992 Fig. 1212; V/1 465, 665; V/3 1636,

Fig. 1091. Gabelspaltung der Wedelspreite bezw. der Fiedern von Polypodium vulgare L. (I, 41).

Fig. 1092. „Hexenbesen" auf der Weisstanne, verursacht durch den Rostpilz Melampsorella caryophyllacearum Schröt. Orig. von R. E. Pfenninger, München.

Fig. 2652 h, i, 1731; VI/1 245, 511, Fig. 259 b, 530, Fig. 268 b, c, d; VII Fig. 1087 und 1094) kommen auf verschiedenem Wege zustande: durch einfache Umwandlung der Staubblätter in Blütenblätter (Petaloidie), durch Spaltung der einfachen Staubblätter, durch direktes Hervorsprossen von überzähligen Blütenblättern zwischen den ursprünglichen Blüten- und Staubblättern, durch Umwandlung des Kelches oder der Honigblätter, durch Ausbildung von sonst unscheinbaren Blüten als Schauapparat (f. tubulósa, f. ligulósa von Compositen), durch Beteiligung von Gallmilben (V/3 1632).

Gegenfüsslerinnen — = Antipoden.

gegenläufige (anatrope) **Samenanlage** — I/CXXXI.

gegenständige Anordnung — I/LXXII.

gegenüberstehend-gefiedertes Blatt — I/XCVI.

gegliederter Spross — I/LXXXIV.

Gehängemoore (Hangmoore) — bilden sich besonders in Gebirgen an Hängen bei recht verschiedenen Neigungswinkeln unter dem Einfluss von Quellen oder herabrieselndem Oberflächenwasser; sie haben Flachmoor- oder Hochmoorcharakter.

Gehilfinnen — siehe Synergiden (I/CXLVII).

Gehölze (Lignosa). (Siehe auch Bäume, Sträucher bezw. Wald und Gebüsch) — darunter versteht man die aus Bäumen und Sträuchern bestehenden Pflanzengesellschaften, die auf unbeweglichem Boden so geschlossen sind, dass sie den Pflanzen der andern niederen Stockwerke wesentlich andere oekologische Bedingungen schaffen, als wenn diese selbst vorherrschend wären. Bäume und Sträucher bezw. Wälder (Silvae) und Gebüsche (Fruticeta) werden unterschieden, weiter Regen- (Pluviilignosa), Lorbeer- (Laurilignosa), Hartlaub- (Durilignosa), Heiden- (Ericilignosa), Fallaub- (Deciduilignosa) und Nadel- (Aciculi- bezw. Conilignosa)-gehölze.

geigenförmiges Blatt — heisst ein längliches Blatt, das in der Mitte beidseitig einen bogigen Einschnitt oder eine weite Bucht hat.

Fig. 1093. Geflügelte Blattstiele von der Orange (Citrus Aurantium L.).

Geigenharz (Colophonium) — bleibt nach Abscheidung des Terpentinöles aus den Primärbalsamen (Terpentinen) übrig (I/107).

Geilstellen — heissen kleinere, zu stark gedüngte Stellen, die eine üppigere Flora erzeugen.

Geissel — I/XVII.

Geitonogamie — I/CXVI; V/2 937.

Geitonokarpie — Fruchtansatz als Erfolg der Geitono- u. der Xenogamie.

Geizen — Kurztriebe des Weinstockes (V/1 966).

gekammerter Fruchtknoten — I/CXXVII.

gekappte Bäume — V/1 449.

gekerbtes Blatt — I/XCVI.

gekielt — der Länge nach von einer vorspringenden Kante durchzogen.

geknäuelt — Teile bilden einen dichten, kugeligen Haufen.

gekniete Granne — Granne der Deckspelze ein Knie bildend (I 253, Fig. 101).

geknieter Spross — I/LXXXV.

gekreuzt-gegenständige Stellung — siehe dekussierte Stellung.



Fig. 1094. Tagetes erectus L. (VI/1, 535). *a*, *b* Köpfchen mit Scheiben- und Randblüten. *c*, *d* mit sog. „gefüllten" Köpfchen (Scheibenblüten ähnlich den Randblüten.) — *e* Caltha palustris L. (III, 457) mit gefüllten Blüten.

Gel — als Gele bezeichnet man die aus ihren Lösungen abgeschiedenen Kolloide. Sie können gallertig, halbweich oder fest sein.

gelapptes Blatt — I/XCIV.

Gelatinisierung — Bildung einer Gallerte (siehe dort).

Gelegenheitsepiphyten (fakultative Epiphyten) — Pflanzen, die sich in Astgabeln oder Rindenrissen der

Bäume aus zufällig durch den Wind oder durch Tiere hergebrachten Samen bezw. Früchten entwickeln (III 16, 138; IV/2 767; VII Fig. 1095).

Geleitzellen — I/XLIII, XLIV.

Gelenkpolster (Gelenke, Blattgelenke, Blattpolster) — sind polsterförmige Verdickungen gewisser Stengel- und Blattstielzonen, welche Krümmungsbewegungen ermöglichen.

Gelenkzellen (Blasenzellen, II 146; VI/1 156) — sind farblose, zartwandige, in Längsstreifen angeordnete Epidermiszellen, die bei der Einrollung des Blattes eine scharnierartige Bewegung gestatten (bei xerophilen Gräsern).

gémma núda — I/ LXV.

Gemme — V/2 809.

gemmipare Blätter — erzeugen Adventivknospen.

gémmula — siehe plúmula.

Gemsläger — siehe Schafläger (IV/2 835).

Gen — = Erbeinheit, Erbfaktor, Einzelelement des Idioplasma.

Generationswechsel — heisst die gesetzmässige Aufeinanderfolge einer Geschlechtsgeneration mit x-Chromosomen (Gametophyt, Haploïdgeneration) und einer ungeschlechtlichen Generation mit 2 x-Chromosomen (Sporophyt, Diploïdgeneration). Siehe I 2.

generativer Kern — I/CXLVII.

generative Zelle — I/CXLVII.

Genetik — = Vererbungslehre.

genetische Spirale — I/LXXIII.

Genossenschaft — siehe Formation, Assoziation, Verein.

Genotypus — besitzt durch innere (Erb-) Anlagen bedingte Merkmale.

génus (Genitiv géneris) — siehe Gattung.

Geoaesthesie — Empfindlichkeit für die Schwerkraft.

Geobotanik — = Pflanzengeographie.

geöhrt (Oehrchen) — am Grunde der Blattorgane sind stumpfe oder rundliche Lappen (Oehrchen) ausgebildet (VI/1 407, Fig. 210 c, c_1).

geogene Veränderungen — können langsame (saekulare) oder sehr plötzliche sein, wodurch für Pflanzen Neuland oder die Möglichkeit, sich auszubreiten geschaffen wird (Bildung von Inseln, Landbrücken, vulkanische Ausbrüche, Bergstürze, Alluvionen, Schlickablagerung usw.).

Fig. 1095. Junge Fichte als „Gelegenheitsepiphyt" auf einer Kopfweide (Salix purpurea L.). Phot. Dr. G. Hegi, München.

Geographische (heteronome) **Bastarde** — bilden sich dort, wo die Verbreitungsgrenzen zweier verschiedenen pflanzengeographischen Bezirken angehöriger Arten sich berühren (Luzula nivea × L. nemorosa, Digitalis lutea × D. ambigua).

Geokarpie, echte (Erdfrüchtigkeit) — Früchte reifen ihre Samen ausschliesslich im Boden aus, Bergung erfolgt durch Verlängerung des Blütenstieles (siehe auch Amphicarpie und Pseudogeokarpie) VII Fig. 1096.

Geologische (heterochthone) **Bastarde** — entstehen dort, wo verschiedene geologische Zonen sich berühren (Primula Auricula × Pr. hirsuta, Gentiana Clusii × G. Kochiana).

Geologische Formationen — zerfallen in Systeme, Serien oder Stockwerke, Stufen, Facies, Schichten, von denen hier nur eine Auswahl gebracht wird.

I. *Palaeozoicum.* 1. Archaicum. 2. Praecambrium. 3. Cambrium. 4. Silur: a) Untersilur oder Ordoricium; b) Obersilur. 5. Devon: a) Unterdevon (Rheinische Grauwacken); b) Mitteldevon (Eifelkalk, Stringocephalenkalk oder Massenkalk); c) Oberdevon (Ibergerkalk, Goniatenschiefer, Cyprinidenschiefer, Klymienkalke). 6. Carbon: Kohlenkalk, Kulm, Flözleerer Sandstein, Steinkohlenformation. 7. Perm oder Dyas: a) Rotliegendes oder Palaeodyas; b) Zechstein oder Neodyas (Verrucano).

II. *Mesozoicum.* 1. Trias: a) Buntsandstein: Leberschieferschichten, Hauptbuntsandstein oder Vogesensandstein, Chirotheriensandsteine, Carneolhorizont, Röth oder Voltziensandstein. In den Alpen Servino- oder Werfenerschichten, Grödenersandstein, Seisser- und Campilerschichten. b) Muschelkalk: Wellendolomit (in Luxemburg Sandstein), Wellenkalk (Schaumkalkbänke), Anhydritgruppe, Zellendolomit, Hauptmuschelkalk mit Krinoidenschichten, Trochitenkalk, Ceratitenschichten, Nodosus-

kalk und Trigonodus-Dolomit. — In den Alpen Reichenhaller-Dolomit, Ramsau-Dolomit, Alpiner Muschelkalk, Partnachschiefer, Rauhwacke, Reiflinger Knollenkalk, Diploporendolomit, Arlbergkalk, Wettersteinkalk, Röthidolomit, Schlern-Dolomit, Esino-Dolomit, Virgloriakalk, Recoaro- und Buchensteinerkalk. c) Keuper: Grauer Keuper oder Lettenkohlenkeuper mit Widdringtonides-Sandstein, Bunter Keuper mit Gipskeuper, Schilfsandstein, Berggipsschichten, Lehrbergschicht, Blasen- oder Plattensandstein, Semionoten-Sandstein, Stubensandstein, Burgsandstein, Zanclodonletten, Gelber Keuper oder oberer Keuper (Rhaetsandstein). — In den Alpen Raiblerschichten, Prosantoschichten, Hauptdolomit, Plattenkalk, Hallstätterkalk, Dachsteinkalk, Quartenschiefer (Norien), Kössenerschichten, Rhät, Conchodondolomit.

2. Jura: a) Lias oder Schwarzer Jura: Angulatensandstein, Gryphaeen-, Arieten- und Arkuatenschicht, Turneriton, Rarikostatenton, Numimalismergel, Amaltheentone, Posidonienschiefer, Radiansbis etwa Christi Geburt). — II. Geschichtliche oder historische Zeit wird in die römische Zeit (bis 400 nach Chr.), ins Mittelalter (bis 1500 n. Chr.) und in die Neuzeit (bis heute) oder aber, wie in Nordostdeutschland und im nördlichen

Jurenschicht, Allgäuschiefer, Fleckenmergel, Hierlatzkalke, Bündnerschiefer. b) Dogger oder Brauner Jura: Opalinuston, Doggersandstein, Personatensandstein, Ostreenkalk, Parkinsoni-Oolith, Macrocephalus-Oolith, Ornatenton. — Eisensandstein, Echinodermenkalk, Parkinsoni-Schichten, Eisenoolith. c) Malm oder Weisser Jura: Grünoolithkalke, Transversariusschichten, Planulatenkalke, Schwammkalke, Frankendolomit, Lithographen-Schiefer, Korallen- und Oolithkalke, Krebsscheeren-Kalke. — Oxfordschichten, Schildschichten (Argovien), Quintnerkalk (Sequanien), Korallenkalk (Portlandien), Radiolarit, Aptychenschichten, Plassenkalk.

3. Kreide, kretazische, Quadersandstein- oder Grünstein-Formation wird gegliedert in: 1. Unterkreide (Valangien oder unteres Neokom, Hauterivien oder mittleres Neokom, Barrémien und Aptien), 2. in Mittel-Kreide (Albien, Cenoman und Turon) und 3. in Oberkreide (Emscher oder Coniacien, Senon, Maestrichtien und Danien). Als Unterstufen oder Facies kommen in Betracht: Kieselkalk (Hautrivien), Orbitolinenschicht (Cenoman), Grünsandstein, Pläner (Albien), Teschener Schichten. — In den Alpen Schrambachschichten (Neokom), Rossfelderschichten (Neokom), Orbitolinenschicht (Cenoman), Gosauschichten (Senon), Nierentalerschichten (Senon), Drusbergschichten (Urgon), Schrattenkalk (Barrémien und Aptien), Gault (Aptien und Albien), Seewerkalk (Turon), Amdenerschichten (Senon), Wangschichten (Maestrichtien).



Fig. 1096. Arachis hypogaea L., Erdnüsschen, als Beispiel für echte Geokarpie. Siehe Bd. IV/3, 1463.

III. *Kaenozoicum* (kaenolithisches Zeitalter). 1. Tertiaer: α) Alt-Tertiaer (Palaeogen oder Eogen): a) Paleozaen: Belgischer Kalk von Mons, Thanetsande von London usw., b) Eozaen (Lutétien, Bartonien, Ludien): Nummulithenschichten (Lutétien, Auversien), Siderolithischer Sandstein (Lutétien), Pariser Grobkalk, Bohnerzbildungen. In den Alpen Hohgantschiefer (Auversien), Lithothamnienkalk (Bartonien), Flysch z. T. (siehe dort!); c) Oligozaen (Sannoisien, Lattorfien, Tongrien, Rupélien, Stampien, Aquitanien): Blaue Erde (Samland), Septarienton, Cyrenenmergel, Cerithienschicht (Paris), Corbiculaschichten, Hydrobienschichten. — Taveyannazsandstein (Lattorfien), Dachschiefer; β) Jung-Tertiaer (Neogen); d) Miozaen (Burdigalien [= Mainzer Stufe], Vindobonien, Sarmatien, Tortonien): enthält marine und tertiäre Nagelfluh, Sandsteine, Mergel und Süßwasserablagerungen, Molasse z. T. (siehe dort), ebenso Kohlenbildungen (siehe Miozaenflora!); e) Pliozaen (Pontien, piacentische und astische Stufe).

2. Quartaer (Quarternär, Posttertiär). Diluvium, Glazial oder Pleistozaen mit starker Entfaltung von Gletschereis, Bildung fluvioglazialer Schotter (Decken-, Hoch- und Niederterrassenschotter, Moränen, Drumling, Asar, Löss), Postglazial (siehe dort) und Alluvium oder Holocaen. Praehistorische und historische Zeit: I. Palaeolithicum oder ältere Steinzeit (siehe dort), Mesolithicum, Neolithicum oder jüngere Steinzeit, Bronze- oder ältere Hallstattzeit (reicht in Italien und Griechenland bis 1000 vor Christus, in der Schweiz bis ca. 750, in Skandinavien bis 500 vor Christus), ältere Eisenzeit oder Hallstattzeit (bis ca. 500 vor Christus), jüngere Eisenzeit oder la Tènezeit (bis etwa Christi Geburt). — II. Geschichtliche oder historische Zeit wird in die römische Zeit (bis 400 nach Chr.), ins Mittelalter (bis 1500 n. Chr.) und in die Neuzeit (bis heute) oder aber, wie in Nordostdeutschland und im nördlichen

Teil von Oesterreich bezw. Tschechoslovakei, in die germanische bezw. vorslavische (500 v. Chr. bis 500 n. Chr.), in die slavische Zeit (600 bis 1100 n. Chr.) und in die spätslavische Zeit (11. bis 13. Jahrhundert) zerlegt.

Geophyten (Erdpflanzen, skotophile Pflanzen) — die Ueberdauerungsorgane (Rhizom, Knolle, Zwiebel) stehen im Substrat und sind daher den Einwirkungen der ungünstigen Jahreszeit wenig ausgesetzt.

Geotaxis — bezeichnet die Orientierung freibeweglicher Organismen nach der Schwerkraft.

Geotropismus — I/LIV

gepaarte Blätter — V/4 2549.

geradläufige (orthotrope) **Samenanlage** — I/CXXX.

Gerbstoffe, Gerbsäuren (Tannin) — sind Verbindungen der aromatischen Reihe, oft Endprodukte des Stoffwechsels. In der lebenden Zelle kommen sie nur im Zellsaft (oft in besonderen Saftbläschen oder Schläuchen) vor. Beim Absterben der Zelle nimmt sie besonders die Zellwand (Kernholz, Rinde) auf.

Gerinnungsenzyme — siehe Labferment.

gérmen (Fruchtknoten) — I/CXXVIII.

Geröllpflanzen — siehe Schuttpflanzen.

gerundete Blattspitze — I/XCV.

gesägtes Blatt — I/XCVI.

Gescheine — V/1 367.

gescheitelt — in einer Ebene liegend.

geschlängelter Spross — I/LXXXV.

Geschlechtertrennung — I/CXXXI.

Geschlechterumschlag — siehe Geschlechtswechsel.

geschlechtliche (sexuelle, digene) **Fortpflanzung** — I/CXLVI.

geschlechtliche Generation — siehe Generationswechsel.

geschlechtslose Blüten — II 260; VII Fig. 1087.

Geschlechtssäule — V/1 482, 618.

Geschlechtsverlust — siehe Apomixis, Apogamie und Parthenogenesis.

Geschlechtswechsel (Geschlechtsumschlag) — III 14, 302; V/1 242, 665; V/3 1930.

geschneitelte Bäume — IV/2 710.

geschnittenes Blatt — I/XCIV.

gesellschaftsfest — eine bestimmte Gesellschaft ausgesprochen bevorzugend, daneben (wenn auch spärlich) in verwandten Gesellschaften auftretend.

gesellschaftsfremd — aus einer fremden Gesellschaft ± zufällig und nur ausnahmsweise eingedrungen.

gesellschaftshold — in mehreren Gesellschaften reichlich vertreten, jedoch eine bestimmte Gesellschaft ± bevorzugend.

gesellschaftstreu — ± feste Bindung an bestimmte Gesellschaften.

gesellschaftsvag (indifferent) — ohne ausgesprochene Vorliebe für eine bestimmte Gesellschaft.

gespaltenes Blatt — I/XCIV

gespreizte Aeste — I/LXXXV.

gestieltes Blatt — I/XCVI.

geteiltes Blatt — I/XCIV

Getreidebrand — siehe Brand.

Gewebe (Zellgewebe) — nennt man Vereinigungen (Komplexe) gleichartiger Elementarteile (Zellen) grösseren oder kleineren Verbänden (I/XXVII).

Gewebesysteme — I/XXVII.

Gewohnheitsrassen (spécies speciáles) — Formen von Schmarotzern (viele Pilze), die sich allmählich an bestimmte Nährpflanzen angepasst haben.

gezähntes Blatt — I/XCVI.

Gift — Gift heisst jeder chemische Stoff, der auf den lebenden Organismus schädigend einwirkt. Unorganische und organische Tier- und Pflanzengifte werden unterschieden.

Gipskristalle — I/XXII.

Gitterrost — IV/2 703, 754.

glasieren — V/1 401.

Glauceszenz — Wachsbildung.

glauk — blaugrün, seegrün.

glazial (diluvial) — eiszeitlich.

Glazialpflanzen (Glazialmigranten) — haben während der Eiszeit Wanderungen vollzogen.

Glazialrelikte — Ueberreste der Eiszeit bezw. der auf sie folgenden Zeitabschnitte.

Glazialzeit (Diluvium) — siehe Geologische Formationen.

gleitende Reihe — V/3 1727.

Gleitfalle (als Blumentypus) — die angelockten Insekten gleiten an steilen Epidermisoberflächen einer Blüte (bezw. eines zum Blütenstand gehörigen Scheidenblattes) aus und stürzen ein Stück weit in die Tiefe, wobei die Bestäubung vollzogen wird (hierher die Kesselfallenblumen, ferner Stanhopea).

Gliederfrucht — I/CL; IV/1 54; IV/3 1121.

Gliederhaare — Haare bestehen aus einer Zellreihe und sind an den Querwänden etwas eingeschnürt.

Gliederhülse (loméntum) — IV/3 1121.
Gliederschote (biloméntum) — IV/1 54.
Globoide — I/XXIII.
Glochiden der Cacteen — V/2 680.
glockenförmig — eine weite, bauchige Röhre mit erweitertem Rande bildend.
glomérulus — = Knäuel.
glúmae — Hüllspelzen der Gramineen (I 168).
Glutinatorien — V/4 2476.
Glykoside (Glukoside) — heissen allgemein solche Pflanzen- und Tierstoffe, die durch Hydrolyse (Wirkung von Enzymen, Wasser, Säuren oder Basen) in mehrere Spaltstücke, von denen eines aber ein Kohlenhydrat sein muß, zerfallen.
Glyzerin — ist ein dreiwertiger Alkohol $C_3H_5(OH)_3$; er tritt in geringen Mengen bei der alkoholischen Gärung auf (V/1 400).
Gonen — Kollektivbegriff für die aus den diploïden Gonotokonten hervorgehenden haploïden Zellen.
goneokline Bastarde — gleichen dem einen der beiden Eltern (párens) vollständig oder wenigstens nahezu (matroklin: der Mutter, patroklin: dem Vater) VI/2 563.
Gonidien — heissen die Algen im Flechtenthallus; siehe auch Konidien.
goniotrich — V/4 2309.
Gonotokonten — Ur-Mutterzellen der Gonen (siehe dort).
Granne (aŕista) — dünner, meist steifer und ± stechender Fortsatz der Deckspelze (I 168).
Grasährchen — siehe Aehrchen (VII Fig. 975).
Grasbäume — II 187.
Grasmoor — siehe Wiesenmoor.
Grenzzone — heisst der meist schmale, zwischen dem mittleren Hochwasser- und Niederwasserstand gelegene Streifen. Siehe auch Kampfzone.
Griffel (stýlus) — I/CXXVIII; II 284; III 301; IV/2 804, 810; VI/2 988.
Griffelhaken — durch Verholzung wird der Griffel zum Kletterorgan (Ranunculaceen, Geum-, Anemone-Arten).

Fig. 1097. Verzweigtes Rhizom (Grundachse) mit Adventivwurzeln der weissen Seerose (Nymphaea alba L.). Siehe Bd. III S. 441.

Griffelplatte — V/3 2050.
Griffelpolster (stylopódium) — I/CXXX; V/2 936.
Griffelsäule — siehe Gynostemium.
Grobkies (Grand) — ist durch Wassertransport gerundeter Grobschutt.
Grobsand — siehe Sand.
Grobschutt — ist locker gehäuft und besteht aus Gesteinsbrocken von mittlerer Größe (von etwa 25 cm Durchmesser bis auf etwa 2 cm herab). Es lassen sich beweglicher oder tätiger Grobschutt (Grobgeröll) und ruhender Schutt (Ruhschutt) unterscheiden. Siehe auch Schutt-(Ruderal-)flora.
Grünblütigkeit — siehe Verlaubung.
Gründüngung — IV/3 1118.
Grünfäule des Holzes — die spangrüne Färbung an faulen alten Stöcken wird durch einen Pilz (Chlorosplénium aeruginósum und Chl. aeruginéscens) bedingt.
Grünmoore — siehe Wiesenmoore.

Grundachse — siehe Rhizom und Grundachse (VII Fig. 1067, 1097, 1132).
Grundgewebe (Grundparenchym) — I/LXXXVI.
Grundgewebshaare — siehe innere Haare.
Grundspirale — I/LXXIII.
grundständiger Griffel — I/CXXIX.
Grus — siehe Feinschutt.
Günz-Eiszeit — Erste Eiszeit.
Gummi arabicum — IV/3 1124.
Gummi-Arten — sind den Kohlenhydraten sehr nahe stehende, in starkem Alkohol, Aether usw. unlösliche Stoffe, die sich im Wasser zu einer dicklichen Flüssigkeit lösen oder zu einem fadenziehenden Schleim oder zu einer Gallerte aufquellen.
Gummifluss (Gummósis) — IV/2 1055; IV/3 1124.
Gummiharze — Gemenge von Gummiarten und Harzen, die in Wasser oder Alkohol nicht vollständig löslich sind (V/2 924, 945, 1356).
Gummiparenchym — IV/2 1054.
Gurtungen — heissen die widerstandsfähigen, technischen Konstruktionselemente des mechanischen Gewebesystems.
Guttapercha — ein chemisch dem Kautschuk ähnliches (als Isoprenderivate aufzufassende Kohlenwasserstoffe) Produkt, das fast ausschliesslich von Sapotaceen (V/3 1895, 2063) gewonnen wird.
Guttation — I/XCIX; V/2 945.
Gynaezeum — = Gesamtheit der Fruchtblätter (I/CXXVII).
Gynaezeumnektarien — Honig bezw. Nektar absondernde Organe an den Fruchtblättern (z. B. Griffelpolster der Umbelliferen).
Gynandria — XX. Klasse des Linné'schen Systems (Staubblätter mit dem Stempel verwachsen).
gynobasisch — V/4 2255.
Gynodimorphismus — bezeichnet das Auftreten von einzelnen Pflanzen mit kleineren weiblichen Blüten bei gynodioezischen Pflanzen.
Gynodioezie — I/CXXXII.
gynodyname Blüten — sind Zwitterblüten, in denen die weiblichen Organe stärker entwickelt bezw. die männlichen ± reduziert sind.
Gynoezie — sämtliche Blüten einer Pflanze sind rein weiblich.
Gynomonoezie — I/CXXXII.
Gynophor (Fruchtknotenträger) — III 483; IV/2 914, 917; V/4 2508.
Gynophyllie — Umbildung von Fruchtblättern in Laubblätter.
Gynostegium — Körper, der durch Vereinigung der Staubblätter und des Stempels zustande kommt (V/3 2058).
Gynostemium (Griffelsäule) — I/CXXIV; II 322.
Gyttje (Teichschlamm) — Humusbildung, entstanden aus Ablagerungen schwimmender Pflanzen, aus tierischen Resten, zersetztem Tierkot und Mineralteilen in klaren Gewässern.

H.

Haare (Trichome) — I/XXX; V/3 1791.
Haare, innere — I/XXVI Fig. 16b; III 439; V/3 1954.
Haarkranzflieger — als anemochore Ausrüstung der Früchte bezw. Samen dient ein seitlich sitzender zierlicher Haarkranz (Heliosperma, Ipomoea-Arten).
Haarkrone — siehe Pappus.
Haarreusen (Haargitter) — im Innern von Blüten befindliche, zu gitter- oder reusenförmigen Gruppen vereinigte Haargebilde.
Haarschuppen — I/CIV.
habituelle Aehnlichkeiten (Fig. 1098 A) — sind Konvergenzerscheinungen, welche teils durch innere Faktoren bedingt werden (Hamamelidaceae mit Kätzchenblütlern, siehe IV/2 656), teils auf äussere, gleichsinnige Anpassungen zurückzuführen sind (Insektivoren, Cuscuta und Cassytha) oder aber durch die Wasserversorgung bedingt werden (siehe Xerophyten inkl. Sukkulenten, Hydrophyten, siehe I/CI Fig. 157).
Habitus — Tracht, äussere Erscheinungsform der Pflanze.
Hadrom (Gefässteil) — I/XLI, XLIV.
hadrozentrisches (amphikribrales) **Leitbündel** — konzentrisches Leitbündel, bei dem der Gefässteil die Mitte und das Leptom die Hülle bildet (I/XLIII Fig. 39).
Häckelfrüchte — I/CLIV; IV/3 1253; V/1 43; V/2 939, 1504; VI/1 498; VI/2 826.
Haematochrom — blutroter Farbstoff, der (bei Algen) auch als Reservenährstoff dient.
Haffblüte — siehe Wasserblüte.
Haftscheiben — I/LXXV; V/1 354.
Haftwurzeln — I/LX; V/2 918, 920.
Hahnenkammform — III 261; V/2 686.
Hakenhaare — siehe Kletthaare.
Halbformation — siehe sekundäre Formation.

Halbarten (hemikepogene) **-Bastarde** — sind Kreuzungen von Gartenpflanzen mit nahe verwandten, in der Nähe wildwachsenden Arten (Solidago Virga aurea × S. Canadensis, Lychnis Coronaria × L. flos Jovis).

Halbkulturrasen — siehe Kulturrasen.

Halblianen — I/LXXVI.

halbober- oder **halbunterständige Blüte** bezw. Fruchtknoten — die Blüte bezw. der Fruchtknoten ist weder ganz ober- noch ganz unterständig (z. B. Saxifragaceae).

halbschlafende Blüten — siehe hemigamotrope Blüten.

Halbschmarotzer — III 152.

halbstengelumfassendes Blatt — das Blatt umfaßt den Stengel mit seinem Grunde nur halb.

Halbsträucher (chamaephyta suffrutescéntia) — der obere Teil der Triebe ist in der Trockenzeit abgedorrt, während der untere erhalten bleibt und die Ueberdauerungsknospen trägt (I/LXIX; IV/2 668).

Halbwaisen — Bastarde, von denen einer der Eltern heute in der näheren oder weiteren Umgebung fehlt.

Halm (culmus) — I/LXXXIV; I 166.

Halmknoten — I 166.

halophil — salzliebend.

Halophyten (Salzpflanzen) — I/XXXVI, LXXIX; III 256.

Halophyten, fakultative — Pflanzen bevorzugen Salzboden, gedeihen aber auch auf salzarmem Boden.

Halophyten, obligate — Salzpflanzen (vertragen viel Salz) und sind auf Salzboden bezw. Salzwasser angewiesen.

Haloplankton — = Mikroplankton des Salzwassers.

handförmiges Laubblatt — I/XCV; VII Fig. 1098 B.

handnerviges Laubblatt — I/XCVII; VII Fig. 1098 B.

hapaxanthisch — = monokarpisch (nur einmal blühend) (I/LXIX).

Haplobionten — siehe monokarpische Gewächse (I/LXIX).

haplochlamydeisch — V/2 1570.

haploïd — ist der Zellkern der Geschlechtszellen, d. h. er enthält die einfache Chromosomenzahl.

Haploïdgeneration — siehe Generationswechsel.

haplokaulisch — siehe einachsig.

Haplont — bezeichnet das ganze haploïde Stadium (also von der Reduktionsteilung bis zur Befruchtung).

Haplophase (bei der geschlechtlichen Fortpflanzung) — wird durch die Gesamtheit der Zellen mit haploïdem Kern mit Einschluß der von ihnen abgeleiteten Geschlechtszellen gebildet.

haplostemones Androezeum — I/CXXVI.

haptotrop — VI/1 312.

Haptotropismus (Thigmotropismus) — durch Kontakt- (Berührungs-) reiz ausgelöste tropistische Bewegungen bezw. Krümmungen.

Hartbast — I/XLIII.

Hartgräser — heissen dauernd assimilierende, hochschäftige Horstgräser.

Hartlaubgebüsche (Durifruticeta) — Hartlaubgehölze, bei denen Gebüsche vorherrschen (Macchia und Garigue im Mittelmeergebiete, Scrub in Australien).

Hartlaubgewächse — besitzen versteiftes, ziemlich kleines, vielfach behaartes, immergrünes Laub (V/2 791).

Hartlaubwälder (Durisilvae) — Hartlaubgehölze, die vorzugsweise aus Bäumen bestehen (Eucalyptus-, Casuarina-, Stein-Eichen- und Kork-Eichen-Wälder).

hartschalige Samen — sind solche (u. a. verschiedene Leguminosen), die nicht quellen und kein Wasser aufnehmen.

Hartschicht der Früchte bezw. der Samen — besteht aus sklerenchymatischen Elementen und bedingt die eigentliche Festigkeit der Frucht- bezw. Samenschale (I/XXXVIII).

Harzbildung — erfolgt gewöhnlich in besonderen Zellen oder aber in schizogenen bezw. schizolysigenen, zuweilen in Form von Kanälen oder Schläuchen ausgebildeten Behältern (I/XXXIV).



Fig. 1098 A. Eryngium ebracteatum Lam. (s. Bd. V/2, 975). Phot. Dr. G. Hegi, München.

Fig. 1098 B. Acer Pseudoplatanus L., Berg-Ahorn, mit handförmigen und handnervigen Laubblättern.

Harzdrüsen — sondern an Knospenschuppen (Rosskastanie) oder an jungen Blättern (Birke, Erle, Balsampappel) harzartige Stoffe ab (vgl. auch „lackierte Blätter"). Siehe III 11, 78 Fig. 476; V/3 1628, 1644.

Harze (Resine) — sind in Terpentinöl, Aether, Alkohol ± lösliche, kohlenstoffreiche, stickstoffreie Körper (Stoffgemenge), die unter anderem esterartige, spaltbare, flüssige Substanzen, die Harzester oder Resine und die gegen Alkalien und Säuren sehr widerstandsfähigen, wohl zu den Oxypolyterpenen gehörenden Resene enthalten. Als Beisubstanzen kommen in Betracht: Terpene, aromatische Verbindungen (Alkohole oder Resinole, Phenole, Ester, Säuren und Aldehyde, aromatische Säuren, Bitterstoffe), Gummiarten, ätherische Oele usw. (V/3 1900).

Harze, fossile — siehe Bernstein und Kopale.

Harzfluss (Resinosis) — entsteht gewöhnlich durch einen Verwundungsreiz im Holzkörper; die heraustretende Lösung, die auch als Wundverschluß dient, erstarrt an der Luft zu einer festen Masse.

Harzfluss, primärer — kleine Einschnitte oder sogar nur Einstiche genügen zur Erzeugung eines Sekretergusses.

Harzfluss, sekundärer — erfolgt durch tiefgreifende Verletzungen und beruht auf sekundären Gewebe-Veränderungen (Bildung von Jungholzpartien mit neuen Harzbehältern).

Harzgang (Harzkanal) — I/XXXIV Fig. 30 b.



Fig. 1099. Garchingerheide nördlich von München als Typus einer „süddeutschen Heidewiese" (mit Lycoperdon caelatum Bull.). S. Bd. III, 535. Phot. Dr. Emil Schmid, München.

Haube (der Blüte) — V/2 781.

Hauptachse — V/1 137 (siehe Achse, Spross).

Hauptnerv (Mittelnerv) — I/XCVII.

Hauptwurzel — siehe Pfahlwurzel.

Haustorialfortsatz (Saugfortsatz) — heisst der in die Wirtspflanze eindringende (intramatrikale) Teil der Haustorien.

Haustorialknopf (Haustorialanschwellung) — wird der außerhalb des Wirtsorganes liegende (extramatrikale) Teil der Haustorien genannt.

Haustorien — I/LIX; III 156 Fig. 516; IV/3 1729; V/3 2029; VI/1 83, 130, 134. Siehe auch Embryosackkern und Endospermhaustorien.

Hautbildungsgewebe — siehe Dermatogen.

Hautdrüsen (äussere Drüsen) — sind epidermale Gebilde, die Oel, Harz, Schleim, Gummi usw. ausscheiden.

Hautgelenk (des Spaltöffnungsapparates) — als solches wird ein verdünnter Membranstreifen bezeichnet, welcher sehr oft die Aussenwände der Nebenzellen parallel der Rückenseite der Schliesszellen durchzieht (zuweilen auch die entsprechenden Innenwände) und beim Oeffnen und Schliessen wie ein Scharnier wirkt.

Hautgewebe — I/XXVII, LXXXV.

hautreizende Drüsen — V/1 219; V/3 1721; siehe auch Dermatitis und Allergie.

Hebelschleuderer — Teile der saftigen Frucht dienen beim Fortschleudern der Samen als Hebel (Impatiens, Cyclanthera, Cardamine-Arten).

Hefepilze (Saccharomycétes) — V/1 400; V/3 1993; VII 140.

Heide — bezeichnet ursprünglich wohl nicht mehr als unbebautes Land. Heiden entstehen entweder auf Sandboden oder alten Hochmooren; sie zeigen oft einen dicht gedrängten Pflanzenwuchs.

Heidegehölze (Ericilignosa) — Holzpflanzen mit erikoiden Blättern.

Heidehumuspflanzen — I 375.

Heidemoor — siehe Hochmoor.

Heidewiesen — sind Trockenwiesen (Brometen), die besonders in Süddeutschland verbreitet sind und meistens eine reichhaltige Flora aufweisen (VII Fig. 1099).

Hekistothermen — Gebiete werden von Pflanzen mit den bescheidensten Wärmeansprüchen besiedelt. Die mittlere Jahrestemperatur liegt unter dem Nullpunkt.

heliophiles Blatt — siehe Sonnenblatt.

heliophobes Blatt — siehe Schattenblatt.

Heliophyten — Pflanzen sonniger Standorte.

Heliotropismus — siehe Phototropismus.

Heliotropismus, negativer — V/1 562.
Helm — siehe Blüten der Orchidaceen und von Aconitum.
Helophyten — = Sumpfpflanzen des Süsswassers.
hemerophob (menschenfliehend) — V/2 707.
Hemerophyt (an Siedlungen gebunden) — IV/3 1534.
hemigamotrope (halbschlafende) **Blüten** — öffnen und schliessen sich nur unvollständig.
Hemikryptophyten (Erdschürfepflanzen) — Knospen befinden sich hart auf dem Erdboden oder innerhalb einer Laub- und Moosdecke (IV/2 512; V/1 179).
Hemiparasit — Halbschmarotzer (siehe III 151; VI/1 72, 83).
Hemipelorien — V/4 2263.
Hemisaprophyten — vermögen ihren Kohlensäurebedarf z. T. oder ganz durch Photosynthese zu decken.
hemisynkotyl — Keimblätter sind nicht vollständig verwachsen (z. B. nur am Stielgrund).
hemitetrakotyle Pflanzen — Keimpflanzen mit zwei gespaltenen Samenlappen oder mit drei Kotyledonen.
hemitrikotyle Pflanzen — Keimpflanzen mit einem normalen und einem gespaltenen Keimblatt.
hemitrope Blüten — halb- oder nur unvollkommen an bestimmte Insektengruppen angepasste Blumen.
Hemizellulosen — zeichnen sich durch ihre leichte Hydrolysierbarkeit aus; sie liefern bei der Hydrolyse verschiedene Spaltprodukte wie Galaktose, Mannose usw.
hemizyklische Blüten — I/CXXXIV.
Hemmungsbildungen (Hypoplasie) — der Organismus oder einer seiner Teile erfährt nicht die normale Ausbildung, sondern schliesst seinen Entwicklungsgang vorzeitig ab, oft als Folge ungenügender Ernährung, durch Einwirkung von Galltieren usw. (IV/3 1649, 1652; VII Fig. 1100.)
Hemmungsfaktoren — Gene, welche das Aktivwerden anderer Gene in irgendeiner Weise verhindern, also eine „Latenz" bedingen.
Hemmungskörper (Fermentgifte) — verzögern oder heben die Fermentreaktion auf.
Heptandria — VII. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit 7 freien Staubblättern).
herablaufendes Blatt — I/XCVI.
Herbstdrift — V/2 909; V/3 2165 (siehe auch Drift).
Herbstfärbung, rote — wird durch einen im Zellsaft gelösten roten Farbstoff (Anthocyan oder Erythrophyll) bedingt.
Herbstform(-rasse) — V/3 1983.
Herbstholz — I/LXXXVIII.
Herbstkeimung — V/2 811.
Heredität — Vererbung.
Herkogamie — Blüten zeigen im Bau der Geschlechtsorgane solche Einrichtungen (Staubbeutel und Narben stehen horizontal oder vertikal weit voneinander), daß eine Belegung mit eigenem Blütenstaub [auch bei Homogamie] nicht erfolgen kann (viele Liliaceae, Orchidaceae, Verbascum, Pirola, Iris [II 285] usw.)

Fig. 1100. Athyrium Filix femina (L.) Roth (I, 33). Spitzen der Endfiedern gehemmt, eingerollt. Verursacht durch eine Fliege (Anthomyia signata Brischke).

hermaphroditische (zwitterige) **Blüten** — I/CXXXI.
Hernie — IV/1 251.
herzförmiges Blatt — I/XCV.
herzynisch — IV/2 802 Fussnote 4.
hesperídium — Bezeichnung für die Früchte der Agrumen.
Heteranthie — ungleiche Ausbildung der Staubblätter (V/4 2261, 2280).
heteroblastisch — heisst eine Entwicklung, bei der Jugend- und Folgeform voneinander abweichen (heterophylle Gewächse) V/1 538.
Heterocanthie — IV/2 979.
heterochlamydeïsche Blüte — I/CXVIII; III 5.
heterochorische Arten — treten in ganz verschiedenartigen Assoziationen auf.
Heterodichogamie — Vorkommen metandrischer u. metagyner Individuen bei der gleichen Pflanzenart (III 10).
Heterodistylie — I/CXLI; V/3 1725.
Heterodynamie (heterodynamischer Hermaphroditismus) — tritt bei solchen Zwitterblüten in Erscheinung, bei denen der weibliche bezw. männliche Charakter schon äusserlich durch relativ starke Entwicklung bezw. Reduktion des Gynaeceums oder Androeceums zum Ausdruck kommt (V/1 371).

heteroezische (metaxene) **Pilze** — wirtswechselnde Pilze, die ihren Entwicklungszyklus (Sporenkategorien) auf verschiedenen Nährpflanzen vollführen.

Heterogenesis — = Mutation I/CXVI.

Heterokarpie — I/CLI; IV/2 335; V/2 939; VI/2 800 (siehe auch Pseudoheterocarpie).

heterokline Bestäubung — siehe Fremdbestäubung (Allogamie).

heteromere (heterozyklische) **Blüten** (I/CXXXIV) — besitzen ungleichzählige Quirle. Heteromerie kann ursprünglich sein oder sie wird durch nachträgliche Veränderungen (Verdoppelung, Abort usw.) hervorgerufen.

Heteromericarpie — V/2 940.

Heteromesogamie — Individuen derselben Art besitzen verschiedene Bestäubungseinrichtungen (siehe Autoallogamie, Homodichogamie, Anemo-, Entomophilie, Di-Entomophilie).

Heteromorphie — unregelmässige Ausbildung eines Organes.

Heterophyllie (Verschiedenblätterigkeit) — I/CII, CXIV; I 5, 130 Fig. 58; III 579; IV/3 1548; V/2 783, 896, 919, 1160, 1222; VI/1 87, 516.

heteroploïder Typus — der Chromosomensatz weist zu viel oder zu wenig Chromosomen auf (hypo- oder hyperdiploïd).

Heterorhizie — Verschiedenwurzeligkeit (z. B. Arbeitsteilung des Wurzelsystems bei der gleichen Pflanze in Ernährungs- und Befestigungswurzeln, in Haft- und Zugwurzeln).

Heterospermie — die Samen sind bei derselben Art verschieden ausgebildet (IV/1 111).

heterospore Gefässkryptogamen — I 4, 47, 69.

Heterostachyae — verschiedenartige Seggen (II 52).

Heterostemonie — V/4 2599.

heterostomatisch — heissen Organe, die an verschiedenen Stellen voneinander abweichend gebaute Spaltöffnungen besitzen.

Heterostylie — I/CXXIII, CXLI; V/1 4; V/3 1725, 1958, 1963.

Heterotaxie — Organe bilden sich an Stellen, wo sie unter normalen Verhältnissen nicht auftreten würden.

heterotope Kolonien — Ansiedlungen von Kieselpflanzen in einem ausgesprochenen Kalkfloragebiet und umgekehrt.

Heterotrichie — IV/3 1526.

Heterotristylie — I/CXLII; V/2 743.

heterotrophe Pflanzen — siehe allotrophe Pflanzen.

Heterotrophie — heisst die ungleiche Förderung der Gewebe bezw. Organe.

Heterozygot — sind Individuen, die aus der Verschmelzung von Gameten mit verschiedenen Erbfaktoren hervorgegangen sind.

heterozyklische Blüten — I/CXXXIV.

Heufieber (Heuschnuppen) — siehe Pollenallergie.

hexakotyle Pflanzen — besitzen 6 Keimblätter.

hexamere Blüten — = sechszählige Blüten (Lythraceae).

Fig. 1101. Hexenbesen auf Birken, verursacht durch Schlauchpilze (Taphrina-Arten), bei Schleissheim (Oberbayern). Phot. Dr. Meta Lutz und Dr. G. Hegi, München.

Hexandria — VI. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit 6 freien Staubblättern).

Hexenbesen (Donnerbesen, Donnerbüchse) IV/2 1056; V/3 1916; VII Fig. 1092 und 1101 — sind organoide Gallen (siehe dort!), die durch abnorme Verzweigung zustande kommen und als dichte, besenartige oder kugelig geballte, perennierende Sprossanhäufungen von den normalen Teilen der Wirtspflanzen oft auffallend abstechen. Als Erzeuger kommen Milben, Exoasaceen, Ustilaginaceen und Uredineen in Betracht. Daneben gibt es auch nichtparasitäre spontane Abänderungen (IV/2 1056).

Hexenringe — II 148.

Hexosen ($C_6H_{12}O_6$) — sind Aldehyde der sechswertigen Alkohole (Aldosen) oder Ketone der sechswertigen Alkohole (Ketosen). Zu den ersteren gehören die Dextrose oder Glukose (Traubenzucker), die Mannose und die Galaktose, zu den letzteren die Fruktose oder Laevulose (Fruchtzucker) und die Sorbose.

hibernácula — siehe Winterknospen oder Turionen I/LXVI; V/3 1867; VI/1 164; VII Fig. 1159.

hílum (Nabel) — I/XLIX, CXXX; IV/3 1139, 1633.

Hispidität — IV/2 1021.

histioide Gallen — siehe Gallen.

Histogene — Gesamtbezeichnung für diejenigen Bildungszentren des Urmeristems, welche bestimmte Dauergewebepartien der verschiedenen Organe liefern.

Histologie — Gewebelehre (I/XXVII).

Hochblätter (hypsophýlla) — I/CX, CXXXIII, CXXXVIII; III 315; VII Fig. 1083 und 1102 (siehe auch extraflorale Schauapparate).
Hochmoorbülten — siehe Bulten.
Hochmoore (Moos- oder Heidemoore) (sphagnipráta) — Pflanzengesellschaften, die unabhängig vom Grundwasser, nur auf Meteorwasser angewiesen sind, Sümpfe bilden und ihren Boden vorzugsweise durch eine Sphagnumdecke selbst erzeugen. Sie kommen nur in kalttemperierten Gebieten mit grosser Luftfeuchtigkeit vor.
Hochstauden — IV/2 668; V/2 1397; VI/1 403.
Hochstaudenwiesen — verlangen einen humusreichen, frischen, feuchten Boden und bestehen aus hohen, meist grossblätterigen Stauden.
Hochzuchten (hochgezüchtete Rassen) — nennt man die durch Selektion, Kreuzung, Inzucht usw. bedeutend verbesserten Rassen.
Hoftüpfel — I/XXV Fig. 14 b.
Höhenstufen — siehe Stufen.
Hohlblatt — siehe Röhrenblatt.
Hohlkugelkissen — IV/1 116.
Hohlschuppen — = Schlundschuppen (I/CXX).
holarktisches Florenreich (Holarktis) — umfasst den subtropischen, gemässigten und kalten Gürtel der ganzen nördlichen Erdhälfte.
Holoparasit — Ganzschmarotzer oder echter Schmarotzer (V/3 2091; VI/1 129, 134).
holotrich — V/4 2309.
Holz, sekundäres — I/LXXXVI, LXXXVIII.
Holzfasern — I/XXXVII.
Holzfeige — siehe Caprifikation (III 126).
Holzgrenze, absolute (der Alpen) — wird durch die allerobersten Pioniere von Zwergsträuchern gebildet (Juniperus nana steigt bis 3570 m hinauf).
Holzkopfstauden — IV/2 668.
Holzkörper — I/XC; III 508.
Holzkörper, zerklüfteter — I/XCIII; III 508.
Holzkörper, zusammengesetzter — I/XCII.
Holzkropf der Weiden — III 16.
Holzlianen — siehe Windepflanzen (VII Fig. 1170).
Holzparasiten — siehe Viscum und Loranthus.
Holzparenchym — I/XLIII, XLIV.
Holzrosen — strahlige Gallbildungen, die Loranthaceen auf ihren Wirtspflanzen verursachen (III 145).



Fig. 1102. Haemanthus tigrinus Jacq., Blutblume (Amaryllidaceae). *a* Habitus (die zahlreichen unscheinbaren Blüten werden von 6 blutroten Hochblättern umgeben). *b* Einzelblüte (Blütenhüllblätter fädlich.)

Holzstoff (Lignin) — ist kein einfacher Körper und reicher an Kohlenstoff als die Kohlenhydrate. Bestandteile oder Spaltungsprodukte sind Cellulose und Gummiarten.
Holztriebe, reine — IV/2 1059.
homalochorische Arten — diese halten sich streng an eine einzige Assoziation.
homoblastisch — heisst eine Entwicklung, bei der Jugend- und Folgeform identisch sind oder unmerklich ineinander übergehen (V/1 538).
homochlamydeïsche Blüten — I/CXVIII.
Homodichogamie — manche Pflanzen derselben Art sind homogam, andere dichogam.
Homoesis (bei Farnen) — Umbildung einzelner Fiedern in ganze Wedel oder (in weiterem Sinne gebraucht) die Neigung einfach gefiederter Wedel bipinnat oder tripinnat zu werden.
Homogamie (Selbstbestäubung, Zwitterreife) — I/CXLI.
Homoheterostylie — bei derselben Art kommen gleichgriffelige und ungleichgriffelige Blüten vor.
homoiochlamydeïsche Blüten — I/CXVIII.
Homoiogamie — Verschmelzung zweier Kerne der gleichen Art.
homokline Blüten — siehe Autogamie.
homologe Organe (Homologie) — werden in gleicher Weise angelegt und stimmen in ihrer Stellung und in den Anfangsstadien ihrer Entwicklungsgeschichte überein, wenn sie sich auch später verschieden weiter entwickeln (siehe analoge Organe).
homologe Reihen — genetisch nahe verwandte Arten zeichnen sich durch parallele und gleichbedeutende Reihen der Merkmale aus (erbliche Variationen).
Homostachyae — gleichährige Seggen (II 52; VII Fig. 1103).
homostyle Blüten — V/3 1726.
homozygot — sind Individuen, die aus der Verschmelzung von Gameten mit gleichen Erbfaktoren hervorgegangen sind.
Honig — I/CXXI, CXLV.
Honigblätter — I/CXXII; III 452; IV/1 10.

Honigblumen — siehe Nektarblumen (I/CXLV).

Honigdiebstahl (Honigraub) — wird zuweilen (durch Anbohren der Blüten von aussen) durch unberufene Gäste, die auf dem normalen Wege nicht zum Honig gelangen können, ausgeführt (III 482).

Honigdrüsen — III 13; IV/1 52, 64.

Honiggrübchen — I/CXXI, CXXII; III 575 Fig. 702.

Honigtau — V/1 442.

Hopfendrüsen (Lupulindrüsen) — III 131/132.

Hormone — innere Reizstoffe, die Entwicklung, Bau und Funktion der Organe regeln. Sie leiten die Tätigkeit einzelner Fermente ein.

Horizontalprojektion der Blüte — siehe Diagramm.

Horstpflanzen (hemikryptophýta caespitósa) — sind mit umhüllten und durch eine dicke Strohtunika (siehe dort!) aus verwitternden Blattscheiden geschützten Erneuerungsknospen versehen (I 166; II 78; VII Fig. 1104).

Horstflachkissen — V/3 1789.

Horstpolster — Polster mit unregelmässigen wurzelnden Trieben (II 78; V/3 1717).

hort. — = hortórum (der Gärten). Von Gärtnern aufgestellte Namen, die botanisch nicht immer einwandfrei sind.

hortifuge Pflanzen (hortifuge Oekiophyten) — gartenflüchtige Arten, die sich zuweilen erhalten und einbürgern.

Hüllbecher — siehe Achsenbecher, Cupula, Scheinfrüchte (VII Fig. 1050).

Hüllblätter — I/CXI; V/2 1541; VI/1 394; VI/2 946.

Hüllchen (involucéllum) — I/CXXXVIII; V/2 930.

Hülle (involúcrum) — I/CXI, CXII; V/1 134; V/2 930; VI/1 394 (siehe auch Integument!).

Hüllgewebe — siehe Periblem.

Hüllkelch — siehe Involucrum und Aussenkelch.

Hüllspelzen (glúmae) — I 168; VII 5, Fig. 975.

Hülse (legúmen) — I/CL; IV/3 1138, 1253.

hüpfende Früchte — siehe kriechende Früchte.

humicole Arten — Humus liebende Pflanzen (II 374).

humid — feucht, nass. Klimabezeichnung für Gebiete mit reichlicheren Niederschlägen.

Hummelblumen — I/CXLVI; III 492.

Humus — der Kollektivbegriff Humus umfasst alle bei Sauerstoffabschluss oder ungenügender Sauerstoffzufuhr in Zersetzung begriffenen organischen Körper (siehe auch Mullerde, Rohhumus, Trockentorf).

Humusanzeiger — Pflanzen, die nicht auf rein mineralischem Boden vorkommen, sondern Humus (Mullerde) verlangen.

Humusboden — der Humusgehalt beträgt über 50%.

humusstet — ausschliesslich auf Humus gedeihende Pflanzen.

Humuszehrer — ernähren sich von den Humussubstanzen (siehe Saprophyten).

Hungerfacies — ist eine edaphische, durch Nährstoffarmut ausgezeichnete Gesellschaft.

Hungergräser (Angergräser) — besitzen sehr feine, tiefgehende Wurzeln, die dem trockenen Boden die letzten Spuren von Feuchtigkeit bezw. Nährstoffen entziehen.

Hyaloplasma — I/XVIII.

Hybride — siehe Bastard.

Hybridisation — I/CXLII.

hybridogene Art — durch Bastardierung erzeugte konstant gewordene Art (siehe I 32; IV/2 844; V/2 881; V/4 2353; VII 12/13.

Hydathoden (Wasserspalten, Wasserdrüsen) — I/XCVIII, XCIX; IV/3 1726; VI/1 157; siehe auch Trichomhydathoden.

Fig. 1103. Carex chordorrhiza Ehrh. (II, 60). *a* Habitus mit peitschenförmigen, sympodial gebauten, oberirdisch kriechenden Ausläufern. *b* Weibliche, *c* männliche Blüte. *d*, *e* Fruchtschlauch. *f* Stengelquerschnitt.



Fig. 1104. Carex stricta Good. (II, 78). Einzelner, blühender Horst. Phot. V. Zünd, München.

Hydatochorie — Verbreitung der Früchte und Samen durch das Wasser (siehe auch Hygrochasie).
Hydatophyta — siehe Hydrophyta.
Hydroaesthesie — Empfindlichkeit für Feuchtigkeit.
Hydrochariten — freischwimmende Pflanzen des Süsswassers, oft mit rosettig angeordneten, schwimmenden Blättern (IV/2 509).
hydrochore Verbreitung — die Verbreitung der Samen bezw. Früchte erfolgt durch das Wasser bezw. Meeresströmungen (II 186; V/3 2127).
Hydrokarpie — Ausreifen der Früchte im Wasser.
Hydrolyse — Zersetzung von Verbindungen unter Wasseraufnahme, z. B. Spaltung von Kohlehydraten unter Wasserzutritt. So wird unter der Einwirkung des Fermentes Diastase die Stärke zu Glukose hydrolysiert.
Hydrom — Bezeichnung für das typische Wasserleitungssystem.
Hydromegathermen — Gebiete mit viel Feuchtigkeit und hoher Wärme (mindestens 20° mittlere Jahrestemperatur).
hydrophil — feuchtigkeitsliebend.
hydrophile Pflanzen (Wasserblütler) — I/CXLIII.
Hydrophyten — zu den Hydrophyten gehören alle nicht zum Plankton zählenden Wasserpflanzen, deren Ueberdauerungsorgane während der ungünstigen Jahreszeit im Wasser untergetaucht sind.
Hydropoten — V/3 1963.
Hydrostereïden —Elemente, die sowohl der Wasserleitung als der Festigung dienen.
Hydrotropismus — Krümmungsbewegungen werden durch eine Feuchtigkeitsdifferenz in der Luft oder im Wasser hervorgerufen.
Hydrotropismus, negativer — Pflanzenteile krümmen sich von feuchten Medien weg.
Hydrotropismus, positiver — Pflanzenteile krümmen sich einem feuchten Medium zu bezw. wenden sich von trockenen Stellen ab.
Hygrochasie (V/2 1171) — Fruchtstände führen zufolge von Durchfeuchtung bezw. Regenfall Bewegungen aus, welche das Ausstreuen der Samen oder Sporen erleichtern; sie schliessen sich aber wieder beim Austrocknen (siehe Regen- und Auferstehungspflanzen).
Hygrophyten — feuchtigkeitsliebende Pflanzen mit geringer Wasserversorgung.
hygrophytische Paravarianten — heissen die verschiedenartigen Anpassungen der Wasserpflanzen.
hygroskopisch — wasseranziehend.
hygroskopische Bewegungen — beruhen auf Quellung (bezw. Entquellung oder Schrumpfung) der Zellmembranen.
hygroskopischer Mechanismus — IV/1 70.
hygroskotophil — VI/2 744.
Hylaea — Regenwaldgebiete des äquatorialen Brasiliens.
Hylogamie — Fusion eines Sexualkernes mit einem vegetativen Kern.
Hymenium — Fruchtschicht (gebildet aus Asci, Basidien) vieler Pilze und Flechten.
Hymenopterenblumen — Hautflüglerblumen.
Hypanthium — siehe Receptaculum (I/CXXVIII).
Hyperblasie — bezeichnet eine auf Zellteilung beruhende abnorme Massenzunahme der Gewebe bezw. der Organe.
Hyperpetalie — siehe gefüllte Blüten (V/3 2167).
Hypersepalie (hypersepaler Kelch) — V/3 2167.



Fig. 1105. Corylus Avellana L. (Haselnuß). *a* Junge Pflanze. *b* Im Boden keimende Nuss. *c* Schnitt durch die Nuss.

Hypertrophie — abnormer Wachstumszuwachs bei einem Organ (vgl. auch III 145).
Hyphen (Pilzfäden) — ± reich verzweigte Fäden, welche den Vegetationskörper (Myzel) der Pilze und Flechten bilden.
Hyphydrogámicae — Wasserblütler, bei denen die Bestäubung unter dem Wasser erfolgt.
hypnoider Typus — IV/2 570.
Hypoderm — Unterhautgewebe, mehrschichtige Epidermis (I/XXX, XCVIII Fig. 150).
hypogäische (unterirdische) **Keimung** — (III 75; IV/3 1122. 1637; VII Fig. 1105).
Hypogeokarpie — siehe Amphikarpie.
hypogyne Blüten — I/CXXVIII.
Hypokarp — IV/2 804, Fig. 1105b.
Hypokotyl (hypokotyles Glied) — I/XLVI.
hypokotyle Adventivknospen — V/3 1870.
Hyponastie — I/LXXIV.
hypophyllopoder Wuchs — VI/2 1184.
Hypoplasie — siehe Hemmungsbildungen.
hypostomatisch — heissen Laubblätter, welche nur auf der Unterseite Spaltöffnungen tragen.

Hypotrophie — Förderung der Gewebe bezw. Organe auf der morphologischen Unterseite.
hysterogene Gerbstoffbehälter — gehen durch nachträgliche Teilung aus Parenchymzellen hervor im Gegensatz zu den protogenen.

I.

Jahresringe — I/LXXXVII; V/1 432.
Icosandria — XII. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit 20 und mehr, dem Kelch eingefügten Staubblättern).
Idiobiologie — Lehre von den Einzelorganismen.
Idioblasten — in den verschiedensten Geweben einzeln oder in Gruppen (Zellnester) auftretende, fremde, nach Bau und Funktion vollständig abweichende Formbestandteile. Siehe auch IV/1 64; V/11 495.
Ikterus — = Chlorose, Bleichsucht.
illegitime Befruchtung — wird bei der Heterostylie die Befruchtung der Narbe mit dem Pollen der ungleich hoch inserierten Staubblätter bezeichnet.
Imbibition (Quellung) — heisst die mit einer Volumenzunahme verbundene Aufnahme von Flüssigkeit.
imbrikate Knospendeckung — I/CXXXV.
Immenblumen — siehe Bienenblumen.
Immenblumen mit Umwanderungseinrichtung — V/1 659.
Immenfallenblumen — Bienenblumen, die häufig auch von Faltern besucht werden.
immune Rassen bezw. **Kultursorten** — sind durch Züchtung, Inzucht, Auslese, Kreuzung usw. entstanden und sind gegenüber gewissen Krankheiten oder gegen Schädlinge (z. B. Peronospora, Kartoffelkrebs, Reblaus, Orobanche-Arten usw.) unempfindlich geworden.
Immunität — Unempfindlichkeit gegen gewisse Giftstoffe und Infektionskrankheiten.
Immunserum — gibt nur mit dem als Antigen benützten Eiweiss einen Niederschlag (IV/3 1644).
Inaktivierung — vorübergehende Hemmung bezw. Verhinderung einer Organfunktion.
indifferente Arten bezw. **Gesellschaften** — reichen aus dem basischen weit in den sauren Reaktionsbereich hinüber.
indigen — einheimisch.
indoloide Düfte — durch Indol, Skatol (heterozyklische Verbindungen) bedingte üble Blumendüfte (Aasgeruch von Araceen, Stapelia, Balanophoraceen usw.).
Indument (Kleid) — Bekleidung des Pflanzenkörpers (VII Fig. 1106).
induplikat-valvate (induplikate) **Aestivation** — heisst die klappige Aestivation, bei der die sich berührenden Ränder nach innen gebogen sind (V/3 1953).
Indusium (Schleier) — I 5; 11, Fig. 4.
induziert — durch Aussenfaktoren hervorgerufen.
inermis — unbewaffnet, wehrlos (Gegensatz bewehrt).



Fig. 1106. Lychnis Coronaria (L.) Desr. (Ill, 297). Falterblume mit einem weissen, dichten, seidenhaarigen Wollfilz bedeckt. Phot. Otto Ziegler, Zollikon und Dr. G. Hegi.

Infektion (Befall) — Eindringen bezw. Befall von Pflanzenteilen durch sehr oft pathogene Mikroorganismen.
infektiöse Chlorose — durch Impfung übertragbare Art der Buntblätterigkeit.
Infloreszenz (Blütenstand) — I/CXXXVI.
Initialzelle(n) — siehe Scheitelzelle.
Inklination — Neigung einer Fläche gegen die Erdoberfläche.
Inklusen — IV/3 1454.
Inkrustation (Infiltration) — heisst die nachträgliche Einlagerung von Stoffen (besonders von Mineralsubstanzen) in das Zellulosegerüst der Zellmembran.
Inkubations- oder **Latenzzeit** — heisst die zwischen dem Moment der Gifteinführung und dem Ausbrechen der ersten Symptome (d. h. auffälliger Störungen der Lebenserscheinungen) liegende Zeit.
Innenrinde — = sekundäre Rinde.
innere Haare — I/XXIV, Fig. 12.
Innovationspflanzen — V/2 809/810.
Innovationssprosse — heissen Erneuerungssprosse, die sich alljährlich am Pflanzenstock bilden.
Innovationsverhältnisse — IV/1 117.
insektenähnliche Blüten — siehe Ophrys (II, 328); hieher gehört auch Delphinium elatum.
Insektenblütler — I/CXLIV.

Insektivoren (insektenfressende Pflanzen) — I/CVII; VII Fig. 1157.
Insertion — Anheftungsstelle.
insubrisch — Flora des oberitalienischen Seengebietes und der nach Süden ausmündenden Alpentäler mit vielen mediterranen Arten.
Integument — I/CXXX; V/3 1567.
Intercutis (= Endodermhypodermis) — heisst die grösstenteils oder ausschliesslich aus Endodermzellen bestehende Hypodermis der Wurzel.
Interfascicularcambium — I/LXXXVI.
Interfolium — = Internodium (siehe Stengelglied).
Interkalarblätter (-schuppen) — Laubblätter gehören (bei saisondimorphen Arten) den zwischen den obersten Seitenästen und dem Blütenstande gelegenen Stengelgliedern an (VI/1 84).
interkalares Wachstum — I/XCII; V/3 1886.
intermediäre Bastarde — halten ungefähr die Mitte zwischen den beiden Eltern (siehe goneokline Bastarde).
Intermediärzone (des Stammes) — wird der zwischen Mark und primärer Rinde gelegene Gewebekomplex im dikotylen Stamm genannt.
Internodium — I/LXVII.
Interpetiolarknospen — scheinen ganz innerhalb des Blattstieles zu liegen; neben den Knospenschuppen ist an dem Knospenschutz noch der Grund des Blattstieles beteiligt.
Interzellularräume (Interzellularen) — I/XXIV, XXXIV V/3 1721.
Intine (Pollenkorn) — I/CXXV.
Intoxikation — Vergiftung durch einen organischen oder anorganischen Giftstoff.
intramolekulare Atmung (anaërobe oder Spaltungs-Atmung) — trotz Sauerstoffentzug fährt der Organismus fort, Kohlensäure zu bilden, die nicht von einer physiologischen Verbrennung mit elementaren Sauerstoff herrührt, sondern auf einer Reduktion von vorhandenen Sauerstoffverbindungen oder auf der Spaltung organischer Substanzen auf nicht oxydativem Wege beruht. In diesem letztern Fall entsteht neben andern Stoffen überdies regelmässig Alkohol.
intrapetiolare Nebenblätter (stípulae intrapetiólares) — entstehen durch Verwachsung bei Pflanzen mit quirligen Laubblättern.
intrastaminaler Diskus — schiebt sich zwischen Staub- und Fruchtblätter ein (I/CXXXI).
intravaginale Triebe — I 166; II Fig. 207.
Intravaginalschuppen — Trichomgebilde (Schleimorgane), die sich bei einzelnen Wasser- und Sumpfpflanzen innerhalb des verbreiterten Blattgrundes befinden.
intrazellular — innerhalb der Zelle befindlich.
introrse Staubbeutel — I/CXXIII.
Intumeszenzen — kleine Pusteln an der Rinde jugendlicher Zweige, an Blättern und Blüten, die vom Grundgewebe gebildet werden.
Intussuszeptionswachstum — I/XXIV.
Inulin — I/XXII; VI/1 476, 515, 531; VI/2 673, 685, 696, 1084.
invers-dorsiventral — Organe, deren Dorsiventralität gerade umgekehrt wie bei der Mehrzahl der übrigen gleichartigen Organe entwickelt ist (z. B. invers-dorsiventral sind Blätter, deren morphologische Oberseite unter einer spaltöffnungsreichen Epidermis Schwammgewebe und deren morphologische Unterseite unter einer ± stark xerophil gebauten Epidermis Palisadengewebe trägt; vgl. V/2 726).
Invertase — ist ein kohlenhydratspaltendes Enzym, das Rohrzucker hydrolysiert.
involucéllum — = Hüllchen (V/2 930).
involúcrum (Hülle) — I/CXI; V/2 930; VI/1 394.
Involukralblätter (-schuppen) — III 315; V/2 930.
Johannistrieb — V/1 264, 265, 281, 291, 298.
Johannistrieb, verkappter — unterscheidet sich vom echten Johannistrieb durch Einschaltung einer weniger ausgesprochenen, oft kaum nachweisbaren Ruheperiode.
-ion (-ium), (Genitiv = iónis) — diese Endung wird zur Benennung einer Pflanzengesellschaft von der Rangstufe einer Formation durch Anhängen an den Gattungs- bezw. Speziesnamen verwendet.
Jordanismus — IV/1 391; V/1 599; V/2 1409 Fussnote 2.
Isofloren — heissen Zonen mit gleichem Blütenbeginn.
isolateraler Blattbau — I/XCVIII; IV/3 1587.
isomere (gleichzählige) **Blütenquirle** — I/CXXXIV.
Isonotiden — Linien gleicher nutzbarer Feuchtigkeit.
Isophyllie — Gleichblätterigkeit.
isospore Gefässkryptogamen — I 4, 63.
Isothermen — Linien gleicher Wärme.
Isotrophie — allseitig gleiche Förderung der Gewebe bezw. der Organe.
Jugendblätter — siehe Primärblätter.
Jugendformen — V/2 683.
Jugendspross — V/2 919 (siehe auch Retinospora).
Jungfernfrüchte — siehe Parthenokarpie.

Jungfernzeugung — (siehe Apogamie und Parthenogenese).
Jungpflanzenerneuerer (winterannuelle Therophyten) — haben im vorangegangenen Sommer oder Herbst gekeimt, als Blattrosetten oder mit einzelnen Blättern überwintert und erneuern am Anfang der Vegetationsperiode den Pflanzenbestand.
junkoider Spross — hoher, stielrunder, blattloser und unverzweigter Stengel bezw. Schaft (bei vielen Cyperaceen und Juncaceen).
junkoides Blatt — I/CIII.
Jura — siehe Geologische Formationen.

K.

Käferblumen — Käfer nehmen an der Bestäubung meistens nur neben andern Insekten teil (so bei Veratrum album, Saxifraga rotundifolia, Sorbus Aria, Peltaria alliacea usw.). Als eigentliche Käferblumen werden verschiedene Ranunculaceen und Encephalartus angesehen.
Kälteblätter — V/3 1608.
Kälteschutz — I/LI.
Kältestarre — bei niederen Temperaturen hören die vitalen Bewegungen vorübergehend auf (nicht zu verwechseln mit Gefrieren).
Kätzchen (amentum) — I/CXXXVIII.
Kätzchensucht — Kätzchen (männliche Blütenstände) bei Kätzchenblütlern können stark vermehrt und zu Quasten oder Büscheln vereinigt sein (VII Fig. 1107).
Kahmhaut — heisst die durch gewisse Hefearten an der Oberfläche von Flüssigkeiten gebildete Haut (z. B. Essigmutter, V/1 414).
Kahnfrüchte — VI/2 800.
Kaktusform — siehe Stammsukkulenten.
Kalium — kommt in Form von Kalisalzen (schwefel-, salpeter- oder phosphorsaures Kali) vor, und zwar besonders in Speicherorganen.
Kalkdrüsen — IV/2 562 Fig. 932 m, 571.
Kalkflieher — sind teils Arten, welche durch hochkonzentrierte Kalklösungen geschädigt oder in ihrer Entwicklung gehemmt werden, teils azidiphile Arten, die nur auf saurem Boden bei einem Ueberschuss von Wasserstoff-Ionen gedeihen.
kalkhold (Kalkdeuter) — vorzugsweise kalkreichen Boden bewohnende Pflanzen.
kalkscheu — = kalkmeidend.
kalkstet (Kalkzeiger) — ausschliesslich auf kalkreichen Böden wachsende Arten.
Kalkzystolithen — V/3 2187.
Kallose — I/XXV.
Kallusbildungen — Zellen- und Gewebeformen, die nach oder infolge Verwundung entstehen (siehe Callus).
Kaloritropismus — heissen die auf Wärmeleitung beruhenden tropistischen Krümmungen.
Kalyptra — = Wurzelhaube; siehe auch V/2 781.
Kalyptrogen — Bildungsgewebe der Wurzelhaube.
Kalzipenurie — Kalkmangel.
Kambiformzellen — I/XLIII, XLIV.
Kambium — siehe Cambium.
Kamm (Blüte) — V/1 89.
Kammerfasern — I/LXXXVIII.
kammeriger (gekammerter) **Fruchtknoten** — Scheidewände reichen im Fruchtknoten nicht bis zur Mitte.
Kampfer — sind Oxydationsprodukte der Terpene und kommen in ätherischen Oelen vor (IV/1 11; V 534).
Kampfgürtel (Kampfzone, Grenzzone) — liegt an der obern Grenze des geschlossenen Nadelwaldes, wo sich dieser nach oben allmählich in Einzelbäume auflöst; bildet oft den Uebergang von der subalpinen zur alpinen Stufe.
kampylotrope Samenanlage — I/CXXXI.
Kannenpflanzen — I/CVII; IV/2 510.
Kantenstellung — V/2 784.
Kaprifikation — III 126.
Kapsel (cápsula) — I/CL; III 301 (siehe Streuefrüchte; VII Fig. 1070, 1075, 1108. 1115, 1170).
Karbohydrasen — heissen kohlenhydratspaltende Fermente (Diastase, Invertase, Maltase usw.).
Karbon — siehe Geologische Formationen.
Kardinalpunkte — geben die Grenzwerte (Minimum, Maximum, Optimum) für gewisse Funktionen an.



Fig. 1107. „Kätzchensucht" bei der Haselnuss (Corylus Avellana L.).



Fig. 1108. Durch Längsspalten aufspringende Fruchtkapseln einer Orchidee (Epipactis latifolia All.); die Klappen bleiben oben und unten miteinander verbunden.

Karflur — Gesellschaft hochwüchsiger Stauden auf feuchtem und humusreichem, aber ungedüngtem Boden (III 500).
Karotin — siehe Carotin.
karpellbürtige Samenanlagen — entspringen aus den Fruchtblättern.
Karpelle (Fruchtblätter) — I/CXXVII.
Karpellträger — siehe Carpophor (I/CL).
Karpiden — Fruchtblätter (Diminutiv von Karpell).
Karpostegium — V/4 2262.
Karpotropismus (karpotropische Bewegungen) — heissen die zum Schutze der ausreifenden Frucht erfolgenden oder die Aussaat der Samen erleichternden Nutationsbewegungen der Blüten- und Fruchtstiele, Hüllblätter usw.
Karstheide — Hartwiesen kahler, öder Hänge auf trockener Kalkunterlage im Karstgebiet.
Karyogamie — Verschmelzung von generativen oder vegetativen Kernen.
Karyokinese (indirekte Kernteilung) — I/XIX.
Karyopse — I/CL; I 170.
Karzinom — siehe Krebs.
Kastration — künstliche Entfernung der männlichen oder weiblichen Geschlechtsorgane.
Katablasten — unterirdische Sprosse (siehe Rhizom).
Katabolismus — siehe Dissimilation.
Katakorolle — Verdoppelung der Krone.
Katalyse — Aenderung der Geschwindigkeit eines chemischen Vorganges durch die Gegenwart eines Stoffes (Katalysator), der am Ende des Vorganges stofflich unverändert vorliegt.



Fig. 1109. Keimpflanzen verschiedener Dikotyledonen. *a* Corrigiola litoralis, *b* Chenopodium bonus Henricus, *c* Beta vulgaris, *d* Cakile maritima, *e* Lactuca sativa, *f* Mimulus tigrinus, *g* Eschscholtzia Californica.

Kataphylla — = Niederblätter.
Kauliflorie — Hervortreten der Blüten aus älteren Stammteilen (IV/2 753).
Kaulom — = Stengel, Spross.
Kautschuk — V/1 118.
Keim — = Embryo (wird im weitern Sinne auch für Vermehrungsknospen gebraucht).
Keimblatt (cotyledo) — I/XLVI, L; IV/1 160; V/1 333; V/4 2257; VI/1 439.
Keimblattscheide — = Koleoptile (I 170).
Keimfähigkeit — die prozentische Anzahl der keimenden Samen einer Samenprobe.
Keimling (Embryo) — I/XLV; IV/1 55; IV/3 1729; V/4 2257.
Keimlingserneuerer (sommerannuelle Therophyten, Samenüberwinterer) — überwintern als Samen, keimen im Frühling bei steigender Temperatur und erneuern am Anfang der Vegetationsperiode den Pflanzenbestand durch Keimlinge.
Keimmund — = Samenmund.
Keimpflanze — I/XLV; V/1 439; V/2 680; V/3 2091; VII Fig. 1109, 1124, 1157, 1158.
Keimsack — = Embryosack.
Keimscheide — siehe Koleoptile (I 170).
Keimung — I/XLV, L; V/1 4.
Keimung, endokarpe — siehe Bioteknose.
Keimverzug — bezeichnet die verspätete Keimung, verursacht durch die schwere Quellbarkeit der Samenschale oder durch ungünstige Keimungsbedingungen.
Kelch (cályx) — I/CXVIII, CXIX.
kelchartige Krone — V/3 1730.
Kelchbecher (receptáculum, hypánthium) — I/CXXVIII; IV/2 981.
Kelchschuppen — III 318.
Kelchstaubblätter — I/CXXVI.

Kern (núcleus) — I/XVII.
Kernholz — I/LXXXVIII.
Kernkörperchen (nucléoli) — I/XVII.
kernlose Früchte — siehe samenlose Früchte und Parthenokarpie.
Kernpole — I/XVIII.
Kernteilung — I/XIX.
Kernwarze — I/CXXX.
Kesselfallenblumen (Mikromyiophilae) — I/CXLV; III 164.
Kettenachse (Sympodium) — I/LXXI (siehe auch Sprossverband).
Keuper — siehe Geologische Formationen.
Kiel (carína) — I/CXXI.
Kienholz — das vom Harz imprägnierte Holz.
kieselhold (Kieseldeuter) — vorzugsweise auf kalkarmen Böden wachsend.
Kieselpflanzen (Kalkflieher) — vermögen in einem Boden mit kohlensaurem Kalk über 0,2 bis 0,3% nicht zu gedeihen.
Kieselsäure (Kieselsäureanhydrid) (SiO_2) — ist in den Zellwänden eingelagert oder wird in bestimmten Zellen bezw. Zellgruppen, in Haaren usw. ausgeschieden.
Kieselsäure-Einlagerungen — I 51, 373, 402.
kieselstet (Kieselzeiger) — ausschliesslich kalkarmen Boden bewohnend.
Kindel — V/1 682.
Kindelbildung — V/4 2599.
Kirschgummibildung — IV/2 1054.
Kissenpflanzen — V/3 1717.
Kladodien — siehe Phyllokladien.
Kladomanie (Blastomanie) — abnorm gesteigerte Neigung zur Bildung von Laubsprossen (VII Fig. 1110).
klandestin (= kleistogam) — I/CXLII; IV/3 1652; V/3 2118.
Klappenfallenblumen — siehe Gentiana prostrata (V/2 1980).
klappenspaltig — = lóculizid.
Klappenteil der Cruciferenschote — IV/1 54.
Klappfallen-Typus — V/3 1981.
klappige Knospendeckung — I/CXXXV.
Klappvorrichtung der Schmetterlingsblüten — IV/3 1136.
Klausen — I/CXXVIII; V/3 2143.
Klebdrüse der Orchidaceen — II 322.
Klebfrüchte (Klebsamen) — bleiben ohne besondere Klettvorrichtungen an dem Gefieder, am Schnabel, vor allem an den Füssen von Wasser- und Sumpfvögeln haften, besonders wenn diese von Schlamm umgeben sind.
Kleber (Klebermehl) — I/XXIII.
Klebscheibe — siehe Translatoren.
Klebstoffkügelchen — V/4 2261, 2476.
Klebwarze — stärkehaltiges Anhängsel an Samen (z. B. Colchicum).
Kleinarten — systematische Einheiten, oft als Unterarten (subspezies) bezeichnet, die konstant (samenbeständig) sind (IV/1 391; IV/2 844).
Kleinfliegenblumen — siehe Kesselfallenblumen.
Kleinmutationen (Faktormutationen) — sind wie die Mutationen beständig, entstehen aber nicht sprungweise, sondern schrittweise (durch

Fig. 1110. *a–d* Kladomanie (Blastomanie) bei Lupinus polyphyllus Lindl. (IV/3 1154).

Fig. 1111. Galium Aparine L. (VI/1, 228), als Beispiel für Kletterkletten. Phot. Walter Hirzel, Winterthur.

„Trippeln") und weichen von der Stammpflanze nur durch geringfügige, oft nicht leicht wahrnehmbare Merkmale ab. Zuweilen mutiert nur die väterliche oder mütterliche Geschlechtszelle. Den Kleinmutationen wird Selektionswert zuerkannt.

Kleinsporen — siehe Mikrosporen.

kleistantherische Kleistogamie — IV/3 1549.

Kleister — I/XX.

Kleistogamie — I/CXIII; IV/3 1220, 1549, 1652; V/1 591; V/3 2118; V/4 2454; VI/1 367.

Kleistokarpie — Fruchtbildung bei kleistogamen Blüten.

Kleistopetalie — als solche wird das dauernde Geschlossenbleiben der Blütendecken (ohne Verbindung mit Kleistogamie) bezeichnet.

Klemmfallenblumen — I/CXLV; V/3 2061.

Klemmkörper — I/CXLV; V/3 2060.

Kletten — siehe Häckelfrüchte, Fellkletten, Schleuderkletten, Kletthülsen.

Kletterkletten — klettern mit Hilfe von Stacheln oder Klimmhaaren; letztere befinden sich an Stengel- und Blattorganen (VII Fig. 1111).

Kletternde Sprosse — I/LXXV.

Kletterorgane — I/LXXIV.

Kletterwurzeln — siehe Wurzelkletterer.

Klettfrüchte (Klettsamen) — siehe Häckelfrüchte, Fellkletten.

Kletthaare — finden sich als Hakenhaare an Früchten bezw. Samen verschiedener Wald- und Wasserpflanzen (Asperula odorata, Galium, Circaea, Parietaria, Nymphoides usw.).

klimatische Faktoren — bedingen z. T. den Standort der Pflanze, so Luftdruck, Lufttemperatur, direkte Besonnung, Luftfeuchtigkeit, Verdunstungskraft, Niederschläge, Schneedecke, Dauer- oder Vegetationsdecke, Windstärke usw.

Kletthülsen — siehe Früchte von Medicago und Onobrychis.

Klimax (der) — heisst die klimatisch bedingte Schlussgesellschaft der Vegetationsentwicklung.

Klinogeotropismus — siehe Plagiotropismus.

Klinostat — V/3 2092.

Klumpenblätter — V/3 1631.

Knäuel (glomérulus) — I/CXL.

Knephoplankton — = Schattenplankton.

Kniebildung geophiler Pflanzen (IV/1 322, Fig. 815c) — der Blattstiel verschiedener Schattenpflanzen bildet eine Krümmung und durchstösst mit diesem Knie die Bodendecke (ist kausal durch Lichtmangel bedingt).

Fig. 1112. Rapunzel (Phyteuma) mit köpfchenartigem Blütenstand.

Knochenzellen (Osteosklereïden) — = Sklerenchymzellen.

Knöllchenbakterien — siehe Wurzelknöllchen.

Knolle (túber) — I/LVIII, LXXX; II 198; III 493; V/3 1837; V/4 2597.

Knollengeophyten — besitzen unterirdische Speicherorgane (Wurzel- oder Sprossknollen) und verbringen in der Regel die ungünstige, trockenheisse Jahreszeit im Ruhestand.

Knospe, Knöspchen (plúmula) — I/LXIV.

Knospen, ruhende — siehe schlafende Augen.

Knospenblätter — siehe Knospenschuppen.

Knospenerneuerer — die Erneuerungsknospen überwintern an den unter oder über der Erde befindlichen Teilen und liefern zu Beginn der neuen Vegetationsperiode neue Sprosse.

Knospenkern (nucéllus) — I/CXXX.

Knospenlage (vernátio) — I/CXXXVI.

Knospenmutationen — werden solche Mutationen genannt, deren Veränderungen in somatischen Zellen auftreten (IV/2 739).

Knospenproterogynie — die Narbe ist bei sonst homogamen Blüten (so bei den Cruciferen) vor dem Oeffnen der Krone empfängnisfähig (IV/1 366).

Knospenschuppen (tegménta) — I/LXIV.

Knospensucht — V/4 2591; siehe auch Kladomanie (VII Fig. 1110).

Knospen-Symbiose — V/2 895; V/3 1715.

Knospenträger — I/CXXX.

Knospenvariation — IV/3 1166.

Knoten (nódi) — I/LXVII, LXXXIV.

Koagulasen — sind eiweisskoagulierende oder Gerinnungsenzyme (z. B. Labferment).

Koagulation — = Gerinnen, Ausflocken.

Koaguline — ältere Bezeichnung für Präzipitine.

Köpfchen (capítulum) — I/CXXXVIII; VI/1 396; VII Fig. 1112.

Köpfchendichasien — siehe Botryo-Cymen.

Köpfchendrüsen — VI/1 130.
Köpfchenhaare — V/1 484.
Köpfchentraube — siehe Dibotryen (z. B. Petasites).
Körnchenflieger (Mohntypus) — anemochore Samen bezw. Früchte von sehr geringer Grösse und geringem Gewichte. Besondere Flugvorrichtungen fehlen.
Kohlenhydrate — die meisten enthalten neben Kohlenstoff die Elemente Wasserstoff und Sauerstoff im gleichen Mengenverhältnis wie sie im Wasser (H_2O) vorhanden sind. Beispiele: Zucker, Stärke, Cellulose.
Kohlenhydrate, einfache (Monosaccharide oder Monosen) — sind mehrwertige Aldehyd- oder Keton-Alkohole und lassen sich von 6- oder 5-(wertigen) Alkoholen ableiten (hierher Hexosen [Glukose, Fruktose] und Pentosen).
Kohlenhydrate, zusammengesetzte — entstehen, wenn zwei oder mehrere Moleküle einfacher Kohlenhydrate sich unter Wasseraustritt vereinigen (Kondensation). Hierher Disaccharide (Rohrzucker oder Saccharose, Maltose), Trisaccharide (Raffinose), Melitose, Gossypose) und Polysaccharide (Stärke, Cellulose, Stärkegummi, Dextrine, Glykogen, Inulin).
Kohlensäureassimilation — I 122.
kohlensaurer Kalk ($CaCO_3$) — findet sich gelegentlich eingelagert in Zellwänden, in Haaren und Früchten (siehe Cystolithen).
Kohleschicht (Phytomelane) der Kompositen — VI/1 399.
Kohlhernie — IV/1 251.
Kokken — V/1 114.
Kolben — = spádix (I/CXXXVIII); VII, Fig. 1113.
Koleoptile — Scheidenblatt der Graskeimlinge, das die ersten Blätter rings umgibt (I 170).
Koleorrhiza — siehe Wurzelscheide.
Kolibriblumen — siehe Ornithophilie.
Kolke (Kölke, Blänken, Mooraugen) — heissen mit Wasser gefüllte Vertiefungen der Hochmoore, Reste von verlandeten Gewässern.
kollaterale Beisprosse — I/LXIX.
kollaterale Leitbündel — I/XLIII.
Kollektivart — umfasst ± zahlreiche Klein- oder Unterarten.
Kollenchymhypoderm — Unterhautgewebe, bestehend aus einer oder mehreren Kollenchymschichten.
Kollenchymzellen — I/XXXVII, XXXVIII.
Kolleteren — siehe Leimzotten.
kolloidale Lösung — Lösung, deren gelöste Stoffe nicht bis zu den Molekülen (wie bei den echten Lösungen), sondern nur bis zu Molekülkomplexen von der Grössenordnung 10^{-7} bis 10^{-4} mm Durchmesser aufgeteilt sind.



Fig. 1113. Calla palustris L. (II, 136). *a* Fruchtstand „Kolben". *b* Frucht. *c* Querschnitt durch die Beere. *d* Samen.

Kolloide — diese sind weitgehend zerteilte, also hochdisperse, flüssige oder feste Stoffe. Dispersoide vom Teilchendurchmesser von $^5/_{10000}$ mm bis $^1/_{1000000}$ mm. Teilchen werden auch Ultramikronen genannt. Da sie noch nicht molekulardispers sind, diosmieren oder dialysieren sie nicht oder fast nicht.
Kolonisten — = naturalisierte Pflanzen.
Kommensalismus (Kommensalen) — Verhältnis zwischen Pflanzen, die den Nahrungsvorrat in Licht, Wasser und Boden miteinander teilen.
kommissurale Narben — I/CXXIX.
Kommissuralfurche — I 51.
Kommissuralnerven — Nerven, die den Verwachsungsnähten (z. B. der Kelchblätter) entsprechen.
Kommissuralzähne — V/4 2260.
Kommissuren — I/CXXIX.
Kompasspflanzen (Meridianpflanzen) — I/CIII; VI/1 496; VI/2 1118.
konfervoider Pollen — I 142 Fig. 70.
Konidien — Fortpflanzungszellen, die durch Abschnürung oder durch simultane Querteilung (Oidien) entstehen.
Koniferenholz — I/XC.
Konkauleszenz — teilweise Verwachsung des Achselsprosses mit der Abstammungsachse (V/4 2549).
Konnektiv (Zwischenband) — I/CXXII; V/2 796; V/4 2476.
Konnektivfortsatz — I 77, 120.
Kontaktreiz — siehe Haptotropismus.
kontinental — ein im Gegensatz zu ozeanischem, durch ± geringere Niederschläge und grössere Temperaturunterschiede gekennzeichnetes Klima.
kontraktile Wurzeln — I/LXI; II 301 (siehe Zugwurzeln).
Kontrastfarben — innerhalb derselben Blüten (bezw. Blütenstandes) kommen zwei oder mehrere Farbentöne vor (Clematis alpina, Galeopsis versicolor, Aster-, Rudbeckia-Arten); auch Blätter- bezw. Früchte kontrastieren zuweilen von der Umgebung.

Konvergenz — äussere Aehnlichkeit generisch verschiedener Pflanzen zufolge Uebereinstimmung der Anpassungen an analoge Lebensbedingungen.
konzentrisches Leitbündel — I/XLIII.
Kopale — als solche bezeichnet man natürliche (rezent fossile), harte, erst bei hoher Temperatur schmelzende, im Aussehen dem Bernstein ähnliche Harze, die ziemlich tief im Boden liegen (IV/3 1131).
Kopfdolden — V/2 931, 936.
Kopfholz — III 15.
Kopulation — I/CLVIII.
Kork (Periderm) — I/XXX.
Kork, unechter — siehe Phelloide.
Korkcambium (Phellogen) — I/XXXI.
Korkflügel — V/1 248, 286.
Korkleisten — III 119.
Korkmantel — I/XIV.
Korksubstanz (Suberin) — I/XXV, XXXI; III 106.
Korkwarzen — = Lentizellen.
Kormus — der in Stamm und Blätter gegliederte Körper der höheren Pflanzen.
Korolle (coróna) — = Krone (Blütenkrone).
korollinisch — = petaloid, d. h. blumenblattartig.
korrugative Vernation — = zerknitterte Knospenlage (z. B. Papaver).
Koryphyllie — abnorme Bildung eines terminalen Blattes.
Kosmopoliten — Arten, die in allen Erdteilen auftreten (geographischer, nicht soziologischer Ausdruck).
Kotyledonarknospen — erscheinen in den Achseln der Samenlappen.
Kotyledonen — siehe Samenlappen, Keimblätter.
Kräuselkrankheit — IV/2 1092.
Kratt (Eichenkratt) — krüppelhafter Niederwald (im westlichen Schleswig-Holstein, in Jütland, Oldenburg). Stämme knorrig, vom Grund an beästet.
Krautschicht — siehe Schichtung.
Krautstamm — I/LXVIII.
Krebse (Carcinome) — heissen abnorme, krankhafte, z. T. durch Parasiten erzeugte Gewebeprodukte bezw. Zellwucherungen (V/3 1943), die mit Gallen (siehe dort!) grosse Aehnlichkeit haben.
Kreide(-zeit) — siehe Geologische Formationen.
Kreise (Blüten) — I/CXVIII.
Kremnophyten — Bewohner harter, humusarmer Böden.
Kreuzbestäubung — I/CXLI.
Kreuzung — I/CXLII.
Kreuzung, reziproke — V/2 853.
kriechende (hüpfende) **Früchte** — zufolge hygroskopischer Bewegungen ihrer behaarten Anhänge (Pappushaare, Grannen) bewegen sich die Früchte bei wechselnder Feuchtigkeit auf dem Boden fort.
Kriechrosetten-Typus — IV/2 570.
Kriechstauden (chamaephýta reptántia) — Krautgewächse mit niederliegenden oder aufstrebenden und zuweilen plagiotropen Trieben, die während der ungünstigen Jahreszeit erhalten bleiben und die Erneuerungsknospen tragen.
Kristalle — I/XXII; V/1 351; V/2 870, 934 (siehe auch Sphaerite).
Kristalloide (I) (Aleuronkörner) — werden Eiweisskristalle bezeichnet; sie quellen bei Zusatz von Flüssigkeiten und haben variierende Winkel (I/XXIII).
Kristalloide (II) — sind Stoffe, deren äussere regelmässige Formgestaltung in gesetzmässigem Zusammenhange mit den besondern physikalischen und chemischen Eigenschaften steht. Sie können in Kristallform übergeführt werden und sind befähigt, aus Lösungen durch dünne Häute in Wasser überzutreten (zu diosmieren oder dialysieren).
Kristallsand (-zellen) — I/XXII; V/4 2551, 2572.
Krönchen — III 299.
Kronblätter (Petalen) — I/CXIX.
Krone (corólla) — I/CXVIII (siehe auch Nebenkrone).
Krone, doppelte — V/3 2011.
Kronstaubblätter — I/CXXVI.
Kropf — IV/1 251.
Krümmungen — siehe Nastien.
Krüppelgrenze (im Gebirge) — Verbindungslinie der obersten zwerghaften Holzgewächse; sie verläuft in den Alpen zuweilen bis 500 m über der Baumgrenze.
Krummholzbestandgrenze (obere) — Verbindungslinie der obersten Bestände der Legföhren und Alpen-Erlen.
krummläufige (campylotrope) **Samenanlage** — I/CXXXI.
Kryoflora (Kryoplankton) — = Schnee- und Eisbewohner.

Kryotropismus — Kältereiz.
Kryptocecidien — heissen Gallen, die im Innern des Wirtsorganes völlig verborgen sind.
Kryptodorsiventralität — V/1 72.
Kryptogamae (Sporenpflanzen, blütenlose Pflanzen) — I 2; VII/2 135.
Kryptogamengürtel — siehe Thallophytengürtel.
Kryptophyten — = Geophyten.
Kuckucksgallen — siehe Ananasgallen.
künstliche Systeme — Gruppierung der Pflanzen meist nach rein morphologischen Gesichtspunkten, den praktischen Bedürfnissen entsprechend.
künstliche Vermehrung — siehe ungeschlechtliche Vermehrung (I/CLVII). Siehe auch Bulbillen, Ausläufer (VII, Fig. 1062, 1069).
Kulturfaktoren — siehe anthropogene Faktoren.
Kulturrasen (Halbkulturrasen) — ist aus Naturrasen durch irgendeine Beeinflussung durch den Mensch oder Haustiere entstanden.
Kumarin — I 981; IV/3 1237.
Kunstwiesen (Kulturwiesen) — entstehen durch Aussaat (käufliche Grasmischung, Heublumen) aus Aeckern, Rebland usw. oder durch andere Beeinflussung seitens des Menschen oder der Haustiere.
kurzgriffelige Blüten — V/3 1725 (siehe Heterostylie).
kurztägige Pflanzen — beschleunigen bei Verkürzung des Tages ihre Blütenbildung und leben daher wenig lang (Tabak, Hirse).
Kurztriebe (Brachyblasten) — I/LXX; IV/2 642; V/3 1963; VI/1 247 (siehe auch Stauchsprosse).
Kutikula — siehe Cuticula, Epidermis.
kutikuläre Transpiration — erfolgt durch die geschlossene Oberhaut.
Kutikularnaht — in Blüten können benachbarte Anlagen (z. B. Staubbeutel) durch Verzahnung der Epidermiszellen oder deren Kutikularrippen verschmelzen.

L.

Labellisierung (Labellisation) — Umwandlung eines Blütenphyllomes in ein Labellum-ähnliches Organ (Orchidaceae, Zingiberaceae).
labéllum (Lippe) — I/CXXI; II 321, 324.
Labferment (Chymase) — siehe Koagulasen und V/1 661.
Labiatendrüsen — V/4 2258.
labíolum (Unterlippe) — V/4 2260.
lábium — Lippe; siehe auch labéllum.
lábrum (Oberlippe) — V/4 2260.
lacíniae — Abschnitte.
lackierte Blätter — I/CIV.
Lactoretine — siehe Guttapercha.
Lägerflur — Hochstaudenflur des überdüngten Bodens (III 500). Siehe auch Schafläger.
Lägerpflanzen — sind stickstoffliebende, üppige, vom Vieh gemiedene Arten (III 140, 173, 500; IV/2 835; VI/2 747, 903).
längsgefalteter Keim — IV/1 56.
Längsreihen (Blattstellung) — I/LXXII.
Läufer (Stolonen) — VI/2 1185 (siehe Ausläufer).
Laevulose — siehe Kohlenhydrate.
Lager (Thallus) — heisst der vegetative Körper der Lagerpflanzen (I 2).
Lagerpflanzen (Thallophyten) — I 2.
Lamina — siehe Spreite, Blattfläche.
Landform (f. terréstris) — heissen die ausserhalb des Wassers lebenden Standortsformen von Wasser- und amphibischen Pflanzen (III 552, 558 Fig. 704; V/1 511, 537; V/2 899; V/4 2387).
langgriffelige Blüten — siehe Heterostylie und Heterotristylie.
langtägige Pflanzen — beschleunigen bei einer Verlängerung des Tages die Blütenbildung (Weizen, Roggen, Hafer, Gerste).
Langtrieb — I/LXX; IV/2 642; V/3 1963; VI/1 247.
lanzettliches Blatt — I/XCV.
Larvenfrucht — VI/1 800.
Latenzzeit (Inkubationszeit) — V/2 1721.
Lathyrismus — IV/3 1606.
Latschengürtel — siehe Krummholzgürtel.
Laubblätter (nomophýlla) — darunter versteht man die gewöhnlich einfach als „Blätter" bezeichneten Organe (mit Ausschluss der Nieder-, Hoch- bezw. Hüllblätter, Vor- und Tragblätter) (I/XCII, CX).
Laubfall — Abfallen der Blätter an einem vorgebildeten parenchymatischen Trennungsgewebe durch Verschleimung der Mittellamellen.

Laubglieder — II 138.
Laubknospen — siehe Knospen.
Laurilignosa — siehe Lorbeergehölz.
lebendig gebärend — I/CLVII; I 310; VI/1 313 Fig. 168.
Lebensform (Vegetationsform) — umfasst Lebewesen, deren Gesamtbau ± deutlich ausgeprägte gleichartige Anpassungserscheinungen an den Lebenshaushalt aufweisen (IV/2 569; IV/3 1143).
Lecithin — eine Verbindung von Glycerinphosphorsäure mit Fettsäuren und Cholin (Ammoniumbase) (IV/3 1141).
Lederblatt — V/1 236; V/3 1614.
Legehalme — I/LXXXIII, 272.
Legföhren- oder **Latschengürtel** der Alpen — erstreckt sich von der Baumgrenze bis zur oberen Grenze des Krummholzes bezw. der Alpen-Erle (I 103).
Legumin — IV/3 1140.
Lehmboden — enthält 20 bis 55% Ton, 1 bis 10% Kalk und 3 bis 20% Humus (VI/2 677).
leierförmiges Blatt — gelapptes oder geteiltes Laubblatt mit vergrössertem Endlappen.
Leimringe — erscheinen zuweilen als ringförmige Ausscheidung klebriger Stoffe bei verschiedenen Caryophyllaceae (III 277), Robinia viscosa, einigen Rhododendron-Arten.
Leimspindel-Typus — VI/1 156.
Leimzotten (Kolleteren) — I/LXV.
Leitarten — sind bezeichnend für bestimmte Pflanzenvereine, können aber an Menge zurücktreten.
Leitbündel (Mestom) — I/XL, XLIV; VII Fig. 969.
Leitbündel, mark- und rindenständige — I/XLV.
Leitbündel, reduzierte — siehe reduzierte Leitbündel.
Leitbündel der Wurzel — I/LXII.
Leitbündel des Blattes — I/C, 63.
Leitungsgewebe — I/XL, LXXXVI.
Leitungssystem — I/XLI.
Lentizellen (Korkwarzen) — I/XXXI.
lépides (lat.) — Schülfern.
Leptom (Siebröhrenteil) — I/XLI, XLIV.
leptozentrisches (amphivasales) **Leitbündel** — konzentrisches Leitbündel, bei dem der Siebteil innen liegt und der Gefässteil die Hülle bildet (I/XLIII Fig. 39).



Fig. 1114. Humulus Lupulus L., Hopfen, in wilden Zustand (III, 130), eine rechtswindende Schlingpflanze. Phot. Dr. Joh. Mattfeld, Berlin.

Lepyrophyllie — Umbildung von Integumenten in Schüppchen oder Blättchen.
leuchtende Blüten — gewisse von Nachtfaltern besuchte Blüten sollen ein phosphoreszierendes Licht ausstrahlen (Lychnis chalcedonica).
Leukoplasten (Leukoplastiden, Anaplasten, Stärkebildner) — farblose kleine Plasmakörper, die teils als Stärkebildner, teils als Bildner anderer Produkte (Oel) auftreten. Auch können aus ihnen Chloro- bezw. Chromoplasten hervorgehen (I/XIX, XX).
Leukospermie — Hellsamigkeit von Samen bezw. Früchten entsteht durch Pigmentverlust.
Lianen — siehe Windepflanzen und Winden (VII Fig. 1114 und 1170).
Lias (Schwarzer Jura) — siehe Geologische Formationen.
Libriformzellen (Holzfasern) — I/XXXVIII.
lichtharte Samen — verlieren durch Belichtung ihre Keimfähigkeit (Nigella sativa).
Lichtkeime — V/4 2599.
Lichtkeimer — Samen bedürfen zur Keimung nicht nur der Benetzung, sondern auch einer wenn nur vorübergehenden Belichtung, wobei in der Regel der grüne Teil des Spektrums wirksam ist (V/2 818).
Lichtlinie (der Samenhaut) — IV/3 1139; V/3 2075, 2167.
Lichtsinnesorgane — I/XCIX.
Lichtstarre — siehe Starrezustand.
Licopoli-Organe — V/3 1878.
Lignin — siehe Holzstoff.
Ligula — I/XCIV; I 49, 69, 167; siehe auch Nebenkrone (VII Fig. 1194).

límbus — Saum.
Limnaeen — wachsen auf losem Kies, Sand, Ton oder losem Schlamm völlig untergetaucht, schwimmend oder flutend im Süsswasser.
Limnobiologie — Studium der die Seen bewohnenden Lebewesen.
Limnologie — Seenkunde.
limnophile Pflanzen — bevorzugen stehendes Wasser.
Limnoplankton (limnetisches Plankton) — Mikroplankton des Süsswassers.
lineales (linealisches) **Blatt** — I/XCV.
Linie (reine) — alle durch Selbstbefruchtung, Parthenogenese oder ungeschlechtliche Vermehrung von einem homozygoten Individuum abstammenden Exemplare.
linksgriffelige Blüten — siehe Enantiostylie.
Linkswinder — I/LXXV.
linsenförmig — bikonvex, d. h. auf beiden Seiten gewölbt.
Linsengallen — III 58, 107.
Lipasen — fettspaltende Enzyme, welche die Fette zu freien Fettsäuren und Glyzerin hydrolysieren.
Lippe der Orchideen (Lippensporn) — I/CXXI; II 321, 327.
Lippenblüten — I/CXX, CXXV, Fig. 233.
Lithiasis — bezeichnet das Steinigwerden der Birnen.
Lithophyten (Steinpflanzen) — heissen solche Felsenpflanzen, welche die nackte, glatte oder verwitterte Felsoberfläche oder oberflächennahe Haarspalten besiedeln oder aktiv in den Fels eindringen.
Litorina-(Tapes-)zeit (Litorinasenkung) — folgt auf die Ancyluszeit. Die Ostsee verbindet sich durch das Kattegat mit der Nordsee und wird salzig. Benannt nach der Nordseeschnecke Litorína litórea L. Klima gemässigt.
Lockfrüchte — I/CLIV.
Loculamente — = Pollensäcke.
loculizides (fachspaltiges) **Aufspringen** von Kapselfrüchten — I/CL; VII Fig. 1115.
lóculus (lat.) — Fruchtknotenfach.
lodículae — I 169.
Löcherkapsel — = Porenkapsel (VII 18, Fig. 1016).
Löss (Briz) — ist eine lockere, poröse Bildung von feinstem Quarzsand (60—70%), Ton (8—20%) und in unverändertem Zustand 8—25% kohlensaurem Kalk. Der europäische Löss ist in verschiedenen Zeitabschnitten des Diluviums entstanden und beschränkt sich auf das weitere Vorland der einstmals vereist gewesenen Gebiete. Er wurde aus dem Feinmaterial und ihrer Auswaschungsprodukte gebildet.
Lokalität (Fundort) — als geographischer Begriff gibt für die Pflanze die genaue Flur- und Ortsbezeichnung entsprechend der Karte mit Nennung der Höhe über Meer an.
loméntum — Gliederhülse (IV/3 1461, 1500) und Gliederschote (I/CL).
Lorbeergehölze (Laurilignosa) — bestehen aus Holzpflanzen, mit immergrünen, meist unbehaarten, senkrecht zum einfallenden Licht gestellten Laubblättern von frischgrüner Farbe (Rhododendron-, Arbutus-, Unedo- und Buxus-Gebüsch).



Fig. 1115. Gladiolus paluster Gaud. (II, 303). *a* Fruchtender Stengel mit fachspaltig aufspringenden Kapseln. *b* Samen.

Lotten der Rebe — V/1 366.
luftbedürftig — siehe aërob.
Luftgewebe — siehe Aërenchym.
Luftkammern — II 146.
Luftkissen — IV/2 570.
Luftknollen (Pseudobulben) — knollenförmige Verdickungen an oberirdischen Sprossen; sie dienen als Speicherorgane oder der Vermehrung (siehe auch Bulbillen) I/LXXX, Fig. 110; II 281.
Luftsäcke (Luftblasen) der Pollenkörner — haben die Aufgabe, die Flugfähigkeit der Pollenkörner zu erhöhen (Taf. 71, Fig. 15).
luftscheu — siehe anaërob.
Luftspross — VI/1 164.
Luftwurzeln — I/LVII, LX; V/1 454; V/2 918.
lúmen (Mehrzahl: lúmina) (Zellhöhlung) — I/XXXVIII.
lúsus (Spielart) — eine sich nur vereinzelt oder nur vorübergehend bildende, geringfügige, individuelle, erbliche Abänderung (siehe Wuchsform).
luxuriende Bastarde — zeichnen sich durch üppigeres Wachstum gegenüber den Eltern aus.
lysigene Oelgänge bezw. Oeldrüsen — I/XXXIV; V/1 44, 45, 51.

M.

Macchia (Macchie, Mâquis) — ist ein üppiges, bis über mannshohes, dichtes, gern auf Urgestein auftretendes, besonders im Mittelmeer vertretenes Hartlaubgebüsch.

Macrostylie — siehe Heterostylie (I/CXLI).
Mähewiesen (Matten) — Hauptnutzung ist das Heu, als Nebennutzung kann Weide in Betracht kommen.
Mähewiesen, einschürige — werden im Jahr nur einmal gemäht (Ortheu usw.).
Mähewiesen, halbschürige — werden nur alle zwei Jahre gemäht.
Mähewiesen, zweischürige — liefern im Jahr zwei Schnitte (Heu und Emd oder Grummet).
-männig — bezieht sich auf die Zahl der Staubblätter.
männlich — I/CXXXII.
Magerkeitszeiger — kommen vorzugsweise auf mageren, ungedüngten Böden vor und können durch Düngung oder Bewässerung vertrieben werden (VII Fig. 1116).
Magermatten — heissen ungedüngte, regelmässig gemähte Wiesen.
magnocaricétum (macrocaricétum) — Sumpfwiesenbestand, gebildet aus Gross-Seggen (II 8).
Maisbrand — siehe Beulenbrand (VII Fig. 1068).
Makrobiokarpie (V/2 787, Fig. 2182) — Früchte bleiben während einer unbegrenzten Zahl von Jahren an der Mutterpflanze haften (Myrtaceen).
Makrophyten — als solche bezeichnet man alle mit blossem Auge deutlich erkennbaren pflanzlichen Organismen (Gegensatz: s. Mikrophyten).
Makropleuston — siehe Hydrochariten.
Makrosporangien — I 4, 47, 49, 69, 72.
Makrosporen — I 4, 47, 49, 69.
Makrosporophylle — Sporophylle, die Makrosporangien tragen.
Malakophilae (Malakogamae) — I/CXLIV.
Malm (Weisser Jura) — siehe Geologische Formationen.
Maltose — reduzierendes Disaccharid, das durch Kondensation zweier Moleküle Glukose gebildet ist; mit Diastase aus Stärke darstellbar.
Mamme, mammoni — siehe Kaprifikation (III 126).
Mangrove — heisst die von stark halophilen Holzpflanzen gebildete Pflanzengesellschaft an ruhigen, flachen Küsten der Tropenländer.
Mangrovewälder — V/2 769.
Manna — IV/3 1453; V/1 585; V/3 1906, 1916, 1925, 1931, 1949; VII 1238.
Mannit — ist ein sechswertiger Alkohol, der bei der Milchsäure- und Schleimsäuregärung von Rohrzucker entsteht (s. auch IV/3 1453; V/3 1928).
Mannweibigkeit — = Androgynie.
Manöverpflanzen — siehe Stratiobotanik.
Mantelblätter — I/CXV.
Mantelchimären — IV/3 1666.
Mâquis — siehe Macchie.
marin — mit dem Meere zusammenhängend.
Mark (medúlla) — I/XXXV; II 145.
Markstrahlen — I/LXXXVII.

Fig. 1116. Nardus stricta L. (II, 372) ist ein Magerkeitsanzeiger und bildet öfters den Hauptbestandteil (nardétum) der mageren und trockenen Alpenweide (Schafweide). Phot. Dr. G. Hegi, München.

Marschland — heisst in Nordwestdeutschland das niedrige, bei Flut zum Teil unter dem Meeresspiegel gelegene fruchtbare Land längs der Meeresküste und der Flüsse. Durch Eindeichen und Kultur werden die Wiesen allmählig ausgesüsst.
Marschwiesen (Strandwiesen) — ± natürliche Wiesen im Ueberschwemmungsbereiche der Meere (siehe Sandmarsch und Schlickmarsch).
Maserbildung beim Holz — Zeichnungen, die durch besondere (z. B. wellige) Ausbildung der Jahresringe und Markstrahlen zustandekommen.
Maskenblütler (Gaumenblütler) — der Schlundeingang der Krone erscheint durch eine Emporwölbung der Unterlippe, den Gaumen, verschlossen, also „maskiert" (Antirrhinum maius, Linaria Cymbalaria; I/CXX).
maskierter Schlund — VI/1 5.
mássulae — I/CXXV.
Mastform — VI/2 706.
mechanisches Gewebe — I/XXXVI; II Fig. 268, 270, 271, 301.
Medianebene der Blüte — I/CXXXIV.
Mediannerv — Mittelnerv (I/XCVII).
medianzygomorphe Blüten — I/CXXXIV.

mediterran(e) Arten — beschränken sich in der Hauptsache auf die Mittelmeerländer (V/2 1936 Fig. 2922).
Meerbälle — siehe Seebälle.
Mehltau (Meltau) — heisst das weisse, die Pflanzenteile schimmelartig überziehende Luftmyzel vieler Erysibaceae (VII 140); siehe auch echter und falscher Mehltau (V/1 420).
mehrbrüderige Staubblätter — I/CXXIII.
mehrfächeriger (polymerer) **Fruchtknoten** — I/CXXVII.
mehrpaarig — I/XCVI.
Meiophyllie — verringerte Blattzahl in einem Quirl bezw. der Fruchtblätter im Gynaeceum (Juglans regia).
Meiotaxie — Unterdrückung eines ganzen Quirls.
Melanismus (Schwarzfärbung) — Neigung eine dunklere Färbung als gewöhnlich anzunehmen (so z. B. Samen von Helianthus, Aehren von alpinen Gräsern).
Melittophilae — = Bienenblumen.
Membran — siehe Zellhaut.
Membranschleim — V/1 482.
mendeln — Ausdruck sagt, dass Merkmale bei der Kreuzung den Mendel'schen Gesetzen folgen.
Mendelismus — die auf folgende Mendel'sche Gesetze gegründete Lehre von der Vererbung (I/CXLIII).

I. Alle durch Kreuzung reiner Linien gewonnenen Bastarde (F_1-Generation) sind untereinander gleich. Sie können dem einen Elter gleichen (bei Dominanz des unterscheidenden Merkmals) oder in der Mitte zwischen den beiden Eltern stehen (intermediäre Bastarde).

II. Diese Bastarde spalten sich bei Reinzucht auf. Bei intermediären Bastarden gleicht $1/4$ der Nachkommenschaft (F_2-Gen.) dem Grossvater, $1/4$ der Grossmutter (P.-Gen.) und $1/2$ den Eltern (F_1-Gen.). Dabei sind die beiden $1/4$ reinrassig, während das $1/2$ Bastardnatur aufweist. Bei Dominanz zeigen $3/4$ der F.-Gen. das dominante, $1/4$ das rezessive Merkmal. Reinrassig sind dabei das $1/4$ rezessiv und $1/3$ des $3/4$ dominant.

III. Sind mehrere Merkmalspaare verschieden, so vererbt sich jedes davon unabhängig von allen anderen nach demselben Gesetz.

Mergel — als solche bezeichnet man innige Mischungen von kohlensaurem Kalk, tonigen Bestandteilen, Sand und Humus (Tonmergel, Lehm- und Kalkmergel mit 15 bis 75% Kalk).
Meridianpflanzen — siehe Kompasspflanzen.
Merikarpien (Teilfrüchte) — I/CXLIX; V/2 896, 911; VII Fig. 1164 a.
Meristem (Bildungsgewebe) — I/XXVII.
meristematisch (teilungsfähig) — I/LXIV.
Merogonie — IV/2 897.
Mesekret — V/1 240.
Mesocormus — IV/2 811.
mesohygrophytisch — V/1 149.
Mesokarp — I/CXLIX; V/4 2262.
Mesolithicum — siehe Geologische Formationen.
mesophil — Adjektiv zu Mesophyt.
Mesophyll — bezeichnet beim Blatt die Gesamtheit des zwischen der oberen und unteren Epidermis und den Leitbündeln liegenden Grundgewebes.
Mesophyten — Landpflanzen von mittleren Ansprüchen an Feuchtigkeit.
Mesothermen — umfassen Länder mit einer mittleren Jahrestemperatur zwischen 15 und 20° C mit warmem und mildem Winter.
Mesozoicum — siehe Geologische Formationen.
Mestom (Leitbündel) — I/XL.
Metachlamydeae — = Sympetalae (V/3 1567; VII 195).
Metagynie — bei eingeschlechtigen Blüten werden die männlichen Blüten früher geschlechtsreif als die weiblichen.
Metallglanz der Blätter — siehe Blauglanz.
metamorphe Nektarien — Blütenorgane haben ihre ursprüngliche Funktion aufgegeben und sich morphologisch und physiologisch gänzlich in ein Nektarium umgewandelt (Honigblätter vieler Ranunculaceen).
Metamorphose — Umbildung eines Organes in ein anderes, das dem ersteren morphologisch gleichwertig ist, aber ein ganz anderes Aussehen und eine andere Funktion haben kann.
metamorphosierte Blätter — I/CVI.
metamorphosierte Sprosse — I/LXXIV
Metandrie — bei eingeschlechtigen Blüten werden die weiblichen Blüten früher geschlechtsreif als die männlichen.
Metapherie — Verschiebung von (angewachsenen) Organen.
Metastase — Verlagerung (Transport) eines Organes an einen ungewöhnlichen Ort.
Metatypie — abnorme Veränderung der Zahlenverhältnisse in einer Blüte.
metaxene Pilze — siehe heteroecische Pilze.
meteorische Blüten — das Oeffnen der Blüten ist von den Witterungsverhältnissen abhängig.

Metroklinie — V/2 853.
Mikroben — Mikroorganismen, d. h. kleine Lebewesen, welche den niedrigsten Klassen des Pflanzen- (Spaltpflanzen [Schizophyta VII 135], Pilze) und des Tierreiches (Protozoen) angehören und in der Regel nur mit dem Mikroskop wahrgenommen werden können.
mikrokladisch — IV/3 1596.
Mikroorganismen — siehe Mikroben.
Mikrophyten — heissen alle nur mit der Lupe oder dem Mikroskop wahrnehmbaren pflanzlichen Lebewesen.
Mikropyle (Keimmund) — I/XLV, CXXX, CXXXI Fig. 248; I/CXLVI Fig. 275.
Mikrosomen — I/XVII, XVIII.
Mikrosporen — I 4, 47, 49, 69.
Mikrosporangien — I 4, 47, 49, 69, 72.
Mikrosporophylle — Sporophylle, welche Mikrosporen tragen.
mikrostyle Blüten — siehe Heterostylie (I/CXLI).
Mikrothermen-Gebiete — werden von Pflanzen bewohnt, die eine mittlere Jahrestemperatur von o bis 15° C verlangen. Die Vegetationsperiode wird durch eine winterliche Ruhezeit unterbrochen.
Mikro-Therophyten-Typus — IV/2 570.
Milbenhäuschen (Acarodomatien) — V/1 432.
Milchsäure — eine aliphatische Oxysäure $CH_3 CH(OH) COOH$ (α-Oxypropionsäure); sie bildet sich u. a. bei der Vergärung von Kohlenhydraten (V/1 400).
Milchsaft — I/XXXII; V/1 115, 661.
Milchsaftgefässe — I/XXXIII; IV/1 16; V/3 2072 Fig. 3049; VI/2 1133.
Milchsaftröhren — I/XXXIII; V/1 115.
Mimikry — wird die Nachahmung oder Färbung (angeblich zum Schutze oder als Schreckmittel gegen Tiere) von gewissen Formen genannt (siehe auch III 466 und V/2 1523).
Mindel-Eiszeit — = Zweite Eiszeit.
Miozaen — siehe Geologische Formationen.
Mischling — siehe Bastarde.
Mischlingsmoore — siehe Zwischenmoore.
Mischwald — setzt sich aus Nadelhölzern und Laubbäumen von verschiedenem Alter zusammen.
Missbildungen der Blüte — III 507; V/3 2011; VII Fig. 1117 (siehe Blütenmißbildungen und Bildungsabweichungen).

Fig. 1117. „Erdbeerfrucht" (Fragária) mit zahlreichen von der Oberfläche an Stelle der Nüsschen entspringenden jungen Pflänzchen.

Mistpflanzen — sind absolute Düngerzeiger; sie leben auf Tierkot, Düngerhaufen.
Mitose (indirekte Kernteilung) — I/XIX.
Mitscherlich'sche Körperchen — V/1 490 Fig. 1990.
Mittelband — siehe Konnektiv.
Mittelblattstamm (stirps) — heisst der die Laubblätter (Nomophylla) tragende Teil der Pflanze.
mittelgriffelige Blüten — V/2 743.
Mittellamelle — siehe Zellmembran.
Mittelwald — der Niederwald- und Hochwaldbetrieb sind miteinander verbunden.
mixotisch — V/4 2309.
mixotrophe Pflanzen — beziehen gemischte Nahrung, die teils durch Photosynthese, teils mit Hilfe von Mykorrhizen (Knöllchenbakterien usw.) erzeugt wird.
Modifikation — jede nichterbliche, auf Standort, Klima oder Ernährung zurückführbare Variation.
Mohrenrübe — V/2 1509, 1523.
Molasse — ist eine sedimentäre, teilweise eine Süsswasser-, teilweise eine marine Bildung (daneben gibt es auch Kohlenflöze) und gehört dem obern Oligozaen und dem Miozaen an.
Molassepflanzen — siehe IV/3 1127; V/1 263.
Monadelphia (Einbrüderigkeit) — XVI. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit zu einem Bündel verwachsenen Staubblättern bezw. Staubfäden) I/CXXIII.
Monandria — I. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit 1 freien Staubblatt).
monarch (einstrahlig) — heisst ein radiales Leitbündel mit einem Xylemstrahl.
Monochasium (eingabelige Trugdolde) — I/CXXXIX.
monochlamydëische Samenanlage — I/CXXX.
monozyklische (einjährige) **Pflanzen** — Spross erreicht in einem Jahre seine Blühbarkeit (I/LXVIII).
Monoecia — XXI. Klasse des Linné'schen Systems (Blüten eingeschlechtig, und zwar einhäusig).
Monoezie (Einhäusigkeit) — I/CXXXII; V/1 667.
monoezische Polygamie — I/CXXXII.
monogene Fortpflanzung (Monogonie) — ungeschlechtliche Fortpflanzung.
monohybride Bastarde — heissen Bastarde, deren Eltern sich nur in einem Merkmalspaar unterscheiden.
monokarpes Gynaeceum — I/CXXVII.

monokarpische (einmal blühende) **Gewächse** — I/LXIX.
monokline (zwitterige) **Blüten** — I/CXXXI.
Monokotyledonen (Spitzkeimer, Einblattkeimer) — I/XLVI, XLVII, LII, 109; VII 152.
monomerer Fruchtknoten — I/CXXVII.
monomorph — siehe Saisondimorphismus.
monomorphe Blüten — Blüten sind gleich und zwitterig (V/2 937).
monomorphe Gewebe — bestehen aus durchaus gleichartigen und gleichwertigen Zellen.
monopetal (verwachsenkronig) — I/CXVIII.
Monopetalae — = Sympetalae (V/3 1567; VII 195).
Monophagie — Schmarotzerpilze beschränken sich auf eine Wirtspflanze.
monophyletisch — ist der Ursprung aller der Formen, die von einer gemeinsamen Urform abgeleitet werden.
Monopodium — I/LXX; V/3 2126; V/4 2575.
Monosaccharide — siehe Kohlenhydrate.
monosexuelle Blüten — getrenntgeschlechtige Blüten (siehe Diklinie).
Monosie — Trennung vereinzelter Phyllome von andern.
Monostachyae — Seggen-(Carex-)Arten, mit nur einer Blütenähre (II 52).
Monostelie — Grundtypus der Stele (siehe dort), mit einer einzigen, zentralen, von einer einheitlichen Endodermis, Rinde und Epidermis umgebenen Stele.
monostemone Blüten — besitzen nur einen Kreis von Staubblättern.
monosymmetrische Blüten — = zygomorphe Blüten.
monosymmetrische Organe — = dorsiventrale Organe, die eine Rücken- und eine Bauchseite erkennen lassen.
monothezische Antheren — I/CXXIII, CXXV.
monotope Entstehung — eine Art ist ursprünglich nur an einer Stelle (bezw. in einem Gebiet) entstanden (Gegensatz ist polytope Entstehung).
monotypisch — heissen Gattungen mit nur einer Art (IV/2 497, 506).
Monstrositäten (monströse Formen) — werden abnorm ausgebildete Pflanzen bezw. Organe genannt (V/2 1524; VII Fig. 1118).
montane Stufe — erstreckt sich von der oberen Grenze der Kulturstufe bis zur obern Grenze des Laubwaldes.
Moorauge — siehe Kolke.
Moore — siehe Hoch-, Wiesen- und Zwischenmoor.
Moosmoor — = Hochmoor.
Morphogenese — Gestaltbildung.
Morphologie (Formenlehre) — Lehre der äusseren Gliederung der Pflanze (Gegensatz ist die Anatomie, die Lehre vom inneren Bau). Siehe auch Organographie.



Fig. 1118. Vermehrung und teilweise Verwachsung der Nüsse vom Haselnuss-Strauch (Corylus Avellana L.). Phot. Josef Ostermaier, Dresden.

Mosaikbastarde — Bastarde, bei denen abwechselnd Eigenschaften der Mutter und des Vaters auftreten.
Mudde (Gyttia, Sapropel) — heisst der unter Wasser bei Luftabschluss sich absetzende, grösstenteils aus organischem Detritus zusammengesetzte Faulschlamm.
Müllersche Körperchen — III 124.
mukronate Blätter — besitzen eine kurze Stachelspitze.
Mullerde (gewöhnlicher Humusboden) — entsteht in besser durchlüfteten Böden mit reichlichem Bakterien- und reichem Tierleben. Er besteht aus einem Gemisch von Sand und von (3 bis 15%) Humusstoffen.
Mullpheliophoben — = chlorophyllhaltige Humuspflanzen des Buchenmull (Anemone nemorosa, Milium effusum).
multilaterale Ausbildung — siehe radiäre Ausbildung.
Multiplikation — Spaltung eines Organes in mehrere homologe Teile.
Muschelkalk — siehe Geologische Formationen.
Mutationen (spontane Abänderungen) — heissen plötzlich „sprungweise", aus rein inneren Ursachen (autogenetisch) auftretende, richtungslose und vererbbare Abweichungen eines Individuums. Sie erscheinen mit Vorliebe im Gefolge — oder als Folge — der Bastardierung (I/CXVI; III 97; IV/1 365; V/2 858). Siehe auch Kleinmutationen.
Mutationen, progressive — IV/2 981.
Mutationstheorie (von Hugo de Vries) — Organismenarten können in eine Mutationsperiode eintreten, als deren Folge Aenderungen in der Erbanlage (Mutationen) auftreten. Solche Mutationsperioden führen zur Artbildung.
Myazeit — letzte Periode des Postglazials in Norddeutschland. Die Ostsee wird durch Hebung am Ende der Litorinazeit wieder ± ausgesüsst. Herausbildung der heutigen Verhältnisse. Benannt nach der Sandmuschel Mya arenaria L.

Myiophilae — Fliegenblumen.
Mykorrhiza (Pilzsymbiose) — I/LVI; II 390; IV/2 926, Fig. 1177 a, b; V/3 1570, 1600.
Mykotroph — V/3 1704.
Myriophyllum-Drüsen — V/2 895.
Myrmekochoren (Ameisenwanderer) — I/CLIV; II 206; III 456, 466; IV/3 1186; V/1 593; V/3 1736.
Myrmekochoren, fakultative — Ameisenpflanzen, die noch andere Verbreitungseinrichtungen besitzen.
Myrmekochoren, obligatorische (echte) — sind vollständig auf die Verbreitung durch Ameisen angewiesen (I/CLV).
Myrosin(-schläuche) — IV/1 57, 75, 120, 207, 238, 320, 445.
myrtoide Blattform — an Verdunstung angepasste, verkehrt-eiförmige, längliche, ungeteilte, immergrüne Blätter (Nerium, Olea, Rhododendron-Arten, Lavandula).
Myzel (Mycelium) — aus Pilzfäden (Hyphen) gebildete Geflechte von lockerer oder ± fester Beschaffenheit, die den Vegetationskörper vieler Pilze darstellen.

N.

Nabel (hílum, hílus, umbílicus) — I/XLIX, CXXX.
Nabelfleck — = Chalaza.
Nabelfleck (mácula hiláris) — umgibt besonders bei vielen Leguminosensamen als auffällig gefärbter Fleck den Nabel.
Nabelstrang (funículus) — I/CXXX; V/2 682.
Nabelwulst — IV/3 1139.
Nachbarbestäubung (Geitonogamie) — I/CXLI; V/2 938.
nachgiebige Böden — heissen solche, die schwach gepuffert sind (z. B. Sandböden), die ihren p_H-Wert bei Zusatz von Säuren oder Basen sehr rasch ändern.
Nachtblumen — sind bei Tage geschlossen, welk oder unansehnlich, öffnen sich abends und duften auffällig (V/2 693).
Nachtfalterblumen — I/CXLV IV/1 466.
Nachtstellung — siehe nyktitropische Bewegungen.
nackte Knospen — I/LXV.
Nadelblatt (pinoides Blatt) — I/CII.
Nadelkissen — ein den Zweigen aufsitzender Wulst, der die Nadel trägt.
Nährböden — künstlich für Bakterien- und Pilzkulturen hergestellte Nährböden, die flüssig (Bouillon, Milch) oder fest (Gelatine, Agar usw.) sein können.
Nährgewebe — I/XLVIII; V/2 932, 933.
Nährgewebe, doppeltes — enthält Endosperm + Perisperm.
Nährpflanze — = Wirtspflanze.
Nährsalze (Leitung) — I/XLI.
Nährwurzel — V/2 918.
Nagel (únguis) — I/CXX.
Nagelfluh — sind Konglomerate, vorwiegend aus Kalksteinstücken, seltener aus Bruchstücken von Sandsteinen oder kristallinischen Gesteinen bestehend, die durch ein kalkreiches, mässig toniges Bindemittel verbunden sind (tertiäre und diluviale Nagelfluh bezw. [älterer und jüngerer] Deckenschotter werden unterschieden).
Nahrungsaufnahme — I/LIII.
Nanismus — Zwergwuchs, Verzwergung; dieser kann gezüchtet oder angeboren sein.
Nanoflora — IV/1 361.
Nanophanerophyten (Sträucher) — die Erneuerungsknospen befinden sich etwa 0,25 bis 2 m über dem Boden (IV/2 512; V/2 720).
Narbe (stígma) — I/CXXVIII, CXXIX.
Narbe, reizbare — siehe reizbare Narbe.
Narbenformen — I/CXXIX; II 293 (Fig. 395), 298; V/3 2053.
Narbenkopf — V/1 590.
Narbennachreife — siehe Proterogynie I/CXLI.
Narbenpapillen — II 298.
Narbenvorreife — siehe Proterogynie I/CXLI.
Narkotika — sind Stoffe, welche das Plasma lähmen, d. h. bestimmte Stoffwechsel- und Reizvorgänge vorübergehend herabsetzen oder ausschalten können (Anaesthesie).
Narren (Narrentaschen) — IV/2 1056.
Narrenzapfen — III 133.
Nastien (Krümmungen) — als Nastie wird an nicht radiären Organen jede durch allseitige diffuse, nicht orientierte Reize bewirkte Krümmung, ohne Rücksicht auf die Mechanik der Reaktion, bezeichnet.
natürliche Systeme — versuchen den phylogenetischen (stammesgeschichtlichen) Entwicklungsprozess zum Ausdruck zu bringen. Sie sind auf der monophyletischen Entwicklung des Pflanzenreiches begründet.

naturalisierte Pflanzen — sind in historischer Zeit durch den Menschen (bewusst oder unbewusst) in ein Gebiet eingewandert, wo sie sich wie einheimische wilde Pflanzen verhalten.
Naturrasen — sind völlig unberührte Wiesen, die weder gemäht, geweidet, noch gedüngt, entwässert oder bewässert werden.
Nebenblätter (stípulae) — I/CV V/2 741, 952.
Nebenblattdornen (Stipulardornen) — IV/3 1394, 1396; V/ 327.
Nebenblattnektarien — IV/3 1507, 1540.
Nebenblattscheide (óchrea) — I/CVI; VII Fig. 1018.
Nebenblattstacheln — I/CVI.
Nebenkrone (paracorólla) — I/CXX; V/1 639; V/3 2056, 2061; VII Fig. 1194.
Nebenrippen — siehe Früchte von Daucus Carota (V/2 1502, 1518).
Nebenzeilen (Schrägzeilen) — I/LXXIII.
nec (latein.) (bei Autornamen) — = und nicht.
Neïsmus — formbildende Reaktion, welche die Entstehung neuer Organe an einem gegebenen Punkte (z. B. Wurzeln an Stecklingen) veranlasst.
Nekrose — Absterben eines Pflanzengewebes, das noch in räumlichem Zusammenhang mit dem lebenden Organismus steht.
Nektar — I/CXXI.
Nektarblumen — I/CXLV
Nektarien — I/CXXXI; II 186; IV/1 8.
Nektarien, extraflorale (asexuelle) — III 452; IV/2 1054; IV/3 1507, 1540; V/1 310, 459.
Nektarien, nuptiale — treten im Bereich der Blüten auf.
Nektarorganismen — sind mikroskopische Lebewesen (Bakterien, Schimmelpilze), die sich regelmässig im Nektar verschiedener Blütenpflanzen vorfinden.
Nektarostegium — V/4 2260.
Neocom — siehe Geologische Formationen.
Neo-Endemismus — siehe Endemismus.
Neogen — siehe Jung-Tertiaer.
Neolithicum — = Jüngere Steinzeit (geschliffener Stein); sie gehört der Würmzeit an und reicht von etwa 5000 bis 2000 vor Christi.
Neophyten — Fremdlinge, die sich an natürlichen Standorten einzubürgern vermögen (IV/1 69).
Neotropisches Florenreich (Neotropis) — umfasst Mittel- und den grössten Teil von Südamerika.
Nereïden — im Wasser (besonders im Meerwasser) lebende, mit Haftorganen ausgestattete, auf felsigem Untergrund wachsende Pflanzen.
Nerven (vénae) — I/XCVII.
Netzgefässe — I/XXIV Fig. 13.
netznerviges Blatt — I/XCVII.
Neubildung (Neuentfaltung) — siehe Callus und Regeneration.
Neubürger — = Neophyten.
Neu-Endemismus — siehe Endemismus, progressiver (V/1 16; V/3 1790).
Neuston — Lebensgemeinschaft jener Mikroorganismen, die das Oberflächenhäutchen des Wassers bewohnen.
neutriphile Arten bezw. Gesellschaften — Boden neutral. Wasserstoffzahlen 7,08 bis 6,7 (IV/3 1417).
nichtschlafende Blüten — siehe agamotrope Blüten.
nickender Spross — I/LXXXV
Niederblätter — als solche werden einerseits die unter den eigentlichen Laubblättern am Sprosse befindlichen Blätter bezeichnet (kataphylla, I/CX), andrerseits aber auch Blattbildungen an unterirdischen Organen (diese enthalten Reservestoffe).
Niederblattschuppen — IV/3 1678.
Niederungsmoor (Niedermoor) — siehe Flach- bezw. Wiesenmoor.
Niederwald(-betrieb) — entsteht durch Stockausschlag und wird periodisch abgetrieben. Hiezu eignen sich nur Laubhölzer (III 91, 104, 114; V/3 1930).
nierenförmiges Laubblatt — I/XCV
Nischenblätter — I/CXV
Nitragin — I/LVII.
Nitrat- bezw. **Nitritorganismen** — bevorzugen bei der Stickstoffaufnahme Nitrate oder Nitrite (V/2 816).
Nitrifikation (Salpeterbildung) — Nitritbildner (Nitrosómonas, Nitrosocóccus) führen zunächst die Ammoniakverbindungen durch teilweise Oxydation in salpetrige Säure (HNO_2) oder Nitrit über, welcher Prozess durch die Anwesenheit alkalischer Substanzen, Kalk, Magnesium usw. begünstigt wird. Darauf wird die salpetrige Säure oder ihr Salz durch die Tätigkeit von Nitratbakterien zu Salpetersäure (HNO_3) oder Nitrat oxydiert, die für die höheren Pflanzen die wichtigste Stickstoffnahrung darstellt.
Nitrogenorganismen — verwerten den elementaren Luftstickstoff.
Nitrophyten — gedeihen am besten auf starkgedüngtem Boden (Düngerzeiger).
Nitrozellulose (Dinitro- und Trinitrozellulose) — V/1 462 (Salpetersäurereste der Zellulose).

nivaler Pionierrasengürtel der Hochgebirge — erstreckt sich von der klimatischen Schneestufe bis zu den obersten Rasenflecken.

Nivalstufe (Schneestufe) der Hochgebirge — reicht von der klimatischen Schneegrenze bis zu den höchsten Spitzen (Unterstufen: nivaler Pionnierrasengürtel, Polsterpflanzengürtel, Kryptogamengürtel).

nódi (Knoten) — I/LXVIII.

nördlich-extratropisches Florenreich — siehe Holarktis.

nómen núdum (nom. nud.) nackter Name, d. h. es ist nur der Name, aber keine Beschreibung der Pflanze vorhanden.

Normaltiefe der Wurzel — I/LXI.

notorrhizer Embryo — IV/1 55.

nov. gen. (n. g.) — nóvum génus = neue Gattung.

nov. spec. (n. sp.) — nóva spécies = neue Art.

nucéllus (Knospenkern) — I/XLVIII, CXXX.

núcleus (Zellkern) — I/XVII.

Nuculanium — = Sammelsteinfrucht.

Nudelspritzen oder **-pumpeneinrichtung** der Schmetterlingsblüten — IV/3 1137.

Nüsschen — I/CXXVIII; VI/1 Fig. 206 m.

Nüsse — als solche werden im täglichen Sprachgebrauch auch Samen oder Steinkerne (Hasel-, Wal-, Para-, Kokosnüsse) bezeichnet.

Fig. 1119. Anemone nemorosa L. mit geschlossenen und hängenden Blüten. Phot. Dr. R. Scharfetter, Graz.

nukleäres (nukleares) **Endosperm** — die Endospermbildung setzt mit einer raschen Kernvermehrung ein (freie Zellbildung), Membranbildung folgt erst später.

Nukleïne — phosphorhaltige Eiweisskörper, die in den Zellkernen vorkommen.

Nukleolen (Kernkörperchen) — kugelige, innerhalb des Zellkernes gelegene Körper, die sich bei der Mitose auflösen.

nuptiale Nektarien — liegen innerhalb des Bereiches der Blüte.

Nussfrucht (nux) — I/CL.

Nuss-Schötchen (nucaméntum) — IV/1 54.

Nutationen (IV/3 1728; V/1 4; V/3 2092) — heissen alle durch Wachstum vermittelten Bewegungen und Drehungen, die nicht unmittelbar durch äussere Verhältnisse hervorgerufen werden (siehe Reize), ihre Ursachen also in der eigenen inneren Beschaffenheit der Pflanze haben (spontane, autonome oder autogene Nutation).

Nutationsbewegung — IV/1 60.

Nutationsbewegung, praeflorale — V/2 1179.

Nutrizismus — Ernährung mit Hilfe von Mykorrhizen, Knöllchenbakterien usw.

núx — Nuss (I/CL).

Nuzellarembryonen — I/CXLVIII; II 187.

Nuzellus — I/XLVIII, CXXX.

Nyktinastie — IV/3 1121.

nyktitropische Bewegungen (Nyktinastie, Schlafbewegungen, Pflanzenschlaf) — periodische Bewegungen, welche viele Pflanzenteile in Abhängigkeit vom täglichen Wechsel von Tag und Nacht ausführen (Tag- und Nachtstellung). Diese Bewegungen sind Nastien (keine Tropismen) VII, Fig. 1119.

O.

obdiplostemones Androezeum — I/CXXVI; IV/3 1659.

Oberflächenpflanzen (Exochomophyten) — heissen solche Felsenpflanzen, die in oberflächlichen Detritushäufchen wurzeln oder auf Polstern oder Spalieren keimen.

Oberhaut — siehe Epidermis (I/XXVII).

Oberlippe der Labiaten — V/4 2260.

oberschlächtige Deckung — die Unterkante der Teilblättchen ist von der Rückseite gesehen frei und deckt ziegelartig das darunterliegende Blättchen (Botrychium, Cycas).

oberständiger Fruchtknoten — I/CXXVIII.

obligat — bedeutet an bestimmtes Verhalten gebunden oder angepasst (Gegensatz ist fakultativ).

obliteriert — zusammengedrückt.

Obturator — V/1 116.

óchrea — I/CVI; VII Fig. 1018.
Octandria — VIII. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit 8 freien Staubblättern).
Oedland — künstlich geschaffener, offener, nicht in Kultur genommener Boden Eisenbahngelände, Kiesgruben, Steinbrüche, Hafenanlagen).
Oehrchen — kurzes, blattartiges Anhängsel an den beiden Seiten oder am Grunde eines Laubblattes (VI/1 407 Fig. 210c, c_1).
Oekiophyten — aus der einheimischen (wilden) Flora durch bewusste Tätigkeit des Menschen hervorgegangene Kultur- oder Zierpflanzen.
Oekologie — Wissenschaft von den Beziehungen der Organismen zu ihrer lebenden und leblosen Umwelt.
Oelbaumtuberkulose — V/3 1944.
Oeldrüsen (Oelbehälter) — I/XXXIV; V/1 45; V/2 778.
Oele — siehe fette und ätherische Oele.
Oelkörper — siehe Elaiosom.
Oelkugeln — V/2 798.
Oelplastiden — I 121.
Oelstriemen (víttae) — V/2 928, 930, 933; VII Fig. 1160.
Oelzellen — I/XXXIII.
offene Gefäss- oder **Leitbündel** — siehe Leitbündel.
offene Knospenlage (aestivátio apérta) — die einzelnen Blätter eines Zyklus erreichen einander mit ihren Rändern nicht.
Oidien — siehe Konidien.
Okulieren — I/CLVIII.
Oligomerie — der heteromere Blütenzyklus zeichnet sich durch eine verminderte Gliederzahl aus.
oligosaprob — Organismen, die in wenig verschmutztem Wasser leben.
oligotrophe Pflanzen — gedeihen in Böden mit einem geringen mineralischen Nährstoffgehalt.
Oligozän — siehe Geologische Formationen.
ólim (latein.) — = einst. früher.
ombrophil — regenliebend.
ombrophile Pflanzen — ertragen ohne Schaden eine monatelange Benetzung (Regen); als Schutzeinrichtungen gegen Benetzung dienen zuweilen Wachsüberzug, Sammtblätter.
ombrophob — regenscheuend (V/3 2000).
ombrophobe Pflanzen — ertragen keine andauernde Benetzung. Sie zeigen in der Regel unbenetzbare Blätter. Die meisten Xerophyten sind ombrophob.

Fig. 1120. Clianthus speciosus (Don) Aschers. et Graebner (= Clianthus Dampieri A. Cunn.), Deutsche Flagge (IV/3, 1456). Blume dient als ornithophiler Schauapparat.

omnivore Organismen (Allesfresser) — sind hinsichtlich der Ernährung bezw. des Futters oder des Substrates nicht wählerisch.
Ontogenese — Entwicklung eines Lebewesens von der befruchteten Eizelle bis zum höchsten Grade seiner Ausbildung bezw. bis zum Tode.
Ooapogamie — Entwicklung eines diploïden Eies (siehe auch Parthenogenese, Apogamie und V/2 944).
oogene Apagomie — siehe Ooapogamie.
Oolyse — Vergrünung der Samenanlagen (VII Fig. 1164c).
Oosmose — bezeichnet den Durchtritt von wässerigen Flüssigkeiten bezw. Gasen durch porenlose Membranen.
Ophiurenzellen — siehe Spikularzellen.
Opisthialöffnung — heisst der Ausgang aus dem Hinterhof des Spaltöffnungsapparates.
Opium — IV/1 35.
opponierte Blattstellung — Blätter stehen einander gegenüber.
opponierte Quirle — I/CXXXIV.
Opsigonie — verspätetes Auftreten von Knospen, welche eine Zeitlang ruhen, ehe sie zum Vorschein kommen (siehe Proventivknospen VI/1 248).
Oreophyten — Pflanzen der alpinen und nivalen Stufe der Hochgebirge.
Organisationsmerkmale — heissen die den Organismen zukommenden, sich konstant erweisenden Merkmale, die nicht direkt mit Anpassungen an eine bestimmte Lebensweise im Zusammenhange stehen (Gegensatz siehe Anpassungsmerkmale).
Organographie (experimentelle Morphologie) — sucht die Verschiedenheit der Organe mit Rücksicht auf die Zufuhr von Licht, Wasser, Wärme usw. zu erklären.
organoide Gallen — siehe Gallen.

Ornithogamae (Ornithophilae) — Vogelblütler (I/CXLIV; V/1 312; VII Fig. 1120 und 1167).
orographische (physiographische) **Faktoren** — wirken mehr indirekt als Ursachen durch Veränderung der klimatischen Faktoren (Exposition, Böschungswinkel, Richtung der Gebirge, Passlücken).
Orthocanthie — IV/2 979.
Orthogeotropismus — bezeichnet die stabile Gleichgewichtslage orthotroper Organe.
Orthonastie — V/1 132.
orthoploker Keim — IV/1 56.
Orthospermae — V/2 933.
Orthostichen (Längszeilen) — I/LXXII.
orthotrope Organe — stehen normal ± aufrecht (I/CXXII)
orthotrope (geradläufige) **Samenanlagen** — I/CXXX.
Ortstein (Fuchserde, Knick) — ist ein durch humose Stoffe verkitteter Sandstein (Humussandstein), von hellbrauner bis schwarzbrauner Farbe, der an der Luft zu einem helleren Sande zerfällt.
Osmose — I/XXII.
osmotischer Druck — heisst der Druck, den die in Bewegung befindlichen Moleküle eines in einem Lösungsmittel gelösten Stoffes auf die Umgebung ausüben.
Osteosklereïden — gehören zu den Sklerenchymzellen.
oszillierende Bewegung — siehe periodische Bewegung.
ovárium (Fruchtknoten) — I/CXXVIII.
óvula (Samenanlagen, Eichen) — I/CXXIX.
Oxalsäure — I/XXII; IV/3 1654.
oxalsaurer Kalk — I/XXII.
Oxanïen (Pistille) — werden die normal weiblichen Blüten von Arum-Blumen benannt.
Oxybiose (Aërobiose) — bezeichnet das an die Aufnahme von freiem Sauerstoff gebundene Leben.
Oxydasen — heissen oxydierende Fermente (u. a. die Alkoholasen).
Oxydationsgärung — durch die Enzyme oder Fermente von Mikroorganismen hervorgerufene Stoffumwandlung mit unvollständiger Oxydation (z. B. Essigsäuregärung).
Oxynesie — Fähigkeit des Organismus einen Reiz zu erzeugen.
ozeanisches Florenreich — umfasst die Flora der Meere (besonders Algen, in der litoralen Region auch Seegräser) und zerfällt in ein boreales, tropisches und australes Gebiet.
ozeanisches Klima — im Gegensatz zu kontinental, ausgezeichnet durch größere Niederschläge und geringere Temperaturunterschiede.

P.

paarig-gefiedertes Blatt — I/XCVI.
Paedogenesis — abnormes Auftreten von Blüten an Keimpflanzen oder an Jugendformen von Pflanzen (V/1 83; VI/1 354).
Palaeobotanik (Palaeophytologie, Phytopalaeontologie) — befasst sich mit den Pflanzen der Vorwelt auf Grund fossiler Reste (VII Fig. 1089).
Palaeo-Endemismen — Ueberreste alter Formen in bestimmten Gebieten.
Palaeogen — = Alt-Tertiaer (Eogen).
Palaeolithicum — = ältere Steinzeit; sie erstreckt sich von der Mindel- bis zur Würm-Eiszeit und gliedert sich in das Alt-Palaeolithicum (Cheléen, Acheuléen und Moustérien) und in das Jung-Palaeolithicum (Aurignacien, Soluthréen und Magdalénien). Sie ist charakterisiert durch zugeschlagene Steinwerkzeuge.
Palaeotropis (Palaeotropisches Florenreich) — umfasst die Tropen der alten Welt.
Palaeozoicum — siehe Geologische Formationen.
páleae — siehe Spreuschuppen.
Palisadengewebe — I/XCVIII IV/2 1090.
Palisadenparenchym — I/XCIX.
Paludilignosa — siehe Bruchwälder.
Panaschierung (Weissfleckigkeit, albicátio) — Blattspreiten zeigen weisse Flecken oder Streifen, oder sind vollständig weiss gefärbt (siehe auch Periklinalchimären und V/4 2450).
Pannonien — Name einer römischen Provinz, welche ausser Ungarn die Länder an der Donau umfasste.
panphotometrische Blätter — vermögen ihre Stellung je nach der Stärke und der Richtlage des einfallenden Lichtes zu ändern (Vertikalstellung, Faltung).
Pantropisten (Tropenweltbürger) — heissen Pflanzen, die den grössten Teil der Tropenzone bewohnen.
Papayacin (Papayotin) — V/1 601.
Papillen — sind kurze, kegelförmige Haargebilde bezw. Ausstülpungen der Oberhautzellen (I XXIX Fig. 21 a; IV/3 1726.
Pappus (Haarkrone) — I/CLIII; VI/2 866.
Paracorolla — siehe Nebenkrone (I/CXX; V/1 657; V/3 2056, 2061; VII Fig. 1194.
paraeutroph-oligocholikische Gewässer — V/2 891.
paraffinoide Düfte — werden durch Kohlenwasserstoffe erzeugt. (Baldrian-, Rauten-, Weinblütenduft).
parakarpes Gynaezeum — Fruchtblätter sind nur mit den Rändern verwachsen (Primula).

Parakarpidien — heissen die abortierten weiblichen Blüten der Arum-Blume.
parallelnervig (parallelodrom) — I/XCVII.
Paralleltypen — V/4 2561, 2575.
Paralysatoren — siehe Fermentgifte.
Parasiten (Schmarotzerpflanzen) — I/LIX.
Parastemonen — heissen die abortierten männlichen Blüten der Arum-Blume.
Parastichen (Schrägzeilen) — I/LXXIII.
paratonische (rezeptive, induzierte, aitogene) **Vorgänge** — werden durch äussere Reize bestimmt (Gegensatz: autonom).
paratonische Trophien — heissen die auf die Wirkung äusserer Faktoren zurückführbaren Tropismen (Phototrophie, Geotrophie).
Paratypus — siehe Plastotypus.
Paravarianten (Parallelvarianten) — heissen die mannigfachen Abänderungen einer Pflanze, die in derselben Richtung stattfinden (xero- und hygrophytische Paravarianten).
Parenchymgewebe — I/XXXII.
parietale Plazentation — I/CXXX.
Parthenogenesis (Jungfernzeugung) — apomiktische Entstehung eines Embryos aus einem Ei (siehe Ooapogamie).
Parthenogenesis, generative (echte Parthenogenesis) — der Kern des unbefruchteten Eies besitzt die haploïde Chromosomenzahl.
Parthenogenesis, somatische (Ooapogamie) — der Kern des Eies besitzt die diploïde Chromosomenzahl (die bei den Pflanzen verbreitete Parthenogenese).
Parthenokarpie (Jungfernfrüchtigkeit) — ist eine rein vegetative Fruchtbildung, die ohne Mitwirkung männlicher Sexualzellen vor sich geht (I/CXLVIII; V/1 63, 132, 210; V/2 682, 766; VI/1 313).
Partialblütenstand — = Teilblütenstand.
Parvocaricetum — Sumpfwiesenbestand, gebildet aus niederen Seggen (besonders Carex panicea und Carex Goodenowii = C. fusca).
Pasteurisieren — Abtöten (Sterilisieren) von Mikroorganismen durch Erwärmen auf 55 bis 80° C (V/1 401).
pathogen — krankheitserregend.
Pathologie — Lehre von den Krankheiten der Pflanzen (siehe auch Teratologie).
Pathophyten — pflanzliche Krankheitserreger.
Pech — I 98.
Pedagnuoli — siehe Kaprifikation (III 126).
pedicéllus — Blütenstiel.
Pedologie (Bodenkunde) — Lehre von der Entstehung, den Eigenschaften und den Umbildungen des Bodens.
Peitschenhaare — VI/2 679.
Pektine — treten besonders in der Mittellamelle der Zellwände auf; es sind hochkondensierte, mit den Gummiarten verwandte Kohlenhydrate mit Neigung zu Gallertbildungen.
pelagisches Plankton — Mikroplankton im Salzwasser.
pelogene Gesteine — liefern staubförmige, erdige Verwitterungsprodukte.
Pelorie — ± aktinomorphe Ausbildung einer normal zygomorphen Blüte (I/CXXXV; IV/3 1162; V/1 635; V/4 2260, 2263; VI/1 21; VII Fig. 1121).
Penduliflorae — hängeblütige Windblütler.
Pentakotylen — Keimpflanzen mit fünf Keimblättern.
pentamere Blüten — I/CXXXIV.
Pentandria — V. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit 5 freien Staubblättern).
pentarch (fünfstrahlig) — heisst ein radiales Leitbündel mit fünf Xylemstrahlen.
pentazyklische Blüten — fünfquirlige Blüten.
Peptiotisieren — V/1 401.
perennierend (ausdauernd) — I/LXIX.
pergeloide Böden — V/3 1618.
Perianth (Blütenhülle) — I/CXVIII.
Periblem (Hüllgewebe) — wird das zwischen Dermatogen und Plerom gelegene Urmeristem (die junge Rindenschicht) des Vegetationsscheitels bezeichnet.
Pericambium — I/LXII.
Perichylen — das Wassergewebe liegt zwischen Epidermis und Mesophyll (siehe Endochylen).
Periderm — I/XXX.

Fig. 1121. Pelorie von Digitalis purpurea L. (VI/1 S. 66).

Perigon (Blütenhülle) — I/CXVIII.
Perigynie — I/CXXVIII.
Perikarp (Fruchtwand) — I/CXLVIII.
Perikladium — gegliederter Blütenstiel von Rumex und Cannabis; der untere Teil entspricht dem eigentlichen Blütenstiel, der obere dem herablaufenden Perigon.
Periklinalchimären — IV/3 1666; V/1 295; V/4 2610.
perikline Wandrichtung — Zellwände sind in gleichem Sinne wie die Oberfläche gekrümmt.
periodische Bewegung — die Bewegung erfolgt in wiederholten Schwingungen um die Gleichgewichtslage.
periodische Blüten — öffnen und schliessen sich wiederholt, und zwar täglich einmal.
Perisperm — Nährgewebe der Samen, das den Rest des Nuzellus darstellt und ausserhalb des Embryosackes gebildet wird (im Gegensatz zum Endosperm, das im Innern desselben entsteht) (I/XLVIII).
Perizykel — heisst in den Sprossorganen der zwischen den Leitbündeln und der Endodermis (innerste Rindenschicht) liegende Gewebekomplex.
Perldrüsen der Vitaceen — V/1 352.
perlschnurartig — mit kugelig oder ellipsoidisch verdickten Gliedern.
Permeabilität — Durchlässigkeit einer Substanz für andere Stoffe (siehe Osmose).
Permutation — Vergrösserung der Blütenhülle mit gleichzeitigem Abort der Geschlechtsorgane.
Perthophyten — Parasiten, die zwar lebende Pflanzen befallen, aber nur von abgetötetem Gewebe leben.
Perzeption — Aufnahme der äusseren Reizursache durch den Organismus.
Petalen (Kronblätter) — I/CXIII, CXIX.
petaloide Fruchtblätter — V/3 1731.
petaloide Staubblätter — V/3 1731.
Petalodie Umbildung eines Blattes in ein blumenblattartiges Gebilde.
Petalomanie — überreiche Produktion von in alternierenden Wirteln oder in Spiralen geordneten Blättchen in Blüten, wodurch eine reichere Füllung der Blüten erzielt wird, als durch alleinige Umbildung von Staub- und Fruchtblättern zu Blumenblättern (IV/3 1649; V/3 1730).
petiolus — Blattstiel (siehe auch geflügelter Blattstiel).
Petrefakten (Versteinerungen) — siehe Fossilien.
Petrophyten — Felsenbewohner.
Pfahlwurzel — I 72; V/2 1016 Fig. 2376.
pfeilförmiges Blatt — I/XCV.
Pflanzenasche — enthält vor allem Verbindungen von Kali, Kalk, Magnesia, Eisenoxyd, Schwefel- und Phosphorsäure, oft auch Kieselsäure, Natron und Chloride, mehr zufällig auch Jod, Mangan, Aluminium und Zink.
Pflanzengeographie (Geobotanik) — untersucht die Beziehungen zwischen Erde und Pflanzenwelt.
Pflanzengesellschaft — siehe Synoekologie.
Pflanzengifte — gehören vorwiegend den Gruppen der Glykoside (inkl. Saponine) und der Alkaloide an. Es werden ätzende (scharfe), narkotische (betäubende) scharf-narkotische Gifte unterschieden.
Pflanzensäuren — siehe Säuren.
Pflanzenschleim — findet sich als Zellinhalt bei vielen Sukkulenten, in den Knollen der Orchidaceen, in Zwiebeln; in andern Fällen geht er aus der Zellwand hervor (siehe Schleimmembran und Schleimhaare).
pfriemliches Blatt — I/XCV.
Pfropfbastarde — I/CXLIII; IV/2 743; IV/3 1167; V/4 2610.
Pfropfen — I/CLVIII.
p_H — siehe Wasserstoffzahl.
Phaenologie — Wissenszweig, der sich mit der für verschiedene Gegenden (infolge des verschiedenen Klimas) verschiedenen zeitlichen Ordnung der rhythmischen Lebenserscheinungen (Laubausbruch, Blütenentfaltung, Fruchtreife, Laubfall) beschäftigt.
Phaenotypus — die durch Wechselwirkung von Anlage und Umwelt zustandegekommene sichtbare Erscheinungsform eines Individuums.
Phanerophyten (Luftpflanzen) — Ueberdauerungs- bezw. Erneuerungsknospen befinden sich an aufrechten, wenigstens 25 bis 30 cm hohen Trieben über dem Boden.
Phellidophyten — Schutt- im Sinne von Ruderalpflanzen.
Phelloderm — I/XXXI.
Phellogen (Korkcambium) — I/XXXI.
Phelloide (unechter Kork) — sind unverkorkte (nur verholzte) Gewebepartien, die das leichtere Ablösen der Korkpartien ermöglichen.
Phlobaphene — werden den Gerbstoffen nahe stehende braune bis braunrote Farbstoffe benannt.
Phloëm (Siebröhrenteil) — I/XLI, XLIV.
Phloëmparenchym — I/XLIII, XLIV.
phobische Reaktion — Auftreten der Reaktionsbewegung nach Uebergang in eine andere Reizintensität.
Phoeotherma — V/4 2257.
Phosphor — kommt in der Pflanze teils in Form von Phosphorsäureestern als Bestandteil der Nucleïne (Nucleoproteïde), des Lecithins usw. vor, teils als phosphorsaure Salze als Begleiter von Eiweissstoffen.

photische (euphotische) **Tiefenstufe** der Wasservegetation — die Lichtintensität genügt für die normale Entwicklung von Makrophyten.
Photoaesthesie — Lichtempfindlichkeit.
photoaesthetische Bewegungen — heissen vom Licht abhängige (positive und negative) Bewegungen.
photometrische Blätter — sind in ihrer Lage von der Richtung des einfallenden Lichtes abhängig.
Photonastie — durch (allseitige) Lichtreize bewirkte Krümmungsbewegung (Nastie) (IV/3 1398).
photophil — lichtliebend, lichtsuchend (I/LXIX).
photosynthetische Kohlensäureassimilation — erfolgt bei Gegenwart von Kohlensäure (Kohlensäureanhydrid und Wasser), Licht (als Energiequelle) und Chlorophyll.
Phototonus — Lichtreiz.
Phototropismus (Heliotropismus) — Bezeichnung für die durch Licht (einseitig) ausgelösten tropistischen Bewegungen.
Phycocyan — I/XIX.
Phycodomatien — von Spaltalgen bewohnte Domatien (bei Azolla).
Phycoërythrin — I/XIX.
Phycophaeïn — I/XIX.
Phyllerium — siehe Erineum.
Phyllidien — werden die den Blättern der höheren Pflanzen analogen Organe der niederen Pflanzen bezeichnet.
phyllochyle Pflanzen (Blattsukkulenten) — I/CIII; VII Fig. 1062 und 1152.
Phyllodie (Phyllomorphie) — Auftreten von Laubblättern an Stelle anderer Organe (I/CXVII; V/2 926).
Phyllodium — I/XCIII; IV/3 1644, 1647; V/2 695.
phyllokarpische Bewegungen — sind karpotropische Bewegungen von Blütenstielen, durch welche die junge Frucht unter die Blätter gebracht wird.
Phyllokladien (Flachsprosse) — I/LXXVI; II 264.
Phyllom — Blatt (Blattorgan) im allgemeinen Sinne (IV/2 500).
Phyllomanie — vollständige Vergrünung von Blüten, bei der alle Blütenblätter zu Laubblättern umgebildet sind.
Phyllomkreis — V/3 1723.
phyllopoder Wuchs — VI/2 1184.
Phyllotaxis (Blattstellungslehre) — I/LXXII.
Phylogenie (Phylogenese) — Stammesgeschichte (Gegensatz ist Ontogenie).
physikalische Bewegungen — sind im Gegensatz zu den vitalen von der Lebenstätigkeit ganz oder doch nur unmittelbar abhängig (siehe hygroskopische Bewegungen, Auferstehungspflanzen).
physikalisch trocken — ist ein Boden, der wenig Wasser enthält.
Physiologie — versucht die kausale Erforschung der Lebensvorgänge zu erklären.
physiologische Varietät — III 135; IV/2 1088.
physiologisch trocken — ist ein Boden für solche Pflanzen, welche ihm zu wenig Wasser zu entnehmen vermögen.
phytobiotische Faktoren — zu diesen gehören, abgesehen von pathologischen Einwirkungen, der Wettbewerb um den Wuchsort, Blattkonkurrenz, Beschattung, Bodenbakterien.
Phytodomatien — von pflanzlichen Organismen bewohnte Domatien.
Phytomelane — siehe Kohleschicht (VI/1 399).
Phytomorphose (Zoomorphose) — heissen die durch Pflanzenschmarotzer hervorgerufenen Gestaltveränderungen des Wirtes.
Phytonosen — Erkrankungen, verursacht durch Haut und Schleimhaut reizende Pflanzen (V/1 219; V/3 1721). Siehe Dermatitis und Pollenallergie.
Phytoptosen — Milbenkrankheiten der Pflanzen.
Phytosoziologie (Pflanzensoziologie) — befasst sich mit allen Richtungen des Studiums der Pflanzengesellschaften.
Piezotropismus — = Haptotropismus.
Pigmentverlust — siehe Albinos und Leucospermie.
pílae marínae — siehe Seebälle.
Pilzfäden — siehe Hyphen.
Pilzsymbiose — siehe Mykorrhiza.
Pilzwirtzellen — II 389.
Pilzwurzel — siehe Mykorrhiza.
pínnae (Fiedern) — I/XCVI.
pínnulae (Fiederchen) — I/XCVI.
pinoides Blatt — I/CII.
Pionierrasen — Rasenflecken oberhalb der geschlossenen Rasennarbe im Gebirge.
Pisangstauden (Weichstämme) — die Laubblätter bilden mit ihren gewaltigen Scheiden einen Scheinstamm (Musa).
Pistillodie — Umbildung von Phyllomen (Blattgebilden) jeder Art zu Fruchtblättern.
Pistillodium — V/1 233, 242.

Plänklerrasen — siehe Pionierrasen.
Plaenterwald — siehe Blenderwald.
Plagiogeotropismus (Klino- oder Diageotropismus) — plagiotrope Organe orientieren sich unter einem Winkel zur Schwerkraftrichtung.
plagiotrop — I/LXXIV.
plankonvex — auf der Innenseite flach, auf der Aussenseite gewölbt.
Plankton (Phytoplankton) — Gesellschaft der nicht wurzelnden, frei im Wasser schwebenden Mikroorganismen.
Plasma — = Protoplasma (I/XVII, XLI).
Plasmabewegung — I/XXI.
Plasmodesmen — I/XVIII.
Plasmodien — einfache, auf der Unterlage bewegliche, membranlose Organismen.
Plasmogamie — Verschmelzung von Plasmen ohne Kernverschmelzung.
Plasmolyse — I/XXII.
Plastiden — sind Plasmagebilde, welche Pigmente besitzen oder wenigstens die Fähigkeit haben, solche zu bilden.
plastische Stoffe — siehe Baustoffe.
Plastotypus (Paratypus) — Wirkung der äusseren Einflüsse auf die Pflanze.
Platte (Kronblatt) — I/CXX.
Plattendrehflieger — V 1 82.
Plazenta (Plazentation) — I/CXXIX.
Plazentasprosse — die Ovula bilden sich zu kleinen Sprösschen aus (siehe Oolyse).
Pleiochasium (Scheindolde) — I/CXXXIX.
Pleiomerie — der heteromere Zyklus einer Blüte weist eine erhöhte Gliederzahl auf.
Pleiontismus (zeitlicher Dimorphismus) — gleichzeitige Ausbildung von proterandrischen und proterogynen Individuen bei derselben Art.
Pleiopetalie — Blüten besitzen eine erhöhte Zahl von Blütenblättern.
pleiophag — wirtsvage Schmarotzer.
Pleiophyllie — Auftreten mehrerer Blätter an Stelle eines einzigen.
Pleiotaxie — abnorme Vermehrung der Blattquirle (besonders in den Blüten).
pleioxen — wirtsvage Schmarotzer.
Pleistozaen — = Diluvium (siehe Geologische Formationen).
Plektenchym (Pseudoparenchym, Scheinparenchym) — gewebeartige Verbände bei Pilzen, die aus Hyphen zusammengesetzt sind.
Pleogamie — bezeichnet kompliziertere Formen der Geschlechterverteilung (Dryas, Fragaria, Leontopodium).
pleomorph — verschiedengestaltet.
pleomorphe Blüten — Blüten derselben Pflanze sind verschiedener Art (Chasmo-Kleistogamie, Monoezie).
Pleophyllie — Blattspreiten sind reicher zusammengesetzt als beim Typus (4- und 5-blätterige Kleeblätter).
pleozyklische Pflanzen — blühen nur einmal, jedoch erst nach mehreren Jahren.
Plerom (Pleromzylinder, Füllgewebe) — ist wie das Dermatogen und Periblem ein Urmeristem des Vegetationsscheitels, und zwar der innerste axile Gewebestrang bestehend aus längs verlaufenden Zellen, aus dem die Leitbündel, das Mark und der Perizykel hervorgehen.
Plesiasmie — abnorme Verkürzung (Stauchung) der Stengelinternodien.
Pleuridienbildung — V/4 2260.
pleuroploker Keimling — IV/1 56.
pleurorrhizer Keimling — IV/1 55.
Pleuston — auf der Wasseroberfläche passiv treibende Pflanzen.
pliogene Formen — gehen aus der Kreuzung dreier oder mehrerer Arten hervor.
Pliozaen — siehe Geologische Formationen.
Plumula — Stammknospe, Federchen, gémmula (I/XLVI, LXIV).
plurienne Kräuter — fruchten erst nach mehreren Jahren.
Pluviilignosa — siehe Regengehölze.
Pneumathoden — Gesamtbezeichnung für die offenen Ausführungsgänge des Durchlüftungssystems.
Pneumatokarpie — IV/3 1399, 1404; V/1 261.
Pneumatophoren — Atemwurzeln.
Pocken — durch Milben an Blättern erzeugte bikonvexe, weiche Anschwellungen.
Podsol (Bleicherdeböden) besteht fast nur aus Kieselsäure und Humus und ist sehr arm an anorganischen Nährstoffen (V/3 1618).
Polachena — siehe Polyachaenium.
Polarität — verschiedenartige Ausbildung von Basis und Spitze einer Zelle, eines Gewebes, Organes oder Individuums.
pollakanth — wiederholt blühend und fruchtend.
Pollen (Pollenkörner, Blütenstaub) — I/CXXIV I 73, 142; V/1 87, 590: V/3 1956.

Pollenallergie (Heuschnuppen, Pollinose) — durch den Blütenstaub (bei uns) verschiedener Gräser (besonders Fioringras, englisches und französisches Raygras, Roggen) erzeugte Schleimhautreizung der Nase, Augen, des Rachens und der Bronchen, oft verbunden mit Asthma (siehe auch VI/1 498).

Pollenanalyse — dient zur genauen qualitativen und quantitativen Untersuchung für die ehemalige Zusammensetzung der in der Umgebung der Moore befindlichen Wälder.

Pollenblumen — I/CXLIV; VII, Fig. 1122.

Pollenfach — siehe Pollensack.

Pollenkammer — I/CXLVI.

Pollenmal (Pseudosaftmal) — saftmalähnliche Zeichnungen auf den Kronblättern von Pollenblüten, die dorthin weisen, wo normalerweise Honig zu finden ist.

Pollenmasse (mássulae) — I/CXXV.

Pollenmutterzellen — heissen jene Zellen in den Mikrosporangien (Pollensäcken) der Samenpflanzen, die durch 4-Teilung (Tetradenteilung) die Pollenkörner liefern.

Pollennachreife — = Proterogynie.

Pollensäcke (loculaménta) — I/CXXII, CXXIV; I 72.

Pollenschlauch — I/CXLVI.

Pollentetraden (Vierlingskörner) — I/CXXV; V/3 1702.

pollenvorreif — = proterandrisch.

Pollen-Wasserblüte — siehe Schwefelregen.

Pollinarien — I/CXXV.

Pollination — = Bestäubung.

Pollinatorien — V/4 2475.

Pollinium — II 322, 336 Fig. 420; V/3 2068.

Polsterpflanzen (Polsterwuchs) — I/LXVIII; V/2 928; V/3 1717, 1791; VII, Fig. 1123.

Polsterpflanzengürtel (Dikotylengürtel der Alpen) — zeigt nur noch vereinzelte Individuen von Blütenpflanzen und zwar meist Polsterpflanzen; nach oben schliesst sich der Kryptogamengürtel der Nivalstufe an.

Fig. 1122. Rosa canina L. var. transitoria. Rob. Keller als Beispiel einer „homogamen Pollenblume". Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.

Polyachaenium (Polachena) — heisst die Sammelfrucht (schizocárpium) von Malva.

Polyadelphia — XVIII. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit zahlreichen, zu drei oder mehr Bündeln verwachsenen Staubblättern; I/CXXIII).

Polyandria — XIII. Klasse des Linnéschen Systems (zweigeschlechtige Blüten mit 20 und mehr freien, dem Blütenboden eingefügten Staubblättern.

polyarch (mehrstrahlig) — heisst ein radiales Leitbündel mit vielen Xylemstrahlen (viele Monokotyledonen); siehe I/LXIII Fig. 77.

Polychorie — Früchte und Samen werden auf verschiedene Art und Weise verbreitet (autochor-zoochor, autochor-myrmekochor, anemochor-zoochor, anemochor-hydatochor, zoochor usw.), wobei die Pflanze nur eine (isokarpe Polychorie) oder aber zwei bezw. mehrere Fruchtformen ausbildet (siehe Amphikarpie und Heterokarpie).

Fig. 1123. Mannsschild (Androsace) als Beispiel einer Polsterpflanze.

polyciliate Pteridophyta — Spermatozoiden besitzen mehr als 3 Cilien (Farne, Schachtelhalme, Isoëtes).

Polyembryonie — I/CXLVIII; V/1 63.

Polygamie — I/CXXXII.

polyhybride Bastarde — Nachkommen von Eltern, die in mehreren Merkmalen voneinander abweichen.

polykarpes Gynaezeum — I/LXIX, CXXVII.

polykarpisch (mehrmals blühend) — I/LXIX.

Polykladie — durch Verletzung, z. B. durch Beschneiden, Insektenfrass hervorgerufenes, abnormes Verzweigungssystem (Lebzäune).

polymeres Gynaezeum — I/CXXXVII.

polymorph — vielgestaltig.

polymorphe Früchte — Pflanzen mit mehrgestaltigen Früchten (siehe Heterokarpie).

polymorphe Gewebe — bestehen aus verschiedenartigen Zellen.

polymorphe Spezies — sind Arten bezw. Kollektivarten, die mehrere konstante Lebensformen (Kleinarten, Varietäten) umfassen (V/1 599).

Polymorphismus — siehe Heterophyllie bezw. Dimorphismus der Sprosse.

Polyoezie — gleichzeitiges Vorkommen verschiedener, durch das Geschlecht sich unterscheidender Pflanzen bei derselben Art.

Polypetalae — siehe Choripetalae (III 6).

polyphyletische Abstammung — Herkunft der Formen von mehreren unter sich verschiedenen Ahnentypen.

Polyphyllie — abnorme Vermehrung der Gliederzahl eines Wirtels (IV/3 1276).

Polysaccharide — siehe Kohlenhydrate.

Polyspermie — liegt vor, wenn mehr als eine männliche Zelle mit der weiblichen verschmelzen.

Polystelie — Spross besitzt mehrere Stele (siehe dort!), von denen jede ihre eigene Endodermis und ihren eigenen Perizykel besitzt.

polystemones Androezeum — Blüten mit mehr als 2 Staubblattquirlen (z. B. Lauraceae) (I/CXXVI).

Polysymmetrie — siehe radiäre Ausbildung.

polysymmetrische Blüten — lassen sich senkrecht durch mehrere Symmetrieebenen teilen.

Polytomie — siehe gabelige Verzweigung.

polytope Entstehung — liegt vor, wenn eine Pflanze auf dem Wege der Bastardierung oder Mutation aus der gleichen Stammform an ganz getrennten Orten unabhängig von einander entstanden ist.

polytrophe (polyvore, polyphage) **Organismen** — leben auf sehr verschiedenartigen Substraten.

pontische Hügelformation — Hart- oder Steppenwiesen milderer warmer Lagen.

pontische Pflanzen — haben ihre Hauptverbreitung vom ungarischen Tiefland an in den Ebenen und Steppen Südosteuropas und Westasiens.

Porenkapsel — I/CLI; VII Fig. 1016.

Porogamie — I/CXLVI.

postflorale Aenderung der Blütenfarbe — verschiedene Pflanzen ändern in der Postfloralzeit ihre ursprüngliche Blütenfarbe (Pulmonaria, Trifolium sect. Chromosemium).

Postfloration — Verhalten der Blüte (insbesondere der Blütenhüllen) nach Abschluss des Blühens.

Postflorationsbewegung — IV/3 1658, 1728; V/1 562.

Postglazial (Postwürmzeit, Nacheiszeit) — heisst die auf die Eiszeit folgende Periode, die im Alpengebiet in die Achenschwankung, in das Bühl-, Gschnitz- und Daunstadium gegliedert wird. Auf diese folgt das Palaeo- (siehe dort), Meso- und Neolithicum, dann die Bronze- und Eisenzeit. In Norddeutschland werden zufolge Hebung und Senkung der Ostsee Yoldia-, Ancylus-, Litorina- und Myazeit (siehe dort) unterschieden.



Fig. 1124. *a* Keimpflanze. *b* Junge Pflanze mit Primärblättern vom Schellkraut (Chelidonium maius L.).

postglaziale Wärmeperiode — umfasst den borealen, atlantischen und subborealen Zeitabschnitt (diese war 1—2½% wärmer als heute) der Nacheiszeit.

postkarpotropische Bewegungen — siehe Karpotropismus.

potamophil — im fliessenden Wasser lebend.

Potamoplankton — Plankton der Flüsse.

potentiell-polychrome Blüten — besitzen der Anlage nach eine grosse Amplitude in der Ausbildung verschiedener Blütenfarben (Salvia pratensis, Aiuga reptans, Aconitum Napellus).

praealpine Arten — bewohnen in der Hauptsache einen den Alpen vorgelagerten Gürtel (IV/1 330, 338; VI/1 426).

Praeanthese — Kronblätter stellen bei ungenügender Beleuchtung (schlechtem Wetter) ihr Wachstum frühzeitig ein, während der Stengel weiterwächst und die Narbe weit über die kleinen Kronblättchen emporhebt.

praeflorale Nutationen — V/2 1179.

Praefloration — siehe Knospendeckung (aestivátio, I/CXXXV).

Praefoliation — siehe Knospenlage (vernátio).

praehistorisch — der vorgeschichtlichen Zeit angehörend.

Präsentationszeit — Minimum der Reizdauer, das eben noch eine mit freiem Auge erkennbare Reaktionsbewegung bedingt.

praesentiertellerförmig — Krone mit flachem Saum auf einer bedeutend engeren Röhre sitzend.

Praezipitate — sind spezifische Niederschläge, welche beim Zusammenbringen eines Antiserums mit seinem homologen gelösten Antigen auftreten.

Primärblätter (Uebergangsblätter, V/2 1160; VII Fig. 1124) — heissen die unmittelbar auf die Keimblätter folgenden Laubblätter, die oft einfacher gestaltet sind als die obern Blätter (Esche).
primär-dikline Blüten — heissen solche dioezische Blüten, die sich nicht von Zwitterblüten ableiten lassen.
primäre Meristeme — sind Bildungsgewebe, die aus dem einheitlichen Urmeristem hervorgehen (Protoderm, Procambium, Grundmeristem).
primärer Endospermkern — I/CXLVII.
primäre Rinde — I/XXXV, LXXXV, XCI; V/1 347.
primäres Hautgewebe — siehe Epidermis.
Primeldermatitis — V/3 1721.
Primordialblätter — I/XCII.
Primordialgefässe — Gesamtbezeichnung für alle (zeitlich) zuerst gebildeten Gefässe (Vasalprimanen, Protoxylem, Protohadrom).
Primordialzellen — I/XVII.
Proanthesis — vorzeitige, im Herbst erfolgende Entfaltung der Blütenknospen.
proanthrop — vor dem Auftreten des Menschen vorhanden (IV/1 198).
proembryonale Generation — I 72; siehe Generationswechsel.
Profichi — siehe Kaprifikation (III 126).
Profilstellung — I/CIII; II 284; V/2 784, 1097 (siehe auch Kompasspflanzen).
Prokambium — I/XL.
Prokambiumstränge — I/XLIV.
Prokaulom — V/3 1571.
Prolepsis — vorzeitige Entfaltung eines Organes (siehe Johannistrieb) (IV/3 1161; V/1 298).
proleptische Verschiebung — IV/2 917.
prolificátio intérna — V/4 2599.
Prolifikation — zentrale oder seitliche Durchwachsung von Blüten, Blütenständen oder Früchten (vgl. Diaphyse, Ekblastesis). Siehe I/CXVII; IV/2 985 Fig. 1210; V/2 682, 685; V/3 1732; VII Fig. 1125.
Propagation — = Verbreitung.
Propagation, vegetative — Vermehrung durch Ausläufer, Brutknospen, Nuzellarembryonen usw.
Prophylaxis — Vorbeugung bezw. vorsorgliche Massnahmen bei Krankheiten.
prophylloide Blütenhülle — Perianth ist hochblattartig ausgebildet.
Prophyllum — siehe Vorblatt.
Prosenchymgewebe — I/XXXII.
Proteasen — sind eiweissabbauende (proteolytische) Fermente (z. B. Pepsin, Trypsin, Papayacin, Urease).
Proteïnkörner (Eiweiss) — I/XXII.
Proteïnkristalle — Kristalle von Eiweisskörpern (siehe auch Kristalloide).
proteolytische Enzyme — bedingen den primären Abbau der Eiweisskörper unter Wasseraufnahme.
Proterandrie (Pollenvorreife) — I/CXLI.
Proterogynie — I/CXLI.
proterogynisch-homogame Blüten — sind nur beim Beginn des Blühens proterogyn, sonst aber homogam.
proteropetales Androezeum — obdiplostemone Blüten, bei denen der epipetale Staminalkreis der äussere ist.
Prothallium (Vorkeim) — I 1 (Taf. 1), 3, 42, 43, 52, 69.
Protisten — Urwesen, die den allerersten auf der Erde entstandenen Organismen nahestehen.
Protoderm — siehe Dermatogen.
protogene Gerbstoffbehälter — werden im Gegensatz zu den hysterogenen bereits im Urmeristem angelegt.
Protokorm — II 323; IV/2 499.
Protonema (Vorkeim) — I 2.
Protophloëm — I/XLV.
Protoplasma — I/XVII, XLI.
Protoplasmastränge — V/1 565.
Protoplast — Bezeichnung des gesamten Plasmakörpers mit all seinen Einschlüssen (I/XVII).
Protoxylem — I/XLV.
Provenienz-Unkräuter — IV/3 1339.
Proventivknospen (Ruheknospen) — VI/1 248.
psammogene Gesteine — zerfallen in Grus und Sand.



Fig. 1125. Allium Cepa L. f. proliferum (Moench) Regel. Blütenstand mit austreibenden Zwiebeln.

Psammophyten (Sandpflanzen) — V/2 872, 980; VII Fig. 1126.
pseudannuelle Pflanzen — sind mehrjährige Arten, deren Sprosse eeine nur einjährige Lebensdauer haben
Pseudanthien — V/1 114.
Pseudapetalie — in den Blüten sind die Petala durch Staubblätter ersetzt.
Pseudaxis (Scheinachse) — siehe Sympodium.
pseudephemere Blüten — öffnen sich nur einmal, schliessen sich aber nicht am Tage des Oeffnens.
Pseudobulben — siehe Luftwurzeln.
Pseudocecidien — werden gallenähnliche Gebilde genannt, welche lediglich durch Hemmung zufolge Wachstumsvorgängen zustande kommen.
pseudodichotome Verzweigung — V/2 1096.
Pseudogamie — Verschmelzung zweier vegetativer Kerne (IV/2 804).
Pseudogeokarpie — Fall der Geokarpie, bei dem die Bergung durch Verkürzung des Blütenstieles bezw. des Fruchtstandes erfolgt (Cyclamen [V/3 1841], Plantago Cretica).
Pseudokleistogamie (V/4 2454) — Blüten werden unter normalen Verhältnissen durch äussere Einwirkungen (besonders durch Unterbelichtung) zum völligen Schliessen ihrer Kronen veranlasst (siehe Kleistogamie: I/CXLII).
Pseudomixis — Ersatz der eigentlichen Keimzellverschmelzung durch einen pseudosexuellen Kopulationsprozess zweier nicht als spezifische Sexualzellen differenzierter Zellen.



Fig. 1126. Corispermum canescens Kit. (III, 254), als Beispiel eines Psammophyten (Sandpflanze), bei Oftersheim (Baden). Phot. Alfr. Löwenberg u. Dr. Fr. Zimmermann.

pseudomonokotyler Keimling — der Embryo verschiedener Dikotyledonen besitzt nur ein deutlich wahrnehmbares Keimblatt (V/2 1194; V/3 1715; VII 1052).
Pseudoparenchym — siehe Plektenchym.
pseudopelorische Blüten — normal zygomorphe und monosymmetrische Blüten werden durch Verwachsung, Abort oder Umwandlung einzelner Phyllome nicht wirklich aktinomorph, aber wenigstens disymmetrisch.
Pseudopodien — I/XVII.
Pseudosaftmal — siehe Pollenmal.
Pseudostipellen — Blätter tragen am Grunde gelegentlich nebenblattartige Gebilde, die neben rudimentären Stipeln vorhanden sein können (IV/3 1120, 1617).
Pseudostrophiole — V/3 2123, 2160; V/4 2262.
Pseudosymbiose — findet sich bei Mischgärungen, d. h. bei Gärungsprozessen an denen sich gleichzeitig oder nacheinander mehrere spezifische Gärungserreger beteiligen.
Pseudoviviparie — in der Blütenregion gelangen neben den Blüten mit Laubblättern besetzte, bewurzelungsfähige Sprosse zur Ausbildung, die aber nicht von den Mutterpflanzen abfallen (Juncus ranarius).
Pseudoxe[illegible]yt — IV/3 1185.
Psychophi[illegible] — Tagfalterblumen.
psychrophil — heissen an niedrige Temperaturen angepasste Mikroorganismen.
Psychrophyten — Pflanzengesellschaften auf kaltem Boden.
Pterodium — geflügelte Schliessfrucht (Ulmus, Fraxinus).
Ptomaïne — sind giftige Körper, die bei der Zersetzung von Eiweisstoffen (bei beginnender Fäulnis) gebildet werden.
Pufferung des Bodens — heisst die Eigenschaft des zähen Festhaltens der Eigenreaktion (als Pufferstoffe wirken im Boden schwache Säuren, Salze schwacher Säuren mit starken Basen, amphotere Elektrolyte, austauschfähiger Ton und Humus, kolloides Eisen- und Aluminiumhydroxyd).
Pulpa — Bezeichnung für die saftigen Teile einer Frucht (I/CLI; V/1 55; V/2 762).
Putamen — = Steinkern, Stein (I/CLI).

putate Formen — durch Köpfen der oder des Hauptstengels (z. B. durch die Sense) werden die sonst meist nichtblühenden, unteren Zweige zur Entwicklung veranlasst (VI/2 1192).
Pyramidenbäume — gehören dem panphotometrischen Typus an (Pyramidenpappel, Cypresse).
Pyrenarium (Nukulanium) — eine aus mehreren verwachsenen Karpellen gebildete Steinfrucht mit ein bis mehreren Steinkernen.
Pyrene(n) — V/2 911.
Pyrenoïde — I/XXIII.
Pyroxylin — griechischer Name für die Schießbaumwolle (V/1 462).
Pyxidium — Deckelkapsel (I/CLI).

Q.

Quadrupelhybride (vierelterliche Bastarde) — an der Bildung des Bastardes nehmen vier, ursprünglich reine Arten, teil.
Quartär — siehe Geologische Formationen.
Quellfluren — lockere Bestände feuchtigkeitsliebender Gewächse am Rande von Bächen und Quellen.
Quellschicht — siehe Schleimgewebe.
Quellung — Volumenvergrösserung einer Substanz infolge Flüssigkeitseinlagerung (z. B. Gelatine + Wasser).
Quellungsdruck — Druck, der durch die Quellung entsteht (siehe Quellung).
Quetschschleuderer — das Ausschleudern der Samen erfolgt durch Quetschung geschwellter (lebender) Fruchtteile (Oxalis Acetosella).
quinkunziale Aestivation — I/CXXXV.
Quirle, heteromere — siehe heteromere Blüten.
quirlig, quirlständig (wirtelig) — drei oder mehr Organe (Blätter, Blüten, Sprosse) entspringen auf gleicher Höhe (siehe Scheinquirl).

R.

racemöse Blütenstände — I/CXXXVII; VII Fig. 1127.
racémus — siehe Traube (Blütenstand).
Rachenblüte — siehe Lippenblüte.
radförmige Krone — I/CXX.
radiäres Leitbündel — I/XLIII.
radiäre (multilaterale, polysymmetrische) **Ausbildung** — die Organe sind rings um die Längsachse nach allen Radien des Querschnittes annähernd gleichartig angeordnet.

Fig. 1127. Traubiger (racemöser) Blütenstand von Samolus Valerandi L. (V/3, 1875).

radiales (radiäres) **Leitbündel** — I/XLIII.
Radialpolster — Polster mit von einem Punkt kugelradienförmig ausstrahlenden Trieben (V/3 1717).
Radicula — Wurzelanlage beim Keimling.
rádix (Wurzel) — I/LI.
Raffinose — siehe Trisaccharide.
Rahmen — siehe réplum.
Rahmenhülse (craspédium) — IV/3 1121.
Ramifikation — = Verzweigung.
Randblüten — I/CXXXVIII.
Ranke (círrhus) — meist fadenförmig verlängerte, kontaktreizbare, ausschliesslich dem Klettern dienende Organe (Stamm-, Blatt- und Wurzelranken) (I/LXXV, CVII).
Rankenpflanzen — sind Lianen mit reizempfindlichen Kletterorganen (I/LXXV, CVII; VI/1 3[illegible]).
Rankensprosse — VI/1 164.
Raphe der Samenanlage — I/CXXXI.
Raphiden (Kristallnadeln) — I/XXII.
rasenbildende Bestockung (Rasenbildner) — zahlreiche, ± dichtgedrängte, meist umscheidete (intravaginale) Triebe mit grundständigen, schmalen Blättern bilden einen flachen oder ± kugeligen Horst (VII Fig. 1128).
Rasensträucher — in der Erde gewurzelte Holzpflanzen, deren Zweigspitzen, über die Erde vorragend, einen dichten Rasen bilden.
Rasenubiquist — in allen Wiesentypen vorkommend.
Rasse (Sorte) — Bezeichnung für eine erblich konstante oder nahezu konstante Abweichung vom Arttypus (siehe auch Saisondimorphismus und Subspecies).

Receptaculum (Blütenboden, Torus) — I/CXVII; I 5; IV/2 981; VII Fig. 1129.
recessiv — I/CXLIII.
Rechtswinder — I/LXXV; VII Fig. 1114.
Reconcauleszenz — V/4 2549.
redivive (renaszente) **Stauden** — die Laub- und Blütensprosse treten nur während eines Teiles im Jahre über die Oberfläche (eine Ruhezeit ist eingeschaltet); die unterirdischen Organe dienen als Stoffspeicher.



Fig. 1128. Carex canescens L. (II, 75) mit rasenbildender Bestockung und umscheideten Trieben. Phot. Apotheker Engelbert Meisner, München.

Reduktionsteilung — Entwicklungsvorgang, durch welchen aus Zellen mit diploïdem Kern solche mit haploïdem Kern hervorgehen (Chromosomenreduktion).
reduplikate (reduplikatvalvate) **Aestivation** — heisst jene klappige Aestivation, bei der die Ränder nach aussen geschlagen sind.
reduzierte Leitbündel — finden sich bei vielen submersen Wasserpflanzen als axiler Leitungsstrang (s. I/LXIII Fig. 78) und bei Saprophyten.
regelmässige Blüten — siehe aktinomorphe Blüten.
Regeneration — Erneuerung von verlorengegangenen Geweben oder Organen.
Regenfrüchte (Hygrochasie) — Kapselfrüchte, die zur Trockenzeit geschlossen sind, sich aber bei Regen bezw. bei feuchtem Wetter weit öffnen, so dass die Samen herausgespült werden können (Veronica-Arten, Sedum acre, Telephium, Odontospermum, Anastatica, Mesembrianthemum, viele Zygophyllaceen).
Regengehölze (Pluviilignosa) — hierher gehören die tropischen und subtropischen Wälder und Gebüsche, die ein grosses Bedürfnis nach gleichmässiger Feuchtigkeit und Temperatur besitzen.
Region — horizontale Gliederung der Vegetation (siehe Stufen).
Regma — Bezeichnung für das Schizokarpium von Erodium und Geranium.
Reif (Wachsüberzug) — durch Wachsausscheidung bedingter, grauweisser oder bläulicher, abwischbarer Ueberzug.
Reife — I/XXVII.
Reihe — systematischer Begriff (meist mit Endung „áles"), der sich weiter in Klassen und Ordnungen usw. gliedert.
reine Linien — Individuen mit gleichen Erbanlagen.
Reinigung (akropetaler Asttod) — nennt man das Absterben der unteren Zweige bei Bäumen.



Fig. 1129. Comarum palustre L. *a* Reife Scheinfrucht mit Kelch und Aussenkelchblättern. *b* diese geöffnet. *c* Fruchtboden mit Nüsschen. *d* Längsschnitt durch die Blüte von Fragaria vesca L.

Reinkultur (Reinzucht) — lebende Anzuchten von Mikroorganismen auf keimfreien Substraten (Nährböden).
reitende Laubblätter — II 189, 283; VII Fig. 1130.
Reiz — ausserhalb des Organismus liegender Faktor, der bestimmte Reaktionsbewegungen auslöst, z. B. Licht, Schwerkraft, Wärme, chemische und mechanische Einwirkungen.
reizbare Narben — führen bei Berührung (Kontaktreiz) Bewegungen aus (Mimulus [VI/1 36], Rehmannia, Bignoniaceae und Lentibulariaceae).
reizbare Staubblätter — V/1 565.

Reizerscheinungen — die durch den Reiz veranlassten Veränderungen des Organismus.
Reizleitung — Fortpflanzung der Reizerregung vom Empfindungsort zum Ort der Reaktionsbewegung (IV/3 1121).
Reizschwelle — die zum Zustandekommen der Reaktionsbewegung eben nötige Reizmenge.
Rekauleszenz — Emporheben des Tragblattes durch das Achselprodukt (V/4 2549).
relative Transpiration (Transpirationskraft) — darunter versteht man das Verhältnis zwischen der von der Pflanze verdunsteten Wassermenge und derjenigen einer freien Wasseroberfläche (Evaporation).
Relikt (im pflanzengeographischen Sinne) — nennt man in einem bestimmten Gebiet eine Pflanze, die dort nachweisbar oder vermutlich den Rest eines früher grösseren Areals darstellt. Klimatische, geomorphologische und Formations-Relikte werden unterschieden.
Relikt-Endemismus — siehe Endemismus, konservativer (IV/1 146).
remontieren — IV/2 981.
reparative Wurzelsprosse — erscheinen bei etwaiger Beschädigung der Wurzel.
réplum (Rahmen) — I/CL.
Reproduktionsorgane — ermöglichen das Entstehen neuer Individuen.
reproduktiver Spross — I/CXVI.
Resenharze (Resenretine) — enthalten ein oder mehrere Resene als bezeichnende Bestandteile (Burseraceenharze, Mastix usw.).
Reservestärke — I/XX.
Reservestoffbehälter — I/LVIII.
Reservestoffe — I/XXXV.
Resinolsäureharze — enthalten eine oder mehrere Harzsäuren (Coniferenharze, Colophonium).
Resinosis — siehe Harzfluss.
Respiration — siehe Atmung.
Resupination — I/CXXXV; II 321; IV/3 1162; V/1 312.
Retine — siehe Harze.
Retinospora-Form — heisst die erblich fixierte Jugendform von Thuja-, Biota- und Chamaecyparis-Arten; sie läßt sich durch Stecklinge vermehren (VII Fig 1131).
Reusenhaare — III 164; VII/3 2061.
reversible Paravariante (doppelte Anpassung) — erworbene Abänderungen (z. B. induzierter Nanismus) können durch Aenderung der Bedingungen wieder rückgängig gemacht werden.
Revolverblüten — innerhalb der allgemeinen Blumenpforte sind die Mündungen von engen Röhren zu sehen (V/3 2011).
rezent — als Zeitbegriff Gegensatz zu fossil, also der gegenwärtigen geologischen Periode entstammend.



Fig. 1130. *a* Liliensimse (Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. mit „reitenden" Laubblättern und abnorm gestielten Blüten (Iusus ramosa Hoppe). *b* Blüte. Vgl. II, 190.

rezente Organismen — umfassen die heute lebenden oder in historischer Zeit ausgestorbenen Pflanzen und Tiere.
rezessive Eigenschaften — Eigenschaften, die beim Zusammentreffen mit entsprechenden „dominanten" Anlagen bei der Bastardierung an der Entfaltung gehindert werden.
reziproke Kreuzung — V/2 853.
Rhachis — Hauptachse eines Blütenstandes oder eines Fiederblattes.
Rhät — siehe Geologische Formationen.
rhezigene Gänge — I/XXXIV.
rhipídium — siehe Fächel (I/CXL).
Rhizodermis — siehe Wurzelhaut.
rhizogen — wurzelentsprossen, wurzelbürtig.
Rhizogenschicht — = Pericambium.
Rhizoiden — I/LIV; III 449; VI/1 164.
Rhizolithen bezw. **Rhizolithophyten** — siehe Felswurzler.
Rhizom (Grundachse, Wurzelstock) — I/LII, LXXIX; II 262: V/3 1963; VII Fig. 1057, 1097, 1132, 1151 b.
Rhizomanie — reichliche Entwicklung von Adventivwurzeln (V/4 2520).

Rhizomgeophyten — halten ihre (meist) sympodialen Ausläufer und die Erneuerungsknospen in bestimmter Tiefe unter der Erdoberfläche. Sie haben die Fähigkeit unterirdisch zu wandern und bevorzugen lockere Humus-, Sand- und Schlammböden (IV/3 1575).

Rhizomknollen — IV/3 1625; V/4 2256; VII Fig. 1133.

Rhizomschuppen — I/CXIII.

Rhizomstaude — siehe Rhizomgeophyt.

Riefen (carínae) — I 51.

rigid — I 284.

Rillen — siehe valléculae.

Rinde — I/LXXXVI, XCI; V/2 344, 347.

Rindenporen — I/XXXI.

Rindenstrahlen — I/XCI.

Rindenwurzeln — I/LIX; III 148.

Ring der Equiseten-Sporangienstände — I 52.

Ring (ánnulus) **der Sporangien** — I 5.

Ringelborke — I/XXXI.

Ringelfrucht — VI/2 800.

Ringgefäss — I/XXIV, XLIII.

Ringkronige — = Sympetalae.

ringporiges Holz — I/LXXXVIII.

Rippen (cóstae) — I/XCVII; I 51.

Rispe (pánicula) — I/CXXXVIII; siehe auch Doldenrispe.

Riss-Eiszeit — dritte (grösste) Eiszeit.

rissige Borke — reisst in der Längsrichtung (Eiche, Pappel).

Fig. 1131. „Retinospora" von Thuja. Die Erstlingsblätter (Jugendform) sind nadelförmig; die späteren schuppenförmig (zugleich Beispiel von Heterophyllie).

Röhrenblatt (Rundblatt) — aufrechte, hohle Blätter ohne deutliche Mittelrippe mit ziemlich gleichmässigem radiärem Bau (II 146, 214).

Röhrenblüten — I/CXXXVIII; VI/2 395.

Rohhumus — ist eine durch Pilzhyphen, Mycelfäden und durch das Wurzelgeflecht höherer Pflanzen (besonders Zwergsträucher) verfilzte, von der mineralischen Feinerde deutlich abgegrenzte, in Vermoderung begriffene, sauer reagierende, torfartige Humusschicht.

Rohrsümpfe (Süsswasserverlandungsbestände) — bestehen aus hohen Sumpfpflanzen, die weit ins Wasser hinausgehen (Schilf, Teichbinse) und die Verlandung einleiten können, andererseits aber auch landeinwärts in die Wasserwiesen übergehen (I 274; V/2 909).

Rohrzucker (Rübenzucker, Saccharose) — ist ein Disaccharid und aus Fruktose und Glukose zusammengesetzt (I 186; III 217; IV/2 897, 1095; IV/3 1132; V/1 264, 269.

Rollblatt — I/CII; V/1 564; V/3 1614; V/4 2519.

Rosanoff'sche Drüsen — Kristallbehälter, deren Kristall an Cellulosebalken im Lumen der Zelle aufgehängt erscheint.

Rosenäpfel — siehe Schlafäpfel (VII Fig. 1140).

Rosettenchamaephyten — IV/2 512; VII, Fig. 1134.

Rosettenpflanzen (hemikryptophýta rosuláta) — meist niedrige Kräuter mit rosettig angeordneten Grundblättern und blattlosem Stengel (Schaft), der den Blütenstand trägt (I/LXVII).

Fig. 1132. Convallaria majalis L. Blühende Pflanze (II, 274). (Rhizomstaude.)



Fig. 1133. Rhizomknollen von Equisetum (siehe Bd. I, 51).

Rostellum (Schnäbelchen) — II 322.

Rostpilze — IV/1 8; VII 142.

Roterdeböden (terra rossa) — heissen nicht ausgelaugte, meist feinsandige, humusarme, durch Abscheidung von Eisenoxyd in der Regel ziegelrotgefärbte Böden; im Mittelmeergebiet (auch Karst) verbreitet.

Rotliegendes — siehe Geologische Formationen.

Ruderalpflanzen — bedürfen grösserer Mengen von Ammoniak, Nitraten, zuweilen auch Chlornatrium; deshalb sind sie Besiedler von Oedland, Schutt- und Abfallplätzen, Wegrändern, Garten- und Ackerland. Sie wechseln gern ihren Standort (V/4 2575).

rudimentäre (reduzierte) **Organe** — heissen zurückgebildete, unvollkommene, ganz oder nahezu funktionslose Gebilde.

Rüben — I/LVIII, LXIII.

Rückennaht (sutúra dorsális) — heisst bei Früchten die der Bauchnaht gegenüberliegende, vom Mittelnerv durchzogene Naht.

rückenwurzeliger Keim — IV/1 55.

Rückkreuzung — Bastardierung der Tochtergeneration (F_1-Generation) mit einem der beiden Eltern.

Rückschlag — siehe Atavismus (IV/3 1162; V/1 683).

Ruheknospen — VI/1 248.

ruhende Knospen — siehe schlafende Augen.

Ruhschutt — siehe Grobschutt.

ruminates (zerklüftetes) **Endosperm** — I/XLIX Fig. 49, CLV Fig. 296c; IV/1 15.

Rundblatt — siehe Röhrenblatt.

Runzelblätter — xerophile Blätter, die zum Schutze gegen zu starke Transpiration mit starken Runzeln und Vertiefungen versehen sind.

Russtau — schwarzer, lockerer, russartiger Ueberzug auf Pflanzenteilen (besonders auf Blättern), der durch Pilze (Perisporiaceen; VII 140) hervorgerufen wird.

rutenförmige Aeste — I/LXXXV.

Rutengewächse — Xerophyten, bei denen die Transpiration durch Reduktion oder frühzeitiges Abwerfen des Laubes eingeschränkt und die Assimilation durch die grünen Sprosse besorgt wird [Ephedra VII Fig. 1135]; Spartium [VII Fig. 1226], Casuarina usw.).

Fig. 1134. Saxifraga Cotyledon L. mit grundständigen Rosetten.

S.

saccharophylle Blätter — siehe Zuckerblätter.

sacéllus — siehe Schlauchkapsel.

Sägeblätter — rauhe, harte und verkieselte, oft schneidende Blätter mit scharfen Zähnen oder Widerhaken (II Fig. 173b, c). Wohl zum Schutz gegen Tierfrass.

Säuregärung — durch Bakterien werden Kohlenhydrate und Alkohole in Säuren umgewandelt. Ferner können hierbei vorhandene organische Säuren in andere übergehen.

Säuren, organische (Pflanzensäuren) — Organische, saure Verbindungen mit der charakteristischen Carboxylgruppe (—COOH), die teils frei als solche, teils an Alkalien oder Pflanzenbasen gebunden, teils verestert (z. B. Fettsäureglyzerinester) vorkommen. Am verbreitetsten sind: Oxalsäure [$(COOH)_2$], Apfelsäure (Oxybernsteinsäure, $C_4H_6O_5$), Weinsäure (Dioxybernsteinsäure, $C_4H_6O_6$), Zitronensäure (eine dreibasische Oxysäure, $C_6H_8O_7$), Palmitin- und Stearinsäure (höhere Fettsäuren), Oelsäure (ungesättigte, höhere Fettsäure), Gallussäure (eine aromatische Trioxysäure). Seltener kommen vor: Salicylsäure (Oxybenzoësäure, $C_6H_4(OH)COOH$), Benzoësäure (C_6H_5COOH), Zimtsäure (eine ungesättigte, aromatische Säure), Mandelsäure (Phenyloxyessigsäure), Ameisensäure (HCOOH), Isovaleriansäure (C_4H_9COOH), Bernsteinsäure [$(CH_2COOH)_2$], Malonsäure [$CH_2(COOH)_2$] usw.

Saft- oder Galläpfelchen — V/3 1619 (siehe auch Gallen).

Saftdecke — V/4 2260.

Saftdrüsen — = Nektarien.

Safthalter — heisst derjenige Teil der Saftblüten, der den von den Honigdrüsen abgesonderten Saft empfängt und aufbewahrt.

Saftmale (Wegmarkierung) — Flecken und Zeichnungen der Blütenhüll- bezw. Kronblätter, die sich am Eingange oder auf dem Wege zum Honig befinden (IV/3 1652; V/3 2107). Siehe auch Nektarien.

Saftmaschinen — III 474.

Saftpflanzen — siehe Succulenten.

Safträume — siehe Vakuolen (I/XXI).

Saftventile — treten als Spaltöffnungen in der Epidermis mancher Blütennektarien auf und dienen der Nektarsekretion.

Saison-Dimorphismus — V/2 811; V/3 1983; VI/1 83, 84, 341.

Saison-Diphylismus — siehe Saison-Dimorphismus.

Salatblätter — III 446.

Salicornia-Zone — bildet am Meeresstrand in reinen, aber sehr offenen Beständen die äusserste Zone der eigentlichen halophilen Landvegetation (III 256).

salicornoider Spross — ist stielrund, fleischig, langgliederig, blattlos oder mit Schuppenblättern besetzt (siehe Chenopodiaceae).

Salpeterbakterien — umfassen die Nitrit- und Nitratbakterien (siehe Nitrifikation). Beide vermögen Kohlensäure ohne Licht und Chlorophyll zu assimilieren. Gewinnung der nötigen Energie durch Oxydation der Stickstoffverbindungen.

Salpeterpflanzen — siehe düngerliebende Arten.

Salzdrüsen — V/1 545.

Salzparasiten — III 148.

Salzpflanzen (Halophyten) — I/LXXIX; III 210.

Salzwiesen — sind Sumpfwiesen auf salzhaltigem Boden (siehe Marschwiesen).

samára (Flügelfrucht) — I/CLIII.

Samen (Saat, sémen spérma) — I/XLV, CXLVIII; V/2 870; V/3 1601, 1962; VI/1 134.

Samen — im Handel oder im täglichen Leben ist in vielen Fällen nur eine Bezeichnung für Nussfrüchte (Gras-, Hanf-, Birkensamen) bezw. für Fruchtstände (Runkelrübensamen), für Knollen (Kartoffelsamen) usw.

Samenanlagen, Eichen (óvula) — I/CXXVII, CXXIX; V/3 1690.

samenbeständig — nennt man eine systematische Einheit, wenn sie sich aus allen ihren durch reine Befruchtung entstandenen Samen wiederholt.

Samendeckel — ist ein Teil der Samenschale, welcher bei der Keimung gewisser Samen abgehoben wird.

Sameneiweiss — I/XLVIII.

Samenfäden — siehe Spermatozoiden.

Samenhaut (Samenschale, tésta) — I/XLIX; IV/3 1496; V/2 870; V/3 1673.

Samenhülle (-mantel) — I 75; III 443.

Samenjahre — III 100.

Samenknospen — I/CXXVII, CXXIX.

Samenlappen — = Kotyledonen.

Samenleiste — = Plazenta.

samenlose (taube, kernlose) **Früchte** — kommen ohne Befruchtung der Eizelle auf rein vegetativem Wege zustande, so besonders bei verschiedenen Kulturpflanzen (Korinthen, Walnus, Banane, Ananas, Feige, Diopyros Kaki, Carica Papaya usw.), wohl infolge langdauernder Kultivierung, zuweilen durch nachweisbare äussere Reize, oft in Verbindung mit ungeschlechtlicher Vermehrung (s. Parthenocarpie).

Fig. 1135. Ephedra distachya L. subsp. Helvetica C. A. Mey., Walliser-Meerträubchen (I, 76). „Rutenstrauch". Phot. Prof. Dr. Ernst Wettstein, Zürich.

Samenmantel (aríllus) — I/CLV; I 81; III 443.

Samenmund (cicatrícula) — entspricht am Samen der Mikropyle; unter ihr befindet sich stets die Wurzelspitze des Keimes. Oefters wird auch die Mikropyle (Keimmund) als Samenmund bezeichnet.

Samenschale (tésta) — I/XLV.

Samenschwiele (strophíola, spermotýlium) — IV/3 1139; V/1 593.

Samenstände (spermatocárpia) — die Früchte, denen Fruchtblätter fehlen, gehen nicht aus Blüten hervor und sind von Deckblättern völlig eingeschlossen. Samen oder Samenstände vieler Nadelhölzer.

Samenstiel — siehe funículus.

Samenträger — V/2 1147 (siehe auch Plazenta).

Samenüberwinterer — siehe Keimlingserneuerer.

Samenverbreitung durch Wasser — I/CLVI; IV/3 1587.

Samenwolle — siehe Haare (Trichome) und V/1 460, 461.

Samenzelle — = männliche Geschlechtszelle.

Sammelart — siehe Kollektivart.

Sammelfrucht — I/CXLVIII; III 231 (siehe Syncarpium, Coenocarpium).

Sammellinsen — erscheinen als papillöse Vorwölbungen der Epidermiszellen bei photometrischen Blättern; sie sind befähigt, die auffallenden Lichtstrahlen zu konzentrieren.

Sammelspringfrucht (syncárpium dehíscens) — wird aus mehreren, ± verwachsenen Fruchtblättern gebildet.

Sammelsteinfrucht — siehe Pyrenarium.

Sammetblätter — sind durch stark papillös bis kegelförmig vorgewölbte Oberhautzellen gekennzeichnet.

Sand — Boden ist aus losen Körnern von 2 mm Grösse bis zu 0,25 mm gebildet (Grobsand 2 bis 0,5 mm, Feinsand unter 0,5 mm Grösse).

sandbindende Pflanzen — I/LV; V/1 237, 387, 402.

sandblütige Pflanzen — III 404.

Sandmarsch — hat als Grundlage eine sandige Ebene und unterliegt den störenden Einflüssen des bewegten Meeres (siehe Schlickmarsch).

Sandsteine — Gesteine aus verkitteten, kleineren, nicht über erbsengrossen Gesteins- und Mineralbruchstücken gebildet. Hauptbestandteil ist oft Quarz. Tonige (viele Buntsandsteine), mergelige (liefern tiefgründige fruchtbare Böden), kalkige, kieselige und eisenschüssige Sandsteine werden unterschieden.

Sanduhrzellen — IV/3 1139.

Saponine (III 345; IV/2 663; V/1 90; V/3 1753, 1847) — sind Glykoside mit bestimmten chemischen, physikalischen (schäumende Wirkung) und physiologischen Eigenschaften (Giftigkeit, haemolytische Wirkung usw.) und die homologe Reihen darstellen ($C_n H_{2n-10} O_{18}$ oder $C_n H_{2n-8} O_{10}$).

Sapromyiophilae — = Aasfliegen- oder Ekelblumen.

Sapropel — Faulschlamm (siehe Mudde).

Saprophyten (Fäulnisbewohner) — II 389; V/3 1595; VII Fig. 1136.

Fig. 1136. Monotropa Hypopitys L. (V/3, 1595). Chlorophylloser, humusbewohnender Saprophyt.

Saproplankton — Mikroplankton in organogen verunreinigtem Wasser.

Sarkokarp — = Mesokarp, das fleischig oder saftig ausgebildet ist.

Sarkotesta — V/1 660.

sarmatisch — Pflanzen osteuropäischer Herkunft, die nördlich der Karpaten nach Westen wanderten (V/1 522).

sarméntum — = Schössling.

Sauerstoffstarre — Sauerstoffmangel hebt anscheinend die Sensivität (z. B. bei Ranken) auf.

Saugfortsätze (Saugorgane) — siehe Haustorialfortsatz.

Saugkraft — heisst die Kraft, mit welcher die unveränderte Zelle Wasser einzusaugen bestrebt ist.

Saugwurzeln — VI/1 130.

saure Wiesen — die meist aus Riedgräsern und Binsen gebildete Vegetation lebt in nährstoffreichem Wasser und geht gern in Wiesenmoore (siehe dort) über.

saures oxalsaures Kali (Kleesalz) — KOOC—COOH (siehe IV/3 1653).

saurochor —Verbreitung der Samen durch Eidechsen (V/1 593, 691).

scápus (Schaft) — I/LXXXIV.

Schafläger (Gemsläger) — heissen in den Alpen regelmässig von Schafherden bezw. von Gemsen aufgesuchte Stellen, wo sich zufolge einer überreichen Düngung eine bezeichnende Hochstaudenflora (Cirsium spinosissimum [VI/2 903], Aconitum Napellus) entwickelt.



Fig. 1137. Lilium Martagon L. (II, 236). *a* Reife Fruchtkapsel. *b* Samen. („Scheibenflieger"). *c*, *d* Keimung.

Schaft (scápus) — I/LXXXIV; V/3 1720, 1733.

Schaftpflanzen (hemikryptophyta scapósa) — meist hochwüchsige Stauden (seltener Gräser) mit gewöhnlich fester Pfahlwurzel und ± dicht beblättertem Stengel. Grundständige Blattrosette vorhanden oder fehlend.

Schalfrucht (Schlauchfrucht) — siehe Caryopse (I 170).

schalige (tunicate) **Zwiebel** — I/LXXXII.

Schattenblatt — III 100; IV/2 972; IV/3 1192; V/4 2567.

Schattentriebe — V/2 919.

Schauapparat — I/CXLIV; III 589; VI/1 396 (siehe florale und extraflorale Schauapparate).

Schaufläche — heisst die zur Blütenachse meist senkrecht stehende Fläche der geöffneten Krone bezw. Blütenhüllblätter.
Schaukelmoor — II 92.
Scheelisieren — V/1 401.
Scheibenblüten — I/CXXXVIII; VI/2 203.
Scheibenflieger — Samen flach, dünn, zuweilen geflügelt (VII Fig. 1137).
Scheide (Blattscheide) — der den Stengel umfassende untere Teil eines ungestielten Blattes (Gramina, Commelinaceae). Siehe auch Ochrea.
Scheidenblätter — I/XCIV; siehe auch Spatha.
Scheidenknoten — I/LXVII; I 166.
Scheidewand (séptum) — I/CL; IV/1 53.
Scheidewände, falsche — I/CXXVIII; I 163; V/4 2560.
scheidewandbrüchige Kapsel — = septifrage Kapsel (I/CLI).
scheidewandspaltige Kapsel — = septizide Kapsel (I/CL).
Scheinachse — siehe Sympodium.
Scheinähre — III 65, 189; V/4 2259.
Schein-Arillus — IV/3 1645.
Scheinbeere — I 78, 91; III 146; V/2 738, 762.
Scheinblätter — V/2 695.
Scheinfrüchte — I/CXLVIII, CLI; I 75; II 7; V/2 738; VII Fig. 1050.
Scheinkopf — kopfförmiger, aber aus ± langgestielten Blüten bestehender Blütenstand.
Scheinnektarien — siehe Parnassia palustris (IV/2 638).
Scheinparenchym — siehe Plektenchym.
Scheinquirl (verticillástrum) der Blüten — verkürzte, gegenständige, meist blattachselständige Trugdolden (I/LXXII, CXL; V/4 2255); siehe auch VI/1 196.
Scheinquirl (Blätter) — I/CVI; V/4 2259.
Scheinsame — I 75.
Scheinstamm — siehe Pisangstauden.
Scheinsteinfrucht — V/2 728.
Scheintraube — III 189; V/4 2259.
Scheinzwiebel — siehe Luftknolle.
Scheinzwitter — V/1 371.
schichtkronige Bäume — siehe Etagenwuchs.
Schichtung (Vegetationsschichtung) — findet sich in vielen Assoziationen und ist das Ergebnis eines lang andauernden Anpassungs- und Ausleseprozesses, wobei besonders der Lichtfaktor ausschlaggebend ist. Baum-, Strauch-, Kraut- bezw. Feld- und Moos- oder Bodenschicht werden oft unterschieden (VII Fig. 1138).
schief-(schräg-)zygomorphe Blüten — I/CXXXV; V/1 296.
Schienen-(Schenkel-)sammler — Insekten, bei denen der pollensammelnde Apparat sich an den Hinterschienen und Fersen (Fersenbürste) befindet.
Schiessbaumwolle (Schiesswolle) — V/1 462 (hauptsächlich Trinitrozellulose, in Aceton löslich).
Schiffchen (carína) — I/CXXI; IV/3 1135.
Schiffchenhaare — VI/2 628 Fig. 339.
Schildchen (scutéllum) — I 170; V/4 2508.
Schilddrüsen — V/3 1628; VI/1 130.
schildförmiges Blatt — I/XCIII; IV/3 1729; V/2 954.
Schildhaare — V/2 735; VII Fig. 1139.
Schirm (umbélla) — I/CXXXVIII.
Schirmflieger — die Haare des Flugapparates sitzen einzig am oberen Ende der Früchte bezw. Samen (siehe Schopfflieger) in regelmässiger Anordnung am Rande oder auf ± langem, gemeinsamem Fussstück (Valerianaceae, Dipsacaceae, viele Compositae, Strophanthus usw.).
Schirmrispe (corýmbus) — I/CXL.



Fig. 1138. Brachypodium pinnatum (Huds.) Pal. (I, 370) bildet im schattigen Walde eine fast reine Kraut- bezw. Feldschicht. Phot. X. Siegle, Pforzheim.



Fig. 1139. *a* bis *e* Entwicklung der Scheiben- oder Schildhaare von Hippuris vulgaris L. (nach Jos. Rauter). Vgl. Bd. V/2, 908.

Schirmschlagbetrieb — der geschlossene Altbestand des Hochwaldes wird gleichmässig und vorsichtig gelichtet. Die Verjüngung erfolgt durch Samen der stehenbleibenden Mutterbäume während eines oder weniger aufeinander folgender Samenjahre, so dass die Kronen sich nicht mehr aneinander schliessen.

Schirmtraube — I/CXXXVII.

schizogene Gänge und **Drüsen** — I/XXXIV.

Schizokarpium — Spaltfrucht (I/CI).

Schizostelie (Astelie) — Stele (siehe dort!) ist gerissen, d. h. jedes einzelne Leitbündel ist von einer besonderen Endodermis und von perizykelartigem Gewebe umgeben.

Schizostigma — V/2 852.

Schläuche (Ampullen) — VI/1 163 (siehe auch Utriculus).

Schlafäpfel (Bedeguar) — heissen die an Rosen durch eine Gallwespe (Rhodites rosae L.) erzeugten, bis 5 cm breiten, mit langen, fadenförmigen, verzweigten, ± rot angelaufenen Auswüchsen versehenen Gallbildungen (IV/2, 984; VII Fig. 1140).

Schlafbewegungen — siehe nyktitropische Bewegungen (I/XXIV; IV/3 1121, 1648).

schlafende Augen (ruhende bezw. schlafende Knospen) — sind nichtaustreibende Reserveknospen, die sich oft jahrelang untätig, aber lebensfähig erhalten und auf besondere Veranlassung hin zum Austreiben gebracht werden können (I/LXVI; III 27).

Schlagbaummechanismus bei Salvia — V/4 2475, 2500.

Schlageinrichtung der Schmetterlingsblüten — IV/2 1137.

Fig. 1140. Schlafäpfel an Rosen, erzeugt durch eine Gallwespe (Rhodites rosae L.). Phot. Otto Ziegler, Zollikon (Schweiz).

Schlagpflanzen — stellen sich bald nach dem Schlagen (besonders Kahlschlag) der Wälder (oft in grosser Zahl) ein (V/2 816; VI/2 793.

Schlammwurzler — siehe Limnäen.

Schlauch (Schlauchfrucht) — wird das Sporangium der Askomyzeten („Schlauchpilze") genannt. Siehe auch Utriculus.

Schlauchkapsel (= Caryopse, sacéllus) — Streufrucht mit unregelmässiger Oeffnung (Chenopodium, Najas).

Schlauchkern — I/CXLVIII.

Schlechtwetterblüten — siehe Praeanthese.

Schleier, Schleierchen (Indusium) — I 5 und I 11 Fig. 4.

Schleim — siehe Pflanzenschleim.

Schleimbehälter — V/1 431.

Schleimbildung — IV/1 55; V/3 1721, 1955.

Schleimepidermis — bildet bei Frucht- und Samenschalen die Quellschicht.

Schleimfluss — aus den Wunden verschiedener Bäume (Ulmen usw.) austretende, schleimige Absonderungen.

Schleimhaare — I/XXIX.

Schleimmembran — Zellhaut, die sich schleimig verdickt und reichlich Wasser speichern kann.

Schleimzellen — V/1, 482; V/2 751.

Schlenken — heissen flache, nasse Vertiefungen im Hochmoor.

Schleuderfrüchte — beim Ausschleudern der Samen sind tote oder saftige Gewebe der Früchte wirksam; siehe auch Hebel- und Quetschschleuderer (I/CLVI; III 270; IV/3 1659; V/1 140, 312, 542, 592.



Fig. 1141. Reife Früchte („Schleuderkletten") der Gemshornpflanze (Martynia Proboscidea Glox.). Siehe Bd. VI/2, 1363.

Schleuderhaare — II 323.

Schleuderkletten — Klettfrüchte, die an der Mutterpflanze haften bleiben und beim Zurückschnellen die Samen oder Früchte wegschleudern (VII Fig. 1141).

Schleuderzellen — siehe Elateren (I 52).

Schlick (Seeschlamm) — ist ein Gemisch von organischen Resten mit tonigen, sandigen Mineral- und Humusteilen; findet sich an ruhigen Stellen im Mündungsgebiet der Ströme am Meeresstrand.

Schlickmarsch — bildet sich unter ruhigen Verhältnissen auf dem von der Flut zugeführten, an tonigen oder organischen Teilen sehr reichen (deshalb fruchtbaren) Boden.
Schliessen der Blüten — siehe Nyktinastie (VII Fig. 1119).
Schliessfrüchte — I/CXLIX.
Schliesszellen — V/1 247.
Schlingpflanzen (Lianen) — I/LXXV und VII Fig. 1170 (siehe Windenpflanzen, Rechts- und Linkswinder).
Schluchtwaldgenossenschaft — V/1 316.
Schlund (faux) — I/CXIX.
Schlundschuppen — I/CXX; V/3 1980, 2098, 2123.
Schlupfwespenblumen — siehe Listera ovata (II 387).
Schmalzblätter — III 446.
Schmarotzerpflanzen (Parasiten) — I/LIX; VI/1 129, 133.
Schmetterlingsblüte — IV/3 1135.
Schnabel der Cruciferen — IV/1 54.
Schnabelfrucht — IV/3 1659.
Schnäbelchen (rostéllum) — II 322.
Schneckenblütler — I/CXLIV; II 139.
Schneckenroller — Bezeichnung für Farnpflanzen.
Schneeflüchtlinge (chionophobe Arten) — scheuen eine längere Schneebedeckung.
Schneeläufer — siehe IV/2 554, 556, 573.
Schneeschützlinge (chionophile Arten) — gedeihen nur unter einer beträchtlichen, lange andauernden Winterschneedecke.
Schneestufe — siehe nivale Stufe.
Schneetälchen — kleine Mulden der alpinen Stufe, deren fetter Boden vom Schmelzwasser durchtränkt ist (III 28; IV/2 606).
Schneitelbäume — V/3 1930, 1931.
Schössling — I/LXXXIII; IV/2 772.
Schötchen (silícula) — IV/1 54.
Schopfbäume — immergrüne Bäume, die am Gipfel des unverzweigten, oder doch nur wenig verästelten Stammes einen Schopf von grossen, rosettenartig genäherten Blätter tragen (Farnbäume, Cycadaceen, viele Palmen, Liliaceenbäume, Pandanus, Ravenala).
Schopfflieger — das Flughaarkleid bildet einen pinselförmigen Haarbusch in regelloser Anordnung an der Spitze, seitlich oder am Grunde der Früchte bezw. des Samens (Arundo, Phragmites, Eriophorum, Typha, Salix, Populus, Myricaria, Asclepiadaceen, Epilobium).
Schopfpflanzen — durchspinnen mit aufwärtsstrebenden, niemals wurzelnden Trieben den Boden.
Schopfpolster — Polster mit unregelmässigen, nichtwurzelnden Trieben.
Schote (síliqua) — I/CL; IV/1 54.
Schoten — werden fälschlicherweise die Hülsen von Pisum usw. genannt (IV/3 1121).
Schrägzeilen (Parastichen) — I/LXXIII.
schrägzygomorph — = schiefzygomorph.
Schraubel (bóstryx) — CXXXIX.
Schraubenblätter — lange, schmale, aufgerichtete Blätter mit schraubenförmiger Drehung (4 bis 6 oder nur ½ Windungen).
Schraubendrehflieger — unterscheiden sich von den Schraubenfliegern durch den Bau der Flügel; die Rückenkante fehlt, so dass die Flügel auf beiden Längsseiten dünn, zweischneidig sind. Beim freien Fall beschreiben die Früchte nicht nur Schraubenlinien, sondern drehen sich auch um ihre Längsachse (Fraxinus [V/3 1931], Liriodendron).
Schraubenflieger — sind exzentrisch gebaut und besitzen meist nur einen seitlichsitzenden Flügel, so dass der Schwerpunkt des ganzen Organes nicht im Mittelpunkt liegt. Die Früchte bezw. Samen geraten dadurch beim Abfallen in eine schnellrotierende Schraubenbewegung, wobei die harte, glatte Vorderkante des Flügels nach vorn gerichtet ist (Acer, V/1 267; Samen vieler Nadelhölzer).
schrotsägeförmiges Blatt — fiederspaltiges Laubblatt, dessen Spitzen der Abschnitte etwas nach dem Blattgrunde gebogen sind (Taraxacum, Leontodon, Aposeris).
Schrumpfung — Volumenverringerung zufolge Wasserabgabe.
Schubfestigkeit — I/XXXIX, XL.
Schülfern (squámae, lépides) — I/XXIX; V/2 735, 914.
Schüppchen — siehe lodículae.
Schüttelfrüchte — I/CLIII.
Schüttelfrüchtler — Kapselfrüchte, aus denen die Samen durch den Wind herausgeschüttelt werden.
Schüttelkletten (Schleuderkletten) — Klettfrüchte, die beim Anhaften an Tieren nicht an diesen, sondern an der Mutterpflanze haften bleiben und beim Zurückschnellen die Samen wegschleudern (VI/2 826).
Schuppenblätter — I/CIII, CXIII; VI/1 130.
Schuppenborke — I/XXXI; IV/2 658.
Schuppenhaare (squámae, lépides) — V/1 192; V/2 729, 916.

Schuppenzwiebel — I/LXXXII; II 234.

Schutt (Felsschutt) — sind Gesteinsmassen, welche sich aus dem Zusammenhang mit dem Anstehenden gelöst haben.

Schuttdecker — Pflanzen bilden über den Schutt eine wurzelnde Rasendecke.

Schuttfluren — umfassen alle offenen Gesellschaften auf mechanisch zertrümmerten Felsenteilen vom groben Schutt bis zum feinen Sand (also Schuttkegel, Schutthalden, Kiesanschwemmungen, Moränen usw.).

Schuttpflanzen — leben im Geröll, Gesteinstrümmern, im Grob-, Fein- und Ruhschutt (VII Fig. 1142); andrerseits werden auch die Ruderalpflanzen als Schuttpflanzen (Phellidophyten) bezeichnet.

Schuttstauer — Pflanzen stemmen sich mit kräftigen Triebbündeln oder Polstern dem Schutt entgegen; sie sind im Boden mit einer kräftigen Wurzel fest verankert (VII Fig. 1143).

Schuttstrecker — Pflanzen arbeiten sich durch Verlängerung aufrechter Triebe und Blätter durch den Schutt (IV/1 133).

Schuttüberkriecher — legen sich mit schlaffen, oberirdischen, beblätterten, von einem Punkte entspringenden und nicht wurzelnden Stengeln über den Schutt (IV/1 417).

Fig. 1142. Astragalus (Oxytropis) montanus L. (IV/3. 1439) als Schuttbefestiger auf Kalkgeröll im Wettersteingebirge. Phot. Dr. Emil Schmid, München.

Schuttwanderer — durchspinnen mit verlängerten, horizontalen, wurzelnden Kriechtrieben (Wandertriebe) den Schutt.

Schutzkolloide — haben die Eigenschaft, das Koagulieren zu erschweren bezw. zu verhindern.

Schutzscheide — = Endodermis (I/LXI).

Schwärmerblumen — siehe Falterblumen.

Schwammparenchym — I/C.

Schwarzerdeböden — heissen hauptsächlich aus Löss gebildete, nicht ausgelaugte, an löslichen Nährstoffen und an Stickstoff reiche Böden; sie kommen vor allem in nicht extrem ariden Gebieten mit kalten Wintern vor (Südrussland, Rumänien, Ungarn, Mähren [Hannaböden], Schlesien, Ostpreussen, Braunschweig, Magdeburger Börde).

Schwebfliegenblumen — I/CXLV.

Schwefel — erscheint in der Pflanze in Form von Salzen (Sulfaten), auch als Bestandteil der Eiweisstoffe, in flüchtigen Oelen und in Bakterien (Thiobakterien).

Schwefelregen — heissen Staubwolken von Pollen der Nadel- und Kätzchenblütler, die sich auf die Wasseroberfläche niederschlagen können (I/CXLIX).

Schwellgewebe — Zellschichten mit starker Turgeszenz bei saftigen Schleuderfrüchten (Impatiens, Cyclanthera usw.).



Fig. 1143. Carex sempervirens Vill. (II, 103) als Schuttfestiger und Schuttstauer, zugleich Rasenpionier. Phot. Dr. G. Hegi, München.

Schwellkörper — siehe lodículae (I 169).

Schwemmlinge — Pflanzen, die besonders durch die Gebirgsflüsse in die Täler und ins Vorland gebracht werden (II 271; III 312; IV/2 586; VI/1 350; VI/2 689, 1350).

Schwemmtorf — I 275.

Schwerkraftorgane — I/XXXVI.

schwermetallholde Pflanzen — V/3 1890.

schwertförmiges Blatt — I/XCV; VII Fig. 1130.

Schwiele — III 167.

Schwimmblatt — I/CI; I 121; III 443, 552; V/2 954; VII Fig. 1144.
Schwimmer — V/4 2256.
Schwimmfrüchte (bezw. -samen) — I/CLVI; II 7; III 443; IV/3 1587; V/2 736; V/3 1954, 1964, 2165.
Schwimmgewebe (Schwimmblasen) — Gesamtbezeichnung für alle jene Gewebe, welche die Erhöhung der Schwimmfähigkeit bestimmter Organe zur Aufgabe haben.
Schwingrasen — sind stark verfilzte, bis über 1 m mächtige zusammenhängende Rasendecken, die auf wasserdurchtränkter Unterlage ruhen oder auf dem Wasser schwimmen und beim Auftreten deutlich in schwingende Bewegung geraten (II 8, 119; IV/2 808).
scutéllum — I 170; V/4 2508.
See-(Meer-)bälle, Seeknödel (pílae marínae) — auf dem Grunde der Gewässer liegende tote und lebende Pflanzenteile gelangen durch den Wellenschlag in rotierende Bewegung und ballen sich zu kugeligen oder ovalen Körpern zusammen (I 95; Posidonia, Zostera).
Seeblüte — siehe Wasserblüte.
Seegrasvegetation — siehe Enhaliden.
Seekreide — heisst die unter Wasser entstandene Humusbildung, die hauptsächlich aus dem durch Pflanzen abgeschiedenen Kalkkarbonat besteht.
segetal — V/3 2159 (auf den Getreidebau bezüglich). Von latein. secale = Korn, Getreide.
Segment — heisst die bei der Teilung von der Scheitelzelle (siehe dort!) abgeschiedene, ihr an Gestalt ungleiche Tochterzelle.
Seichtwasserform — VI/1 195.
Seidenhaare — liegen der Blattoberfläche in einer Richtung glatt an und bilden einen seidenglänzenden Ueberzug.
seidenhaarig (seríceus) — Haare kurz, dicht anliegend.
Seismonastie — Reaktionsbewegung auf Stossreiz, deren Richtung in der Struktur der Pflanze begründet ist, also von der Reizrichtung unabhängig ist (IV/3 1126, 1648; V/1 565; V/3 1980, 2026).
Seitenknospen der Pfahlwurzel — V/2 1016.
Seitennerven — siehe Blattnervatur.
Seitenspross — I/LXIX.
seitenwurzeliger Keim — IV/1 55.
Sekretionssystem (Sekretionsorgane) — I/XXXVI.
Sekretschläuche (-gänge) — I/XXXIV; V/1 507.
Sektorialchimären — s. Pfropfbastarde (IV/3 1666).



Fig. 1144. Nymphaea candida Presl (III, 443). Habitus. Fruchtstiel spiralförmig aufgerollt.

sekundäre Blattstellung — die ursprüngliche Anordnung der Blätter geht in eine andere Stellung über.
sekundäre Formationen (Halbformationen) — sind unter dem Einflusse von Menschen oder Tieren (Weiden) entstanden.
sekundäre Markstrahlen — I/LXXXVI.
sekundäre Meristeme — siehe Folgemeristeme (I/XXVII).
sekundäre Rinde — I/XLIV, LXXXVI, XCI; V/1 347.
sekundärer Embryosackkern — I/CXLVII.
sekundäres Dickenwachstum — I/LXXXVI.
sekundäres Hautgewebe — siehe Kork.
sekundäres Holz — I/LXXXVI.
Sekundärnerven — I/XCVII.
Sekundine — Bezeichnung für das innere Integument der Samenanlage.
Selbstbestäubung (Autogamie) — I/CXLI; IV/2 981; VI/1 462.
selbstfertile Blüten — I/CXLI; IV/1 55; V/3 1726, 1854.
Selbststerilität der Blüten — Gynaezeum mit blüteneigenem Pollen setzt keine Samen an (gewisse Papilionaceen, Orchidaceen, Hemerocallis fulva (I/CXII; IV/1 59; V/3 1726; VI/2 967).
selektive Chorologie — Lehre von der Verbreitung und Vergesellschaftung der Organismen unter dem Einfluss des auswählenden Wettbewerbes.
sémen (latein.) — Same(n), Saat.
Semialbinos — Blüten (genauer Blütenhüllblätter) und Früchte mit verminderter Anthocyanbildung.
semifrútex — = Halbstrauch.
Senföl — IV/1 207.

Senker (Senkerwurzeln) — I/LIX; III 148; siehe auch Ableger.
sensitive (Sinnes-) **Pflanzen** — IV/3 1124, 1645.
sépala (Kelchblätter) — I/CXVIII.
Sepalodie — Umbildung von Blattgebilden (Phyllomen) zu Kelchblättern oder zu kelchähnlichen Organen.
Septaldrüsen (Septalnektarien) — I/CXXXI; II 184 Fig. 310.
septifrage Kapsel — I/CLI.
septizide (scheidewandspaltige) **Kapsel** — I/CL.
séptum (Scheidewand) — I/CL; IV/1 53.
seriale Beiknospen — I/LXIX.
Serpentin — ist $H_4Mg_3Si_2O_9$ und liefert einen schwarz bis grünglänzenden, scherbig und eckig zerfallenden, äusserst unfruchtbaren Verwitterungsboden. Zuweilen zeigt der Serpentin einen ziemlich beträchtlich CaO-Gehalt. Die Flora einförmig, arm.
Serpentinpflanzen — dem Serpentin sind eine beschränkte Zahl von Pflanzen eigen, die ausschliesslich an Magnesiumsilikate bezw. Karbonate gebunden sind (I 6, 27; IV/2 553). Zuweilen erscheinen auf dem Serpentin auch Kalkpflanzen (VII Fig. 1145).
Serumdiagnostik — Bestimmung der Verwandtschaftsverhältnisse von Individuen aus ihrer Eiweissverwandtschaft (IV/3 1141, 1644).
Sexokarpie — Fruchtbildung mit Befruchtung (Gegensatz ist Parthenocarpie).
Sexualsystem — künstliches System, das auf dem Geschlecht der Blüten, sowie auf der Zahl und Anordnung der Staubblätter begründet ist.
sexuelle (digene) **Fortpflanzung** — I/CXLVI.
Sichel (drepánium) — I/CXL.
siebenzähliges Blatt — I/XCV.
Siebröhren — I/XLIII, XLIV.
Siebröhrenteil — I/XLI, XLIII, XLIV.
Silberflecken der Laubblätter — siehe V/4 2443.
silícula — kleine Schote (Schötchen).
Siliculosen, angustisepte — IV/1 60.
silikole (oxyphile) **Pflanzen** — bewohnen ausschliesslich oder doch mit Vorliebe Silikat- (Kiesel-)böden (VI/2 557).

Fig. 1145. Asplenium Serpentini Tausch, „Serpentinfarn" (I, 32), bei Klosters-Selfranga (Graubünden). Phot. Dr. G. Hegi, München.

síliqua — Schote.
Sinnesorgane — haben den Charakter von Reizperzeptionsorganen (hierher Fühltüpfel, Fühlpapillen, Fühlhaare, Fühlborsten, Statolithen, Sammellinse).
Sinnpflanzen — Blätter reagieren auf Stossreize.
Siphonanthie — röhrenförmige Ausbildung der ligulaten Strahlblüten im Kompositensköpfchen.
sitzendes Blatt — I/XCVI.
Skelettsystem — siehe mechanisches System.
Skiophyten — Schattenpflanzen.
Sklereïden (Steinzellen) — I/XXXVIII; V/1 495.
Sklerenchym — I/XXXVII, XXXVIII; V/3 1720, Fig. 2718.
Sklerokarp — V/4 2262.
Sklerophyllen — Pflanzen mit steifen, lederigen Blättern.
Sklerotien — harte, horn- oder knollenförmige Pilzkörper, die zuweilen als Dauerzustände auftreten (z. B. Mutterkorn; I 388 Fig. 167).
skotophile Pflanzen — siehe geophile Pflanzen.
Skotoplankton — Dunkelplankton.
Sol — als Sole bezeichnet man Kolloide im gelösten Zustande (unechte Lösungen).
sommerannuelle Pflanzen — keimen und fruchten in derselben Vegetationsperiode (IV/2 946).
Sommerblätter — II 139.
Sommerform — V/2 1983.
Sommergebüsche (Aestatifruticeta) — heissen hauptsächlich aus Sträuchern gebildete Durilignosa, die in der kalten Jahreszeit ihr Laub abwerfen (Weiden- und Ufergebüsch, Corylusgebüsch).
sommergrün — I 76.
Sommerholz — I/LXXXVIII.
Sommerwälder (Aestatisilvae) — sind Deciduilignosa, deren vorherrschende Holzpflanzen Bäume sind, die

in der kalten Jahreszeit das Laub abwerfen (hierher gehören die meisten Laubwälder der gemässigten Zonen).

Sonnenblatt — III 100; IV/2 972; IV/3 1192; V/4 2567.

Sonnenpflanzen — sind nichtsukkulente Xerophyten, bei denen die Saugkräfte der Zellen eine Hauptrolle für die Dürreresistenz bilden.

Soredien — I/CLVII.

Sorophor — = Sporophyll.

sorósus (Fruchthaufen) — Fruchtblüten ± miteinander verwachsen und meist zusammenfallend (Morus, Maclura, Ananassa). Siehe auch Schein- und Sammelfrucht.

Sorte — siehe Rasse.

Sorus (Fruchthäufchen) — I 4, 5; VII 2.

Soziologie — Lehre von den Gesellschaften der Organismen.

spádix — siehe Kolben.

Spätglazial — umfasst das auf die Würmeiszeit folgende Bühl-, Gschnitz- und Daunstadium.

Spätschliesser — Blüten bezw. Blütenstände schliessen sich normalerweise erst in den späten Nachmittagsstunden (bei Verdunkelung des Himmels auch tagsüber).

Spaliersträucher (chamaephýta velántia) — kriechende, oft teppichartig ausgebreitete, bodenbedeckende, sommer- oder wintergrüne Sträucher und Halbsträucher der kalten Klimate (VII Fig. 1146).

Spaltenpflanzen— siehe Chasmophyten (VII Fig. 1147).

Spaltfrucht (schizocárpium) — I/CL.

spaltkronige Bäume — Krone ist etwa radial in vertikaler Richtung gespalten (Thuja).

Spaltöffnungen (stómata) — I/XXVIII; V/1 297, 549; VI/2 681.

Spaltöffnungsmutterzellen — I/XXIX.

Spaltungsgärung — Stoffumwandlung auf nicht oxydativem Weg durch einen Spaltungsprozess (z. B. Alkoholgärung).

spannrückige Rinde — III 66; Taxus baccata.

Spartiumform — IV/3 1213; VII Fig. 1226.

spatelförmiges Blatt — I/XCV.

spátha — I/CXI; I 142, 162, 164; II 131.

Speicherblätter — I/CXIII.

Speichergewebe — I/XXXII, XXXV.

Speicherinternodien — I 276.

Speicherwurzeln — siehe Knollen und Rüben.

Spelzen — I/CXIII; I 167; VII Fig. 975.

Spermakern — = männlicher Sexualkern.

Spermakörper — I/CXLVII.

Spermatozoiden — I 2, 73.

Spezialisten — heissen jene Tiere, welche sich von einer verhältnismässig kleinen Zahl (oder nur von einer) von Pflanzen ernähren, deren Schutzstoffe ihnen gegenüber wirkungslos sind, wodurch andere Tiere ferngehalten werden (Wolfsmilchschwärmer lebt nur auf Euphorbia Cyparissias).

Speziesbastard — = Artbastard (I/CXLII).

Sphaerochorise — Vielteilung einer Achse nach allen Richtungen.

Sphaerokristalle (Sphaerite) — I/XXIII (kommen auch in der Samenschale von Cucubalus vor).

Sphagnummoore (sphagnéta) — siehe Hochmoore.

spíca (Aehre) — I/CXXXVII; VII Fig. 975.

spicástrum — V/4 2259.

Spiegel (Markstrahlen) — I/LXXXVII.

Spielart — siehe lúsus.

spiessförmiges Blatt — I/XCV.



Fig. 1146. Rhamnus pumila Turra (V/1, 343). Zwerg-Kreuzdorn, ein Spalierstrauch. Phot. Otto Berghardt, München.

Fig. 1147. Carex firma Host (II, 140), in Kalkspalten. Phot. Dr. Walter Sandt, München.

Spikularzellen (Astrosklereïden, Ophiurenzellen) — heissen vielarmig verzweigte, prosenchymatisch zugespitzte Sklerenchymzellen.
Spindel — siehe rháchis.
Spindelfasern — I/XVIII.
spindelförmige Narbe — I 170.
Spinnwebehaare — lange, aber feine Haare, die gewöhnlich an vorspringenden Teilen von einem zum andern hinlaufen (vgl. IV/2 556).
Spiralgefäss — I/XXIV.
spiralige Blattstellung — I/LXXII.
spiralige Blüten — I/CXXXIV.
spiraliggerollter Keim — IV/1 56.
Spiralismus (Speiranthie) — siehe Zwangsdrehung.
spirolober Keimling — IV/1 56.
spirozyklische Blüten — IV/2 654.
Spirre (anthéla) — I/CXI.
Spitzenwachstum — I/XCII.
spitzes Blatt — I/XCV.
Spitzkeimer — siehe Monokotyledones (I 3, 109).
Splint — I/LXXXVIII.
spontan — im wilden Zustande vorkommend; siehe autonom.
spontane Bewegungen — siehe Variationsbewegungen.
spontane Nutation — siehe Nutation.
spontane Variation — siehe Mutation.
sporadisch — zeitweise und unerwartet auftretend.
Sporangien (Sporenbehälter) — I 2, 5; Tafel 1.
Sporangienhülle — I 48.
Sporen — I/CLVII; I 1 Taf. 1.
Sporenfrucht (sporocárpium) — I 47.
Sporn (cálcar) — hohler, ± kegelförmiger, am Grunde eines Kron- oder Kelchblattes befindlicher Fortsatz, der meist als Honigbehälter dient.
Sporobiont — allgemeine biologische Bezeichnung für den Sporophyt.
Sporophylle — heissen bei Gefässkryptogamen die sporangientragenden Blätter (I/CXVI; I 49, 63).



Fig. 1148. *a* Fruchtstand von Verbascum nigrum L. (VI/1, 11). *b* Kapsel zweiklappig aufspringend mit 2-spaltigen Klappen. *c* Fruchtstand von Verbascum thapsiforme Schrad. (VI/1, 15). *d* Reife Frucht. *e* Klappe. *f* Fruchtstand von Pedicularis Sceptrum Carolinum L. (VI/1, 125).

Sporophyt (2 x-Generation, Diploïdgeneration) — die durch den Befruchtungsakt entstandene, auf vegetativem Wege sich weiterteilende, ungeschlechtliche Generation der höheren Pflanzen.
Spreite (lámina) — Fläche eines Blattes bezw. eines Kronblattes.
Spreizklimmer — I/LXXVI; V/4 2564.
Sprengmast — in einem aus einer Art bestehenden Bestand von Laub- und Nadelhölzern blühen im Jahre nur einzelne Bäume (Gegensatz ist Vollmast. III 100).
sprengwedelförmige Narbe — I 169.
Spreuschuppen — I 5; siehe auch Spreublätter.
Springfrüchte (rhexocárpia) — I/CL, CLVI; IV/1 59; V/1 140, 312; VII Fig. 1070, 1075, 1108 und 1148.
Springfrucht, einfache (apocárpium dehíscens) — wird aus einem Fruchtblatt gebildet.
Spross — I/LXIV; V/1 588; V/3 1867.
Spross, reproduktiver — I/CXVI.
Sprossachse — I/LXVIII; IV/3 1119; V/1 137, 368, 588.

Sprossanlagen — V/1 367.
Sprossaufbau — I/LXIX; V/1 137, 366, 588; V/3 1867.
Sprossdorn (spínae) — I/LXXXIII; IV/3 1120.
Sprossformen — I/LXXXIV.
Sprossknolle — I/LXXX; V/4 2597.
Sprossmetamorphose — die mit einem Funktionswechsel verbundene Umwandlung von Laubsprossen in Dornen, Ranken, Phyllokladien usw.
Sprosspilze — siehe Hefepilze — IV/1 400; VII 140.
Sprossranker — I/LXXV; V/1 657; siehe Stammranker.
Sprossverband — I/CX.
Sprossverkettung — siehe Sympodium.
Sprungvariationen — siehe Mutationen.
squámae — = Schuppenhaare, Schülfern.
Stachel (acúleus) — I/XXX; IV/2 642, 979.
stachelspitziges Blatt (mucronátus) — I/XCV.
Stachyose — V/4 2419.
Stärke, bewegliche (Statolithenstärke) — siehe Statolithen.
Stärkebildner (Leucoplasten) — I/XIX, XX.
Stärkebäume — die Reservestärke bleibt über den Winter unverändert in Holz und Mark erhalten, während die Rindenstärke im Herbst gelöst wird (hartlaubige Laubbäume).
Stärkeblätter (Amylophylle) — Blätter, die als Kohlenstoffassimilationsprodukt reichlich Stärke führen im Gegensatz zu den Zuckerblättern (V/3 1956).
Stärkekörner — I/XIX; II 240; IV/3 1496.
Stärkescheide — I/XXXVI.
stámen (Mehrzahl stámina) — Staubblatt (I/CXXII).
stámen séssile — I/CXXII.
stámina ananthéra — I/CXXV.
stámina connáta — I/CXXIII.
stámina sterília — I/CXXV; IV/2 638.
stámina synanthéra — I/CXXIV.
Staminodie — Umwandlung eines Blattgebildes in ein Staubblatt.
Staminodien (stámina sterília) — I/CXXV IV/2 638.
Stamm (trúncus) — öfters Bezeichnung für die verholzte Sprossachse von Bäumen (I/LXXXIV).
Stammbaum der Blütenpflanzen — IV/3 1643.
stammbürtige Blüten — siehe Kauliflorie.
Stamm- oder Sprossdornen — I/LXXXIV.
Stammesgeschichte — siehe Phylogenie.
Stammesrelikt — V/3 1646.
Stammglieder — siehe Stengelglieder.
Stammknospe — siehe Plumula.
Stammranker (Stammkletterer) — vorwiegend Holzpflanzen mit reizempfindlichen Ranken (I/LXXV).
Stammsaftpflanzen — I/LXXVII; VII Fig. 1063.
Stammsukkulenten (Chylocaulen) — I/LXXVII.
Standort — ist ein ökologischer Begriff, der alle Lebensbedingungen, unter denen die Pflanze an einer geographisch bestimmten Lokalitat wächst, umfasst (z. B. Hochmoor, Zwergstrauchheide, Weisse Düne). Siehe auch Lokalität.
Standortsform (Standortsmodifikation) — bezeichnet eine unbedeutende Abweichung vom Typus, die nicht oder nur in geringem Masse erblich ist (IV/1 71; V/4 2387; VII Fig. 1240).
Stapel — bezeichnet die Länge der Baumwollfaser (V/1 460).
Starrezustand — bezeichnet allgemein die vorübergehende Aufhebung bezw. die aufgezwungene Untätigkeit verschiedener Lebensäusserungen; sie kann durch Mangel an Licht, Wasser, Sauerstoff, durch extreme Temperaturen, starke Erschütterungen, Beschädigungen, Anaesthetica usw. bedingt sein.
Stasimorphie (Stesomorphie) — Hemmung in der Entwicklung eines Organes bezw. Organkomplexes und dessen Stehenbleiben auf einer niederen Entwicklungsstufe.
statischer Reiz — heisst der durch gleichmässigen Druck ohne Erschütterung wirkende Reiz.
Statolithen — sind leichtbewegliche Stärkekörner, die als spezifische Sinneszellen zur Wahrnehmung des Schwerereizes betrachtet (siehe auch Stärkescheide; I/LIV) werden.
Statozysten — spezifische Sinneszellen zur Wahrnehmung des Schwerereizes.
Staubbeutel (anthéra) — I/CXXII.
Staubblätter (stámina) — I/CXXII; V/1 565.
Staubblattformation — Gesamtheit der Staubblätter (Androezeum).
staubblattvorreif — = proterandrisch.
Staubfaden (filaméntum) — I/CXXII; VI/2 935.
Staubflieger — V/3 1570.

Staubgefässvorreife — siehe Proterandrie (I/CXLI).
Staubweg — siehe Griffel.
Stauchsprosse (Stauchlinge, Brachyblasten) — zeigen eine verkürzte Gliederung und demzufolge engzusammengedrängte Blätter, oft auch ein begrenztes Wachstum.
Stauden — I/LXIX.
Steckling — I/CLVIII; IV/2 985.
steifborstig (setáceus) — mit starren, fast stechenden Haaren versehen.
steifhaarig (híspidus) — mit steifen Haaren versehen.
Stein(-kern) — siehe putámen.
Steinapfel — jedes Fruchtfach wird zu einem Steinkern.
Steinborke — Borke mit besonders reichlicher Ausbildung von Sklerenchym.
Steinelemente (Steinzellen) — siehe Sklerenchymzellen.
Steinfrucht (drúpa) — I/CLI; IV/2 804 Fig. 1105 b und c, 1055.
Steinpflanzen — siehe Lithophyten.
Steinsamen — heissen abnorm harte bis steinharte, nicht quellungsfähige Samen.
Steinzellen — I/XXXVII, XXXVIII.
Stele — Zentralzylinder der Sprossachse, umfasst die Leitbündel, das Mark, die primären Markstrahlen und den Perizykel (siehe dort).
Stelzwurzeln — I/LVII, LX; III 94; VII Fig. 1149.
Stempel (pistíllum) — I/CXXVII.
Stengel — I/LXXXIV, CXVIII.
stengelähnliches Blatt — II 146.
Stengelglieder (Stammglieder, Internodien, Interfolien) — heissen die zwischen den Ansatzstellen der Laubblätter liegenden Achsenstücke.
Stengelquerschnitte — II 145, 156; V/4 2276 Fig. 3186.
stengelumfassend (amplexicaúlis) — I/XCVI.
stenoezische (stenochore) **Pflanzen** — heissen oekologisch engangepasste (IV/2 569) und daher nur unter ganz bestimmten, sich gleichbleibenden Bedingungen gedeihende Pflanzen.
stenotop — Bezeichnung für engverbreitete Sippen (siehe auch Endemismus).

Fig. 1149. Weide, am Grunde mit einem dichten Bündel von Stelzwurzeln. Phot. Dr. Rud. Siegrist, Aarau.

stenosynusisch — an ganz bestimmte Gesellschaften gebunden, also ± gesellschaftstreu (IV/2 569).
Steppen — sind subxerophile Gramineenbestände ohne Baumwuchs (Prairie in Nordamerika, Pampas in Südamerika).
Steppenläufer(-hexen) — losgelöste, ganze Fruchtstände oder entwurzelte ganze Pflanzen werden in trockenem Zustand mit reifen Früchten oder Samen vom Winde über weite Strecken hin fortgerollt (Bunias, Crambe Tatarica [IV/2 976, 991], Eryngium).
Stereïden — I/XXXVII.
Stereome — I/XXXVII.
steril (stérilis) — = unfruchtbar.
Sternhaare (Flocken) — auf kurzem Fuss strahlenförmig verzweigte Haare (V/I 192, 577; V/2 916; VI/2 1188).
sternotrib — Pollenabladung erfolgt auf der Körperunterseite des Bestäubers.
Stickstoffassimilation — Prozesse, die zum Aufbau der stickstoffhaltigen Verbindungen (insbesonders der eiweissartigen Substanzen) dienen.
Stickstoffbinder — als solche kommen mehrere anaërobe oder aërobe Bakterien aus den Gattungen Clostridium und Azotobacter (VII 135) in Betracht (siehe auch Knöllchenbakterien); möglicherweise aber auch Wurzelpilze (Mycorrhiza).
Stickstoffpflanzen — binden freien Stickstoff der Luft mit Hilfe von Knöllchen- und anderen Bodenbakterien und führen ihn in Eiweiss über.
Stickstoffsammler — IV/3 1116.
Stieldrüsen — gestielte Drüsen.
Stigma (Narbe) — I/CXXVIII.
Stigmaticae — narbenblütige Windblütler.

Stipellen (Stipeln) — kleine schüppchen- oder zähnchenartige Bildungen am Grunde gefiederter Laubblätter (bei Thalictrum-Arten) (IV/2 937). Siehe auch Pseudostipellen.
stípulae — = Nebenblätter (I/CV).
stípulae intrapetioláres — siehe intrapetioläre Nebenblätter.
stípulae laterāles — heissen die freien, seitlichen Nebenblätter.
Stipularbildungen — IV/2 499.
Stipulardornen — siehe Nebenblattdornen (V/1 327).
Stipulardrüsen — V/1 134.
stirps — Mittelblattstamm.
Stock — I/LXXXIV.
Stockausschlag — erscheint öfters am Grunde von Baumstämmen durch Austreiben „schlafender Augen", zuweilen als Folge plötzlicher Belichtung (IV/3 1396 Fig. 1451).
Stockknospen (turiónes) — V/2 809.
Stockteilung — I/CLVIII.
Stoffbehälter — Umwandlung von Sprossen (I/LXXIX).
Stolonen (Ausläufer, Läufer) — I/LXXXIII; IV/2 898 Fig. 1156; VI/2 1185; VII Fig. 1057.

Fig. 1150. Vaccinium uliginosum L. (V/3, 1681), ein sommergrünes Sträuchlein mit Kriechsprossen. Phot. Apotheker Engelbert Meisner, München.

stóma (stómata) — siehe Spaltöffnung (I/XXVIII).
stomatäre Transpiration — erfolgt durch die Spaltöffnungen.
Stossreiz — plötzliche Stosseinwirkung auf eine Pflanze (siehe Seismonastie).
Stossreizbarkeit — V/1 565; V/3 1980, 2026.
Strahlblüten — heissen die vergrösserten Zungenblüten vieler Kompositen, Dipsaceen, Cruciferen usw.
strahlige Blüten — = aktinomorphe oder radiäre Blüten.
Strandsteppenpflanze — V/3 1972.
Strandwiesen — erscheinen am Meeresstrand auf schlammigen, schlickigen oder humusreichen Böden mit einem gewissen Salzgehalt oberhalb der Flutlinie. Bewohner sind obligate und fakultative Halophyten (siehe Marschwiesen).
Stratiobotanik — beschäftigt sich mit den Veränderungen der Flora unter dem Einfluss des Krieges (IV/1 422). Siehe auch Manöverpflanzen.
Sträucher (frútex, Mehrzahl frútices) — sind Holzpflanzen von meist niederem Wuchs; sie verholzen nur stellenweise und besitzen mehrere gleichhohe Stämmchen, welche sie nach Bedarf ersetzen bezw. vermehren (I/CXIX; VII Fig. 1150).
Stratifizieren — V/2 1000.
Streckungsperiode — I/XXVII.
streifennerviges Blatt — = parallelnerviges Blatt.
Streuewiesen — gehören den Wasserwiesen oder Flachmooren an und werden im Herbst gemäht.
striegelhaarig (strigósus) — mit dicht anliegenden Borstenhaaren bedeckt.
Striemen — siehe Oelstriemen.



Fig. 1151. Scirpus lacustris L. (II, 28). *a* Rhizom einer normalen Pflanze. *b* Pflanze mit „Strömungsblättern".

Strömungsblätter — untergetauchte, flache, langgezogene Blätter von monokotylen Wasserpflanzen, die im Wasser fluten (siehe auch Bandblatt); VII Fig. 1151 b.
Strohtunica — I 268, 333; II 160; III 331; VII Fig. 1155.
Stroma — farblose Grundsubstanz der Chloroplasten (I/XIX).
strophische Reaktion — = topische Reaktion.
Strophomanie — siehe Zwangsdrehung.
Stützblatt — = Tragblatt (I/LXIX).
Stützwurzeln — I/LVII, LX.
Stufe (bezw. Höhen- oder Tiefenstufe) (früher Region geheissen) — = vertikale Gliederung der Flora in den Gebirgen bezw. in den Gewässern.
stufenvag — Pflanzen bewohnen verschiedene Höhenstufen.
stumpfe Blattspitze — I/XCV.
Stylarglied — IV/1 54.
stylopódium — = Griffelpolster.
stylus (Griffel) — I/CXXVIII.
Styluskopf — V/1 590.
sub- oder häufiger **super-** (seltener per-) — in Zusammensetzungen bedeutet nahe oder näher bei einer Art stehend.
subalpine Stufe — Nadelwaldstufe, von der oberen Grenze des Laubwaldes aufwärts bis zur oberen klimatischen Baumgrenze.
subarktische (praeboreale) **Periode** — kühler (2 bis 4° kälter als heute) und trockener, auf das Spätglazial folgende Zeitabschnitt, zugleich erste Periode der Nacheiszeit. Espenperiode.
subatlantische Arten — Pflanzen westeuropäischer (atlantischer) Verbreitung, die weit in den Kontinent vordringen.
subatlantische Periode — feuchter und kühler, auf die subboreale Periode folgender Zeitabschnitt der Nacheiszeit. Buchenperiode. Eisenzeit.
subboreale Periode — warmer und trockener, auf die atlandische Periode folgender Zeitabschnitt der Nacheiszeit. Eichenmischwaldperiode.
subdioezische Pflanzen — eingeschlechtige Pflanzen mit ± rückgebildeten Sexualorganen des einen Geschlechtes (Ribes alpinum, IV/2 652; VII Fig. 1225).
Suberin (Kork) — I/XXV, XXXI.
súbex — = Mittelblattstamm.



Fig. 1152. Aloë Succotrina Lam. (II, 77). Beispiel einer sukkulenten Pflanze. Phot. R. E. Pfenninger, München.

subfossile Pflanzenreste — heissen die in Torfmooren aus verhältnismässig junger Zeit erhalten gebliebenen Reste; sie geben öfters Auskunft über die frühere Ausbreitung von Arten (auch der Wälder und Moore).
submerse Pflanzen bezw. **Formen** — wachsen untergetaucht (III 550, 551 Fig. 687 d, e; V/1 537 Fig. 2016).
subnivale Stufe — Stufe der dauernden Schneeflecken und der vereinzelten Rasenflecken (Pionierrasen).
subnivaler Pionierrasengürtel der Alpen — erstreckt sich von der oberen Grenze des geschlossenen Rasens bis zur klimatischen Schneegrenze.
súbolus (Ausläufer) — V/3 1718.
subruderale Pflanzen — V/2 852.
Subspezies (Unterart, Rasse) — systematische Gruppe (innerhalb der Art), die von der nächstverwandten zwar durch einige wichtige Merkmale abweicht, aber mit ihr durch unverkennbare, nicht hybride Zwischenformen verbunden ist.
subspontane Arten — siehe verwilderte Pflanzen bezw. Kultur- und Gartenflüchtlinge (VII Fig. 1054).
Substrat — Nährboden, Bodenunterlage.
Subzession (Succession) — verfolgt den Wechsel der Pflanzenvereine an einer bestimmten Lokalität.
Succinit — siehe Bernstein.
sukkulente (Saft-)Pflanzen — I/XXXVI; IV/2 512; VII Fig. 1152.
Sumachdermatitis — V/1 219, 220.
Sumpfgasgärung — siehe Cellulosegärung.
Sumpfwiesen (emersipráta) — heissen die von Sumpfpflanzen gebildeten Wasserwiesen.
superponierte Quirle — I/CXXXIV.
Supression — gänzliche Unterdrückung eines Organes.
Suspensor — durch Teilung der befruchteten Eizelle entsteht der Vorkeim. Seine Spitze ergibt den Embryo, der übrige Teil den Embryoträger oder Suspensor (IV/3 1729).
Sutur — Verwachsungsnaht (siehe Früchte).
suturale (Naht-)Hauptrippen — V/2 932.
sylleptische Triebe — V/1 265.

Symbiose — Lebensgemeinschaft, aus der beide Partner Nutzen ziehen. Mutualistische S. bei gleichem Nutzen für beide Teile, Helotismus, wenn der eine Partner wesentlich im Vorteil ist (V/2 895).
symbiotrophe Pflanzen — ernähren sich mit Hilfe von Mykorrhizen, Knöllchenbakterien usw.
Symmetrieverhältnisse der Blüte — I/CXXXIV.
Sympetalae — V/3 1567.
Sympetalie (Verwachsung der Kronblätter) — I/CXVIII; VII Fig. 989 und VII S. 195.
Symphysis — Verwachsung.
Sympodium (Schein- oder Kettenachse) — I/LXXI; I 374.
Synandrie — abnorme Verwachsung der Staubblätter (V/1 498).
Synandrodie — Verwachsung der Staminodien.
Synantherie — Verwachsung der Staubbeutel.
Synanthie — seitliche Verwachsung von zwei oder mehr Blüten bezw. blühenden Pflanzen (IV/1 286; VII Fig. 1153).
Synanthodie — seitliche Verwachsung zweier Blütenköpfchen auf gemeinsamem Stiel oder auf zwei längs verwachsenen Stielen (z. B. bei Taraxacum, Bellis).
Synanthropen — Pflanzen, die durch den Menschen in ein Gebiet gelangt sind (IV/2 69; VII Fig. 1054, 1154, 1165).
Synaptospermie — Samen oder einsamige Früchte werden beim Abfallen portionenweise zusammengekoppelt und durch den Wind verweht (verbreitet bei Wüsten- und Steppenpflanzen, auch bei Circaea Lutetiana, Agrimonia, Onobrychis [IV/3 1488], Medicago minima).
syncárpium (Sammelfrucht) — I/CXLVIII.
Synchorologie — verfolgt die Anordnung der Pflanzengesellschaften im Raum, ihr Vorkommen und ihre Verbreitung.
Synchronologie — verfolgt den Wechsel bezw. die gesetzmässige Aufeinanderfolge der Gesellschaften im Lauf der Zeiten.
Synconus — Bezeichnung für die Frucht der Feige (Ficus).
Syncytium — Zellfusion.
Synergiden (Gehilfinnen) — I/CXLVII.
Syngenesia — XIX. Klasse des Linné'schen Systems (Staubblätter mit dem Griffel verwachsen).
Syngenetik (Gesellschaftsentwicklung) — sucht die Gesetze des Werdens und Vergehens der Pflanzengesellschaften aufzudecken.
Synkarpie — seitliche Vereinigung von 2 oder mehr Fruchtknoten.
synkotyl — Keimblätter sind zu einem einzigen breiten, flachen, „doppelten" Blatt verwachsen.
Synoekologie (Gesellschaftshaushalt) — macht sich das Studium der Abhängigkeitsbeziehungen der Pflanzengesellschaften voneinander und von der Umwelt zur Aufgabe.
Synonyma — Nebennamen.
synsepal (verwachsener Kelch) — I/CXVIII.
Synspermie — Verwachsung von Samen untereinander.
syntepal (verwachsene Blütenhüllblätter) — I/CXVIII.
Synusie — Vereinigung von Individuen einer bestimmten Wuchsform.
synzoisch — Verbreitungseinheiten, welche durch Tiere absichtlich von der Mutterpflanze entfernt und forttransportiert werden (IV/2 574).
Systigma — V/2 852.



Fig. 1153. *a* Garten-Tulpe mit seitlicher Verwachsung (Synanthie) der Schäfte, Blätter und Blüten (*b*).

T.

Tachysporie — III 152; V/4 2262.
Tälchen (Früchte) — V/2 932.
Täuschblumen — II 276.
Täuschfrüchte — einige Früchte und Samen (Calendula, Corispermum, Helleborus usw.) täuschen dem menschlichen Auge Tierformen vor, welche aber für die Biologie der Verbreitung bedeutungslos sind (siehe Mimikry).
Tagfalterblumen — I/CXLV und VII Fig. 1155.
taktische Bewegungen — durch einen Reiz veranlasste freie Ortsbewegungen eines Organismus.
Tannin — siehe Gerbstoffe.
Tannolharze — siehe Esterharze.
Tapeszeit — siehe Litorinazeit.
Tapetenzellen — innerste Reihe der Schichtzellen des Mikrosporangiums (Pollensackes) der Samenpflanzen.
Tapetum — I/CXXIV.

Taschen — IV/2 1056.
taube Früchte — siehe kern- bezw. samenlose Früchte.
taube Samen — II 206.
Tautröpfchen — I/XCIX.
Taxien (Taktismen, taktische Bewegungen) — darunter werden die Orientierungsbewegungen freibeweglicher Organismen zusammengefasst.
Teichschlamm — siehe Gyttie.
Teilfrüchte — V/2, 928, 932 (siehe auch apokarpes Gynaeceum, Merikarpien, Klausen, Pyrenen).
Teilnuss — siehe carcérulus.
Teilungsgewebe (Meristeme, Bildungsgewebe) — I/XXVII.
Teleologie — Lehre von der zweckmässigen Einrichtung der belebten Natur.
tellerförmige (corólla hypocraterifórmis) **Blüte** — Blütehülle mit ziemlich gleichmässig dicker, walzlicher Röhre und mit flachem Saum.
Tentakel — I/CIX.
tenuizellate Samenanlage — V/2 1567.
Tepalen (Perigonblätter) — I/CXVIII.
Teratologie — Lehre von den „teratologischen" Erscheinungen, Monstrositäten, Abnormitäten, Bildungsabweichungen oder Missbildungen, d. h. unvermittelt auftretende Veränderungen einzelner Pflanzenorgane oder Organteile. Siehe auch Gallen (I/LXXVII), gefüllte Blüten, Verlaubung, Wuchsform, Monstrosität (VII Fig. 1156).
Terminalblüte — = Endblüte, ist oft anders gebaut als die Axillarblüten (V/3 Fig. 2626k, l).
Terminalknospe (Endknospe) — I/LXIX.

Fig. 1154. Hemerocallis flava L. (II, 200), Gelbe Taglilie, am Lech unterhalb Augsburg ursprünglich angepflanzt, als Beispiel einer Synanthropenpflanze. Phot. R. E. Pfenninger, München.

Terpene — sind hydroaromatische Kohlenwasserstoffe der allgemeinen Formel $C_{10}H_{16}$, und zwar Derivate eines Cymols, in denen ein oder zwei Doppelbindungen vorhanden sind. Sie finden sich in ätherischen Oelen.
terpenoide Düfte — rühren von ätherischen Oelen her, in denen Terpene und deren sauerstoffhaltige Derivate (Orangenblütenduft) vorkommen.
Terpentin — ist eine Lösung von Terpentinharz in Terpentinöl, gehört zu den Balsamen (I 82, 99, 105, 107; V/1 233).
Tertiär — siehe Geologische Formationen.
Tertiärlikt — IV/2 619.
tertiäres Cambium — III 210.
tésta (Samenschale) — I/XLV, CLIII.
Tetracytie — = Reduktionsteilung.
Tetraden — I/CXXV; IV/2 497; V/2 862.
Tetradynamia — XV. Klasse des Linnéschen Systems (Zwitterblüten mit vier langen und zwei kurzen, freien Staubblättern).
Tetrahybriden — = Quadrupelhybriden.
Tetrakotylen — Keimlinge besitzen 4 Samenlappen.
tetramere Blüten — I/CXXXIV.
Tetrandria — IV. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit vier freien Staubblättern).
tetrarches (vierstrahliges) **Leitbündel** — heisst ein radiales Leitbündel mit vier Xylemstrahlen (I/LXII Fig. 76).
tetrazyklische Blüten — bestehen aus vier Quirlen.

Fig. 1155. Dianthus silvester Wulfen (III, 330), eine xerophil gebaute (Strohtunica), proterandrische Tagfalterblume. Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.

Textur — I 27.
thálamus (Blütenboden) — I/CXVII; siehe auch Rezeptakulum.
Thallophyten — I 2.
Thallophytengürtel (Kryptogamengürtel) — bildet in den Alpen die oberste Unterstufe der Nivalstufe und setzt sich nur aus blütenlosen Pflanzen (Moose, Flechten, Pilze, Algen und Spaltpflanzen) zusammen.
Thallus — ein nicht oder nur unvollkommen in Stamm und Blatt gegliederter Pflanzenkörper (verbreitet bei Pilzen, Flechten und verschiedenen Algen.
théca — I/CXXIII.
Therapie — Lehre von der Heilung von Krankheiten.
thermisch-indifferente Pflanzen — heissen Arten, die an breites Temperaturintervall angepasst sind (= eurytherm).
Thermonastie — IV/3 1398; V/3 1980.
thermophil — wärmeliebend.
Thermophyten — IV/2 415, 515.
Thermotropismus, positiver — Pflanzen schmiegen sich dem warmen Boden an (V/1 32).
Therophyten — einjährige Kräuter ohne Dauerknospen; überdauern nur durch Samen (V/2 928).
Thigmonastie — V/3 1981.
Thigmotropismus — = Haptotropismus oder Kontaktbewegungen.
Thiobakterien (Schwefelbakterien) — VII 136.
Thyllen — I/XC; IV/3 1398, 1657.
Tiefenstufen(-zonen) — siehe Stufe, sowie photische, dysphotische und aphotische Stufe.
Tiefwasserform — VI/1 167.
Tierblütler (Zoidiogamae, Zoidiophilae) — I/CXLIII, CXLIV.
tierfangende Pflanzen — I/CVII; IV/2 500, 509; VI/1 156, 163; VII Fig. 1157.
Tierfrüchter — I/CLIV.
Tierpassage der Früchte bezw. Samen — I/CLIV.
Tonboden — enthält 55 bis 80% Ton (ist deshalb klebrig), 1 bis 10% Kalk und 3 bis 20% Humus.
topische Reaktion — freie Ortsbewegung eines Organismus in der Richtung des Reizes.
Topophysis — V/2 879.
Torf — entsteht da, wo durch Wasseranreicherung Sauerstoffmangel herrscht und die Zersetzung organogener Produkte verhindert.
Torsion — Drehung eines Körpers um seine eigene Achse, wobei der eine Pol in Ruhe bleibt (siehe auch Zwangsdrehung).
Torus (Blütenboden) — I/CXVII. — Andrerseits führt auch der mittlere, scheibenförmige, verdickte Teil der Tüpfel-Schliesshaut diese Bezeichnung.
Torusdrüsen — III 13.
Toxicodermien (Phytonosen) — Erkrankungen durch die Haut und Schleimhaut reizende Pflanzen bezw. Hölzer (V/1 219/220; V/3 1721).
Toxikologie — Wissenschaft der Gifte (siehe dort) und der Vergiftungen.
Toxine — werden solche Giftstoffe (Antigene) bezeichnet, auf deren Injektion der Organismus mit der Bildung von Antikörpern antwortet.
trabéculae (Gewebsstränge) — I 49.
Tracheen — I/XLIII.
Tracheïden — I/XLI, XLIV.
Trägerzellen — IV/3 1137.

Fig. 1156. Abnorme Teilung bezw. Häufung (Agglomeration) der Aehre von Plantago lanceolata L. (VI/1, 183).

Fig. 1157. Sarracenia purpurea L. in „La Tuillerie" oberhalb Vevey am Genfersee angepflanzt. Phot. aus dem Botan. Institut der Univers. Lausanne.

Träufelspitze — I/CII; V/2 784.
Tragblatt (bráctea) — I/CXXXIII, LXIX.
Trampelkletten — harte, spitze Dornen, Hörner, Krallen dienen bei vielen Wüsten- und Steppenpflanzen mit dem Boden aufliegenden Sprossen als Kletterorgane; sie bohren sich leicht in die Füsse von Tieren ein (viele Pedaliaceen, Zygophyllaceen [siehe V/1 41], Chenopodiaceen).
transalpin — jenseits, d. h. südlich der Alpen.
transitorische Stärke — I/XX.
Translatoren — V/3 2058, 2060.
transparente Blüten — siehe Fensterblüten.
Transplantation — heisst die Uebertragung lebender Zellen bezw. Gewebepartien auf eine geeignete lebende Unterlage (siehe auch Pfropfung).
Transspiration — I/XXXV, XLIII (siehe auch kutikulare, stomatäre und relative Transpiration).
Transversalebene der Blüte — I/CXXXIV.
transversalzygomorphe Blüten — I/CXXXV.
Traube (racémus, bótrys) — I/CXXXVII.
Traube, zusammengesetzte — I/CXXXVIII.
Traubenstein (Cystolith) — I/XXV.
Traubenzucker (Dextrose, Glukose) — ist eine Hexose bezw. Aldose (d. h. ein Aldehyd eines 6-wertigen Alkohols).
traumatische Reize — = Wundreize.
Traumatropismus — durch Verletzung bedingte tropistische Krümmungen.
Treiben — siehe Frühtreiben, Forcieren.
Treibfrüchte (Treibsamen, Driftfrüchte) — werden kürzere oder längere Zeit von den Strömungen des Wassers umhergetrieben.
Trennungsphelloide — unverkorktes Trennungsgewebe, welches eine leichtere Ablösung der Borke ermöglicht.
Treppengefäss — siehe Leitbündel.
Triadelphia (Dreibrüderigkeit) — I/CXXIII.
Triandria — III. Klasse des Linné'schen Systems (Zwitterblüten mit drei freien Staubblättern).
triarches (dreistrahliges) **Leitbündel** — I/LXII.
Trias — siehe Geologische Formationen.
Tribus (die) — systematischer Begriff innerhalb der Unterfamilie.
Trichome (Haarbildungen) — I/XXX; IV/2 500; VII 106, Fig. 1139.
Trichomhydathoden — treten gelegentlich als mehrzellige, gekrümmte, plasmareiche Keulenhaare auf der Blattunterseite auf; sie sind als Hydathoden tätig.
Trichoplasten — V/3 1953.
Trichotomie — siehe gabelige Verzweigung.
Trift (Triftgrasflur) — sind Trockenwiesen (der Ausdruck wird neuerdings ausgeschaltet).
Trikotylen (Trikotylie) — besitzen drei völlig getrennte und in gleichen Winkeln stehende Samenlappen (IV/1 286; V/3 1730; VII Fig. 1158).
trimerer Fruchtknoten — I/CXXXIV.
Trimethylamin — gehört zu den tertiären Aminen $N(CH_3)_3$ (III 222).
Trimonoezie — I/CXXXII; V/2 938.
trimorphe Blüten — I/CXLII.
trimorphe Früchte — Pflanzen mit dreigestaltigen Früchten.
Trioekotrimorphie — siehe Heterotristylie.
Trioezie — I/CXXXII.
trioezisch-androgyne Pflanzen — besitzen eingeschlechtige Blüten, die auf dreierlei Stöcke verteilt sind.
trioezische Polygamie — I/CXXXII.
Tripelbastard (ternärer Bastard) — I/CXLIII; III 50, 187; IV/2 561; VI/2 915.
Triplasie (Dreigabelung) — Spaltung eines Organes in drei analoge Gebilde.
triplokaulisch (Triplokaulie) — dreiachsige Pflanzen (V/4 2430).
Trisaccharide — z. B. Raffinose ($C_{18}H_{32}O_{16}$), bilden eine Zwischenform zwischen den Disacchariden und den Polyssacchariden.
Trockenfrüchte — I/CXLIX.
Trockengewicht — entsteht dann, wenn die zu untersuchenden Pflanzenteile bei 100° C bis zur Gewichtssubstanz unter Abgabe von Wasser getrocknet werden.
Trockenpflanzen — siehe Xerophyten.
Trockenschleuderer (Früchte) — V/1 140; V/3 2118.
Trockentorf — ist die oberste, noch wenig vermoderte Rohhumusschicht, welche die einzelnen Pflanzenteile noch ± erkennen lässt.
Trockenwiesen — sind Magerwiesen, die auf einer wenig mächtigen, oft sehr durchlässigen Erdschicht (häufig auf Kiesboden) lagern.

Fig. 1158. Junge Pflanze einer Prunus-Art mit 3 Samenlappen („Trikotylie"). Phot. Dr. Fr. Kollmann, Weilheim.

Tropenweltbürger — siehe Pantropisten.
Trophien — heissen die durch die Lage im weitesten Sinne bedingten Fälle ungleichmässiger Förderung der Gewebe bezw. Organe (siehe Epi-, Hypo-, Iso-, Heterotrophie).
trophisch — = in Beziehung zur Ernährung; Hypertrophie: Ueberernährung, Hypotrophie: Unterernährung.
trophische Stoffe — = Baustoffe.
Trophophylle — unfruchtbare assimilierende Blätter der Farnpflanzen (Gegensatz: Sporophylle).
Trophoplasten — siehe Plastiden.
Trophosporophylle — heissen bei Farnpflanzen die gleichzeitig assimilierenden Organe und Sporangienträger.
Trophotaxis (Trophotropismus) — durch Nährstoffe ausgelöste taktische Bewegungen bezw. tropistische Krümmungen.
Tropismen — heissen die durch einseitige Reize (Orientierungsreize) veranlassten Krümmungsbewegungen (siehe Nastien).
Tropophyten (Wechselpflanzen) — kommen in Gebieten mit abwechselnd feuchtem und trockenem oder kaltem Klima vor.
Trugdolde — I/CXXXIX.
trúncus (Stamm) — I/LXXXIV.
Tryma — Steinfrucht mit abspringendem Epi- und Mesokarp (Walnuss).
tryptische Enzyme (Trypsine) — hydrolysieren sowohl echte Eiweiss-Stoffe als auch Polypeptide.
túber — = Knolle.
tubíllus (Samenhülle) — I 75.
túbus — Röhre bez. Kelchröhre.
Tüpfel — I/XXIV (siehe auch Hoftüpfel).
Tunikagräser — siehe Strohtunica (I 333).
tunikate Zwiebeln — = schalige Zwiebel.
Turgor (Turgeszenz) — Druck des Zellsaftes auf Protoplasmaschlauch und Zellwand (I/XXII).
Turionen (Hibernakeln) — I/LXVI; V/2 809, 897; VI/1 164; VII Fig. 1159.
Tutenblatt — IV/1 246.
tutenförmig — Blatt, dessen Längsränder einander durch Einrollung genähert sind.
Tychoplankter — siehe Zufallsplankter.

Fig. 1159. Austreibender Turio von Potamogeton crispus L. (Stark vergrößert.)

U.

Ubiquisten — heissen Arten, die in verschiedenen Pflanzengesellschaften auftreten.
Uebergangsblätter — siehe Primordialblätter.
Uebergangsmoor — siehe Zwischenmoor.
Ueberliegen — forsttechnischer Ausdruck für gewisse Samen, die oft jahrelang, ohne dass ein Quellungshindernis vorläge, nicht keimen.
Ueberpflanzen — siehe Epiphyten und Gelegenheitsepiphyten.
Ueberwinterungsknospen — IV/3 1678; V/3 2156.
Uferform — IV/1 71.
Uhrfederranken — I/LXXV.
umbélla — = Dolde, einfache u. zusammengesetzte (I/CXXXVIII, VII Fig. 1160).
umbéllula — = Döldchen (I/CXXXVIII; VII Fig. 1160).
umbilícus — = Hilum der Samen.
umgewendete Samenanlage — siehe anatrope Samenanlage (I/CXXXI).
umscheidete (intravaginale) **Triebe** — I 166.
umständige Blüte — = perigyne Blüte.
Umwanderungsblumen — siehe Passiflora (V/1 659).
ungeschlechtliche Generation — = Sporophyt.
ungeschlechtliche (vegetative) **Vermehrung** — I/CLVII (siehe Bulbillen, Ausläufer, Pfropfen).
ungeteiltes Blatt — I/XCIV.
únguis — = Nagel, d. i. der untere schmale Teil der Blütenblätter.
unitegminate Samenanlage — V/3 1567.
Unkräuter — siehe Ruderalflora.
unpaarig gefiedertes Blatt — I/XCV.

Fig. 1160. *a* Typus einer Umbellifere mit zusammengesetzter Dolde. *b* Frucht (Kundmannia Sicula). *c* Querschnitt durch ein Merikarpium.

unsymmetrisch (asymmetrisch) — I/XCV, CXXXV.
Unterart — siehe Subspecies.
unterbrochen-fiederschnittiges Blatt — V/4 2595; VII Fig. 1161.
unterbrochen-gefiedertes Blatt — I/XCVI.
untergetaucht — = submers.
Unterhautgewebe — = Hypoderm.
Unterlage (Wildling) — I/CLVIII.
Unterlippe der Labiaten — V/4 2260.
unterschlächtige Deckung — die obere Kante der Teilblätter ist von der Rückseite betrachtet sichtbar, während die untere Kante durch das unterhalb liegende Teilblatt verdeckt wird.
unterseeische Wiesen — s. Wasserwiesen, submerse Wiesen.
unterständiger Fruchtknoten — I/CXXVIII; VII Fig. 986a
Unterwuchs — siehe Schichtung.
Uovoli — V/3 1940.
Urfeige — siehe Kaprifikation.
Urmeristem — heisst das anatomisch undifferenzierte ursprünglichste Bildungsgewebe.
Urnenblatt — Blatt von Dischidia (V/3 2059 Fig. 3037).
urwüchsig — = einheimisch, spontan.
Urzeugung (generátio spontánea, g. aequivóca) — Entstehung der ersten Organismen aus lebloser Materie.
Utriculus (Fruchtschlauch) — II 5.
Utrikel — VI/1 162.
Uva — Beerenfrucht mit zartem Epikarp.

V.

Vaganten — Ruderalpflanzen, die ihren Standort oft wechseln (V/4 2575).
vagína — = Blattscheide (siehe Gramineen).
Vakuolen (Safträume) — I/XXI.
Vallecularhöhlen (Furchenlücken) — I 51.
Valvarglied — IV/1 54.
valvate Aestivation — siehe Knospendeckung.
var. — Abkürzung für Varietät (s. dort).
Variabilität — Erscheinung, dass die einzelnen Individuen derselben Spezies, selbst dergleichen reinen Linie, unter sich verschieden sind. Sprungweise Variationen bei sehr auffälligen Unterschieden, flukturierende Variabilität bei nur geringfügigen Unterschieden.
Variation — im Sinne der Vererbungslehre bedeutet die Veränderung der Organismen durch Aussen- und Innenbedingungen.
Variationsbewegungen — werden (teils spontan bezw. autonom, teils paratonisch, d. h. auf äussere Reize hin) ohne Wachstum durch Turgorschwankungen bedingt, wobei bei Blättern die Gelenke die Bewegung vermitteln. Solche Bewegungen kommen auch an Staubblättern, Griffeln, Narben vor.
variegátio — = Panaschierung.
Varietät (varíetas) — = Abart, eine systematische Abstufung von geringerem taxonomischen Werte, verglichen mit Art oder Unterart (VII Fig. 1162).



Fig. 1161. Solaum Lycopersicum L. (V/4, 2607), Tomate. Einjähriges Kraut mit unterbrochen-fiederschnittigen Laubblättern und Beerenfrüchten.



Fig. 1162. Veronica verna L. (VI/1, 49) als Beispiel einer stark variierenden, meist zweijährigen Art. Phot. Dr. Fr. Zimmermann, Mannheim.

Vasallenpflanzen — werden durch andere Pflanzen oder durch gewisse Tiere geschützt.
Vasalprimanen — I/XLV.
Vasalteil — I/XLI.
Vectiarien — V/4 2476.
Vegetation — Pflanzenleben, d. h. Abhängigkeit der Flora (siehe dort) von den äusseren Bedingungen, Gruppierung zu bestimmten Gesellschaften, Anpassungserscheinungen.
Vegetationsdauer (jährliche Vegetationsperiode) — umfasst die Zeit vom Erwachen der Vegetation bis zum Eintritt der Vegetationsruhe.
Vegetationsform — siehe Lebensform.
Vegetationskegel (Vegetationsscheitel) — I/LXV.
Vegetationspunkt — I/XXVII, LXIV, LXV.
Vegetationsschichtung — siehe Schichtung.
Vegetationstypus — bildet in der ökologischen Pflanzengeographie die oberste Einheit, wie Gehölze (lignósa), Wiesen (práta), Einöden (desérta) und Plankton.
Vegetationszonen — entsprechen ungefähr den klimatischen Breitenzonen der Erde.
vegetative Mutationen — Mutationen, die während der Entwicklung der Pflanze plötzlich an einem Organ der Pflanze auftreten.
vegetative (ungeschlechtliche) **Vermehrung** — I/CLVII; V/4 2355; VII Fig. 1069. Siehe Ausläufer, Brutzwiebeln.
vegetative Zelle — I/CXLVII.
vegetativer Spross — I/LXIV.
Velamen (Wurzelhülle) — I/LVII.
Ventralseite — = Bauchseite bezw. Unterseite.
Venus-Waschbecken — VI/1 282.
Verbänderung — siehe Fasciation (VII Fig. 1085.).
Verband (= Assoziationsgruppe) — Vereinigung floristisch und soziologisch ± nahe verwandter Assoziationen.
Verbissformen — durch Benagen (Ziegen, Schafe, Rotwild, Hasen) bilden sich bei Holzpflanzen eigenartige, am Grunde oft reichlich verästelte Formen aus (III 99; VII Fig. 1163).
Verbreitungsagentien der Früchte und Samen — hieher Wind, Tiere, Wasser (inkl. Meeresströmungen) usw.
Verbreitungsausrüstungen der Früchte und Samen — als solche kommen Flug- und Häkelapparate usw. in Betracht.
Verdauungsdrüsen — siehe tierfangende Pflanzen.
Verdauungszellen — II 389.
Verdickungsring — = Kambiumring bezw. Kambium.
Verdoppelung — Dédoublement.
Verdunstung (Transpiration) — I/C.
Veredelung — I/CLVIII; IV/2 985.
Verein (Pflanzenverein) — oder Synusie ist jede in der Natur verwirklichte Gemeinschaft von Arten einer bestimmten Lebensformengruppe mit einheitlichen ökologischen Ansprüchen.
vereintblätterig — = gamophyll.
Vererbungsregeln — V/2 862.
Vergeilen — durch mangelhafte oder fehlende Beleuchtung erzeugte übermässig verlängerte, chlorophyllarme Organe (V/4 2600).
Vergrünung (virescéntia) — einfache Farbenänderung von Organen, die blattgrün werden, ohne jedoch die ursprüngliche Gestalt zu ändern.
Verholzung — I/XXVI.
Verjüngungstriebe — VI/1 247.
verkehrteiförmiges Blatt — ist eiförmig bei nach unten gerichteter Spitze.
Verkernung — I/LXXXVIII.
Verkieselung — I/XXV.

Fig. 1163. Verbissform (durch Rehe) einer Fichte. Phot. Dr. Fr. Kollmann, Weilheim (Oberbayern).



Fig. 1164. Daucus Carota L. *a* Normale junge Frucht. *b* Fruchtknoten abnormal oberständig, die beiden Fruchtblätter getrennt, am Rande Samenanlagen tragend. *c* Fruchtblätter in grüne Laubblätter ausgewachsen.

Verlandung — Ueberführung eines offenen Gewässers in Festland, im engeren Sinne Vordringen der rasenbildenden Bodenvegetation vom Ufer nach dem Innern (I 274; II 30; V/2 909).

verlaubte Hülle — V/2 1524.

Verlaubung (Phyllodie, Phyllomorphie, frondescéntia) — Ersetzung verschiedener, nicht laubblattartiger Organe (Brakteen, Kelch, Krone, Staub- und Fruchtblätter) durch wirkliche Laubblätter (siehe auch Chloranthie). I/CXVII; V/1 138; V/2 1305, 1453 Fig. 2555; V/3 1729; VI/1 291; VII Fig. 1164.

Vernation — siehe Knospenlage.

versatile Anthere — I/CXXIII, 169.

Verschleimung — I/XXVI; V/4 2262, 2268, 2270, 2376; VI/1 194.

Verschleppungskletten — siehe Wollkletten.

Versprossung — siehe Prolifikation.

Versteinerungen — = Fossilien, Petrefakten.

verticillástrum (Scheinquirl) — V/4 2259.

Vertikalstellung — I/CIII.

Vertikalstellung der Blätter — I/XCIII; siehe auch Kompasspflanze.

Vertrittpflanzen — II 43, 156.

verwachsenes Blatt — I/XCVI.

verwachsene Staubblätter — I/CXXIII.

Verwandtschaftsreaktionen — serologische Methoden (Präzipitation, Konglutination), die zum Nachweis phylogenetischer Beziehungen von Organismen dienen (IV/3 1644).

Verwesung — ein der Fäulnis ähnlicher Vorgang bei welchem aber die stoffliche Umwandlung bei Luftzutritt durch aërobe Mikroorganismen ohne Bildung übelriechender Stoffe vor sich geht.

verwilderte Pflanzen (subspontane Arten) — aus der Kultur entflohene (siehe Kultur- und Gartenflüchtlinge) Arten (VII Fig. 1165).

Fig. 1165. Crocus albiflorus Kit. (II, 299), eingebürgert am Zavelstein bei Calw (Württemberg), ursprünglich aus den Alpen stammend. Phot. Forstrat O. Feucht, Stuttgart.

Verzweigungssysteme — 1. der Spross teilt sich an der Spitze in 2 gleichwertige Seitenäste (dichotome Verzweigung);

2. der Spross wächst weiter und erzeugt Seitenzweige (seitliche oder monopodiale Verzweigung);

a) der Hauptast dominiert über die Seitenzweige und übernimmt die weitere Verzweigung (racemöse Verzweigung).

b) die Seitenäste dominieren über den Hauptzweig und übernehmen die weitere Verzweigung (cymöse Verzweigung). Siehe auch pseudodichotome Verzweigung (V/2 1096). Ueber die Verzweigung bei Blütenständen siehe I/CXXXVI.

Verzwergung — siehe Nanismus.

vexíllum — siehe Fahne.

Viehläger — siehe Lägerpflanzen.

vielehige (polygame) **Blüten** — zwitterige und eingeschlechtige Blüten befinden sich auf derselben Pflanze.

vielgabelige Trugdolde (Pleiochasium) — I/CXXXIX.

vielköpfige Rhizomstaude — das perennierende Organ ist ein vielköpfiges Rhizom.

Vielliebchen — Früchte mit überzähligen Samen (III 75; IV/2 1088, 1090).

Vierlingskörner — = Pollentetraden.

viermächtige Staubblätter (Tetradynamia) — von den sechs Staubblättern sind vier länger als die beiden andern (siehe Cruciferae).

vikariierende Formen — schliessen sich in ihrer Verbreitung gegenseitig aus (III 369, 532; V/2 2010).

virescéntia — siehe Vergrünung.

Vitamine — sind lebensnotwendige Stoffe, die in der gemischten Nahrung normalerweise in Spuren vorkommen, deren Fehlen aber im lebenden Körper schwere Ausfallerscheinungen oder Avitaminosen hervorruft. Besteht die Nahrung von Versuchstieren aus künstlichen Gemischen von reinen, vitaminfreien Nährstoffen, so treten schwere Störungen auf, die mit gewissen auch beim Menschen beobachteten Krankheiten weitgehend übereinstimmen. Die Vitamine spielen daher sowohl für die Volksernährung wie für die Massnahmen des Arztes eine grosse Rolle. Bis jetzt kennt man drei fettlösliche (A, D, E) und zwei wasserlösliche (B, D) Vitamine.

Das Vitamin A findet sich in der Butter, im Fett, Lebertran, Eiweiss, seltener aber in grünen Pflanzen, vor allem aber in der Gelben Rübe. Seine Wirkung ist eine antixerophtalmische; sein Fehlen führt zu einer Austrocknung der Augenhornhaut (Xerophtalmie) und zu einem Stillstand des Wachstums. In Dänemark hat man Augenerkrankungen beobachtet, die mit dem starken Butterexport des Landes zusammenhängen und durch Verabreichung von Vollmilch und Lebertran zur Heilung gebracht werden konnten.

(Vitamine)

Von Euler und Karrer fanden im Jahre 1929 auf Grund ihrer gemeinsamen Untersuchungen, dass nach ihrer chemischen Struktur bereits erkannte Pflanzen-Farbstoffe, wie das Carotin (V/2 1525) von Daucus Carota, das ein ständiger Begleiter des Chlorophylls ist, und das mit Wasserstoff hydrierte Crocetin (II 298) des Safrans (Crocus sativus) die Wirkung des Vitamins A zeigen. Die beiden Forscher nehmen an, dass Carotin selber, und nicht etwa ein Begleitstoff, die Grundsubstanz dieses Vitamins sei, und zwar vermuten sie, dass ein aus dem Carotin nach seiner Resorption im Darm entstehender Stoff als Wachstumsfaktor wirke.

Noch grösseren Erfolg hatte die Wissenschaft beim Vitamin D, das die „englische Krankheit", die Rachitis, verhindert. Es findet sich auch im Lebertran und scheint in bestimmter Wechselwirkung mit dem Vitamin A zu stehen. Durch Bestrahlen von pflanzlichen und tierischen Fetten mit ultraviolettem Licht kann es erzeugt werden; doch darf nicht übersehen werden, dass eine solche Bestrahlung von Nahrungsmitteln dafür andere Vitamine vernichtet. Schon Ende 1926 konnten Windaus und Pohl zeigen, dass eine dem Cholesterin im Verhältnis 1 : 6000 spurenweise anhaftende Verunreinigung, das Ergosterin, durch ultraviolette Strahlen in das antirachitische Vitamin D übergeführt werden kann. Es wird daher technisch bereits in grossen Mengen hergestellt und hat in der Medizin unter dem Namen „Vigantol" starke Verbreitung gefunden. Es ersetzt Kuren mit Lebertran.

Ueber das Vitamin E ist bis jetzt nur wenig bekannt; sein Fehlen soll nach amerikanischen Autoren bei Tieren zur Sterilität führen.

Der Mangel an antineuritischem Vitamin B ruft die in Asien weitverbreitete Beriberi-Krankheit hervor. Dieses Vitamin kommt in den Reisschalen vor und wird beim Polieren des Reises entfernt. Im Jahre 1927 ist es Jansen und Donath gelungen, aus der Reiskleie einen kristallisierten Stoff von der Formel $C_6H_{10}ON_2$ zu isolieren, von dem Spuren genügen, um die bei Vögeln experimentell erzeugte Beriberi-Krankheit zum Verschwinden zu bringen. Dieses Vitamin B findet sich auch in der Hefe vor. Das Hefepräparat Marmite ist daher ein Träger dieses Vitamins.

Fig. 1166. Chlorophytum Sternbergianum Steud. Unfruchtbarer Spross mit Adventivsprossen (echte Viviparie).

Das Vitamin C verhindert das Auftreten des Skorbuts. Es findet sich in der Natur überall da, wo ein lebhaftes Wachstum stattfindet, in grösster Menge in Zitronen und Apfelsinen. Die schädliche Wirkung von überreichlichem Konservengenuss kann daher mit frischem Obst hintangehalten werden. Sicheres über die chemische Natur dieses antiskorbutischen Vitamins ist zurzeit noch nicht bekannt.

Die Vitamine zeigen eine ähnliche Wirkung wie die Hormone; beide können in kleinsten Mengen wirken, also eine Art katalytischen, enzymatischen oder fermentativen Einfluss auf den Stoffwechsel ausüben (Prof. Rob. Huber, Zürich).

Viviparie, echte — Bildung von vegetativen, abfallenden und selbständig entwicklungsfähigen Organen (Laubsprosse, Knöllchen, Bulbillen) an Stelle von Blüten und Früchten (I 171, 244, 308, 310; VII Fig. 1177, 1166.) (Juncus alpinus, Allium- und Lilium-Arten, Chlorophytum [VII Fig. 1166], Polygonum viviparum [III 197], Saxifraga-Arten usw.). Siehe auch Pseudoviviparie, Verlaubung und Vergrünung.

Vlies (Samen) — V/1 460.

Vogelblütler — I/CXLIV (siehe Ornithophilie und Fig. 1120, 1167).

Vollkugelkissen — IV/1 413.

Vollmast — als solche wird bei Laub- und Nadelhölzern die Entfaltung der Blüten in bestimmten Zeitabständen (siehe Sprengmast) benannt.

Vorblätter (bractéolae) — zwischen Deckblatt und Blüte am Blütenspross stehende Blätter, bei Dikotylen zwei, bei Monokotylen eins (wohl durch Verwachsung von zwei entstanden). Siehe I/CX, CXXXIII; V/4 2259; VI/I 279.

Vorhof — siehe Spaltöffnungsapparat.

Vorkeim — siehe Prothallium (I 3).

Vorläuferspitze — I/CII; II 387.

vormännlich — siehe Proterandrie (I/CXLI).

Vorspelze — I 169.

vorweiblich — siehe Proterogynie (I/CXLI).

W.

Wachs — I/XXVII; III 11.

Wachsausscheidungen — I/CIV.

Wachsblätter — unbenetzbare, mit einem Wachsüberzug versehene Blätter ombrophober Pflanzen.

Wachsstreifen — I 83.

Wachstum — I/XXVII.

Wachstumsbewegungen — Lageveränderungen von Pflanzenteilen, die auf ein verschieden starkes Wachstum einzelner Organteile zurückzuführen sind.

Wachstumsgeschwindigkeit — der in der Zeiteinheit erfolgte Zuwachs der Längeneinheit.

Wachstumskorrelationen — gegenseitige Beeinflussung verschiedener Organe in ihrem Wachstum.

Wachsüberzug (Glauzeszenz) — I 167.

Wälder (silvae) — heissen Gehölze (siehe dort!), bei denen Bäume vorherrschen.

Wärmestarre — Zustand, in dem infolge zu hoher Temperatur die Bewegungserscheinungen eingestellt sind.

Waisen (Vollwaisen) — werden solche Bastarde bezeichnet, deren Eltern (paréntes) heute in der Umgebung des Bastardes fehlen (siehe Halbwaisen).

Fig. 1167. Protea pallens aus Südafrika, Beispiel einer ornithophilen Blüte (Vogelblüte).

Waldgrenze (obere) **im Gebirge** — Verbindungslinie der obersten Endpunkte des zusammenhängenden Waldes und Waldstreifen (entspricht, sofern sie nicht durch den Menschen herabgedrückt wird, am nächsten der klimatischen Waldgrenze).

Waldschlagpflanzen — siehe Schlagpflanzen.

Waldzeugen (Baumzeiger) — Baumstrünke in der heute baumlosen alpinen Stufe oder in Mooren sind Beweise einer ehemaligen grösseren bezw. höher reichenden Waldvegetation (V/3 1677).

wandbrüchige Kapsel — siehe septifrage Kapsel.

Wanderassoziation — V/1 550.

Wanderfaktoren — ermöglichen die Wanderung der Pflanzen durch ihre Früchte, Samen, Sporen, Bulbillen usw.; siehe Verbreitungsausrüstungen, Verbreitungsagentien, Wanderungshindernisse.

Wanderknospen — siehe Turionen.

Wanderpflanzen — V/2 808; V/3 1591.

Wanderrasse — V/1 144; VI/2 785.

Wander-Rhizomstauden — besitzen ein kriechendes Rhizom (Speicherorgan).

Wandertriebe — siehe Schuttwanderer und Rhizomstaude.

Wanderungshindernisse — bilden für die Ausbreitung Meeresarme, Bergketten, Wüsteninseln, Engpässe usw.

wandspaltige Kapsel — siehe septizide Kapsel.

wandständige (parietale) **Samenanlage** — I/CXXX.

Warmbad — V/3 1915.

Warnfarbe — V/2 944.

Warngeruch — V/2 944.

Wasserblatt — III 578 Fig. 704 (siehe auch Heterophyllie).

Wasserblüte, echte (See- oder Haffblüte) — die Wasseroberfläche besonders ruhiger Seen wird zu gewissen Zeiten durch massenhaftes Auftreten verschiedener Algen (Oscillatoriaceae, Nostocaceae; VII 136) intensiv (zuweilen grün oder blutrot) gefärbt und wird trübe.

Wasserblüte, falsche — siehe Schwefelregen, Pollenwasserblüte.
Wasserblütler (Hydrophílae) — I/CXLIII.
Wasserdrüsen — = Hydathoden.
Wasserform — III 550, 551 Fig. 687 d, e; V/2 899, 907, 1153; V/3 2531; VI/1 195.
Wasserfrüchtler — I/CLVI; IV/2 891, 982.
Wassergehalt — Differenz zwischen dem Gewicht der Trockensubstanz und dem ursprünglichen Gewicht der Pflanze bezw. der Pflanzenteile.
Wassergewebe — I/XXXVI; II 265; III 255 Fig. 556.
Wasserkapazität — heisst die Fähigkeit des Bodens, Wasser aufzunehmen und kürzere oder längere Zeit festzuhalten.
Wasserkelch — V/4 2560, 2562, 2614.
Wasserkletten — verschiedene Wasserpflanzen (Zostera, Ruppia) besitzen an den Früchten bezw. Samen Klettorgane, die der epizoischen Verbreitung durch Wassertiere dienen können (siehe auch Ankerkletten).
Wassernäpfe — VI/1 282.
Wasserpflanzen — I/CI; VII Fig. 1144.
Wasserporus — I 121; VI/1 164.
Wasserreiser — brechen aus den Stämmen oder Aesten der Linden, Weiden, Eichen, Ulmen, Obstbäumen usw. hervor und besitzen oft eigenartige (vergrösserte) Laubblätter.
Wasserreservoir — V/1 282, 496.
Wasserschwimmer — freischwimmende Wasserpflanzen.
Wasserspalten (Hydathoden) — I/XCVIII; IV/2 831 h bis k; IV/3 1726; V/3 1721 Fig. 2720 b.
Wasserstoff-Ion — ist der positiv geladene Wasserstoffatomkern, ein einfach gebautes und äusserst bewegliches Ion, das die physiologischen Vorgänge im Pflanzenkörper stark beeinflusst. So sind u. a. die Enzymwirkungen (Diastase, Cytase) von der Wasserstoffionenkonzentration abhängig. Letztere wird auch zur Charakterisierung der Bodentypen herangezogen.
Wasserstoffionenkonzentrationsgrad — V/3 1618.
Wasserstoff-Zahl und der **Wasserstoff-Exponent** p_H. — Die Wasserstoffzahl gibt die Konzentration, die Menge der Wasserstoffionen und damit auch der Hydroxylionen in wässerigen Lösungen an. Denn, ob diese neutral, sauer oder alkalisch sind, stets hat es H-Ionen und OH-Ionen nebeneinander und sind ihre Mengen eng miteinander verknüpft. Während 1 Liter reines neutrales Wasser von beiden Ionen je 10^{-7} (d. i. $1:10^7$) Grammäquivalente enthält (also $10^{-7} \cdot 1{,}008$ g Wasserstoffionen und $10^{-7} \cdot 17{,}008$ g Hydroxylionen), wiegen in den sauren Lösungen die H-Ionen vor (10^{-6} bis 10^{-1}), während die OH-Ionen zurücktreten (10^{-8} bis 10^{-14}). Bei den basischen oder alkalischen Lösungen ist es gerade umgekehrt. Multiplizieren wir aber die die Wasserstoffionenmenge kennzeichnende Zahl mit der Hydroxylionenzahl, so erhalten wir nicht nur beim neutralen Wasser, sondern auch bei den sauren und basischen Lösungen stets den Wert 10^{-14} (d. i. $1:10^{14}$), z. B.: 10^{-7} $10^{-7} = 10^{-14}$; $10^{-5} \cdot 10^{-9} = 10^{-14}$; $10^{-3} \cdot 10^{-11} = 10^{-14}$; $10^{-1} \cdot 10^{-13} = 10^{-14}$. Die Wasserstoffionen- und die Hydroxylionenmengen sind also zueinander gerade umgekehrt proportional und wenn man daher die Konzentration der einen, wie der Wasserstoffionen, angibt, so ist damit auch die Menge der andern bestimmt. Die negativen Zahlen -1, -2, bis -13, -14 sind die Logarithmen der Ionenmengen und daher auch der Wasserstoffzahl. Da $10^{-a} = 1:10^a$ ist, schlug Sörensen vor, statt der Wasserstoffzahl selber ihren negativen Logarithmus, also die positiven Zahlen 1 bis 14, zur Kennzeichnung des Säuregrades, der Azidität, und damit auch der Basizität einer Lösung zu verwenden. Er nannte diese Zahlen die Wasserstoff-Exponenten und bezeichnete sie kurz mit p_H. Heute wird aber dieser Sörensensche Exponent von einzelnen Forschern selber als die „Wasserstoffzahl" bezeichnet, so auch von Braun-Blanquet in seiner „Pflanzensoziologie". Diese „Wasserstoffzahl", d. h. der Wasserstoff-Exponent, ist also eine Mass- oder Reaktionszahl, mit welcher der Säuregrad des Erdbodens ausgedrückt werden kann. Denn jedes Bodenwasser besitzt ein ihm eigenes p_H, seine „Eigenreaktion", die normalerweise durch äussere Einflüsse nicht verändert wird und für die Organismen von grosser Bedeutung ist. (Prof. Robert Huber, Zürich).
Wasserwiesen, submerse (supmersipráta) — werden von makrophytischen, flutenden Wasserpflanzen gebildet, deren Laubsprosse sich unter Wasser (z. B. Zostera, Sargassum) oder auf der Wasseroberfläche befinden.
Wasserwiesen — sind Frischwiesen, die stark vom Grundwasser beeinflusst werden.
Wasserwurzler — wurzelnde Wasserpflanzen.
Wasserzuleitung — I/LV.
Wechselbefruchtung — siehe Dichogamie.
wechselständige Blätter — I/LXXIV.
Wedel — Bezeichnung für Cycas-, Farn- und Palmblätter.
Wegmarkierung — siehe Saftmale.
weibliche Blüten — I/CXXXII; V/1 190 Fig. 1801 f; V/1 203, Fig. 1809 c.
Weichbast — I/XLIII.
Weichselzopf — V/2 1453.
Weichstamm — siehe Pisangstauden.

Weiden (Schaf-, Ziegen-, Galtvieh-Weiden) — heissen regelmässig vom Gross- und Kleinvieh abgeweidete, nichtgemähte Strecken (VII Fig. 1168).

Weidenrosen — III 16.

Weingeist — ist ein einwertiger Alkohol, Aethylalkohol C_2H_5OH (V/1 414).

Weinsäure — IV/3 1130; V/1 415; VI/1 237, 239.

weissblätterige Pflanzen — siehe Panaschierung.

Weissfleckigkeit — siehe Panaschierung.

Welken — Schlaffwerden des Pflanzenkörpers infolge Sinkens des Zellsaftdruckes bei zu starker Verdunstung (Transpiration).

Wendeltreppenblätter — V/1 665.

Wespenblumen — I/CXLV; IV/2 688.

Wickel (cincínnus) — I/CXL; IV/3 1658, 1670.

Wickelranke — IV/3 1506; VI/1 316.

Widerhakenstacheln — siehe Glochiden (V/2 680).

widerhakig (glochídeus) — Borsten sind an der Spitze mit rückwärtsgerichteten Haken versehen.

Wiesen — Pflanzengesellschaften, ausgezeichnet durch eine auffallend regelmässig wiederkehrende Zusammensetzung von vorwiegend ausdauernden Mesophyten, durch die geschlossene „Grasnarbe", durch das Fehlen von Holzpflanzen und von ein- oder zweijährigen Arten (VII Fig. 1099, 1116).

Fig. 1168. Ligusticum (Meum) Mutellina (L.) Crantz (V/2, 1322), als Beispiel einer bodenvagen Wiesen- und Weidepflanze.

Wiesenmoor (Gras-, Grün-, Nieder-, Flach-, Kalk-Niedermoore, paludipráta, madidétum) — bilden sich besonders auf Alluvial- und Diluvialböden und sind vom Grundwasserspiegel (das Wasser ist reich an Kalk und Kali) abhängig. Der durch das Wasser bedingte Luftabschluss lässt die absterbenden Teile vertorfen. Die Hauptmasse bilden Cyperaceen und Juncaceen; Sphagneen fehlen (VII Fig. 1169).

Fig. 1169. „Wiesenmoor" (Dachauermoor bei München). Im Vordergrund Juncus obtusiflorus Ehrh., im Wasser Potamogeton coloratus Hornem. Phot. Dr. G. Hegi, München.

Wildheuplanken — heissen ungedüngte Grasbänder und Abhänge der Alpen, die nicht regelmässig gemäht werden.

Wildling — siehe Unterlage (I/CLVIII).

Windblätter — VI/1 513.

Windblütler (Anemophilae, Anemogamae) — I/CXLIII, CXLIV.

Windblumen — als solche werden diejenigen Windblütler bezeichnet, die zufolge einer gewissen Augenfälligkeit gelegentlich auch Insektenbesuch erhalten.

Windecken-Zwergstrauchheide — V/3 1683.

Winden (Zyklonastie) — nennt man die Fähigkeit der Schlingpflanzen in schraubenförmigen Windungen (ohne Berührungsreiz) an einer senkrechten Stütze emporzuklettern (siehe Rechts- und Linkswinder).

windende Sprosse — I/LXXXV; V/3 2092.

Windepflanzen (Lianen) — krautartige Pflanzen (VII Fig. 1114) und Holzgewächse bezw. Holzlianen (VII Fig. 1170); die sich aufrechtbewegenden Achsen wachsen durch rotierende Nutation schraubenartig um dünne Stützen empor. Reizbarkeit fehlt im Gegensatz zu den Rankenpflanzen (I/CXXV; III 512).

Windfrüchtler — siehe Anemochorie (I/CLIII; II 186).

windgescherte Bäume (Fahnenwuchs) — heftig den Winden ausgesetzte Bäume sterben zufolge von Vertrocknung an der Luvseite ab, während die auf der Leeseite befindlichen Teile am Leben bleiben. Dadurch kommen (besonders an Küsten und auf Berggipfeln) einseitig entwickelte Baumformen zustande (VII 52, Fig. 1084).

Windpolster (Winderosionspolster) — sind in der Richtung des Windes angefressen, von der Seite, von vorn oder in der Mitte, je nach der Lage, dem orographischen Schutz des Polsters und dem Einfall des Windes.

windstiller Raum bei Blättern — siehe Rollblatt (I/CIII).

windstiller Raum bei Blüten — hat bei Kesselfallenblumen (Araceen) für kleine Fliegen eine gewisse Anziehungskraft.

winter-annuell — Keimung erfolgt im Herbst, Weiterentwicklung im kommenden Frühjahr.

Winterblätter — II 139.

wintergrün (immergrün) — I 76.

Winterknospen (Hibernakel, Turionen) — I/LXVI; V/3 1867; VI/1 164; VII Fig. 1159.

Winterknospen, unechte — III 450.

Winterruhe — starke Einschränkung der Lebensäusserungen während des winterlichen Klimas (besonders infolge der Trockenheit): Laubfall, Knospenschutz usw.

Winterständer — V/4 2262.

Wintersteher — V/4 2262.

Winterxerophyten — werfen im Winter die Blätter ab und besitzen meist durch Kork geschützte Zweige.

Wirrzöpfe — III 16.

Wirtel — = Quirl (I/LXXII).

wirtsholde Schmarotzer — bevorzugen gewisse Nährpflanzen (VI/1 149, 154).

wirtsstete Schmarotzer — sind auf ganz bestimmte Nährpflanzen angewiesen (VI/1 139, 147, 152, 154).

wirtsvage (pleioxene, pleiovage, plurivore) **Schmarotzer** — heissen solche, welche auf verschiedenen Nährpflanzen leben (VI/1 134).

Woll-(Filz-)haare — sind verhältnismässig lange Epidermisgebilde, die einen dichten, grauen oder weissen Filz bilden (VI/1 452 Fig. 228; VII Fig. 1106).



Fig. 1170. Aristolochia macrophylla Lam. (= A. Sipho L'Hérit.), Pfeifenstrauch, Pfeifenwinde (III, 162). *a* Windender Strauch („Holzliane") mit Blüten. *b*, *c* Fruchtkapsel. *d* bis *g* Samen.

Wollkletten (Verschleppungskletten) — Klettfrüchte (bezw. -samen), die an der Wolle oder am Federkleide von Tieren haften bleiben und dadurch verschleppt werden (IV/3 1272; VII Fig. 1141).

Wollspinne — siehe Harpagophyton (VI/1 176).

Wucherungen — I/XC.

Wuchs-Abänderungen (Wuchsformen) — es werden unterschieden: 1. spontane erbliche Abänderungen, die vereinzelt unter der Normalform ohne nachweisbare äussere Ursache auftreten (lúsus) und 2. induzierte, nichterbliche, individuelle Abänderungen (fórmae), die durch äussere Einflüsse bedingt werden, so auf mechanischem Wege durch Verbiss (VII Fig. 1163), Schneiteln, Verlust des Gipfeltriebes (VII Fig. 1171), durch wiederholtes Erfrieren, Schneebruch, durch Ernährungs- und Bodeneinflüsse (I 88, 100, 106; VII Fig. 1171). Siehe auch Lebensform.

Wuchsenzyme — hypothetische Stoffe (angeblich enzymatischer Natur), welche die Blüten- und Gallenbildungen beeinflussen sollen.

Wuchsform — siehe Lebens- und Vegetationsform (IV/2 569).

Würm-Eiszeit — vierte (letzte) Eiszeit. (Siehe Geologische Formationen.)

Wundholz — Holz, das durch Ueberwallung von Verletzungen aus einem neugebildeten Kambium entsteht. Es ist reich an isodiametrischen Zellen, aber arm an faserförmigen Zellen.

Wundkork — I/XXXII.
Wurzel — I/LI; II 173; V/2 1158.
Wurzel (Arbeitsteilung) — V/2 918.
Wurzelausläufer — V/2 817.
Wurzelbrut — aus schlafenden Augen des Wurzelstockes sich entwickelnde Reiser bezw. Pflänzchen (II 206; V/2 739; V/4 2564).
Wurzeldornen — I/LIX.
Wurzeldruck — das durch die Wurzel aufgenommene Wasser wird im Stamme emporgepresst.
Wurzelfasciationen — stellen gewisse Orchideenknollen dar.
Wurzelfechser — III 132; IV/1 307.
Wurzel-Gewebesysteme — I/LXI.
Wurzelhaare — I/LIII, LXI.
Wurzelhaube — I/LII, LIV; V/2 1142.
Wurzelhaut (Rhizodermis) — heisst die ein- oder mehrschichtige Oberhaut der Wurzel, welche entwicklungsgeschichtlich aus dem Protoderm hervorgeht und zur Aufnahme von Wasser und Nährsalzen dient.
Wurzelhülle — siehe Velamen.
Wurzelkletterer — I/LX; V/2 916, 918 (siehe auch Wurzelranker).
Wurzelknöllchen — I/LVI; III 86; V/2 736; V/3 1116, 1187.
Wurzelknollen — I/LVIII; III 544; IV/3 1588, 1593; VII Fig. 970.
Wurzelknospen — V/2 1021; V/3 1575, 1591.
Wurzelranker — klettern mit Hilfe der kontaktreizbaren Luftwurzeln (epiphytische Orchidaceen [z. B. Vanille] und Araceen).
Wurzelrosetten — I/LXVII.
Wurzelscheide (Coleoptile) — I 170.
Wurzelschmarotzer (geophyta parasitica) — die Ueberdauerungsknospen befinden sich unterirdisch, sind in der Wirtspflanze verankert (Orobanche usw.).
Wurzelsprosse — gehen aus Adventivknospen hervor (siehe additionelle und reparative Wurzelsprosse): Cirsium arvense, Sonchus arvensis, Rumex Acetosella.
Wurzelstock (Grundachse, Rhizom) — I/LXXIX; VII Fig. 1067, 1097, 1132, 1151 b.
Wurzelverkürzung — I/LXI.
Wurzelwanderer — V/3 1591.
Wurzelzopf — III 94.

Fig. 1171. Lärche (Larix decidua Mill.), mehrwipfelige Wuchsform. Bei Verlust des Gipfelsprosses richten sich die Seitenzweige auf.

X.

Xanthophyll — kristallisierbare Oxydationsstufe des Carotin von der Formel $C_{40}H_{56}O_2$ · (I/XIX, XXI).
Xenogamie (Fremdbestäubung) — I/CXLI.
Xenokarpie — Resultat der erfolgreichen Xenogamie.
Xerochasie — V/2 1171.
Xerokleistogamie — die Blüten bleiben zufolge zu geringer Wasserzufuhr geschlossen.
Xeromorphie — strukturelle Schutzmittel gegen Trockenheit.
xerophil (xerotisch, xerisch) — trockenheitliebend.
Xerophyten — Trockenpflanzen mit geringen Feuchtigkeitsansprüchen (I/CI, CII; IV/3 1195, 1214; VII Fig. 1172). Siehe auch Pseudoxerophyten.
xerophytische Paravarianten — heissen die verschiedenartigen Einrichtungen zum Trockenheitsschutz.
xerotherme (aquilonare) **Periode** — Wärmeperiode, die früher in eine wärmere Interglazialzeit, später ins Postglazial (Gschnitz-Daun-Interstadialzeit) verlegt wurde.
xerotherme Relikte (Steppenrelikte) — sind Kolonien meist trockenheit- und wärmeliebender Pflanzen, die als Beweis eines kontinentalen Klimas (Steppen- oder xerotherme Periode) angesehen werden.
x-Generation — = Haploïdgeneration oder Gametophyt.
Xylem (Gefässteil) — I/XLI, XLIV.

Y.

Yoldiazeit (Yoldiameer) — wird in Norddeutschland die erste Nacheiszeit mit arktischem Klima bezeichnet. Die Ostsee ist mit dem Eismeer verbunden und ist salzig. Bezeichnend ist die arktische Muschel Yóldia Árctica.

Z.

Zapfen — I/CXXXVIII.

Zapfen der Coniferen (stróbilus, cónus) — sind Samenstände mit zahlreichen, schraubig, gegenständig oder wirtelig angeordneten, voneinander gesonderten, verholzenden Deckschuppen, welche auf der Ober- oder Unterseite oder in ihrer Achsel die öfters geflügelten Samen tragen (viele Nadelhölzer und Cycadaceen).

Zapfenschuppe — I/CXVII; I 77.

Zapfensucht — wird das Auftreten von abnorm vielen weiblichen Blüten an Stelle der männlichen oder an Stelle der Kurztriebe bei Coniferen (so häufig bei der Kiefer) bezeichnet.

Zechstein — siehe Geologische Formationen.

zeitlicher Dimorphismus — siehe Pleiontismus.

Zeitstauden (Etesiae) — die oberirdischen Organe sind nur zu gewissen Zeiten vorhanden.

Zelle (céllula) — I/XVIII.

Zellenpflanzen — I 2; VII 135.

Zellfusion — Verschmelzung von Zellen erfolgt bei der Befruchtung, bei der Bildung von Tracheen und Milchröhren.

Zellgewebe — I/XXVII.

Zellhaut — I/XXIV.

Zellkern (núcleus) — I/XVII.

Zellkernteilung — siehe Karyokinese.

Zellkolonie — siehe Coenobium.

Zell-Lumen — I/XXVIII.

Zellmembran — I/XXIV.

Zellsaft — I/XXI.

Zellstoff (Cellulose) — I/XXIII.

Zellteilung — I/XVIII.

zelluläres Endosperm — die Membranbildung erfolgt gleich nach den ersten Kernteilungen.

Fig. 1172. Asplenium Ceterach L., Krätzfarn (I, 26), als Beispiel eines xerophilen Farns. Phot. Dr. G. Weisenbeck, München.

Zellulose — Sammelname für hochkondensierte Kohlenhydrate (bezw. für einen dreiwertigen Alkohol von der Formel $[C_6H_{10}O_5]$), die sich nur in ammoniakalischer Kupferoxydlösung (Schweitzer's Reagens) leicht und rasch lösen und durch Bakterien vergoren werden. Zellulose ist eine kristallisierte Substanz und tritt in der Form von sehr kleinen faserigen Kristallen (Kristallite) auf.

Zellulosegärung (Sumpfgasgärung) — wie andere Kohlenhydrate wird Zellulose ohne Gegenwart von Sauerstoff zu Kohlensäure, Wasserstoff und Methan (Sumpfgas) zersetzt.

Zellwandbildung — erfolgt gewöhnlich im Verein mit der Kernteilung, indem die Spindelfasern in der Aequatorialplatte anschwellen und die Membran ausscheiden. Bei Vielzellbildung (z. B. Embryosäcke der Angiospermen) bilden sich erst viele Kerne, um die sich dann gleichzeitig (simultane Bildung) oder nacheinander (succedane Bildung) Zellwände entwickeln.

Zentralhöhle (der Equisetaceae) — I 51.

Zentralkern — I/CXVII.

Zentralplazenta — I/CXXX; III 271, 277, 301; V/3 1724.

zentralwinkelständige (axile) **Plazentation** — I/CXXX.

Zentralzylinder — I/LXI, LXII.

zentrifugale Blütenstände — siehe cymöse Infloreszenzen.

zentripetale Blütenstände — = botrytische Infloreszenzen.

Zerklüftung des Holzkörpers — I/XCII; III 508.

zerstreute Blattstellung — siehe wechselständige Blattstellung (I/LXXII).

zerstreutporiges Holz — I/LXXXVII.

Zeugung — siehe Fortpflanzung und Befruchtung.

Zeugungsverlust — siehe Apomixis, Apogamie und Parthenogenesis.

Ziegenfeige — siehe Kaprifikation (III 126).

Zimtsäure — siehe Säuren.

Zinkpflanzen — IV/1 425; V/1 608; V/3 1890.

Zirkulation des Plasmas — I/XXI.

zirkumpolar — siehe circumpolar.
Zoidiogamae — = Zoidiophilae (Tierblütler).
Zoidiophilae (Tierblütler) — I/CXLIII.
Zonen — horizontale Gliederung der Erde nach der Vegetation.
zoobiotische Faktoren — Wirkungen der Tiere (Bestäubung und Verbreitung) auf die Pflanzen.
Zoocecidien — heissen die durch Tiere (Milben, Würmer usw.) erzeugten Gallen (VI/2 965).
Zoochorie (Tierfrüchtler) — Verbreitung der Früchte bezw. Samen durch Tiere (I/CLIV; II 186).
Zoodomatien — von Tieren (Milben, Ameisen) bewohnte Domatien.
Zoogamae — Pflanzen mit selbstbeweglichen Befruchtungskörpern (viele Kryptogamen).
zoogen — unter Mitwirkung der Tierwelt oder des Menschen entstanden.
Zoomorphosen — siehe Phytomorphosen.
zoophob — Anpassungen der Pflanze, die als Schutz gegen Tierfrass dienen (mechanische und chemische Schutzmittel).
zosteroides Blatt — siehe Bandblatt.
Zotten — V/1 57.
Zottenschuppen — I/LXV.
Zuchtrassen — durch Selektion veredelte Kulturrassen.
Zucker — I/XXII (siehe auch Kohlenhydrate).
Zuckerblätter — erzeugen im Gegensatz zu den Stärkeblättern nie oder nur unter günstigen Assimilationsbedingungen Stärke (V/3 1956).
Zufallsplankter (Tychoplankter) — Planktonorganismen, die durch Zufall (Strömungen) vom Ufer oder Grund ins offene Wasser hinausgeschwemmt werden.
Zufallssämlinge — III 97 (siehe Mutation).
Zugfestigkeit — I/XXXVIII, XL.
Zugwurzeln — I/LXI.
Zungenblüten — Randblüten der Kompositen (I/CXXII, CXXXVIII).
zusammengesetzte Aehre — I/CXXXVIII.
zusammengesetzte Dolde — I/CXXXVIII.
zusammengesetzte Traube — I/CXXXVIII.
zusammengesetzter Holzkörper — I/XCII.
zusammengesetztes Laubblatt — I/XCV.

Fig. 1173 A. Betula nana L., Zwerg-Birke (III, 80), als Beispiel eines sommergrünen Zwergstrauches. Phot. G. Eigner Speyer.

Zuwachszonen — siehe Jahresringe.
Zwangsdrehungen (Torsionen, Spiralismus, Strophomanie, Biastrepsis) — werden an Pflanzen mit gegen- oder wirtelständigen Blättern sichtbar, wenn an diesen die Blätter in spiraliger Stellung stehen, jedoch am Grunde, wie bei normalen Pflanzen, miteinander verbunden bleiben.
Zwangsschmarotzer — sind obligate Schmarotzer, die nur als solche leben können.
Zweiblattkeimer — siehe Dikotyledones (I 3; II 5; VII 165).
zweibrüderig — diadelphisch (I/CXXIII).
zweifächeriger (dimerer) **Fruchtknoten** — I/CXXVIII.
Zweigdornen — I/LXXXIV.
zweigeschlechtige Blüten — führen beide Geschlechter; sind zwitterig.
Zweigsucht — V/4 2591.
Zweihäusigkeit (Dioezie) — I/CXXXII; V/1 128.
zweijährige Pflanzen — I/LXVIII.
zweimächtige Staubblätter — von den 4 Staubblättern sind 2 länger und 2 kürzer (siehe Cruciferae).
zweizeilige Blattstellung — I 166.
Zwergform — III 552.
Zwergsträucher (VII Fig. 1173 A) — bis ½ m hohe Sträucher, die ihre Spross- und Blattorgane öfters dauernd behalten (siehe Halbsträucher).

Zwergstrauchgürtel der Alpen — als solcher wird die zweite Unterstufe der eu-alpinen Stufe bezeichnet; sie erstreckt sich von der oberen Grenze des Krummholzes bis zur oberen Grenze der Alpenrose.
Zwergstrauchheide — wird in den Alpen vorwiegend aus zwergigen Ericaceen gebildet.
Zwiebel (búlbus) — I/LXXXII; II 243.
Zwiebelbrut — siehe Brutknöllchen.
Zwischenband (connectívum) — I/CXXII.
Zwischenmoor (Uebergangs- oder Mischlingsmoore) — sind vorübergehende (labile) Erscheinungen von meist geringer Ausdehnung, sind sehr oft die Vorläufer von Hochmooren, lagern häufig auf Flachmooren, gehen häufig aus Molinieten hervor und vereinigen Wiesen- und Hochmoorcharakter.
Zwischenwanddrüsen — die Ablagerung des Sekretes erfolgt in den die Sekretzellen trennenden Zwischenwänden.
Zwischenzähne (Kelch) — V/2 741.
Zwitterblüten — I/CXXXI.
zwitterige (monokline) **Blüten** — I/CXXXI.
Zwitterreife — = Homogamie.
zygomorphe Blüten — I/CXXI, CXXXIV.
zyklische Blüten — I/CXXXIII.
zyklische Symbiose — V/3 1715.
Zyklonastie — siehe Winden.
Zyma (Scheinquirl) — V/4 2255.
Zymasen — Gärungsenzyme.
zymogene Bakterien — Gärungserreger, können gleichzeitig auch pathogen oder chromogen sein.
Zytokinese — = Zellteilung.
Zytoplasma = Zellprotoplasma im engeren Sinn (ohne Kern und Plastiden).



Fig. 1173B. Auskeimender Samen an der Mutterpflanze (Typha latifolia L.).

Fig. 1173C. Bestand von Rohrkolben (Typha latifolia L.). Phot. Dr. G. Hegi, München.

3. Systematische Übersicht

Seite 135—213

Unsere Heilpflanzen

ihre Geschichte und ihre Stellung in der Volkskunde. Ethnobotanische Streifzüge von **Prof. Dr. H. MARZELL.** Mit 38 Abb. Geh. Mk. 4.—, gebd. Mk. 5.—.

Wenn überhaupt jemand berufen war, über die Beziehungen der Pflanzenwelt zur Volkskunde, zu Glauben und Aberglauben, Sprache und Sitte zu schreiben, so war es Professor Marzell, der auch zur Hegischen Flora viele kulturhistorische, mundartkundliche und volksmedizinische Beobachtungen beigetragen hat. Er ist heute zweifellos der beste Kenner dieser botanisch wie volkskundlich gleich interessanten Gebiete. Sein Buch über die Heilpflanzen enthält vieles, was im Rahmen der Hegischen Flora nicht untergebracht werden konnte, es ergänzt daher die Flora in ausgezeichneter Weise. Marzell ist fern von dem erhabenen Standpunkt, daß die manchmal merkwürdig anmutenden Ansichten des Volkes über die Heilkraft oder über die Gefährlichkeit vieler Pflanzen nur eines wohlwollenden Lächelns wert seien. Er geht überall an Hand der Quellen den Dingen auf den Grund und fördert dabei wichtige volkskundliche Tatsachen ans Licht, die z. T. bisher der Aufmerksamkeit der Volkskundler entgangen waren.

J. F. LEHMANNS VERLAG / MÜNCHEN 2 SW

3. Systematische Übersicht der Hauptgruppen des Pflanzenreiches.

In den letzten Jahrzehnten, also auch seit dem Erscheinen des Werkes im Jahre 1906, hat das wissenschaftliche Pflanzensystem, entsprechend den grossen Fortschritten der Systematik, bedeutende Wandlungen durchgemacht. Waren es ehedem allein oder doch fast ausschliesslich morphologische Tatsachen, ganz besonders solche der Blütenmorphologie, welche zum Aufbaue eines wissenschaftlichen Systems sowie zum Erkennen und zum Beschreiben der Einheit verwendet wurden, so erkannte man bald, dass die Systematik ihre Aufgabe nur dann richtig erfüllen kann, sofern sie auch die übrigen Richtungen der wissenschaftlichen Botanik zur Mithilfe heranzieht. Vor allem ist es die Anatomie, also die Lehre vom inneren Bau des Pflanzenkörpers, welche imstande ist, für die stammesgeschichtliche Forschung und für die Systematik (siehe Juncus, Cyperaceae, Lilium) brauchbare Beiträge zu liefern, dann die Zytologie, Embryologie, Physiologie, Palaeobotanik, Phytochemie und Pflanzengeographie. In neuerer Zeit hat dann die sog. „Serodiagnostik" für die Verwandtschaftsforschung eine gewisse nicht zu unterschätzende Bedeutung erlangt (vgl. hierüber den Stammbaum Bd. IV/3 1643 Fig. 1608).

In der folgenden Übersicht sind die neuen Ergebnisse der systematischen bezw. der monographischen Forschungen nach Möglichkeit verwertet worden. Allerdings wurde im Allgemeinen — von Ausnahmen (siehe u. a. Pilze) abgesehen — das Engler'sche System beibehalten. Aus diesem Grunde erscheinen denn auch die Monokotyledonen nach wie vor „vor" den Dikotyledonen, ebenso die Tricoccae innerhalb der Reihe der Geraniales und nicht unter den Monochlamydeen. Immerhin ist bei den einzelnen Familien wiederholt auf die Stellung in anderen Systemen (v. Wettstein, Mez, Hallier, Fleischer usw.) hingewiesen worden.

Diese Übersicht soll auch die Unterlage für Pflanzensammlungen (Herbarien) bilden, aus welchem Grunde auch die Kryptogamen — wenigstens in den Hauptformen — miteinbezogen worden sind. Bei den Pteridophyten und Phanerogamen erscheinen die in der mitteleuropäischen Flora vertretenen Familien in grösserem Druck, die einheimischen Gattungen gesperrt. Verschiedene Gründe machten es unmöglich, auch auf die Arten und Unterarten usw. einzugehen. Diese werden deshalb in einer Sammlung am zweckmässigsten innerhalb der Gattung alphabetisch geordnet. Im Interesse der Übersichtlichkeit konnte den noch immer etwas strittigen Nomenklaturregeln nicht streng nachgelebt werden. Dagegen ist, einem wiederholt geäusserten Wunsche nachkommend, den lateinischen Namen soweit wie immer möglich eine, wenn auch zuweilen etwas gekünstelte deutsche Bezeichnung beigegeben worden. Neue Beobachtungen und Ergänzungen von Standorten konnten aus Raumersparnis nur in geringem Masse berücksichtigt werden; dasselbe gilt für die Textbilder.

A. Plántae celluláres (= Cryptógamae celluláres). Zellenpflanzen (I 2).

I. Abteilung Schizóphyta. Spaltpflanzen.

1. Klasse Schizomycétes. Spaltpilze (Bakterien).

1. Reihe Eubactéria. Echte Bakterien.

Familien: **Bacteriáceae.** Stäbchenbakterien (Bactérium [IV/3 1117, 1167; VII 44] — Bacíllus inkl. Clostrídium [V/4 2604] — Pseudómonas [IV/3 1117 V/3 1943]). — **Spirilláceae.** Schraubenbakterien (Spirosóma — Microspíra z. T. Víbrio — Spirillum — Spirochäte, Schlingentierchen). — **Phycobacteriáceae** (= Chlamydobacteriáceae), Fadenbakterien (Phragmidióthrix — Chlamydóthrix — Gallionélla — Crenóthrix, Brunnenfaden — Clonóthrix — Sphaerótilus [= Cladóthrix] — Zoogloëa). — **Actinomycétes.** Strahlenpilze (Actinómyces). — **Coccáceae.** Kugelbakterien (Streptocóccus). — Micrococcus inkl. Nitrosocóccus) [V/1 400; VII 115] — Leucocýstis — Sárcina — Azotobácter (VII 115) — Planocóccus — Planosárcina). — **Myxobacteriáceae** (Polyángium — Chondrómyces — Myxocóccus).

2. Reihe **Thiobactéria.** Schwefelbakterien.

Familien: **Beggiatoáceae** (Beggiatóa — Thióthrix). — **Rhodobacteriáceae** (Lamprocýstis — Thiosárcina — Rhodobacíllus — Thiospiríllum — Chromátium).

2. Klasse **Schizophycéae.**

(Cyanophycéae, = Myxophycéae). Spaltalgen.

Familien: **Oscillatoriáceae** (= Lyngbyáceae) (Oscillatória [= Oscillária], Schwingfaden — Lýngbya — Heliótrichum — Arthrospíra — Spirulína — Phormídium — Hydrocóleum — Microcóleus) — **Scytonematáceae** (Plectonéma — Scytonéma — Tolypóthrix — Hydrocorýne — Diplócolon). — **Stigonematáceae** (= Sirosiphonáceae) (Mastigocóleus — Mastigocládus — Hapalosíphon — Stigonema). — **Nostocáceae.** Gallert-Spaltalgen (Nóstoe [V/2 896], Rosenkranzalge — Nodulária — Anabáena — Aphanizómenon — Cylindrospérmum (Aulosíra — Michrochaéte — Desmonéma). — **Rivulariaceae.** Spitzhaar Spaltalgen (Leptochaéte — Amphíthrix Stomoeóthrix — Calóthrix — Rivulária — **Chroococcáceae** (Chroocócus — Synechocóccus — Gloeocápsa — Gloeothéce — Aphanocápsa — Aphanothéce — Microcýstis — Clathrocýstis — Coelosphaérium — Merismopédia, Teiltäfelchen — Holopédium — Tetrapédia — Oncobýrsa) — **Chamaesiphonáceae.** Zwergschlauch-Spaltalgen (Xenocóccus — Hyélla — Clastídium — Chamaésíphon).

II. Abteilung Myxomycétes (= Phytosarcodína, = Myxothallophýta, = Mycetózoa). Schleimpilze, Pilztiere.

1. Klasse **Acrasiáles.**

Familien: **Guttulináceae** (Copromýxa — Guttulína). — **Dictyosteliáceae** (Dictyostélium — Acrasis — Polyphondýlium).

2. Klasse **Myxogastéres.**

1. Reihe **Ectosporéae.**

Familie: **Ceratiomyxáceae** (Ceratiomýxa).

2. Reihe **Endosporéae.**

Familien: **Liceáceae** (Lícea — Tubulína — Lindbládia) — **Clathroptychiáceae** (Enterídium — Clatroptýchium) — **Cribrariáceae** (Dictýdium — Cribrária). — **Trichiáceae** (Perichaéna — Ologonéma — Arcýria — Lachnólobus — Lycógala — Tríchia — Prototríchia — Hemiarcýria). — **Reticulariáceae** (Reticulária — Siphoptýchium — Amaurochaéte). — **Stemonitáceae** (Enertheréma — Lamprodérma — Comátricha — Stemonítes) — **Brefeldiáceae** (Breféldia). — **Spumariáceae** (Diachéa — Spumária, Kuckucksspeichel). — **Didymiáceae** (Didýmium — Lepidodérma — Chondriodérma). — **Physaráceae** (Cienkówskia — Tilmádoche — Leocárpus, Glanzstäubling — Cratérium, Becherstäubling — Physárum, Blasenstäubling — Fulígo [= Aethálium], Russling, Lohblüte).

III. Abteilung Flagellátae. Geisselträger.

1. Reihe **Pantostomatáles.**

Familien: **Holomastigáceae** (Multicília). — **Rhizomastigáceae** (Actinomónas — Pteridímonas — Mastigamœba — Dimorphá — Cercobódo).

2. Reihe **Distomatáles.**

Familie: **Distomatáceae:** Gyrómonas — Trepómonas — Hexamítus — Uróphagus — Megástoma — Spironéma.

3. Reihe **Protomastigáles.**

Familien: **Ocimonadáceae** (Occómonas — Leptómonas — Platythéca — Herpetómonas). — **Bicoeáceae** (Bicœca — Poteriodéndron). — **Craspedomonadáceae** (Codonosíga — Protospóngia — Salpingœca — Diplosíga). — **Phalansteriáceae** (Phalanstérium). — **Monadáceae** (Mónas — Anthophýsa). — **Bodonáceae** (Bódo — Phyllómitus — Oxýrrhis). — **Amphimonadáceae** (Amphímonas — Diplomíta — Rhipidodéndron). — **Trimastigáceae** (Dallingéria — Elviréa — Trimástix — Cóstia) — **Tetramitáceae** (Costiópsis — Tetramítus — Collodíctyon — Trichómonas — Polymástix — Trypanosóma).

4. Reihe **Chrysomonadáles.**

Familien: **Chromulináceae** (Chromulína — Chrysamœba — Pedinélla — Hydrúrus, Wasserschwanz — Chrysopýxis — Mallómonas). — **Hymenomonadáceae** (Hymenómonas — Derepýxis — Synúra — Chlorodésmus — Syncrýpta). — **Ochromonadáceae** (Ochrómonas — Dinóbryon — Hyalóbryon — Urogléna).

5. Reihe **Cryptomonadáles.**

Familie: **Cryptomonadáceae** (Chilómonas — Botryómonas — Cryptómonas).

6. Reihe **Chloromonadáles.**

Familie: **Chloromonadáceae** (Vacuolária — Chloramœba — Rhaphidómonas — Merótricha — Thaumatomástix).

7. Reihe **Euglenáles.**

Familien: **Euglenáceae** (Eugléna — Phácus — Trachelómonas — Eutréptia — Cryptogléna). — **Astasiáceae** (Astásia — Distígma — Menoídium). — **Peranematáceae** (Euglenópsis — Peranéma — Heteronéma — Tropidoscýphus — Notosolénus — Anisonéma — Metanéma — Entosíphon — Dinéma).

IV. Abteilung **Dinoflagellátae** (= Peridináles, = Cilioflagellátae). Furchengeisselträger[1]).

Familien: **Gymnodiniáceae** (Hemidínium — Amphidínium — Sporodínium — Pyrocýstis — Pouchétia). — **Prorocentráceae** (Cenchrídium — Exuviælla — Prorocéntrum) — **Peridináceae** (Glenodínium — Ptychodíscus — Cerátium — Goniódoma — Peridínium (= Vorticélla) — Amphídoma — Oxytóxum — Dinophýsis — Ornithocércus — Histionëis — Citharístes).

Die Gruppe **Silicoflagellátae** mit den Familien **Dictyocháceae** und **Ebriáceae** gehört wahrscheinlich auch zur Abteilung IV.

V. Abteilung **Bacillarióphyta.** Stabalgen.

Familie: **Bacillariáceae** (= Diatomáceae). Kieselalgen.

A. **Centrícae.**

Unterfamilien: Discoídeae (Melosíra — Discosíra — Endíctya — Stephanopýxis — Sceletonéma — Antelminéllia — Cyclotélla — Coscinodíscus — Liradíscus — Stictodíscus — Arachnoidíscus — Actinoptýchus — Aulacodícus — Aulíscus) — Solenioídeae (Coréthron — Laudéria — Rhizosolénia — Cylindrothéca) — Biddulphioídeae (Chaetóceras — Bacteriástrum — Ditýlium — Lithodésmium — Tricerátium — Biddúlphia — Zygóceros — Isthmia — Hemiaúlus — Anaúlus — Terpsínoe — Porpeía — Euódia).

B. **Pennátae.**

Unterfamilien: Fragilarioídeae (Rhabdonéma — Tabellária — Diatomélla — Grammatóphora — Licmóphora — Meridion — Plagiográmma — Diátoma — Fragilária — Sýnedra — Asterionélla — Ceratonéis — Eunótia — Actinélla) — Achnanthoídeae (Achnánthes — Campylonëis — Cocconëis, Schildalge) — Naviculoídeae (Navícula, Schiffchenalge — Schizonéma — Pinnulária — Vanheúrckia — Amphipleúra — Pleurosígma — Gomphonéma — Cymbélla — Amphóra — Epithémia — Stauronëis — Rhopalódia — Bacillária — Nítzschia) — Surirelloídeae (Cymatopleúra — Suriélla — Campylodíscus, Krummscheibe).

VI. Abteilung **Conjugátae.** Jochalgen.

Familien: **Mesotaeniáceae** (Spirotænia — Mesotænium — Cylindrocýstis). — **Desmidiáceae.** Bandalgen (Pénium — Clostérium — Pleurotænium — Docídium — Cosmárium — Holacánthum — Staurástrum, Kreuzstern — Euástrum — Micrastérias — Sphaerozósma — Desmídium — Hyalothéa). — **Zygnemataceae** (Zygnéma, Jochfaden — Spirogýra, Schraubenalge — Debárya — Zygogónium). — **Mesocarpáceae** (Mougeótia — Gonatonéma).

VII. Abteilung **Chlorophýceae.** Grünalgen.

1. Klasse **Protococcáles.**

1. Reihe **Volvocáles** (= Phytomonadínae).

Familie: **Volvocáceae** (Chlamydómonas — Pithíscus — Sphaerélla — Chloráster — Haematocóccus — Polýtoma — Coocómonas — Phacótus — Gónium — Stephanosphæra — Pandorína — Eudorína — Vólvox, Kugeltierchen).

2. Reihe **Euprotococcáles.**

Familien: **Tetrasporáceae** (Chlorángium — Dactylocóccus — Apiocystis — Tetraspora — Palmodáctylon — Chlorosphæra). — **Botryococcáceae** (Botryocóccus — Dictyosphærium). — **Pleurococcáceae** (Palmo-

[1]) Eine neue Einteilung haben neuerdings A. Koford und O. Swezy aufgestellt.

díctyon — Palmophýllum — Pleurocóccus). **Protococcáceae** (Chlorocóccum — Chlorochýtrium — Endosphá — Halosphǽra — Chlorélla — Charácium — Codíolum). — **Botrydiáceae** (= Hydrogastráceae) (Botrýdium — Protosíphon). — **Oocystáceae** (Eremosphǽra — Oocýstis). — **Ophiocytiáceae** (Ophiocýtium). — **Hydrodictyáceae** (Pediástrum, Zellensternchen — Coelástrum — Sorástrum — Hydrodíctyon, Wassernetz). **Coelastráceae** (Scenedésmus — Coelástrum — Ankistrodésmus).

2. Klasse Ulotricháles (= Conferváles).

Familien: **Ulváceae** (Monostróma — Úlva, Meersalat — Letterstédtia — Enteromórpha, Darmtang — Jlea). — **Ulotricháceae** (Ulóthrix, Kraushaaralge — Hormídium — Binucleária — Micróspora — Tribonéma [Confærva] — Uronéma — Bumilliéra). — **Blastosporáceae** (Prasíola) — **Chaetophoráceae** (Stigeoclónium — Draparnáldia, Pinselalge — Chaetóphora — Ctenocládus — Endoclónium — Gomóntia — Entodérma — Herpoposteíron — **Trentepohliáceae** (Chroolepidáceae) (Trentepóhlia — Gongrosíra — Microthámnion — Phycopéltis — Dermatophýton — Cephaleúros). — **Chaetopeltidáceae** (Chaetopéltis). — **Aphanochaetáceae** (Aphanochǽte). — **Coleochaetáceae** (Coleochǽte). — **Cylindrocapsáceae** (Cylindrocáspa) — **Oedogoniáceae** (Oedogónium — Bulbochǽte, Knollenborste).

3. Klasse Siphonocladáles.

Familien **Valoniáceae** (Valónia — Dictyosphǽria). — **Siphonocladáceae** (Chamædoris — Siphonocládus — Struvéa — Microdíctyon — Anadyómene). — **Dasycladáceae** (Polyphýsa [Australien] — Acetabulária — Dasycládus — Cymopólia). — **Cladophoráceae** (Uróspora — Chaetomórpha — Rhizoclónium — Cladóphora — Spongocládia — Pithóphora). — **Sphaeropleáceae** (Sphaeróplea).

4. Klasse Siphonáles. Röhrenalgen.

Familien: **Bryopsidáceae** (Bryópsis, Mooswall). — **Caulerpáceae** (Caulérpa — Chlorodíctyon). — **Derbesiáceae** (Derbésia). — **Phyllosiphonáceae** (Phyllosíphon — Phytophýsa). — **Codiáceae.** Schwammtange (Penicíllus — Udótea — Haliméda, Meerkette — Códium). — **Vaucheriáceae** (Vauchéria). — **Geosiphónaceae** (Geosíphon).

VIII. Abteilung Charóphyta (= Charáles). Armleuchtergewächse.

Familie: **Charáceae** (Nitélla — Tolypélla — Tolypellósis — Lamprothámnus — Lychnothámnus — Chára).

IX. Abteilung Phaeóphyta (= Phaeophýceae). Braunalgen, Brauntange.

1. Reihe Ectocarpáles.

Familien: **Ectocarpáceae** (Ectocárpus — Lithodérma — Phycocélis — Strelonéma — Pleurocládia — Ascocýclus). — **Mesogloeáceae** (Castagnéa — Mesogloía — Chordária). — **Corynophlaeáceae** (Myriáctis). **Myrionematáceae** (Myrionéma — Rálfsia). — **Elachistáceae** (Elachísta — Symphoricóccus — Leptonéma — Halóthrix). — **Spermatochnáceae** (Spermatóchnus — Stilóphora). — **Desmarestiáceae — Sporochnáceae** (Nereía — Sporóchnus — Carpomítra). — **Punctariáceae** (Desmótrichum — Punctária). — **Scytosiphonáceae** (Phyllítis — Scytosíphon). — **Dictyosiphonáceae** — (Dictyosíphon). — **Asperococcáceae** (Myriotríchia — Striária — Asperocóccus). — **Hydroclathráceae** — **Giffordiáceae** (Giffórdia).

2. Reihe Sphacelariáles.

Familie **Sphacelariáceae** (im Meer). (Battérsia — Sphacélia — Sphacelária — Chaetópteris — Cladostéphus, Seequirl — Halópteris — Stypocaúlon).

3. Reihe Cutleriáles.

Familie: **Cutleriáceae** (Zanardínia — Cutléria).

4. Reihe Laminariáles.

Familien: **Laminariáceae.** Blatt-Tange (Phyllária — Saccorrhíza — Adenocýstis — Alária, Flügeltang — Thalassiophýllum — Laminária — Costária — Lessónia — Postélsia — Nereocýstis — Arthrothámnus — Macrocýstis — Egrégia). — **Chordáceae** (Chórda, Meersaite).

5. Reihe Tilopteridáles.

Familie: **Tilopteridáceae** (Tilópteris — Haplóspora — Scaphóspora). Hierher wohl auch Christocárpus Discosporángium.

6. Reihe **Fucáles.**

Familien: **Durvilleáceae** (Durvíllea). — **Fucáceae.** Leder-Tange (Himanthália — Fúcus, Tang — Ascophýllum, Knotentang — Bifurcária — Cystoseíra, Blasenkette — Cystophýllum — Halidrys — Turbinária — Carpophýllum — Sargássum, Beerentang).

7. Reihe **Dictyotáles.**

Familie **Dictyotáceae** (Spatoglóssum — Taónia — Pádina — Dictyópteris — Dictyóta, Netztang — Dílophus).

X. Abteilung Rhodóphyta (= Rhodophýceae). Rotalgen, Rottange.

1. Klasse **Bangiáles.**

Familien **Bangiáceae** (Bángia — Porphýra, Porphyrtang — Erythrotríchia) — **Rhodochaetáceae** (Rhodochaéte, im Mittelmeergebiet). — **Compsopogonáceae** (Compsópogon).

2. Klasse **Florídeae.**

1. Reihe **Nemalionáles.**

Familien. **Lemaneáceae** (Lemánea — Tuomeýa — Sterrocládia) — **Helminthocladiáceae** (Batrachospérmum, Froschlaichalge — Chantránsia — Nemálion — Helminthocládia — Helimthothóra — Liagóra). — **Thoreáceae** (Thórea). — **Chaetangiáceae** (Scinaía — Galaxaúra — Actinotríchia — Chaetángium). — **Gelidiáceae** (Gelídium, Gallerttang). — **Wrangeliáceae** (Wrangélia — Atractóphora — Naccária — Bonnemaisónia).

2. Reihe **Cryptonemiáles.**

Familien: **Gloiosiphoniáceae** (Thuretélla — Schimmelmánnia — Gloiopéltis — Gloiosiphónia). — **Grateloupiáceae** (Halyménia — Grateloúpia — Cryptoménia). — **Dumontiáceae** (Dumóntia — Dudresnaýa — Dasyphlœa — Dilséa). — **Nemastomatáceae** (Calosiphónia — Plátoma — Schizyménia — Neurocaúlon — Furcellária — Barthóldia — Nemástoma). — **Rhizophyllidáceae** (Polyídes — Chondrocóccus — Rhizophýllis — Contarínia). — **Squamariáceae** (Rhododíscus — Petrocélis — Cruória — Cruoriópsis — Peyssonélia). — **Corallináceae.** Kalk-Rotalgen (Schmitziélla — Choreonéma — Lithophýllum — Lithothámnion — Amphiróa — Corallína, Korallenmoos — Hildebrándia [Stellung zweifelhaft]).

3. Reihe **Gigartináles.**

Familien: **Acrotyláceae** (Küsten von Südafrika und Australien) — **Gigartináceae.** Kerntange (Chóndrus, Knorpeltang — Gigartína — Phyllóphora — Gymnogóngrus — Calophýllis — Meredíthia). — **Rhodophyllidáceae** (Cystoclónium — Catenélla — Riscélla — Euthóra — Rhodophýllis — Soliéria — Eucheúma).

4. Reihe **Rhodymeniáles.**

Familien **Sphaerococcáceae** (Sphaerocóccus — Chondryménia — Gracilária — Calliblépharis — Hypnéa). — **Rhodymeniáceae** (Gloiocládia — Rhodyménia — Halichrýsis — Chrysyménia — Lomentária — Chylocládia — Plocámium, Kammtang).

5. Reihe **Ceramiáles.**

Familien: **Ceramiáceae** (Lejolísia — Spermothámnion — Griffíthsia — Halúrus — Monóspora — Pleonospórium — Callithámnion, Schönstrauch — Plumária, Meerfeder — Ptilóta, Federtang — Antithámnion — Spyrídia — Cerámium, Horntang — Microcládia). — **Rhodomeláceae** (Lauréncia — Chóndria — Alsídium, Baumtang — Polysiphónia — Rhodoméla — Odonthália — Herposiphónia (= Trichothámnion) — Halópithys — Rytiphlœa, Runzelfaden — Heterosiphónia — Dásya). — **Delesseriáceae** (Nitophýllum, Prachtblatt — Delesséria).

XI. Abteilung Eumycétes (= Fúngi). Echte Pilze[1]).

1. Klasse **Archimycétes** (= Myxochytridiáles).

Familien: **Olpidiáceae** (Olpídium — Olpidiástrum). — **Synchytriáceae** (Synchýtrium, inkl. Pycnochýtrium, IV/4 2604; V/3 1741). — **Plasmodiophoráceae** (Plasmodióphora, IV/1 251) — Tetramýxa — Sorodíscus — Sorosphæra). — **Woroniniáceae** (Olpidiópsis — Woronínia — Rozélla).

[1]) Die Anordnung erfolgt nach Gäumann, Ernst. Vergleichende Morphologie der Pilze. Jena 1926.

2. Klasse **Phycomycétes** (= Leucozoospóreae). Algenpilze, Pilzalgen.

1. Ordnung **Chytridiáles.**

Familien: **Rhizidiáceae** mit den Unterfamilien: Rhizophidíeae (Rhizophídium póllinis [A. Br.] Zopf auf Pinus-Pollen in stehenden Gewässern — Rhizidiómyces — Zygorhizídium) — Entophlýcteae (Diplophlýctis) — Harpochytríeae (Harpochýtrium) — Chytridíeae (Dangeárdia — Chytrídium) und Rhizidíeae (Rhizídium — Sporophlýctis — Polýphagus). — **Hypochytriáceae** (Macrochýtrium). — **Cladochytriáceae** (Cladochýtrium — Nowakowskiélla — Physodérma — Urophlýctis [IV/3 1264]).

2. Ordnung **Oomycétes.** Eipilze.

Familien: **Monoblepharidáceae** (Monoblépharis). — **Blastocladiáceae** (Gonapódya — Blastocládia — Iaraía). — **Ancylistáceae** (Ancylístes — Lagenídium — Myzocýtium — Ectrogélla). — **Saprolegniáceae** (Saprolégnia — Isoáchlya — Áchlya — Aphanómyces — Dictýuchus — Aplánes — Leptómitis — Apodáchlya — Rhipídium — Araióspora — Pythiópsis). — **Peronosporáceae** (Pythiógeton — Pythiomórpha — Thraustothéca — Pýthium — Phytóphthora [Ph. inféstans (Monti) De Bary, V/4 2603] — Albúgo [= Cystópus, IV/1 366, 477] — Basidióphora — Scleróspora — Plasmópara [Pl. vitícola Berl. et De Toni, V/1 420] — Brémia — Peronóspora [IV/2 812; V/3 1741].

3. Ordnung **Zygomycétes.** Jochpilze.

Familien: **Mucoráceae.** Schimmelpilze, mit den Unterfamilien: Mucóreae (Múcor, Kopfschimmel — Rhizópus — Parasitélla — Absídia — Phycómyces — Sporodínia) — Pilobóleae (Pilóbolus, Hutwerfer, Pillenträger) — Cephalídeae (Choanéphora — Cunninghamélla — Blakesléa — Syncephalástrum — Syncéphalis — Piptocephalis) — Chaetocladíeae (Thamnídium — Chaetocládium) und Mortierélleae (Mortierélla). — **Endogonáceae** (Endogéne — Sclerocýstis — Glaziélla). — **Entomophthoráceae** (Coniodióbolus — Delacroíxia — Completória — Empúsa, Fliegentöter — Entomóphthora). **Basidiobolaceae** (Basidióbolus).

3. Klasse **Ascomycétes.** Schlauchpilze.

I. Unterklasse Hemiásci (=Protascíneae). Ur-Schlauchpilze.

1. Ordnung **Endomycetáles.**

Familien: **Dipodascáceae** (Dipodáscus). — **Endomycetáceae** (Eremáscus — Endómyces — Podocápsa). — **Saccharomycetáceae.** Hefepilze (Zygosaccharómyces — Willia — Schizosaccharómyces — Debaryómyces — Nadsónia [Guilliermóndia] — Toruláspora — Schwanniómyces — Saccharómyces [V/1 400; V/3 1993] — Píchia (V/3 1993).

2. Ordnung **Exoascáles.**

Familien: **Protomycetáceae** (Protómyces — Taphrídium = Volkártia). — **Exoascáceae** (= Taphrináceae) (Taphrína, = Exoáscus [IV/2 1056], — Ascómyces — Magnusiélla — Ascocortícium).

II. Unterklasse Euascomycétes. Echte Schlauchpilze.

3. Ordnung **Plectascáles.**

Familien: **Gymnoascáceae** (Arachniótus — Amauroáscus — Gymnoáscus — Myxótrichum — Ctenómyces — Eidamélla). — **Aspergilláceae** (Aphanoáscus — Thielávia — Monácus — Magnúsia — Aspergíllus, Kolbenschimmel — Citrómyces — Penicíllium, Pinselschimmel — Penicilliópsis). — **Onygenáceae** (Onýgena). — **Trichocomáceae** (Trichócoma) — **Elaphomycetáceae** (Elaphómyces, Hirschtrüffel) — **Terfeziáceae** (Terfézia).

4. Ordnung **Perisporiáles.**

Familien: **Erysipháceae** (=Erysibáceae). Mehltaupilze (Phyllactínia [V/1 212, 252, 268] — Erýsiphe [= Erýsibe] VI/2 1064 — Sphaerothéca [IV/2 644; V/1 422] — Uncínula [V/1 268] — Microsphæra — Podosphæra). — **Perisporiáceae** (Direrospórium — Apiospórium [V/3 1644]). — **Englerulaceae** (Englérula).

5. Ordnung **Myriangiáles.**

Familien: **Myriangiáceae** (Kusanoópsis — Myriángium — Phymatosphæria). — **Plectodiscellaceae** (Plectodiscélla). — **Saccardiáceae** (Eurythéca — Saccárdia — Anhéllia). — **Dothioráceae** (Bagnisiélla — Dothióra — Bagnisiópsis — Parodiellína — Chevaliéra — Botryosphæria). — **Pseudosphaeriáceae** (Pyrenóphora [V/3 1741] — Pleóspora [V/3 1187] — Leptosphæria [V/3 1187; V/4 2568] — Didymélla).

6. Ordnung **Hypocreáles.**

Melanóspora — Peckiélla — Necosmóspora — Entonæma — Polystígma — Xylócrea — Néctria (IV/3

1399) — Hypómyces — Pyxidióphora — Sphaerostílbe — Hypócrea — Corallómyces — Mycocítrus — Calonéctria — Gibberélla (V/1 452) — Stilbonétria — Peloronéctria — Pleonéctria — Megalonéctria — Shiraía — Ascolóphorus — Epichlóë — Ophiodótis — Balánsia — Cláviceps, Mutterkorn [I, 389] — Córdyceps, Kernkeule.

7. Ordnung **Sphaeriáles.**

Familien **Fimetariáceae** (Chaetómium — Fimetária [= Sordária] — Hypócopra — Delítschia — Sporórmia). — **Sphaeriáceae** (Trichosphæria — Herpotríchia [I 104] — Lasiosphæria — Rosellínia [IV/3 1187 V/1 422] — Bértia — Melanómma). — **Ceratostomatáceae** (Ceratostomélla — Cerástostoma — Ceratosphæria). — **Cucurbitariáceae** (Nítschkia — Cucurbitária [IV/2 726; IV/3 1162; V/1 268]). — **Coryneliáceae** (Caliciópsis — Corynélia — Tripóspora). — **Amphisphaeriáceae** (Amphisphæria — Trematosphæria — Pleosphæria — Teichóspora). — **Lophiostomatáceae** (Lophiélla — Lophióstoma). — **Mycosphaerellaceae** (z. T. Pleosporáceae) (Mycosphaerélla [IV/2 727; IV/3 1162] — Ophióbolus [V/1 139; V/3 1922, 2243] — Ventúria [IV/3 1187, V/3 1619] — Guinárdia [V/1 212, 261; V/1, 422; V/3 1992] — Dilóphia — Sphaerulína — Massária [V 3 1949]). — **Gnomoniáceae** (Gnomónia [Gloeospórium] [V/1 139, 208] — Glomerélla). — **Valsáceae - Diatrypáceae** (Válsa [IV/3 1162; V/1 261, 268] — (Anthóstoma — Diatrýpe — Diaprypélla — Diapórthe [V/1 261, 368] — Endóthia — Meláconis — Plowrightia). — **Xylariáceae** (Nummulária — Ustulína — Hypóxylon [V/1 268] — Xylária, Holzpilz — Porónia).

8. Ordnung **Dothideáles.**

Familien: **Dothideáceae** (Dothidéa [V/1 261] — Systrémma). — **Phyllachoráceae** (Phylláchora — Rhopógráphus).

9. Ordnung **Hysteriáles.**

Familien: **Hypodermatáceae** (Hypodérma — Hysterópsis — Lophodérmium, Schüttepilz [V/3 1626, 1643]). — **Dichaenáceae** (Dichæna). — **Ostropáceae** (Óstropa — Robérgea). — **Hysteriáceae** (Hystérium — Hysterográphium — Lóphium). — **Acrospermáceae** (Acrospérmum).

10. Ordnung **Hemisphaeriáles.**

Stigmateáceae (Stigmatéa). — **Polystomelláceae** (Cyclostomélla — Parmulária — Cycloschízon). — **Microthyriáceae** (Asterína). — **Trichothyriáceae** (Trichothýrium — Loranthómyces).

11. Ordnung **Phacidiáles.** (Phacídium — Cryptómyces — Coccómyces [V/3 1661] — Rhytísma [V/1 268]).

12. Ordnung **Pezizáles.** Napfpilze.

Familien: **Philipsiellaceae** (Philipsiélla). — **Agyriáceae** — **Patellariáceae** (Patéllea — Durélla — Patinélla — Kárschia — Patellária — Biatorélla). — **Dermateáceae** (Dermatéa — Týmpanis — Dermatélla). — **Bulgariáceae.** Gallertbecherlinge (Bulgária — Coryne). — **Cyttariáceae** (Cyttária auf der südlichen Halbkugel). — **Mollisiáceae** (Pseudopeziza, IV/3 1263, 1307; V/1 422) — Fabræa — Orbília — Callória). — **Helotiáceae** (Sarcóscypha — Chlorosplénium (VII 62) — Rutstrœmia — Sclerotínia [V/3 1619, 1624, 1674, 1681] — Dasyscypha — Láchnum (V/4 2568). — **Geoglossáceae** (Mítrula — Microglossum — Geoglóssum, Erdzunge — Trichoglóssum — Spathularia, Spateling — Leótia, Gallertkäppchen — Cudónia, Kreisling — Vibríssea). — **Rhizináceae** (Ascocortícium — Rhízina, Wurzellorchel — Sphaerosóma). — **Pyronemataceae** (Ascodésmis — Pyronéma — Pyronemélla). — **Ascoboláceae** (Cubónia — Lasiólobus — Ascóphanus — Ryparóbius — Saccóbolus — Ascóbolus). — **Pezizáceae.** Becherpilze (Lachnéa — Sarcosphæra [= Sepultária] — Peziza — Humária — Pustulária — Acetábula — Hydnocystis — Geopóra, Löchertrüffel). — **Helvellaceae** (Morchélla, Morchel — Gyromítra — Vérpa, Verpel = Cídaris — Helvélla, Lorchel).

13. Ordnung **Tuberáles.**

Familie: **Tuberáceae,** Eutuberáceae (Sphaerósma — Hydnótrya, Morcheltrüffel — Piersónia — Pachyphlœus, Kratertrüffel — Túber, Trüffel — Áschion, Harttrüffel — Balsámia, Balsamtrüffel — Choriómyces, Weisse Trüffel — Myrmecocystis — Genéa).

14. Ordnung **Laboulbeniáles.**

Familien: **Peyritschiellaceae** (Rickia — Dichómyces). — **Laboulbeniáceae** (Herpómyces — Stigmatómyces — Laboulbénia). — **Ceratomytáceae.**

4. Klasse **Basidiomycétes.** Basidienpilze, Ständerpilze.

I. Unterklasse Protobasidiomycétes.

1. Ordnung **Auriculariáles.**

Familien: **Auriculariáceae.** Muschelpilze (Helicobasídium [= Stypinélla] — Platygloea [= Achro-

ómyces] — Auriculária, Judasohr — Eocronártium). — **Cystobasidiáceae** (Jóla — Cystobasídium — Saccoblástia). — **Septobasidiáceae** (Septobasídium). — **Phleogenáceae** (Stílbum — Pilacrélla — Pilácre = Ecchýna).

Ordnung **Uredináles.** Rostpilze.

Familien: **Coleosporiáceae** (Goplána — Coleospórium, VI 2 680) — **Melampsoráceae** (Uredinópsis — Melampsorélla [III 32; VII, Fig. 1092] — Melampsóra [V/1 139] — Thecóspora [V 3 1619] — Pucciniástrum [V/2 818] — Calyptóspora [V 3 1668]). — **Cronartiáceae** (Cronártium, Walzenrost [IV/2 644] — Chrysomýxa [V 3 1619, 1631]). — **Pucciniáceae** (Blastóphora — Urómyces [IV 3 1169, 1508; V 1 139 — Ochrópsora — Cystópsora — Zaghouánia — Endophýllum [IV/2 546] — Puccínia [IV/1 9; V 1 212, 335; V/3 2201] — Gymnosporángium [IV/2 703, 754] — Phragmídium [IV 2 760, 771, 812] — Hemileía — Umycládium — Ravenélia — Triphrágmium [IV 2 974] — Kuehnéola — Gymnocónia).

Ordnung **Ustilaginales.** Brandpilze.

Familien: **Ustilagináceae** (Ustilágo, Staubbrand [II 249; IV/2 1059; VII Fig. 1068] — Sphacelothéca — Cinctráctia [II 62] — Tolypospórium). — **Tilletiáceae** (Tillétia, Stinkbrand — Neovóssia — Entylóma — Urocýstis [V/3 1741] — Doassánsia — Thecáphora — Turburcínia [IV/3 1864] — Sorospórium).

4. Ordnung **Tremelláles.**

Familien: **Tremelláceae.** Gallert- oder Zitterpilze (Stypélla — Heterochæte — Exidiópsis — Sebacína — Exídia, Drüsling — Ulocólla — Ditángium [= Craterocólla] — Tremélla, Zitterling — Gyrocéphalus, Gallerttrichling — Clavariópsis — Protomerúlius — Protohýdnum — Treméllodon, Zitterzahn). — **Hyaloriáceae** (Hyalória in Brasilien). — **Sirobasidiáceae** (Sirobasídium im tropischen Amerika).

II. Unterklasse Autobasidiomycétes.

5. Ordnung **Tulasnelláles.**

Familien: **Tulasnelláceae** (Tulasnélla — Prototremélla — Pachysterígma — Mucipórus). — **Vuilleminiáceae** (Vuillemínia). — **Brachybasidiáceae.**

6. Ordnung **Dacryomycetáles.**

Familie: **Dacryomycetáceae.** Hornpilze (Ceráceae — Dacryómyces — Guepínia — Dacryomítra — Dacryópsis — Calócera, Hörnling).

7. Ordnung **Cantharelláles.**

Familien: **Peniophoráceae** (Penióphora). — **Exobasidiáceae** (Kordyána auf Commelinaceae — Exobasídium [IV/3 1619, 1631]). — **Chantarelláceae.** Leistenpilze (Craterélus, Totentrompete) — Cantharéllus, Eierschwamm, Gelbling). — **Thelephoráceae.** Warzen- oder Rindenpilze (Theléphora). — **Hydnáceae.** Stachelpilze (Hýdnum, Stacheling — Irpex, Eggenpilz — Sistótrema, Rissling, Zahnling).

8. Ordnung **Polyporáles.** Röhren- oder Löcherschwämme.

Familien: **Corticiáceae** (Tomentélla — Hirsutélla — Cortícium — Kneiffia — Conióphora — Gloeopenióphora — Gloecystídium — Epithéle — Hymenochæte = Stéreum). — **Cyphelláceae** (Cyphélla, Fingerhutpilz — Solénia). — **Claviariáceae.** Keulenschwämme (Pistillária, Stempelpilz — Týphula, Kolbenträger — Clavária p. p. mit Ramária, Keulenpilz — Sparássis, Judenbart, Glucke — Ptérula, Borstenkralle — Lachnocládium). — **Meruliáceae** (Merúlius, Fältling = Gyróphana). — **Polyporáceae.** Löcherschwämme (Pória — Fómes — Polýporus, Porling — Polystíctus — Tramétes, Riechschwamm — Daedálea, Wirrling — Lenzítes, Blättling — Fávolus). — **Fistulináceae** (Fistulína, Leberpilz, Reischling). — **Dictyoláceae** (Neurophýllum — Dictýolus). — **Raduláceae** (Grandínia — Odóntia — Rádulum, Raspeling — Phlébia, Aderpilz — Kneiffiélla — Hydnochæte).

9. Ordnung **Agaricáles.** Blätterschwämme.

Familien: **Hygrophoráceae** (Hygróphorus [= Camarophýllus], Dickblatt — Nýctalis, Zwitterling — Gomphídius, Schnierling, Gelbfüssler — Limácium, Schneckling). — **Agaricáceae** mit den Unterfamilien: Clitocýbeae oder Collybíeae (Clitócybe, Trichterling — Omphália, Nabeling — Clitópilus, Pflaumenpilz, Mousseron — Entolóma, Röthling, Glockenpilz — Mycéna, Helmling) — Marasmíeae (Marásmius, Schwindling — Pánus, Korkschwamm — Leontínus, Zähling — Schizophýllum, Spaltblatt). — Tricholómeae (Inócybe, Faserkopf — Cortinárius, Schleierling — Armillária, Ringeling, Hallimasch, IV/2 754; VI/1 422) — Amaníteae (Lepióta, Schirmling — Amaníta, Wulstling — Amanitópsis, Streifling — Volvária, Scheidling — Rozítes, Ziegenpilz — Pholióta, Stockschwamm, Schüppling — Tubária — Agáricus [inkl. Tricholóma, Pleurótus, Collýbia] — Psallióta, Champignon — Strophária, Harfenpilz — Hypholóma, Schwefelkopf — Psathyrélla). — **Lactacáceae** = Russuláceae (Rússula, Täubling — Russulína — Lactária, Milchling, Reizker). —

Coprináceae. Mistpilze (Bolbítius, Goldmistpilz — Coprínus, Tintenpilz). — **Paxilláceae** (Paxíllus, Krämpfling, Pfahlpilz). — **Boletáceae** (Suíllus — Bolétus, Röhrling, Steinpilz — Boletópsis — Volvobolétus (= Cryptopórus). — **Secotiáceae** (Hemigáster — Secótium). — **Podaxáceae** (Pódaxon).

10. Ordnung **Plectobasidiáles.**

Familien: **Sclerodermatáceae** (Melanogáster, Schleimtrüffel — Leucoáster — Sclerodérma, Kartoffelbovist, Falsche Trüffel — Pómpholyx — Pisolíthus [= Polysáccum], Dickfuss, Erbsenstreuling). — **Calostomatáceae.** Schönmundpilze (Calóstoma — Astræus, Wetterstern). — **Sphaeroboláceae** (Sphaerobólus, Schnellerling). — **Tulostomatáceae** (Tulóstoma, Stielbovist).

11. Ordnung **Gasteromycétes.** Bauchpilze.

Familien: **Lycoperdáceae.** Staubpilze (Rhizopógon, Barttrüffel — Octaviána, Laubtrüffel — Hydnángium, Heidetrüffel — Lycogaliópsis — Bovísta, Bovist — Lycopérdon, Stäubling [VII Fig. 1099] — Diplocýstis — Broomeía — Geáster, Erdstern). — **Nidulariáceae.** Nestpilze (Nidulária, Nestling — Cýathus, Teuerling, Trommelpilz — Crucíbulum). — **Hymenogastráceae.** Erdnüsse (Hymenogáster). — **Clathráceae** (Gautiéria, Morchling — Hysterángium, Schwanztrüffel — Rhopalogáster — Phallogáster — Protúbera — Blumenávia — Cláthrus, Gitterling — Clathrélla — Aseróe — Cólus — Anthúrus — Símblum — Lysúrus — Kalchbrennéra). — **Phalláceae.** Rutenpilze, Hexeneier (Mutínus — Ithypállus [= Phállus], Stinkmorchel — Echinophállus — Dictyóphora).

5. Klasse Fúngi imperfécti.

1. Reihe **Hyphomycétes.**

Oóspora — Achórion — Micrósporon — Trichophýton — Monília — Oídium, Eischimmel (V 1 421; V 3 1742, 1993) — Geotríchum — Sporotríchum — Botrýtis, Traubenschimmel (IV 2 703; V 399; V 3 1992) — Verticíllium — Tórula — Trichospórium — Demátium (V/1 400) — Fusicládium (IV/2 703, 754) — Cladospórium (V/1 422; V/3 1824) — Macrospórium — Alternária (V 1 57) — Sporodésmium, Bündelspore (V/2 1064) — Cercóspora, Schweifspore (V/1 279; V/3 1667, 1741) — Stilbélla — Corémium — Isária, Keulenkopf — Fusárium, Spindelwarze.

2. Reihe **Melanconiáles.**

Gloeospórium (IV/2 644, 659; V/1 422) — Myxospórium — Melancónium — Marssónia — Coryneum — Pestalózzia (IV 3 1152, 1187; V/1 279; V/3 1667).

3. Reihe **Sphaeropsidáles.**

Phyllostícta (V/3 1667, 1741) — Phóma (IV/3 1187; V/3 1619, 1992) — Ascochýta, Fadenwerfer (V 3 1619, 1667, 1741) — Diplódia (V/3 1661) — Septória (IV/2 703; V/3 1674) — Rhabdóspora (V 3 1992) — Leptothýrium — Psilóspora.

XII. Abteilung Lichénes. Flechten, Flechtenpilze.

I. Unterklasse Ascolichénes.

1. Reihe **Pyrenocárpeae.** Kernfrüchtige Flechten.

Familien: **Morioláceae** — **Epigloeáceae** — **Verrucariáceae.** Warzenflechten (Verrucária — Thelídium — Staurothéle — Polyblástia). — **Dermatocarpáceae** (Dermatocárpon — Endocárpum). — **Pyrenothamniáceae.** — **Pyrenuláceae.** Kernflechten (Pyrénula — Acrocórdia — Arthopyrénia). — **Phyllopyreniáceae** (Lepolíchen). — **Trypetheliáceae** (Tropen, Subtropen). — **Paratheliáceae** (Tropen). — **Astrotheliáceae** (Astrothélium — Parmentária). — **Strigulaceae** (Strígula — Phylloporína). — **Pyrenidiáceae.** — **Mycoporáceae.**

2. Reihe **Gymnocárpeae.** Scheibenfrüchtige Flechten.

1. Unterreihe **Coniocarpíneae.**

Familien: **Caliciáceae.** Knopfflechten (Spinctrína — Chaenothéca — Coniócybe — Calícium). — **Cypheliáceae.** Buckelflechten (Cyphélium). — **Sphaerophoráceae** (Sphaeróphorus).

2. Unterreihe **Graphidíneae.**

Familien: **Arthoniáceae** (Arthónia — Allarthónia). — **Graphidáceae.** Schriftflechten (Lithógrapha — Opégrapha — Gráphis — Graphína). — **Chiodectonáceae** (meist tropisch). — **Dirináceae** (Dirína) — **Rocellácea** (Rocella, Färberflechte, Orseilleflechte).

3. Unterreihe **Cyclocarpíneae.**

Familien: **Lecanactidáceae** (Lecanáctis — Schismatómma). — **Pilocarpáceae** — **Chrysotrichaceae** — **Thelotrematáceae** — **Diploschistáceae** (Conotréma — Diploschístes). — **Ectolechiáceae** (Sporódium).

Gyalectáceae (Gyalécta — Secolíga). — **Coenogoniáceae** (Coenogónium, Algenflechte — Racódium). — **Lecideáceae** (Lecidéa, Scheibenflechte — Tonínia — Catillária — Megalóspora — Bacídia — Rhizocárpon, Landkartenflechte). — **Phyllopsoráceae** (Tropen, Subtropen). — **Cladoniáceae.** Säulenflechten (Baeómyces, Korallenflechte [V 3 1694]) — Cladónia, Renntierflechte — Stereocaúlon, Strunkflechte). — **Gyrophoráceae** (Umbilicária — Gyróphora, Kreisflechte). — **Acarosporáceae** (Thelecárpon — Biatorélla — Acaróspora). — **Ephebáceae** (Spilonéma — Ephébe, Fadenflechte — Porocýphus). — **Pyrenopsidáceae** (Synalíssa — Psorotíchia — Anéma). — **Lichináceae** (Lichína, Flechtentang). — **Collemataceae** (Phýsma — Colléma, Gallertflechte — Leptógium). — **Heppiáceae** — **Pannariáceae** (Pannária). — **Stictáceae** (Lobária, Lungenflechte — Stícta). — **Peltigeráceae** (Peltígera, Schildflechte [V/3 1677] — Solorína — Nephróma). — **Pertusariáceae.** Porenflechten (Pertusária). — **Lecanoráceae** (Lecanóra, Kuchenflechte — Icmadóphila — Ochroléchia — Phlýctis — Haemotómma). — **Parmeliáceae.** Schüsselflechten (Parmélia — Cetrária, Isländisches Moos — Candelária). — **Usneáceae** (Evérnia, Bandflechte — Letharia — Alectória [Bryopógon], Moosbart — Ramalína, Astflechte — Úsnea, Bartflechte, Baumbart). — **Caloplacáceae** (Blasténia — Calopláca). — **Theloschistáceae** (Theloschístes — Xanthória). — **Buelliáceae** (Buéllia — Rinodína). — **Physciáceae** (Phýscia, Wandflechte — Anaptýchia inkl. Tornabéna).

II. Unterklasse Basidiolichénes (= Hymenolichénes).

Córa, Pfauenflechte (Tropen) — Corélla (Brasilien) — Dictyonéma, Netzfadenflechte (Tropen).

XIII. Abteilung Archegoniátae (= Embryóphyta asiphonógama oder zoidiógama).

I. Unterabteilung Bryóphyta (= Muscíneae). Moospflanzen (I 2).

1. Klasse Hepáticae. (= Lichenástra). Lebermoose[1]).

1. Reihe **Anthocerotáles.** Schotenfrucht Lebermoose.

Familie: **Anthocerotáceae** (Notóthylas Sull. — Anthóceros L., Fruchthorn — Dendróceros Nees).

2. Reihe **Marchantiáles.**

1. Familie: **Ricciáceae.**

Ríccia L. — Ricciocárpus Corda — Tesselína Dum. (= Oxomítra).

2. Familie: **Marchantiáceae.**

Corsínia Raddi — Funiculária Trevis (Brasilien) — Targiónia L. — Cyathódium Kunze — Peltolépis S. O. Lindb. — Sautéria Nees — Clévea S. O. Lindb. — Exormothéca Mitten. — Aytónia Forst. — Reboúlia Raddi — Grimáldia Raddi — Neesiélla Schiffner — Conocéphalus Necker (= Fegatélla Raddi) — Lunulária Adans., Mondbecher — Dumortiéra Reinw. — Chomiocárpon Corda — Marchántia (L.) Raddi.

3. Reihe **Jungermanniáles.**

1. Familie: **Jungermanniáceae anacrogýnae.**

Thallocárpus S. O. Lindb. — Sphaerocárpus Adans. — Riélla Mont. — Riccárdia S. F Gray (inkl. Aneúra Nees) — Metzgéria Raddi — Pallavicínia S. F. Gray — Péllia Raddi — Blásia L. — Fossombrónia Raddi — Haplomítrium Nees.

2. Familie: **Jungermanniáceae acrogýnae.**

Gymnomítrium Corda, Nackthaube — Marsupélla Dum. (= Sarcoscýphus Nees) — Nárdia S. F Gray (= Aliculária S. F Gray) — Aplózia Dum. (inkl. Liochléna Nees) — Calypogeía Raddi — Lophózia Dum. — Plagiochíla Dum. — Leioscýphus Mitt. (= Mýlia Gray) — Lophocólea Dum., Kammkelch — Chiloscýphus Corda — Harpánthus Nees — Saccogýna Dum. (= Geocályx Nees — Encephalózia Spruce — Nowéllia Mitt. — Hygrobiélla Spruce — Prionólobus Spruce — Cephaloziélla Spruce — Odontoschísma Dum. (= Sphag-

[1]) Zuweilen werden im System die Musci den Hepaticae vorangestellt. Ebenso hat **D. H. Campell** die Anthocerotales aus der Klasse der Hepaticae entfernt und sie als eigene (dritte), den Hepaticae und Musci koordinierte Klasse (Anthocerótes) behandelt. Die zum Bestimmen der Laubmoose sehr bequeme Unterscheidung von acrokarpen und pleurokarpen Laubmoosen ist wissenschaftlich nicht mehr haltbar und wird neuerdings von **Brotherus, M. Fleischer, K. Fritsch** u. a. nicht mehr verwendet. Das natürliche System von **M. Fleischer** (siehe **Engler,** Syllabus) gliedert die Laubmoose in die drei „Reihengruppen" **Eubryinales** (umfasst alle Familien mit Ausnahme der Buxbaumiaceae, Diphysciaceae, Polytrichaceae und Dawsoniaceae), **Buxbaumiinales** (Buxbaumiaceae und Diphysciaceae) und **Polytrichinales** (Polytrichaceae, Dawsoniaceae), diese dann weiter in Reihen und Familien.

noecétis Nees) — Kántia S. F Gray — Bazzánia L. (= Mastigóbryum Nees) — Pleuróclada Spruce — Lepidózia Dum. — Anthélia S. O. Lindb. — Mastigóphora Nees, Peitschenmoos — Ptilídium Nees — Trichocólea Dum. — Scapánia Dum. — Stephanína O. Kuntze (= Rádula Nees) — Pleurózia Dum. — Bellincínia Raddi (= Madothéca Dum.) — Eulejeúnia Spruce — Harpalejeúnia Spruce — Frullánia Raddi.

2. Klasse **Músci** (= Músci frondósi). Laubmoose.

I. Unterklasse Sphagnáles.

Familie: **Sphagnáceae.** Torf oder Sumpfmoose — Sphágnum Ehrhardt, Sumpfmoos (V/3 1688, 1694).

II. Unterklasse Andreæáles.

Familie: **Andreæáceae** (Andreæa Ehrh., Steinmoos).

III. Unterklasse Bryáles.

1. Reihe **Acrocárpi.**

I. Familie: **Archidiáceae.** Ur-Moose (Archídium Brid.).

II. Familie: **Dicranáceae.** Gabelzahn-Moose.

Brúchia Schwaegr. — Trematódon Michx., Lochzahn — Pleurídium Brid. — Tríchodon Schimp. — Dítrichum Timm — Cerátodon Brid., Hornzahn — Distíchium Br. et Sch. — Brachyodóntium Bruch. — Seligéria Br. eur. — Trochóbryum Breidl. — Stylostégium Bryol. eur. — Blíndia Bryol. eur. — Aongstrœmia Bryol. eur. — Dicranélla Schimp. — Rhabdoweísia Schimper — Oréas Brid. — Cynodóntium Schimper, Hundszahn — Oreoweísia De Not. — Dichothodóntium Schimper — Dicranoweísia Lindb. — Oncóphorus Brid. — Dícranum Hedw., Gabelmoos — Campýlopus Brid., Krummstiel — Dicranodóntium Bryol. eur. — Metzléria Schimp.

III. Familie: **Leucobryáceae.**

Leucóbryum Hamp., Weissmoos — Schizomítrium Doz. et Molk. (Monsungebiet). — Octoblépharum Hedw. (Tropen).

IV Familie: **Fissidentáceae.** Spaltzahn-Moose.

Físsidens Hedw., Farnmoos — Sorapílla Spruc. (Anden, Neu-Guinea) — Moenckemeyéra C. Müll.

V. Familie: **Calymperáceae.**

Syrrhópodon Schwaegr. (Tropen) — Calympéres Sw. (Tropen).

VI. Familie: **Pottiáceae.**

Cinclidótus Pal. Beauv., Siebzahn — Hymenóstomum R. Br. — Gymnóstomum Hedw. — Gyroweísia Schimp. — Hymenostýlium Brid. — Pleuroweísia Limpr. — Eucládium Bryol. europ. — Molendóa Lindb. — Leptobárbula Schimp. — Trichóstomum Hedw., Haarmund — Timmiélla De Not. — Tortélla Limpr. — Pleurochæte Lindb. — Leptodóntium Hamp. — Hypóphila Brid. — Didýmodon Hedw. — Bárbula Hedw., Bartmoos — Dialytríchia Limpr. — Acaúlon C. Müller — Pháscum L., Glanzmoos — Póttia Ehrh. — Pterygoneúrum Jur. — Desmátodon Brid. — Aloína (C. Müll.) Kindb. — Tórtula Hedw. — Encalýpta Schreb., Glockenhut.

VII. Familie: **Grimmiáceae.**

Scouléria Hook. (Nordamerika) — Campylostélium Bryol. europ. — Coscínodon Spreng., Siebzahn — Schistídium (Brid.) Bryol. europ. — Grímmia Ehrh., Zwergmoos — Rhacomítrium Brid., Zackenmütze.

VIII. Familie: **Orthotricháceae.**

Anoectángium (Hedw.) Bryol. eur. — Amphídium Schimp. — Zýgodon Hook. et Tayl., Paarzahn — Orthótrichum Hedw., Goldmoos — Ulóta Mohr., Kräuselmoos — Macromítrium Brid. (Tropen) und südliche Erdhälfte) — Schlotheímia Brid. (südliche Erdhälfte).

IX. Familie: **Splachnáceae.** Schirmmoose.

Voítia Hornsch. — Taylória Hook. — Tetráplodon Bryol. eur. — Háplodon R. Br. — Spláchnum L., Schirmmoos.

X. Familie: **Oedipodiáceae** mit Oedipódium Griffithiánum (Dicks.) Schwaegr. von Schottland bis Lappland.

XI. Familie: **Disceliáceae** mit Discélium núdum (Dicks.) Brid.

XII. Familie: **Funariáceae.** Drehmoose.

Nanomítrium Lindb. — Physcomitrélla Bryol. eur. — Physcomítrium (Brid.) Fürn. — Pyramídula Brid. — Funária Schreb. (inkl. Enthóstodon Schwaegr.), Drehmoos — Ephemerélla C. Müll. — Ephémerum Hamp.

XIII. Familie: **Schistostegáceae** (Schistostéga osmundácea [Dicks.] Mohr, Leuchtmoos).

XIV Familie: **Drepanophylláceae** (Drepanophýllum Rich. und Mniomália C. Müll; Tropen).

XV. Familie: **Mitteniáceae** (Mitténia Lindb. in Australien und Neuseeland).

XVI. Familie: **Bryáceae.** Birnmoose.

Mielichhoféria Hornsch. — Leptóbrym Bryol. eur. — Póhlia Hedw. (= Webéra Hedw.) — Mnióbryum Limpr. — Epipterýgium Lindb. — Anomóbryum Schimp. — Plagióbryum Lindb. — Brýum Dill., Birnmoos — Rhodóbryum (Schimp.) Hamp.

XVII. Familie: **Leptostomáceae** (Leptóstomum R. Br. auf der südlichen Erdhälfte).

XVIII. Familie: **Mniáceae.**

Mnium L., Sternmoos — Cinclídium Sw. — Réllia Kindb. (Amerika) — Leucolépis Lindb. (Westl. Nordamerika).

XIX. Familie: **Rhizogoniáceae.**

Hyménodon Hook. et Wils. (Südhemisphaere) — Rhizogónium Brid. (aussereuropäisch) — Mesochæte Lindb. (Australien) — Cryptopódium Brid. (Neu Seeland).

XX. Familie: **Aulacomniáceae.**

Leptothéca Schwaegr. (Australien, Südliches Amerika) — Aulacómnium Schwaegr. (= Gymnócybe Fr.), Kopfmoos (V/3 1694).

XXI. Familie: **Meeseáceae.**

Paludélla Ehrh. — Amblyodon Palis. — Meésea Hedw., Bruchmoos.

XXII. Familie: **Catascopiáceae.** Nick-Moose, monotypisch, mit Catascópium nigrítum (Hedw.) Brid.

XXIII. Familie: **Bartramiáceae.**

Plagíopus Brid. — Anacólia Schimper — Bartrámia Hedw., Apfelmoos — Conóstomum Sw. — Philonótis Brid., Quellmoos — Breutélia Schimp.

XXIV Familie: **Timmiáceae** (Tímmia Hedw.).

XXV Familie: **Diphysciáceae** (= Weberáceae).

Diphýscium Ehrh. (= Webéra Ehrh.), Blasenmoos. — XXVI. Familie: **Buxbaumiáceae.** Schorfmoose (Buxbaúmia Hall.). — XXVII. Familie: **Calomniáceae** (Calómnion Hook. f. et Wils. Auf Neu-Seeland und Samoa).

XXVIII. Familie: **Georgiáceae.** Vierzahnmoose.

Geórgia Ehrh. — Tetrodóntium Schwaegr.

XXIX. Familie: **Polytricháceae.** Haarmoose.

Polýtrichum Dill., Haarmoos — Pogonátum P Beauv., Widerthon, Filzmütze — Catharinæa Ehrh. (= Átrichum P. Beauv.) — Oligótrichum Lam. et DC.

XXX. Familie: **Dawsoniáceae** (Dawsónia R. Br. in Australien).

2. Reihe **Pleurocárpi.**

XXXI. Familie: **Erpodiáceae** (Tropen und Subtropen).

Erpódium Brid. — Venturiélla C. Müll. — Solmsiélla C. Müll. — Wíldia C. Müll.

XXXII. Familie: **Hedwigiáceae.**

Hedwígia Ehrh. — Braúnia Bryol. eur. (Wärmere Gebiete) — Rhacocárpus Lindb. (südliche Hemisphaere) — Cleistóstoma Brid. (Ostindien).

XXXIII. Familie: **Fontinaláceae.** Quell-Moose.

Wárdia Harv. (Cap) — Fontinális (Dill.) L., Brunnenmoos — Dichelýma Myr.

XXXIV. Familie: **Climaciáceae.**

Climácium Web. et Mohr, Leitermoos — Girgensóhnia Lindb. (Ostasien).

XXXV. Familie: **Cryphaeáceae.** Schleier Moose (Cryphæa Mohr — Acrocryphæa Bryol europ.).

XXXVI. Familie: **Leucodontáceae.**

Leúcodon Schwaegr., Weisszahn — Antitríchia Brid. — Pterogónium Sw.

XXXVII. Familie: **Prionodontáceae** (Priónodon C. Müll. im trop. und subtrop. Amerika).

Tropische und subtropische Familien: XXXVIII. **Spiridentáceae** (Monsungebiet). — XXXIX. **Cyrtopodáceae** (Neukaledonien). — XL. **Echinodiáceae.** — XLI. **Ptychomniáceae.** — XLII. **Myuriáceae.** — XLIII. **Sorapilláceae.** — XLIV. **Lepyrodontáceae.** — XLV **Pleurophascáceae** (Tasmanien).

XLVI. Familie: **Neckeráceae.** Ringmoose.

Neckéra Hedw., Ringmoos — Homália (Brid.) Bryol. eur., Spatelmoos — Meteórium Doz. et Molk. (Tropen) — Thámnium Bryol. eur., Baummoos.

XLVII. Familie: **Lembophylláceae** (Isothécium Brid. — Camptochæte Reichdt. [südliche Erdhälfte]).

XLVIII. Familie: **Entodontáceae.**

Orthothécium Bryol. europ. — Éntodon C. Müll. (= Cylindrothécium Bryol. eur.) — Campylodóntium Doz. et Molk. — Platygýrium Bryol. eur. — Pylaísia Bruch. et Schimp. — Erythrodóntium Hamp. (wärmere Teile der Erde) — Trachyphýllum Gepp (ebenso) — Pterygynándrum Hedw.

XLIX. Familie: **Fabroniáceae.**

Fabrónia Radd. — Anacámptodon Brid. — Clasmátodon Hook. et Wils. — Hábrodon Schimp.

L. Familie: **Pilotricháceae** (Tropen und Subtropen, besonders in Amerika).

LI. Familie: **Nematáceae** (Ephemerópsis Goebel in Java).

LII. Familie: **Hookeriáceae.**

Daltónia Hook. et Tayl. — Pterygophýllum Brid. — Hookéria Sm. — Cyclodíctyon Mitt. — Callicostélla Jaeg. (aussereuropäisch). — Lepidopílum Brid. (wärmere Gebiete).

LIII. Familie: **Hypopterygiáceae** (Tropen und Subtropen).

Cyathóphorum P. Beauv. — Hypopterýgium Brid.

LIV Familie: **Helicophylláceae** (Tropen und Subtropen). — Helicophýllum Brid. — Powéllia Mitt.

LV. Familie: **Rhacopiláceae** (Rhacopílum P. Beauv. in den Tropen und Subtropen).

LVI. Familie: **Leskeáceae.**

Heterocládium Bryol. eur. — Myurélla Bryol. eur. — Anómodon Hook., Trugzahn — Léskea Hedw. — Leskeélla (Limpr.) Loeske — Pseudoleskeélla Kindb. — Lescuraea Bryol. eur. — Pseudoléskea Bryol. eur. — Thuídium Bryol. eur., Federmoos.

LVII. Familie: **Hypnáceae.** Schlafmoose.

Amblystégium Bryol. eur. inkl. Leptodíctyum (Schimp. Warnst.), Stumpfdeckel — Amblystegiélla Loeske — Homomállium (Schimp.) Loeske — Hygroamblystégium Loeske — Cratoneúrum (Sull.) Roth — Drepanocládus (C. Müll.) Roth inkl. Scorpídium Limpr. — Calliérgon (Sull.) Kindb. — Acrocládium Mitt. — Hygrohýpnum Lindb. — Campýlium (Sull.) Bryhn (= Chrysohýpnum [Hampe] Roth) — Hylocómium Bryol. eur., Waldmoos — Ctenídium (Schimp.) Mitt. — Rhytidiadélphus (Lindb.) Warnst. — Rhytídium (Sull.) Kindb. — Hylocómium Bryol. eur. (V/3 1677) — Hýpnum Dill., Ast- oder Schlafmoos — Ptílium (Sull.) De Not. — Steréodon (Brid.) Mitt. — Isopterýgium Mitt. — Plagiothécium Bryol. eur., Flachmoos, Schiefbüchse.

LVIII. Familie: **Leucomiáceae** (Leucómium Mitt. in den Tropen — Vesiculariópsis in Chile).

LIX. Familie: **Sematophylláceae** (Tropen, Subtropen).

LX. Familie: **Rhegmatodontáceae** (Tropen, Subtropen).

LXI. Familie: **Brachytheciáceae.**

Stenocarpídium C. Müll. — Homalothécium Bryol. eur. — Camptothécium Bryol. eur., Krummbüchse — Ptychódium Schimp. — Brachythécium Bryol. eur., Kurzbüchse — Scleropódium Bryol. eur. — Scorpiúrium Schimp. — Cirriphýllum Grout — Oxyrrhýnchium (Bryol. eur.) Warnst. — Eurhýnchium Bryol. eur. — Bryhnia Kaur. — Rigódium Kunz. (fast nur in Amerika) — Rhynchostegiélla Limpr. — Rhynchostégium Bryol. eur.

LXII. Familie: **Hypnodendráceae** (indo-asiatisch, pazifische Inseln).

B. Plántae vasculáres. Leitbündelpflanzen (I/2).

II. Unterabteilung (der Archegoniátae S. 144) Pteridóphyta (= Cryptógamae vasculáres). Leitbündelkryptogamen. Blütenlose Gefässpflanzen (I 23).

1. Reihe **Lycopodiáles** (I 4).

I. Familie: **Lycopodiáceae.** Bärlappgewächse (I 63). — Lycopódium L., Bärlapp, Schlangenmoos (I 63; VII Fig. 1174) — Phyloglóssum Kunze (I 64).

II. Familie: **Selaginellaceae.** Moosfarne (I 69). — Selaginélla Pal.em.Spring., Moosfarn (I 69; VII Fig. 1056 und 1175).

2. Reihe **Psilotáles.**

Familie: **Psilotáceae.** Spaltblatt-Bärlappe (I 64). — Psilótum Sw. (4 Arten in den Tropen und Subtropen). — Tmesípteris Bernh. (T. Tannénsis Bernh. in Polynesien und auf den Philippinen).

3. Reihe **Isoëtáles.**

Familie: **Isoëtáceae.** Brachsenkräuter (I 49). — Isóëtes L.[1]), Brachsenkraut (I 50).

4. Reihe **Equisetáles.** Schachtelhalmgewächse (I 4).

Familie: **Equisetáceae.** Schachtelhalme (I 51). — Equisétum L.[2]), Schachtelhalm, Zinnkraut (I 53; VII Fig. 1133).

[1]) **Isóëtes echinósporum** Durieu (I 50) wurde 1927 als neu für Mitteldeutschland im Thüringischen Vogtland (bei Plothen im Pörnitzerteich) nachgewiesen. — Die Pflanze des Blöckensteinersees im Böhmerwald hat sich als Isóëtes lacústre L. herausgestellt.

[2]) **Equisétum trachýodon** A. Br. (V 61) wird neuerdings als hybridogene Art (E. hiemale L. × E. va-

5. Reihe **Filicáles.** Farnartige Gewächse, Schneckenroller (I 2, 4).

I. Familie: **Ophioglossáceae.** Natterzungengewächse (I 43) — Ophioglóssum L., Natterzunge (I 43) — Botrýchium Sw., Mondraute, Traubenfarn (I 44) — Helminthostáchys Kaulf. (H. Zeylánica Hook., in Ostindien und Ausstralien), Wurmähre.

II. Familie: **Marattiáceae.** 50 bis 60 Vertreter in den Tropen beider Erdhälften. — Angiópteris Hoffm. — Archangiópteris Christ et Giesenhagen — Maráttia Sm. — Kaulfússia Blume — Danæa Sm.

III. Familie: **Osmundáceae.** Rispenfarne (I 42) — Osmúnda L., Rispenfarn (I 42) — Tódea Willd., Elefantenfarn (I 42) — Leptópteris Presl (Melanesien, Australien).

IV. Familie: **Schizaeáceae.** Spaltastfarne. Etwa 90 Arten, zumeist im tropischen Amerika. — Schizæa Sm. (Schizæa pusílla Pursh, Curly grass, selten in den pine barrens des atlantischen Nordamerika) — Aneímia Sw., Ährenfarn — Móhria Sw. (Móhria caffrórum [L.] Desv., Weihrauchfarn, in Ostafrika und Madagaskar) — Lygódium Sw. (Lianen, Lygódium palmátum Sw. in Nordamerika).

V. Familie: **Gleicheniáceae.** Gabelfarne. Etwa 30 Arten in den Tropen und Subtropen, wenige in den gemässigten Zonen.

VI. Familie: **Matoniáceae.** Schirmfarne. 2 Arten der Gattung Matónia R. Br. auf Borneo und Malakka.

VII. Familie: **Hymenophyllaceae.** Hautfarne (I 7) — Hymenophýllum[1]) Sm., Hautfarn (I 7) — Trichómanes L., Haarfarn (I 7).

VIII. Familie: **Dicksoniáceae.** Tropen und Subtropen. — Balántium Kaulf., Beutelfarn. — Dicksónia L'Hér. — Cibótium Kaulf., Traubenfarn, Schatullenfarn.

IX. Familie: **Thyrsopteridáceae.** Thyrsópteris Kuntze (Th. élegans Kuntze) auf Juan Fernandez.

X. Familie: **Cyatheáceae.** Baumfarne. Cyáthea Sm., Becherfarn — Alsóphila R. Br. — Hemitélia R. Br.

XI. Familie: **Polypodiáceae.** Tüpfelfarne, Echte Farne. Woódsia R. Br.[2]), Wimperfarn (I 12) — Cystópteris Bernhard, Blasenfarn (I 9; VII Fig. 1176) — Onóclea L. (= Struthiópteris Willd.), Straußfarn (I 12) — Aspídium Sw.

Fig. 1174. Lycopodium complanatum L. subsp. anceps (Wallr.) Aschers. (Bd. I S. 68).
Phot. Otto Ziegler, Aadorf (Schweiz).



Fig. 1175. Selaginella Helvetica (L.) Link (Bd. I S. 70).
Phot. Dr. Fr. Sauerbrei, Berlin-Mahlsdorf.

riegatum Schleicher) angesehen. Sie ist auch in Württemberg (Wolfegg im Oberamt Waldsee), sowie an vielen Stellen in der Schweiz (Rheingebiet zwischen Schaffhausen und dem Bodensee, an der Thur bei Andelfingen, Emmeufer bei Derendingen, Gerlafingen-Biberist, Aareufer bei Dotzigen, Büren, Bremgartnerwald bei Bern, Aubonne), ebenso in Schweden von G. Samuelsson bei Rättvik und in Lettland von K. Starcs in der Provinz Vidzeme im Kr. Cesis (an den Flüssen Rauna und Gauja).

Von Bastarden werden neuerdings genannt: **Equisétum ramosíssimum** Desf. × **E. variegátum** Schleicher (= **Equisétum Naegeliánum** Walo Koch), am Rheinufer bei Dachsen (Kt. Zürich). — **Equisétum hiemále** L. × **E. ramosíssimum** Desf. im Tessin (Roccabella).

[1]) **Hymenophýllum Tunbrigénse** Sm. et Sow. ist seit 1905 in der Sächsischen Schweiz vergeblich gesucht worden.

[2]) **Woódsia glabélla** R. Br. (I 14) ist als neu für Deutschland im Allgäu (Höfats) und in den Berchtesgadeneralpen (Funtensee, ca. 1600 m) und als neu für die Schweiz (Klus bei Kandersteg, 1350 m) nachgewiesen worden.

(= Dryópteris Adanson, = Nephródium Rich., = Polýstichum Roth, = Phegópteris Fée), Schildfarne (I 15; VII Fig. 1177) — Nephrolépis Schott (Tropen und Subtropen) — Davállia Sm. (Tropen und Subtropen) — Bléchnum L. (inkl. Lomária), Rippenfarn (I 35) — Woodwárdia Sm. (6 Arten auf der nördlichen Erdhälfte) — Asplénium L.[1]), Streifenfarn (I 25; VII Fig. 1172) — Scolopéndrium Adanson (= Phyllítis Ludwig), Hirschzunge (I 34 und CXVI Fig. 199) — Athýrium Roth, Waldfarn, Frauenfarn (I 33; VII Fig. 1100) — Gymnográmma Desv. (= Gymnográmme, = Anográmme Link) — Pellǽa Link, Nacktfarn (I 40) — Notholǽna R. Br., Pelzfarn (I 39) — Allosórus Bernh. (= Cryptográmme R. Br.), Rossfarn, Rollfarn (I 36) — Cheilánthes Sw. (40 Arten in wärmeren Gebieten) — Adiántum L., Lappenfarn — Ptéris L., Saumfarn (I 38) — Pterídium Kuhn (= Eúpteris Newmann), Adlerfarn (I 37) — Polypódium L., Tüpfelfarn (I 40; VII Fig. 1091) — Acróstichum L. (A. aúreum L., Mangrovepflanze) — Platycérium Desv., Hirschgeweihfarn (Heterophyllie).

Fig. 1176. Cystopteris Sudetica A. Br. (I, 11), bei Berchtesgaden (Vorderbrand) in Oberbayern. Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.

XII. Familie: **Parkeriáceae.** Geweihfarne. Hierher einzig Ceratópteris thalictroídes (L.) Brogn., eine einjährige, heterophylle Wasserpflanze, die gelegentlich in Warmhäusern gehalten wird.

XIII. Familie: **Marsiliáceae.** Schleim- oder Kleefarne (I 48) — Marsília L., Kleefarn (I 48) — Pilulária L., Pillenfarn (I 49).

XIV. Familie: **Salviniáceae.** Schwimmfarne (I 47), — Salvínia Micheli[2]), Wurzel-Schwimmfarn (I 47) — Azólla Lam.[3]), Moos-Schwimmfarn (I 47).

Fig. 1177. Aspidium (Polystichum) Braunii Spenner (I, 23), bei Engelberg (Obwalden). Phot. Dr. G. Hegi, München.

---

[1]) **Asplénium lanceolátum** Forskål (nicht Hudson!), (= A. Petéri Becherer) ist in Westdeutschland (I 28) neuerdings in der südlichen Pfalz bei Lambrecht und Fischbach, in Unterelsass beim Wasigenstein, unweit Steinbach, als neu für die Schweiz bei Brissago festgestellt worden. — Die als Unterart behandelte Serpentinform (I 32; VII Fig. 1145) wird neuerdings meist als Art **Asplénium cuneifólium** Viv. (= Asplénium Serpentíni Tausch, = Asplenium Wimmer) aufgefasst. Sie ist nunmehr auch für die Schweiz (Graubünden: Davos-Wolfgang — Parsenn und Klosters-Selfranga) nachgewiesen. — Seite 32. Als neuer Bastard ist **Asplénium fontánum** Bernh. × **Asplénium Trichómanes** (IV) = **Asplénium Verbanénse** v. Tavel) aus dem südlichen Tessin (Ronco, Brissago) einzufügen.

[2]) **Salvínia auriculáta** Aubl. aus dem tropischen Amerika ist 1914 bei Altstetten unweit Zürich, beobachtet worden.

[3]) **Azólla Caroliniana** Willd. (Bd. I S. 47) ist in den letzten Jahrzehnten an verschiedenen Orten beobachtet worden, so mehrfach um Berlin (zw. Zehlendorf und Dahlem massenhaft), Breslau, Giessen, Magdeburg, bei Brechten im Landkr. Dortmund, an der Rednitz und Regnitz, sowie bei Baiersdorf, bei Nürnberg, in Württemberg bei Hohenheim (1908) und Berkheim bei Esslingen (1910), Mannheim, Heidelberg, Pilsen, Eisgrub, Münster usw. — **Azólla filiculoídes** Lam. aus dem tropischen und subtropischen Amerika wurde in mehreren Gewässern bei Nürnberg eingesetzt.

XIV. Abteilung Phanerógamae (= Siphonógamae, = Anthóphyta, = Spermatóphyta, = Embryóphyta siphonógama, = Endoprothalliátae). Blüten- oder Samenpflanzen (I 72).

I. Unterabteilung Gymnospérmae (= Archispérmae). Nacktsamige Gewächse (II 72).

1. Reihe **Cycadofilicáles** (= Pteridospérmae).

Hierher nur fossil bekannte Gruppen, die Anklänge an die Filicáles besitzen.

2. Reihe **Cycadáles** (I 73).

Familie: **Cycadáceae.** Farnpalmen, Palmfarne. — Cýcas L., Falsche Sagopalme (I 73; VII Fig. 1090) — Stangéria T. Moore (Natal) — Bowénia Hook. f. (Australien) — Dióon Lindl. (Mexiko) — Ceratozámia Brogn. (Mexiko) — Zámia L. (trop. und subtrop. Amerika) — Encephalártos Lehmann (Afrika) — Macrozámia Miq. (Australien) — Microcýcas DC. (westl. Cuba).

3. Reihe **Bennettitáles** mit der Familie Benettitáceae (nur fossil bekannt).

4. Reihe **Ginkgoáles** (I 74).

Familie: **Ginkgoáceae** (I 74) mit der Gattung Ginkgo Kaempf. (= Salisbúria Smith, = Pterophýllus Nelson).

5. Reihe **Coníferae**[1]). Nadelhölzer, Zapfenbäume (I 76).

I. Familie: **Taxáceae.** Eibengewächse (I 79). — Torreýa Arnott, Nuss-Eibe (5 Arten in Japan und China sowie in Kalifornien und Florida) — Táxus L., Eibe (I 80) — Austrotáxus Compton (A. spicáta Compton im nördlichen Neukaledonien).

II. Familie: **Podocarpáceae.** Stielfruchtgewächse.

Pherosphæra Archer (2 Arten auf Tasmanien und in Neu-Südwales). — Microcáchrys Hook. f. (M. tetrágona Hook. f. auf Tasmanien). — Saxegothæa Lindl. (S. conspícua Lindl. im südl. Chile). — Dacrýdium Soland., Tränen-Eibe (20 Arten auf den australischen Inseln und im Monsungebiet). — Acmopýle Pilger (A. Panchéri auf Neukaledonien). — Podocárpus L'Hérit., Stielfruchtbaum (Tropen und Subtropen) — Podocárpus macrophýllus (Thunb.) Don (= P. Chinénsis Wall.) aus Japan, im Süden (z. B. im Südtirol) kultiviert — Phyllocládus Rich., Farnfibe (6 Arten auf Neu-Seeland, Tasmanien, östliches Monsungebiet).



Fig. 1178. Araucaría Araucana (Molina) K. Koch (= A. imbricáta Pavon), Chile- oder Arden-Tanne, kultiviert im Tessin. Phot. Dr. Georg Weisenbeck, München.

III. Familie: **Araucariáceae.**

Araucária Jussieu mit etwa 12 Arten auf der südlichen Erdhälfte (VII Fig. 1081 und 1178). — Ágathis Salisb. (= Dámmara Lambert), Kopal-Fichte, mit etwa 12 Arten in Ostasien und Ozeanien.

IV. Familie: **Cephalotaxáceae.** Kopf-Eiben.

Cephalotáxus Sieb. et Zucc., Kopf-Eibe (5 Arten vom tropischen Himalaya durch Süd- und Mittelchina nach Japan) — Amentotáxus Pilger (eine Art in Westchina).

V. Familie: **Pináceae.**

Ábies Miller, Tanne (I 82; VII Fig. 1092) — Keteleéria Carrière, Zedertanne (3 bis 4

[1]) Einteilung nach R. Pilger Pflanzenfamilien. Zweite Auflage (1925).

Arten in China) — Pseudotsúga Carrière, Falsche Tsuga (5 Arten im pazifischen Nordamerika und in Ostasien) — Tsúga Carrière, Hemlock- oder Schierlings-Tanne (VII Fig. 1179A) mit 14 Arten in Asien vom Himalaya bis Japan und in Nordamerika — Pícea A. Dietrich, Fichte (I 84; VII Fig. 1051, 1084, 1163) — Pseudolárix Gord. (I 81) — Lárix Miller, Lärche (I 95; VII Fig. 1171) — Cédrus (Trew) Link, Zeder (4 Arten bezw. Varietäten oder Subspezies im Mittelmeergebiet und im westlichen Himalaya) — Pínus L., Föhre, Kiefer (I 96).



Fig. 1179A. Tsuga Americana (Mill.) Farwell (= Tsuga Canadensis Carr.), Hemlock-Tanne. *a* Zweig mit Zapfen. *b* Geflügelter Samen.

VI. Familie: **Taxodiáceae.**

Sciadópitys Sieb. et Zucc., Nadelschirm (I 81) — Sequoía Endl., Mammutbaum (= Wellingtónia Lindl., = Washingtónia Winslow) (I 82) — Taxódium Richard, Sumpf-Zypresse, Sumpf-Zeder (3 Arten im südöstlichen Nordamerika) — Glyptóstrobus Endl. (G. pendulus Endl., Wasserfichte, in Südostchina) — Cryptoméria DC. (C. Japónica [L. f.] Don in Japan und China) (Fig. 1179B). — Arthrotáxis Don (3 Arten in Tasmanien) — Taiwánia Hayata, Formosa-Zeder (1 Art auf Formosa) — Cunninghámia R. Br., Spiesstanne (2 Arten in China und Formosa).



Fig. 1179B. Cryptomeria Japonica (L. f.) Don, Japanische Zeder. *a* Zweig mit Zapfenblüten. *b* Zapfen. *c*, *d* Zapfenschuppe.

VII. Familie: **Cupressáceae.** Zypressen-Nadelhölzer. — Actinóstrobus Miq. (2 Arten in Westaustralien) — Callitris Ventenat (etwa 20 Arten in Australien und Neukaledonien) — Tetráclinis Masters (T. articuláta [Vahl] Masters, = Callitris quadriválvis Vent. in den Gebirgen von Südspanien und Nordafrika; I 108) — Callitrópsis Compton (C. araucarioídes Compton auf Neukaledonien) — Widdringtónia Endl. (5 Arten im tropischen und südlichen Afrika) — Fitzroýa J. D. Hooker (F. cupressoídes [Molina] Johnston, = F. Patagónica J. D. Hook.), Alerce-Zypresse in Südchile — Disélma J. D. Hooker (D. Archéri J. D. Hook. im westlichen Tasmanien) — Thujópsis Sieb. et Zucc. (Th. dolobráta [L. f.] Sieb. et Zucc., „Hiba") — Thúja L. (= Thúya, Thýia, Thýa aut. inkl. Bióta Endl.), Lebensbaum (6 Arten in Ostasien und Nordamerika) — Libócedrus Endl., Schuppen-Zeder (I 82). — Fokiénia A. Henry et H. H. Thomas (3 Arten in China) — Cupréssus L. (12 Arten im westlichen Nordamerika und in Asien bis ins östliche Mittelmeergebiet) (I 81) — Chamaecýparis Spach, Halb- oder Schein-Zypresse (6 Arten in Nordamerika, in Japan und auf Formosa) — Arceúthos Antoine et Kotschky (A. drupácea [Labill.] A. et K., = Juníperus drupácea Labill. in Kleinasien und im Balkan).

VIII. Familie: **Juniperoídeae.** Wacholdergewächse. — Juníperus[1]) L. (einschl. Sabína Spach), Wacholder (I 89; VII Fig. 1180).

6. Reihe **Cordaitáles** mit der nur fossil bekannten Familie Cordaitáceae.

7. Reihe **Gnetáles** (I 74).

Familie: **Gnetáceae.** (I 74). — Éphedra L., Meerträubchen[2]) (I 75; VII Fig. 1135) — Welwítschia Hook. (= Túmboa Welw.) (I 74) — Gnétum L. (I, 74).

[1]) Das Vorkommen der Unterart subsp. **nána** (Willd.) Briquet (= Juníperus nána Willd.) in Ostpreussen (I 92) wird neuerdings angezweifelt. — **Juníperus Sabína** L. (I 94) tritt spontan auch in Steiermark bei Pürgg (Südhänge des Burgstall und Brandanger) und bei Mixnitz (Rote Wand) auf.

[2]) Aus **Éphedra distáchya** L. (I 75) wird neuerdings das Alkaloid Ephedrin mit adrenalinähnlichen

II. Unterabteilung Angiospérmae (= Metaspérmae, = Stigmáteae). Bedecktsamige Blütenpflanzen (I 109).

1. Klasse Monocotylédones. Einsamenlappige Blüten- oder Samenpflanzen, Streifenblättler, Spitzkeimer, Einblattkeimer (I 109).

1. Reihe Pandanáles. Schraubelbäume (I 116).

I. Familie: **Typháceae.** Rohrkolbengewächse (I 111) — Týpha L., Rohrkolben (I 111; VII 1173).

II. Familie: **Pandanáceae.** Schraubelbäume, Schraubenpalmen — Freycinétia Gaud. (100 Arten in Melanesien und Polynesien). — Pándanus L. (150 Arten in den Tropen).

III. Familie: **Sparganiáceae.** Igelkolbengewächse (I 115) — Spargánium L., Igelkolben (I 116).

2. Reihe Helóbiae (= Fluviáles). Wasser- oder Streifenblättler (I 164).

IV. Familie: **Potamogetonáceae.** Laichkrautgewächse (I 120) — Zostéra L., See- oder Meergras (I 142) — Phyllospádix W. J. Hook. (2 Arten an der Westküste von Nordamerika) — Posidónia König, Neptungras (I 120) — Potamogéton[1]) L., Laichkraut (I 124; VII Fig. 1159) — Rúppia L., Salde (I 170) — Cymodocéa Koenig, Tanggras (I 120) — Zannichéllia L., Teichfaden, Fadenblatt (I 141) — Althénia Fr. Petit (= Belvália Délile) (I 120).



Fig. 1180. Juníperus communis L. subsp. nana (Willd.) Briquet (I, 91). Zwerg-Wacholder in den Alpen mit Früchten. Phot. Dr. G. Hegi, München.

V. Familie: **Najadáceae.** Nixkrautgewächse (I 144) — Nájas L., Nixkraut (I 144).

VI. Familie: **Aponogetonáceae.** Gitterkrautgewächse. (I 164). Hierher einzig die Gattung Aponogéton Thunb. (inkl. Ouvirándra Thouars) in den Tropen und Subtropen von Afrika bis Australien.

VII. Familie: **Juncagináceae** (= Scheuchzeriáceae). Blumenbinsengewächse (I 146), Triglóchin L.[2]), Dreizack (I 148; VII Fig. 973) — Scheuchzéria L., Blumenbinse, Blasenbinse (I 147).

VIII. Familie: **Alismatáceae.** Froschlöffelgewächse (I 150) — Sagittária L.[3]), Pfeilkraut (I 155) — Echinódorus Rich., Igelschlauch (I 155) — Alísma L.[4]), Froschlöffel,

---

Eigenschaften dargestellt. Die Präparate werden in der Schulmedizin bei Asthma bronchiale, bei Hämorrhoidalleiden, zur Bekämpfung von Kollapszuständen usw. empfohlen.

[1]) **Potamogéton Zízii** Mert. et Koch (= P. angustifólius Berchtold et Presl; II 129) wird auch als Unterart („Miniaturform") von P. lucens L. aufgefasst, andrerseits als hybridogen aus P. gramineus und P. lucens gedeutet. Eine Landform wird von Eugen Baumann als var. **terréstris** beschrieben. — **Potamogéton nítens** Weber (II 131) wird auch als P. gramineus × P. perfoliatus gedeutet. Hagström will die subsp. **Panormitánus** Bivona (II 135) als gute Art von P. pusillus L. abtrennen. — **P. trichoídes** Cham. et Schlecht. (II 136) ist jetzt auch für das Rheingebiet nachgewiesen worden, so rechtsrheinisch in der Alten Murg bei Illingen Baden, linksrheinisch im Altrhein bei Neuhofen und Speyer. — **P. filifórmis** Pers. (I 138) ist auch aus Steiermark (Totes Gebirge), Krallersee ca. 1650 m bekannt. In den Alpen (Schwarzsee bei Zermatt) reicht sie bis 2540 m hinauf.

[2]) **Triglóchin marítima** L. (I 149) ist neuerdings bei München (Kiesgrube bei Neufreimann) und in Mähren (Bahnhof Auspitz) adventiv beobachtet worden.

[3]) **Sagittária latifólia** Willd. aus Nordamerika wurde bei Schaffhausen (Eschheimertal) angepflanzt.

[4]) Die Unterart subsp. **graminifólium** Ehrh. (I 152) wird neuerdings wieder als Art (**A. gramíneum** Gmel.) betrachtet.

Wasserwegerich (I 151, VII Fig. 978) — Elísma Buchenau, Froschlöffel (I 153) — Caldésia Parlatore[1]), Caldesie (I 153).

IX. Familie: **Butomáceae.** Schwanenblumengewächse (I 157; VII Fig. 978).

Bútomus L.[2]), Schwanenblume, Wasserliesch, Rinderschneide (I 157).

X. Familie: **Hydrocharitáceae.** Froschbissgewächse (I 158).

Stratiótes L., Krebsschere (I 162) — Hydrócharis L., Froschbiß (I 163) — Vallisnéria L., Wasserschraubel (I 161) — Hydrílla L. C. Rich., Grundnessel, Wasserquirl (I 159) — Helodéa (Elodéa) Michaux[3]) (= Philótria Raf.), Wasserpest (I 160; VII Fig. 977).

3. Reihe **Triuridáles.** Dreischwanzgewächse.

Familie: **Triuridáceae** (I 164) mit etwa 40 tropischen Arten. — Sciáphila Blume. — Triúris Miers.

4. Reihe **Glumiflórae**[4]) (= Graminales). Spelzblütler (II 130).

I. Familie: **Grámina.** Süssgräser, Echte Gräser (I 165; VII Fig. 975).

a) *Tribus Maydeae (I 178).*

Euchlaéna Schrad., Teosinte (I 178). — Zéa L., Mais (I 178; VII Fig. 1068) — Trípsacum (nicht Tripsácum!) L. (I 178) — Chionáchne Brown (I 178) — Cóix L., Tränengras (I 178, 181).

b) *Tribus Andropogóneae (I 185).*

Andropógon L., Bartgras (I 182) — Sórghum (Sorgum) Pers., Mohrenhirse (I 185) — Imperáta Cyr. (I 186) — Sáccharum L., Zuckerrohr (I 186) — Spodiopógon Trin.[5]) — Erianthus Mich., Wollblütgras, Seidengras (I 186) — Anthistíria L. (I 186).



Fig. 1181. Stipa pennata L. (I, 203). Federgras, bei Bellinchen im Odertal (Mark Brandenburg). Phot. Dr. Fr. Sauerbrei, Berlin-Mahlsdorf.

c) *Tribus Zoisieae (I, 186).*

Trágus Haller (= Lappágo Schreb.), Klettengras (I 186).

d) *Tribus Tristegíneae.* — Arundinélla Raddi (Tropen).

e) *Tribus Paniceae (I 194).*

Páspalum[6]) L. (I 194) — Erióchloa[7]) Kunth — Pánicum L. (inkl. Echinóchloa Pal.), Hirse (I 186) — Oplísmenus Pal. (= Hoplísmenus Pal., = Orthopógon Pal.), Grannenhirse (I 190) — Setária Pal. (= Chaetóchloa Pribner), Fennich, Borstenhirse — Cénchrus L. (I 194) — Pennisétum Pers., Rohrkolbenhirse (I 194) — Spínifex L., Stachelkopfgras (I 194).

---

[1]) **Caldésia parnassifólia** Parl. ist jetzt auch für Südbayern (Bühelweier bei Lindau) und für die Schweiz (Tuggen und Bätzimatt am oberen Zürchersee) nachgewiesen.

[2]) **Bútomus umbellátus** L. ist in der Bodenseegegend bei Wasserburg, bei Rheineck, Mammern, bei Moos nächst Radolfszell (1906), in der Schweiz an der Limmat von Engstringen bis Wettingen, zwischen Aesch und Dornach, vorübergehend bei Yverdon (1921) und im Tessin (Piano di Magadino) als Neuansiedler festgestellt worden.

[3]) **Helodéa dénsa** Casp. aus Argentinien. Wird neuerdings in Aquarien gehalten und verwildert gelegentlich daraus, so im Elster-Saale-Kanal bei Leipzig (1910), bei Niers am Niederrhein (1914).

[4]) Neuerdings werden zu dieser Reihe einzig die Gramina gezogen, während die Cyperaceae als eigene Reihe (Cyperáles) betrachtet werden.

[5]) **Spodiopógon Sibíricus** Poir. aus Nord- und Ostasien bei Heidelberg (1909) eingeschleppt.

[6]) **Páspalum dístichum** L. subsp. paspalódes (Michx.) Thellung und **P. dilatátum** Poir. wurden neuerdings wiederholt adventiv beobachtet.

[7]) **Erióchloa punctáta** (L.) Desv., **E. ramósa** (Retz.) O. Kuntze und **E. Australiénsis** Stapf selten eingeschleppt.

f) *Tribus Oryzeae (I 194).*

Phárus L. (I 196) — Zizánia L. (= Hydropýrum Link), Wasserreis, Tuskarora-Reis (I 196) — Oryza L., Reis (I 194) — Lygéum L. (I 196).

g) *Tribus Phalarideae (I 202).*

Microláena R. Br. (M. stipoídes [Labill.] R. Br. aus Australien bei Kettwig [Ruhr] 1925 eingeschleppt) — Phálaris L., (inkl. Baldíngera Fl. Wetterau und Typhoídes Moench), Glanzgras (I 196) — Anthoxánthum L., Ruchgras, Geruchgras (I 198) — Hieróchloë R. Br., Mariengras (I 200).

h) *Tribus Agrostideae (I 238).*

Aristída L.[1]) — Stípa L., Pfriemgras (I 202; VII Fig. 1181) — Lasiogróstis Link, Rauhgras (I 206) — Oryzópsis Michaux, Grannenhirse (I 207) — Mílium L., Flattergras (I 208) — Muehlenbérgia Schreb.[2]) — Cornucópiae L.[3]) — Crýpsis Ait. (inkl. Heleóchloa Host), Dorn- oder Sumpfgras (I 209) — Phléum L., Lieschgras (I 211) — Echinopógon Beauv.[4]) — Alopecúrus L., Fuchsschwanz (I 216) — Míbora Adanson (= Chamagróstis Bockh.), Zwerggras (I 220) — Coleánthus[5]) Seidel (= Schmídtia Tratt.), Scheidenblütgras (I 220) — Phíppsia R. Brown (I 238) — Sporólobus R. Brown, Schleudersamengras (I 238) — Chaetúrus Link[6]) — Thellúngia Stapf[7]) — Cínna L. (I 238) — Polypógon Desf., Bürstengras (I 221) — Gastrídium Pal. (I 222) — Agróstis L., Straussgras, Windhalm (I 222) — Tripláchne Link (I 238) — Calamagróstis Adanson, Reitgras (I 229) — Ammóphila Host (= Psámma Pal.), Strandhafer, Helm (I 236) — Dicheláchne Endl. (D. criníta Hook. aus Australien 1924 bei Kettwig eingeschleppt) — Lagúrus L., Sammetgras (I 237).



Fig. 1182. Melica Transsilvanica Schur (I, 290), bei Remüs (Ramosch) im Unterengadin. Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi.

i) *Tribus Avéneae (I 264).*

Hólcus L. (= Nothólcus Nash), Honiggras (I 238) — Aíra L., Schmielenhafer (I 240) — Weingaertnéria Bernh. (= Corynéphorus Pal.), Silbergras, Keulenschmiele (I 242) — Deschámpsia Pal.[8]), Schmiele (I 243) — Trisétum Pers., Grannenhafer (I 246) — Ventenáta Koeler, Schmielenhafer (I 251) — Avéna L.[9]) (= Avenástrum Koch, = Heuffélia Schur), Hafer (I 252) — Arrhenátherum Pal., Glatthafer (I 260) — Gaudínia Pal., Ährenhafer (I 262) — Danthónia DC., Traubenhafer (I 263) — Sieglíngia Bernh., Dreizahn (I 278).

k) *Tribus Festúceae (I 372).*

---

[1]) **Aristída vágans** Car. wurde mit australischer Schafwolle bei Derendingen (Schweiz) 1918 eingeschleppt, **A. grácilis** Ell. aus Nordamerika im Hafen von Mannheim (1909).

[2]) **Muehlenbérgia Mexicána** (L.) Trin. wurde kürzlich von H. Preuss bei Osnabrück nachgewiesen.

[3]) **Cornucópiae cucullátum** L. aus Griechenland und aus dem Orient 1906 bei Solothurn adventiv.

[4]) **Echinopógon ovátum** (Forst.) Pal. aus Australien bei Derendingen (Schweiz) 1927 eingeschleppt.

[5]) **Coleánthus súbtilis** Seidel wurde in Sachsen (nicht in Schlesien!) noch für weitere sechs Teiche zwischen Freiberg und Sayda im Erzgebirge nachgewiesen (briefl. Mitteil. von Joh. Uhlig, Lehrer in Oederan); vorübergehend auch im Flosshafen bei Mannheim (1899 bis 1902).

[6]) **Chaetúrus fasciculátus** Link aus Spanien 1916 bei Derendingen (Schweiz) adventiv.

[7]) **Thellúngia advéna** Stapf (Heimat wohl Australien) seit 1907 bei Derendingen (Schweiz) fast alljährlich beobachtet (R. Probst).

[8]) Als eine für Mitteleuropa neue bezw. bisher verkannte Art kommt nach E. Issler (Beiträge zur naturwissenschaftl. Erforschung Badens. Heft 5/6, 1930) für Baden (Rheingegend um Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg) die mediterrane **Deschámpsia média** Roem. et Schult. in Betracht.

[9]) **Avéna strigósa** Schreb. (I 253) stellt eine Kulturform von **Avéna barbáta** Pott aus dem Mittelmeergebiet und dem atlantischen Westeuropa dar. — **Avéna desertórum** Lessing (I 257) ist nunmehr auch für Mähren und Niederösterreich nachgewiesen.

Schmídtia Steud.[1]) — Triráphis R. Brown[2]) — Sesléria Scop. (inkl. Oreóchloa Link), Kopfgras (I 265) — Gynérium Humb. et Bonpl.[3]), Pampasgras (I 173, 372) — Arúndo L. (= Dónax Pal.), Pfahlrohr (I 270) — Phragmítes Adanson em. Trin. (= Czérnya Presl., = Trichóon) (I 271) — Molínia Schrank, Pfeifengras (I 276) — Diplächne Pal., Steifhalm (I 278) — Eragróstis Host, Liebesgras (I 279) — Eatónia Raf.[4]) — Koeléria Pers., Kammschmiele (I 281) — Catabrósa Pal., Quellgras — Melíca L., Perlgras (I 289; VII Fig. 1182) — Diarrhéna Raf. (I 372) — Uníola L. (I 372) — Bríza L., Zittergras (I 292) — Aelúropus Trin.[5]) — Dáctylis L.[6]), Knaulgras (I 294) — Cynosúrus L., Kammgras (I 296) — Lamárckia Moench, Goldschwanzgras (I 372) — Schísmus Pal. (Sch. calýcinus Duval-Jouve 1922 bei Kettwig an der Ruhr) — Scleróchloa Pal., Hartgras (I 298) — Póa L.[7]), Rispengras (I 299) — Graphéphorum Desv., Schwingelschilf (I 317) — Glycéria R. Br.[8]), Schwaden, Süssgras (I 318) — Átropis Trin. (= Pucciniélla Parl.), Salzgras (I 323) — Vúlpia Gmelin, Federschwingel (I 325) — Festúca L.[9]) (inkl. Nardúrus Rchb.), Schwingel (I 327) — Sclerópoa Griseb., Steifgras (I 354) — Brómus L., Trespe (I 355) — Boissiéra Hochstetter (I 372) — Brachypódium Pal., Zwenke (I 370; VII Fig. 1138).

l) *Tribus Chlorídeae (I 265).*

Cynódon Rich., Hundszahn (I 264) — Chlóris Sw., Gilbgras (I 265) — Boutelóua Lagasca (I 265) — Astrébla[10]) F. v. Muell. — Beckmánnia Host (I 265) — Eleusíne Gaertn., Fingerhirse, Kreuzgras (I 265) — Dactylocténium Willd., Sterngras (I 265) — Leptóchloa Pal.[11]) — Búchloë Engelm. (I 265).

m) *Tribus Hórdeae (I 402).*

Nárdus L., Borstgras, Hirschgras (I 372; VII Fig. 1106) — Lólium L., Lolch (I 375) — Leptúrus R. Br. (= Pholiúrus Trin.), Dünnschwanz (I 381) — Psilúrus Trin. (I 402) — Agriopýrum[12]) Pal. (= Agriopýron Gaertn. em. Pal.), Quecke (I 382) — Haynáldia Schur (I 396) — Secále L., Roggen (I 382; VII Fig. 1065) — Aégilops L. (I 390) — Tríticum L., Weizen (I 391) — Hórdeum L., Gerste (I 396) — Élymus L., Haargerste (I 400) — Asprélla Willd. (= Hýstrix Moench) (I 402).

n) *Tribus Bambúseae (I 402).*

Arundinária Michx. (I 402) — Phyllóstachys (nicht Phyllostáchys) Sieb. et Zucc. (I 402) — Bambúsa Schreb. (I 402).

II. Familie: **Cyperáceae.** Scheingräser, Sauergräser, Rietgräser (II 5).

1. Unterfamilie: Scirpoídeae.

Dulíchium Pers. (II 9) — Cýperus L. (einschl. Pýcreus Pall., Duvaljoúvea Palla, Acoréllus Palla, Chorocýperus Rikli, Dichostýlis Pall.), Zypergras (II 10) — Erióphorum L., Wollgras (II 15) — Trichóphorum Pers., Haargras (II 23) — Fuiréna Rottb.[13]) — Scírpus L. (ein-

[1]) **Schmídtia pappaphoroídes** Steudel, aus dem tropischen und südwestlichen Afrika, wurde in der Schweiz bei Derendingen (1922) als neu für Europa eingeschleppt.

[2]) **Triráphis móllis** R. Br., aus Australien. Bei Kettwig (1923) und bei Derendingen (1917) eingeschleppt.

[3]) **Gynérium argénteum** Nees führt richtig die Bezeichnung **Cortadéria Selloána** Aschers. et Graebner (= Cortadéria argéntea Stapf).

[4]) **Eatónia obtusáta** (Michaux) A. Gray (= Reboúlia obtusáta Asa Gray) aus Nordamerika. Eingeschleppt im Hafen von Mannheim (1883).

[5]) **Aelúropus Nilíacus** (Spreng.) Steud., aus Nordafrika. Adventiv im Hafen von Mannheim (1898).

[6]) **Dáctylis Aschersoniána** Graebner (= Dáctylis glomeráta L. var. lobáta Dreyer, = subsp. Aschersoniána Thellung) wird richtiger als Unterart von D. glomerata L. aufgefasst. Die Pflanze scheint ab und zu auch in Süddeutschland, in Mähren und in der Schweiz vorzukommen.

[7]) Eine neue von v. Oettingen aufgestellte Art, **Póa athroostáchya,** steht morphologisch zwischen Poa Chaixii und Poa pratensis. Sie wird für das norddeutsche Flachland angegeben.

[8]) **Glycéria remóta** Fries (I 322) wird neuerdings zur Gattung **Póa** gezogen; sie erscheint auch in der Schweiz im Bremgartnerwald bei Bern (und wohl anderwärts im Westen).

[9]) **Festúca alpína** Suter (I 337) ist jetzt auch im nördlichen Steiermark (Sinabell im Dachsteingebiet) und mehrfach in den Bayerischen Alpen nachgewiesen worden. — **Festúca spadícea** L. wird als neu für Steiermark von der Koralpe erwähnt.

[10]) **Astrébla triticoídes** (Lindley) F. v. Mueller, aus Australien als neu für Europa bei der Kammgarnfabrik Derendingen (Schweiz) eingeschleppt (1917 usw.).

[11]) **Leptóchloa Chinénsis** (L.) Nees, aus dem tropischen Asien und Australien. Eingeschleppt 1924 bei Kettwig (Ruhrgebiet) und in der Schweiz (Pfyn, Derendingen).

[12]) Als neue Art kommt hinzu: **Agriopýron litorále** (Host) Dum. (= A. pycnánthum Godr. et Gren.) in Norddeutschland (besonders an der jütländisch-holsteinschen Westküste), im süddeutschen Rheintale, in der Schweiz (Basel, Wallis, Unterengadin) usw.

[13]) **Fuiréna pubéscens** (Lam.) Kunth aus dem westlichen Mittelmeergebiet adventiv im Hafen Ludwigshafen a. Rh. (1901).

schl. Holoschœnus Link, Schoenopléctus [Rchb.] Palla und Bolboschœnus Palla), Binse, Flechtbinse (II 27) — Heleócharis[1]) R. Br. (= Eleócharis R. Br.), Sumpfbinse (II 37) — Blýsmus Panzer (= Nomóchlora Pal., = Chlóra Pal.), Quellried (II 42) — Isolépis R. Br., Moorbinse (II 44) — Fimbrístylis Vahl, Fransenbinse (II 22).

2. Unterfamilie Rhynchosporoideae.

Schœnus L. em. Vahl, Kopfbinse (II 45) — Cládium P. Browne (= Maríscus Zinn), Binsen-Schneide (II 47; VII Fig. 1183) — Rhynchóspora Vahl, Schnabelbinse (II 48).

3. Unterfamilie Caricoideae.

Elýna Schrader, Ährenriet (II 49) — Cobrésia Pers. (= Kobrésia Willd.), Schuppenriet (II 50) — Cárex L., Segge, Rietgras (II 51): Monostáchyae, Einährige Seggen (Nr. 411 bis 418) — Homostáchyae, Gleichährige Seggen (Nr. 419 bis 449)[2]) — Heterostáchyae, Verschiedenährige Seggen (Nr. 450 bis 515)[3]).

Fig. 1183. Cladium Mariscus (L.) R. Br. (= Mariscus Cladium [Sw.] O. Kuntze), Binsen-Schneide (II, 47). Phot. Dr. Joh. Mattfeld, Berlin.

5. Reihe **Príncipes.** Palmenartige Gewächse.

Familie: **Pálmae.** Palmen (II 130).

1. Unterfamilie Coryphoideae. Beerenfrucht-Palmen.

Phœnix L., Dattelpalme (II 130) — Chamærops L., Zwergpalme (II 130) — Trachycárpus Wendl., Hanfpalme — Rhápis L., Ruten-Palme — Acanthorhíza Wendl. et Dietr., Dornwurzel-Palme — Córypha L., Schirm-Palme — Livistóna R. Br. — Erythéa Wats. — Pritchárdia Seem. et Wendland — Brahéa Mart. — Washingtónia Wendl. — Sábal Adans., Palmetto-Palme — Copernícia Mart., Wachs-Palme.

2. Unterfamilie Borassoideae. Steinfrucht-Fächerpalmen.

Hyphæne Gaertn., Dum-Palme — Latánia Comm. — Borássus L., Borassus-Palme — Lodoicéa Labill., Seychellen-Nuss.

3. Unterfamilie Lepidocaryoideae. Panzerfrucht-Palmen.

Maurítia L. f., Buriti-Palme — Ráphia Pal., Bambus-Palme — Metróxylon Rottb., Sago-Palme — Cálamus L., Rotang- oder Kletter-Palme.

4. Unterfamilie Ceroxyloideae. Steinfrucht-Fiederpalmen.

---

[1]) **Heleócharis palústris** (L.) R. Br. (II 38) wird neuerdings in 3 Unterarten gegliedert: subsp. **eupalústris** (Lindberg) Beauverd. Stengel meist hart (wenn gleich zuweilen dick), matt graugrün. Perianthborsten meist 3 bis 4, oft verkümmert oder fehlend. Griffelrest höher als breit, der verdickte Griffelgrund von der Frucht deutlich abgeschnürt. — subsp. **mamillata** (Lindberg) Beauverd. Stengel weich (leicht zusammendrückbar), lichtgrün, durchsichtig, trocken, deutlich gefurcht. Perianthborsten 5 oder 6 (sehr selten 8, niemals 0 oder rudimentär). Griffelrest zitzenförmig, breiter als hoch. Verbreitung noch festzustellen. Nachgewiesen in Ostpreussen, Vorarlberg (Bregenz), Steiermark und in der Schweiz. Siehe Samuelsson, Gunnar. Vierteljahrsschrift der Naturforsch. Gesellschaft Zürich Bd. LXVII (1927) und Koppe, Fritz. Kleine Mitteil. in der Grenzmark Posen-Westpreussen 1927. Abh. und Ber. der naturw. Abt. grenzmärk. Ges. zur Erforschung und Pflege der Heimat. Schneidemühl 1927 — susp. **uniglúmis** (L.) Schult. (II 38).

[2]) Zur Gruppe Cyperoideae der Carices gehört **Cárex invérsa** R. Br. aus Australien und Neu-Seeland, welche Art 1927 von R. Probst als neu für Europa bei Derendingen (Schweiz) festgestellt wurde.

[3]) Bei der Gruppe Vesicáriae ist einzuschalten: **Cárex leviróstris** (Blytt) Fries (= Cárex rhynchophýsa C. A. Mey.) f. **Lettauána** J. Abromeit. Skandinavische Segge. Als neu für Ostpreussen und für Deutschland 1925 von Mittelschullehrer i. R. August Lettau im Kreis Insterburg im Forstrevier Kranichbruch (Graben des Wolfsgarten-Gestell) entdeckt. Siehe Bericht des Preuss. Botan. Vereins, 1917—1927 S. 9 und 33.

Caryóta L., Fischschwanz-Palme, Brenn-Palme — Arénga Wendl. et. Dietr., Zucker-Palme — Iriártea Ruiz et Pav., Stelzen-Palme — Ceróxylon Humb., Bonp. et Kunth — Chamaedórea Willd., Spazierstock- oder Bergpalme (II 130) — Oreodóxa Willd., Königs-Palme — Eutérpe Mart., Assai-Palme — Oenocárpus Mart., Wein-Palme — Kéntia Bl. (= Hówea Becc.) — Archontophœnix Wendl. et Dietr. (II 130) — Aréca L., Betelnuss-Palme (II 130) — Eláeis Jacq., Öl-Palme — Attaléa Humb., Bonpl. et Kunth, Piassaba-Palme — Cócos L., Kokos-Palme — (II 130) — Jubæa Gay., Coquito- oder Chilenische Honig-Palme — Astrocáryum Mey., Sternnuss-Palme — Báctris Jacq. — Desmóncus Mart.

5. Unterfamilie ***Phytelephantoideae.***

Halb-Palmen.

Phytélephas Ruiz et Pav., Steinnuss-, Elfenbein-Palme.

6. Unterfamilie ***Nipoideae.***

Nípa Thimb., Nipa- oder Atap-Palme.

6. Reihe **Synánthae.**

Familie: **Cyclanthaceae.** Kolbenpalmen (II 131) — Carludovíca Ruiz et Pav., Panama- oder Toquillo-Palme, Bombanassa.

7. Reihe **Spathiflórae.** Scheibenblattblütler.

I. Familie: **Aráceae.** Arongewächse (II 131).

1. Unterfamilie Pothoideae.

Póthos L. (besonders in Melanesien) — Anthúrium L., Fahnen- oder Schwanzblume (II 131) — Zamiocúlcas L. (Z. Loddigésii auf Bourbon, Sansibar, Ostafrika) — Gonátopus (Hook. f.) Engler (Ostafrika) — Ácorus L., Kalmus (II 134).

Fig. 1184. Zebrina pendula Schnitzl. (= Tradescantia zebrina Loud.), Zebratute (II, 143). *a* Habitus. *b* Blüte.

2. Unterfamilie Monsteroideae.

Rhadidóphora Hassk. (etwa 70 kletternde indo-malayische Arten) — Monstéra Adanson, Fensterblatt, Gitterpflanze (I/XCVII Fig. 149b) im tropischen Amerika (II 131) — Spathiphýllum Schott, Blattfahne, fast ausschließlich im trop. Amerika (I/CXI Fig. 183b).

3. Unterfamilie Calloideae.

Oróntium L. (O. aquáticum L. im atlantischen Nordamerika) — Cálla L., Drachenwurz, Wasser-Calla (II 136; VII Fig. 1113).

4. Unterfamilie ***Lasioideae.***

Lásia Lour., indisch-malayisch — Dracóntium L., im trop. Amerika — Amorphophállus Blume (inkl. Hydrósme Schott), Dickkolben. Knollenpflanzen mit riesigen Blättern und Blütenständen. Etwa 80 palaeotropische Arten.

5. Unterfamilie ***Philodendroideae.***

Philodéndron Schott mit 230 Arten im tropischen Amerika — Aglaonéma Schott, Kolbenfaden, indisch-malayisch — Dieffenbáchia Schott. im tropischen Amerika — Peltándra Raf. mit 2 Arten in Nordamerika — Zantedéschia Spreng. (= Calla L. z. T., = Richárdia Kunth) mit 10 Arten in Südafrika (II 131; I/CXI Fig. 183).

6. Unterfamilie ***Colocasioideae.***

Steudnéra C. Koch (Ostindien) — Alocásia Schott, Tropenwurz (indisch-malayisch) — Remusátia Schott (Ostindien, Java) — Colocásia Schott, Blattwurz (indisch-malayisch) — Caládium Vent., Buntwurz (trop. Amerika) — Xanthosóma Schott (trop. Amerika) — Syngónium Schott (trop. Amerika) — Ariópsis Graham (Ostindien).

7. Unterfamilie Aroideae.

Spathicárpa Hook., Blattbeere (Brasilien, Paraguay). — Árum L., Aronstab (II 132) — Dracúnculus Miller, Schlangenwurz (II 134) — Helicíderos Schott (H. muscívorus [L.] Engl., fliegenfangende Hornwurz, auf Corsika und Sardinien) — Typhónium Schott (indisch-malayisch-australisch) — Sauromátum Schott, Eidechsenwurz (II 131) — Helicophýllum Schott (5 Arten in Westasien) — Bíarum Schott (11 Arten im Mittelmeergebiet) — Arísarum Targ.-Tozz., Kraft

Aron (3 Arten im Mittelmeergebiet) — Arisǽma Martius (in den Tropen und Subtropen) — Pinéllia Tenore (II 131) — Cryptocorýne Fischer (Wasserpflanzen, indisch-malayisch).

8. Unterfamilie Pistioídeae.

Pístia L., Wasserkohl, Muschelpflanze (II 131).

II. Familie: **Lemnáceae.** Wassserlinsen (II 137). — Spirodéla Schleiden, Teichlinse (II 141) — Lémna L., Wasserlinse — Wólffia[1]) Horkel (= Horkélia Rchb., = Grántia Griff., = Bruniéra Franch.), Entenlinse.

8. Reihe **Farinósae** (z. T. Enantioblástae). Mehlsamengewächse (II 142).

I. Familie: **Flagellariáceae** (II 142) — Joinvíllea Gaud. — Flagellária L. — Súsum Blume (= Hanguána Blume).

II. Familie: **Restionáceae** (II 142), über 250 Arten in den subtropischen und gemässigten Gebieten, wenige tropisch — Réstio L., Strickgras (Südafrika und Australien) — Elégia L. (Südafrika) — Leptocárpus L. — Thamnochórtus Berg (Südafrika).

III. Familie: **Centrolepidáceae** (II 142), etwa 30 Arten, meist Sumpfpflanzen — Juncélla F. v. Muell. — Brízula Hieron. — Aphélia R. Br. — Centrolépis Labill. — Hydatélla Diels (Westaustralien).

IV. Familie: **Mayacáceae** (II 142).

V. Familie: **Xyridáceae.** Degenkräuter (II 142) mit etwa 50 Arten.

VI. Familie: **Eriocauláceae,** etwa 550 Arten. — Eriocaúlon L. — Paepalánthus Mart. — Tonína Aubl. — Lachnocaúlon Kunth.

VII. Familie: **Thurniáceae** (die Familie wurde früher zu den Juncaceen gestellt). 2 Arten der Gattung Thúrnia Hook. f. in Britisch Guayana.

VIII. Familie: **Rapateáceae** (II 142).

IX. Familie: **Bromeliáceae.** Ananasgewächse (II 142, 143). — Caragúata Lindl. — Massángea E. Morren — Guzmánnia Ruiz et Pav. — Tillándsia L., Greisenbart (II 143) — Vriésea Lindl. — Púya Molina — Dýckia Schult. — Héchtia Klotsch et Zucc. — Pitcaírnia L'Hér. — Bromélia Plum. — Káratas Plum. — Nidulárium Lem., Nestrosette — Cryptánthus Otto et Dietr., Versteckblüte — Ánanas Adans. (II 143; I/CLII Fig. 286) — Billbérgia Thunb. — Aechméa Ruiz et Pav., Lanzenrosette.

X. Familie: **Commelináceae** = Ephemeráceae). (II 144) — Póllia Thunb. — Palisóta Rchb. — Commelína L., mit über 100 Arten in den wärmeren Gebieten (II 143) — Aneiléma R. Br. — Cochliostéma Lemaire, Schneckenkölbchen (II 143) — Dichorisándra Mikan, Doppeldrilling — Tinántia Scheidweiler (II 143) — Tradescántia L. (II 143) — Callísia Loeffl. (trop. Amerika) — Rhœo Hance (II 143) — Zebrína Schnitzl., Zebratute (II 143 und VII Fig. 1184).

XI. Familie: **Pontederiáceae** (II 143) — Monochária Presl — Eichhórnia Kunth (I/XCIII Fig. 137 a) — Pontedéria L. — Heteranthéra Ruiz et Pavon, inkl. Scholléra (II 143).



Fig. 1185. Juncus biglumis L. nec Jacq. *a* Habitus. *b* Blütenstand. *c* Kapsel. *d* Samen.

XII. Familie: **Cyanastráceae** (II 144) . — Cyanástrum.

XIII. Familie: **Philydráceae** (II 144). — Philýdrum Banks — Helmhóltzia F. v. Muell. — Fritzélia F. v. Muell.

9. Reihe **Liliiflórae.** Lilienartige Gewächse (II 320).

I. Familie: **Juncáceae.** Binsengewächse (II 144).

Priónium E. Meyer (II 145) — Oxýchloë Philippi — Distíchia Nees et Meyen — Marsippospérmum Desv. — Rostkóvia Desv. — Júncus L.[2]), Binse (II 145; VII Fig. 1169 und 1185) — Lúzula Lam. et DC.[3]) (= Juncoídes Adans.), Simse, Marbel (II 173; VII 1071 und 1086).

[1]) **Wólffia arrhíza** Wimmer ist in der Rheinprovinz auch bei Bärendonk nächst Kempen, Oedt, Tönisberg bei Krefeld, zw. Kempen und Aldekerk, zw. Tönisberg und Schaephuysen, Nersdonk, Mühlheim a. Rh. und Gladbach bei Köln (an den beiden letzten Orten wohl verschwunden) nachgewiesen worden.

[2]) **Júncus biglúmis** L. nec Jacq., zweiblütige Segge, wurde als neu für die Alpen in Salzburg (Hochfeind) nachgewiesen. Vgl. Oesterr. Botan. Zeitschrift LXVII (1918) und VII Fig. 1185. — **Júncus stýgius** L., Moor-Binse (II 163), ist neuerdings in Südbayern im Pulvermoos bei Oberammergau, Premerfilz bei Lechbruck, Wölkamer See im Halfinger Filz, Gallerfilz bei Bernried und am Hofstätter See bei Rosenheim festgestellt worden — subsp. Grössii Abromeit. In Ostpreussen (Kl. Lenkuker See bei Lötzen und Milchbude im

II. Familie: **Stemonáceae** (= Roxburghiáceae). 3 Gattungen und wenige Arten im Monsungebiet, in Ostindien, Japan und im südlichen Nordamerika.

III. Familie: **Liliáceae.** Liliengewächse (II 184; VII Fig. 972).

1. Unterfamilie Melanthioideae (II 199).

Tofiéldia Hudson, Simsenlilie (II 189; VII Fig. 1130) — Narthécium Huds., Beinbrech, Ährenlilie (II 199) — Helónias L. (II 199) — Schoenocaúlon A. Gray (= Sabadílla Brandt) — Zygádenus Michx. (Sibirien bis Nordamerika) — Verátrum L., Germer (II 192; VII Fig. 1187) — Uvulária J. E. Smith, Zäpfchenkraut (II 199) — Gloriósa L., Ruhmkrone (II 199) — Tricýrtis W. J. Hook. (II 199) — Meréndera Ram. (M. Bulbocódium Ram., Irrlichtpflanze, auf der Pyrenäenhalbinsel) — Bulbocódium[1]) L., Lichtblume (II 194) — Cólchicum L., Zeitlose (II 195; VII Fig. 1077).

2. Unterfamilie: Herrerioideae. Knolle einen windenden Spross treibend. Kapseln septizid aufspringend. 3 Arten im südöstlichen Brasilien.

3. Unterfamilie: Asphodeloideae (II 277).

Asphódelus L., Affodill, Goldwurz (II 199) — Asphodéline Rchb., Peitschenaffodill (II 277) — Paradísia Mazzucato, Trichterlilie (II 200) — Eremúrus Bieb., Lilienrüssel, Steppenlilie (II 277) — Bulbíne L. (viele Arten in Südafrika) — Anthéricum L., Graslilie (II 201) — Chloróphytum Ker., Liliengrün (II 277; VII Fig. 1166) — Bowiéa Harvey (II 277) — Dianélla Lam. (Ostasien, Polynesien, Australien) — Hósta Tratt. (= Fúnckia Spreng.), Herzlilie (II 277; VII Fig. 1188) — Hemerocállis L., Taglilie (II 204; VII 1070, 1154) — Phórmium Forster, Lilienflachs (II 277) — Kniphófia Moench (= Trítoma Ker.), Hyazinthenaloë, Raketenblume (II 277) — Áloë (Tournef.) L., Bitterschopf (II 277; VII Fig. 1152) — Gastéria Duval, Bitterbauch (II 277) — Apícra Willd. (II 277) — Hawórthia Duval (II 277) — Aphyllánthes L., (A. Monspeliénsis L. im westlichen Mittelmeergebiet) — Xanthorrhœa Sm., Grasbaum (II 277) — Kíngia R. Br. (Australien).

Fig. 1186. Hymenocallis sp. Blüten mit Nebenkrone. Phot. † B. Othmer, München.

4. Unterfamilie: Allioideae (II 278).

Agapánthus L'Hér., Schmucklilie (II 278; VII Fig. 1190) — Tulbághia L. (Afrika) — Gágea[2]) Salisb., Gelbstern, Goldstern (II 205) — Állium L.[3]), Lauch (II 137; VII Fig. 1069, 1125, 1189) — Nothoscórdum Kunth, Lauchschön — Brodiæa Sm. (= Hookéra Salisb.) (II 278).

5. Unterfamilie: Lilioideae (II 278).

Lílium L.[4]), Lilie (II 234; VII Fig. 1085, 1137, 1191) — Fritillária L., Schachblume (II 239) — Erythrónium L., Zahnlilie (II 245) — Lloýdia Salisb., Faltenlilie (II 278) — Túlipa L., Tulpe (II 242; VII Fig. 1153) — Calochórtus Pursh (II 278) — Urgínea Steinheil (II 278) — Galtónia Decne. (II 279) — Dípcadi Medicus, Meerzwiebel (II 279) — Scílla L. (inkl. Endýmion), Blau-

Kr. Lyck. — **Júncus castáneus** Sm., Kastanienbraune Segge (II 164), wurde in Nordtirol bei Vent (W. Kinzel briefl.) entdeckt (fehlt in Vorarlberg). In Graubünden auch im Misox (Val Vignone) nachgewiesen. — **Júncus squarrósus** L. (II 161) ist jetzt auch für Salzburg (Rossbrand bei Radstatt) bekannt.

[3]) **Lúzula Forstéri** (Sm.) × L. **pilósa** (L.) Willd. (= **Lúzula Borréri** Bromfield). Im sog. „Remmerich" nordwestlich von Untergrombach bei Bruchsal von A. Kneucker entdeckt. — **Lúzula lútea** (All.) Lam. et DC. × **L. spadícea** (All.) Lam. et DC.). Schweiz: Grimsel (Samuelsson). — **Lúzula Johánnis príncipis** Murr (L. multiflora × L. Sieberi) ist nach Samuelsson zu L. multiflora zu stellen.

[1]) **Bulbocódium vérnum** L., wurde von R. Scharfetter als neu für die Ostalpen an der Görlitzen bei Annenheim am Ossiachersee (780 m) in Kärnten festgestellt.

[2]) **Gágea spathácea** (Hayne) Salisb. (II 210) ist nun auch für Österreich (Pettau in Steiermark) nachgewiesen, **G. mínima** (L.) Ker-Gawler auch in Steiermark (Föttelek).

[3]) **Állium stríctum** Schrader (II 220) wurde von Vierhapper für Salzburg (Schellgaden im Murwinkel) nachgewiesen.

[4]) Zu **Lílium Mártagon** L. (II 236) gehören: var. **alterniflórum** Wilczek. Alle Laubblätter wechselständig. — f. **subhercýnicum** F. Hermann. Kanten der Fruchtkapseln abgerundet, stumpf. Blütenknospen länglich-oval, nur auf dem Scheitel und auf der Mittellinie des Rückens der Blütenhüllblätter zerstreut wollig-zottig bis kahl. Blütenhüllblätter schmal länglich (Harz). — f. **Thuringíacum** F. Hermann. Kapsel mit hervorragenden, scharf gekielten, fast geflügelten Kanten. Blütenknospen kugelig, überall dicht weiss wollig-filzig. Blütenhüllblätter verhältnismäßig breiter und kürzer (Steiger bei Erfurt).

Fig. 1187. Veratrum nigrum L. (II, 192). Schwarzer Germer. *a* Untere Stengelpartie. *b* Junger Blütenstand. *c* Fruchtstand. *d* Blüte. e Samen.

Fig. 1188. Hosta caerulea Tratt. (= Funckia ovata Spreng.) (II, 277). Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.

Fig. 1189. Allium Ophioscorodon Link, Perlzwiebel (II, 231). Phot. X. Siegle, Pforzheim (Baden).

Fig. 1190. Agapanthus umbellatus L'Hérit. (II, 278). Blaue Schmucklilie. Phot. Otto Ziegler, Zollikon (Schweiz).

Fig. 1191. Lilium Martagon L. Pflanze mit Früchten (die obersten sind nicht normal ausgebildet, samenlos). Phot. Walter Hirzel, Winterthur.



Fig. 1192. Yucca filamentosa L. (II, 279), Palmlilie.

Fig. 1193. Asparagus Sprengeri Regel (II, 261). Phot. Otto Ziegler, Zollikon (Schweiz).

Fig. 1194. Aspidistra elatior Blume, Sternschild (II, 280). Phot. Otto Ziegler und Dr. G. Hegi.

stern (II 246; VII Fig. 968) — Camássia Lindl., mit 2 Arten in Nordamerika — Eúcomis L'Hér. (= Basilæa Juss.), Schopflilie (II 279) — Ornithógalum L.[1]) em. Salisb., Milchstern, Vogelmilch — Chionodóxa Boiss., Schneestolz (II 279; V/1 414) — Puschkínia Adams (II 279) — Hyacínthus L. (inkl. Hyacinthélla Schur und Bellevállia Lapeyr.), Hyazinthe (II 279) — Muscári L., Bisam- oder Perlhyazinthe (II 256; V/I Fig. 1934) — Veltheímia Gleditsch (II 279) — Lachenália Jacq. (II 279).

6. Unterfamilie: Dracaenoídeae (II 279).

Yúcca L., Palmlilie (II 279; VII Fig. 1192) — Nolína Mich. (II 280) — Dasylírion Zucc., Rauhschopf (II 279) — Cordýline Commers., Keulenbaum (II 279) — Dracæna Vandelli, Drachenblutbaum (II 279) — Astélia Banks et Soland. (altozeanisch) — Sanseviéra Thunb. (II 280).

7. Unterfamilie: Asparagoídeae (II 280).

Aspáragus L. (inkl. Myrsiphýllum Willd. und Medéola L.), Spargel (II 260; VII Fig. 1193) — Dánaë Med. (D. racemósa Moench aus Vorderasien als „Alexandrinischer Lorbeer" in Kultur) — Sémele Kunth (II 264) — Rúscus L., Mäusedorn (II 264) — Smilacína Desf. (20 Arten im gemässigten Asien und Amerika) — Majánthemum Weber, Schattenblume (II 267) — Stréptopus Michaux, Knotenfuss (II 268) — Polygonátum Miller[2]), Weisswurz, Salomonssiegel (II 269; VII Fig. 1066, 1067) — Convallária L., Maiglöckchen (II 273; VII Fig. 1132) — Reinéckia Kunth (II 280) — Aspidístra Ker-Gawl., Sternschild (II 280; VII Fig. 1194) — Páris L., Einbeere (II 275) — Tríllium L. (II 280).

Fig. 1195. Hippeastrum vittatum Herb., Zimmeramaryllis, Ritterstern, als Topfpflanze gezogen. Phot. † B. Othmer, München.

8. Unterfamilie: Ophiopogonoídeae (II 280).

Liríope Lour. (China) — Ophiopógon Ker-Gawler, Schlangenbast, mit 4 Arten, von Japan bis zum Himalaja; O. Japónicus Ker-Gawler wird zu Einfassungen und als Rasen angepflanzt.

9. Unterfamilie: Aletroídeae (II 280).

Alétris L. (Ostasien, Nordamerika).

10. Unterfamilie: Luzuriagoídeae (II 280).

Geitonoplésium A. Cunn. (= G. cymósum [R. Br.] aus dem östlichen Australien, selten in Kultur — Philésia Comm. (Ph. buxifólia Lam., Kussblume), in Südchile und Feuerland — Lapagéria Ruiz et Pav. (II 280).

11. Unterfamilie: Smilacoídeae (II 280).

Smílax Tourn., Stechwinde (II 280). — Rhipógonum Forst. (Australien, Neu Seeland).

IV. Familie: **Haemadoráceae** (II 320) (mit über 30 Arten), in Australien, im Kapland und im tropischen Amerika.

V. Familie: **Amaryllidáceae** (= Leucoiáceae). Amaryllispflanzen (II 306).

1. Unterfamilie: Amarylloídeae.

Haemánthus L., Blutblume (II 319; VII Fig. 1102) — Búphane Herb., wenige Arten im Kapland und im tropischen Ostafrika — Clívia Lindl., Riemenblatt, Liliendolde (II 310) — Galánthus L., Schneeglöckchen (II 307) — Leucóium L. (= Nivária Moench), Knotenblume (II 309) — Nérine Herb. (II 310) — Amaryllis L. (= Belladónna Sweet) (II 310) — Brunswígia Heister (Kap.) — Vallóta Herb. (II 310) — Pephyránthes Herb., Zephirblume (II 310) — Sternbérgia Waldst. et Kit (II 310) — Crínum L., Hakenlilie (II 310) — Cyrtánthus Ait., Bogenlilie (II 310) — Ixiolírion Fisch. (Vorderasien) — Hymenocállis Salisb., Schönhäutchen (VII Fig. 1186), im tropischen Amerika — Eúcharis Planch., Herzkelch (Zentralamerika) — Narcíssus L., Narzisse (II 312) — Pancrátium L., Kraftzwiebel (II 310) — Sprekélia Heister, Jakobslilie (II 310) — Hippeástrum Herb., Ritterstern (II 319; VII Fig. 1195).

2. Unterfamilie: Agavoídeae (II 310).

Brávoa La Llave et Lexarza (Mexiko) — Polyánthes (Poliánthes) L., Tuberose (II 319; VII

---

[1]) **Ornithógalum tenuifólium** Guss. (II 252) wird nunmehr auch aus Baden (zw. Bellingen und Neuenburg) und Steiermark (Radkersburg) angegeben.

[2]) **Polygónatum verticillátum** (L.) All. (II 273) wurde als neu für die Provinz Brandenburg bei Frankfurt (Oderabhänge bei der Buschmühle) nachgewiesen. — Polygonátum multiflórum (L.) All. × P. officinále All. ist nach Hermann in Gärten entstanden, ausserdem im Neuenburger Jura (Creux du Van, Oeillon). Siehe auch Vestergren, I. Svénsk Bot. Tidskr. (1925).

Fig. 1196) — Agáve L., Agave (II 317) — Fourcróya (nicht Foucróya) Schult., Scheinagave (II 317) — Beschornéria Kunth (II 320) — Doryánthes Correa, Speerblume (II 320).

3. Unterfamilie: Hypoxioïdeae (II 320).

Altstroemèria L., Inkalilie (II 320) — Bomárea Mirb. (II 320) — Curculígo Gaertn., Lilienrüssel (II 320) — Hypóxis L. (Tropen, Subtropen) — Anigosánthus Labill. (II 320).

4. Unterfamilie: Campynematoïdeae (2 Arten in Tasmanien).

VI. Familie: **Velloziáceae.** Charakterpflanzen der Campos.

Vellózia Vandelli (Südamerika) und Barbacénia Vand. (Südamerika, Südafrika) (II 320).

VII. Familie: **Taccáceae** (II 320).

Tácca Forster (inkl. Attácia Presl) (II 320) — Schizocápsa Hance (Kanton).

VIII. Familie: **Dioscoreáceae.** Yamswurzelgewächse (II 280).

Borderéa Miègev. (II 280) — Dioscórea L.[1]), Yamswurzel (II 281) — Testudinária Salisb., Schildkrötenpflanze (II 281) — Rajánia L. (Westindien) — Támus L.[2]) (=Támnus Juss., =Thámnus Link), Schmerwurz (II 281).

IX. Familie: **Iridáceae.** Schwertliliengewächse (II 283).

1. Unterfamilie: Crocoïdeae.

Crócus L., Safran (II 297; VII Fig. 1165) — Romúlea Maratti (Mittelmeergebiet).

2. Unterfamilie: Iridoïdeae.

Hermodáctylus Adans. (H. tuberósus Salisb. im Mittelmeergebiet) — Íris L., Schwertlilie (II 284) — Moræa L. (II 306) — Márica Ker-Gawler (II 306) — Tigrídia Ker-Gawler, Tigerlilie, Pfauenlilie (II 305) — Ferrária L. (Kap) — Nematostýlis Nutt. (Nord- und tropisches Amerika) — Homéria Vent. (Südafrika) — Libértia Spreng. (= Reneálmia R. Br.) — Bobártia Ker Gawler (Kap) — Belamcánda Adans. (B. Chinénsis Lem. in China und Japan) — Sisyrínchium L., Gras-Schwertel (II 305) — Patersónia R. Br. (Australien) — Orthrosánthus Sweet (Australien) — Cleánthe Salisb. (Kap) — Arístea Ait. (Afrika) — Witsénia Thunb. (Kap) — Nivénia Vent. (Südafrika).

3. Unterfamilie: Ixioïdeae.

Schizostýlis Backh. et Harv., Spaltgriffel (2 Arten in Südafrika — Geissorrhíza Ker-Gawler (Kap) — Hesperántha Ker-Gawler (meist im Kapland) — Íxia L. (= Wuérthia Regel), Klebschwertel (II 305; VII Fig. 1197) — Dieráma K. Koch, Trichterschwertel (Südafrika) — Tritónia Ker-Gawler (inkl. Montbrétia DC. und Crocósma Plach.) (II 305; VII Fig. 1198) — Sparáxis Ker-Gawler, Fransenschwertel (II 306) — Acidanthéra Hochst. (Süd- und tropisches Afrika) — Synnótia Sweet (Südafrika) — Babiána Ker-Gawler (Südafrika) — Gladíolus L., Siegwurz (II 302; VII 81, Fig. 1115) — Antholýza L., Rachenlilie (II 306) — Lapeyroúsia Pourr. (südliches und tropisches Afrika) — Watsónia Miller (II 306) — Freésea (Freesia) Klatt (II 306; VII Fig. 1199).

Fig. 1196. Polyanthes tuberosa L., Tuberose (II, 319). *a*, a_1 Blühender Spross. *b* Blüte.

10. Reihe **Scitamíneae** (= Arillátae). (II 320).

I. Familie: **Musáceae.** Bananenpflanzen (II 320).

Músa L., Banane, Pisang (II 320; I/XCVII Fig. 149) — Ravenála Adans. (II 320) — Strelítzia Ait. (II 320) — Helicónia L. (II 320).

II. Familie: **Zingiberáceae.** Ingwergewächse (II 320).

Cúrcuma L., Safranwurz (II 321) — Hedýchium Koenig, Süsschnee (II 321) — Kaempféria L. (II 321) — Roscœa Smith (Himalaya) — Glóbba L. (indisch-malayisch) (II 328) — Alpínia L. (II 321) —

[1]) Eine für Europa neue Art (**D. Balcánica** Košanin) wurde 1913 in Nordalbanien entdeckt.

[2]) **Támus communis L.** ist nunmehr auch für Württemberg (Laimnau [auf Neuland] und Betznau im Oberamt Tettnang) nachgewiesen.

Reneálmia L. — Zíngiber Adans, Ingwer (II 321) — Amómum L. (II 321) — Elettária Maton (= Cardamómum Salisb.), Kardamon (II 311) — Cóstus L. (II 321).

III. Familie: **Cannáceae.** Blumenrohrgewächse (II 321).

Cánna L., Blumenrohr, Safranmarron (II 321).

IV. Familie: **Marantáceae.** Pfeilwurzgewächse (II 321).

Phrýnium Willd., Sumpfmarante (II 321) — Calathéa G. F. W. Meyer, Korbmarante (II 321) — Maránta L., Geilwurz (II 321) — Ischnosíphon Körnicke (II 321) — Thália L. (II 321).

11. Reihe **Microspérmae** (= Gynándrae). (II 395). Mannweibige.

I. Familie: **Burmanniáceae**[1]) (II 395) — Gymnosíphon Blume — Dictyostégia Miers — Aptéria Nutt. — Burmánnia L. — Campylosíphon Blume.

II. Familie: **Orchidáceae** (= Satyriáceae[2]). Knabenkräuter (II 321; VII Fig. 970, 1108).

I. Unterfamilie: Pleonándrae (= Diándrae).

Cypripédium L. (= Cypripedílum), Frauenschuh (II 326) — Selenipedílum Rchb. (II 324) — Paphiopedílum Pfitzer, Venusschuh (II 324).

II. Unterfamilie: Monándrae.

Óphrys L. em. R. Br., Ragwurz, Insektenorchis (II 328) — Órchis[3]) L., Knabenkraut (II 325; VII Fig. 970a, d, 1200, 1202) — Serápias L. (= Serapiástrum O. Kuntze), Stendelwurz — Áceras R. Br., Fratzenknabenkraut, Spornlos (II 359; VII Fig. 1202, 1203) — Loroglóssum Rich. (= Himantoglóssum Sprengel) (II 360; VII Fig. 1204) — Anacámptis Rich.[4]), Hundswurz — Chamaeórchis Rich. (= Chamórchis L.), Zwergknabenkraut (II 361) — Hermínium R. Br., Einknolle (II 361) — Coeloglóssum Hartmann, Hohlzunge (II 363) — Gymnadénia R. Br.[5]), Nacktdrüse (II 367; VII Fig. 970) — Nigritélla Rich., Kohlröschen (II 365) — Platanthéra Rich., Breitkölbchen (II 372; VII Fig. 970b) — Habenária Willd. (etwa 900 Arten, besonders im tropischen Asien und Amerika) — Satýrium Sw. (70 Arten am Kap und im tropischen Afrika) — Dísa Berg (130 Arten im tropischen und im südlichen Afrika) — Vanílla Sw. (II 324) — Cephalanthéra Rich.[6]), Waldvögelein, Kopforchis



Fig. 1197. Ixia maculata L. (II, 305). *a* Blühender Sproß. *b* Blüte.

Fig. 1198. Tritonia (Montbretia, Crocosma) crocosmaeflora Voss. Garten-Tritonie (II, 305).

[1]) Neuerdings wird die Familie als stark abgeleitete Gruppe (Blüten meist aktinomorph. Endosperm vorhanden) zu den Liliiflorae gezogen. Die Gattung Córsia (wenige Arten auf Neu-Guinea) mit zygomorphen Blüten wird von Beccari als besondere Familie **(Corsiáceae)** angesehen.

[2]) Die beiden Gattungen **Neuwiedia** Bl. (6 Arten im tropischen Asien und Australien) und **Apostásia** Blume (8 Arten im tropischen Asien und Australien) werden neuerdings als **Apostasiáceae** von den Orchidaceen als eigene Familie abgetrennt.

[3]) **Orchis córdiger** Fries (II 355) ist nach R. Soó eine den Ost-Karpaten und der Balkanhalbinsel eigentümliche Art. Die Angaben aus den Alpen sollen sich auf Orchis latifolius subsp. impudícus (Crantz) Soó beziehen.

[4]) Der Bastard **Anacámptis pyramidális** (L.) Rich. × **Órchis Mório** L. wurde 1920 von R. La Nicca bei Haldenstein (Graubünden) entdeckt.

[5]) **Gymnadénia cucullata** (L.) Rich. (= Neottiánthe cucullata [L.] Schlechter), Kapuzen-Nacktdrüse (II 368) ist nunmehr auch im Memelgebiet bei Tilsit (Schreitlaugkener Forst) und bei Nidden (Purwienscher Berg), sowie im Kreis Lyck (Ploczitznen) nachgewiesen worden. An Stelle von Forst Warna bei Iszlaudzen ist richtig Forst Warnen bei Iszlandzen zu schreiben. Der Standort Lochstädt ist unsicher.

[6]) **Cephalanthéra pállens** Rich. × **C. rúbra** (L.) Rchb. (= **Epipáctis Mayéri** W. Zimmermann) wurde von C. Josef Mayer in München bei Neufahrn im Isartal (Oberbayern) entdeckt.

(II 379) — Epipáctis Adans.[1]) (= Helleborine Miller), Sumpfwurz (II 374; VII Fig. 1108) — Limodórum Sw. (= Centrósis Sw.), Dingel (II 382) — Epipógium (= Epípogon Sw.), Oberkinn, Widerbart — Spiránthes Rich., Drehwurz, Wendelorchis — Listéra R. Br., Zweiblatt (II 386) — Neóttia Ludwig, Nestwurz, Lederorchis — Goodyéra R. Br., Netzblatt — Thúnia Rchb. (Birma, Himalaya) — Coelogyne Lindl., Hohlnarbe (II 324) — Platyclínis Benth. (indisch-malayisch) — Maláxis Solander (inkl. Achroánthus Raf., = Microstýlis Nutt.), Weichorchis (II 391) — Líparis Rich. (= Stúrmia Rchb.), Glanzkraut (II 393) — Calýpso Salisb. (II 323) — Corallorrhíza (nicht Coralliorrhiza!) Chatelain, Korallenwurz.

Masdevállia Ruiz et Pav. (150 Arten in Südamerika) — Stélis Sw. trop. Amerika) — Pleurothállis R. Br. (600 Arten im trop. Amerika) — Isochílus R. Br. (trop. Amerika) — Cœlia Lindl. (trop. Amerika) — Epidéndrum L. (tropisches und wärmeres Amerika) — Cattleya Lindl. (II 334) — Lælia Lindl. (trop. und subtrop. Amerika) — Sobrália Ruiz et Pav. (trop. Amerika) — Phajus Lour. (Tropen der alten Welt) — Chýsis Lindl., Hangeorchis (trop. Amerika) — Blétia R. Br. (trop. Amerika) — Catasétum L. C. Rich. — Lycáste Lindl. (Südamerika) — Stanhópea Frost (trop. Amerika) — Dendróbium Sw. (über 1000 Arten palaeotropisch) — Éria Lindl. (230 Arten im trop. Asien) — Bulbophýllum Thouars (trop. Asien und Afrika) — Cymbídium Sw. (trop. Asien) — Maxillária Ruiz et Pav. (trop. Amerika) — Odontoglóssum H. B. et Kth., Zahnzunge (Süd- und Mittelamerika) — Miltónia Lindl. (Süd- und Mittelamerika) — Oncídium Sw. (400 Arten in Süd- und Mittelamerika) — Phalaenópsis Bl., Mottenblume (indisch-malayisch) — Saccolábium Bl., Sacklippe (indisch-malayisch) — Vánda R. Br. (indisch-malayisch) — Angrécum Thouars, Tropensporn (Afrika) — Taeniophýllum Bl. (indisch-malayisch, I/LI) — Aerídes Lour. (trop. Asien).

Fig. 1199. Freesea refracta Klatt (II, 306). *a* Blühender Sproß. *b* Junge Frucht. *c* Aufgesprungene Kapsel.

2. Klasse **Dicotylédones.** Zweisamenlappige Blüten- oder Samenpflanzen, Netzblättler, Blattkeimer, Zweiblattkeimer (III, 5).

a) **Archichlamýdeae** (= Choripétalae, = Eleutheropétalae, = Polypétalae + Apétalae) (III 6).

1. Reihe **Verticillátae** (= Casuarináles). Wirtelgewächse.

Familie: **Casuarináceae.** Kasuarinengewächse, Keulenbäume (III 6).

Casuarína Rumphius mit 25 meist in Australien (wenige indomalayisch) beheimateten Holzpflanzen von schachtelhalmartiger Tracht.



Fi . 1200. Orchis purpureus Hudson (II, 344). Phot. Otto Ziegler, Zollikon (Schweiz).

2. Reihe **Piperáles.** Pfefferartige Gewächse (III 209).

I. Familie: **Saururáceae.** Echsenschwanzgewächse (III 209)

Saurúrus L., Molch- oder Echsenschwanz mit 2 Arten (III 209). — Houttuýnia Thunb. (III 209) — Anemiópsis Hook. et Arn. (III 209).

II. Familie: **Piperáceae.** Pfefferpflanzen (III 209).

Píper L., Pfeffer — Peperómia Ruiz et Pav., Zwergpfeffer (III 209).

III. Familie: **Chlorantháceae.** Grünährengewächse (III 209). — Chloránthus Sw., Grünähre, mit 10 Arten in Ostasien und Ostindien — Ascarína Forst. (Stiller Ozean) — Hedyósmum Sw. mit 20 Arten im tropischen Amerika.

[1]) W. Zimmermann (Mitteil. des Badischen Landesvereins für Naturkunde. N. F. I Heft 9 [1922] und Fedde, Repertorium Europaeum Nr. 32/33, 1922) hat eine bisher wohl meist mit Epipáctis latifólia vermengte Pflanze (Parapáctis epipactoídes) als Typus einer neuen Gattung **Parapáctis** aufgestellt. Zerstreut in Württemberg, Rheinland, Hannover, Niederösterreich und Südfrankreich.



Fig. 1201. Orchis masculus L. (II, 346). Phot. J. C. Th. Uphof, Amsterdam.

Fig. 1202. Aceras anthropophorum (L.) R. Br., Orchis ustulatus L. und Orchis Simia Lam., am Genfersee. Phot. A. Eisenlohr, Tübingen.



Fig. 1203. Aceras anthropophorum (L.) R. Br. (II, 359) auf einer Trockenwiese mit Salvia pratensis L. im Schweizer Jura. Phot. A. Eisenlohr Tübingen.



Fig. 1204. Lorogossum (Himantoglossum) hircinum Rich., Riemenzunge (II, 360) am Genfersee. Phot. A. Eisenlohr, Tübingen.

3. Reihe **Salicáles.** Weidenartige Gewächse.

Familie: **Salicáceae.** Weidenpflanzen (III 12) — Pópulus L., Pappel (III 57) — Sálix L.[1]), Weide (III 13; VII Fig. 1149u. 1205).

4. Reihe **Garryáles.**

Familie: **Garryáceae.** Becherkätzchengewächse mit der einzigen Gattung Garrýa Dougl. (15 Arten in Nordamerika, Mexiko und Westindien). Die Familie wurde früher zu den Cornaceae (V/2, 1538) gezogen.

5. Reihe **Myricáles.** Gagelartige Gewächse.

Familie: **Myricáceae.** Gagelsträucher (III 10) — Myríca L., (inkl. Comptónia Banks), Gagelstrauch, Wachsbeere (III 11).

6. Reihe **Balanopsidáles.**

Familie: **Balanopsidáceae.** Scheineichelgewächse mit der einzigen Gattung Bálanops Baill. (7 Arten) auf Neu-Kaledonien.

7. Reihe **Leitneriáles.**

Familie: **Leitneriáceae.** Hakennarbengewächse, mit der einzigen Gattung Leitnéria Chapm. im atlantischen Nordamerika. L. Floridána Chapm., cork wood liefert ein äusserst leichtes Holz.

8. Reihe **Juglandáles.** Walnussartige Gewächse.

Familie: **Juglandáceae.** Walnussbäume (III 6) — Platycárpa Sieb. et Zucc. (Pl. strobilácea Sieb. et Zucc.) in Nord-China und Japan — Engelhárdtia Leschen. (III 7) mit 11 Arten im Monsungebiet und eine Art in Costa Rica — Pterocárya Kunth, Flügelnussbaum (III 7; VII Fig. 1206) — Júglans L., Walnussbaum (III 7; VII Fig. 1061) — Cárya Nutt. (= Hicória Raf.), Hickorynussbaum (12 Arten in Nordamerika).

9. Reihe **Batidáles.**

Familie: **Batidáceae.** Spatelfadengewächse, mit 1 Art (Bátis marítima L.) an den Küsten des tropischen und subtropischen Amerika und der Sandwichinseln. Die Familie wurde früher zu den Chenopodiaceen gestellt.

10. Reihe **Julianiáles.**

Familie: **Julianiáceae.** Flügelstielgewächse mit den Gattungen Juliánia Schl. (4 Arten in Mexiko) und Orthopterýgium Hemsl. (1 Art in Peru).

11. Reihe **Fagáles.** Buchenartige Gewächse.

I. Familie: **Betuláceae.** Birkengewächse



Fig. 1205. Salix incana Schrank (III, 26), an der Isar ob München. Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.



Fig. 1206. Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach. Kaukasischer Flügelnussbaum (III, 7). *a* Zweig mit Fruchtstand. *b*, *c* Nuss (richtiger Scheinfrucht).

[1]) Gunnar Samuelsson (Vierteljahrsschrift der Naturf.-Gesell. Zürich [1922], 247) fasst die beiden Unterarten von **Sálix myrsinítes L.**, Myrten-Weide (III 48), die subsp. **serráta** (Neilr.) und die subsp. **Jacquíni** (Host) Rouy, als gute, von der nordischen S. myrsinites verschiedene Sorten auf und bringt für die erstgenannte Unterart den Namen **Sálix arbutifólia** Willd. in Vorschlag.

(III 65) — Ostryópsis Decaisne (III 65) — Carpínus L., Hainbuche (III 66) — Ostrya Scop., Hopfenbuche (III 69; VII Fig. 1207) — Córylus L., Haselnuss (III 71; VII Fig. 1107, 1118) — Bétula (Betúlla)[1]) L. (III 75; VII Fig. 1059, 1101, 1173, 1208) — Álnus Miller, Erle (III 85; VII Fig. 1080).

II. Familie: **Fagáceae.** Buchengewächse (III 94) — Nothofágus Blume, Südbuche (III 95) — Fágus L., Buche, Rotbuche (III 95; VI Fig. 1060) — Castánea Miller (inkl. Castanópsis Spach), Edelkastanie (III 101; VII Fig. 1050) — Pasánia Miq. (III 95) — Quércus L.[2]), Eiche (III 105; VII Fig. 1079).



Fig. 1207. Ostrya carpinifolia Scop., Hopfenbuche (III, 69), im Karstgebiet. Phot. F. Kerner. Photographie aus dem Botan. Institut der Universität Wien.

12. Reihe **Urticáles.** Nesselartige Gewächse (III 144).

I. Familie: **Ulmáceae.** Ulmengewächse (III 117).

Úlmus L., Ulme, Rüster (III 117) — Planéra J. F. Gmelin in einer Art (P. aquática J. F. Gmel., water elm) in den Südstaaten der Union — Céltis L., Zürgelbaum (III 121) — Zelkówa Spach (= Abelícea Rchb., = Hemiptélea Planch.) (III 117) — Tréma Loureiro (Tropen der alten und neuen Welt).

II. Familie: **Moráceae.** Maulbeergewächse (III 123).

Mórus L., Maulbeerbaum (III 127) — Maclúra Nutt. (= Tóxylon Raf., = Jóxylon Raf.) (III 136) — Chlorophora Gaudich., Gelbholz (III 124) — Broussonétia Vent., Papier-Maulbeerbaum (III 136) — Dorsténia L. (=Kosária Forsk.), Dorstenie (III 124 und I/CLII Fig. 286b) — Cudránia Trécul (III 124) — Trecúlia Decaisne (III 124) — Artocárpus Forst., Brotfruchtbaum

[1]) **Bétula nána L.,** Zwerg-Birke (III 80), wurde neuerdings auch in der Niederlausitz im Pastlingsmoor im Drewizer Walde bei Tauer, ebenso in Bayern im Oberpfälzer Wald (Mooslohe bei Weiden), in Salzburg (Lungau und bei Passthurn), in der Schweiz in Obwalden (Röhrlimoss beim Grossen Schlieren, 1530 m) und in Appenzell (Stoss) festgestellt. Für Rumänien ist die Art erstmals 1926 im Hochmoor Luci in den Harghita-Bergen von E. J. Nyárády nachgewiesen worden (südlichster Standort!). Aus Polen wird sie neuerdings aus dem Jelniamoor und im Cieszyn genannt. — **Bétula húmilis** Schrank, Strauch-Birke (III 82), ist in Kärnten neuerdings von Franz Pehr im Dobramoos in den Glantalerbergen (900 m) nachgewiesen worden (die Standortsangabe Auerthal ob St. Lorenzen in der Reichenau ist zu streichen); angeblich soll die Art auch in Tirol (Lappach bei Predoi, 1450 m) und in Oberösterreich vorkommen.

[2]) **Quércus pubéscens** Willd. (III 112) wurde am Kunitzberg bei Jena bereits 1850 von Bogenhard beobachtet, 1919 von J. Bornmüller dann dort neuerdings festgestellt. Ausserdem hat E. Schalow 1924 die Art an den Oderabhängen zwischen Bellinchen und Nieder-Lübbichow im Kreis Königsberg i. d. Neumark 52° 56′ nördl. Breite entdeckt. Öfters auch angepflanzt, so im Fränkischen Muschelkalkgebiet und auf dem Ostorfer Berge bei Schwerin. — Nach H. Gams stellt **Quércus sessiliflóra** Salisb. (III 111) ein polytop entstandenes Kreuzungsprodukt von Q. Robur × Q. pubescens dar (Genetica VI, 1925). Eine Übergangsform von Q. sessiliflora zu Q. pubescens ist wohl var. **barbuláta** (Schur) Thellung — **Quércus pubéscens** Willd. × **Q. Róbur** L. × **Q. sessiliflóra** Salisb. (= **Quércus Helvética** Thellung) wird aus der Schweiz (Lägern, Jouxbrulée) erwähnt.

(III 124) — Castillóa Cervant. (III 123) — Antíaris Leschenault (III 123) — Brósimum Sw. (trop. Amerika) — Fícus L., Feigenbaum (III 125; VII Fig. 1209 und I/LII Fig. 150) — Musánga R. Br. (M. Smíthii, Schirmbaum im trop. Afrika) — Cecrópia L., Kanonenbaum (III 124) — Húmulus L., Hopfen (III 130; VII Fig. 1114) — CánnabisL., Hanf (III 133).

Fig. 1208. Betula humilis Schrank (III, 82), im Tattenhausenermoor bei Bad Aibling (Oberbayern). Phot. Apotheker Engelbert Meisner, München.

III. Familie: **Urticáceae.** Nesselgewächse (III 136).

Urtíca L., Nessel, Brennessel (III 137) — Laportéa Gaudich. (III 137) — Pelliónia Gaudich. (III 137) — Pílea Lindl., Kanonier- oder Bombardierpflanze (III 137 — Pelliónia Gaudich. (III 137) — Elatostéma Forst. (III 137) — Boehméria Jacq., Ramie, Chinagras (III 137) — Piptúrus Wedd. (III 128 — Parietária L., Glaskraut, Wandkraut (III 142).

13. Reihe **Proteáles.** Proteusartige Gewächse (III 144).

Familie: **Proteáceae.**

Leucadéndron Herm. (III 145) — Grevíllea R. Br. mit 160 Arten in Australien und Neukaledonien (VII Fig. 1210) — Hákea Schrad. (Australien) — Faúrea Harvey in Südafrika — Prótea L. (VII Fig. 1167) — Embóthrium Forst., Grubenkölbchen (Südamerika, Ostaustralien) — Lomátia R. Br. (Australien, Chile) — Stenocárpus R. Br. (Australien) — Bánksia L. f. (Australien) — Dryándra R. Br. (Australien).

14. Reihe **Santaláles.** Sandelgewächse (III 160).

I. Familie: **Myzodendráceae.** Federmistelgewächse (III 160). Einzig die Gattung Myzodéndron Banks et Sol., Federmistel, mit 11 Arten in Chile.

II. Familie: **Santaláceae.** Sandelholzgewächse (III 150).

Ósyris (nicht Osyris) L. (III 151) — Comándra Rchb. (= Hamiltónia Nutt.) (III 151) — Thesíum L., Leinblatt, Bergflachs, Verneinkraut (III 151).

III. Familie: **Opiliáceae** mit der Gattung Opília Roxb. (6 palaeotropische Arten).

IV. Familie: **Grubbiáceae** mit der Gattung Grúbbia Berg (3 Arten in Südafrika).

Fig. 1209. Ficus elastica Roxb. (III, 124), Gummibaum, als Zimmerpflanze gezogen. Phot. R. E. Pfenninger, München.

V. Familie: **Olacáceae.** Stinkholzgewächse, mit mehreren Gattungen und etwa 160 Arten (Schœpfia Schreb., Ximénia Plum., Coúla Baill., Heistéria Jacq., Ólax L., Liriósma Pöpp. et Endl., Opília Roxb. usw.) in Südamerika, Afrika und Indomalesien, z. T. mit essbaren Früchten.

VI. Familie: **Octoknemataceae** mit der Gattung Octoknéma in Westafrika.

VII. Familie: **Loranthaceae** (= Viscáceae). Mistelgewächse (III 145).

Struthánthus Mart. mit 40 Arten in Südamerika (III 145) — Phthirúsa Mart. mit 50 Arten im tropischen Amerika (III 145) — Loránthus L., Riemenmistel (III 149) — Phoradéndron Nutt. mit 100 Arten in Nord- und Südamerika (III 145) — Arceuthóbium Bieb. (= Razoumófskya Hoffm.) mit etwa 10 Arten in der nördlich gemässigten Zone — Víscum L., Mistel (III 146).

VIII. Familie: **Balanophoraceae.** Kolbenträgergewächse (III 160). Etwa 40 Arten in den wärmeren Teilen. — Lophophýtum Schott et Endl. (trop. Amerika) — Scybálium Schott et Endl. (trop. Amerika) — Helósis Rich. (trop. Amerika) — Balanóphora Forst. (trop. Asien und Australien) — Cynomórium Micheli wird nunmehr zu den Myrtales gezogen (V/2 698).

15. Reihe **Aristolochiáles** (III 165).

I. Familie: **Aristolochiaceae**[1]. Osterluzeigewächse (III 160).

Ásarum L., Haselwurz (III 160) — Aristolóchia L., Osterluzei, Pfeifenblume (III 162; VII Fig. 1170).

II. Familie: **Rafflesiaceae.** Schmarotzerblumengewächse. Etwa 25 Arten, besonders der Tropen, wenige extratropisch. — Rafflésia R. Br. (auf Cissus-Arten) auf Java und Sumatra — Pilostýles Guillem. (auf Leguminosen) — Cýtinus L. (III 165; V/1 558).

III. Familie: **Hydnoraceae.** Pilzblumengewächse (III 163).

Hydnóra Thunb. (8 Arten in Afrika) — Prosopánche de Bary (2 Arten in Südamerika).



Fig. 1210. Grevillea Preissii Meisn. *a* Blüte im Längsschnitt mit Nektardrüse am Grunde des Gynophors. *b* Blühender Zweig. (Gez. stud. G. Hegi 1898).

16. Reihe **Polygonáles.**

Familie: **Polygonaceae** (= Persicariáceae). Knöterichgewächse (III 165).

1. Unterfamilie: Eriogonoideae.

Eriógonum L., Wollampfer, mit etwa 160 Arten im westlichen Nordamerika und in Mexiko.

2. Unterfamilie: Polygonoideae.

Émex Necker (III 166) — Rúmex L.[2]), Ampfer (III 166) — Oxýria Hiller, Säuerling, Nierenampfer (III 188) — Rhéum L., Rhabarber (III 166) — Atrapháxis L., Bocksknöterich, Bocksweizen (besonders in Vorder- und Zentralasien, III 165) — Pteropýrum Jaub et Spach. (III 165) — Callígonum L. (im Steppengebiete des östl. Mittelmeergebietes und in Zentralasien, III 165) —



Fig. 1211. Polygonum Baldschuanicum Regel. Zierpflanze aus Turkestan. *a* Blühender Sproß. *b* Blüte. *c* Querschnitt durch die Blüte. *d* Sproß mit Früchten. *e* Junge Frucht.

[1]) R. v. Wettstein tritt für eine Verwandtschaft der Familie mit den Polycarpicae (speziell mit den Anonaceae und Myristicaceae) ein.

[2]) Ausser den bereits (III 187) genannten adventiven Arten sind zu nennen: **Rúmex dentátus** L. aus Nordafrika und Westasien (Altona 1926, Neuss 1914, Solothurn 1915). — **R. confértus** Willd. aus Westasien, Süd- und Mittelrussland (in Ostpreussen bei Heilsberg; ehedem auch bei Thorn). — **R. Brównii** Campd.

Polýgonum L.[1]) (inkl. Pleuróptérus Benth. et Hook.), Knöterich (III 188; VII Fig. 1018, 1211) — Fagopýrum Miller, Buchweizen, Heidekorn (III 207) — Koenígia L. (III 165).

3. Unterfamilie: Coccoloboídeae.

Tripláris L. (trop. Südamerika) — Antígonum Endl. (III 166) — Muehlenbéckia Meissn. (= Sarcógonum Don), Scheinknöterich (III 166; I/LXXVII Fig. 103) — Coccóloba L., Lappenbeere (125 Arten im wärmeren Amerika).

17. Reihe **Centrospérmae.** Zentralsamige Gewächse.

I. Familie: **Chenopodiáceae.** Meldengewächse (III 210).

Polycnémum L., Knorpelkraut (III 211) — Hablítzia Bieb. (III 260) — Béta L., Mangold, Rübe (III 214; VII Fig. 1109c) — Rhagódia R. Br.[2]) — Chenopódium L. (inkl. Telóxys, Blítum u. Roubiéva), Gänsefuss (III 217; VII Fig. 1109b) — Cyclóloma (Michx.) Moq. (III 260) — Monolépis Schrad. (III 62) — Átriplex L., Melde (III 237) — Obióne Gaertn., Salzmelde, Keilmelde, Salme (III 235) — Spinácia L., Spinat (III 233) — Eurótia Adans., Hornsame, Hornmelde (III 260) — Axýris Bl.[3]) (III 260) — Kóchia Roth, Radmelde (III 248; VII Fig. 1212) — Echinopsílon (nicht Echinópsilon) Moqu. (= Bássia All.), Dornmelde (III 248) — Corispérmum L., Wanzensame (III 251; VII Fig. 1126) — Salicórnia L., Glasschmalz, Queller (III 254) — Athrocnémum Moqu. (8 Arten an den Küsten der wärmeren Meere, jedoch nicht in Amerika, in Europa im Mittelmeergebiet A. glaucum Sternb.) — Sacobátus Nees (S. vermiculátus Torr. in Nordamerika) — Suæda Forsk. (= Schobéria C. A. Meyer), Salzmelde (III 257) — Halóxylon Bunge (III 210) — Sálsola L., Salzkraut (III 258) — Anábasis L. (11 Arten im Mittelmeergebiet) — Halimocnémis C. A. Mey. (III 260).



Fig. 1212. Kochia arenaria Roth (III, 250), auf Sandboden bei Oftersheim (Baden). Phot. Alfred Löwenberg und Dr. Fr. Zimmermann, Ludwigshafen a. Rh.

II. Familie: **Amarantáceae.** Fuchsschwanzgewächse (III 260).

Celósia L., Brandschopf (III 261) — Amarántus (inkl. Scléropus L.), Fuchsschwanz (III 261) — Dígera Forsk. (III 261) — Achyránthes L.[4]) (15 Arten in den Tropen und Subtropen) —

aus Australien (bei Kettwig im Ruhrgebiet 1913, 1922 usw. und bei Derendingen [Schweiz] seit 1907 alljährlich). — **R. salicifólius** Weinm. aus Nordamerika (bei Altona, Nienstedten, Harburg, Finkenwerder, 1926 [scheint sich um Hamburg einzubürgern], bei Duisburg, Neuss, Ürdingen, Essen, Herne usw., Hannover [seit 1916 bei Selze], Ludwigshafen 1909, Basel 1915/17, Solothurn 1919, Pérolles, St. Moritz 1918). — **R. flexuósus** Soland. aus Neu-Seeland (Derendingen [Schweiz] 1926). — **R. halóphilus** F. v. Muell. aus Australien 1922 bei Kettwig an der Ruhr eingeschleppt.

[1]) Adventiv (III 190) kommen hinzu: **Polýgonum calcátum** Lindmann (Unterart von P. aviculare), neuerdings wiederholt beobachtet. — **P. polystáchyum** Wallr. aus dem Himalaya (in Steiermark bei Aussee, in Oberösterreich bei Hallstadt, in der Schweiz 1918 bei Olten und Luzern). — **P. Douglásii** Greene, aus Nordamerika (in der Schweiz Bahnhof Langendorf, 1918). — **P. cognátum** Meissner var. **alpéstre** (C. A. Meyer) Meissner aus Südwestasien (Solothurn 1914) — **P. pulchéllum** Lois. aus dem Mittelmeergebiet (Hafen von Mannheim, 1902/03). — **P. plebéjum** R. Br. (palaeotropisch), bei Ürdingen und Düsseldorf (1913/14) adventiv. — **P. al pínum** All. (III 194) ist neuerdings von Lämmermayr in Steiermark an einem zweiten Standort (Predigtstuhl bei Kirchdorf) gleichfalls auf Serpentin festgestellt worden. Der Wurzelstock enthält 16 bis 22% Gerbstoff.

[2]) **Rhagódia nútans** R. Br. aus Australien; in der Schweiz bei Derendingen (1916, 1927) adventiv.

[3]) **Axýris amarantoídes** L., ursprünglich im mittleren und südlichen Rußland, in Sibirien und in der Mongolei beheimatet; neuerdings adventiv bei Berlin (Grunewald), Altona (1926), Dortmund, Duisburg, in der Schweiz bei Basel (1916), Solothurn, Bürglen (wohl z. T. mit Getreide aus Amerika eingeschleppt).

[4]) **Achyránthes áspera** L., aus Mexiko, Südamerika und Australien, adventiv bei Derendingen.

Froehlíchia Moench (10 Arten im gemässigten Nordamerika bis Brasilien) — Alternanthéra[1]) Forsk., Wechselkölbchen (III 261) — Gomphréna L., Kugelamarant (III 367) — Iresíne L. (III 370).

III. Familie: **Nyctagináceae** (= Jalapáceae). Wunderblumengewächse (III 266).

Mirábilis L., Wunderblume (III 266) — Boerhávia L. (III 266) — Bougainvíllea Commers., Drillingsblume (III 266; VII Fig. 1083) — Abrónia Juss., Saftkirsche (III 266) — Neéa Ruiz et Pav. (III 266).

IV. Familie: **Cynocrambáceae** (= Thelygonáceae). Hundskohlgewächse.

Cynocrámbe Gaertn. (= Thelygonum L.) mit 2 Arten. C. prostráta Gaertn. (= Thelýgonum Cynocrámbe L.), Hundskohl, aus dem Mittelmeergebiet, wurde adventiv bei Hamburg (auf Kaffeeabfällen bei Blankenese), bei Dortmund, 1929 (Südfruchtbegleiter) und bei Mannheim beobachtet.

V. Familie: **Phytolaccáceae.** Kermesbeergewächse (III 266).

Phytolácca L., Kermesbeere (III 266) — Rivína Plumier (= Rivínia L.) (III 267) — Petivéria Plumier (III 267).

VI. Familie: **Aizoáceae** (= Ficoidáceae, = Mesembrianthemáceae). Eiskrautgewächse (II 267).

Mollúgo L. mit etwa 15 Arten in den wärmeren Gebieten der alten und neuen Welt — Glínus L. (Tropen und Subtropen) — Sesúvium L. mit 5 Arten am Strande der wärmeren Meere — Aizóon L. (10 Arten, mediterran und Wüstenpflanzen) — Tetragónia L., Neuseeländer Spinat (III 267) — Mesembriánthemum L., Mittags- oder Zaserblume (III 267; VII Fig. 1063; I/CIV Fig. 165).



Fig. 1213. Portulaca grandiflora Hook. (III, 268). Blühende Pflanze.

VII. Familie: **Portulacáceae.** Portulakgewächse (III 268).

Talínum Adans. (III 268) — Calandrínia H. B. et Kth. (III 268, 269) — Anacámpseros L. (III 268) — Claytónia L. (III 268) — Móntia L., Quellkraut, Flachssalat (III 270) — Portuláca L., Portulak, Porzelkraut (III 268, 269; VII Fig. 1213) — Lewísia Pursh (III 268).

Fig. 1214. Sagina Linnaei Presl (II, 385), in den Berchtesgadener Alpen. Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.

VIII. Familie: **Baselláceae.** Baselgewächse (III 267) — Basélla L., Malabarspinat (III 267) — Tournónia Moq. (Kolumbien) — Ullúcus Loz. (= Mellóca Lindl.), Knollen-Baselle (III 267) — Boussingaúltia H. B. et Kth., Basell-Kartoffel (III 267).

IX. Familie: **Caryophylláceae.** Nelkengewächse (III 271).

1. Unterfamilie: Alsinoideae. Mierenpflanzen (III 272).

Malách ium Fries, Wassserdarm (III 348) — Stellária L.[2]), Sternmiere, Sternkraut (III 349) — Cerástium L.[3]) Hornkraut (III 360) — Holósteum L., Spurre (III 377). — Mœnchia Ehrh., Weissmiere (III 378) — Sagína L., Mastkraut, Knebel (III 380; VII Fig 1062

[1]) **Alternanthéra répens** Steudel aus Südamerika, bei Rodleben (Anhalt), Döhren (Hannover), Derendingen (Schweiz) adventiv. — **A. denticuláta** R. Br. aus Australien, bei Döhren und Derendingen.

[2]) **Stellária longifólia** Mühlenb., ist jetzt auch für die oberbayerische Hochebene (Lengenwang) und in Franken (Altenfurth bei Nürnberg) nachgewiesen.

[3]) **Cerástium tetrándrum** Curtis (III 364) besitzt nach W. Christiansen im Nordseegebiet

und 1214) — Colobánthus, Bartling (etwa 10 Arten im antarktischen Amerika, in Australien und Neu-Seeland) — Buffónia L., Büffonie (III 389) — Lepirodíclis Fenzl (III 436) — Quéria L. (III 272) — Minuártia Loefling (= Alsíne Wahlenb.), Miere, Meirich, Hainkraut (III 389) — Honckényia Ehrh. (= Haliánthus Fries), Salzmiere (III 403) — Arenária L., Sandkraut (III 405) — Moehríngia L., Nabelmiere (III 410) — Thurýa Boiss. et Bal. (III 272) — Spérgula L., Spark (III 418) — Spergulária Presl, Schuppenmiere (III 421) — Délia Dum., Getreidemiere (III 424) — Teléphium L., Zierspark (III 426) — Drymária Willd. (etwa 20 Arten in Südamerika, Asien, Afrika und Australien) — Polycárpon Loefling, Nagelkraut (III 426; VII Fig. 1109a) — Ortégia Loefling (III 272) — Polycarpæa Lam. (etwa 30 Arten der tropischen bis gemässigten Gebiete; in Europa fehlend) — Loeflíngia L. (5 Arten im Mittelmeergebiet; III 436) —

Fig. 1215. Gypsophila fastigiata L. (III, 313), auf sandigen Hügeln in der Oberlausitz.
Phot. Apotheker Max Otto Dietrich in Zilly (Kr. Halberstadt).

Pycnophýllum Rémy (III 272) — Lyállia Hook. (III 272) — Corrigíola L., Hirschsprung, Strandling (III 427) — Paronýchia (III 428) — Herniária L., Bruchkraut, Harnkraut, Tausendkorn (III 430) — Sclerocéphalus Boiss. (III 272) — Illécebrum L., Knorpelblume (III 428) — Cardionéma DC.[1]) (= Acanthonýchia DC.) — Scleránthus L., Knäuel (III 433).

2. *Unterfamilie:* ***Silenoideae.*** Leimkrautpflanzen (III 272).

Agrostémma L., Rade, Kornrade (III 273) — Viscária Roehling, Pech- oder Klebnelke (III 275) — Siléne L., Leimkraut (III 277) — Lýchnis L. (= Coronária Adans.), Lichtnelke (III 296; VII Fig. 1106) — Heliospérma Rchb.[2]), Strahlensame (III 304) — Melándrium Roehling, Wald- oder Nachtnelke (III 299) — Drýpis L., Kronenkraut (III 308) — Cucúbalus L., Taubenkropf (III 307) — Gypsóphila L., Gipskraut (III 309; VII Fig. 1215) — Túnica Scop., Felsnelke, Knopfnelke (III 315) — Acanthophýllum C. A. Mey. (15 Arten in Armenien, Persien, Beludschistan, Sibirien) — Vaccária Medikus, Kuhkraut (III 317) — Diánthus L., Nelke (III 318; VII Fig. 1155) — Saponária L., Seifenkraut (III 344) — Velézia L. (III 272).

18. Reihe **Ranáles** (= Polycárpicae). Vielfrüchtler (IV/1 12).

I. Familie: **Nymphaeáceae.** Wasserrosengewächse (III 438).

Nelúmbo Adans., Lotosblume (III 438) — Cabómba Aubl., Haarnixe (III 438) — Brasénia

einen zweiten (neben St. Peter im Kreis Eiderstedt) Standort auf dem Festlande zwischen Aalbek und Jerpstedt (nördlich von Hoyer) in Nordschleswig.

[1]) **Cardionéma ramosíssimum** Thellung (= Pentacæna ramosissima Hook. et Arn.), aus Amerika (Californien bis Argentinien), wurde adventiv bei Rosslau und Rotleben (Anhalt) festgestellt.

[2]) **Heliospérma quadrífidum** (L.) Rchb. (III 305) ist nach Alfred Becherer als **H. quadridentátum** (Murray) Schinz et Thellung zu benennen.

Schreb. (= Hydropéltis Michx.) (III 438) — Núphar[1]) Sm. (= Nymphozánthus C. Rich.), Teichrose, Mummel (III 444) — Barcláya Wall. (III 439) — Nymphæa L. (= Castália Salisb.), See- oder Wasserrose (III 440; VII Fig. 1144) — Eurýale Salisb., Stachel-Seerose (III 439) — Victória Lindl. (III 438; I/CI Fig. 156).

II. Familie: **Ceratophylláceae.** Hornkrautgewächse (III 449).

Ceratophýllum L., Hornkraut, Wasserzinken (III 449).

III. Familie: **Trochodendráceae.** Radbaumgewächse mit 6 Arten in Ostasien (IV/1 16).

IV. Familie: **Cercidiphylláceae.** Judasbaumblattgewächse (IV/1 16) mit 2 Arten in Japan.

V. Familie: **Ranunculáceae.** Hahnenfussgewächse (III 451; VII Fig. 996a).

1. Unterfamilie: Hydrastoídeae.

Hydrástis L., Gelbwurzel (III 453) — Glaucídium Sieb. et Zucc. (III 453).

2. Unterfamilie: Paeonioídeae.

Paeónia L., Pfingstrose (III 454; VII Fig. 1064).

3. Unterfamilie: Helleboroídeae.

Cáltha L., Dotterblume (III 457; VII Fig. 969, 1094) — Tróllius L., Trollblume (III 459) — Calliánthemum C. A. Meyer, Schmuckblume, Jägerkraut (III 460) — Helléborus L., Nieswurz (III 463; VII Fig. 987) — Eránthis Salisb., Winterstern, Winterling (III 472; VII Fig. 987 d) — Nigélla L., Schwarzkümmel (III 474) — Isopýrum L., Muschelblümchen (III 476) — Leptopýrum Rchb. (III 477) — Cóptis Salisb., Goldwurz, mit 11 subarktischen und arktischen Arten — Xanthorrhíza Marsh., Gelbwurzel (III 453) — Anemiópsis Sieb. et Zucc., Schein-Anemone (III 453) — Actæa L., Christophskraut (III 477) — Cimicífuga[2]) L., Wanzenkraut (III 479) — Aquilégia L., Akelei (III 480; VII Fig. 987 e, f) — Delphínium L., Rittersporn (III 485) — Aconítum L., Eisenhut, Sturmhut (III 492; VII Fig. 1216).

4. Unterfamilie: Anemonoídeae.

Anemóne[3]) L. (inkl. Pulsatílla Tournef. und Hepática Spreng.), Windröschen, Kuhschelle (III 517; VII Fig. 1119 und 1217) — Clématis L. (inkl. Atragéne), Waldrebe

Fig. 1216. Aconitum paniculatum Lam. (III, 503), auf einer feuchten Alpenwiese. Phot. Dr. G. Hegi, München.

Fig. 1217. Anemone pratensis L. (III, 508). Phot. Dr. Fr. Sauerbrei, Berlin-Mahlsdorf.

[1]) **Núphar púmilum** (Timm) DC. (III 447) ist von Herm. Handel-Mazzetti auch in der Rheinprovinz in der Mosel bei Bullay beobachtet worden; in Bayern neuerdings auch bei Reutberg, in der Schweiz bei Genthoud nächst Genf nachgewiesen.

[2]) **Cimicífuga fœtida** L. fehlt in Böhmen; als Fundort kommt einzig Porstendorf (zw. Schlegelberg und Silberwasser im Bezirk Mähr.-Trübau in Betracht, wo R. Kraus die Pflanze 1905 entdeckte. Schönhengst (Hrebecov) und Mähr.-Trübau (Prebová) sind zu streichen.

[3]) **Anemone silvéstris** L. (III 526) ist im Bayer. Donaugebiet bei Moos (Osterhofen) entdeckt wor-

(III 507) — Myosúrus L., Mäuseschwänzchen (III 540) — Oxýgraphis Bunge (III 453) — Ranúnculus L. (einschl. Ficária Dill. und Batráchium E. Meyer)[1]), Hahnenfuss (III 540) — Thalíctrum L.[2]), Wiesenraute (III 587) — Adónis L., Adonisröschen, Feuerauge (III 596).

VI. Familie: **Lardizabaláceae.** Fingerfruchtgewächse (IV/1 16) — Stauntónia DC. (Ostasien) — Hollbœllia Wall. (Himalaya) — Akébia Decaisne (China, Japan) (IV/1 16).

VII. Familie: **Berberidáceae.** Sauerdorngewächse (IV/1 5).

1. Unterfamilie: Podophylloideae.

Diphylleía Michx. (Nordamerika, Ostasien) — Podophýllum L., Fussblatt (IV/1 5).

2. Unterfamilie: Berberidoideae.

Bérberis L. (inkl. Mahónia), Sauerdorn, Berberitze (IV/1 6) — Nandína Thunb. (IV/1 5) — Epimédium L., Sockenblume, Bischofsmütze (IV/1 9) — Leóntice L. (inkl. Caulophýllum Michx.), Trapp, mit gegen 12 Arten in Südeuropa (L. Leontopétalum L., Löwen-Trapp), Westasien und Nordamerika — Jeffersónia Barton (je 1 Art in Nordamerika und in der Mandschurei).

VIII. Familie: **Menispermáceae.** Mondsamengewächse (IV/1 15).

Chondrodéndron Ruiz et Pav., Grieswurzel (IV/1 16) — Anamírta Colebr. (IV/1 16) — Jatrorrhíza Miers (IV/1 16) — Cócculus DC. (IV/1 16) — Cebátha Forsk. (IV/1 16) — Menispérmum Tournef., Mondsamen (IV/1 16) — Cissámpelos L. (IV/1 84).

IX. Familie: **Magnoliáceae**[3]). Magnoliengewächse (IV/1 13).

Magnólia L., Magnolie (IV/1 14; VII Fig. 1218a bis e) — Liriodéndron L., Tulpenbaum (IV/1 13) — Illícium L., Sternanis (IV/1 14; VII Fig. 1218f, g) — Drímys Forst., Winterrindenbaum (IV/1 13, 14) — Schizándra Michx., Spaltkölbchen (Nordamerika, Asien) — Kadsúra Juss., Kugelfaden (Ostasien, tropisches Asien).

X. Familie: **Himantandráceae** mit der einzigen Gattung Himantándra F. v. Muell. (2 Arten) auf den Molukken, in Papuasien und Ostaustralien.

XI. Familie: **Calycantháceae.** Gewürzstrauchgewächse (IV/1 14) mit der einzigen Gattung Calycánthus L. (inkl. Chimonánthus Lindl.).

XII. Familie: **Lactoridáceae** (IV/1 16).

XIII. Familie: **Anonáceae.** Anonengewächse (IV/1 14).



Fig. 1218. Magnolia grandiflora L., aus den südlichen Vereinigten Staaten. *a* Sproß mit jungem Zapfen. *b* Aufspringende Balgkapsel. *c* Samen. *d* Junge Frucht. *e* Überwinterter entleerter Zapfen. — Illicium verum Hook. f. (IV/1, 14). *f, g* Sammelfrucht von oben und unten.

Uvária L. (meist palaeotropisch) — Asimína Adans. (IV/1 14) — Canánga Rumph. (IV/1 14) — Polyálthia Bl. (palaeotropisch) — Oxymítra Blume (besonders in Indien) — Xylópia L. (IV/1 14) — Artabótrys R. Br. (IV/1 15) — Anóna L. (IV/1 15) — Monodóra Dun. (IV/1 15).

XIV. Familie: **Eupomatiáceae** mit der Gattung Eupomátia R. Br. (Neuguinea und Australien).

XV. Familie: **Myristicáceae.** Muskatnussgewächse (IV/1 15).

Myrística L. (inkl. Viróla Aubl.), Muskatnuss (IV/1 15 und I/CLV Fig. 296).

---

den; in der Rheinprovinz dagegen bei Siegburg seit langem nicht mehr beobachtet. In der Schweiz mit Sicherheit einzig bei Merishausen (Kt. Schaffhausen). — **A. pátens** (Mill.) L. (III 534) wurde von H. Poeverlein 1918 in Bayern auch zw. Neustadt a. D. und Geibenstetten nachgewiesen.

[1]) **Ranúnculus Seguiérii** Vill. (III 570) ist jetzt auch für die Schweiz (Giswilerstöcke in Unterwalden) nachgewiesen. — **R. glaciális** L. (III 573) besitzt in Deutschland einen zweiten Standort in den Allgäueralpen am Wildengundkopf 2215 m. — **R. Baudótii** Godron (III 580) hat H. Gams 1916 als neu für die Schweiz im Wallis (Charrat) festgestellt.

[2]) **Thalíctrum exaltátum** Gaud. ist in letzter Zeit wiederholt im Bodenseegebiet (auf deutschem, österreichischem und schweizerischem Anteil), ebenso am Oberrhein (um Karlsruhe) und im Maintal (Bettingen bei Wertheim) beobachtet worden.

[3]) Die früher meist zu den Magnoliaceae gestellte Gruppe der Wintéreæ (Illícium, Drímys, Wintéra, Bellióium, Búbbia, Zygogýnum usw.) wird von Hutchinson zu einer eigenen Familie erhoben.

XVI. Familie: **Gomortegáceae** mit der einzigen Gattung Gomortéga Ruiz et Pav.

XVII. Familie: **Monimiáceae** (IV/1 16).

Peúmus Pers. (P. Bóldus Mol. liefert in Chile die aromatischen fólia Bóldo) — Mollinédia Ruiz et Pav. (warmes Amerika, Australien) — Dorýphora Endl. (D. Sássafras Endl.), Australischer Sassafras, in Neusüdwales — Siparúna Aubl. (ca. 100 Arten im tropischen Amerika).

XVIII. Familie: **Lauráceae.** Lorbeergewächse (IV/1 10).

Cinnamómum Bl. (IV/1 11) — Perséa Gaertn. (IV/1 11) — Ocótea Aubl., inkl. Oreodáphne Nees (250 Arten in den Tropen und Subtropen) — Umbellulária (Nees) Nutt. (U. Californica Nutt.) — Nectándra Roland (90 Arten im trop. und subtrop. Amerika) — Dicypéllium Nees (D. caryophyllátum Nees in Brasilien) — Sássafras Nees (IV/1 11) — Litséa Lam. (IV/1 11) — Cryptocárya R. Br. (indisch-malayisch und trop. Amerika) — Lindéra Thunb. (= Bénzoin Nees) (60 meist ostasiatische Arten). — Laúrus L., Lorbeerbaum (IV/1 11) — Cassýtha L. (= Volutélla Forsk.), Schlingfaden (IV/1 11).

XIX. Familie: **Hernandiáceae.** Eierfruchtbaumgewächse (IV/1 16).

Fig. 1219. Cochlearia Anglica L. (IV/1, 139), im Schlick an der Nordsee. Phot. Dr. Joh. Mattfeld, Berlin.

19. Reihe **Rhoeadáles.** Mohnartige Gewächse (IV/1 489).

I. Familie: **Papaveráceae.** Mohngewächse (IV/1 16).

1. Unterfamilie: Hypecoídeae (IV/1 16).

Hypecóum L., Lappenblume, Gelbauge (IV/1 18) — Pteridophýllum Sieb. et Zucc. (IV/1 18).

2. Unterfamilie: Papaveroídeae (IV/1 19).

Platystígma Benth., Breitnarbe (Nordamerika) — Platystémon Benth., Breitfaden (pazifisches Nordamerika) — Romneýa Harv. (IV/1 19) — Dendromícon Benth., Baum-Mohn (Kalifornien) — Hunnemánnia Sweet (Mexiko) — Eschschóltzia Cham. (123 Arten im pazifischen Nordamerika; IV/1 19; VII Fig. 1109g) — Sanguinária L. (S. Canadénsis Cham.), Blutkraut (Nordamerika) — Stylóphorum Nutt. (Nordamerika) — Chelidónium L. em. Adanson, Schellkraut (IV/1 21; VII Fig. 1124) — Macleáya R. Br. (IV/1 19) — Boccónia L., Federmohn (IV/1 19) — Glaúcium Miller em. Crantz, Hornmohn (IV/1 23) — Roeméria Medik. (IV/1 19) — Meconópsis Viguier, Mohnling (IV/1 19) — Argemóne L., Stachelmohn, Teufelsfeige (IV/1 19) — Papáver L., Mohn (IV/1 25; VII Fig. 1016) — Arctomécon Torr., Bär-Mohn (Kalifornien, Utah).

3. Unterfamilie: Fumarioídeae.

Dicéntra Borkh. (= Diclýtra), Doppelsporn, Herzblume (IV/1 20) — Adlúmia Raf. (= Bicucúlla Adans.), Doppelkappe (IV/1 20) — Corýdalis Medikus, Lerchensporn, Hohlwurz (IV/1 36) — Fumária L. em. Adanson, Erdrauch (IV/1 45).

II. Familie: **Capparidáceae.** Kapperngewächse (IV/1 490).

Cápparis L., Kappernstrauch (IV/1 490) — Cleóme L., Senfkapper (IV/1 490) — Isómeris Nutt., Gleichfaden (IV/1 490) — Cleomélla DC. (IV/1 490) — Pedicellária Schrank (IV/1 490) — Polanísia Raf (IV/1 490) — Koeberlínia Zucc. (Texas, Mexiko), wurde früher zu den Parietales gestellt.

III. Familie: **Crucíferae.** Kreuzblütler (IV/1 51; VII Fig. 1021).

Tribus ***Thelypodieae*** *(IV/1 65).*

Nothothláspi Hook. f. (Neu-Seeland) — Prínglea Hook. f. (P. antiscorbútica Hook. f., Kerguelenkohl; IV/1 70) — Wárea Nutt. (Florida) — Stanleýa Nutt. (Kalifornien, Rocky Mountains) — Thelypódium Endl.[1]) — Helióphila L., Sonnenfreund (60 Arten in Südafrika).

Tribus ***Sinápeae*** *(IV/1 65).*

Subulária L., Pfriemenkresse (IV/1 70) — Teesdália R. Br., Tisdälie, Rahle (IV/1 72) — Lepídium L. em. R. Br., Kresse (IV/1 74) — Corónopus Joh. Gottfried Zinn, Krähenfuss (IV/1 92) — Biscutélla L., Brillenschote (IV/1 96) — Jonopsídium (DC.) Rchb., Scheinveilchen (IV/1 101) — Ibéris L., Bauernsenf, Schleifenblume (IV/1 102) — Aëthionéma R. Br., Steinkresse, Steintäschel (IV/1 110) — Eunómia DC. (östliches Mittelmeergebiet) — Petrocállis K. Br., Steinschnückel (IV/1 114) — Bivonæa DC. (westliches Mittelmeergebiet) — Thláspi L., Täschelkraut (IV/ 116) — Cochleária L., Löffelkraut (IV/1 134; VII Fig. 1219) — Kernéra Medikus, Kugelschötchen (IV/1 142) — Peltária Jacq. (= Bohádschia Crantz), Scheibenschötchen (IV/1 146) — Alliária Scop., Lauchkraut (IV/1 149) — Sisýmbrium L. em. DC. (inkl. Bráya [z. T.] und Huguenínia), Raukensenf (IV/1 152) — Descuraínia Webb et Berth.[2]) — Cákile Miller, Meersenf (IV/1 182; VII Fig. 1199d) — Erucária (L.) Halácsy (IV/1 186) — Myágrum L., Hohldotter (IV/1 186) — Calepína Adanson, Calepine, Wendich (IV/1 189) — Boreáva Jaub et Spach (IV/1 192) — Isatis L. (= Glástum Rupp.), Waid (IV/1 192) — Succówia Medikus (S. Baleárica [L.] Med., im westl. Mittelmeergebiet) — Carríchtera Adans. (C. annua [L.] Prantl, im Mittelmeergebiet) — Vélla L. (Spanien, Nordafrika) — Zílla Forsk. (Nordafrika, Sahara) — Erúca Miller, Rucke (IV/1 199) — Sinápis L., Senf (IV/1 297) — Diplotáxis DC., Doppelsame (IV/1 208) — Erucástrum (DC.), Hundsrauke, Rampe (IV/1 218) — Hirschféldia Moench, Hirschfeldie, Bastardsenf (IV/1 226) — Brássica L., Kohl (IV/1 229) — Brassicélla Tourr., Lacksenf (IV/1 268) — Ráphanus L., Rettich (IV/1 272 und 476 Fig. 885a) — Rapístrum Crantz, Rapsdotter, Windsbock (IV/1 287) — Grámbe L., Meerkohl (IV/1 295) — Morísia Gay (IV/1 55) — Barbaræa R. Br., Winterkresse, Barbenkraut (IV/1 299 und 476 Fig. 885b) — Armorácia Gaertner, Meyer et Scherbius, Meerrettich (IV/1 305) — Róripa Scop., Sumpfkresse (IV/1 307 u. 476 Fig. 885c) — Nastúrtium R. Br., Brunnenkresse (IV/1 319) — Dentária L., Zahnwurz (IV/1 321) — Cardámine L., Schaumkraut (IV/1 333; VII Fig. 1055) — Lunária L., Silberblatt, Mondviole (IV/1 353).

Fig. 1220. Cardaminopsis Halleri (L.) Hayek (IV/1 423), apophytisch bei einer Baude im Riesengebirge. Phot. Dr. Fr. Sauerbrei, Berlin-Mahlsdorf.

Tribus ***Schizopetáleae*** *(IV/1 66, 357).*

Schizopétalum Sims, Spaltkrone (IV/1 357) — Lesquerélla Wats. (Nordamerika, Mexiko).

Tribus ***Hesperídeae*** *(IV/1 66).*

[1]) **Thelypódium lasiophýllum** (Hook. et Arn.) Greene f. xeróphilum (Fourn.) Thellung aus Kalifornien wurde 1916 adventiv bei Basel (Birsfelden) beobachtet, ausserdem in Holland (Rotterdam) und wohl auch bei Mannheim.

[2]) **Descuraínia Richardsónii** O. E. Schulz aus Nordamerika wurde als neu für Europa 1920 in der Schweiz (Bahnhof Langendorf) nachgewiesen, **D. appendiculáta** (Griseb.) O. E. Schulz aus Argentinien 1928 im Hafen von Neuss (Rheinland).

Hutchínsia R. Br. (inkl. Hornúngia Rchb. und Hymenólobus Nutt.), Gemskresse (IV/1 357) — Capsélla Medikus, Hirtentäschel (IV/1 363) — Camelína Crantz, Dotter (IV/1 368) — Vogélia Medikus (= Néslia Desvaux), Finkensame, Ackernüsschen (IV/1 371) — Drába L. (inkl. Eróphila DC.), Hunger- oder Felsenblümchen[1]) — Schiveréckia Andr.[2]) (IV/1 374) — Arabidópsis Heynh. (= Stenophrágma Čelak.), Schmalwand (IV/1 392) — Turrítis L., Turmkraut (IV/1 393) — Aubriétia Adanson, Blaukissen (IV/1 396) — Árabis L., Gänsekresse (IV/1 395) — Cardaminópsis (C. A. Meyer) Hayek, Schaumkresse (IV/1 419; VII Fig. 1220) — Erýsimum L., Schöterich (IV/1 426) — Conríngia Adanson, Ackerkohl (IV/1 440) — Cheiránthus L. em. R. Br., Goldlack (IV/1 442) — Alýssum L., Steinkraut (IV/1 445) — Clypéola L., Schildkraut (IV/1 457) — Ptilotríchum C. A. Meyer (IV/1 447) — Lobulária Desv., Meerstrand-Steinkraut (IV/1 447) — Bertéroa DC., Graukresse (IV/1 458) — Alyssoídes Miller (= Vesicária Lam.), Blasenschötchen (IV/1 460) — Bráya Sternberg et Hoppe, Braye (IV/1 461) — Anastática L., Rose von Jericho (IV/1 69 Fig. 750b, c) — Malcólmia R. Br. (IV/1 464) — Farsétia R. Br. (= Fibígia Medikus), Schildkresse (IV/1 456) — Euclídium R. Br. (= Sória Adanson), Schnabelschötchen (IV/1 463) — Hésperis L., Nachtviole (IV/1 464) — Matthíola R. Br., Levkoje (IV/1 468; VII Fig. 1221) — Búnias L., Zackenschote (IV/1 472) — Choríspora DC. (IV/1 476) — Párrya R. Br. (IV/1 476) — Orychophrágmus Regel (IV/1 476) — Moricándia D. C. (IV/1 476).

Fig. 1221. Matthiola incana R. Br., auf Corsika an felsiger Küste. Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.

IV. Familie: **Tovariáceae** (IV/1 490).

V. Familie: **Resedáceae.** Resedengewächse, Waupflanzen (IV/1 482).

Astrocárpus[3]) Necker (IV/1 483) — Reséda L., Reseda, Wau (IV/1 483).

VI. Familie: **Moringáceae.** Bennussgewächse (IV/1 491).

VII. Familie: **Bretschneideriáceae** mit der einzigen Gattung Bretschneidéra Hemsley in Yünnan. Die Gattung wurde früher zu den Sapindaceae gestellt.



Fig. 1222. Sedum Sieboldii Sw. (IV/2, 518). *a* Blühender Spross, *b* Laubblatt, *c* Blüte.

20. Reihe **Sarraceniáles** (IV/2 510).

I. Familie: **Sarraceniáceae.** Schlauchgewächse (IV/2 510). Heliámphora Benth., Sumpfkrug (IV/2 510) — Sarracénia L., Schlauchpflanze (IV/2 510; I/CVII Fig. 175a bis c; VII Fig. 1157) — Darlingtónia Torrey (IV/2 510).

II. Familie: **Nepentháceae.** Kannenpflanzen (IV/2 510).

---

[1]) Als neue Art aus der in den Alpen nicht vertretenen Sektion Chrysodraba ist **Drába Ladína** Braun-Blanquet aus der Südkette der Unter-Engadiner Alpen (zw. Piz Nuna und Piz Tavrü, 2600 bis 3000 m) zu nennen.

[2]) Die vermeintliche **Schiveréckia Korabénsis** O. E. Schulz (auf der Rax in Obersteiermark am 4. Juli 1891 von Wiemann festgestellt) ist nach Hrch. Handel-Mazzetti als Drába inána L. × D. stelláta Jacq. (= Drába Wiemánni [O. E. Schulz] Handel-Mazzetti) anzusehen.

[3]) **Astrocárpus sesamoídes** (L.) Duby subsp. **Clúsii** Gay (IV/1 483) wächst seit etwa 50 Jahren in Menge in Niederschlesien bei Naumburg am Bober und gilt dort als eingebürgert (Mitteil. von Oberlehrer Georg Notni in Chemnitz, 1929).

Nepénthes L. (IV/2 510; I/CVII Fig. 174).

III. Familie: **Cephalotáceae.** Schlauchträgergewächse (IV/2 511). — Cephalótus Lab. (monotypische Gattung).

IV. Familie: **Droseráceae.** Sonnentaupflanzen (IV/2 497).

Drosophýllum Link, Taublatt (IV/2 498) — Dionæa Ellis, Venus-Fliegenfalle (IV/2 497; I/CVII, Fig. 175d) — Drósera L., Sonnentau (IV/2 498) — Aldrovánda L., Wasserfalle (IV/2 506; I/CVIII Fig. 176).

21. Reihe **Rosáles.** Rosenartige Gewächse (IV/2 654).

I. Familie: **Podostemonáceae.** Stielfadengewächse (IV/2 654).

II. Familie: **Hydrostachyáceae.** Wasserährengewächse (IV/2 654).

III. Familie: **Crassuláceae.** Dickblattgewächse (IV/2 511).

Sédum L., Fetthenne, Fettkraut (IV/2 517; VII Fig. 1222) — Sempervívum L., Haus- oder Dachwurz, Hauslauch (IV/2 543) — Monánthes Haw. (IV/2 514) — Cotylédon L. (inkl. Umbílicus DC. und Echevéria DC.), Nabelkraut (IV/2 513) — Bryophýllum Salisb., Brutblatt (IV/2 513) — Kalánchoë Adans. (IV/2 512) — Crássula L. (inkl. Tillæa L. und Bulliárda DC.), Dickblatt (IV/2 514).

IV. Familie: **Saxifragáceae.** Steinbrechgewächse (IV/2 562).

1. Unterfamilie: Saxifragoideae.

Astílbe Hamilt. (= Hoteía Morr. et Decne.), Scheingeissbart (IV/2 566) — Rodgérsia Gray (IV/2 567) — Bergénia Moench[1]) (IV/2 568) — Boykínia Nutt. (IV/2 567) — Saxífraga L. (inkl. Zahlbrucknéra Rchb.), Steinbrech (IV/2 568; VII Fig. 1223) — Peltiphýllum Engler, Schildblatt (IV/2 566) — Tiarélla L., Turbankapsel (IV/2 567) — Héuchera L. (IV/2 567) — Tolmiéa Torr. et Gray (IV/2 567) — Téllima R. Br. (IV/2 567) — Mitélla Tourn. — Chrysosplénium L.[2]), Milzkraut (IV/2 633).

Fig. 1223. Saxifraga Hirculus L., im Moor bei Ohlstadt (Oberbayern). Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.

2. Unterfamilie: Parnassioideae mit der Gattung Parnássia L.[3]), Herzblatt, Einblatt (IV/2 636).

3. Unterfamilie: Francooideae mit der Gattung *Francóa* Cav. (IV/2 567).

4. Unterfamilie: Hydrangeoideae.

Philadélphus L., Pfeifenstrauch (IV/2 639; VII Fig. 1224) — Jamésia Torr. et Gray (IV/2 566) — Deútzia Thunb. — Hydrangéa L. (= Horténsia Commers.), Wasserstrauch (IV/2 563) — Díchroa Lour. (IV/2 566) — Decumária L. (IV/2 563) in Nordamerika und China.

5. Unterfamilie: Pterostemonoideae mit der Gattung Pterostémon Schauer im Hochland von Mexiko.

6. Unterfamilie: Escallonioideae.

Jtéa A. Cunn., Moorstrauch, Rosmarinweide (IV/2 566) — Escallónia L. fil. (IV/2 566).

7. Unterfamilie: Ribesioideae.

Ríbes L., Johannisbeere (IV/2 641; VII Fig. 1225).

8. Unterfamilie: Baueroideae mit der Gattung Bauéra Banks im gemässigten Ostaustralien.

V. Familie: **Pittosporáceae.** Klebsamengewächse (IV/2 654).

VI. Familie: **Byblidáceae** mit 2 Arten der Gattung Býblis Salisb. in West- und Nordaustralien (die Gattung wird auch zu den Lentibulariaceae und Saxifragaceae gestellt).

VII. Familie: **Brunelliáceae** (IV/2 654).

---

[1]) **Bergénia crassifólia** (L.) Engler (IV/2 566) „Badan" wird neuerdings zur Kultur als gerbstofffliefernde Pflanze empfohlen und feldmäßig angebaut.

[2]) Der Bastard **Chrysosplénium alternifólium** L. × **Chr. oppositifólium** L. ist 1928 von Walter Zimmermann in Baden (Ybachtal bei Geroldsau) nachgewiesen worden.

[3]) Nach K. Schwandt hat Parnássia den Charakter einer eigenen Familie (zw. Saxifragaceae und Droseráceae).

VIII. Familie: **Cunoniáceae** (IV/2 654).

IX. Familie: **Myrothamnáceae.** Wunderstrauchgewächse (IV/2 654).

X. Familie: **Bruniáceae** (IV/2 654).

XI. Familie: **Hamamelidáceae.** Zaubernussgewächse (IV/2 655).

Bucklándia R. Br. (B. populnea R. Br. im Himalaya und Hinterindien) — Liquidámbar L., Amberbaum (IV/2 655) — Altíngia Noronha (IV/2 656) — Paróttia C. A. Mey., Eisenholz (IV/2 657) — Fothergílla L., (IV/2 657) — Corylópsis Sieb. et Zucc., Scheinhasel (IV/2 657) — Loropétalum R. Br. (China) — Hamamélis L., Zaubernuss, Zauberhasel (IV/2 656) — Sinowilsónia Hemsley (IV/2 657).

XII. Familie: **Roridulaceae** mit der einzigen Gattung Rorídula L., auf Bergen des südwestlichen Kaplandes.

XIII. Familie: **Eucommiáceae** mit der einzigen Gattung Eucómmia Oliver im gemässigten China.

XIV. Familie: **Platanáceae.** Platanengewächse (IV/2 657).

Fig. 1224. Philadelphus coronarius L., Falscher Jasmin (IV/2, 639). Phot. R. E. Pfenninger, München.

Plátanus L., Platane (IV/2 657).

XV. Familie: **Crossosomatáceae** (IV/2 654).

XVI. Familie: **Rosáceae.** Rosengewächse (IV/2 662).

1. Unterfamilie: Spiraeoideae (IV/2 663).

Physocárpus (Cambess.) Maxim., Blasenspiere, Knackbusch (IV/2 680) — Neíllia Don, Traubenspiere (IV/2 663) — Stephanándra Sieb. et Zucc., Kreuzspiere (IV/2 663) — Spiráea L. (inkl. Petrophýtum Nutt.), Spierstaude (IV/2 673) — Sibiráea Maxim. (IV/2 663) — Eriogýnia Hook. (= Luetkéa Bong.) — Arúncus Adanson, Geissbart (IV/2 671) — Sorbária (Ser.) A. Br. (= Basílima Raf.), Federspiere (IV/2 681) — Spiraeánthus Fisch. et Mey. (IV/2 663) — Quillája Molina (IV/3 663) — Kagenéckia (IV/2 663) — Lindeýa H. B. et Kth. (IV/3 663) — Vauquelínia Corr. (IV/2 663) — Exochórda Lindl. (IV/2 663) — Euphrónia Mart., Blumenspiere (IV/2 663) — Holodíscus (C. Koch) Maxim., Scheinspiere (IV/2 663).

2. Unterfamilie: Rosoideae (IV/2 665).

Rhodótypus Sieb. et Zucc., Scheinkerrie (IV/2 665) — Kérria DC., Gold- oder Nesselröschen, Ranunkelstrauch (IV/2 665) — Neviúsia A. Gray, Traubenkerrie (IV/2 665) — Rúbus L., Brombeere (IV/2 759) — Fragária L., Erdbeere (IV/2 895; VII Fig. 1117) — Duchésnea Smith, Schein-Erdbeere (IV/2 907) — Cómarum L., Blutauge, Siebenfingerkraut (IV/2 805; VII Fig. 1129) — Potentílla L., Fingerkraut (IV/2 809) — Horkélia Cham. et Schlecht. (IV/2 665) — Ivésia Torr. (IV/2 665) — Sibbáldia L., Gelbling (IV/2 892) — Potanínia Maxim. (IV/2 665) — Chamaerhódes Bunge



Fig. 1225. Ribes alpinum L. (IV/2, 651) *a* Spross mit männl., *c* mit weiblichen Blüten. *b* Männliche, *d* weibl. Blüte.

(IV/2 605) — Waldsteínia Willd., Waldsteinie (IV/2 927) — Colúria R. Br. (IV/2 665) — Géum L., Benediktenkraut, Nelkenwurz (IV/2 913) — Sievérsia Willd., Petersbart, Gathau (IV/2 908) — Fallúgia Endl. (IV/2 665) — Cowánia Don (IV/2 665) — Dryás L., Silberwurz (IV/2 922) — Filipéndula Miller em. Adans., Rüsterstaude, Spierstaude (IV/2 970) — Cercocárpus H. B. et Kunth (IV/2 666) — Adenóstoma Hook. et Arn. (IV/2 666) — Coleogýne Torr. (IV/2 666) — Púrshia DC. (IV/2 666) — Chamaebátia Benth. (IV/2 666) — Alchemílla L., Frauenmantel, Sinau (IV/2 943) — Agrimónia L. (= Agrimonoídes Miller), Odermennig (IV/2 930) — Aremónia Necker, Aremonie (IV/2 929) — Spencéria Trimen (IV/2 666) — Leucosídea Eckl. et Zeyh. (IV/2 666) — Hagénia Willd., Kosobaum (IV/2 666) — Sanguisórba L. (inkl. Potérium L. und Sarcopotérium Spach), Wiesenknopf, Bibernell (IV/2 935) — Margyriocárpus Ruiz et Pav. (IV/2 666) — Tetraglóchin Poepp. (IV/2 666) — Polylepis Ruiz et Pav. (IV/2 666) — Acæna Vahl, Stachelbecher (IV/2 666) — Bencómia Webb (IV/2 666) — Cliffórtia L. (IV/2 666) — Rósa L., Rose, Wildrose (IV/2 976; VII Fig. 1073, 1122 und 1140).

3. Unterfamilie: ***Pomoídeae.*** Kernobstgewächse (IV/2 663). Cotoneáster Medikus, Zwergmispel (IV/2 682) — Pyracántha Roem., Feuerdorn (IV/2 688) — Naegélia Lindl. (IV/2 664) — Osteoméles Lindl. (IV/2 664) — Cydónia Miller, Quitte (IV/2 689) — Chaenoméles Lindl., Scheinquitte, Feuerbusch (IV/2 693) — Docýnia Decne. (IV/2 664) — Pírus L., Birnbaum (IV/2 694) — Sórbus L., Eberesche, Mehlbeere (IV/2 705) — Málus Hill Apfelbaum (IV/2 743) — Microméles Decne. (IV/2 664) — Rhapiolépis Lindl. (IV/2 664) — Eriobótrya Lindl., Wollmispel, Japanische Mispel (IV/2 664) — Photínia Lindl., Glanzmispel (IV/2 664) — Pourthiæa Decne. (IV/2 664) — Amelánchier Medikus (= Arónia Pers.), Felsenbirne (IV/2 755) — Stranvæsia Lindl., Springmispel (IV/2 664) — Peraphýllum Nutt. (IV/2 664) — Cratægus L., Weissdorn (IV/2 725) — Méspilus L., Mispel (IV/2 739) — Chamaeméles Lindl. (IV/2 664) — Crataegoméspilus G. Camus (IV/2 724).

4. Unterfamilie: ***Neuradoídeae*** (IV/2 667) mit den Gattungen Neuráda L. und Griélum L.

5. Unterfamilie: ***Prunoídeae*** (= Amygdáleae, = Drupáceae). Steinobstgewächse (IV/2 667).

Nuttália Torr. et Gray (IV/2 667) — Pýgeum Gaertn. (IV/2 667) — Maddénia Hook. f. et Thoms. (IV/2 667) — Prúnus L. (inkl. Amýgdalus L.), Steinobst (IV/2 1053; VII Fig. 1158, 1226A) — Prinsépia Royle (IV/2 667).

6. Unterfamilie: ***Chrysobalanoídeae (IV/2 667).***

Chrysobálanus L., Goldpflaume (IV/2 667) — Hirtélla L. (IV/2 667) — Parinárium Aubl. (IV/2 667).



Fig. 1226A. Prunus domestica L. (IV/2, 1106), Zwetschgenkeimling (die untersten Laubblätter sind gegenständig).

XVII. Familie: **Connaráceae** (IV/2 662).

XVIII. Familie: **Leguminósae.** Hülsenfrüchte (IV/3 1113).

1. Unterfamilie: ***Mimosoídeae.*** Mimosengewächse (IV/3 1123).

Ínga Willd. (IV/3 1123) — Enterolóbium Mart. (IV/3 1123) — Pithecolóbium Mart., Spiralhülse (IV/3 1123) — Albízzia Durazz. (IV/3 1123) — Acácia Willd., Echte Akazie (IV/3 1123) — Calliándra Benth., Schönmännchen (IV/3 1123) — Mimósa L., Sinnpflanze (IV/3 1126) — Neptúnia Lour. (IV/3 1127) — Prosópis L., Schraubenbohne (IV/3 1126) — Adenanthéra L., Korallenbaum (IV/3 1126) — Entáda Adans. (= Pusætha L.), Riesenhülse (IV/3 1127) — Párkia R. Br. (Tropen).

2. Unterfamilie: ***Caesalpinoídeae*** (IV/3 1127).

Erythrophlœum Afz. (IV/3 1129) — Cynométra L. (IV/3 1130) — Copaífera L. (= Copaíba Mill.) (IV/3 1130) — Trachylóbium Hayne (IV/3 1131) — Hymenæa L., Lokustbaum (IV/3 1131) — Afzélia Sm. (IV/3 1130) — Tamaríndus L. (IV/3 1130) — Amhérstia Wall. (A. nóbilis Wall. in Hinterindien) — Bauhínia L. (IV/3 1133) — Criffónia Bail. (IV/3 1133) — Cércis L., Judasbaum (IV/3 1133) — Cássia L. (IV/3 1131) — Ceratónia L., Johannisbrotbaum (IV/3 1132) — Kraméria L., Ratanhia (IV/3 1135) — Caesalpínia L. (IV/3 1127) — Haematóxylon L., Blauholz (IV/3 1127) — Parkinsónia L. (IV/3 1127) — Gymnócladus Lam., Schusserbaum (IV/3 1129)

— Gledítschia L., Schotenbaum, Christusdorn (IV/3 1128) — Poinciána L. (3 Arten im tropischen Afrika und Asien).

3. Unterfamilie: Papilionátae. Schmetterlingsblütler (IV/3 1135).

a) Tribus Sophóreae (IV/3 1144).

Sophóra L. (= Styphnolóbium Schott), Schnurbaum (IV/3 1144) — Cladrástis Rafin. (inkl. Virgília Lam.), Gelbholz (IV/3 1146) — Maáckia Ruprecht et Maxim. (IV/3 1146) — Castanospérmum A. Cunn., Australische Kastanie — Myróxylon L. f. (= Toluífera L.), Balsambaum (IV/3 1144) — Bowdíchia H. B. et Kth. (IV/3 1144) — Camoénsia Welw. im trop. Westafrika (IV/3 1144) — Ormósia Jacks. (Tropen).

b) Tribus Podalirieae (IV/3 1146).

Anágyris L., Stinkstrauch (IV/3 1146) — Pipthánthus D. Don (IV/3 1146) — Thermópsis R. Br. (IV/3 1146) — Baptísia Vent., Färberhülse (IV/3 1146) — Podalíria Vent. (IV/3 1147) — Brachyséma R. Br., Kurzfähnchen (IV/3 1147) — Oxylóbium Andr. (= Callístachys Vent.), Prachtähre (IV/3 1147) — Chorizéma Labill., Kurzfähnchen — Viminária Sm. — Aótus Sm. — Pultenáea Sm. (= Eutáxia R. Br.) (IV/3 1147).

c) Tribus Genisteae (IV/3 1147).

Bossiáea Vent. (IV/3 1147) — Templetónia R. Br. (IV/3 1386) — Hóvea R. Br. — Lotonónis DC. (Afrika, Mittelmeergebiet) — Aspálathus L. (Südafrika) — Crotalária L., Klapperhülse (IV/3 1147) — Lupínus L., Lupine, Feig- oder Wolfsbohne (IV/3 1148; VII Fig. 1110) — Agyrolóbium Eckl. et Zeyh., Silberhülse (IV/3 1160) — Labúrnum Medikus, Goldregen, Bohnenbaum (IV/3 1161) — Pettéria Presl (IV/3 1148) — Erinácea Boiss (IV/3 1148) — Laburnocýtisus (IV/3 1166) — Calycótome Link, Stützkelch-Ginster (IV/3 1148) — Adenocárpus DC. (IV/3 1148) — Genistélla Moench, Flügelginster (IV/3 1195) — Genísta L.[1]), Ginster (IV/3 1198) — Spártium L., Binsen-Ginster (IV/3 1213; VII Fig. 1226B) — Úlex L., Stechginster (IV/3 1190) — Cytisánthus Lam., Kugelginster (IV/3 1193) — Cýtisus L., Geissklee, Kleeginster (IV/3 1167) — Sarothámnus Wimmer, Besenginster (IV/3 1181).

d) Tribus Trifolieae (IV/3 1228).

Onónis L.[2]), Hauhechel (IV/3 1215) — Parochétus Hamilt. (Gebirge des tropischen Asien und Afrika) — Trigonélla L., Bockhornklee (IV/3 1228) — Melilótus Hill em. Adanson, Honigklee, Steinklee (IV/3 1236) — Medicágo L., Schneckenklee (IV/3 1248) — Trifólium L., Klee, Kopfklee (IV/3 1275).

e) Tribus Loteae (IV/3 1352).

Anthýllis L., Wundklee (IV/3 1352) — Helminthocárpum A. Rich. (IV/3 1352) — Hymenocárpus Savi (= Circínnus Med.) (IV/3 1352) — Cytisópsis Jaubert et Spach (IV/3 1352) — Hosáckia Douglas (IV/3 1352) — Lótus L. (inkl. Tetragonólobus Scop.), Hornklee, Spargelklee, Flügelerbse (IV/3 1364) — Dorýcnium Miller, Backenklee (IV/3 1376).

f) Tribus Galégeae (IV/3 1382).

Psolárea L. (IV/3 1384) — Amórpha L., Bastard-Indigo (IV/3 1385) — Eysenhárdtia H. B. et Kth. (IV/3 1386) — Dálea L. (IV/3 1386) — Petalostémon Michx. (= Kuhnistéra Lam.) (IV/3 1386) — Brogniártia H. B. et Kth. (IV/3 1386) — Tephrósia Pers. (IV/3 1386) — Wistária Nutt. (= Kraúnhia Rafin., = Phaseolódes), Glyzine, Prunktraube (IV/3 1386) — Galéga L., Geissraute (IV/3 1387, 1642 Fig. 1607) — Robínia L., Falsche Akazie, Robinie (IV/3 1390) — Sesbánia Scop. (IV/3 1390) — Carmichélia R. Br. (IV/3 1390) — Halimodéndron Fisch., Salzstrauch (IV/3 1400) — Caragána L., Erbsenstrauch (IV/3 1400) — Calóphaca Fisch., Schönhülse (IV/3 1402) — Sewerzówia Regel et Schmalh. (IV/3 1400) — Didymopélta Regel et Schmalh. (IV/3 1400) — Astrágalus L.[3]) (inkl. Pháca L. et Oxýtropis DC.), Stragel, Traganth, Bärenschote (IV/3 1402; VII Fig. 1142, 1227) — Bisérrula L. (IV/3 1400) — Glycyrrhíza L., Süssholz (IV/3 1453) — Clianthus Banks et Soland. (= Dónia G. Don), Ruhmesblume (IV/3 1456; VII Fig. 1120) — Sutherlándia R. Br. (IV/3 1457) — Eremospárton Fisch. et Mey. — Lessértia DC. — Swainsónia Salisb. — Smirnóvia Bunge (IV/3 1457) — Colútea L., Blasenstrauch (IV/3 1457).

g) Tribus Hedysareae (= Coronilleae) (IV/3 1461).

Securígera DC. (= Bonavéria Scop.), Beilwicke (IV/3 1461) — Scorpiúrus L. (IV/3 1463) — Coronílla L., Kronwicke, Peltsche (IV/3 1465) — Ornithópus L., Vogelfuss, Klauenschote (IV/3 1475) — Hippocrépis L., Hufeisenklee (IV/3 1481) — Onobrýchis Miller, Esparsette (IV/3 1487) — Ebénus L. (IV/3 1462) — Alhági Desv. (IV/3 1462) — Brýa

---

[1]) **Genísta Anglica** L. (IV/3 1209) ist von Issler für Süddeutschland (Schönau im Wiesental im Badischen Schwarzwald) nachgewiesen worden.

[2]) Über die systematische Stellung von **Onónis** siehe IV/3 1216 und 1383 Fig. 1441.

[3]) **Astrágalus oroboídes** Hornemann (IV/3 1414) kommt auch in Salzburg (Stubachtal und Lungau) vor.

Patr. Br. (Westindien) — Amícia H. B. et Kth. (IV/3 1462) — Aeschynómene L. (= Herminiéra Guill. et Perr.), Ambatsch (IV/3 1462) — Árachis L., Erdnuss (IV/3 1463; VII Fig. 1096) — Desmódium Desv., Bündelhülse — Lespedéza L. (IV/3 1463).

h) Tribus Dalbergieae (IV/3 1495).

Dalbérgia L. (IV/3 1496) — Machærium Pers. (trop. Amerika) — Pterocárpus L., Flügelfruchtbaum (IV/3 1496) — Lonchocárpus H. B. et Kth. (trop. Amerika) — Dérris Lour. (= Deguélia Aubl.) in den Tropen — Andíra Lam. (IV/3 1496) — Dípterix Schreb. (IV/3 1496).

i) Tribus Vicieae (IV/3 1497).

Ábrus L. (IV/3 1498) — Cícer L., Kichererbse (IV/3 1498) — Léns Miller, Linse (IV/3 1501) — Vícia L.[1]), Wicke, Vogelerbse (IV/3 1506) — Láthyrus L.[2]), Platterbse, Kicher (IV/3 1562; VII Fig. 1228) — Písum L., Erbse (IV/3 1610).

Fig. 1226B. Spartium junceum L. (IV/3, 1213), Binsen-Ginster, auf Corsika. Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.

k) *Tribus Phaseóleae (IV/3 1619).*

Clitória L., Schamblume (IV/3 1626) — Bradbúrya Raf., Spornfahne (Amerika) — Amphicárpa Ell. (Amerika, Japan, Himalaya) — Glýcine L. (= Sója Savi), Soja-Bohne (IV/3 1620) — Kennédya Vent. (= Hardenbérgia Benth.) (IV/3 1626) — Erýthrina L., Korallenbaum (IV/3 1626) — Ápios Moench, Erdbirne (IV/3 1625) — Bútea Roxb. (IV/3 1626) — Mucúna Adans., Brennhülse, Juckbohne (IV/3 1626) — Camptoséma Hook. et Arn., Krummfahne — Puerária DC. (IV/3 1625) — Canavália Adans (IV/3 1625) — Cájanus DC., Taubenerbse (IV/3 1625) — Rhynchósia Lour. (wärmere Gebiete) — Physostígma Balf. (IV/3 1624) — Phaséolus L., Gartenbohne (IV/3 1626) — Voandzeía (L.) Thouars, Erderbse (IV/3 1624) — Kerstingiélla Harms (IV/3 1625) — Vígna Savi (IV/3 1623) — Pachyrrhízus Rich. (IV/3 1624) — Dólichos L. (= Láblab Savi).

Fig. 1227. Astragalus (Phaca) frigidus (L.) A. Gray, (IV/3, 1416) im Unterengadin, ca. 1500 m. Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.

22. Reihe **Pandáles** mit der einzigen Gattung Pánda Pierre (P. oleósa Pierre, = Porphyránthus Engler).

23. Reihe **Geraniáles** (Gruináles) (IV/3 1643).

1 Unterreihe **Geraniíneae** (IV/3 1643).

I. Familie: **Oxalidáceae.** Sauerkleegewächse (IV/3 1644).

Eichléria Progel (IV/3 1645) — Óxalis L.[3]), Sauerklee (IV/3 1645) — Biophýtum DC., Reizpflanze (IV/3 1645) — Avérrhoa L., Gurkenbaum (IV/3 1645).

---

[1]) **Vícia Órobus** L. (IV/3 1525) ist auch im Hohen Venn (Kalterherberg) festgestellt worden (Fettweis briefl.).

[2]) **Láthyrus marítimus** (L.) Bigelow (IV/3 1586) kommt am schleswig-holsteinschen Ostseestrand (Schwansen), ebenso im Lande Oldenburg (mehrfach) bestimmt vor (Neueinwanderer, wie auf der Insel Ösel).

[3]) Zu **Oxalis Ortgiésii** Regel gehört auch Fig. 1656a bis c (S. 1726).

II. Familie: **Geraniáceae.** Schnabelkräuter (IV/3 1656).

Géranium L. em. L'Hérit., Storchschnabel (IV/3 1668 exkl. Fig. 1656a bis c S. 1726) — Monsónia L. (IV/3 1660) — Sarcocaúlon (DC.) Sweet (IV/3 1660) — Eródium L'Héritier, Hirtennadel, Reiherschnabel (IV/3 1716) — Pelargónium Burmann (IV/3 1660) — Viviánia Cav. (Südamerika).

III. Familie: **Tropaeoláceae.** Kapuzinerkressen (IV/3 1726).

IV. Familie: **Lináceae.** Leingewächse (V/1 1).

Radíola Hill, Zwerg-Lein (V/1 2) — Línum L., Lein, Flachs (V/1 3) — Reinwárdtia Dum. (V/1 1) — Hugónia L. (V/1 1) — Rouchéra Planch. (V/1 1). — Ochtocósmus Benth. (trop. Amerika, trop. Afrika).

V. Familie: **Humiriáceae** (V/1 36).

VI. Familie: **Erythroxyláceae.** Kokagewächse (V/1 37).

Erythróxylon L., Rotholz (V/1 37 und VII Fig. 1229) — Aneúlophus Benth.

VII. Familie: **Zygophylláceae.** Jochblattgewächse (V/1 38).

Fagónia L. (V/1 38) — Seetzénia R. Br. (V/1 38) — Zygophýllum L., Jochblatt (V/1 39) — Guajácum L., Pockholz (V/1 39) — Porliéra Ruiz et Pav. (V/1 40) — Bulnésia Gay — Larréa Cav. — Tríbulus L., Burzeldorn, Zwillingsblatt (V/1 42) — Augéa Thunb. — Chitónia Moç. et Sess., Kleidstrauch — Péganum L., Steppenraute (V/1 41) — Nitrária L., Salpeterstrauch — Balanítes Delile (V/1 41).

VIII. Familie: **Cneoráceae.** Zeilandgewächse (V/1 44).

IX. Familie: **Rutáceae.** Rautengewächse (V/1 44).

1. Unterfamilie: Rutoideae.

Xanthóxylum L., Gelbholz (V/1 47) — Fagára L. (V/1 47) — Evódia Forst., Duftstrauch (trop. Asien) — Oríxa Thumb. (Japan) — Choísya Knuth, Orangenblume (V/1 48) — Boenninghausénia Rchb. (V/1 69) — Rúta, Raute (V/1 68) — Dictámnus L., Diptam, Spechtwurz (V/1 74) — Borónia Smith (V/1 48) — Eriostémon Sm., Wollfaden (Australien) — Crówea Sm. (Australien) — Córrea Sm. (V/1 49) — Coleonéma Bartl. et Wendl. Scheidenfaden (V/1 50) — Agathósma Willd. (V/1 49) — Barósma Willd., Bukkostrauch (V/1 49) — Adenándra Willd. (V/1 50) — Diósma L., Götterduft (V/1 50) — Empleúrum Soland. (V/1 50) — Pilocárpus Vahl, Jaborandi (V/1 50) — Esenbéckia H. B. et Kth. (V/1 51) — Galipéa Aubl. (V/1 51) — Erythrochíton Nees et Mart. — Cuspária Humb. (V/1 51) — Monniéria L.

Fig. 1228. Lathyrus filiformis (Lam.) Gay subsp. ensifolius (Ser.) auf der Hechinger Alb. Phot. Julius Plankenhorn in Dettingen (Erms). — Fig. 1572 (Bd. IV/3, 1578) ist als Lathyrus Pannonicus (Kramer) Garcke var. Suévicus Ad. Mayer zu bezeichnen.

2. Unterfamilie: Dictyolomoideae (V/1 52) mit der Gattung Dictyolóma DC.

3. Unterfamilie: Flindersioideae (V/1 52) mit den Gattungen Flindérsia R. Br. und Chloróxylon DC.

4. Unterfamilie: Spathelioideae (V/1 52) mit der Gattung Spathélia L.

5. Unterfamilie: Toddalioideae (V/1 53).

Ptélea L., Leder-, Klee- oder Hopfenstrauch, Klee-Ulme (V/1 52) — Phellodéndron Rupr., Korkstrauch (V/1 53) — Sargéntia Wats. (Mexiko) — Casimíroa Llav. et Lex. — Vépris Commers. (Afrika, Ostindien) — Toddália Juss. (V/1 53) — Skímmia Thunb. (V/1 53) — Amýris L.

6. Unterfamilie: Aurantioideae (V/1 54).

Murraya L. — Clauséna Burm. (= Coókia Sonnerat) — Limónia (Burm.) L. — Luvúnga Ham. (indisch-malayisch) — Triphásia Lour. — Atalántia Correa — Ferónia Correa, Elefantenapfelbaum — Aegle Correa, Belbaum — Cítrus L., Agrumen, Goldäpfel (V/1 54; VII Fig. 1078, 1093).

X. Familie: **Simarubáceae.** Bitterholzgewächse (V/1 77).

Suriána L. (V/1 78) — Cadéllia F. v. Muell. — Samadéra Gaertn. — Hyptiándra Hook. f. —

Simarúba Aubl., Ruhrrindenbaum (V/1 79) — Simába Aubl., Cedronbaum — Quássia L. (V/1 79) — Hannóa Planch. (trop. Afrika) — Holacántha A. Gray — Brúcea J. S. Müll. (V/1 79) — Picrásma Blume (= Picraéna Lindl.), Unechtes Quassiaholz (V/1 79) — Picrélla H. Baillon — Picrolémma Hook. f. — Ailánthus Desf.[1]), Götter- oder Himmelsbaum (V/1 80) — Kírkia Oliv. (V/1 79) — Irvíngia Hoog f., Scheinmango (V/1 79) — Picrámnia Sw. (V/1 80) — Alvarádoa Liebm. (Zentral- und Südamerika).

XI. Familie: **Burseráceae.** Balsambaumgewächse (V/1 83).

Prótium Burm., Elemibaum (= Icíca Aubl.) — Canárium L., Kanaribaum (V/1 84) — Pachýlobus Don — Ancoúmea Pierre — Boswéllia Roxb., Weihrauchbaum (V/1 84) — Burséra L. (= Eláphirum Jacq.) — Commíphora Jacq. (= Balsamodéndron Kunth), Balsambaum (V/1 84) — Garúga Roxb. (indisch-malayisch).

XII. Familie: **Meliáceae.** Zedrachgewächse (V/1 84).

Cédrela L., Zedrele (V/1 85) — Toóna Roem., Tuni, Asiatische Zedrele — Khaýa Juss. — Soymída A. Juss. — Pseudocédrela Harms — Swieténia L., Mahagonibaum — Entandrophrágma DC. — Carápa Aubl., Crabbaum (V/1 85) — Xylocárpus Koenig, Granatenbaum (V/1 85) — Mélia L., Zedrachbaum — Azadirächta L. (V/1 85) — Lánsium (Rumph.) Jack.

XIII. Familie: **Akaniáceae** mit 1 Art (Akánia Híllii Stapf) in Queensland.

2. Unterreihe **Malpighíneae.**

XIV. Familie: **Malpighiáceae** (V/1 86).

Mascágnia Bertero — Hiraéa Jacq. — Tetrápteris Cav. — Banistéria L. — Heterópteris Juss. — Malpíghia L. — Bunchósia Rich. — — Byrsoníma Rich. et Juss. — Burdáchia Mart.

XV. Familie: **Trigoniáceae** (V/1 86) mit 3 Gattungen (Trigónia Aubl. — Líghtia Schomb. — Trigoniástrum Miq.).

XVI. Familie: **Vochysiáceae** mit 3 Gattungen (V/1 86).

3. Unterreihe **Polygalíneae** (V/1 86).

XVII. Familie: **Tremandráceae** mit 3 Gattungen (V/1 86).

XVIII. Familie: **Polygaláceae.** Kreuzblumengewächse (V/1 86).

Polýgala (Tournef.) L., Kreuzblume (V/1 89) — Bredemeyéra Willd. (V/1 88) — Securídaca L. (V/1 87) — Monnína Ruiz et Pav. (V/1 87) — Salomónia Lour. (inkl. Epirrhizánthus Blume) — Muráltia Neck. (V/1 88) — Múndia Kunth — Carpolóbia G. Don — Xanthophýllum Roxb. (vielleicht Vertreter einer besonderen Familie) — Montabéa Aubl.

4. Unterreihe **Dichapetalíneae.**

XIX. Familie: **Dichapetaláceae.** Spaltkrongewächse (V/1 113).

Dichapétalum Dup. — Stephanopódium Poepp. et Endl. — Tapúra Aubl.

5. Unterreihe **Tricóccae.**

XX. Familie: **Euphorbiáceae** (= Tithymaláceae). Wolfsmilchgewächse (V/1 113).

1. Unterfamilie: Phyllanthoideae (V/1 117).

Andráchne L. (V/1 117) — Securínega Juss. — Fluéggea (nicht Fluggea) Willd. — Phyllánthus L., Blattblume (V/1 117, 120, 125) — Antidésma L. (V/1 114, 117, 120) Uapáca Baill. (V/1 120) — Toxicodéndron Thunb. (V/1 117) — Oldfiéldia Hook. (V/1 120) — Bischófia Blume — Cleistánthus Hook. — Bridélia Willd. — Daphniphýllum Blume.

2. Unterfamilie: Crotonoideae (V/1 117).

Cróton L. (V/1 117, 120) — Chrozóphora Necker (= Tournesólia Scop.), Lackmuskraut (V/1 117, 120) — Manniophýton Muell.-Arg. (V/1 120) — Aleurítes Forst., Gummilackbaum (V/1 120) — Joannésia Velloz. (Samen von J. prínceps Velloz. [Brasilien] wirken purgierend) — Mercuriális L., Bingelkraut (V/1 126, 190 Fig. 1801) — Mallótus Lour. (= Rottléra Roxb.), Kamalabaum (V/1 117, 125) — Alchórnea Sw. (V/1 117) — Macaránga Thouars inkl. Caelobógyne Sm. (V/1 117) — Acalýpha L., Nesselblatt (V/1 118, 125) — Trágia L. (V/1 118, 120) — Rícinus L., Wunderbaum (V/1 120) — Micrándra Benth. (V/1 119) — Hévea Aubl. (= Siphónia Schreb.),



Fig. 1229. Erythroxylon Coca Lam. (V/1, 37). *a* Blühender Zweig. *b* Laubblatt von der Unterseite. *c* Blüte (vergrößert). *d* Kronblatt. *e* Fruchtknoten mit Griffeln. *f* Staubblattröhre.

[1]) Der richtige Name für den Götterbaum ist **Ailánthus** (oft auch Ailantus geschrieben) **altíssima** (Mill.) Swingle (nicht Siringle!).

Kautschukbaum (V/1 118) — Plukenétia L. (V/1 118) — Dalechámpia L. (V/1 118, 120) — Codiæum Rumph. (V/1 125) — Játropha L. (V/1 118, 120) — Ricinodéndron Muell.-Arg. (V/1 118) — Mánihot Adans. (V/1 118, 119) — Excoecária L., Blindbaum (V/1 118) — Homalánthus Juss. (Monsungebiet) — Sebastiánia Spreng. (meist in Südamerika) — Stillíngia L. (meist tropisch-amerikanisch) — Sápium P. Br., Klebbaum (V/1 118, 119) — Hippómane L., Manizellenbaum (V/1 118) — Húra L., Sandbüchsenbaum (V/1 118) — Anthostéma Juss. (V/1 118) — Euphórbia L. (inkl. Anisophýllum Haw., Poinséttia Graham und Tithýmalus Scop.), Wolfsmilch (V/1 134; VII Fig. 1230) — Synadénium Boiss. (V/1 118) — Pedilánthus Neck. (V/1 118).

3. Unterfamilie: Porantheroideae (V/1 118).

4. Unterfamilie: Ricinocarpoideae (V/1 118).

6. Unterreihe **Callitrichíneae.**

XXI. Familie: **Callitricháceae.** Wassersterngewächse (V/1 190).

Callítriche L.[1]), Wasserstern (V/1 190).

24. Reihe **Sapindáles** (= Celastráles, z. T. Therebintháles) (V/1 202).

I. Familie: **Buxáceae.** Buchsgewächse (V/1 202).

Sarcocócca Lindl. (V/1 202) — Pachysándra Michx. — Búxus L., Buchsbaum (V/1 204) — Notobúxus Oliv. (V/1 202) — Macropodándra Gilg (Zentralafrika) — Stylóceras Juss. — Simmóndsia Nutt. (Kalifornien).

II. Familie: **Coriariáceae.** Gerberstrauchgewächse (V/1 213) mit der Gattung Coriária L., Gerberstrauch.

III. Familie: **Limnantháceae.** Sumpfschnabelgewächse (V/1 213) mit den Gattungen Limnánthes R. Br. und Flœrkea Willd.

IV. Familie: **Anacardiáceae.** Sumachgewächse (V/1 213).

a) Tribus Mangiféreae.

Buchanánia Spreng. (V/1 215) — Mangífera Burm., Mangobaum — Anacárdium L., Nierenbaum (V/1 215) — Glúta L., Giftfirnisbaum (V/1 216) — Swintónia Griff (malayisch) — Melanorrhœa Wall., Firnisbaum — Bouéa Meissn. (malayisch).

b) Tribus Spondíeae (V/1 216).

Spóndias L., Balsampflaume — Dracontomélon Bl., Drachenapfel — Sclerocárya Hochst., Hartsteinpflaume — Lánnea Rich.

Fig. 1230. Euphorbia dulcis L. (V/1, 154). Phot. Otto Ziegler, Zollikon (Schweiz).

c) Tribus Rhoídeae (V/1 217).

Pistácia, Pistazie (V/1 229) — Schínus L., Pfefferbaum (V/1 217) — Cótinus Miller, Perückenstrauch (V/1 226) — Heéria Meissn. (V/1 247) — Comocládia P. Browne (Antillen) — Metópium P. Browne (Antillen) — Rhús L., Sumach (V/1 218) — Astrónium Jacq. (V/1 247) — Loxopterýgium Hook. f. (Brasilien) — Schinópsis Engler (V/1 247).

d) Tribus Semecárpeae (V/1 218) — Nothopégia Bl. (Ostindien) — Semecárpus L., Merkfruchtbaum.

e) Tribus Dobinéeae (V/1 218).

V. Familie: **Cyrilláceae** (V/1 233) mit den Gattungen Cliftónia Banks. Costéa A. Rich. und Cyrilla Garden.

VI. Familie: **Pentaphylacáceae** (V/1 233).

VII. Familie: **Corynocarpáceae** (V/1 233) mit der Gattung Corynocárpus Forst. (3 Arten).

VIII. Familie: **Aquifoliáceae** (= Iliáceae). Stechpalmensträucher (V/1 233).

Ilex L., Stechpalme (V/1 234) — Nemopánthes Raf. — Phellíne Labill. (V/1 234).

IX. Familie: **Celastráceae.** Baumwürgergewächse (V/1 243).

[1]) Eine für Mitteleuropa neue Art ist **Callítriche polymórpha** Loennroth (siehe Samuelsson, Gunnar. Veröffentl. des Geobotan. Institutes Rübel in Zürich Heft 3, 1925), die in manchen Gegenden die häufigste Art der Gattung sein dürfte.

Evónymus L., Spindelbaum, Pfaffenkäppchen (V/1 246) — Lophopétalum Wight (V/1 245) — Celástrus L., Baumwürger, Celaster (V/1 245) — Cátha Endl. (= Gymnospória Wight et Arn.), Kathstrauch (V/1 244) — Cassíne L. (= Elaeodéndron Jacq.) (V/1 245) — Polycárdia Juss. auf Madagaskar (z. T. mit blattbürtigen Blüten) — Goúpia Aubl. (V/1 245).

X. Familie **Hippocrateáceae.** Hippokratesgewächse (V/1 256) mit den Gattungen Hippocrátea L., Salácia L. und Campylostémon Welw.

XI. Familie: **Salvadoráceae** (V/3 1901) mit der Gattung Salvadóra L.

XII. Familie: **Stackhousiáceae** (V/1 256) und den Gattungen Stackhoúsia Sm. und Macgregória F. Müller.

XIII. Familie: **Staphyleáceae.** Klapper- oder Pimpernussgewächse (V/1 256).

Staphyléa L. (= Bumálda Thunb., = Staphylodéndron Scop.), Klapper- oder Pimpernuss, Blasenstrauch (V/1 257) — Turpínia Vent. (V/1 256) — Euscáphis Sieb. et Zucc. (V/1 257) — Tapíscia Oliv. (V/1 235) — Huértea Ruiz et Pav. (Peru, Cuba).

XIV Familie: **Icacináceae** (= Phytocrenáceae). Wasserrebengewächse (V/1 261).

Villarésia Ruiz et Pav. — Phytocréne Wall., Wasserrebe (indo-malayisch) — Chlamydocárya H. Baill. (trop. Westafrika).

XV Familie: **Aextoxicáceae** mit der Gattung Aextóxicum Ruiz et Pav. in Chile.

XVI. Familie: **Aceráceae.** Ahorngewächse (V/1 262).

Dipterónia Oliv. (V/1 262) — Ácer L., Ahorn (V/1 263).

XVII. Familie: **Hippocastanáceae.** Rosskastaniengewächse (V/1 296).

Áesculus L., Rosskastanie (V/1 298) — Billia Peyritsch (V/1 296).

XVIII. Familie **Sapindáceae.** Seifenbaumgewächse (V 1 306).

Serjánia Schum. (V/1 307) — Paullínia L. (V/1 307) — Cardiospérmum L., Herzsame (V/1 307) — Sapíndus L., Seifennussbaum (V/1 307 308) — Thouínia Poit. (V/1 307) — Erioglóssum Bl. (Indien, Australien) — Alphánia Bl. — Melicócca L., (Warmes Amerika) — Schleichéra Willd. (V/1 307) — Litchi Sonn. (V/1 307) — Xerospérmum Blume — Nephélium L., Zwillingspflaume (indisch-malayisch) — Pométia Forst. — Aléctryon Gaertn. — Stadmánnia Lam. — Cupánia L. (trop. und subtrop. Amerika) — Blíghia Kön. (V/1 307) — Koelreutéria Laxm., Blasen-Esche (V/1 308) — Llagunóa Ruiz et Pav (westl. Südamerika) — Dodonæa L. — Harpúllia Roxb. (V/1 307) — Magónia St. Hil. (Brasilien) — Xanthóxeras Bunge, Gelbhornbaum (V/1 308) — Ungnádia Endl. (V/1 306, 308).

XIX. Familie: **Sabiáceae** (V 1 309) — Sábia Colebr. (Ostasien) — Meliósma Bl., Honigduft (Tropen) — Phoxánthus Benth. — Ophiocáryon Schomb., Schlangennussbaum.

XX. Familie: **Meliantháceae.** Honigstrauchgewächse (V/1 309).

Bersáma Fres. (V/1 309) — Melánthus L., Honigstrauch — Greyia Hook. et Harv. (V/1 309).

XXI. Familie: **Didiereáceae** mit 6 Arten der Gattung Didiérea Baill. im südlichen Madagaskar.

XXII. Familie: **Balsamináceae.** Springkrautgewächse (V/1 309).

Impátiens L.[1]), Springkraut, Balsamine (V/1 310) — Hydrócera Bl. (V/1 310).

25. Reihe **Rhamnáles** (V/1 320).

1. Familie: **Rhamnáceae.** Kreuzdorngewächse (V/1 320).

Maesópsis Engl. (trop. Afrika) — Ventilágo Gaertn. (V/1 322) — Paliúrus Gaertner, Stechdorn (V/1 326) — Zízyphus Juss., Judendorn (V/1 322) — Berchémia Necker (V/1 321) — Sagerétia Brongn. (V/1 324) — Rhámnus L., Kreuzdorn (V/1 329; VII Fig. 1010, 1146) — Frángula Miller[2]), Faulbaum (V/1 343) — Hovénia Thunb. (V/1 324) — Ceanóthus L., Säckelblume (V/1 324) — Colubrína Brogn. (V/1 325) — Phýlica L., Kap-Myrte (V/1 326) — Pomáderris Labill. (V/1 325) — Spyrídium Fenzl (V/1 325) — Cryptándra Sm. (V/1 320) — Discária Hook. (V/1 328) — Adólphia Meisn. (V/1 320) — Collétia Juss. (V/1 423) — Gouánia L. (V/1 425) — Crumenária Mart. (V/1 322).

2. Familie: **Vitáceae** (= Ampelidáceae). Rebengewächse (V/1 350).

Vítis L., Weinstock (V/1 359) — Pterisánthes Blume (V/1 354) — Clematocíssus Planch. (V/1 354) — Landúkia Planch. (V/1 354) — Ampelópsis Michx., Wilder Wein (V/1 355) — Parthenocíssus Planch. (= Psedéra Necker, = Quinária Raf.), Jungfernrebe (V/1 356) — Rhoicíssus Planch. (V/1 354) — Císsus L. (V/1 354) — Leéa L. (V/1 351).

---

[1]) Neuerdings ist als weitere Adventivpflanze in der Südschweiz (Tesserete) und im Piemont **Impátiens Insúbrica** G. Beauv. (= I. Mathildae Chiovenda) von unsicherer Herkunft (? Himalaya) festgestellt worden.

[2]) Tafel 181 (Seite 349): Fig. 1 muss es heissen: **Frángula Álnus** (pag. 394), ebenso Nr. 1886 **Frángula** (statt Rhámnus) **rupéstris** Brogniard.

26. Reihe **Malváles** (= Columníferae). (V/I 425).

I. Familie: **Elaeocarpáceae.** Ganiterbaumgewächse (V/1 426).

Elaeocárpus L. — Sloánea L. (Tropen beider Erdhälften) — Crinodéndron Mol. (Chile) — Aristotélia DC.

II. Familie: **Chlaenáceae** (= Schizochlaenáceae) auf Madagaskar und in Afrika (V/1 426).

III. Familie: **Gonystiláceae** (V/1 426).

IV. Familie: **Tiliáceae.** Lindengewächse (V/1 426).

Berrýa Roxb. (V/1 427) — Brownlówia Roxb. (V/1 427) — Pentace Hassk. (V/1 427) — Apeíba Aubl. (V/1 428) — Enteléa R. Br. (V/1 428) — Trichospérmum Bl. (V/1 428) — Tília L., Linde (V/1 430; VII Fig. 1231) — Córchorus L., Júte (V/1 428) — Sparmánnia L. (Vossiánthus), Zimmerlinde (V/1 428) — Lühea Willd. — Móllia Mart. (V/1 426) — Gréwia L., (V/1 429) — Triumfétta L. (V/1 429) — Heliocárpus L. (Mexiko, Südamerika).

V. Familie: **Malváceae.** Malvengewächse (V/1 453).

a) Tribus Malopéae (V/1 455).

Malópe L. (V/1 453) — Kitaibélia (nicht Malope!) vitifólia Willd. (V/1 455) — Paláva Cav. (V/1 455).

b) Tribus Malvéae (V/1 455).

Abútilon Gaertn., Schönmalve (V/1 456) — Wissádula Med. (V/1 454) — Sphaerálcea St. Hil., Kugelmalve (V/1 457) — Modíola Moench (V/1 457) — Howíttia F. v. Muell. (V/1 455) — Lavatéra L., Strauchpappel, Erne (V/1 471) — Althæa L. (= Álcea L.), Eibisch, Stockmalve (V/1 463) — Málva L., Malve, Käsepappel (V/1 474) — Sidálcea A. Gray, Doppelmalve (V/1 455) — Napæa L. (V/1 456) — Malvástrum A. Gray, Scheinmalve (V/1 455) — Plagiánthus Forst. (Australien, Neu-Seeland) — Sída L. (V/1 456) — Anóda Cav., Ohnknoten (V/1 456).



Fig. 1231. Große Linde von Ramsau bei Berchtesgaden (Oberbayern). Phot. Betty Woerner.

c) Tribus Urenéae (V/1 457).

Maláchra L. — Uréna L. (V/1 457) — Pavónia L. (V/1 457) — Goethéa Nees et Mart. (V/1 457) — Malvavíscus Dill., Beeren- oder Tutenmalve (V/1 457).

d) Tribus Hibiscéae (V/1 457).

Sénra Cav. (V/1 455) — Lagunária G. Don (V/1 455) — Hibíscus L. (V/1 458) — Abelmóschus Medik., Bisam-Malve (V/1 457) — Kostelétzkya Presl (V/1 455) — Cienfuegósia Cav. (V/1 454) — Thespésia Corr. trop. Asien und Polynesien) — Gossýpium L., Baumwolle (V/1 455).

VI. Familie: **Bombáceae.** Wollbaumgewächse (V/1 489).

Adansónia L., Affenbrotbaum (V/1 489) — Bómbax L., Seidenwollbaum (V/1 489) — Chorísia H. B. et Kth. — Ceíba Gaertner, Kapok- oder Baumwollbaum (V/1 489) — Cavanillésia Ruiz et Pav. (Südamerika) — Matísia Benth. (trop. andines Südamerika) — Ochróma Sw., Hasenpfotenbaum (V/1 489) — Bernoúllia Oliv. (Costa Rica) — Dúrio L., Durianbaum (indisch-malayisch) — Neésia Bl. (malayisch).

VII. Familie: **Sterculiáceae** (V/1 489).

Melhánia Forsk. (tropisch) — Glossostémon Desf. — Dombeýa Cav. (Afrika, Madagaskar) — Hermánnia L. (V/1 492) — Walthéria L. (trop. Amerika) — Buettnéria L. (Wärmeres Amerika) — Theobróma L., Kakaobaum (V/1 490) — Thomásia Gay (V/1 492) — Helictéres L. (V/1 490) — Triplochíton K. Schum. (Westafrika) — Mansónia J. R. Drumm. (V/1 492) — Stercúlia L. (V/1 492) — Brachychíton Endl. (Australien) — Cóla Schott, Kolanussbaum (V/1 492) — Heritiéra Ait. (V/1 492).

VIII. Familie: **Scytopetaláceae** (= Rhaptopetaláceae). Schüsselkelchgewächse (V/1 426).

27. Reihe **Parietáles.** Wandleistengewächse (V/I 492).

1. Unterreihe **Theíneae** (V/I 493).

I. Familie: **Dilleniáceae.** (V/1 493).

Tetracéra L. — Hibbértia Andr. (V/1 494) — Curatélla L. (V/1 494) — Dillénia L.

II. Familie: **Actinidiáceae**[1]) (wird jetzt als eigene Familie betrachtet) — Actinídia Lindl. (V/1 494) — Sauraúja Willd. (V/1 494).

[1]) Schnarf weist auf die nahen Beziehungen der Dilleniaceae zu den Clethraceae (und damit zu den Bicornes) hin.

III. Familie: **Eucryphiáceae** mit der Gattung Eucrýphia Cav. in Chile und Australien.

IV Familie: **Medusagynáceae** mit der Gattung Medusagýne Bak. auf den Seychellen.

V Familie: **Ochnáceae** [1]) (V/1 494).

Ouratéa Aubl. — Óchna L. — Lophíra Banks. — Oldfiéldia (V/1 494) — Elvásia DC. (trop. Amerika) — Luxembúrgia St. Hil. (Brasilien) — Sauvagésia L. (meist amerikanisch).

VI. Familie: **Caryocaráceae** (= Rhizoboláceae). Butternussgewächse (V 1 494) — Carýocar L. — Anthodíscus G. Mey.

VII. Familie: **Marcgraviáceae.** Schlauchlianen (V/1 494).

Marcgrávia L. — Norántea Aubl. — Souroúbea Aubl. — Ruýschia Jacq. — Caracásia Szyszylowicz.

VIII. Familie: **Quiináceae** (V/1 493) — Quiína Aubl. — Touroúlia Aubl.

IX. Familie: **Theáceae** (= Camelliáceae, Ternstroemiáceae z. T.) — Vísnea L. (V/1 498) — Eurýa Thunb. (V 1 498) — Théa L. (inkl. Caméllia L.), Teestrauch (V/1 495) — Gordónia Ell. (V/1 498) — Stewártia L. (V 1 498) — Adinándra Jack. (Asien, Afrika).

X. Familie: **Strasburgeriáceae** (Strasburgéria Baill. auf Neu-Kaledonien).

XI. Familie: **Hypericáceae** (= Guttíferae). Johanniskrautgewächse, Guttibaumgewächse (V/1 498).

1. Unterfamilie: Kielmeyeroídeae (V/1 499).

Kielmeyéra Mart. (V/1 499) — Caraípa Aubl. (V 499) — Haplocláthra Benth. (V/1 499).

2. Unterfamilie: Hypericoídeae (V/1 499).

Ascýrum L. (V/1 499) — Hypericum L., Johanniskraut, Hartheu (V/1 502) — Cratóxylon Bl. (V/1 499) — Eliæa Camb. (V/1 499) — Vísmia Vell. — Psorospérmum Spach (trop. Afrika).

3. Unterfamilie: Calophylloídeae (V/1 499).

Mámmea L. (V/1 500) — Mésua L. — Calophýllum L., Schönblatt (V 500) — Ochrocárpus Thouars (V/1 500) — Endodésmia Benth. (V/1 499).

4. *Unterfamilie: Clusioídeae (V/1 500).*

Clúsia L. (V 1 499, 500) — Allanbláckia Oliv. (V/1 501) — Garcínia L. (V/1 501) — Rheédia L. (V/1 499, 501) — Tripétalum K. Schum. (V/1 499) — Pentaphalángium Warburg (V/1 499, 501).

5. Unterfamilie: Moronoboídeae (V/1 502).

Pentadésma Sabine (V/1 502) — Platónia Mart. — Symphónia L. (V/1 502).

XII. Familie: **Dipterocarpáceae.** Flügelfruchtgewächse (V/1 533).

Dryobálanops Gaertn. (V/1 534) — Dipterocárpus Gaertn., Zweiflügelfruchtbaum (V/1 534) — Doóna Thw. — Hópea Roxb. — Shórea Roxb. (V/1 534) — Balanocárpus Bedd. (Indien) — Vatíca L. — Pachynocárpus Hook. f. — Stemonopórus Thw. — Vatéria L. — Monótes DC. (trop. Afrika).

2. Unterreihe **Tamaricíneae** (V/1 493).

XIII. Familie: **Elatináceae.** Tännelgewächse (V/1 535).

Bérgia L. (V/1 535) — Elátine L., Tännel (V/1 535).

XIV Familie: **Frankeniáceae** (V 1 543).

Hypericópsis Boiss. (V/1 544) — Frankénia L. (V/1 544) — Beatsónia Roxb. — Niederleínia Hieron.

XV Familie: **Tamaricáceae.** Tamariskengewächse (V/1 544).

Reaumúria L. (V/1 544) — Hololáchne Ehrenb. (V/1 545) — Támarix L., Tamariske (V/1 546) — Myricária Desv., Rispelstrauch, Birzstrauch (V/1 548) — Fouquiéria H. B. et Kth. (Mexiko).

3. Unterreihe **Cistíneae** (V/1 493).

XVI. Familie: **Cistáceae.** Zistrosengewächse (V/1 552).

Cístus L., Zistrose (V/1 554) — Tuberária (Dunal) Spach, Sandröschen (V/1 558) — Helianthemum Miller, Sonnenröschen (V/1 561) — Fumána (Dunal) Spach, Heideröschen (V/1 579) — Hudsónia L. (V/1 552) — Lechéa L. (V/1 552).

XVII. Familie: **Bixáceae.** Annatogewächse (V/1 584) mit der Gattung Bíxa L.

4. Unterreihe **Cochlospermíneae** (V/1 493).

XVIII. Familie: **Cochlospermáceae.** Nierensamengewächse (V/1 493) mit den Gattungen Sphaerosépalum Bak., Amoreúxia Moc. et Sess. und Cochlospérmum Kunth (= Maximilianéa Mart. et Schrank, = Wittelsbáchia Mart. et Zucc.).

5. Unterreihe **Lacistemíneae** mit der XIX. Familie der Lacistemáceae und der Gattung Lacistéma Swartz (16 Arten im trop. Amerika). Die Familie war früher bei den Piperales (III 209) untergebracht.

[1]) Van Tieghem löst die Ochnaceae in mehrere Familien (Lophiráceae, Luxemburgiáceae, Wallaceáceae usw.) auf.

6. Unterreihe **Flacourtíneae** (V/1 493).

XX. Familie: **Canelláceae** (= Winteranáceae). Kaneelbaumgewächse (V/1 493).

Winteräna L. (= Canélla Murr.), Kaneelbaum (V/1 585) — Cinnamodéndron Endl. (Brasilien, Antillen) — Warbúrgia Engler (Ostafrika) — Cinnamósma Baill. (Madagaskar) — Pleodéndron van Tieghem (Portorico).

XXI. Familie: **Violáceae.** Veilchengewächse (V/1 585).

Amphírrox Spr. im trop. Amerika (V/1 585) — Rinórea Aubl. (V/1 585) — Hymenanthéra R. Br. (V/1 586) — Anchiétea St. Hil. (trop. Südamerika) — Calýptrion Ging. (trop. Nordamerika) — Hybánthus Jacq. (= Jonídium Vent.) (V/1 586) — Noiséttia H. B. et Kth. (V/1 586) — Víola L., Veilchen (V/1 586).

XXII. Familie: **Flacourtiáceae** (V/1 656).

Dasylépis Oliv. (Gebirge von Afrika) — Erythrospérmum Lam. (Madagaskar, indisch-malayisch) — Berberidópsis Hook. f. (V/1 656) — Oncóba Forsk. — Carpótroche Endl. — Hydnocárpus Gaertn. (V/1 656) — Trichadénia Thw. — Gynocárdia R. Br. — Pángium Reinw. (V/1 656) — Kiggelária L. — Bartéria Hook. — Streptothámnus F. v. Muell. (V/1 656) — Homálium Jacq. — Triméria Harv. — Phyllobótryum Muell.-Arg. (V/1 656) — Phylloclínium Baill. — Myróxylon J. et G. Forst. — Azára Ruiz et Pav. — Doryalis Arn. et E. Mey. — Idésia Maxim. — Poliothryósis Oliv. — Caseária Jacq. — Bembícia Oliv. — Rapalocárpus Boj.

XXIII. Familie: **Stachyuráceae** (V/1 493) mit der Gattung Stachyúrus Sieb. et Zucc. in Ostasien.

XXIV Familie: **Turneráceae** (V 1 657).

WormskióldiaThonn. et Schum. — Piriquéta Aubl. — Streptopétalum Hochst. (trop. Ostafrika). — Túrnera L.

XXV. Familie: **Malesherbiáceae** (V/1 493).

Maleshérbia Ruiz et Pavon in Peru und Chile.

XXVI. Familie: **Passifloráceae.** Passionsblumengewächse (V/1 657).

Tryphostémma Harvey — Adénia Forsk. (V/1 658) — Passiflóra L. (inkl. Tacsónia Juss.), Passionsblume (V/1 658) — Tetrapathæa Raoul. (V/1 658).

XXVII. Familie: **Achariáceae** [1]) (V/1 493) in Südafrika.

7. Unterreihe **Papayíneae** (V/1 493)

mit der XXVIII. Familie **Caricáceae** (= Papayáceae). Papayagewächse (V/1 660) — Carica L. (= Papáya Tourn.), Melonenbaum (V/1 660) — Jacarátia Marcgr. (V/1 661) — Cylicomorpha Urban (trop. Afrika).

8. Unterreihe **Loasíneae** (V/1 493).

XXIX. Familie: **Loasáceae.** Brennwindengewächse (V/1 661).

Gronóvia L. (V/1 662) — Mentzélia L. — Kissénia R. Br. — Loása Adans., Brennwinde (Südamerika) — Scyphánthus Don (Chile) — Cajóphora Presl (V/1 662) — Blumenbáchia Schrad. (Südamerika).

9. Unterreihe **Datiscíneae**

mit der XXX. Familie **Datiscáceae** (V/1 663) und den Gattungen Tetraméles R. Br. (V/1 663) — Octoméles Miq. — Datísca L., Streichkraut (V/1 663).

10. Unterreihe **Begoniíneae** (V/1 493).

XXXI. Familie: **Begoniáceae.** Schiefblattgewächse (V 663).

Hillebrándia Oliv. (Hawai) — Begónia L., Schiefblatt (V/1 664) — Symbegónia Warburg — Begoniélla Oliv. (V/1 664).

11. Unterreihe **Ancistrocladíneae** (V/1 493)

mit der XXXII. Familie **Ancistrocladáceae** und den Gattungen Bigámea König (Ceylon), Ancistrócladus Wall. (trop. Asien) und Ancistrélla van Tiegh.

28. Reihe **Cactáles** (= Opuntiáles). Kaktusartige Gewächse (V/2 686).

Familie: **Cactáceae** [2]). Kakteen (V/2 679).

*1. Unterfamilie: **Peireskioídeae** (V/2 686).*

Peiréskia (Plumier) Miller (V/2 687).

*2. Unterfamilie: **Opuntioídeae** (V/2 687).*

Peireskiópsis Britton et Rose — Quiabéntia Britton et Rose — Pterocáctus K. Schum. — Nopálea Salm-Dyck (V/2 688) — Maihuénia Phil. — Opúntia (Tournefort) Miller (= Cactodéndron Bigelow), Feigenkaktus (V/2 688; VII Fig. 1232) — Grusónia F. Rchb.

*8. Unterfamilie: **Cereoídeae** (V/2 691).*

Céreus Haw. (inkl. Pachycéreus, Aporocáctus, Carnegiéa usw.), Säulenkaktus (V/2 691) — Echinocéreus Eng., Gliederkaktus (V/2 693) — Echinópsis Zucc., Trompetenkaktus (V/2 693) — Ariocárpus Scheidw., Aloëkaktus (V/2 693) — Lophóphora Coult. (= Anhalónium Lem.) — Leuchtenbérgia Fisch. et Hook. (V/2 694) — Ferocáctus Britt. et Rose (V/2 694) — Echinocáctus Link et Otto, Igelkaktus (V/2

[1]) Die Achariaceae zeigen unleugbar Beziehungen zu den Cucurbitaceae.

[2]) Die neuere Einteilung nach Fr. Vaupel gliedert die Familie in die beiden Unterfamilien der **Malacospérmae** (Samenschale weich. Glochiden fehlend) und der **Sclerospérmae** (Samenschale hart. Glochiden vorhanden). Von der ersten Unterfamilie werden weiter drei Tribus unterschieden: **Foliósae, Areoliflórae** und **Axilliflórae.**

694) — Astrophýtum Lem. (V/2 694) — Discocáctus (nicht Dicocactus!) Pfeiffer (V/2 694) — Melocáctus Link et Otto (V/2 694) — Pelycýphora Ehrenb. (V/2 695) — Mammillária Haw., Zitzen- oder Warzenkaktus (V/2 695) — Neomammillária Britton et Rose (V/2 695) — Epiphýllum Haw. (= Zygocáctus K. Schum.), Gliederblattkaktus (V/2 695) — Phyllocáctus Link, Flügel- oder Blattkaktus (V/2 696) — Pfeifféra Salm-Dyx (V/2 696) — Harióta DC. (V/2 697) — Rhípsalis Gaertn. (inkl. Lepísmium [Pfeiff.] K. Schum.), Ruten- oder Geisselkaktus (V/2 697).

29. Reihe **Myrtiflórae** (= Myrtáles). Myrtenartige Gewächse (V/2 697).

1. Unterreihe **Thymelaeíneae** (V/2 697).

I. Familie: **Geissolomatáceae** mit der Gattung Geissolóma Lindl. et Kth. (V/2 697).

II. Familie: **Penaeáceae** (V/2 698) — Endonéma Juss. — Glischrocólla DC. — Penæa L. — Brachysíphon Juss. — Sarcocólla Kth.

III. Familie: **Oliniáceae** (V/2 698) mit der Gattung Olínia Thunb.

IV. Familie: **Thymelaeáceae.** Seidelbastgewächse (V/2 698).

Microsémma Oliv. (V/2 700) — Aquiléria L. (V/2 700) — Phaléria Jack. — Peddiéa Harv. — Synandrodáphne Gilg (V/2 700) — Gnídia L. (V/2 700) — Struthíola L. (V/2 700) — Enkleía Griff. — Craterosíphon Engler et Gilg (V/2 701) — Lagétta Juss. (V/2 701) — Wikstrœmia Endl. (Ostasien, indisch-malayisch) — Linodéndron Griseb. (V/2 701) — Dáphne L. (inkl. Eriosoléna Bl.), Seidelbast, Kellerhals (V/2 703; VII Fig. 982) — Edgewórthia Meisn. (V/2 701) — Dírca L., Blei- oder Lederholz (V/2 701) — Thymeléa Lam., Vogelkopf, Sperlingskraut (V/2 725) — Cryptadénia Meisn. (V/2 702) — Lachnæa L. — Dáis L. (V/2 702) — Schoenobíblos Mart. et Zucc. — Pimeléa Banks et Soland., Glanzstrauch — Drapétes Banks (V/2 702).



Fig. 1232. Opuntia Ficus Indica (L.) Mill. (V/2 S. 89) in Süditalien.

V. Familie: **Elaeagnáceae.** Ölweidengewächse (V/2 727).

Elaeágnus L., Ölweide (V/2 728) — Hippóphaës L., Sanddorn (V/2 731) — Shephérdia Nutt. (= Lepargýrea Rafin.), Büffelbeere (V/2 729).

2. Unterreihe **Myrtíneae** (V/2 698).

VI. Familie: **Lythráceae** (= Salicariáceae). Weiderichgewächse (V/2 741).

Rotála L. (V/2 741, 744) — Ammánnia L. (V/2 744) — Péplis L., Afterquendel (V/2 748) — Lýthrum L., Weiderich (V/2 752) — Woodfórdia Salisb. (V/2 744) — Cuphéa Adans., Höckerkelch, Krummkapsel — Pémphis Forst. — Diplusódon Pohl (V/2 741) — Physocalýmma Pohl (V/2 746) — Lafoénsia Vand. — Nesæa Commers. (V/2 741) — Heímia Link (V/2 746) — Decódon F. Gmel. — Grislea Loefling — Adenária H. B. et Kth. — Tetratáxis Hook. f. (V/2 741) — Lagerstrœmia L. (V/2 746) — Orías Dode — Lawsónia L., Hennastrauch (V/2 747).

VII. Familie: **Heteropyxidáceae** mit der Gattung Heteropýxis Harv. im südöstl. Afrika.

VIII. Familie: **Sonneratiáceae** (= Blattiáceae) (V/2 761) — Sonnerátia L. (= Blátti Adans.) (ostindisch-malayisch) — Duabánga Hamilt. (Ostindien).

IX. Familie: **Crypteroniáceae** mit der Gattung Crypterónia Blume (Hinterindien bis Philippinen).

X. Familie: **Punicáceae.** Granatapfelgewächse (V/2 761).

Púnica L., Granatapfelbaum (V/2 762).

XI. Familie: **Lecythidáceae** (= Belvisiáceae). Deckeltopfbäume (V/2 766).

Foetídia Commers. (V/2 767) — Barringtónia Forst. (V/2 767) — Asteránthus Desf. — Napoleona P. Beauv. — Lecýthis L., Topfnussbaum (V/2 767) — Berthollétia Humb. et Bonpl., Para-, Juvia- oder Brasilnussbaum (V/2 767).

XII. Familie: **Rhizophoráceae.** Manglebaumgewächse (V/2 768).

Cériops Arn. — Rhizóphora L. — Kandélia Wight et Arn. (trop. Asien) — Bruguiéra Lam. (V/2 769) — Cassipouréa Aubl. (V/2 768) — Anisophylléa R. Br. (palaeotropisch) — Póga Pierre (V/2 769).

XIII. Familie: **Nyssáceae.** Tupelogewächse (V/2 769).
Nýssa L. — Campothéca Decne. — Davídia Baill. (Tibet, China).

XIV. Familie: **Alangiáceae** (V/2 770) mit der einzigen Gattung Alángium Lam.

XV. Familie: **Combretáceae** (= Terminaliáceae). Langfadengewächse (V/2 771).
Lumnitzéra Willd. (V/2 773) — Lagunculária Gaertn. (V/2 773) — Terminália L. (V/2 771) — Anogeíssus Wall. (V/2 773) — Conocárpus Gaertn. (V/2 773) — Búcida L., Kuhhornbaum — Combrétum L., Langfaden (V/2 772) — Quisquális L., Fadenröhre (V/2 772).

XVI. Familie: **Myrtáceae.** Myrtengewächse (V/2 773).

1. Unterfamilie: Myrtioídeae (V/2 774).

Orthostémon Berg (V/2 775) — Úgni Turcz. — Myrtéola Berg — Psídium L. (V/2 775) — Mýrtus L., Myrte (V/2 789) — Psidiópsis Berg (V/2 776) — Myrrhínium Schott (V/2 776) — Rhodomýrtus DC. — Piménta Lindl. (V/2 776) — Campomanésia Ruiz et Pav. — Britóa Berg — Myrceugénia Berg — Mýrcia DC. (V/2 777) — Calyptránthes Swartz — Gomidésia Berg — Eugénia L. (inkl. Jambósa DC.) (V/2 779) — Syzýgium Gaertn. (V/2 780).

2. Unterfamilie: Leptospermoídeae (V/2 774, 780).

Backhóusia Hook. et Arn. (V/2 780) — Metrosíderos Banks, Eisenholzbaum (V/2 780) — Tepuália Griseb. — Tristánia R. Br. (V/2 780) — Angóphora Cav. — Eucalýptus L'Hérit., Schönhaube, Gummibaum (V/2 781) — Leptospérmum Forst., Schmalsame, Südsee-Myrte (V/2 788) — Kunzéa Rchb. — Callistémon R. Br., Schönfaden, Reiherbusch (V/2 788) — Melaleúca L. (V/2 786) — Calothámnus Labill. (V/2 789) — Regélia Schau. (V/2 789) — Baeckéa L.

XVII. Familie: **Melastomatáceae.** Schwarzmundgewächse (V/2 794).
Tibouchína Aubl., inkl. Pleróma DC. (V/2 795) — Centradénia G. Don, Sporndrüse — Melástoma Burm. — Osbéckia L. — Dissótis Benth. (trop. und Südafrika) — Rhéxia L. — Monochaétum Naud., Einzelmähne — Rhynchanthéra DC. (Mittelamerika, Brasilien) — Bertolónia Raddi (Südbrasilien) — Gravésia Naud. (V/2 796) — Medinélla Gaudich. (V/2 796) — Tamónea Aubl. (= Micónia Ruiz et Pav.) — Bellúcia Necker (V/2 795) — Blakéa P. Br. (V/2 795) — Astrónia Blume (V/2 796) — Kibéssia DC. — Mouríria Aubl. (V/2 796) — Memécylon L., Saffranbaum (V/2 795, 796).



Fig. 1233. Oenothera muricata L. (V/2, 871). *a*, *a*1 Fruchtstand. *b*, *b*1 Aufgesprungene Kapsel. *c* Samen. — Oenothera bienis L. (V/2, 866).

XVIII. Familie: **Oenotheráceae** (= Onagráceae). Nachtkerzengewächse (V/2 797).
Jussieúa L. (V/2 799) — Oocárpon Micheli (V/2 799) — Ludwígia L., Wasserlöffelchen, Heusenkraut (V/2 804) — Zauschnéria Presl (V/2 799) — Epilóbium L. (inkl. Chamaenérium Spach), Weidenröschen (V/2 806) — Haúya Moc. et Sessé (V/2 797) — Boisduvália Spach (V/2 799) — Clárkia Pursh (V/2 799) — Eucharídium Fischer et Meyer, Anmutblume (V/2 800) — Oenothéra (Onothéra) L. (inkl. Onágra Tournef., Godétia Spach, Kneiffia Spach, Xylopleúrum Spach, Lavaúxia Spach), Nachtkerze (V/2 857) — Gaúra L., Prachtkerze (V/2 800) — Fúchsia L., Fuchsie (V/2 801) — Lopézia Cavanilles (V/2 803) — Circaéa L., Hexenkraut (V/2 873).

XIX. Familie: **Hydrocaryáceae.** Wassernussgewächse (V/2 882).
Trápa L., Wassernuss (V/2 882).

XX. Familie: **Halorrhagidáceae.** Seebeerengewächse (V/2 894).
Laudónia Lindl. (V/2 894) — Halorrhágis Forst., Seebeere — Meziélla Schindler — Laurembérgia Berg (= Serpícula L.) (V/2 895) — Myriophýllum L., Tausendblatt (V/2 896) — Proserpínaca L. (= Tríxis Gaertn.) (V/2 895) — Gúnnera L. (= Misándra Commers).

3. Unterreihe **Hippuridíneae** (V/2 698).

XXI. Familie: **Hippuridáceae.** Tannenwedelgewächse (V/2 905).

Hippúris L., Tannenwedel (V/2 905; VII Fig. 1139).

4. Unterreihe **Cynomoríneae** (V/2 698).

XXII. Familie: **Cynomoriáceae.** Hundskolbengewächse (V/2 698; siehe auch Bd. III 160).

30. Reihe **Umbelliflórae.** Doldenblütige Gewächse (V/2 910).

I. Familie: **Araliáceae** (= Hederáceae). Efeugewächse (V/2 910).

Trevésia Vis. (V/2 913) — Fátsia Decne. et Planch. (V/2 914) — Tetrápanax (Hook.) K. Koch (V/2 914) — Echinópanax Decne. et Planch. (V/2 911) — Scheffléra Forst. (V/2 911) — Hédera L., Efeu (V/2 914) — Polýscias Forst. (V/2 911, 913) — Pseudópanax K. Koch (V/2 914) — Acanthópanax Decne. et Planch. (inkl. Eleutherocóccus Max.), Stachelpanax (V/2 913) — Cussónia Thunb. (Tropen, subtrop. Afrika) — Arália L. (inkl. Dimorphánthus Miq.) (V/2 913) — Pánax L. (V/2 912) — Mackinlaýa F. v. Muell. (V/2, 911).

Fig. 1234. Foeniculum vulgare Mill., fruchtend (das Kraut am Boden ist Daucus Carota L.). Phot. B. Haldy, Mainz (V/2, 1284).

II. Familie: **Umbellíferae** (= Ammiáceae Presl, = Apiáceae Lindley, = Daucáceae Alef.). Doldengewächse (V/2 926; VII Fig. 988, 993, 994, 1160).

1. Unterfamilie: Hydrocotyloideae (V/2 949).

Hydrocótyle L., Wassernabel (V/2 951) — Centélla L. (V/2 949) — Didíscus DC., Blaudolde (V/2 949) — Trachýmene Rudge, Rauhdolde — Xanthósia Rudge — Schoenoléna Bng. — Pentapéltis Bng. — Actinótus Labill. — Bowlésia Ruiz et Pav. (V/2 950) — Domeýkoa Phil. — Drúsa DC. — Azorélla Lam. (V/2 928) — — Pózoa Lam. (V/2 950) — Schizeiléma Hook. — Larétia Gill. et Hook. — Díposis DC. — Asteriscum Cham. et Schlecht. — Mulínum Pers. — Hérmas L.

2. Unterfamilie: Saniculoideae (V/2 950).

Sanícula L. (= Triclínium Rafin.), Sanikel (V/2 957) — Hacquétia Necker (= Dóndia Sprengel), Schaftdolde (V/2 959) — Astrántia L., Sterndolde (V/2 961, 1527) — Erýngium L., Mannstreu, Donardistel (V/2 974; VII 1098A) — Actinoléma Fenzl (V/2 950) — Alepídea Laroch. — Lagœcia L., Hasenkümmel (V/2 992) — Petágnia Guss. (V/2 950) — Árctopus L. (V/2 950).

3. Unterfamilie: Apioideae (V/2 950).

a) Tribus **Echinophóreae** *(V/2 950).*

Echinóphora L., Stacheldolde (V/2 992) — Pycnocýcla Lindl. (V/2 950).

b) Tribus Scandíceae (V/2 954).

Biasoléttia Koch, Knollendolde (V/2 993) — Physocaúlis (DC.) Tausch, Knotendolde (V/2 994) — Chaerophýllum L. em. Hoffm., Kälberkropf (V/2 995) — Chaerefólium Haller (=Anthríscus Pers.), Kerbel, Kerbelkraut (V/2 1014) — Scandícium (C. Koch) Thellung, Falscher Venuskamm (V/2 1032) — Scándix L. em. Adanson, Nadelkerbel (V/2 1032) — Mýrrhis Miller, Süssdolde (V/2 1041) — Molopospérmum Koch, Striemensame (V/2 1046) — Rhabdosciádium Boiss. (V/2 950) — Grammosciádium DC. (V/2 950) — Osmorrhíza Raf. (V/2 950) — Notopterýgium Boissieu (V/2 950) — Tórilis Adanson, Klettenkerbel, Borstendolde (V/2 1048) — Astrodaúcus Drude, Sternmöhre (V/2 1060) — Caúcalis L. em. Drude (= inkl. Turgénia Hoffm.), Haftdolde (V/2 1061) — Orlaýa Hoffm., Breitsamen, Strahldolde (V/2 1066) — Turgeniópsis Boiss. (V/2 950) — Kozlóvia Lipsky.

c) Tribus Coriánderae (V/2 950).

Coriándrum L. em. Necker, Koriander, Wanzendill (V/2 1071) — Bífora Hoffm., Hohlsame (V/2 1074) — Schrénkia Fisch. et Mey. (V/2 950).

d) Tribus Smyrnieae (V/2 950).

Smýrnium L., Gelbdolde (V/2 1077) — Dánaa All. (= Physospérmum Cusson), Blasendolde (V/2 1080) — Cónium L., Schierling (V/2 1081) — Gráfia Rchb. (= Hladníkia Koch), Kerndolde (V/2 1087) — Pleurospérmum Hoffm., Rippensame (V/2 1089) — Cáchrys L. (V/2 950) — Prángos Lindl. (V/2 1093) — Apiástrum Nutt. — Smyrniópsis Boiss. — Musíneum Raf. (V/2 950). — Velaéa DC. (V/2 950) — Hesperogénia C. et R. — Arracácia Bancroft (V/2 943, 950) — Magýdaris Koch (V/2 950).

e) Tribus Ammineae (V/2 951).



Fig. 1235. Selinum Carvifolia L. (V/2, 1296) im nichtblühenden Zustand. Phot. Dr. Emil Schmid, München.

Bupleúrum L., Hasenohr (V/2 1094) — Trínia Hoffm., Faserschirm (V/2 1131) — Cumínum L., Kreuzkümmel (V/2 1138) — Ápium L. (= Helosciádium Koch), Sellerie, Eppich (V/2 1140) — Petroselínum Hill, Petersilie (V/2 1154) — Ridólfia Moris (V/2 1161) — Síson L., Würzsilie (V/2 1162) — Cicúta L., Wasserschierling (V/2 1164) — Trachyspérmum Link (V/2 1167) — Cryptotænia DC., Rispendolde (V/2 1169) — Ámmi L., Knorpelmöhre (V/2 1170) — Ptychótis Koch, Faltenohr (V/2 1173) — Ammoídes Adanson, Haardolde (V/2 1175) — Falcária Bernh., Sichelmöhre (V/2 1176) — Hladníkia Rchb., Hladnikie (V/2 1180) — Cárum L., Kümmel (V/2 1181) — Búnium L., Erdknollen (V/2 1191) — Conopódium Koch (V/2 1195) — Pimpinélla L., Bibernelle, Bockspeterlein (V/2 1197) — Aegopódium L., Geissfuss (V/2 1212) — Síum L., Merk (V/2 1216) — Lichtensteínia Cham. et Schlecht. (V/2 951) — Ruthéa Bolle (V/2 951) — Heteromórpha Cham. et Schlecht. — Nirarothámnus Balf. (V/2 951) — Rhyticárpus Sond. — Buniotrínia Stapf et Wettst. — Szovítsia Fisch. et Mey. — Anisópoda Bak. — Ammoselínum Torr. et Gray (V/2 951) — Zízia Koch — Olivéria Vent. — Pituránthus Viv. — Murétia Boiss. — Korshínskia Lipsky — Eúlophus Nutt. — Cryptotaeniópsis Dunn (V/2 951) — Críthmum L., Meerfenchel (V/2 1225) — Séseli L. (inkl. Libanótis Böhmer), Bergfenchel (V/2 1226) — Oenánthe L. (inkl. Phellándrium L.), Rebendolde (V/2 1249) — Aethúsa L., Hundspetersilie, Gleisse (V/2 1272) — Athamánta L., Augenwurz (V/2 1276) — Foenículum Miller, Fenchel (V/2 1284; VII Fig. 1234) — Anéthum L., Dill (V/2 1290) — Sílaum Miller (= Sílaus Bernh.), Wiesensilge (V/2 1295) — Gasparrínia Bertol. (V/2 1928) — Trochiscánthes Koch, Rädchenblüte (V/2 1299) — Méum Miller, Bärwurz (V/2 1300) — Cnídium Cusson, Brenndolde (V/2 1304) — Selínum L., Silge (V/2 1310; VII Fig. 1235) — Ligústicum L. (inkl. Pachypleúrum Ledeb., = Neogaýa Meissner), Liebstock, Mutterwurz (V/2 1314) — Cenolóphium Koch, Hohlrippe (V/2 1326) — Discopleúra DC. (V/2 951) — Cynosciádium DC. — Polemánnia Eckl. et Zey. — Pichléria Stapf et Wettst. (V/2 951) — Todároa Part. — Diplolóphium Turcz. — Physotríchia Hiern. (V/2 951) — Polýzygus Dalz. — Schúltzia Spr. — Xatárdia Meissn. — Kundmánnia Scop. — Córtia DC. — Oreóxis Raf. — Aciphýlla Forst., Speerkraut (V/2 951) — Annesorrhíza Cham. et Schlecht. (V/2 951).

f) Tribus Peucedáneae (V/2 951).

Conioselínum[1]) Fischer, Schierlingssilge (V/2 1328) — Angélica L. (inkl. Archan-

[1]) **Conioselínum vaginátum** (Sprengel) Thellung (V/2 1329) ist nunmehr auch von der Koralpe (Nordseite des Seekars, 1900 m) in Steiermark bekannt geworden.

gélica Hoffm. und Ostéricum [Hoffm.] Maxim.), Brustwurz (V/2 1331) — Levísticum Hill, Liebstöckel (V/2 1349) — Agasýllis Hoffm. (V/2 951) — Phellópterus Benth. et Hook. — Cymópterus Raf. — Colóptera Coulter et Rose — Prionosciádium S. Watson — Rhodosciádium S. Watson (V/2 951) — Capnophýllum Gaertner (V/2 1354) — Férula L., Steckenkraut (V/2 944, 1354) — Ferulágo Koch, Birkwurz (V/2 1357) — Opópanax Koch, Gummiwurz (V/2 1359) — Peucédanum L. (inkl. Imperatória L., Thysselínum Hoffm., Ostrúthium Link, Tomasínia Bertol.), Haarstrang (V/2 1363) — Pastináca L., Pastinak (V/2 1404) — Diplotænia Boiss. (V/2 951) — Johrénia DC. — Ducrósia Boiss. — Polytænia DC. — Myrrhidéndron Coulter et Rose — Tiedemánnia DC. — Cymbocárpum Boiss. — Doréma Don (V/2 945) — Leptotænia Nutt. (V/2 951) — Symphyolóma C. A. Mey. (V/2 951) — Lomátium Raf. — Heracleum L., Bärenklau (V/2 1416) — Zosímia Hoffm. (V/2 1456) — Tordýlium L., Zirmet, Drehkraut (V/2 1457) — Malabaíla Hoffm. (V/2 951) — Trigonosciádium Boiss. Páppea Sond. et Harv.

g) Tribus Laserpitieae (V/2 951).

Láser Borkh. (= Síler Ludwig), Rosskümmel (V/2 1464) — Margótia Boiss. (V/2 951) Flaeoselíum Koch (V 2 951) — Síler Miller, Bergkümmel (V/2 1467) — Laserpítium L., Laserkraut (V/2 1472) — Thápsia L., Purgierdolde (V/2 1500) — Guillónea Coss. (V/2 951) — Fornahénia Parl. (V/2 951) — Polylóphium Boiss. (V/2 951) — Melanoselínum Hoffm.

h) Tribus Daúceae (V/2 951).

Daúcus L., Möhre, Gelbe Rübe (V/2 1501; VII 125) — Exoacántha Labill. (V/2 951) — Artédia L. — Ammodaúcus Coss. et DC. (V/2 951).

III. Familie: **Cornáceae.** Hornstrauchgewächse (V 2 1538).

Mastíxia Bl. (V/2 1538) — Curtísia Ait. (V/2 1539) — Toricéllia DC. — Griselínia Forst. — Helwíngia Willd. (V/2 1539) — Aucúba Thunb., Goldbaum (V/2 1539) — Melanophýlla Baker (V 2 1539) Kalíphora Hook. f. (V/2 1539) — Córnus L. (inkl. Chamaepericlýmenum, Benthámia Lindl. und Benthamídia Spach), Hornstrauch (V/2 1040) — Corókia Cunningh. (V/2 1539).

β) **Sympétalae** (= Monopéalae, = Camopétalae, = Corolliflórae). Verwachsenblumige Blattkeimer (V/3 1567; VII Fig. 1043). Gegensatz von Archichlamydeae S. 165.

1. Reihe **Diapensiáles.**

I. Familie: **Diapensiáceae** (V/3 1713).

Diapénsia L. (V/3 1713) — Pyxidanthéra Michx. — Shórtia Torr. et Gray — Schizócodon Sieb. et Zucc. — Gálax L. (atlantisches Nordamerika) — Berneúxia Decsne.

2. Reihe **Ericáles** [= Bicórnes]. Heidegewächse (V/3 1713).

I. Familie **Clethráceae** mit der Gattung Cléthra[1]) L., Scheineller (V/3 1713 und VII Fig. 1236).

II. Familie: **Piroláceae.** Wintergrüngewächse (V/3 1568).

Pírola (Pýrola) L. (inkl. Monéses Salisb. und Ramíschia Opiz), Wintergrün (V/3 1571; VII Fig. 1024) — Chimáphila Pursh, Winterlieb (V/3 1593) — Allótropa Torr. et Gray (westl. Nordamerika) — Monótropa L., Ohnblatt (V/3 1596; VII Fig. 1012) — Pteróspora Nutt. (Nordamerika) — Wirtgénia (Malakka) — Sarcódes Torr. (westl. Nordamerika) — Monótropis Schwein. (= Schweinítzia Ell.) (V/3 1569) — Pleuricóspora Gray (Kalifornien).

III. Familie: **Empetráceae.** Krähenbeergewächse (V/3 1602).

Coréma Don (V/3 1602) — Ceratíola Michx. (V/3 1603) — Empetrum L., Krähenbeere (V/3 1602; VII Fig. 1072).

IV Familie: **Ericáceae** (= Vacciniáceae). Heidekrautgewächse (V/3 1609).

1. Unterfamilie: Rhododendroideae (V/3 1610).

Elliótia Muehl. (V/3 1610) — Tripetaleía Sieb. et Zucc. — Cladothámnus Bong. — Befária Mutis (V/3 1610) — Lédum L.[2]), Porst (V/3 1623) — Rhododéndron L. (inkl. Azálea L. und Azaleástrum Planch.), Alpenrose (V/3 1627) — Bíltia Small (V/3 1610) — Menziésia Sm. (V/3 1610) — Tsusiophýllum Maxim. (V/3 1610) — Ledothámnus Meissn. (V/3 1610) — Leiophýllum Pers. — Loiseleúria Desv., Alpenheide (V/3 1647) — Diplárche Hook. et Th. (V/3 1610) — Rhodothámnus Rchb., Zwerg-Alpenrose, Radrose (V/3 1644) — Kálmia L.[3]), Lorbeerrose (V/3

[1]) **Cléthra alnifólia** L., Pfefferbusch, Scheineller, ist bei Höpkensruh (Bremen) seit langer Zeit verwildert.

[2]) **Lédum palústre** L. wurde von Apotheker Woynar aus Rattenberg vor mehr als 50 Jahren in einem Moor nächst dem Krummsee bei Kramsach (Unterinntal) angepflanzt; hat sich dort bis heute (1929) in kräftigen Sträuchern erhalten (Mitteil. von Hermann Handel-Mazzetti, Innsbruck).

[3]) **Kálmia angustifólia** L. (V/3 1620) ist neuerdings (1927) von Heinr. Kruse in Huxfeld in Han-

1620) — Kalmiélla Small (V/3 1640) — Phyllódoce Salisb. (V/3 1621) — Bryánthus Stell. (V/3 1610) — Dabœcia Don, Kriechheide (V/3 1620).

2. Unterfamilie: Arbutoideae (V/3 1610).

Enkyánthus Lour. (V/3 1610, 1621) — Cassíope Don, Zypressenheide mit Harrimanélla Cov. und Arctérica Cov. (V/3 1610, 1621) — Andrómeda L., Rosmarinheide (V/3 1651) — Leucóthoë Don, Lorbeerkrüglein (V/3 1610) — Lyónia Nutt. — Agaúria DC. (trop. Afrika) — Oxydéndron DC., Sauerbaum (V/3 1622) — Orphanidésia Boiss. (V/3 1610) — Epigæa L., Pinselstrauch — Gaulthéria[1]) L., Wintergrünstrauch (V/3 1621) — Diplycósia Bl. (V/3 1621) — Pernéttya Gaud., Myrtenkrüglein (V/3 1161, 1621) — Pernettyópsis (V/3 1611) — Chiógenes Salisb. (V/3 1611) — Wittsteínia F. v. Muell. (V/3 1611) — Árbutus (nicht Arbútu!) L., Erdbeerbaum (V/3 1664) — Arctostáphylos Adans. (inkl. Arctóus Gray), Bärentraube (V/3 1656).

3. Unterfamilie: Vaccinioideae (V/3 1611).

Rigiolépis Hook. f. (V/3 1611) — Gaylussácia H. B. et Kth. (V/3 1611, 1622) — Vaccínium L., Heidelbeere (V/3 1667; VII Fig. 1150) — Oxycóccus Hill, Moosbeere (V/3 1685) — Calanthéra F. v. Muell. (V/3 1611) — Corallobótrys Hook. f. (V/3 1611) — Disterígma Klotzsch — Pentapterýgium Klotzsch — Agapétes Don — Páphia Seem. — Sphyrospérmum Pöpp. et Endl. — Sophoclésia Klotzsch — Oreánthes Benth. — Macleánia Hook. — Anthópterus Hook. — Notopóra Hook. f. — Finedlaýa Hook. — Cavendíshia Lindl. — Psammísia Klotzsch — Hornemánia Vahl — Thibaúdia H. B. et Kth. (trop. Amerika) usw.

4. Unterfamilie: Ericoideae (V/3 1611).

Callúna Salisb., Besenheide, Heidekraut (V/3 1689) — Eríca L., Glockenheide (V/3 1700) — Macnábia Benth. (V/3 1611) — Bruckenthália Rchb. (V/3 1622) — Philíppia Klotzsch — Ericinélla Klotzsch — Bláeria L. — Erémia Don (V/3 1611) — Simóchilus Benth. et Hook. — Sympiéza Lichtst. — Scyphogýne Brogn. — Codonostígma Klotzsch (V/3 1611) — Salácis Salisb. (Kap).

V. Familie: **Epacridáceae.** Australheidengewächse (V/3 1712).

Lebetánthus Endl. (V/3 1712) — Sprengélia Sm. — Épacris Cav., Bergschöne, Felsbusch (V/3 1713) — Styphélia Sol., Heidebart (Australien).

Fig. 1236. Clethra arborea Ait., von Madeira (s. Bd. V/3, 1713). *a* Blühender Sproß. *b* Blüte (aufgeschnitten).

3. Reihe **Primuláles** (V/3 1713).

I. Familie: **Theophrastáceae** (V/3 1714).

Theophrásta Lindl. (V/3 1714) in Westindien — Neomézia Votsch (Cuba) — Deheraínia Decne. (Mexiko) — Clavíja Ruiz et Pav. (trop. Amerika) — Jacquínia L. (trop. Amerika).

II. Familie: **Myrsináceae** (V/3 1714).

Mæsa Forsk. — Aegíceras Gaertn., Ziegenhorn — Ardísia Swartz, Spitzblume (V/3 1714) — Embélia Burm. (palaeotropisch) — Myrsíne L., Trugmyrte (V/3 1714) — Rapánea Aubl. (Tropen).

III. Familie: **Primuláceae** (= Anagallidáceae). Schlüsselblumengewächse (V/3 1715).

a) Tribus Androsáceae (V/3 1728).

Prímula L., Schlüsselblume, Primel (V/3 1716—1733) — Dionýsia Fenzl (V/3 1728) — Gregória Duby (= Arétia Gaud., = Douglásia Lindl.), Goldprimel (V/3 1787) — Stimpsónia Wright (China, Japan) — Androsace L.[2]) (inkl. Arétia L.), Mannsschild (V/3 1717, 1789;

---

nover in der Nähe von Bremen in den Moorgebieten zwischen Lilienthal, Fischerhude und Tarmstedt entdeckt worden. Die Art dürfte dort seit etwa 70 Jahren eingebürgert sein.

[1]) **Gaulthéria Shállon** Pursh und **G. procúmbens** L. sind bei Bremen (Oberneulander-Strasse) seit längerer Zeit verwildert.

[2]) **Androsace Wulfeniána** Sieber (V/3 1797) wird für Südtirol angezweifelt. — **A. Hausmánnii** Leyb. hat Dr. H. Paul 1929 in den Berchtesgadener Alpen (Wimbachtal) als neu für Deutschland nachgewiesen, Dr. Lechner 1928 für Salzburg in den Loferer Steinbergen (Waidringer Nieder). — **A. alpína** (L.) Lam. wird vom Trittkopf am Arlberg erwähnt. — **A. Tirolénsis** F. Wettstein (V/3 1802) muss an ihrem locus unicus et classicus als zugrunde gegangen betrachtet werden (Herm. Handel-Mazzetti, 1929). — **Androsace láctea** L. ist von Joh. Schwimmer für Vorarlberg (Winterstaude im Bregenzerwald) festgestellt worden.

VII Fig. 1123) — Cortúsa L., Glöckel (V/3 1816) — Ardisiandra Hook (V/3 1728) — Soldanella L., Alpenglöckchen, Troddelblume (V/3 1820) — Pomatósace Maxim. (V/3 1728) — Bryocárpum Hook. et Thoms. (V/3 1728) — Hottónia L., Wasserfeder (V/3 1832) — Dodecátheon L., Götterblume (V/3 1728).

b) Tribus Cyclamineae (V/3 1728).

Cyclámen L., Alpenveilchen, Erdscheibe (V/3 1736, 1836).

c) Tribus Lysimachieae (V/3 1728).

Lysimáchia L. (inkl. Steironéma Rafin. und Naumbúrgia Moench), Gilbweiderich, Friedlos (V/3 1850) — Trientális L., Siebenstern (V/3 1861) — Asterolínum Hoffmans. et Link, Stern-Lein (V/3 1729) — Pelletiéra A. St. Hilaire (V/3 1729) — Glaúx L., Milchkraut (V/3 1865) — Anagállis (Tournef.) L., Gauchheil (V/3 1868) — Centúnculus L., Kleinling (V/3 1873) — Sámolus L., Bunge (V/3 1875; VII Fig. 1127).

d) Tribus Corideae mit der Gattung Córis (Tournef.) L., Stachelträubchen (V/3 1728).

4. Reihe **Plumbagináles** (V/3 1877).

Familie: **Plumbaginaceae.** Strandnelken- oder Bleiwurzgewächse (V/3 1877).

Plumbágo L., Bleiwurz, Zahnwurz (V/3 1878 und VII Fig. 1237) — Ceratostígma Bunge, Hornnarbe (V/3 1879) — Acantholímon Boiss., Igelpolster — Limónium Mill. (inkl. Goniolímon Boiss., = Státice L. em. Willd. non Miller), Widerstoss. Strandflieder (V/3 1879) — Státice L. p. p. (= Arméria Willd.), Grasnelke, Strandnelke (V/3 1885; VII Fig. 1020).

5. Reihe **Ebenáles** [= Diospyráles]. (V/3 1895).

I. Familie: **Sapotáceae.** Breiapfelgewächse (V/3 1895).

Payéna A. DC. (V/3 1895) — Paláquium Blanco (V/3 1895) — Illípe König (= Bássia) — Diploknéma Pierre — Omphalocárpum Pal. Beauv. (Westafrika) — Áchras L. (= Sapóta Plum.), Breiapfel (V/3 1896) — Blutyrospérmum Kotschy (V/3 1896) — Vitellária Gaertn. (trop. Amerika) — Dipholis DC. — Bumélia Sw., Eisenholz — Argánia Roem. et Schult. (V/3 1896) — Chrysophýllum L. — Pradósia Liais — Mímusops L.

II. Familie: **Hoplestigmataceae** mit der Gattung Hoplestígma Gilg im tropischen Westafrika.

III. Familie: **Ebenaceae.** Ebenholzgewächse (V/3 1897).

Royéna L. (Südafrika) — Eúclea L. (Afrika) — Mába J. R. et G. Forster — Diospýros Dalech., Dattelpflaume (V/3 1898) — Tétraclis Hiern (V/3 1897) — Brachynéma Benth.

IV. Familie: **Diclidantheraceae** mit der Gattung Diclidanthéra Gilg in Brasilien.

V. Familie: **Symplocaceae** mit der Gattung Sýmplocus L., Rechenblume (V/3 1900).

VI. Familie: **Styracaceae.** Styraxgewächse (V/3 1900).

Pamphília Mart. — Stýrax L., Storaxbaum (V/3 1900) — Bruínsmia — Alniphýllum Matsumura (Ostasien) — Halésia Ellis, Silberglocke — Pterostýrax Sieb. et Zucc., Flügelstorax (V/3 1901).

VII. Familie: **Lissocarpaceae** mit der Gattung Lissocárpa Benth. in Nordbrasilien.

Fig. 1237. Plumbago Capensis Thunb. (V/3, 1878). Blühender Sproß.

6. Reihe **Contórtae.** Drehblütler (V/3 1901).

I. Familie: **Oleaceae.** Ölbaumgewächse (V/3 1901).

1. Unterfamilie: Oleoideae (V/3 1903).

Fráxinus L., Esche (V/3 1919; VII Fig. 1088 und 1238) — Fontanésia Labill. (V/3 1903) — Forsýthia Vahl (V/3 1903) — Nathúsia Hochst. (= Schrebéra Roxb.) (V/3 1903) — Syringa L., Flieder (V/3 1908) — Phillýrea L., Stein- oder Lorbeerlinde (V/3 1917) — Osmánthus Lour., Duftblüte (V/3 1905) — Adélia P. Browne (= Forstiéra Poir.) — Mayepéa Aubl. in den Tropen (V/3 1902) — Chionánthus L., Schneeflockenbaum (V/3 1905) — Ólea L., Ölbaum (V/3 1934) — Ligústrum L., Liguster, Rainweide (V/3 1944).

2. Unterfamilie: Jasminoideae (V/3 1906).

Nyctánthes L. (V/3 1906) — Menodóra Humb. et Bonpl. (V/3 1906) — Jasmínum L., Echter Jasmin (V/3 1906; VII Fig. 1239).

II. Familie: **Desfontaineaceae** mit der andinen Gattung Desfontaínea Ruiz et Pav.

III. Familie: **Loganiaceae.** Strychnosgewächse (V/3 1949).

Gelsémium Juss., Dufttrichter (V/3 1951) — Logánia R. Br. (Australien, Neu-Seeland) — Spigélia L. (V/3 1651) — Strýchnos L. (V/3 1950) — Fagræa Thunb. (Ostindien, Ozeanien) — Buddleía L., Ährenglöckchen (V/3 1952).

IV. Familie: **Gentianaceae.** Enziangewächse (V/3 1953).

1. Unterfamilie: Gentianoideae (V/3 1954).



Fig. 1238. Fraxinus Ornus L. (V/3, 1922), Manna- od. Blüten-Esche, in Ungarn. Phot. Dr. Antal Pénzes.

Éxacum L. (V/3 1954) — Cotylanthéra Bl. (V/3 1954) — Sebæa R. Br. (V/3 1954, 1956) — Micrócala Link et Hoffmannsegg (= Cicéndia Adans.), Zindelkraut (V/3 1954, 1956) — Sabbátia Adans. (in Nordamerika) (V/3 1956) — Blackstónia Hudson (= Chlóra L.), Bitterling (V/3 1956) — Centaúrium Hill (= Erythræa Nekker), Tausendgüldenkraut (V/3 1986; VII Fig. 1240) — Canscóra Lam. (V/3 1956) — Chirónia L. (V/3 1954, 1956) — Crawfúrdia Wallich (V/3 1954) — Gentiána Tournef., Enzian (V/3 1979) — Lomatogónium A. Br. (= Pleurogýna Eschscholz), Saumnarbe, Fransenkante (V/3 1976) — Swértia L., Tarant, Dorant (V/3 1973) — Halénia Borkh. (V/3 1956) — Lisiánthus L. (V/3 1956) — Táchia Aubl. (= Myrmécia Schreb.) (V/3 1956) — Contoubéa Aubl. (V/3 1956) — Deianíra Cham. et Schlecht. (V/3 1956) — Hélia Mart. (V/3 1954) — Voýria Aubl. (V/3 1954).

2. Unterfamilie: Menyanthoídeae (V/3 1953).

Menyánthes L., Bitterklee (V/3 1957) — Nymphoídes Hill[1]) (= Limnánthemum S. G. Gmel.), Seekanne, Sumpfrose (V/3 1961) — Villársia Gmel. (V/3 1953) — Faúria Franch. (= Nephrophyllídium Gilg) (boreales Nordamerika, Japan) — Liparophýllum Hook. f. (V/3 1953).

V. Familie: **Apocynáceae.** Hundsgiftgewächse (V/3 2048).

1. Unterfamilie: Plumieroídeae (V/3 2084).

Lacméllia Karst. (V/3 2051) — Acocanthéra G. Don, Giftschön (V/3 2048, 2050) — Allamánda L. (V/3 2050, 2051) — Landólphia Pal. Beauv. (V/3 2049) — Clitándra Benth. (V/3 2049) — Willoughbýa Roxb. (V/3 2049) — Carpódinus R. Br. — Hancórnia Gomez (V/3 2049) — Coúma Aubl. (V/3 2051) — Plumiéra L. (V/3 2051) — Gonióma E. Mey. (G. Kamássi [Eckl.] E. Mey., Kap-Buchsbaum) — Alstónia R. Br. (V/3 2050) — Aspidospérma Mart. et Zucc. (V/3 2050) — Amsónia Walt. (Nordamerika, Japan) — Rhazýa Decne. (Arabien, Westasien) — Lochnéra Rchb. (V/3 2051) — Vínca L., Immergrün, Wintergrün (V/3 2051) — Geissospérmum Fr. Allem. (V/3 2050) — Tabernánthe Baill. (= Ibóga K. Schum.) — Tabernaemontána L. — Kópsia Bl. (V/3 2051) — Tanghínia Dupet. Thou. (V/3 2050) — Cérbera L. (V/3 2051). — Thevétia L. (Zentral- und Südamerika).

Fig. 1239. Jasminum fruticans L. (V/3, 1907). Blühender Zweig.

[1]) Der gültige Name für Nr. 2238 (V/3 1691) ist nach Alfred Becherer **Nymphoídes orbiculáta** Gilib.

2. Unterfamilie: Echitoideae (V/3 2048).

Paraméria Benth. (V/3 2050) — Urcéola Roxb. (V/3 2049) — Urechítes Müll.-Arg. (V/3 2050) — Echítes L. (V/3 2051) — Dipladénia DC. (V/3 2051) — Trachelospérmum Lem., Halssamen (V/3 2051) — Kíckxia Bl. (= Funtúnia) V/3 2049) — Mascarenhásia DC. (V/ 2049) — Beaumóntia Wall. (Ostindien bis Java) (V/3 2050) — Adénium Roem. et Schult. (V/3 2048) — Pachypódium Lindl. (V/3 2048) — Apocýnum L. (V/3 2049, 2050) — Poacýnum H. Baill. (V/3 2048) — Nérium L., Oleander (V/3 2056) — Strophánthus DC. (V/3 2049) — Parsónia R. Br. (V/3 2048) — Forsterónia G. F. W. Mey.

VI. Familie: **Asclepiadáceae.** Seidenpflanzen (V/3 2058).

1. Unterfamilie: Periplocoideae (V/3 2064).

Períploca L. (nicht Periplóca) (= Campelépis Falc.), Baumschlinge (V/3 2064) — Cryptostégia R. Br. (V/3 2063) — Cryptolépis R. Br. (V/3 2064).

2. Unterfamilie: Cynanchoideae (V/4 2064).

Solenostémma Hayne (V/3 2063) — Schizoglóssum E. Mey. (V/3 2064) — Gomphocárpus L. (V/3 2059/63/64) — Schizonótus A. Gr. — Stenostélma Schlecht. (V/3 2064) — Asclépias L., Seidenpflanze (V/3 2059) — Calotrópis R. Br. (V/3 2063) — Metapléxis R. Br. (Ostasien) — Diplolépis R. Br. (V/3 2059) — Vincetóxicum Moench (= Cynánchum L.), Schwalbenwurz (V/3 2067) — Sarcostémma R. Br. (V/3 2063) — Daémia R. Br. (V/3 2063) — Oxypétalum R. Br., Spitzkrönchen (V/3 2066) — Secamóne R. Br. (V/3 2066) — Brachystélma R. Br. (V/3 2064) — Leptadénia R. Br. (V/3 2063) — Ceropégia L., Leuchterblume (V/3 2066) — Freréa Dalz. — Echidnópsis Hook. f. (V/3 2067) — Hoódia Sweet (V/3 2067) — Carallúma R. Br. (V/3 2059) — Stapélia L., Aasblume (V/3 2066) — Heúrnia R. Br. (V/3 2067) — Gymnéma R. Br. (V/3 2063) — Sarcólobus R. Br. (V/3 2063) — Tylóphora R. Br. (V/3 2059) — Stephanótis Dup.-Thou. (V/3 2067) — Dischídia R. Br. (V/3 2059) — Hoýa Br., Wachsblume (V/3 2067) — Márdsénia R. Br. (V/3 2059/62) — Pergulária L. (V/3 2064) — Gonólobus Mich. (V/3 2059).



Fig. 1240. Centaurium vulgare Raf. (V/3, 1972). *a, b, c* Verschiedene Standortsformen. *d* Abgeblühtes Dichasium. *e* Blütenknospen. *f* Blüte (aufgeschnitten). *g, h* Staubbeutel. *i* Fruchtknoten. *k* Narbe. *l* Reife Kapsel. *m* Querschnitt durch dieselbe. *n* Samen. *o* Laubblatt.

7. Reihe **Tubiflórae.** Röhrenblütler (VI/1 175).

I. Familie: **Convolvuláceae.** Windengewächse (V/3 2073).

1. Unterfamilie: Convolvuloideae (V/3 2074).

Dichóndra Forst. (V/3 2075) — Nephrophýllum A. Rich. (V/3 2073) — Wilsónia R. Br. (V/3 2073) — Rapóna Baill. (V/3 2073) — Créssa L. (V/3 2075) — Evólvulus L. (V/3 2075) — Hildebrándtia Vatke (V/3 2073) — Legendréa Webb (V/3 2073) — Cardiochlámys Oliv. (V/3 2073) — Humbértia Lam. (V/3 2073) — Mína Llavé et Lex (V/3 2075) — Calonýction Choisy (V/3 2076) — Quámoclit Tournef. (Tropen) — Exogónium Choisy (V/3 2076) — Ipomœa L., Prunkwinde (V/3 2076) — Pharbítis Choisy (V/3 2077) — Operculína Silv. Manso (V/3 2077) — Convólvulus L. (inkl. Calystégia R. Br.), Winde (V/3 2078) — Polyméria L. (V/3 2073).

2. Unterfamilie: Cuscutoideae (V/3 2074).

Cuscúta L., Teufelszwirn, Seide (V/3 2089).

II. Familie: **Polemoniáceae.** Sperrkrautgewächse (V/3 2111).

Cobæa Cav. (V/3 2112) — Cántua Juss. (V/3 2114) — Phlóx L., Flammenblume (V/3

2112) — Collómia Nutt., Leimsaat (V/3 2117) — Gília Ruiz et Pav. (V/3 2113) — Polemónium L., Sperrkraut, Himmelsleiter (V/3 2114) — Bonplándia Cav. (Mexiko) (V/3 2114) — Loesélia L. (Amerika) — Navaréttia (V/3 2114).

III. Familie: **Fouquieráceae** (V/1 493).

IV. Familie: **Lennoáceae** (V/3 1568, 1611).

V. Familie: **Hydrophylláceae.** Wasserblattgewächse (V/3 2119).

Hydrophýllum L. (V/3 2119) — Nemóphila Nutt., Hainblume (V/3 2119, 2122) — Phacélia Juss., Büschelschön (V/3 2119; VII Fig. 989) — Romanzóffia Cham. (V/3 2119) — Eriodíction Benth. (V/3 2119) — Wigándia H. B. et Kth. (V/3 2122) — Hydroléa L., Wasserbläuling (V/3 2122).

VI. Familie: **Boragináceae** (= Asperfoliáceae). Rauhblattgewächse (V/3 2122).

1. Unterfamilie: Cordioídeae (V/3 2124).

Córdia L. (V/3 2124) — Patagónula L. — Auxémma Miers. (V/3 2124).

2. Unterfamilie: Ehretioídeae (V/3 2124).

3. Unterfamilie: Heliotropioídeae[1] *(V/3 2124).*

Heliotrópium L., Sonnenwende, Heliotrop (V/3 2130) — Cochránea Miers (V/3 2131) — Tournefórtia L. (V/3 2131).

4. Unterfamilie: Boraginoídeae (V/3 2124).

Eritríchium Schrader, Himmelsherold (V/3 2133) — Allocárya Greene[2]) (V/3 2127) — Plagiobótrys Fink. et Mey. (Pazifisches Nordamerika, Chile) — Amsínckia Lehm. (V/3 2127) — Asperúgo L., Scharfkraut (V/3 2136) — Láppula Moench (= Echinospérmum Swartz), Klettenkraut, Igelsame (V/3 2138) — Caccínia Savi (V/3 2127) — Omphalódes Moench, Gedenkemein, Nabelnuss (V/3 2142) — Cynoglóssum L., Hundszunge (V/3 2147) — Lindelófia Lehm. (V/3 2147) — Paracáryum Boiss., Vereinsnüsschen (V/3 2147) — Lithospérmum L., Steinsame (V/3 2153) — Myosótis L., Vergissmeinnicht (V/3 2159) — Móltkia Lehm. (V/3 2153) — Mertensia Roth (V/3 2128) — Macroméria Don, Gernegross (V/3 2128). — Arnébia Forsk. (V/3 2128) — Onósma L., Lotwurz (V/3 2177) — Cerínthe L., Wachsblume (V/3 2186) — Lobostémon Lehm., Schuppenfaden (V/3 2193) — Échium L., Natterkopf (V/3 2192) — Rochélia Rchb. (V/3 2128) — Trachystémon Don, Rauhling (V/3 2128) — Anchúsa L., Ochsenzunge

Fig. 1241. Thymus Serpyllum L., Thymian (Bd. V/4, 2308). Phot. W. Heller, Zürich.

Fig. 1242. Prunella laciniata L. (Bd. V/4, 2378). Phot. Julius Plankenhorn in Dettingen (Erms).

[1]) Die Unterfamilien Heliotropioídeae, Ehretioídeae und Cordioídeae stehen nach H. Svensson den Hydrophylláceae näher als den echten Boraginaceae und werden deshalb auch als besondere Familie **(Heliotropáceae)** behandelt.

[2]) **Allocárya Califórnica** (Fisch. et Meyer) Greene (V/3 2127) ist nach Blom als **Plagiobótrys calandrinioídes** (Phil.) Johnston aus Chile und Argentinien richtig zu stellen.

(V/3 2197) — Lycópsis L., Krummhals, Wolfsauge (V/3 2202) — Nónea[1]) Medikus (= Nónnea Rchb.), Mönchskraut, Napfkraut (V/3 2205) — Alkánna Tausch (V/3 2205) — Pulmonária L., Lungenkraut (V/3 2209) — Sýmphytum L., Wall- oder Beinwurz (V/3 2220) — Borágo L., Borretsch, Gurkenkraut (V/3 2230).

5. Unterfamilie: ***Wellstedioídeae*** mit der Gattung Wellstédia Balf. auf Sokotra und in Südwest-Afrika.

VII. Familie: **Verbenáceae.** Eisenkrautgewächse (V/3 2232).

Lantána L., Wandelblüte (V/3 2235) — Líppia L. (V/3 2233/35) — Verbéna L., Eisenkraut (V/3 2238) — Bouchéa Cham. (V/3 2234) — Stachytarphéta Vahl (V/3 2233/36) — Ubochéa Baill. (V/3 2233) — Petræa L. (V/3 2233) — Citharéxylum L. (V/3 2236) — Duránta L. (V/3 2236) — Acharitéa Benth. (V/3 2232) — Nesogénes DC. (nicht Neogénes) — Callicárpa L. (V/3 2236) — Aegíphila Jacq. (V/3 2234) — Tectóna L., Tiekbaum (V/3 2236) — Vítex L. (V/3 2237) — Gmelína L. (V/3 2234) — Faradaýa F. v. Muell. (V/3 2234) — Clerodéndron L., Loosbaum (V/3 2234) — Holmskióldia Retz. (V/3 2234) — Caryópteris Bunge (V/3 2238) — Varengevíllea Baill. (V/3 2232) — Avicénnia Lc. (V/3 2238).

VIII. Familie: **Labiátae.** Lippenblütler (V/4 2255).

1. Unterfamilie: ***Catopherioídeae*** mit der Gattung Catophéria Benth. (V/4 2267).

2. Unterfamilie: Ocimoídeae (V/4 2267).

Hýptis Jacq. (= Mesophærum P. Browne) (V/4 2267) — Ócimum L. (V/4 2267) — Basílicum Moench (= Moschósma Rchb.), Moschusduft (V/4 2270) — Orthosíphon Benth. (V/4 2270) — Plectránthus L'Hérit. (V/4 2270) — Cóleus Loureiro, Buntlippe (V/4 2271) — Perílla L. (V/4 2272) — Collinsónia L. (V/4 2272) — Elshóltzia Willd., Kamm-Minze (V/4 2272) — Pogostémon Desf. (V/4 2273) — Lavándula L., Lavendel (V/4 2274).



Fig. 1243. Catalpa bignonioides Walt., Trompetenbaum (VI/1, 175). Blühender Zweig.

3. Unterfamilie: Stachyoideae.

Saturéja L. (inkl. Calamíntha Moench, Micromèria Benth., Clinopódium L.), Bergminze (V/4 2279, 2548 Fig. 3380A) — Melíssa L., Melisse (V/4 2302) — Thýmus L., Thymian, Quendel (V/4 2306; VII Fig. 1241) — Oríganum L., Dost (V/4 2327) — Majorána Miller, Majoran (V/4 2332) — Amáracus Gleditsch (V/4 2333) — Méntha L., Minze (V/4 2335) — Préslia Opiz (V/4 2338) — Hyssópus L., Ysop (V/4 2357) — Dracocéphalum L., Drachenkopf (V/4 2360) — Lallemántia Fisch. et Mey. (V/4 2362) — Népeta L., Katzenminze (V/4 2367) — Agastáche Clayt. (V/4 2368) — Cedronélla Moench, Zitronenkraut (V/4 2368) — Brittonástrum Briquet (V/4 2368) — Glechóma L., Gundelrebe (V/4 2373) — Prunélla L., Braunelle (V/4 2377; VII Fig. 1242) — Cleónia L. (V/4 2378) — Lýcopus L., Wolfstrapp (V/4 2384) — Leonúrus L. (inkl. Chaitúrus Moench, Cardíaca Moench und Panzéria Moench), Wolfskraut (V/4 2389, 2549 Fig. 3380B) — Lagochílus Bunge (V/4 2390) — Marrúbium L., Andorn (V/4 2393) — Ballóta L., Schwarzer Andorn (V/3 2399) — Siderítis L., Gliedkraut (V/4 2402) — Stáchys

[1]) Nach Schinz-Keller, ebenso nach J. M. Johnston, muss die ursprüngliche Schreibweise von Medikus, also Nonea (und nicht Nonnea), angewendet werden.

Fig. 1244. Verbascum nigrum L. (VI/1, 11). Zweijährige, blühende Pflanze. Phot. Otto Ziegler, Zollikon (Schweiz).



Fig. 1245. Calceolaria-Hybride, Pantoffelblume. Blühende Pflanze.

Fig. 1246. Phygelius Capensis E. Mey., Sonnenfeind (VI/1, 6). Blühender Spross.



Fig. 1247. Veronica urticifolia Jacq. (= V. latifolia L. em. Scop.) (Siehe Bd. VI/1, 60). Phot. Dr. M. Lutz u. Dr. G. Hegi.



Fig. 1248. Pedicularis Sceptrum Carolinum L. (VI/1, 125), im Dachauermoor bei München. Phot. Dr. Emil Schmid, München.

L. (inkl. Betónica L.), Ziest, Betonie (V/4 2407) — Microtœa Prain (V/4 2273) — Phlómis L., Brandkraut (V/4 2435) — Eremóstachys Bunge, Einsamähre, Wüstenziest (V/4 2436) — Lámium L., Taubnessel (V/4 2438) — Wiedemánnia Fisch. et Mey. (V/4 2440) — Molucélla L., Trichtermelisse (V/4 2440) — Galeópsis L., Hanfnessel, Hohlzahn (V/4 2457) — Melíttis L., Immenblatt (V/4 2468) — Physostégia Benth., Blasenkelchling (V/4 2472) — Hormínum L., Drachenmaul (V/4 2472) — Sálvia L., Salbei (V/4 2475) — Meriándra Benth. (V/4 2506) — Perówskia Karel (V/4 2506) — Monárda L., Goldmelisse, Etagenblume (V/4 2506).

4. Unterfamilie: Scutellarioideae.

Scutellária L., Helmkraut (V/4 2508).

5. Unterfamilie: ***Prostantheroideae*** (V/4 2522) mit der Gattung Westríngia Sm. (V/4 2522).

6. Unterfamilie: ***Prasioideae*** (V/4 2522) mit der Gattung Prásium L. (V/4 2522).

7. Unterfamilie: Rosmarinoideae (V/4 2518).

Rosmarínus L., Rosmarin (V/4 2518).

8. Unterfamilie: Ajugoideae (V/4 2523).

Teúcrium L., Gamander (V/4 2522) — Ájuga L., Günsel (V/4 2537).

IX. Familie: **Nolanáceae.** Glockenwindengewächse (V/4 2625) — Nolána L. — Alóna Lindl. — Dólia Lindl.

X. Familie: **Solanáceae.** Nachtschattengewächse (V/4 2548; VII Fig. 1049).

Nicándra Adans., Giftbeere (V/4 2560) — Grabówskia Schlecht. (Südamerika) — Lýcium L., Bocksdorn (V/4 2562) — Iochróma Benth., Glanzbüschel (V/4 2554) — Átropa L. (= Belladónna Ludw.), Tollkirsche (V/4 2565) — Scopólia Jacq. (= Scopolína Schult.), Tollkraut (V/4 2569) — Przewálskia Maxim. (Tibet) — Hyoscýamus L., Bilsenkraut (V/4 2573) — Withánia Panq. (palaeotropisch) — Phýsalis L., Blasenkirsche (V/4 2579) — Saracha Ruiz et Pav. (V/4 2554) — Melisséa Hook. (V/4 2554) — Cápsicum L., Beissbeere (V/4 2556) — Solánum L., Nachtschatten (V/4 2582; VII Fig. 1049) — Cyphomándra Sendtner (V/4 2559) — Salpíchroa Miers (besonders im nichttropischen Südamerika) — — Mandrágora Juss., Alraunpflanze (V/4 2558) — Solándra Sw. (V/4 2555) — Datúra L., Stechapfel (V/4 2612; VII Fig. 1049) — Juanullóa Ruiz et Pav. (Peru, Zentralamerika) — Céstrum L. (= Habrothámnus Endl.), Hammerstrauch (V/4 2554) — Fabiána Ruiz et Pav. (V/4 2556) — Nicotiána L., Tabak (V/4 2616) — Petúnia Juss. (V/4 2554) — Nierembérgia Ruiz et Pav. (V/4 2555) — Salpiglóssis Ruiz et Pav., Trompetenzunge (V/4 2554) — Schizánthus Ruiz et Pav., Spaltblume (V/4 2555) — Duboísia R. Br. (V/4 2558) — Browállia L. (V/4 2555) — Brunfélsia Sw. (V/4 2555).

Fig. 1249 Paulownia tomentosa (Thunb.) Baill. (= P. imperalis Sieb. et Zucc), Blauglockenbaum (aus dem südlichen) Japan (VI/1, 5). Nach einem Aquarell von Therese Weber, München.

XI. Familie: **Scrophulariáceae.** Rachenblütler (VI/1 5).

1. Unterfamilie: Pseudosolanoideae (VI/1 5).

Verbáscum L., Königskerze, Wollkraut (VI/1 7; VI/2 1360; VII Fig. 1041, 1147, 1244) — Célsia L., Bartfaden (VI/1 5; VI/2 1360).

2. Unterfamilie: Antirrhinoideae (VI/1 5).

Alonsóa Ruiz et Pav. (VI/1 6) — Angelónia Humb. et Bonpl. (trop. Amerika) — Calceolária L., Pantoffelblume (VI/1 5/6; VI/2 1360; VII Fig. 1245) — Nemésia Vent. (VI/1 6) — Linária Miller inkl. Kickxia Dum. (= Elatinoídes Wettst., = Cymbalária Baumg. u. Chaenorrhínum Lange), Leinkraut (VI/1 20—29; VI/2 1360) — Antirrhínum L., Löwenmaul (VI/1 18) — Anarrhínum Desf., (= Simbuléta Forsk.), Lochschlund (VI/1 30; VI/2 1360) — Maurándia Ort. inkl. Lophospérmum Don (VI/1 6) — Rhodóchiton Zucc., Rosenkleid (Mexiko) — Phygélius E. Mey., Sonnenfeind (VI/1 6; VII Fig. 1246) — Russélia Jacq. (Mexiko, Chile) — Collínsia Nutt. (VI/1 5) — Scrophulária L., Braunwurz (VI/1 30; VI/2 1360) — Chelóne L., Schildblume, in Nordamerika (VI/1 6) — Pentastémon (= Pentstémon) Mitchell, Fünffaden (VI/1 6) — Tetranéma Benth., Vierfaden (Mexiko) — Paulównia Sieb. et Zucc., Blauglockenbaum (VI/1 5; VII Fig. 1269) — Manúlea L. (Südafrika) — Sutéra Roth (Mexiko) — Mímulus L., Gauklerblume (VI/1 36; VI/2 1360; VII Fig. 1109f) — Gratíola L., Gnadenkraut (VI/1 38; VI/2 1360) — Bácopa Aubl. (Tropen und Subtropen) — Limosélla L., Schlammkraut (VI/1 38; VI/2 1361) — Torénia L. (VI/1 6) — Lindérnia All. (= Vandéllia L.), Büchsenkraut (VI/1 39; VI/2 1361) — Hebenstreítia L. (VI/1 5) — Selágo L. (= Walafrída E. Mey.) (VI/1 5; VI/2 1360).

Fig. 1250. Pedicularis Sudetica Willd. (VI/1, 122), im Riesengebirge. Phot. Dr. Fr. Sauerbrei, Berlin-Mahlsdorf.

3. Unterfamilie: Rhinanthoideae.

Sibthórpia L. (Mittelmeergebiet, Nordafrika, Zentral- und Südamerika, Nepal) — Verónica L. inkl. Paederóta L., Ehrenpreis (VI/1 40; VI/2 1361) — Wulfénia Jacq., Kühtritt (VI/1 64) — Rehmánnia Libosch (VI/1 6; VI/2 1360) — Digitális L., Fingerhut (VI/1 66; VI/2 1362; VII Fig. 1121) — Erínus L., Leberbalsam (VI/1 70) — Tózzia L., Alpenrachen (VI/1 71) — Melampýrum L., Wachtelweizen (VI/1 72; VI/2 1362) — Bártschia L., Alpenhelm (VI/1 82; VI/2 1362) — Euphrásia L., Augentrost (VI/1 83; VI/2 1362) — Odontítes Gilib., Zahntrost (VI/1 100) — Parentucéllia Viv. (VI/1 5) — Trixágo Stev. (VI/1 5) — Alectorólophus All. (= Rhinánthus L. z. T., = Fistulária [L.] Wettstein), Klappertopf, Hahnenkamm (VI/1 102) — Pediculáris L., Läusekraut (VI/1 112; VI/2 1362; VII Fig. 1147, 1248 und 1250) — Lamouroúxia H. B. et Kth. (Zentral- und Südamerika) — Lathræa L., Schuppenwurz (VI/1 128).



Fig. 1251. Catalpa bignonioides Walt. (VI/1, 175). *a* Zweig mit jungen Früchten. *b* Aufgesprungene Kapsel. *c* Früchte.

XII. Familie: **Bignoniáceae.** Bignoniengewächse (VI/1 175).

Pithecocténium Mart., Affenkamm (Mexiko, Brasilien) — Phaedránthus Miers (VI/1 176) — Pyrostégia Presl (VI/1 176) — Oróxylum Vent. (indisch-malayisch) — Cámpsis Lour., Klettertrompete (VI/1 175) — Catálpa Juss., Trompetenbaum (VI/1 175; VII Fig. 1243, 1251) — Tecóma Juss. (Mexiko bis Westindien) (VI/1 173) — Incarvíllea Juss., Freilandgloxinie, Trompetenblume (VI/1 176) — Jacaránda Juss. (Westindien, Brasilien) — Eccremocárpus Ruiz et Pav. (VI/1 176) — Parmentiéra DC. (Mexiko, Panama) (VI/1 176) — Crescéntia L. (VI/1 176) — Kigélia DC. (VI/1 176).

XIII. Familie: **Pedaliáceae.** Sesamgewächse (VI/1 176).

Pedálium Royen (Ostindien, Ostafrika) — Harpagophýtum DC., Wollspinne (VI/1 176) — Sésamum L., Sesam (VI/1 176; VI/2 1363) — Pretréa J. Gay (Ostafrika).

XIV. Familie: **Martyniáceae.** Gemshorngewächse (VI/1 176).

Martýnia L. (= Carpóceras A. Rich.) in Mexiko (VII Fig. 1141) — Proboscídea Schmid (VI/1 176; VI/2 1363) — Craniolária L. (Südamerika).

XV. Familie: **Orobancháceae.** Sommerwurzgewächse (VI/1 132).

Phelipáea (Tournef) Desf. (von Mazedonien bis Kleinasien) — Aeginétia L. (Monsungebiet bis Japan) — Orobánche L., Sommerwurz, Würger (VI/1 132; VI/2 1362; VII Fig. 1028).

XVI. Familie: **Gesneriáceae.** Gesneriagewächse (VI/1 176).

Ramóndia (Ramónda) Rich. (VI/1 176) — Habérlea Frivaldsky — Saintpaúlia Wendl. (VI/1 177) — Roettléra Vahl (= Didymocárpus Wall.) — Streptocárpus Lindl., Drehfrucht (VI/1 177; VII Fig. 1052) — Trichósporum Don (= Aeschynánthus Jack.), Haarsame (VI/1 152) — Klúgia Schlecht. (VI/1 177) — Monophyllæa R. Br. (Sunda-Inseln) (VI/1 177) — Cyrtándra Forst. — Epíscia Mart., Schattenröhre (VI/1 177) — Crántzia Scop. (trop. Amerika) — Colúmnea L. (VI/1 177) — Achímenes P. Br., Schiefteller (VI/1 177) — Smithiántha O. Kuntze (= Naegélia Regel) (VI/1 177) — Kohléria Regel (= Isolóma [Benth.] Decne.), von Mexiko bis Bolivien — Corytholóma (Benth.) Decne. (VI/1 177) — Sinníngia Nees, Gloxinie (VI/1 176) — Gesnéria L. (= Gésnera hort), Westindien, Zentralamerika.

XVII. Familie: **Columelliáceae** mit der Gattung Columéllia Ruiz et Pav. (= Ulúxia Juss.).

XVIII. Familie **Lentibulariáceae.** Wasserhelmgewächse (VI/1 155).

Pinguícula L., Fettkraut (VI/1 155; VI/2 1363; VII Fig. 1042) — Genlísea St. Hil. (VI/1 155) — Polypómpholyx Lehm. (Tropen, Australien, Südamerika) — Utriculária L., Wasserschlauch (VI/1 162; VII Fig. 1042) — Biovulária Kam. (Westindien). Siehe auch Býblis (VII 179).

XIX. Familie: **Globulariáceae.** Kugelblumengewächse (VI/1 171).

Globulária L., Kugelblume (VI/1 172; VI/2 1363; VII Fig. 1037) — Lytánthus Wettstein (VI/1 171) — Cockbúrnia Balf. (VI/1 171).



Fig. 1252. Acanthus mollis L., Bärenklau (Bd. VI/1, 177). Phot. R. E. Pfenninger, München.

XX. Familie: **Acantháceae.** Akanthusgewächse (VI/1 177).

Thunbérgia L. (palaeotropisch) (VI/1 177) — Sanchézia Ruiz et Pav. (Brasilien, Peru, Columbien; VI/1 178) — Hemígraphis Nees, Halbgriffel (trop. Asien, China, Japan) — Strobilánthes Blume (= Goldfússia Nees p.), Zapfenblume (VI/1 178) — Ruéllia L. (Tropen, Subtropen) — Eránthemum L. (= Daedalacánthus T. And.), trop. Asien — Lankestéria Lindl. (trop. Afrika) — Barléria L. (meist palaeotropisch, wenige im trop. Amerika) (V/1 178) — Acánthus L., Bärenklau (VI/1 177, VII Fig. 1252) — Aphelándra R. Br., Ganzkölbchen (VI/1 177) — Geissoméria Lindl., Kurzdachklaue (trop. Amerika) — Chamaeránthemum Nees, Schönpfote (Brasilien) — Perístrophe Nees, Gürtelklaue (VI/1 178 — Schauéria Nees (Brasilien, Mexiko) — Fittónia E. Coem. (Peru) — Justícia L. (Tropen) (VI/1 178) — Jacobínia Moric. (trop. Amerika) (VI/1 178) — Belopérone Nees, Spornbüchschen.

XXI. Familie: **Myoporáceae** (VI/1 178).

Pholídia Baill. (Australien) — Bóntia L. (Westindien) — Myopórum Banks et Soland. — Zombiána Baill. (trop. Westafrika). — Óstia Adans. (Südafrika).

XXII. Familie: **Phrymáceae** (VI/1 178) mit der Gattung Phrýma L. (= Leptostáchya Mitch.).

8. Reihe **Plantagináles.** (VI/1 178).

Familie: **Plantagináceae.** Wegerichgewächse (VI/1 178).

Plantágo L., Wegerich, Wegetritt (VI/1 178; VI/2 1363; VII Fig. 1045, 1076, 1156) — Litorélla Bergius, Strandling (VI/1 194) — Bourguéria Decne. (VI/1 178).



Fig. 1253. Bouvardia hybrida (VI/1, 197). *a* Blühender Sproß. *b, c* Blüte von außen und im Längsschnitt.



Fig. 1254. Coffea Arabica L. (Bd. VI/1, 196). *a* Fruchtender und blühender Zweig. *b* Steinfrucht. *c* Querschnitt durch dieselbe. *d* Samen.



Fig. 1255. Symphoricarpus racemosus Michx. (VI/1, 234). Schneebeere, blühend und fruchtend. Nach einem Bild von Therese Weber, München.



Fig. 1256. Viburnum Opulus L. (VI/1, 243) und Viburnum Lantana L. (VI/1, 242) nebeneinanderwachsend, bei Starnberg (Oberbayern). Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.

9. Reihe **Rubiáles.**

I. Familie: **Rubiáceae.** Rötegewächse (VI/1 196; VII Fig. 983).

Oldenlándia Plum. (Tropen) VI/1 197) — Houstónia L. (VI/1 196) — Péntas Benth., Fünfling (trop. und subtrop. Afrika, Madagaskar) — Rondelétia Plum. (VI/1 197) — Cínchona L. (VI/1 196) — Ladenbérgia Klotzsch (trop. Amerika) — Bouvárdia Salisb., in Zentralamerika (VII Fig. 1253) — Manéttia Mut. (VI/1 197) — Lucúlia Sweet (VI/1 196) — Ouroupária Aubl. (= Uncária Schreb.) (VI/1 196) — Cephalánthus L., Kopfstrauch (VI/1 196) — Mussænda L. (palaeotropisch) — Rándia Houst. (Tropen) — Gardénia Ellis (VI/1 197) — Cóffea L., Kaffeestrauch (VI/1 196; VII Fig. 1254) — Pavétta L. (Tropen) — Jxora L. (Tropen) — Psychótria L. (Tropen) — Rudgéa Salisb. (Zentral- und Südamerika) — Uragóga L. (= Cephaélis Sw.) (VI/1 196) — Hydnophýtum Jack. (indisch-malayisch) — Myrmecódia Jack. (Indien bis Australien) — Seríssa Commerç. (China, Japan) — Nértera Banks et Soland., Korallenbeere (VI/1 197) — Sherárdia L., Ackerröte (VI/1 197; VI/2 1363) — Crucianélla L. inkl. Phuópsis Gris. (VI/1 197) — Aspérula L., Waldmeister (VI/1 198; VI/2 1363) — Gálium L., Labkraut (VI/1 207; VI/2 1363) — Vaillántia L. (Mittelmeergebiet) — Rúbia L., Färberröte (VI/1 231).

Fig. 1257. Lonicera caerulea L. (VI/1, 254), auf Urgestein in den Alpen. Phot. Walter Hirzel und Dr. G. Hegi.

Fig. 1258. Valeriana montana L. (Bd. VI/1, 272). Phot. Dr. Meta Lutz und Dr. G. Hegi.

II. Familie: **Caprifoliáceae.** Geissblattgewächse (VI/1 233).

Sambúcus[1]) L., Hollunder, Holler (VI/ 235) — Vibúrnum L., Schneeball (VI/1 241; VII 54, Fig. 1087 u. 1256) — Symphoricárpus Juss., Schneebeere (VI/1 234; VII Fig. 1087 und 1255) — Dipélta Maxim. (westl. China) — Linnæa Gronovius, Moosglöckchen (VI/1 245; VII Fig. 1034) — Abélia R. Br. (VI/1 235) — Lonicéra L., Geissblatt, Heckenkirsche (VI/1 249; VI/2 1363; VII Fig. 1257) — Diervílla L. im östlichen Nordamerika — Weigélia Thunb. in Ostasien (VI/1 235; VII 44, Fig. 1075) — Leycestéria Wall. (Himalaya, China).

III. Familie: **Adoxáceae.** Moschuskrautgewächse (VI/1 259).
Adóxa L., Moschuskraut (VI/1 260).

IV. Familie: **Valerianáceae.** Baldriangewächse (VI/1 261).

[1]) Die Gattung wird zuweilen zu einer eigenen Familie **Sambucáceae** erhoben.

Patrínia (VI/2 1367) — Nardostáchys DC. (Himalaya) — Triplostégia Wall. (VI/1 279) — Plectrítis DC. (Nordamerika, Chile) — Valerianélla Miller, Feldsalat (VI/1 262) — Fédia Moench, Schmalzkraut (VI/1 262) — Valeriána L., Baldrian (VI/1 267; VI/2 1364; VII Fig. 1258) — Kentránthus Necker, Spornblume (VI/1 277).

V. Familie: **Dipsacáceae** (= Scabiosáceae). Kardengewächse (VI/1 279).

Morína L., Kardendistel (VI/1 279, 280) — Cephalária Schrad., Schuppenkopf (VI/1 286) — Dípsacus L., Karde (VI/1 281) — Succísa Necker, Teufelsabbiss (VI/1 288) — Succisélla Beck, Sumpf-Abbiss (VI/1 289; VI/2 1364) — Knaútia L., Witwenblume (VI/1 290) — Pterocéphalus Vaill. (im Mittelmeergebiet, Indien, trop. Afrika) (VI/1 279) — Callistémma Mert. et Koch im östl. Mittelmeergebiet (VI/1 279) — Scabiósa L., Krätzkraut (VI/1 303; VI/2 1364) — Pycnócomon Hoffmsg. et Link (VI/1 279).

10. Reihe **Cucurbitáles.**

Familie: **Cucurbitáceae** (= Bryoniáceae). Kürbisgewächse (VI/1 311).

Alsomítra Roem. (Tropen) — Zanónia L. (Ostindien bis Neu-Guinea; VI 316) — Thladiántha Bunge, Quetsch-Gurke (VI/1 315, 316) — Melóthria L., Haarweibchen (wärmere Zonen) — Kedróstis Medic., Schnabelfrucht (Afrika, Ostindien) (VI/1 316) — Angúria Plum., Angurie (trop. Amerika) — Guránia Cogn. (trop. Amerika) — Dendrosícyos Balf. f. (Sokotra) — Telfaíria Hook., Taler-Kürbis (VI/1 315) — Acanthosícyos Welw., Naraspflanze (VI/1 315) — Momórdica L., Balsamapfel, Beissgurke (VI/1 315) — Lúffa L., Schwammkürbis (VI/1 314) — Bryónia L., Zaunrübe (VI/1 316) — Ecbállium A. Rich., Spritzgurke (VI/1 313) — Citrúllus Necker (VI/1 313, 316) — Cúcumis L., Gurke, Melone (VI/1 316, 319; VII Fig. 1058) — Brynópsis Arn. (VI/1 316) — Benincása Sav., Wachs-Gurke (VI/1 315) — Lagenária Ser., Flaschen-Kürbis (VI/1 314, 316) — Trichosánthes L., Haarblume (VI/1 315) — Cucúrbita L., Kürbis (VI/1 323) — Coccínia Wight et Arn. (trop. Asien und Afrika) — Echinocýstis Torr. et Gray (VI/2 1364) — Elatérium Jacq. (trop. Amerika) — Séchium P. Browne (VI/1 314) — Sícyos L., Haargurke, Stichling (VI/1 327) — Cyclanthéra Schrad., Kreismännchen (VI/1 313).



Fig. 1259. Campanula Sibirica L. (Bd. VI/1, 434), an den Oderabhängen bei Bellinchen (Brandenburg). Phot. Dr. Fr. Sauerbrei, Berlin-Mahlsdorf.

11. Reihe **Campanulátae** [= Synándrae] (VI/1 394; VI/2 1358).

I. Familie: **Campanuláceae.** Glockenblumengewächse (VI/1 328).

Campánula L., Glockenblume (VI/1 330; VI/2 Fig. 963 und Seite 1364; VII Fig. 1035 und 1259) — Symphyándra DC., Männerbundglocke (VI/1 329) — Adenóphora Fisch., Drüsenglocke (VI/1 365; VII Fig. 1260) — Legoúsia Durande (= Legoúzia Delarbre, = Specularia DC.), Frauen- oder Venusspiegel (VI/1 366) — Asyneúma Grisebach et Schenk, Trauben-Rapunzel (VI/1 368) — Michaúxia L'Hér. (VI/1 329) — Ostrówskia Regel (VI/1 329) — Trachélium L., Halskraut (VI/1 329) — Phyteúma L.[1]), Rapunzel, Teufelskralle (VI/1 369; VI/2 1364; VII Fig. 1035) — Canarína L., Kanarienglocke (VI/1 329) — Codonópsis Wall., Windenglocke (VI/1 329) — Cyanánthus Wall., Blaublume (VI/1 329) — Roélla L. (VI/1 329) — Wahlenbérgia Schrad., Moorglocke (VI/1 388; VI/2 1364) — Edraiánthus A. DC., Becherglocke, Krugglocke (VI/1 389)

[1]) **Phyteúma Siebéri** Spreng. (VI/1 380) ist kürzlich von G. Gentner bei der Erfurter Hütte im Achenseegebiet (Nordtirol) als neu für die nördlichen Kalkalpen nachgewiesen worden.

— Jasióne L., Sandglöckchen, Schafrapunzel (VI/I 390) — Platýcodon L., Breitglocke (Ostasien) — Músschia Dumort. (VI/1 328) — Sphenóclea Gaertn. (Tropen) — Cýphia Berg. (VI/1 328).

II. Familie: **Lobeliáceae.** Lobeliengewächse (VI/1 391).

Centropógon Presl, Stachelbart (trop. Südamerika) — Siphocámpylos Pohl, Krummröhre (VI/1 392) — Lobélia L., Lobelie (VI/1 392) — Monópsis Salisb. (Südafrika, Abessinien) — Heterótoma Zucc. (VI/1 392) — Lauréntia Neck. (Mittelmeergebiet, Südafrika, Nordamerika) (VI/1 392) — Isótoma Lindl., Gleichzipfel (Australien, Westindien) (VI/2 392).

III. Familie: **Goodeniáceae** (VI/2 1359).

IV. Familie: **Brunoniáceae** (VI/2 1359).

V. Familie: **Stylidiáceae** (= Candolleáceae) (VI/2 1359).

VI. Familie: **Calyceráceae** (VI/2 1359).

VII. Familie: **Compósitae.** Korbblütler (VI/1 394; VI/2 1358).

a) Tribus Vernonieae (VI/1 407).

Vernónia Schreb. (VI/1 407) — Stokésia L., Herbst-Kornblume (VI/1 408) — Elephántopus L., Elefantenfuss (VI/1 408).

b) Tribus Eupatorieae (VI/1 400, 408).

Agerátum L., Leberbalsam (VI/1 408; VI/2 1365) — Stévia Cav. (VI/1 408) — Eupatórium L. (inkl. Hebeclínium DC.), Wasserdost (VI/1 401). — Mikánia Willd. (VI/1 408; VI/2 728) — Liátris Schreb. (= Laciniária Hill), Zipfelkraut, Prachtscharte (VI/1 408).

c) Tribus Astéreae (VI/1 400, 448).

Grindélia Willd. (VI/1 448) — Gutierrézia Lag. (VI/1 449) — Chrysópsis Nutt. (VI/1 448) — Solidágo L. (inkl. Euthámia Nutt.), Goldrute (VI/1 409; VI/2 1365) — Myriáctis Less. (VI/1 448) — Brachycóme Cass., Kurzschopf (VI/1 449) — Béllis L., Gänseblümchen (VI/1 414) — Calótis R. Br. (VI/1 448; VI/2 1365) — Béllium L. (VI/1 448) — Boltónia Hérit. (VI/1 448, 449) — Townséndia Hook. (VI/1 449) — Callistéphus Cass., Sommer-Aster, Schönkranz (VI/1 448; VI/2 1355 Fig. 959) — Áster L. (inkl. Galatélla Cass., Tripólium Nees, Machaeranthéra Nees und Bellidiástrum Micheli), Sternblume (VI/1 416; VI/2 1365, 1357 Fig. 962) — Erígeron L., Berufskraut (VI/1 435; VI/2 1365) — Stenáctis Cass., Schmalstrahl (VI/1 447; VI/2 1365) — Vittadínia A. Rich. (VI/1 449; VI/2 1365) — Commidéndron DC. (VI/1 448) — Melanodéndron DC. (VI/1 448) — Hinterhubéra Schultz.-Bip. (VI/1 448) — Diplostéphium H. B. et Kth. (VI/1 448) — Oléaria Moench (= Eurýbia Cass.), Duftstrauch (VI/1 449) — Sommerféldtia Less. (VI/1 448) — Felícia Cass. (VI/1 448, 449; VI/2 1365) — Haástia Hook. (VI/1 395, 448) — Chrysócoma L., Goldhaar (VI/1 448; VI/2 1365) — Báccharis L. (VI/1 448).

Fig. 1260. Adenophora liliifolia (L.) Fischer (Bd. VI/1, 365), im Kreis Ortelsburg (Ostpreussen). Phot. Dr. Fr. Markgraf, Berlin.

d) Tribus Inúleae (IV/1 400, 494).

Brachyläena R. Br. (Südafrika) — Tarchonánthus L. (VI/2 495) — Blúmea DC. (trop. Afrika, Asien, Australien) — Plúchea Cass. (Wärmere Zonen) — Mícropus L. (= Gnaphalódes Adans.), Falzblume (VI/1 449) — Évax Gaertn. (Mittelmeergebiet, Nordamerika) — Filágo L., Fadenkraut, Schimmelkraut (VI/1 450) — Stuartína Sonder[1]) — Antennária Gaertn., Katzenpfötchen (VI/1 455) — Leontopódium Cass., Edelweiss (VI/ 458; VI/2 1365) — Anáphalis DC., Perlkörbchen (VI/1 494) — Gnaphálium L., Ruhrkraut (VI/1 462; VI/2 1365) — Raoúlia Hook f. (VI/1 395) — Phágnalon Cass. (Mittelmeergebiet bis Tibet und Himalaya) — Phaenócoma Don, Glanzschopf (VI/1 495) — Helípterum DC. inkl. Roccárdia Necker (VI/1 495; VI/2 1366) —

[1]) **Stuartína Muelléri** Sonder, aus Süd-Australien, wurde von Bonte 1922 bei Kettwig (Ruhrgebiet) festgestellt.

Fig. 1261. Inula graveolens (L.) Desf. f. pumila Fr. Zimmermann u. Thellung (VI/1, 474).

Fig. 1263. Santolina Chamaecyparissus L. (Bd. VI/1, 673). *a* Habitus. *b* Junges Blatt (vergrößert). *c* Köpfchen. *d* Hüllblatt.

Fig. 1262. Buphthalmum salicifolium L. (Bd. VI/1, 490), im Isartal bei München. Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.

Fig. 1264. Adenostyles tomentosa (Villars) Schinz et Thell. (Bd. VI/1. 490), beim Fornogletscher (Oberengadin), 2000 m. Phot. Walter Hirzel und Dr. G. Hegi.

Ixiolaëna Benth. (VI/2 1366) — Helichrysum Gaertner, Strohblume (VI/1 469) — Waitzia Wendl. (VI/1 495) — Ammóbium R. Br. (VI/1 495) — Calocephalus R. Br. (VI/1 495) — Craspédia Forster[1]) — Podolépis Labill., Stielschuppe (VI/1 495) — Inula L., Alant (VI/1 473; VI/2 1365/66; VII Fig. 1261) — Pulicária Gaertner, Flohkraut (VI/1 487) — Carpésium L., Kragenblume (VI/1 489) — Buphthálmum L., Ochsenauge (VI/1 490; VI/2 1366; VII Fig. 1262) — Telékia Baumgarten (VI/1 492) — Odontospérmum Necker (= Asteríscus Moench) (VI/1 396, 495).

e) Tribus Heliántheae (VI/1 400, 527).

Acanthospérmum Schrank[2]), im tropischen Amerika — Sílphium L., Kompasspflanze (VI/1 495) — Lindheiméra A. Gray et Engelm. (VI/1 528) — Parthénium L., Guayule (VI/1 533) — Íva L. (VI/1 533) — Ambrósia L.[3]) (= Heimiambrósia Delp.), Ambrosie (VI/1 496) Xánthium L., Spitzklette (VI/1 498) — Zínnia L. (= Crassína Scop.) (VI/1 527; VI/2 1366) — Sanvitália Lam. (VI/1 528; VI/2 1353 Fig. 956) — Heliópsis Pers., Sonnenauge (VI/1 528) — Siegesbéckia L. (VI/1 533) — Mantanóa Llav. et Lex. (= Eriócoma H. B. et Kth.) (VI/1 528) — Rudbéckia L. (inkl. Echinácea Moench, = Lepáchis Raf., = Ratibída Raf.), Sonnenhut (VI/1 503; VI/2 1367, Fig. 965) — Tithónia Desf. (VI/1 528) — Helíanthus L., Sonnenblume (VI/1 507; VI/2 1366) — Spilánthes L. (VI/1 528; VI/2 1366) — Ferdinánda Lag. (= Podochænium Benth.) (VI/1 528) — Verbesína L. inkl. Ximenésia Cass. (VI/1 529) — Guizótia L. (VI/1 532) — Coreópsis L., Wanzenblume (VI/1 529; VI/2 1354 Fig. 957) — Dáhlia Cav. (= Georgína Willd.), Dahlie, Georgine (VI/1 529) — Thelespérma Less. (VI/1 531) — Bídens L., Zweizahn (VI/1 515; VI/2 1366) — Cósmos Cav., Schmuckkörbchen (VI/1 531) — Trídax L., Dreibiss (VI/1 532) — Galinsóga Ruiz et Pav. (= Galinsogæa Zucc., = Wibórgia Roth), Franzosenkraut (VI/1 523) — Mádia Mol. (VI/1 532/33) — Hemizónia DC. (VI/1 533; VI/2 1366) — Layía (nicht Laya) Hook. et Arn. (VI/1 532).



Fig. 1265. Cirsium tuberosum (L.) All. (Bd. VI/2, 889), in einem Flachmoor. Phot. Dr. Franz Seitz-Ghisler, München.

f) Tribus Helenieae (VI/1 533).

Bæria Fisch. et Mey. (VI/1 534) — Flavéria Juss. (VI/2 1366) — Schkúhria[4]) Roth (VI/2 1366) — Palafóxia Lag. (VI/1 534) — Helénium L., Sonnenbraut (VI/1 534) — Gaillárdia Foug., Kokarden- oder Papageiblume (VI/1 534) — Tagétes L., Sammetblume (VI/1 534; VII Fig. 1094).

g) Tribus Anthemídeae (VI/1 400; VI/2 672).

Lasiospérmum Lag. (VI/2 1366) — Santolína L., Cypressenkraut (VI/2 672; VII Fig. 1263) — Lónas Adans. (VI/2 673) — Ánthemis L., Hundskamille (VI/1 535; VI/2 1366) — Anacýclus L., Ringblume (VI/2 673) — Achilléa L., Schafgarbe (VI/2 549) — Cladánthus Cass. (VI/2 674) — Matricária L., Kamille (VI/2 580, 1366) — Chrysánthemum L., Wucherblume (VI/2 590) — Nananthéa DC. (VI/2 674) — Cótula L., einschließlich Cénia Juss., Laugenblume (VI/2 622, 1366) — Sóliva Ruiz et Pav.[5]) — Artemísia L., Beifuss (VI/2 626, 1366).

h) Tribus Senecióneae (VI/1 400; VI/2 798).

Liábum Adans. (VI/2 798) — Tussilágo L., Huflattich (VI/2 675) — Petasítes Miller (VI/2 680) — Robinsónia DC. (VI/2 799) — Rhetinodéndron Meisn. (VI/2 799) — Homógyne Cass., Brand- oder Alpenlattich (VI/2 696) — Adenostýles Cass., Drüsengriffel (VI/1 403; VI/2

[1]) **Craspédia chrysántha** (Schlechtend.) Benth., aus Australien, bei Hannover und Döhren (1889 bis 1895) eingeschleppt.

[2]) **Acanthospérmum austrále** (Loefl.) O. Kuntze (= A. xanthioídes [H. B. et Kth.] DC.), eingeschleppt 1919 bei Kettwig im Ruhrgebiet.

[3]) **Ambrósia artemisiifólia** L. (VI/1 497) scheint nach Hans Preuss (briefl.) in Mitteleuropa öfters mit A. pilostáchya DC. verwechselt zu werden. Auch Fig. 251 (Bd. VI/1) soll A. pilostachya darstellen.

[4]) **Schkúhria advéna** Thellung ist vielleicht nur als Abart oder Unterart der Schk. isópappa Benth. anzusehen.

[5]) **Sóliva daucifólia** Necker, aus Südamerika, eingeschleppt bei Hamburg (Reiherstieg 1896).

1365; VII Fig. 1264) — Erechthítes Raf. (= Neocéis Cass.), Afterkreuzkraut (VI/2 701, 1367) — Culcítium H. B. et Kth. (VI/2 798) — Árnica L., Wohlverleih (VI/2 704) — Dorónicum L., Gemswurz, Krebswurz (VI/2 710, 1354 Fig. 958, 1367) — Senécio L. (inkl. Emília Cass., Kleínia DC. und Notónia DC.), Kreuzkraut (VI/2 726, 1367) — Ligulária Cass., Goldkolben (VI/2 796) — Wernéria H. B. et Kunth (VI/2 798) — Othónna L. (VI/2 799).

i) Tribus Calendúleae (VI/1 400; VI/2 806).

Caléndula L., Ringelblume (VI/2 799) — Dimorphothéca Moench, Kapkörbchen (VI/2 806) — Osteospérmum L. (Afrika) — Trípteris Less. (Süd- und Zentralafrika).

k) Tribus Arctotídeae (VI/2 805).

Ursínia Gaertn. (Südafrika, Abessinien) — Arctótis L. einschl. Venídium Less. und Cryptostémma R. Br., Bärenohr (VI/2 806) — Gazánia Gaertn. (VI/2 806) — Berkheya Ehrh. (VI/2 1367).

l) Tribus Cynaréae (VI/1 400; VI/2 990).

Echínops L., Kugeldistel, Igelkopf (VI/2 807) — Xeránthemum[1]) L., Spreublume, Papierblume (VI/2 812) — Carlína L., Eberwurz, Silberdistel (VI/2 816) — Árctium L. (= Lappa Adans.), Klette (VI/2 825) — Cousínia Cass. (VI/2 923) — Staehelína L., Strauchscharte (VI/2 923) — Saussúrea DC. (einschl. Heterótrichum Bieb.), Alpenscharte (VI/2 835, 1367) — Jurínea Cass., Bisamdistel (VI/2 841) — Cárduus L., Distel (VI/2 845, 1367) — Círsium Miller einschl. Erythrolæna Swt. (VI/2 923) und Chamaepeúce Cass. (VI/2 923), Kratzdistel (VI/2 866, 1367; VII Fig. 1264) — Cynára L., Artischoke (VI/2 923) — Sílybum Adanson, Mariendistel (VI/2 916) — Galactítes Necker (= Lúpsia Necker) (VI/2 926) — Onopórdon L. (= Ácanos Scop.), Eselsdistel (VI/2 919) — Serrátula L., Scharte (VI/2 926) — Crupína Cass., Schlupfsame (VI/2 930) — Rhapónticum Lam., Bergscharte (VI/2 931) — Centauréa[2]) L. (einschl. Ambérboa DC.), Flockenblume (VI/2 934) — Cárthamus L., Saflor (VI/2 985) — Carduncéllus Juss. (VI/2 990) — Cnícus Gaertn., Benediktenkraut (VI/2 990).

m) Tribus Mutisíeae (VI/2 992) — Hesperománnia A. Gr. — Berárdia Vill. (VI/2 992) — Mutísia L. — Trichoclíne Cass. (VI/2 992) — Gerbéra Gronov. (VI/2 992) — Moschária Ruiz et Pav. (VI/2 992).

n) Tribus Cichoríeae (VI/1 400).

Scólymus L., Golddistel (VI/2 1006) — Dendróseris Don (VI/1 396; VI/2 1007) — Fítchia Hook. f. (VI/2 1007) — Catanánche L., Rasselblume (VI/2 1007) — Cichórium L., Wegwarte (VI/2 992) — Lapsána L. (= Lampsána Juss.), Rainkohl (VI/2 1000) — Apóseris Necker, Hainsalat (VI/2 1002) — Tólpis Gaertner, Christusauge (VI/2 1007) — Hyóseris L., Schweinssalat (VI/2 1007) — Arnóseris Gaertner, Lämmersalat (VI/2 1004) — Zacýntha Gaertner, Höckerlattich (VI/2 1008) — Rhagadíolus Juss., Sichelsalat (VI/2 1008) — Hedypnóis Schreber, Röhrchenkraut (VI/2 1008) — Hypochœ́ris L., einschl. Achyróphorus Scop., Ferkelkraut (VI/2 1008, 1355 Fig. 960; VII Fig. 1266) — Urospérmum Scop., Schwefelsame (VI/2 1071) — Leóntodon L., Löwenzahn (VI/2 1017) — Pícris L. (VI/2 1035) — Tragopógon L., Bocksdorn (VI/2 1042, 1356 Fig. 961) — Scorzonéra L., Schwarzwurzel (VI/2 1053) — Podospérmum DC., Stielsamenkraut (VI/2 1067) — Rodígia Spr. (VI/2 1134) — Lagóseris Bieb. (= Pterothéca Cass.), Flügel-Lattich (VI/2 1134) — Andrýala L. (VI/2 1134) — Chondrílla L., Knorpellattich (VI/2 1072) — Willemétia Necker, Kronenlattich (VI/2 1076) — Taráxacum J. G. Zinn

Fig. 1266. Hypochoeris uniflora Vill. (Bd. VI/2 1011), in den Urgebirgsalpen.

[1]) **Xeránthemum cylindráceum** Sibth. et Sm. (VI/2 813) heißt richtig **X. fœtidum** Moench.
[2]) Der gültige Name für Nr. 634 ist **Centauréa angustifólia** Miller.

em. Haller, Pfaffenröhrlein, Kuhblume (VI/2 1078) — Cicérbita Wallr. (= Mulgédium Cass.), Milchlattich (VI/2 1096) — Sónchus L., Gänsedistel (VI/2 1101, 1367) — Mycélis Cass., Mauerlattich (VI/2 1110) — Lactúca L., Lattich (VI/2 1113) — Crépis L. (einschl. Barkhaúsia Moench und Soyéria Moench) (VI/2 1135) — Prenánthes L., Hasenlattich (VI/2 1180) — Hierácium[1]) L., Habichtskraut (VI/2 1182, 1367).

[1]) Fig. 948, Bd. VI/2 1343 ist als Hieracium umbellatum L. subsp. umbellatum (L.) Zahn var. commune Fr. (VI/2 1338) zu bezeichnen.

Fig. 1267. Saussurea pygmaea (Jacq.) Spring. (VI/2, 836), am Schneibstein in den Salzburgeralpen. Phot. Dr. Karl Magnus, Braunschweig.



Fig. 1268. Lunaria rediviva L. (IV/1, 353), fruchtend und blühend (rechts oben) mit Impatiens noli tangere L. Phot. Dr. Karl Magnus, Braunschweig.

4. Alphabetisches Verzeichnis der lateinischen Pflanzennamen einschließlich der Synonyma

A.

Abacosa dumetorum Alef. IV/3 1521
Abelia floribunda Decne. VI/1 235
Abelicea hirta C. K. Schneider III 117
„ ulmoides O. Kuntze III 117
Abelmoschus Medik. V/1 454; VII 188
esculentus (L.) Mey. V/1 458
„ moschatus Medikus V/1 457
Abies Mill. I 82; VII 150
alba Mill. I 82; VII 57 Fig. 1092
balsamea Mill. I 82
Cephalonica Link I 82
excelsa Lam. et DC. I 84
Larix Lam. I 95
Nordmanniana Spach I 82
pectinata DC. I 82; VII 57 Fig. 1092
pinsapo Boiss. I 82
„ Sibirica Ledeb. I 82
Abronia fragrans Nutt. III 266
„ umbellata Cam. III 266
Abrus precatorius L. IV/3 1498
Absinthium arborescens Moench VI/2 630
argenteum Bess. VI/2 630
Canariense Bess. VI/2 630
congestum Lam. VI/2 650
frigidum Bess. VI/2 630
glaciale Lam. VI/2 650
grandiflorum Bess. VI/2 656
laxum Lam. VI/2 647
Mutellina Bluff et Fingerh. VI/2 647
officinale Richt. VI/2 651
rupestre Bess. VI/2 656
tanacetifolium Gaertn. VI/2 642
viridiflorum Hoffm. VI/2 656
„ vulgare Lam. VI/2 651
Abutilon Gaertn. VII 188
Asiaticum (L.) G. Don V/1 456
Avicennae Gaertn. V/1 456
Bedfordianum Hook. V/1 457
crispum (L.) G. Don V/1 456
Darwinii Hook. f. V/1 457
Hildebrandii Fenzl V/1 457
Indicum (L.) G. Don V/1 456
insigne Planchon V/1 457
striatum Dicks. V/1 457
venosum Hook. V/1 457
Acacia Arabica Willd. IV/3 1124
armata R. Br. IV/3 1126
Baileyana F. v. Muell. IV/3 1125
Catechu (L. fil.) Willd. IV/3 1124, 1125
cyanophylla Lindl. IV/3 1126
decurrens Willd. IV/3 1124, 1125
Farnesiana Willd. IV/3 1124 1125
giraffae Willd. IV/3 1124
horrida Willd. IV/3 1124
longifolia (Andrews) Willd. IV/3 1126
lophantha Willd. IV/3 1123
lunata Sieb. IV/3 1126
melanolyxon R. Br. IV/3 1124
paradoxa DC. IV/3 1126
pycnantha Benth. IV/3 1124
Senegal Willd. IV/3 1124, 1125
Seyal Del. IV/3 1124, 1125
sphaerocephala Cham. et Schlecht. IV/3 1125
Verek Guill. et Perr. IV/3 1125
verticillata Willd. IV/3 1126
Acaena Vandelli IV/2 666
Acalypha marginata Williams V/1 125
ornata A. Rich. V/1 125
Sanderi N. E. Brown V/1 125
„ Wilkesiana Seem. V/1 125
Acanos Scop. VI/2 919
„ Spina Scop. VI/2 920
Acanthaceae VI/1 177 VII 205
Acantholimon Boiss. V/3 1879; VII 197
„ venustum (Fenzl) Boiss. V/3 1879
Acanthonychia DC. VII 173
Acanthopanax pentaphyllus Marchal V/2 913
ricinifolius Seem. V/2 913
„ senticosus Harms V/2 913
Acanthophyllum C. A. Mey. VII 173
Acanthospermum Schrank VII 211
Acanthosicyos horrida Welw. VI 1 315
Acanthosyris III 151
Acanthus L. VI/1 177
longifolius L. VI/1 177
mollis L. VI 177 VII 205 Fig. 1252
Acanthus spinosus L. VI 1 177
Acer L. V 1 262; VII 187
barbatum hort. V/1 295
barbatum Michx. V/1 271
Bohemicum Presl V/1 277
Bormuelleri Borb. V/1 295
Boscii Koch V/1 295
campestre L. V/1 284
Canadense Marsh. V/1 271
collinum Ten. V/1 284
cordifolium Moench V/1 272
crataegifolium Sieb. et Zucc. V/1 271
Creticum L. V/1 288
Creticum Schmidt V/1 295
dasycarpum Ehrh. V/1 271
denticulatum hort. V/1 289
Dieckii Pax V/1 280, 295
Dobrudschae Pax V/1 280
Douglasii Hook. V/1 271
Durettii (hort.) Pax V/1 295
Fauriei Lév. et Van. V/1 293
glabrum Torr. V/1 271
Guyoti Beauverd V/1 295
hybridum Baudriller V/1 295
hybridum Spach V/1 295
HyrcanumFisch.et Mey.V/I 295
insigne Boiss. et Buhse V/1 271
Italicum Lauche V/1 291
Italum Lauth V/1 291
littorale hort. V/1 289
Lobelii Tenore V/1 282
Martini Jordan V/1 292
melliodorum Opiz V/1 277
Monspessulanum L. V/1 288
montanum Ait. V/1 271
montanum Lam. V/1 274
Neapolitanum Ten. V/1 293
Negundo L. V/1 293
obtusatum Waldst. et Kit. V/1 293
Opalus Miller V/1 290
opulifolium Thuill. V/1 274
opulifolium Vill. V/1 290, 291
Opulus Aiton V/1 290
Ortmannianum Opiz V/1 277
parviflorum Ehrh. V/1 271
Pennsylvanicum L. V/1 271
Peronai Schwerin V/1 295
Perrieri Chab. V/1 295
platanifolium Stokes V/1 280
platanoides L. V/1 280

4. Lateinische Pflanzennamen

Seite 214—380

Die wichtigsten Strandpflanzen, Meeresalgen, Seetiere, Strand- und Seevögel der Nord- und Ostsee bringt **Dr. P. KUCKUCK** von der Preuss. Biolog. Anstalt auf Helgoland in seinem Buche:

Der Strandwanderer

4. Auflage. Mit 225 farbigen und zahlreichen schwarzen Abbildungen auf 32 Tafeln. Taschenformat. Preis in Leinen Mk. 7.—.

„Doch nicht nur der Laie, auch der Biologe von Fach wird bei der ersten Beschäftigung mit der vielgestaltigen Fauna und Flora der deutschen Meere in dem rühmlichst bekannten Buche einen bequemen und zuverlässigen Handweiser haben, der weiterer Empfehlung kaum bedarf." *(Naturwissenschaftliche Korrespondenz.)*

J. F. LEHMANNS VERLAG / MÜNCHEN 2 SW

Acer praecox Opiz V 1 277
procerum Salisb. V/1 274
Pseudoplatanus L. V 1 VII 1098 A
pusillum Schwerin V/1 295
rectangulum Dulac V 1 288
rotundum Dulac V 280
rubrum L. V/1 271
rubrum Lam. V/1 271
Sabaudum Chab. V/1 295
saccharinum L. V/1 271
saccharophorum C. Koch V 271
saccharum Marsh. V/1 271
silvester Wender. V/1 284
spicatum Lam. V/1 271
striatum Duroi V/1 271
Tataricum L. V/1 272
tricuspidatum Stokes V/1 271
trilobatum Lam. V/1 288
trilobatum (Sternb.) A. Br V/1 263
trilobum Gilib. V/1 284
trilobum Moench V/1 288
„ Zoeschense Pax V/1 295
Aceraceae V 1 262; VII 187
Aceras R. Br. II 359; VII 164
anthropophorum (L.) R. Br. II 359; VII Fig. 1202, 1203
hircinum Lindl. II 360
„ longibracteatum Rchb. II 359
Acetosa alpina Moench III 171
digyna Mill. III 188
„ scutata Mill. III 183
Acetosella (Moehr.) O. Kuntze IV/3 1645
Achariaceae V/1 493; VII 190
Acharitherium arvense Bluff et Fingerh. VI/1 453
Achillea L. VI/2 549; VII 211
ageratifolia Sibth. et Sm. VI/2 551
Aizoon Grisebach VI/2 551
Aleppica DC. VI/2 550
asplenifolia Leresce VI/2 578
asplenifolia Vent. VI/2 568
atrata L. VI/2 553
Briquetiana Chenevard VI/ 579
camphorata Gilib. VI/2 566
cartilaginea Ledeb. VI/2 565
cinerascens Heimerl VI/2 579
Clavenae L. VI/2 559
Clusiana Tausch VI/2 555
coarctata Poir. VI/2 550
commutata Heimerl VI/2 579
Conrathii Fritsch VI/2 578
coronopifolia Willd. VI/2 550
crithmifolia Waldst. et Kit. VI/2 550
decumbens L. VI/2 550
dentato-serrata Heuffel VI/ 580
dentifera DC. VI/2 575
Achillea distans Waldst. et Kit. VI/2 575
Dumasiana Vatke VI/2 579
Erba rotta All. subsp. moschata Vaccari VI/2 555, 556
Feliciana Brügger VI/2 579
filifolia Bieb. VI/2 550
filipendulina Lam. VI/2 550
Fronmuelleri Sündermann VI/2 579
Genipi Murr VI/2 555
Gerberi Bieb. VI/2 550
grandifolia Friv. VI/2 550
Haenkeana Sünd. VI/2 579
Haenkeana Tausch VI/2 571
Halleri Crantz VI/2 574
Hausmanniana Sündermann VI/2 578
Helvetica Rchb. VI/2 578
Helvetica Willd. VI/2 579
Jaborneggi Halászy VI/2 577
Jauchiana Guyot VI/2 580
impunctata (Hoppe) Kerner VI/2 577
incisa Clairv. VI/2 579
intermedia Schleich. VI/2 578
Khekiana Heimerl VI/2 579
Kolbiana Sündermann VI/2 579
Kraettliana Brügg. VI/2 577
Laggeri Schultz-Bip. VI/2 578
lanata Spr. VI/2 558
lingulata Waldst. et Kit. VI/2 550
Livia Scop. VI/2 555
macrophylla L. VI/2 562
magna Haenke VI/2 571
micrantha Willd. VI/2 550
Millefolium L. VI/2 569
Millefolium L. subsp. collina (Becker) Weiß VI/2 571
Millefolium L. subsp. Pannonica (Scheele) Hayek VI/2 571
Millefolium L. subsp. Sudetica (Opiz) Web. VI/2 571
Millefolium L. var. setacea Koch VI/2 573
montana Schleich. VI/2 578
Morisiana Rchb. VI/2 557
moschata Wulf. VI/2 555
mucronata Bieb. VI/2 550
nana L. VI/2 558
Neilreichii A. Kern. VI/2 567
nobilis L. VI/2 566
obscura Nees VI/2 578
odorata Koch VI/2 575
odorata Suter VI/2 573
oxyloba (DC.) F Schultz VI/2 551
paucidentata Dalla Torre et Sarnth. VI/2 576
pinnata Sündermann VI/2 579
polyphylla Schleich. VI/2 550, 579
Achillea Ptarmica Bieb. VI/2 565
Ptarmica L. VI/2 563
punctata Ten. VI/2 550
Reichardtiana Beck VI/2 577
Rompelii J. Murr VI/2 578
salicifolia Bess. VI/2 565
sambucifolia Desf. VI/2 616
Santolina L. VI/2 550
Schneideri Rouy VI/2 579
Schreineri Sündermann VI/2 579
Schroeteri F. A. Wolf VI/2 579
sericea Janka VI/2 550
setacea Waldst. et Kit VI/2 573
Siegfriedii Brügger VI/2 579
stricta Schleich. VI/2 575
tanacetifolia All. VI/2 574
Thomasiana Hall. VI/2 578
Thomasiana Rchb. f. VI/2 578
tomentosa L. VI/2 576
Travignolensis Sündermann VI/2 578
umbellata Sibth. et Sm. VI/2 551
Valesiaca Koch VI/2 578
Valesiaca Suter VI/2 579
Veronensis Rouy VI/2 580
virescens (Fenzl) Heimerl VI/2 575
Achimenes coccinea Pers. VI/1 177
grandiflora (Schiede) DC. VI/1 177
longiflora Benth. VI/1 177
patens Benth. VI/1 177
pulchella (L'Hérit.) Hitchcock VI/1 177
„ rosea Lindl. VI/1 177
Achras Sapota L. V/3 1896, 1897
Achroanthus monophyllos Greene II 392
Achyranthes aspera L. VII 171
„ Verschaffeltii Lem. III 261
Achyrophorus Helveticus Jacq. VI/2 1011
maculatus Scop. VI/2 1009
radicatus Scop. VI/2 1013
uniflorus Bluff et Fingerh. VI/2 1011
Acinos alpinus Moench V/4 2299
thymoides Moench V/4 2297
„ vulgaris Pers. V/4 2297
Aciphylla Forster V/2 1328
„ squarrosa Forster V/2 1328
Acmopyle Pilger VII 150
Acocanthera V/3 2050
Aconitum L. III 492; VII 174
acutum Rchb. III 506
Algoviense Gáyer III 507
amoenum Rchb. III 499
Anthora L. III 494
autumnale Lindl. III 493
Cammarum L. III 496, 501, 506
cetium G. Beck III 504

Aconitum Clusianum Rchb. III 498
commutatum Hayek III 497
Dolomiticum A. Kern. III 496, 497
exaltatum Rchb. III 506
Hemsleyanum Pritz. III 493
Japonicum Thunb. III 493
Koelleanum Rchb. III 496
Kusnezovi Rchb. III 493
Latemarense Degen et Gáyer III 497
laxiflorum Schleich. III 498
laxum Hayek III 506
luparia Rchb. III 504
Lycoctonum Koelle III 503
molle Rchb. III 507
Napellus L. III 495
Napellus L. subsp. angustifolium Bernh. III 496
Napellus L. subsp. Bauhini Rchb. III 499
Napellus L. subsp. compactum Rchb. III 497
Napellus L. subsp. eustachyum Rchb. III 497
Napellus L. subsp. firmum Rchb. III 498
Napellus L. subsp. formosum Rchb. III 498
Napellus L. subsp. hians Rchb. III 498
Napellus L. subsp. Lobelianum Rchb. III 499
Napellus L. subsp. neomontanum Wulf. III 499
Napellus L. subsp. pyramidale Mill. III 500
Napellus L. subsp. Tauricum Wulf. III 496
Neubergense DC. III 499
Orientale Mill. III 493
paniculatum Lam. III 503; VII 174 Fig. 1216
paniculatum Lam. subsp. leptophyllum (Rchb.) Gáyer III 503
paniculatum Lam. subsp. Vallesiacum Gáyer III 503
pubescens Rchb. III 497
ranunculifolium Rchb. III 505
rostratum auct. pl. III 501, 502
Schneebergense Gáyer III 506
spicatum Sér. III 496
sterile Thomas III 507
Stoerkianum Rchb. III 506
Thelyphonum Rchb. III 505
variegatum L. III 501, 502
variegatum L. subsp. gracile (Rchb.) Gáyer III 502
variegatum L. subsp. Judenbergense (Rchb.) Gáyer III 502
virgatum Rchb. III 507
volubile Pall. III 493
vulgare DC. III 497
Aconitum Vulparia Rchb. III 503
Vulparia Rchb. subsp. paucifloram (Host) Gáyer III 505
Vulparia Rchb. subsp. Pennínum (Sér.) Gáyer III 505
Vulparia Rchb. subsp. platanifolium Degen et Gáyer III 505
Vulparia Rchb. subsp. puberulum (Sér.) Gáyer III 505
Vulparia Rchb. subsp. Thalianum (Wallr.) Gáyer III 505
„ Zahlbruckneri Gáyer III 500
Acorus L. II 134; VII 157
aromaticus Gilib. II 134
Calamus L. II 134
gramineus Ait. II 131, 134
odoratus Lam. II 134
„ vulgaris Kern. II 134
Acrasiales VII 136
Acrocarpi VII 145
Acrostichum aureum L. VII 149
Actaea L. III 477; VII 174
alba Mill. III 477
Christophorana Gouan III 477
Cimicifuga L. III 479
cordifolia DC. III 477
corymbosa Stokes III 477
Davurica Franchet III 477
erythrocarpa Fisch. III 477
Japonica Thunb. III 477
nigra Gaertner, Meyer et Scherbius III 477
racemosa Genersich III 479
racemosa Gilib. nec L. III 477
rubra Ledeb. III 477
„ spicata L. III 477
Actinanthus Ehrenb. V/2 1249
Actinidia callosa Lindl. V/1 494
polygama (Sieb. et Sm.) Planch. V/1 494
Actinidiaceae VII 188
Actinomycetes VII 135
Actinophora frigida Fisch. et Mey. III 479
„ Wallichii Meissn. III 479
Actinostrobus Miq. VII 151
Adamsia reptans Fisch. IV/2 911
Adansonia digitata L. V/1 489
Adelia acuminata Michx. V/3 1905
„ ligustrina Michx. V/3 1905
Adenandra Willd. V/1 50
Adenanthera pavonina L. IV/3 1126
Adenia Forsk. V/1 658; VII 190
Adenium Roem. et Schult. V/4 2048
Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay. IV/3 1148
Adenolinum alpinum Rchb. V/1 15
Leonii Rchb. V/1 17
„ perenne Rchb. V/1 17
Adenophora Fisch. VI/1 365; VII 208
communis Fisch. VI/1 365
liliifolia (L.) Fisch. VI/1 365; VII 209 Fig. 1260
Adenophora suaveolens Mey. VI/1 365
Adenostýles (nicht Adenóstyles) Cass. VI/1 403; VII 211
albida Cass. VI/1 403
albifrons Rchb. VI/1 403
Alliariae (Gouan) Kern. VI/1 403
alpina Bluff et Fingerh. VI/1 403
candidissima Cass. VI/1 406
canescens Sennholz VI/1 407
crassifolia Kern. VI/1 403
Eginensis Lagg. VI/1 407
glabra (Mill.) DC. VI/1 403; VI/2 1365
hybrida DC. VI/1 406
intermedia Hegetschw. VI/1 407
leucophylla Rchb. VI/1 406
Petasites Bluff et Fingerh. VI/1 403
tomentosa (Villars) Schinz et Thellung VI/1 406; VII 210 Fig. 1264
„ viridis Cass. VI/1 403
Adiantum L. I 38; VII 149
„ capillus Veneris L. I 38
Adlumia fungosa (Gmel.) Irmisch IV/1 20
Adonis L. III 596; VII 175
aestivalis Gaud. III 599
aestivalis L. III 600
Amurensis L. III 597
Apennina Jacq. III 597
autumnalis L. III 600
citrinus DC. III 599
flammeus Jacq. III 599
Helleborus Crtz. III 597
maculatus Wallr. III 600
microcarpa DC. III 597
miniatus Jacq. III 600
phoeniceus Fritsch III 600
Pyrenaica DC. III 597
„ vernalis L. III 597
Adoxa Moschatellina L. VI/1 260
Adoxaceae VI/1 259; VII 207
Adyseton Adans. IV/1 445
Aechmea Ruiz et Pav. VII 158
Aegiceras corniculatum (L.) Blanco V/3 1714
floridum Roem. et Schult. V/3 1714
„ maius Gaertn. V/3 1714
Aegilops L. I 390; VII 155
Aucheri Boiss. I 391
caudata L. I 390
geniculata Roth I 390
incurvata L. I 381
macrura Jaub. et Spach I 391
mutica Boiss. I 391
ovata L. I 390
speltoides Tausch I 391
squarrosa Cav. I 390
triaristata Willd. I 390
triuncialis L. I 390

Aegilops ventricosa Tausch I 390
Aeginetia L. VII 205
Aegiphila L. V/3 2236
Aegle Marmelos (L.) Correa V/3 54
„ separia DC. V/1 58
Aegopodium L. V/2 1212; VII 194
angelicaefolium St. Lager V/2 1212
Bulbocastanum Michot V/2 1191
latifolium Turcz. V/2 1212
Podagraria L. V/2 1212
„ ternatum Gilib. V/2 1212
Aeluropus Niliacus (Spreng.) Steud. VII 155
Aeschinanthus Jacq. VI/1 177
Aeschynomene Elaphroxylon (Guill. et Perr.) Taub. IV/3 1462
Aesculus L. V/1 298; VII 187
Californica Nutt. V/1 299
Chinensis Bunge V/1 299
flava Ait. V/1 300
glabra Willd. V/1 299
Hippocastanum L. V/1 301
Indica Hook. V/1 299
lutea Wangenh. V/1 299
macrostachya Michx. V/1 300
Marylandica Booth V/1 301
octandra Marsh. V/1 299
parviflora Walt. V/1 300
Pavia L. V/1 300
rubicunda Loisel. V/1 300
„ turbinata Bl. V/1 299
Aëthionema R. Br. IV/1 110; VII 177
Arabicum (L.) Andrz. IV/1 111
Banaticum Janka IV/1 113
Buxbaumii DC. IV/1 111
Cappadocicum Spr. IV/1 111
coridifolium DC. IV/1 111
grandiflorum Boiss. et Hohenacker IV/1 111
leptocarpum Ten. IV/1 112
monospermum R. Br. IV/1 114
ovalifolium Boiss. IV/1 113
pulchellum Boiss. et Huet IV/1 111
saxatile (L.) R. Br. IV/1 112
Thomasianum J. Gay IV/1 114
„ varians Solms IV/1 114
Aethusa L. V/2 1272; VII 194
Ammi Spr. V/2 1171
Bunius Murr. V/2 1173
Cicuta Neck. V/2 1272
cynapioides Bieb. V/2 1274
Cynapium L. V/2 1272
cynica Dulac V/2 1272
elata Schleich. V/2 1274
Fischeri Jess. V/2 1326
Meum Murr. V/2 1300
Meum Zawadzki V/2 1319
micrantha Opiz V/2 1272
montana Lam. V/2 1173
Mutellina Lam. V/2 1318
Aethusa tenuifolia Gray V/2 1272
tenuifolia Salisb. V/2 1301
toxicaria Salisb. V/2 1272
venosa Jess. V/2 1305
Aextoxicaceae VII 187
Aframomum II 321
Afzelia bijuga Coleb. IV/3 1130
Agallocha L. V/1 118
Agapanthus Africanus Hoffgg. II 278
umbellatus L'Hérit II 278; VII 160 Fig. 1190
Agaricaceae VII 142
Agaricales VII 142
Agastache foeniculum (Pursh) O. Kuntze V/4 2368
Agathaea microphylla Cass. VI/1 449
Agathis Salisb. VII 150
Agathodes Chirayta D. Don V/3 1974
Agathosma apiculatum G. F. W. Mey. V/1 49
ciliatum Lk. V/1 50
imbricatum Willd. V/1 49
lanceolatum (L.) Engl. V/1 50
Agave L. II 317; VII 163
Americana L. II 318
atrovirens Karw. II 317
Europaea Vis. II 318
ferox K. Koch II 317
filifera Salm-Dyck II 317
geminiflora Ker-Gawler II 317
horrida Lemaire II 317
Mexicana Lam. II 317
ramosa Moench II 318
rigida II 317
„ striata Zucc. II 317
Agavoideae VII 162
Ageratum L. VI/1 408
caeruleum Desf. VI/1 408
coeruleum Sims VI/1 408
conyzoides L. VI/1 408
corymbosum Zucc. VI/1 408
Houstonianum Mill. VI/2 1365
„ Mexicanum Sims. VI/1 408
Aglaonema Schott VII 157
Agraphis nutans Lk. II 249
Agraulus caninus P. B. I 226
Agrimonia L. IV/2 930; VII 181
Agrimonioides L. IV/2 929
conopsea Tschern. IV/2 934
Dahurica Willd. IV/2 934
Eupatoria L. IV/2 931, 932
Goetectiana Andrz. IV/2 934
odorata Mill. IV/2 933
officinalis Lam. IV/2 932
pilosa Ledeb. IV/2 934
Schultzi-Broesiensis Abrom. IV/2 934
Wirtgeni Aschers. et Graebner IV/2 934
Agrimonioides Mill. VII 181
Agriopyron Gaertn. VII 155
Agriopyrum Pal. I 382; VII 155
acutum Buch. I 387
altissimum Schur I 385
Agriopyrum apiculatum Tscherning I 387
biflorum (Brign.) Roem. et Schult. I 385
caesium Presl I 385
caninum (L.) P. B. I 382
cristatum Pal. I 387
elongatum Pal. I 387
farctum Viv. I 386
glaucum Roem. et Schult. I 385
intermedium (Host) P. B. I 385
iunceum P. B. I 386
litorale (Host) Dum. VII 155
litorale Rchb. I 385
maritimum Koch et Ziz I 385
muricatum Eichw. I 387
Orientale K. Koch I 388
pilosum Schur I 386
prostratum P. B. I 388
pungens Roem. et Schult. I 387
pycnanthum Godr. et Gren. VII 155
repens (L.) P. B. I 383
rigidum Eichw. I 388
rigidum Presl I 385
salinum Schur I 386
Savignonii De Not. I 386
Sibiricum (Willd.) Eichw. I 388
unilaterale P. B. I 330
Agrocharis melanantha (Steud.) Hochst. V/2 1503
Agrosinapis Fourr. IV/1 229
Agrostemma L. III 273; VII 173
Coronaria L. III 297
Flos Jovis L. III 296
„ Githago L. III 273
Agrostideae I 238; VII 154
Agrostis L. I 222; VII 154
aculeata Scop. I 209
alba L. I 223
„ alpina L. I 226
alpina Willd. I 227
arundinacea L. I 235
australis L. I 222
bromoides L. I 206
canina L. I 226
capillaris Poll. I 223
festucoides Vill. I 226
incurvata Scop. I 381
interrupta L. I 229
minima L. I 220
pilosa Gaud. I 230
rubra All. I 226
rubra Wahlenb. I 225
rupestris All. I 227
Schleicheri Jordan et Verlot I 227
serotina L. I 278
setacea Vill. 227
signata Schur I 223
silvatica Schrad. I 235
spica venti L. I 228
Stebleri Schröt. I 236

Agrostis stolonifera aut. I 223
tenella Roem. et Schult. I 230
ventricosa Gouan I 222
villosa Chaix I 232
„ vulgaris With. I 225
Ailanthus Desf. V/1 80; VII 185
altissima (Mill.) Siringle V/1 81; VII 185
Cacodendron Schinz et Thellung V/1 81
excelsa Roxb. V/1 80
Giraldii Dode V/1 81
glandulosa Desf. V/1 81
Malabarica DC. V/1 80
Sutschuenensis Dode V/1 81
„ Vilmoriniana Dode V/1 81
Ailantus Desf. VII 185
Aira L. I 240; VII 154
alba Wulf. I 270
aquatica L. I 288
atrorubens Thuill. I 276
caerulea L. I 276
caespitosa L. I 243
canescens L. I 242
capillaris Host I 240
caryophyllea L. I 240
cristata L. p. p. I 286
discolor Thuill. I 246
flexuosa L. I 245
glauca Schrad. I 282
gracilis Trin. I 286
hirsuta Hall. I 282
iuncifolia Wulf. I 267
macrantha Ledeb. I 286
montana L. I 245
praecox L. I 241
setacea Huds. I 246
spicata L. I 247
Vallesiana All. I 283
varia Jacq. I 268
violacea Gilib. I 288
„ Wibeliana Sond. I 245
Airochloa glauca Lk. I 282
„ hirsuta Lk. I 282
Airopsis praecox Fr. I 241
Aithales rubens Webb. IV/2 515
Ajuga L. V/4 2537; VII 203
adulterina Wallr. V/4 2548
alpina L. V/4 2543
alpina Suter V/4 2545
alpina Vill. V/4 2542
astolonosa Schur V/4 2545
Barrelieri Ten. V/4 2541
breviproles Borb. V/4 2548
Chamaepitys (L.) Schreb. V/4 2539
Chia Koch V/4 2540
Genevensis L. V/4 2543
Hampeana auct. V/4 2548
Hampeana Braun et Vatke V/4 2548
hybrida Kern. V/4 2548
latifolia Host V/4 2544
montana Dillen. V/4 2543
Ajuga montana Rchb. V 4 2544
pseudo-pyramidalis Schur V/4 2548
pyramidalis Bieb. V/4 2543
pyramidalis L. V/4 2545
pyramidalis L. var. Genevensis Lam. V/4 2543
repens Host V 4 2541
reptans L. V/4 2541
rugosa Host V/4 2543, 2544
vulgaris subsp. reptans Rouy V/4 2541
Ajugoideae V/4 2523; VII 203
Aizoaceae III 267; VII 172, 38 Fig. 1063
Aizoon L. VII 172
Akaniaceae VII 185
Akebia quinata (Thunb.) Decne. IV 1 16
Alangiaceae V 2 770; VII 192
Alangium Lam. V/2 770; VII 192
Albersia Blitum Kunth III 264
Albizzia julibrissin Durazz. IV 3 1123
Lebbek Benth. IV/3 1123
lophantha (Willd.) Boiv. IV/3 1123
Albucea chlorantha Rchb. II 254
„ nutans Rchb. II 253
Albugo candida Pers. IV 366, 477
Alcea L. V/1 463
„ palmata Gilib. V/1 478
Alchemilla L. IV/2 943; VII 181
acutiloba Steven IV/2 945
algida Obrist IV/2 957
alpina L. IV/2 949
alpina L. subsp. glomerata Camus IV/2 952
amphisericea Bus. IV/2 955
Anisiaca Wettst. IV/2 953
Aphanes L. IV/2 946
arvensis (L.) Scop. IV/2 946
asterophylla Gams V/2 954
colorata Bus. IV/2 961
conjuncta Bab. IV/2 956
coriacea Bus. IV/2 964
cuneata Gaud. IV/2 970
firma Bus. IV/2 958
fissa Günth. et Schumm. IV/2 956
flabellata Bus. IV/2 961
flexicaulis Bus. IV/2 958
Gemmia Bus. IV/2 970
glaberrima Schmidt IV/2 956
glareosa „Kerner" hort. IV/2 945
grossidens Bus. IV/2 953
heptaphylla Schleich. IV/2 970
Hoppeana (Rchb.) Dalla Torre IV/2 953
Hoppeana (Rchb.) Dalla Torre subsp. glabra Poir. IV/2 956, 957
hybrida Brügg. IV/2 958
hybrida L. IV/2 960
lineata Bus. IV/2 967
Alchemilla major Schur IV 2 958
minor Huds. IV/2 968
montana Schmidt IV/2 966
obtusa Bus. IV/2 966
opaca Bus. IV/2 951
palmata Gilib. IV/2 968
pentaphyllea L. IV/2 948
pentaphylloides Bus. IV/2 970
pubescens Lam. IV/2 960
Pyrenaica L. Dufour IV/2 956
Sabauda Bus. IV/2 970
saxatilis Bus. IV/2 951
semisecta Bus. IV/2 965
sericans Tausch IV/2 970
sericata Rchb. IV/2 945
silvestris Schmidt IV/2 968
speciosa Bus. IV/2 945
splendens Christ IV/2 958
subsericea Reut. IV/2 952
trullata Bus. IV/2 970
vulgaris L. IV/2 962
vulgaris L. subsp. acutidens (Bus.) Gams IV/2 966
vulgaris L. subsp. alpestris (Schmidt) Camus IV/2 965
vulgaris L. subsp. heteropoda (Bus.) Gams IV/2 967
vulgaris L. subsp. inconcinna (Bus.) Gams IV/2 965
vulgaris L. subsp. Wichurae Buser IV/2 966
Alchornea ilicifolia Müll.-Aarg. V/1 117
Aldrovanda L. IV/2 506; I CVIII Fig. 176
verticillata Roxb. IV/2 506
„ vesiculosa Monti IV/2 506
Alectoria VII 144
Alectorolophus Boehmer VI/1 102
Alectorolophus Stern. VI/1 104
alpinus (Baumg.) Stern. VI/1 109
angustifolius (Gmel.) Heynhold VI/1 109
angustifolius (Gmel.) Heynhold subsp. angustifolius (Gmel.) Wettst. VI/1 110
angustifolius (Gmel.) Heynhold subsp. lanceolatus (Kovács) Wettst. VI/1 110
angustifolius (Gmel.) Heynhold subsp. subalpinus (Stern.) Wettst. VI/1 110
antiquus Stern. VI/1 110
Apenninus Brockmann VI/1 110
Aschersonianus Schulze VI/1 106
Beyeri Behr. VI/1 107
Brigantiacus Gross VI/1 112
Chabertii Behrendsen VI/1 108
divaricatus Stern. VI/1 107
dubius Poeverlein VI/1 112
Facchinii Stern. VI/1 105
fallax Stern. VI/1 112
Freynii Stern. VI/1 106

Alectorolophus glaber Beck VI 1 108
glandulosus Stern. VI/1 106
goniotrichus Stern. VI/1 107
gracilis Stern. VI 1 110
hirsutus All. VI/1 104
hirsutus All. subsp. patulus (Stern.) Hay. VI 1 105
hirsutus All. subsp. Semleri (Stern.) Hay VI 1 105
leptotrichus Schulze VI/1 112
Lorinensis Behrendsen VI 1 112
maior (Ehrh.) Rchb. VI/1 108
maior (Ehrh.) Rchb. subsp. montanus (Saut.) Hay. VI/1 108
minor (Ehrh.) Wimm. et Grab. VI/1 111
Niederederi Stern. VI/1 112
oligadenius M. Schulze VI/1 112
ovifugus Chab. VI/1 107
ovifugus (Chab.) Stern. VI/1 107
parviflorus Wallr. VI/1 111
Poeverleini Seml. VI/1 112
Pseudo-Freynii Behrendsen VI/1 112
pubescens Fritsch VI/1 111
pulcher Wimm. VI/1 109
Rumelicus (Velen.) Borb. VI/1 106
serotinus Schönh. VI/1 108
Songeoni (Chab.) Stern. VI/1 107
stenophyllus Stern. VI/1 111
„ Sterneckii Wettst. VI/1 106
Alepidea V/2 975
Aletris farinosa L. II 280
„ Uvaria L. II 277
Aletroideae II 280; VII 162
Aleurites laccifera Willd. V/1 120
Moluccana Willd. V/1 120
„ triloba Forst. V/1 120
Aleuritia farinosa Spach V/3 1754
„ longiflora Opiz V/3 1758
Alhagi Desv. IV/3 1462
Alisanthus biflorus Desv. III 408
„ trinervis Desv. III 411
Alisma L. I 151; VII 6 Fig. 978
arcuatum Michalet I 152
diversifolium Gilib. I 153
gramineum Gmel. VII 152
graminifolium Wahlenb. I 152; VII 152
natans L. I 153
parnassifolium Bassi I 153
Plantago (L.) Michalet I 151
„ ranunculoides L. I 155
Alismataceae I 150; VII 152
Alkanna Matthioli Tausch V/3 2205
Orientalis (L.) Boiss. V/3 2206
primuliflora Griseb. V/3 2206
tinctoria (L.) Tausch V/3 2205
Allamanda cathartica L. V/3 2050
Allanblackia floribunda Oliv. V/1 501
Allanblackia Stuhlmanni Engler V/1 501
Alliaria Scop. IV/1 149; VII 177
„ officinalis Andrz. IV/1 149
Allinum Necker V/2 1303
Allioideae II 278; VII 159
Allium L. II 213; VII 159
acutangulum Schrad. II 220
Altaicum Pall. II 233
ampeloprasum L. II 231
angulosum L. II 220
appendiculatum Lam. II 222
Ascalonicum L. II 232
atropurpureum W. et K. II 234
carinatum L. II 227
carinatum Poll. II 226
Cepa L. II 232; VII 97 Fig. 1125
ceratophyllum Bess. II 233
controversum Schrad. II 231
densiflorum De Not. II 218
ericetorum Thore II 221
esculentum Salisb. II 232
fallax Schult. II 221
fistulosum L. II 233
flavum L. II 225
foetidum Willd. II 227
giganteum Regel II 234
globosum Red. II 228
hirsutum Lam. II 234
intermedium Don II 226
kermesinum Rchb. II 228
lacteum Sm. II 234
latifolium Gilib. II 229
laxiflorum Tausch II 217
laxum Don II 220
moly L. II 233
montanum Schmidt II 221
moschatum L. II 224
multibulbosum Jacq. II 234
Neapolitanum Cir. II 234
neglectum Wender. II 216
nemorale Salisb. II 229
nigrum L. II 234
niveum Roth II 234
ochroleucum W. et K. II 221
odorum L. II 233
oleraceum L. II 226
Ophioscorodon Don II 231; VII 160 Fig. 1188
paniculatum All. II 226
paniculatum Host II 227
paradoxum Don II 233
plantagineum Lam. II 219
Porrum L. II 231
pulchellum Don II 226
reticulatum Presl II 220
rotundum L. II 216
sativum L. II 230
saxatile Bieb. II 228
Schoenoprasum L. II 223
Schuberti Zucc. II 234
Scorodoprasum L. II 216
senescens L. II 221
serotinum Lap. II 222
Allium setaceum W. et K. II 224
Sibiricum L. II 224
sphaerocephalum L. II 218
stipitatum Regel II 234
strictum Schrad. II 220; VII 159
suaveolens Jacq. nec Duby II 222
subhirsutum L. II 234
Tataricum L. fil. II 233
triquetrum L. II 234
ursinum L. II 229
Victorialis L. II 219
vineale L. II 217; VII 41 Fig. 1069
Allocarya Californica (Fisch. et Mey.) Greene V/3 2127; VII 200
Allosurus Bernh. I 36; VII 149
„ crispus Bernh. I 36
Allotropa Torr. et Gray VII 195
Alnaster viridis Regel III 87
Alniphyllum Matsumura VII 197
Alnus Hill III 85; VII 168 und Fig. 1080
Alnobetula (Ehrh.) Hartig III 87
Aschersoniana Call. III 94
autumnalis Hartig III 85
Badensis Lang III 94
februaria O. Kuntze III 91
Fiekii Callier III 94
glutinosa Gaertn. III 91
hybrida A. Braun III 94
incana (L.) Moench III 89
lanuginosa Gilib. III 89
nana Clairv. III 80
pubescens Sartorelli III 89
pubescens Tausch III 94
rotundifolia Mill. III 91
rugosa (Du Roi) Spreng. III 85
serrulata Willd. III 86
spuria Callier III 94
viridis (Chaix) Lam. et DC. III 87
„ vulgaris Pers. III 91
Alocasia Schott VII 157
Aloë ferox Mill. II 277
plicatilis Mill. II 277
Succotrina Lam. II 277; VII Fig. 1152
„ vera L. II 277
Alona Lindl. VII 203
Alonsoa linearis Ruiz et Pav. VI/1 6
„ petiolaris Ruiz et Pav. VI/1 6
Alopecurus L. I 216
agrestis L. I 217
aristatus Huds. I 221
arundinaceus Poir. I 217
bulbosus Gouan I 220
fulvus Sm. I 219
geniculatus L. I 219
Haussknechtianus Aschers. et Graebn. I 219
Marssonii Hausskn. I 219
Monspeliensis L. I 221
myosuroides Huds. I 217

Alopecurus nigrescens Jacq. I 218
paludosus P. B. I 219
paniceus Lam. I 221
pratensis L. I 217
repens Marsch. I 217
Ruthenicus Weinm. I 218
Turicensis Brügg. I 219
utriculatus Pers. I 216
ventricosus Pers. I 217
Winklerianus Aschers. et Graebn. I 219
Alpinia officinarum Hance II 321
Alschingera Vis. V/2 1080
actaeifolia Vis. V/2 1081
„ verticillata Vis. V/2 1081
Alsinastrum gyrospermum Rupr. V/1 541
„ triandrum Rupr. V/1 538
Alsine Wahlenb. III 389; VII 173
apetala F. G. W. Meyer III 383
aretioides M. et K. III 391
arvensis Crtz. III 418
Austriaca (Jacq.) Wahlenb. III 397
Bauhinorum Gay III 396
Bavarica Crtz. III 414
biflora (L.) Wahlenb. III 399
brevifolia Gilib. III 398, 407
caespitosa Hegetschw. III 401
Cherleri Fenzl III 392
cherlerioides Dalla Torre III 391
ciliata Crtz. III 409
decandra Rchb. III 401
densiflora Vis. III 403
Donii G. F. W. Mey. III 383
erecta Crtz. III 378
Facchini Rchb. III 401, 403
fasciculata (L.)Wahlenb. III 393
fastigiata Bab. III 393
Funkii Jord. III 390
Gerardi Willd. III 401
glandulosa Mutel III 396
grandiflora Crtz. III 406
Jacquini Koch III 393
lanceolata M. et K. III 392
laricifolia Crtz. III 395
liniflora Hegetschw. III 396
marginata C. A. Mey. III 424
marginata Schreb. III 420
marina M. et K. III 423
maritima Jess. III 383
media L. III 352
Moehringia Crtz. III 416
montana Fenzl III 390
mucronata L. III 394
Naegelii Brügg. III 403
nemorum Schreb. III 350
nodosa Crtz. III 387
octandra (Sieb.) Kern. III 391
pentandra Crtz. III 420
peploides Crtz. III 403
polycarpa Crtz. III 426
Alsine recurva All. III 402
rostrata Fenzl III 394
rubra Crtz. III 422
rupestris Fenzl III 392
saginoides Crtz. III 385
saxatilis Wahlenb. III 401
sedoides (L.) Kitt. III 392
segetalis L. III 425
serpyllifolia Crtz. III 407
setacea M. et K. III 394
striata Gren. III 395
striata (L.) Gren. III 403
stricta Wahlenb. III 399
subulata Jess. III 386
tenuifolia (L.) Crtz. III 398
trinervia Crtz. III 411
Ucranica Spreng. III 408
umbellata DC. III 377
unilateralis Steud. III 425
verna Wahlenb. III 400
viscosa Schreb. III 398
„ Villarsii (Balbis) M. et K. III 403
Alsinella ciliata S. F. Gray III 409
erecta Moench III 378
stricta Sw. III 399
„ viscosa Hartm. III 398
Alsinoideae III 272; VII 172
Alsomitra Roem. VII 208
Alstonia V/3 2049 R. Br.
constricta F. v. Muell. V/3 2050
„ scholaris (L.) R. Br. V/3 2050
Alstroemeria L. II 320
Alternanthera denticulata R. Br. VII 172
paronychioides St. Hil. III 261
„ repens Steud. VII 172
Althaea L. V/1 463; VII 188
borealis Alef. V/1 487
cannabina L. V/1 465
hirsuta L. V/1 470
officinalis L. V/1 467
pallida W. et K. V/1 464, 466
rosea Cav. V/1 464
„ Taurinensis DC. V/1 465
Althenia Fr. Petit I 120
Alvaradoa Liebm. VII 185
Alyssoides Adans. IV/1 460; VII 178
grandiflora (Hook.) IV/1 460
sinuatum Pair. IV/1 460
„ utriculatum (L.) Med. IV/1 460
Alyssum L. IV/1 445; VII 178
alpestre Jacq. IV/1 455
alpestre L. IV/1 451
alpinum Scop. IV/1 143
Alyssoides L. IV/1 448
angustifolium Wirtg. IV/1 451
Arduini Fritsch IV/1 452
arenarium Gmel. IV/1 451
argenteum All. IV/1 446
Bernhardii Wettst. IV/1 455, 456
calycinum L. IV/1 448
campestre L. IV/1 446
campestre Reichard IV/1 448
Alyssum clypeatum L. IV/1 456
Corsicum Duby IV/1 446
cuneifolium Ten. IV/1 455
dasycarpum Steph. IV/1 446
desertorum Stapf IV/1 454
diffusum Nym. IV/1 449, 451
edentulum W. et K. IV/1 447
erigens Jord. et Fourr. IV/1 451
flexicaule Jord. IV/1 455
Gemonense L. IV/1 447
Gmelini Jord. IV/1 451
Heinzii Ullep IV/1 455
incanum L. IV/1 458
latifolium Vis. IV/1 447
macrocarpum Rouy IV/1 447
maritimum Lam. IV/1 447
microcarpum Vis. IV/1 447
micropetalum Fisch. IV/1 446
minimum Willd. IV/1 454
montanum L. IV/1 449
Ovirense A. Kern. IV/1 455
paniculatum Willd. IV/1 371
petraeum Ard. IV/1 447
Podolicum Bess. IV/1 374
repens Baumg. IV/1 446
Rochelii Rchb. IV/1 456
rostratum Steven IV/1 446
sativum Scop. IV/1 368
saxatile L. IV/1 452
sinuatum L. IV/1 460
strigosum Sol. IV/1 446
Styriacum Jord. et Fourr. IV/1 454
Transsilvanicum Schur IV/1 454
utriculatum L. IV/1 460
Vindobonense Beck IV/1 454
Wulfenianum Bernh. IV/1 455, 456
Amaracus Gleditsch V/4 2339
Hill V/4 2333
Dictamnus (L.) Benth. V/4 2333
Majorana Schinz et Thellung V/4 2334
pulcher (Boiss. et Heldr.) V/4 2333
Sipyleis (L.) Briq. V/4 2333
Tournefortii (Sibth.) Benth. V/4 2333
Amarantaceae III 260; VII 171
Amarantus L. III 261; VII 171
acutilobus Uline et Bray III 263
albus L. III 263
ascendens Loisel. III 264
blitoides S. Watson III 263
Blitum L. partim III 264
caudatus L. III 262
chlorostachys Willd. III 262
crispus Terracc. III 263
deflexus L. III 263
gracilis Desf. III 263
graecizans L. III 263
hybridus L. III 262

Amarantus macrocarpus Benth. III 263
melancholicus L. III 263
paniculatus L. III 262
prostratus Balb. III 263
Quitensis H. B. et Kth. III 263
retroflexus L. III 264
silvester Desf. III 265
spicatus Lam. III 260
spinosus L. III 263
viridis All. III 265
viridis L. III 264
vulgatissimus Spegazzini III 263
Amaryllidaceae II 306; VII 162
Amaryllioideae VII 162
Amaryllis L. VII 162
Amberboa moschata DC. VI/2 937
Ambrosia L. VI/1 496; VII 211
aptera DC. VI/1 497
artemisiifolia L. VI 1 497 VII 211
bidentata Michx. VI/1 497
elatior L. VI/1 497
maritima L. VI/1 497
pilostachya DC. VII 211
polystachya DC. VI/1 497
„ tenuifolia Spreng. VI/1 497
Ambrosiaceae VI/1 527
Amelanchier Med. IV/2 755; VII 181
alnifolia Nutt. IV/2 756
„ Amelanchier Karst. IV/2 756
„ Canadensis (L.) Torrey et Gray IV/2 756
ovalis Medikus IV/2 756
rotundifolia Dum.-Cours. IV 2 756
sanguinea Lindl. IV/2 756
spicata (Lam.) Decne. IV/2 755
„ vulgaris Moench IV/2 756
Amelancus F. v. Muell. IV/2 755; VII 181
Amelia media Alef. V/3 1583
„ minor Alef. V/3 1577
Amentotaxus Pilger VII 150
Amherstia nobilis Wallr. IV/3 1130
Amicia Zygomeris DC. IV/3 1462
Ammadenia peploides Rupr. III 403
Ammannia L. V/2 741
„ baccifera L. V/2 744
Ammi L. V/2 1170; VII 194
Boeberi Hökert V/2 1171
Copticum L. V/2 1167
diversifolium Noulet V/2 1171
elatum Salisb. V/2 1171
falcaria Börner V/2 1177
ferulaceum Lk. V/2 1315
glaucifolium L. V/2 1173
intermedium DC. V/2 1172
maius L. V/2 1171
Visnaga (L.) Lam. V/2 946, 1170
Ammiaceae Presl V/2 926; VII 193
Ammineae V/2 951; VII 194
Ammios muricata Moench V/2 1168
Ammobium alatum R. Br. VI/1 494
„ spathulatum Gaudich. VI/1 495
Ammoides verticillata (Desf.) Briq. V/2 1175
Ammophila Host I 236; VII 154
arenaria Roth I 237
arundinacea Host I 237
australis Porta et Rigo I 236
Baltica Lk. I 236
Amomum Melegueta Rosc. II 321
Amorpha canescens Nutt. IV/3 1385
fruticosa L. IV/3 1385
Amorphophallus Bl. VII 157
Ampelidaceae V/1 350; VII 187
Ampelopsis Michx. V/1 355, 356; VII 187
aconitifolia Bunge V/1 355
arborea Koehne V/1 356
brevipedunculata (Maxim.) Koehne V/1 355
cordata Michx. V/1 355
heterophylla Sieb. et Zucc. V/1 355
Japonica C. K. Schneid. V/1 355
megalophylla Diels et Gilg V/1 356
Orientalis (Lam.) Planch. V/1 355
quinquefolia Michx. V/1 358
serjaniaefolia Franch. et Sav. V/1 355
tricuspidata Sieb. et Zucc. V/1 357
Amphicarpa Ell. VII 183
Amphirrhox longifolia Spreng. V/1 586
Amphisphaeriaceae VII 141
Amsinckia Lehm. V/3 2127
angustifolia Lehm. V/3 2127
intermedia A. Gray V/3 2127
intermedia Fisch. et Mey. V/3 2127
lycopsoides auct. V/3 2127
lycopsoides Lehm. V/3 2127
Menziesii (Lehm.) Nelson et Macbridge V/3 2127
Amygdalaceae IV/2 1053; VII 181
Amygdaleae IV/2 667; VII 181
Amygdalopsis virgata hort. IV/2 1085
Amygdalus L. IV/2 1053; VII 181
Amygdalus (L.) Focke IV/2 1084
argentea Lam. IV/2 1085
communis L. IV/2 1086
nana L. IV/2 1085
Orientalis Mill. IV/2 1085
Persica L. IV/2 1091
„ persicoides Zabel IV/2 1096
Amyris balsamifera L. V/1 54
Anabasis L. VII 171
Anacampseros L. III 268
Anacampseros vulgaris Haw. IV/2 524
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. II 334; VII 164
„ Weberi M. Schulze II 335
Anacardiaceae V/1 213; VII 186
Anacardium Occidentale L. V/1 215
„ Rhinocarpus DC. V/1 216
Anacharis alsinastrum Bab. I 160
Anacyclus aureus Lam. VI/2 624
„ officinarum Hayne VI/2 673
Anagallidaceae V/3 1715; VII 196
Anagallidiastrum exiguum Bub. V/3 1873
Anagallis (Tournef.) L. V/3 1868; VII 197
amoena Heldr. V/3 1870
aquatica Erndl. V/3 1875
Arabica Duby V/3 1869
arvensis L. V/3 1869
arvensis L. subsp. phoenicea (Scop.) Schinz et Keller V/3 1869
carnea Schr. V/3 1870
Centunculus Afzel. V/3 1873
Dörfleri Ronn. V/3 1870
foemina Mill. V/3 1869, 1870
Indica Sweet V/3 1869
maritima J. G. Gmel. V/3 1875
mas Vill. V/3 1869
Monelli Bieb. V/3 1869
Monelli L. V/3 1868
orientalis hort. V/3 1869
parviflora Loisel. V/3 1869
pulchella Salisb. V/3 1869
punctifolia Stokes V/3 1869
pusilla Salisb. V/3 1873
repens Pom. V/3 1871
serpyllifolia Dum. V/3 1871
tenella (L.) Murr. V/3 1871
„ verticillata All. V/3 1870
Anagyris foetida L. IV/3 1146
Anamirta Cocculus (L.) Wight et Arnold IV/1 16
Ananas sativus Lindl. II 143; I/CLII Fig. 286
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. VI/1 494
Anarrhinum Desf. VI/1 30; VII 204
bellidifolium Desf. VI/1 30; VI/2 1360
Anastatica hierochuntica Crtz. IV/1 463
hierochuntica L. IV/1 70
„ Syriaca L. IV/1 463
Anchietea St. Hil. VII 190
Anchusa L. V/3 2197; VII 200
amoena Gaertn. V/3 2201
angustifolia auct. V/3 2200
angustifolia Lehm. V/3 2200
angustifolia Rchb. V/3 2201
angustifolia Sibth. et. Sm. V/3 2198
angustissima C. Koch V/3 2198

Anchusa annua Pall. V/3 2198
argentea L. V/3 2147
arvalis Rchb. V/3 2200
arvensis Bieb. V/3 2203
arvensis Tsch. V/3 2200
azurea Mill. V/3 2201
Barrelieri (All.) Vitm. V/3 2198
Capensis Thunb. V/3 2198
Cesatiana Fenzl V/3 2216
echioides Bieb. V/3 2128
hybrida Ten. V/3 2198
Italica Retz. V/3 2201
leptophylla Koch V/3 2200
leptophylla Ledeb. V/3 2198
lutea Bieb. V/3 2208
lutea Cavanilles V/3 2173
lycopsoides Bess. V/3 2200
nonneoides Fisch. et Mey. V/3 2198
ochroleuca Bieb. V/3 2198
officinalis L. V/3 2199
orientalis Rchb. f. V/3 2204
ovata Lehm. V/3 2204
paniculata Aiton V/3 2201
perlata Lam. V/3 2202
procera Bess. V/3 2198
pulla Bieb. V/3 2206
pusztarum Borb. V/3 2205
rhizochroa Viv. V/3 2205
rosea Bieb. V/3 2205
sempervirens L. V/3 2198
stylosa Bieb. V/3 2198
tinctoria Desf. V/3 2205
tuberculata Forsk. V/3 2205
undulata V/3 2198
variegata Lehm. V/3 2202
verrucosa Ten. V/3 2203
„ versicolor Stev. V/3 2205
Anchusopsis longiflora Bisch. V/3 2147
Ancistrocladaceae V/1 493; VII 190
Ancistrocladineae VII 190
Andira Araroba Aguiar IV/3 1496
Andreacaceae VII 145
Andreaeales VII 145
Andromeda L. V/3 1651
axillaris Lam. V/3 1651
caerulea L. V/3 1621
calyculata L. V/3 1654
Catesbaei Walt. V/3 1651
formosa Wall. V/3 1651
ligustrina (L.) Muehl. V/3 1651
lucida Jacq. V/3 1651
Mariana L. V/3 1651
nitida Bartr. V/3 1651
polifolia L. V/3 1651
pulverulenta Bartr. V/3 1651
racemosa L. V/3 1651
„ tetragona L. V/3 1621
Andropogon L. I 182; VII 153
Allionii Lam. et DC. I 184
angustifolius Sm. I 182
Bellardii Bubani I 184
cernuus Roxb. I 185
Andropogon contortus L. I 184
gryllus L. I 183
„ saccharatus Kth. I 185
Andropogoneae I 185; VII 153
Androsace L. V/3 1789; VII 196 u. 95 Fig. 1123
acaulis hort. V 3 1814
alpina Gaud. V/3 1796
alpina (L.) Lam. V/3 1800
Altaica C. Koch V/3 1805, 1806
aretia Lapeyr. V/3 1795
aretia Vill. V/3 1800
aretioides Heer V/3 1806
argentea Lap. V/3 1794
articulata Schur V/3 1804
Bocconi hortul. V/3 1812
brevifolia Vill. V/3 1806
brevis (Hegetschw.) Cesati V/3 1797
bryoides DC. V/3 1795
bryoides Loisel. V/3 1795
carnea L. V/3 1807
Chaixii Gren. u. Godr. V 3 1816
Chamaejasme Wulf. V/3 1802, 1806
Charpentieri Heer V/3 1797
Diapensia Vill. V/3 1795
Ebneri Kern. V/3 1816
elongata L. V/3 1812
elongata Rich. V 3 1814
Escheri Brügg. V/3 1816
farinosa Spreng. V/3 1754
foliosa Duby V/3 1792
glacialis Hoppe V/3 1800
Hausmannii Leyb. V/3 1799; VII 196
hedraeantha Griseb. V/3 1808
Heeri Koch V/3 1816
Helvetica (L.) Gaud. V/3 1795
hybrida Kern. V/3 1816
imbricata Lam. V/3 1793
Lachenalii Gmel. V/3 1806, 1808
lactea L. V/3 1809; VII 196
lactea Vill. V/3 1806
lactiflora Kar. et Kir. V/3 1814
lactiflora Pall. V/3 1792
lanuginosa Wall. V/3 1792
Lehmanniana Spreng. V/3 1802
linearis Grah. V/3 1814
longiscapa C. Koch V/3 1802
lutea Lam. V/3 1788
maxima L. V/3 1810
multiflora Lam. V/3 1814
multiflora (Vand.) Moretti V/3 1793
obtusifolia All. V/3 1806
odoratissima Schreb. V/3 1804
Pacheri Leyb. V/3 1797
pauciflora Vill. V/3 1809
Pedemontana Rchb. V/3 1816
penicillata Schott V/3 1804
Pennina Gaud. V/3 1800
primuloides Moench V/3 1817
Androsace pubescens DC. V/3 1796
rosea Jord. V/3 1808
sarmentosa Wall. V/3 1792
sarmentosa Wall. var. Chumby hort. V/3 1792
sempervivoides Jacquem V/3 1792
septentrionalis L. V/3 1793, 1814
Tauscheri Gand. V/3 1810
Tirolensis F. Wettst. V/3 1801 VII 196
Turczaninowii Freyn V/3 181
Vandellii Chiov. V/3 1793
villosa Jacq. V/3 1802
villosa L. V/3 1804
Vitaliana Rchb. V/3 1787
„ Wulfeniana Sieb. V/3 1797
Androsaceae V/3 1728; VII 196
Androsaemum officinale All. V/1 511
„ vulgare Gaertn. V/1 511
Andryala integrifolia L. VI/2 1134
Aneimia Sw. VII 148
Anemiopsis Californica Hook. et Arn. III 209
Anemogrostis interrupta Trin. I 22
spica venti Trin. I 228
Anemone L. III 517; VII 174
alba Gilib. III 522
albida Mariz III 521
alborosea Gilib. III 530
alpina L. III 531
alpina Scop. III 524
Apennina L. III 518
apiifolia Scop. III 532
Baldensis Turra III 524
Bogenhardiana Pritz. III 535
Bolzanensis Hay. III 539
collina Salisb. III 535
coronaria L. III 518
decapetala L. III 518
Drummondii Wats. III 527
Emiliana F. O. Wolf. III 540
flava Gilib. III 520
fragifera Wulf. III 524
fulgens Gáyer III 518
glacialis Clairv. III 533
Hackelii Maly III 534
Hackelii Pohl III 539
Halleri All. III 533
Halleri Tausch III 539
Hepatica L. III 528
hirsuta Gilib. III 525
hortensis L. III 518; V/3 1849
hybrida Keil III 539
Japonica (Thunb.) Sieb. et Zucc. III 518
intermedia (Lasch) G. Don III 539
intermedia Schult. III 538
intermedia Winkler III 539
Lipsiensis Beck III 539
lutea Lam. III 520

Anemone Mexicana Humb., Bonpl. et Kth. III 518
mixta Halascy III 539
montana Hoppe III 537
narcissiflora L. III 527
nemorosa L. III 522; VII 88 Fig. 1119
nemorosa Mariz III 521
nigricans Fritsch III 538
ochroleuca Brügg. III 540
patens (Mill.) L. III 534 VII 175
Pavoniana Boiss. III 524
pavonina Lam. III 518
pedata Raf. III 522
pinnatifida Dulac III 533
Pittonii Glowacki III 539
praecox Salisb. III 528
pratensis L. III 538 VII 174 Fig. 1217
pratensis L. subsp. nigricans (Störck.) Kern. III 538
pratensis Pall. III 525
pratensis With. III 535
propinqua (Lasch) G. Don III 539
pseudopatens Schur III 53
Pulsatilla Host III 537
Pulsatilla L. III 535
Pulsatilla L. subsp. grandis (Wender.) Gürke III 537
quinquefolia L. III 522
ranunculoides L. III 520
rivularis Hamilton III 518
Seemeni Camus III 539
silvestris L. III 525; VII 174
spuria Camus III 539
Stiriaca Hay. III 534
sulphurea L. III 532
Transsilvanica (Fuss) Heuff. III 518
trifolia L. III 521
triloba Stok. III 528
umbellata Lam. III 527
vernalis L. III 530
Vindobonensis Beck III 539
Virginiana L. III 518
vitifolia Hamilton III 518
Wilczekii F. O. Wolff III 540
Anemonoideae VII 174
Anemonopsis macrophylla Sieb. et Zucc. III 453
Anethum L. V/2 1290; VII 194
arvense Salisb. V/2 1291
dulce DC. V/2 1287
faeniculum Clairv. V/2 1284
graveolens L. V/2 1291
Panmorium Roxb. V/2 1287
Pastinaca Wibel V/2 1405
„ piperitum Ucria V/2 1286
Aneulophus Benth. VII 184
Angelica L. V/2 1331; VII 194
altissima L. V/2 1401
aquilegifolia Lam. V/2 1465
Angelica arcangelica All. V/2 1338
Archangelica L. V/2 1338
chaerophyllea Lottermoser V/2 1329
elatior Fritsch V/2 1336
Fischeri Spreng. V/2 1326
graveolens Steud. V/2 1291
Jllyrica K. Maly V/2 1337
Levisticum All. V/2 1349
litoralis Fries V/2 1342
maior Gilib. V/2 1338
montana Brot. V/2 1336
nemorosa Ten. V/2 1336
Norvegica Nyman V/2 1342
officinalis Bernh. V/2 1397
officinalis Moench V/2 1338
paludapifolia Lam. V/2 1350
palustris (Bess.) Hoffm. V/2 1345
Pančićii K. Maly V/2 1336
paniculata Lam. V/2 1299
Pyrenaea (L.) Spr. V/2 1347
Razulii All. V/2 1336
sativa Mill. V/2 1338
silvestris L. V/2 1333
verticillaris L. V/2 1401
„ villosa Lag. V/2 1336
Angelonia Humb. et Bonpl. VII 204
Angiospermae I 109; VII 152
Anguria Plum. VII 208
Anhalonium Lewinii Hennings V/2 684
Anidrum Necker V/2 1074
„ radians O. Kuntze V/2 1075
Anisactis Dulac V/2 1154
„ segetalis Dulac V/2 1154
Anisoderis rubra Cass. VI/2 1135
Anisophyllea R. Br. V/2 769
Anisum Ludwig V/2 1196
Creticum Calestani V/2 1198
officinarum Moench V/2 1209
„ vulgare Gaertn. V/2 1209
Annesorrhiza Capensis Cham. et Schlecht. V/2 943
Anoda cristata Schlechtend. V/1 456
Dillemana Willd. V/1 456
hastata (Willd.) Cav. V/1 456
„ lavateroides Med. V/1 456
Anona Cherimolia Mill. IV/1 14
muricata L. IV/1 14
squamosa L. IV/1 14
Anonaceae IV/1 14; VII 175
Anosmia Bernh. V/2 1077
Anserina ficifolia Montand. III 228
foetida Montand. III 221
muralis Montand. III 223
urbica Montand. III 224
Antennaria Gaertn. VI/1 455; VII 209
alpina Gaertn. VI/1 455
Carpatica Bluff et Fing. VI/1 455
Carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fing. VI/1 457
dioeca Gaertn. VI/1 456
Leontopodium Gaertn. VI/1 458
Antennaria margaritacea R. Br. VI/1 494
Anthe-Matricaria Čelakovskyi Geisenheyner VI/2 590
Gruetteriana Aschers. VI/2 590
„ Hampeana Geisenh. VI/2 590
Anthemideae VI/2 672; VII 211
Anthemis L. VI/1 535; VII 211
adulterina Wallr. VI/1 544
agrestis Wallr. VI/1 541
alpina L. VI/2 551
altissima L. VI/1 535
arvensis L. VI/1 541
Austriaca Jacq. VI/1 539
Austriaca Ten. VI/1 538
Bollei Schultz-Bip. VI/1 544
Carpatica Willd. VI/1 540
Cota L. VI/1 535
Cotula L. VI/1 544
frutescens hort. VI/2 596
Gerardiana Jord. VI/1 539
grandiflora Host VI/1 540
Kitaibelii DC. VI.1 540
Kitaibelii Spr. VI/1 539
ligustica All. VI/2 1366
mixta L. VI/1 535
montana L. VI/1 539
montana Sibth. et Sm. VI/1 540
Neilreichii Ortmann VI/1 542
nobilis L. VI/1 536
ochroleuca Čelak. fil. VI/1 544
Ormenis DC. VI/1 535
parthenoides Bernh. VI/2 596
Pontica Willd. VI/1 539
Pyrethrum Desf. VI/2 673
rigescens Willd. VI/1 535
Ruthenica Bieb. VI/1 542
semperflorens Schrank VI/1 524
Styriaca Vest VI/1 540
tinctoria L. VI/1 537
Triumfetti (L.) DC. VI/1 538
Wiedemanniana Fisch et Mey. VI/1 536
Anthericum L. II 201; VII 159
autumnale Scop. II 248
bifolium Scop. II 247
calycinum Braun II 189
calyculatum L. II 189
Liliago L. II 203
liliastrum L. II 200
non ramosum Gilib. II 203
ossifragum L. II 191
ramosum L. II 202
serotinum L. II 213
„ sulphureum W et K. II 255
Anthistiria I 186
Anthocerotaceae VII 144
Anthocerotales VII 144
Antholyza L. II 306; VII 163
Anthophyta VII 150
Anthoxanthum L. I 198; VII 154
aculeatum L. f. I 209
aristatum Boiss. I 200
odoratum L. I 198

Anthoxanthum Puelii Lecoq et Lamotte I 200
Anthriscus Pers. V/2 1014; VII 193
abortiva Jordan V/2 1023
alpestris Wimm. et Grab. V/2 1023
alpina Mutel V/2 1020
Anatolica Boiss. V/2 1026
Anthriscus Karsten V/2 1030
Caucalis Bieb. V/2 1030
Cerefolium Hoffm. V/2 1027
chaerophylla St. Lag. V/2 1027
chaerophyllea Druce V/2 1030
dubia Kab. V/2 1023
fumarioides Spreng. V/2 1026
heterosantha Schur V/2 1023
Hispanica Rouy V/2 1031
humilis Bess. V/2 1023
macrocarpa Boiss. et Heldr. V/2 1026
neglecta Boiss. et Reut. V/2 1031
nemorosa Spreng. V/2 1025
nitida Garcke V/2 1023
nodosa Pers. V/2 994
pilosa Schur V/2 1020
rivularis Vukot. V/2 1009
sativa Bess. V/2 1029
Scandix Aschers. V/2 1030
Scandix Bieb. V/2 994
Sicula Presl V/2 1025
Sicula Vis. V/2 1026
silvestris Hoffm. V/2 1017
torquata Duby V/2 1020
torquata Heuff. V/2 1023
trachysperma Rchb. V/2 1029
trichosperma Spr. V/2 1028
tuberculata R. et Sch. V/2 1026
villosa Boiss. V/2 1026
vulgaris Bernh. V/2 1051
„ vulgaris Pers. V/2 1030
Anthurium L. II 131; VII 157
Anthyllis L. IV/3 1352; VII 182
affinis Brittinger IV/3 1359
alpestris Hegetschw. et Heer IV/3 1358
alpestris Rchb. IV/3 1359
alpicola Brügg. IV/3 1358
Barba Jovis IV/3 1353
Carpatica Pantocsek IV/3 1359
coccinea L. IV/3 1362
Dillenii Schultes IV/3 1361
Erinacea L. IV/3 1148
Jacquini Kern. IV/3 1354
Lotus L. IV/3 1364
maritima Schweigg. IV/3 1360
montana L. IV/3 1353
pulchella Rouy IV/3 1362
tetraphylla L. IV/3 1353
tricolor Sag. IV/3 1362
„ Vulneraria L. IV/3 1355
Antiaris toxicaria Lesch. III 123
Antidesma venosum Tul. V/1 120
Antigonum Endl. III 166; VII 171
Antigonum leptopus Hook. et Arn. III 166
Antiphylla biflora Haw. IV/2 577
caerulea Haw. IV/2 579
oppositifolia Fourr. IV 2 579
„ retusa Haw. IV/2 582
Antirrhinoideae VI/1 5; VII 203
Antirrhinum L. VI/1 18; VII 204
alpinum L. VI/1 21
arvense L. VI/1 23
bellidifolium L. VI/1 30
Cymbalaria L. VI/1 27
Elatine L. VI/1 28
genistifolium L. VI/1 26
Linaria L. VI/1 25
maius L. VI/1 19; I/CXX; VII 82
minus L. VI/1 29
Monspessulanum L. VI/1 22
odorum Bieb. VI/1 24
Orontium L. VI/1 20; VI/2 1360
simplex Willd. VI/1 23
„ spurium L. VI/1 28
Anurus linifolius Presl IV/3 1608
„ Nissolia E. Mey. IV/3 1608
Apargia alpina Willd. VI/2 1021
aurantiaca W. et K. VI/2 1023
aurea Host VI/2 1147
autumnalis Hoffm. VI/2 1018
Berinii Bartl. VI/2 1024
canescens Sieb. VI/2 1024
crispa Willd. VI/2 1025
crocea Willd. VI/2 1021, 1023
Haenkii Sternb. VI/2 1023
hispida Host VI/2 1028
hyoseridifolia Less. VI/2 1142
incana Scop. VI/2 1030
Taraxaci Willd. VI/2 1020
tenuiflora Gaud. VI/2 1031
„ Tergestina Hoppe VI/2 1025
Apeibea Tibourbou Aubl. V/1 428
Apenula Neck. VI/1 366
Apera interrupta L. I 229
„ spica venti Pal. I 228
Aphaca vulgaris Presl IV/3 1590
Aphanes arvensis L. IV/2 943, 946
Aphanochaetaceae VII 138
Aphelandra nitens Hook. VI/1 177
„ sulphurea Hook. VI/1 177
Aphyllanthes Monspeliensis L. VII 159
Apiaceae Lindley V/2 926; VII 193
Apicra Willd. II 277
Apinella Neck. V/2 1131
„ Kitaibelii Calestani V/2 1136
Apioideae V/2 954; VII 193
Apios tuberosa Moench IV/3 1625
Apium L. V/2 1139; VII 194
alpinum Car. V/2 1190
Ammi Crtz. V/2 1171
ammoides Calestani V/2 1175
Amomum Stok. V/2 1162
Anisum Crtz. V/2 1209
Berula Car. V/2 1217
Apium biternatum Stok. V/2 1212
Bulbocastanum Car. V/2 119
Carvi Crtz. V/2 1182
Celleri Gaertn. V/2 1142
dulce Mill. V/2 1144
ferulaceum Car. V/2 1190
glaucum Crtz. V/2 1132
graveolens L. V/2 1142
hortense E. H. L. Krause V/1155
inundatum (L.) Rchb. fil. V/1152
iunceum Stok. V/2 1154
Kitaibelii Jess. V/2 1136
laetum Salisb. V/2 1155
latifolium Miller V/2 1158
lobatum Gilib. V/2 1142
Lusitanicum Mill. V/2 1144
maritimum Salisb. V/2 1142
montanum Car. V/2 1190
Moorei (Syme) Druce V/2 115
nodiflorum (L.) Lag. V/2 114
peregrinum Crtz. V/2 1197
petraeum Crtz. V/2 1173
Petroselinum L. V/2 1155
Pimpinella Car. V/2 1199
Podagraria Car. V/2 1212
pumilum Crtz. V/2 1132
rapaceum Mill. V/2 1144
repens Rchb. fil. V/2 1150
saxifragum Calestani V/2 1202
segetum Dumort. V/2 1154
Sisarum Calestani V/2 1222
Sium Crtz. V/2 1217
tenuifolium (Moench) Thellung V/2 1140
tuberosum Steud. V/2 1158
verticillatum Car. V/2 1187
Visnaga Crtz. V/2 1170
vulgare Bubani nec Lam. V/2 1142
„ vulgare Lam. V/2 1155
Apocynaceae V/3 2048; VII 198
Apocynum androsaemifolium L. V/3 2050
Canadense V/3 2050
„ cannabinum L. V/3 2050
Apodicarpum Makino V/2 1140
Aponogeton distachyus L. I 164
fenestralis Hook. f. I 164
„ monostachyus L. I 164
Aponogetonaceae I 164; VII 152
Aporocactus flagelliformis (L.) Lemaire V/2 692
Aposeris Neck. VI/2 1002; VII 212
„ foetida (L.) Less. VI/2 1002
Apostasiaceae VII 163
Aquifoliaceae V/1 233; VII 186
Aquilaria L. V/2 700
Aquilegia L. III 480; VII 174 u. 9 Fig. 987 e, f
alpina Haenke III 482
alpina L. III 482
atrata Koch III 482

Aquilegia Bauhini Schott III 483
Canadensis L. III 480
chrysantha A. Gray III 480
confusa Rota III 483
cornuta Gilib. III 481
Ebneri Zimm. III 481
Einseleana F. W. Schultz (nicht Schulz) III 483
Haenkeana Koch III 482
montana Sternb. III 482
nigricans Baumg. III 482
nigricans Rchb. III 482
Portae Hut. III 484
Pyrenaica Koch III 483
silvestris Neck. III 481
Skinneri Hook. III 480
Sternbergii Rchb. III 482
thalictrifolia Schott et Kotschy III 484
versicolor Salisb. III 481
viscosa Rchb. III 484
vulgaris L. III 481
vulgaris L. subsp. atroviolacea Avé-Lall. III 482
Arabidium Spach IV/1 395
Arabidopsis Heynh. IV/1 392; VII 178
pinnatifida Rupr. IV/1 157
Thaliana (L.) Heynh. IV/1 392
Arabis L. IV/1 395; VII 178
albida Stev. IV/1 396
alpestris Rchb. IV/1 404
alpina L. IV/1 415
alpina L. subsp. crispata (Willd.) Wettst. IV/1 416
arcuata Shuttl. IV/1 404
arenosa Scop. IV/1 421
aubretioides Boiss. IV/1 396
auriculata Lam. IV/1 400
bellidifolia Jacq. IV/1 414
brassicaeformis Wallr. IV/1 399
caerulea All. IV/1 411
Caucasica Willd. IV/1 396
ciliata Murbeck IV/1 410
contracta Spenn. IV/1 403
corymbiflora Vest IV/1 404
Crantziana Ehrh. IV/1 419
digenea Fritsch IV/1 419
flavescens Griseb. IV/1 396
Freynii Brügg. IV/1 422
Gerardi Bess. IV/1 403
Halleri L. IV/1 423
hirsuta (L.) Scop. IV/1 403
hirsuta (L.) Scop. subsp. glabra L. IV/1 404
hirsuta (L.) Scop. subsp. planisiliqua (Pers.) Thell. IV/1 404
hirsuta (L.) Scop. subsp. sagittata Rchb. IV/1 403
hispida Aiton IV/1 407
hispida L. IV/1 419
hybrida Reut. IV/1 418
Arabis Jacquinii Beck IV/1 414
incana Moench IV/1 415
incana Roth IV/1 415
incana Willd. IV/1 406
Kochii Jord. IV/1 404
mollis A. Kern. IV/1 408
muralis Bert. IV/1 406
muralis Bert. subsp. collina (Ten.) Thellung IV/1 407
Murrii Khek IV/1 418
neglecta Schult. IV/1 425
nemorensis Wolf IV/1 404
nova Villars IV/1 402
nutans Moench IV/1 413
Ovirensis Wahlenb. IV/1 425
Palezieuxii Beauv. IV/1 417
patula Wallr. IV/1 400
pauciflora (Grimm) Garcke IV/1 399
pendula L. IV/1 396
perfoliata Lam. IV/1 393
petraea (L.) Lam. IV/1 419
praecox Willd. IV/1 410
procurrens W. et K. IV/1 410
pumila Jacq. IV/1 413
Raetica Brügg. IV/1 418
recta Baumg. IV/1 410
saxatilis All. IV/1 402
scabra All. IV/1 407
Scopoliana Boiss. IV/1 410
Scopolii Freyn et Brandis IV/1 410
serpyllifolia Vill. IV/1 408
stricta Huds. IV/1 407
subnivalis Brügg. IV/1 418
Sudetica Tausch IV/1 404
Thaliana L. IV/1 392
Thomasii Thell. IV/1 418
Turrita L. IV/1 398
umbrosa Crtz. IV/1 398
undulata Lk. IV/1 416
verna (L.) R. Br. IV/1 396
„ Vochinensis Spr. IV/1 408
Araceae II 131; VII 157
Arachis hypogaea L. IV/3 1463; VII 60, Fig. 1096
Arachnites Bertolonii Tod. II 332
Aracium alpinum Monn. VI/2 1099
„ paludosum Monn. VI/2 1153
Aralia Chinensis L. V/2 913
cordata Thunb. V/2 913
hispida Vent. V/2 913
Japonica hort. V/2 913
Japonica Thunb. V/2 914
papyrifera Hook. V/2 914
racemosa L. V/2 913
Sieboldii hort. V/2 913
„ spinosa L. V/2 913
Araliaceae V/2 910; VII 193
Araucaria Araucana (Molina) K. Koch VII 150
excelsa R. Br. I 81; VII Fig. 1081
imbricata Pav. I 81
Araucariaceae VII 150
Arbutoideae V/3 1610; VII 196
Arbutus L. V/3 1664
alpina L. V/3 1661
Andrachne L. V/3 1664
andrachnoides Lk. V/3 1664
integrifolia Lam. V/3 1664
Menziesii Pursh V/3 1664
mucronatus L. V/3 1621
Sieberi Klotzsch V/3 1664
tomentosa Pursh V/3 1656
Unedo L. V/3 1665
uva-ursi L. V/3 1656
„ vulgaris Bub. V/3 1665
Arceuthobium oxycedri (DC.) Bieb. III 145; VII 170
Arceuthos Antoine et Kotschy VII 151
Archangelica Hoffm. V/2 1331; VII 194
alpina Simonkai V/2 1342
Archangelica Karst. V/2 1338
litoralis Agardh V/2 1342
Norvegica Rupr. V/2 1342
officinalis Hoffm. V/2 1338
sativa Bess. V/2 1338, 1342
„ Slavica Reuss. V/2 1342
Archegoniatae VII 144
Archichlamydeae III 6; VII 212
Archidiales VII 145
Archimycetes VII 139
Archispermae VII 150
Arcterica Cov. VII 196
Arctium L. VI/2 825; VII 212
ambiguum Beck VI/2 834
Austriacum Teyber VI/2 831
Bardana Willd. VI/2 832
Carduelis L. VI/2 853
Cimbricum (E. H. L. Krause) Hay. VI/2 834
edule hort. VI/2 829
Lappa L. VI/2 827
Maassii M. Schulze VI/2 834
macrospermum Hay. VI/2 829
majus Bernh. VI/2 827
minus (Hill) Bernh. VI/2 831
mixtum Nym. VI/2 834
nemorosum Lej. et Court. VI/2 829
nothum Weis. VI/2 834
Personata L. VI/2 856
pubens Bab. VI/2 834
„ tomentosum Mill. VI/2 832
Arctomecon Torr. VII 176
Arctostaphylos Adans. V/3 1656; VII 196
alpina (L.) Spr. V/3 1661
Manzanita Parry V/3 1656
Nevadensis Gray V/3 1656
officinalis Wimm. et Grab. V/3 16
procumbens E. Mey. V/3 1657
tomentosa Dougl. V/3 1656
Uva-ursi L. V/3 1656

Arctotideae VI/2 806; VII 212
Arctotis aspera L. VI/2 806
„ micrantha Thunb. VI/2 806
Arctous alpina Niedenzu V/3 1661
Ardisia crispa (Thunb.) DC. V/3 1715
Japonica (Thunb.) Blume V/3 1715
„ paniculata Roxb. V/3 1715
Ardisiandra Hook. V/3 1728
Areca catechu L. II 130
Aremonia Neck. IV/2 929; VII 181
Agrimonioides DC. IV/2 929
„ agrimonioides Nestl. IV/2 929
Arenaria L. III 405; VII 173
alpina Kern. III 407
arvensis Wallr. III 418
Austriaca All. III 403
Austriaca Jacq. III 397
Baldensis Rchb. III 414
Bavarica L. III 414
biflora L. III 408
campestris All. III 422
capillacea All. III 406
Cherleria Ard. III 392
cherlerioides Portenschlag III 391
ciliata L. III 409
controversa Boiss. III 405
fasciculata L. III 393
flaccida All. III 403
Gothica Fries III 410
graminifolia Schrad. III 408
grandiflora L. III 406
holosteoides Edgew. III 405
Jurana Genty III 410
leptoclados Guss. III 407
liniflora L. III 396
liniflora Willd. III 406
litoralis Salisb. III 403
marginata DC. III 424
marina All. III 424
marina Roth III 423
Marschlinsii Koch III 407
media L. III 423, 424
media Poll. III 420
moehringioides Murr. III 410
muscosa Med. III 416
nervosa Lam. III 411
occulta Fisch. III 399
pentandra Wallr. III 419
peploides L. III 403
polygonoides Wulf. III 416
Ponae Rchb. III 414
procera Spr. III 408
pulposifolia Zois III 413
recurva All. III 402
rostrata Pers. III 394
saxatilis Roth III 400
Scandinavica Spr. III 399
segetalis Lam. III 425
serpyllifolia L. III 407
setacea Thuill. III 394
Arenaria sphagnoides Froel. III 416
sphagnoides Thom. III 399
striata L. III 395
tenuifolia L. III 398
thesiifolia Fröl. III 416
triflora Vill. III 403
trinervia L. III 411
uliginosa Schleich. III 399
umbellata Clairv. III 377
verna L. III 400
villosa Wulf. III 413
„ Wulfenii Steud. III 413
Areoliflorae VII 190
Aretia Gaud. V/3 1787
alpina Bub. V/3 1796
alpina L. V/3 1800
argentea Gaertn. V/3 1793
auriculata Lk. V/3 1760
carnea Bub. V/3 1807
Carniolica Lk. V/3 1764
Charpentieri Dalla Torre V/3 1797
elongata Bub. V/3 1812
glutinosa Lk. V/3 1780
Hausmanni Car. V/3 1799
Helvetica Murr. V/3 1795
integrifolia Lk. V/3 1778
maxima Bub. V/3 1810
minima Lk. V/3 1782
multiflora Vand. V/3 1793
pubescens Loisel. V/3 1796
rubra All. V/3 1797
spectabilis Lk. V/3 1773
tomentosa Schl. V/3 1793
Vandelli Turr. V/3 1793
villosa Bub. V/3 1804
villosa Lk. V/3 1771
Vitaliana Lodd. V/3 1787
„ Wulfeniana Car. V/3 1797
Argania Sideroxylon Roem. et Schult. V/3 1896
Argemone Barclayana Penny IV/1 20
Mexicana L. IV/1 19
ochroleuca Sweet IV/1 20
„ sulphurea Sweet IV/1 20
Argentina Anserina Rydberg IV/2 889
supina Lam. IV/2 854
„ vulgaris Lam. IV/2 889
Argyrolobium Eckl. et Zeyh. IV/3 1160; VII 182
argenteum Willk. IV/3 1160
calycinum (Bieb.) Jaub. et Spach IV/3 1160
„ Linnaeanum Walp. IV/3 1160
Aria Chamaemespilus Host IV/2 721
intermedia Koehne IV/2 716
Mougeotii Beck IV/2 717
nivea Host IV/2 713
Sudetica Tausch IV/2 721
„ torminalis Beck IV/2 719
Arillatae II 320; VII 163
Ariocarpus fissuratus (Engelm.) Schum. V/2 693
Ariopsis Graham VII 157
capillaris Schur I 240
„ caryophyllea Fr. I 240
Arisaema Martius VII 158
Arisarum Targ.-Tozz. VII 158
Aristella bromoides Bert. I 206
Aristida L. VII 154
gracilis Ell. VII 154
„ vagans Ell. VII 154
Aristolochia L. III 162; VII 170
Clematitis L. III 163
macrophylla Lam. III 162
pallida Wild. III 164
rotunda L. III 163
Serpentaria L. III 162
Sipho L'Hérit. III 162; VII Fig. 1170
Aristolochiaceae III 160; VII 170
Aristolochiales III 165; VII 170
Aristotelia Maqui L'Hérit. V/1 401, 426
Arkopoda Luteola Rafin. IV/1 487
Armarintea (nicht Amarintea) V/2 1093
Armeria Willd. V/3 1885; VII 197
alliacea Ebel V/3 1894
allioides Boiss. V/3 1886
alpina Willd. V/3 1891, 1892
arenaria Ebel V/3 1894
armeria Karst. V/3 1887
campestris Wallr. V/3 1889
cephalotes hort. V/3 1886
cephalotes Lam. et Hoffm. V/3 1886
elongata Koch V/3 1887, 1889
elongata var. purpurea Boiss. V/3 1893
Halleri Wallr. V/3 1889
juncea Wallr. V/3 1886
latifolia Willd. V/3 1886
Mauritanica Wallr. V/3 1886
montana Wallr. V/3 1894
plantaginea Willd. V/3 1894
pubescens Lk. V/3 1888
purpurea Koch V/3 1893
Rhenana Gremli V/3 1893
rigida Wallr. V/3 1894
„ vulgaris Willd. V/3 1887
Armeriastrum dianthifolium O. Kuntze V/3 1879
Armoracia G. M. Sch. Fl. Wett. IV/1 305; VII 177
Austriaca Scheele IV/1 308
lapathifolia Gilib. IV/1 305
rusticana Gaertn., Mey. et Scherb. IV/1 305
„ sativa Heller IV/1 305
Arnebia cornuta Fisch. et Mey. V/3 2128
decumbens (Vent.) Coss. et Kral. V/3 2128
„ echioides DC. V/3 2128
Arnica L. VI/2 704; VII 212
alpina Olin VI/2 704

Arnica angustifolia Duby VI 704
Austriaca Hoppe VI/2 712
Bellidiastrum Vill. VI/1 425
Clusii All. VI/2 724
cordata Wulf. VI/2 714
Doronicum Benth. VI/2 751
Doronicum Jacq. VI 2 723
glacialis Wulf. VI/2 722
montana L. VI/2 704
scorpioides L. VI/2 720
Stiriaca Vill. VI/2 724
„ Wulfeniana Lam. VI/2 714
Arnoseris Gaertn. VI/2 1004; VII 212
minima (L.) Schw. et K. VI/2 1004
„ pusilla Gaertn. VI/2 1004
Aroideae VII 157
Aronia Pers. IV/2 755
Chamaemespilus Pers. IV/2 721
rotundifolia Pers. IV/2 756
rupestris Bluff et Fingerh. IV/2 756
Aronicum Clusii Hausm. VI/2 724
Doronicum Gren. et Godr. VI/2 724
Doronicum Rchb. VI/2 723
glaciale Rchb. VI/2 722
latifolium Rchb. VI/2 720
„ scorpioides Koch VI/2 720, 1354
Arpitium simplex Sweet V/2 1323
Arracacia xanthorrhiza Bancr. V/2 943
Arrhenatherum Pal. I 260; VII 154
avenaceum Pal. I 260
elatius (L.) Mert. et Koch I 260
„ precatorium P. B. I 261
Artabotrys intermedia Hassk. IV/1 14
Artedia muricata L. V/2 1505
Artemisia L. VI/2 626; VII 211
Abrotanum L. VI/2 634
Absinthium L. VI/2 651
Afra Jacq. VI/2 632
alba Turra VI/2 657, 658
Alberti Petitmengin VI/2 672
alpina Willd. VI/2 650
annua L. VI/2 630
arborescens L. VI/2 630
argentea Buch. VI/2 630
argentea L'Hérit. VI/2 630
argentea Seb. et Mauri VI/2 630
Arragonensis Lam. VI/2 628
atrata Lam. VI/2 642
Austriaca Jacq. VI/2 642
Baumgarteni Bess. VI/2 646
Biasolettiana Vis. VI/2 658
biennis Willd. VI/2 630
Bocconei All. VI/2 645
borealis Pal. VI/2 669
caerulescens L. VI/2 660
campestris L. VI/2 666
campestris × Artemisia spicata F. O. Wolf VI/2 647
Artemisia camphorata Vill. VI/2 657
Canariensis Less. VI/2 630
Carroniana Palézieux et Farquet VI/2 672
chamaemelifolia Vill. VI/2 629
Chanousii Vaccari VI/2 672
Christii Bess. VI/2 672
Cina Berg VI/2 665
clavatus (Desf.) Pers. VI/2 674
Cognensis Petitmengin VI/2 672
Columnae Ten. VI/2 658
Csepeliensis Simonkai VI/2 672
desertorum Spr. VI/2 632
Dracunculus L. VI/2 635
eriantha Ten. VI/2 646
filaginoidea Web. VI/2 661
frigida Willd. VI/2 628, 630
Genipi Web. VI/2 645
glacialis L. VI/2 650
glacialis Mermod VI/2 649
glacialis Vitm. VI/2 650
glacialis Wulf. VI/2 647
gnaphalodes Nutt. VI/2 631
grandiflora Hoffm. VI/2 656
Herba-alba Asso VI/2 628
Herba-alba Clairv. VI/2 661
humilis Wulf. VI/2 657
Jaeggiana Wolf VI/2 672
Japonica Sieb. et Zucc. VI/2 632
insipida Gren. et Godr. VI/2 672
insipida Vill. VI/2 672
intermedia Host VI/2 657
laciniata Willd. VI/2 641, 1366
lactiflora Wall. VI/2 630
lanata Koch VI/2 650
laxa (Lam.) Fritsch VI/2 647
Lobelii All. VI/2 657
Ludoviciana Nutt. VI/2 632
maritima L. VI/2 659
Mertensiana Wallr. VI/2 641
monogyna W. et K. VI/2 559, 664
Mutellina Vill. VI/2 647
nitida Bertoloni VI/2 650
nivalis Braun-Blanquet VI/2 647
nivea Redowsk. VI/2 642
Norvegica Fries VI/2 628
nutans Schur VI/2 662
Orientalis Willd. VI/2 642
pauciflora Web. VI/2 660
Pedemontana Balb. VI/2 650
Pedemontana Koch VI/2 650
petrosa (Baumg.) Jan VI/2 646
pinnatifida Jacq. VI/2 631
Pontica L. VI/2 644
Portae Huter VI/2 650
Pseudopyrethrum Aschers. VI/2 673
Pyrethrum DC. VI/2 673
radiatus Loisel. VI/2 674
repens Pallas VI/2 642
Artemisia rupestris L. VI/2 656
rupestris L. p. p. VI/2 647
rupestris Vill. VI/2 645
salina Willd. VI/2 662
Santonica L. VI/2 659
Santonicum Fritsch VI/2 662
Santonicum Waldst. et Kit. VI/2 664
scoparia W. et K. VI/2 670
Seileri F. O. Wolf VI/2 672
Selengensis auct. VI/2 631
Sémsek Forsk. VI/2 657
Seriphium Wallr. VI/2 659
Sieversiana Ehrh. VI/2 632
spicata Wulf. VI/2 645
Stelleriana Bess. VI/2 630
subsericea Rouy VI/2 672
Sylviana Wolf VI/2 672
tanacetifolia All. VI/2 642
Tournefortiana Rchb. VI/2 631
tridentata Nuttall VI/2 628
umbelliformis Lam. VI/2 647
umbrosa Verlot VI/2 631
Valentinus L. VI/2 674
Vallesiaca All. VI/2 659
Verlotorum Lam. VI/2 631
viridiflora Hoffm. VI/2 656
vulgaris L. VI/2 637
„ Wilczekiana Heimerl VI/2 672
Arthrolobium ebracteatum Desv. IV/3 1476
pinnatum Rendle et Britton IV/3 1476
repandum DC. IV/3 1466
„ scorpioides Desv. IV/3 1466
Arthrotaxis Don I 79; VII 151
Artocarpus incisa Forst. III 124
„ integrifolia Forst. III 124
Arum L. II 132; VII 157
Dracunculus L. II 134
Italicum Mill. II 134
maculatum L. II 132
Numidicum Schott II 134
ternatum Thunb. II 131
„ vulgare Lam. II 132
Aruncus L. IV/2 671; VII 180
Aruncus Karst. IV/2 671
„ silvester Kostel. IV/2 671
Arundinaria Michx. I 402; VII 155
Arundinella Raddi VII 153
Arundo L. I 270; VII 155
arenaria L. I 237
Calamagrostis Hall. f. I 232
Calamagrostis L. I 231
colorata Ait. I 196
donax L. I 270
Epigeios (L.) Roth I 233
festucacea Willd. I 317
glauca Bieb. I 234
litorea Schrad. I 234
Phragmites L. I 271
Plinii Turra I 270
sativa Lam. I 270
speciosa Schrad. I 206

Arundo tenella Schrad. I 260
varia Schrad. I 235
vulgaris L. I 271
„ vulnerans Aschers. I 271
Asarum L. III 160; VII 170
Canadense L. III 160
„ Europaeum L. III 160
Asclepiadaceae V/3 2058; VII 199
Asclepias L. V/3 2065; VII 199
amoena L. V/3 2066
Cornuti Decaisne V/3 2065
Curassavica L. V/3 2065
incarnata L. V/3 2066
quadrifida L. V/3 2066
Syriaca L. V/3 2065
„ tuberosa L. V/3 2066
Ascobolaceae VII 141
Ascolichenes VII 143
Ascomycetes VII 140
Asimina triloba Dun. IV/1 14
Aspalathus Dorycnium Lam. IV/3 1379
Asparagoideae II 280; VII 162
Asparagus L. II 260; VII 162
altilis Aschers. II 261
crispus Lam. II 261
hortensis Mill. II 261
medeoloides Thunb. II 261
officinalis L. II 261
plumosus Baker II 261
scandens Thunb. II 261
silvaticus Waldst. et Kit. II 263
Sprengeri Regel II 261; VII 161 Fig. 1192
„ tenuifolius Lam. II 263
Asperella oryzoides Lam. I 194
Aspergillaceae VII 140
Asperugo L. V/3 2136; VII 200
„ procumbens L. V/3 2136
Asperula L. VI/1 198; VII 207
Aparine Bieb. VI/1 200
aristata L. f. VI/1 205
arvensis L. VI/1 199
azurea Jaub. et Spach VI/2 1363
canescens Vis. VI/2 1363
ciliata Moench VI/1 199
cynanchica L. VI/1 204; VI/2 1363
cynanchica L. var. alpina Neilr. nec Bieb. VI/1 205
galioides Bieb. VI/1 202
glauca (L.) Bess. VI/1 202; VI/2 1363
leiantha Kern. VI/1 206
longiflora W. et K. VI/1 205
longiflora W. et K. subsp. umbellulata Reut. VI/1 206
molluginoides Bieb. VI/1 199
Neilreichii Beck VI/1 205
odorata L. VI/1 201
Orientalis Boiss. et Hoh. VI/1 196, 199
rivalis Sibth. VI/1 200
Asperula setosa Jaub. et Spach VI/1 199
stylosa Boiss. VI/1 196
Taurina L. VI/1 200
„ tinctoria L. VI/1 203
Asphodeline lutea Rchb. II 277
Asphodeloideae II 277; VII 159
Asphodelus L. II 199; VII 159
albus Mill. II 199
fistulosus L. II 199
intermedius Hornem. II 199
macrocarpus Parl. II 199
microcarpus Salzm. et Viv. II 199
„ tenuifolius Cav. II 199
Aspidistra elatior Bl. VII 161 Fig. 1193
Aspidium Sw. I 15; VII 149
aculeatum (L.) Doell I 22
angulare I 23
Braunn Spenn. I 23; VII 149 Fig. 1177
cristatum (L.) Sw. I 20
Dryopteris (L.) Baumg. I 16
filix mas (L.) Sw. I 18
lobatum I 22
Lonchitis (L.) Sw. I 22
montanum (Vogl.) Aschers. I 17
Oreopteris Sw. I 17
Phegopteris (L.) Baumg. I 15
rigidum Sw. I 19
Robertianum (Hoffm.) Luerss. I 16
spinulosum (Lam.) Sw. I 21
„ Thelypteris Sw. I 17
Aspidosperma Quebracho blanco Schlecht. V/3 2050
Asplenium L. I 25; VII 149
Adiantum nigrum L. I 31
adulterinum Milde I 27
Ceterach I 26; VII Fig. 1172
cuneifolium Viv. VII 149
fissum Kit. I 30
fontanum (L.) Bernh. I 28; VII 149
Halleri D. J. Koch I 28
lanceolatum Huds. I 28; VII 149
lepidum Presl I 30
onopteris Heufl. I 32
Ruta muraria L. I 31
Seelosii Leyb. I 29
septentrionale (L.) Hoffm. I 29
Serpentini Tausch I 32; VII 149
Trichomanes L. I 26
Verbanense v. Tavel VII 149
„ viride Huds. I 27
Asprella hystrix Willd. I 402
Astelia Banks et Soland. VII 162
Aster L. VI/1 416; VII 209
abbreviatus Nees VI/1 419
acris L. VI/1 417
acuminatus Nees VI/1 419
albus (Nutt.) Eaton et Wright VI/1 420
alpinus L. VI/1 426
amellodes DC. VI/1 449
Aster Amellus L. VI/1 428
amplexicaulis Willd. VI/1 430
artemisiiflorus Poir. VI/1 434
asperrimus Wall. VI/1 417
azureus Lindl. VI/1 418
Bellidiastrum (L.) Scop. VI/1 425
bellidiflorus Willd. VI/1 433
Bigelowii A. Gray VI/1 419
Britannicus All. VI/1 483
brumalis Nees VI/1 431
Bubonium Scop. VI/1 481
canus W. et K. VI/1 422
Capensis hort. VI/1 449
Chapmani Torrey et Gray VI/1 420
Chinensis L. VI/1 448
commixtus (Nees) O. Kuntze VI/1 419
cordifolius L. VI/1 418
Cornuti Wendl. VI/1 419
corymbosus Ait. VI/1 417
corymbosus Moench VI/1 478
Curtisii Torrey et Gray VI/1 419
cyaneus Hoffm. VI/1 430
diffusus Ait. VI/1 420
divaricatus L. VI/1 417
divergens Ait. VI/1 420
diversifolius DC. VI/1 419
dracunculoides Willd. VI/1 434
dumosus L. VI/1 420
dysentericus Bluff et Fing. VI/1 488
dysentericus Scop. VI/1 487
eminens Aschers. et Graebn. VI/1 419
ensifolius Scop. VI/1 483
ericoides L. VI/1 420
flexuosus Nutt. VI/1 420
fragilis Willd. VI/1 434
frutetorum Wimm. VI/1 433
Garibaldii Brügg. VI/1 427
glaucescens Nees VI/1 430
grandiflorus L. VI/1 419
Hauptii Ledeb. VI/1 417
Helenium Scop. VI/1 475
Herveyi A. Gray VI/1 419
heterophyllus Willd. VI/1 418
hirtus Scop. VI/1 482
hispidus Lam. VI/1 419
Hungaricus Poir. VI/1 432
hyssopifolius Willd. VI/1 417
junceus Ait. VI/1 419
Lamarckianus Aschers. et Graebner VI/1 433
Lamarckianus Nees VI/1 432
lanceolatus Willd. VI/1 433; VI/2 1357
lateriflorus (L.) Britt. VI/1 420
leucanthemus aut. VI/1 433
leucanthemus Desf. VI/1 434
levigatus Curt. VI/1 430
levigatus Lam. VI/1 431
levigatus Willd. VI/1 431

Aster levis Bot. Reg. VI/1 431
levis L. VI/1 430
Lindleyanus Torr. et Gray VI/1 419
Linosyris (L.) Bernh. VI/1 420
longifolius Lam. VI/1 419
luxurians auct. VI/1 431
macrophyllus L. VI/1 417
Meyendorfii (Reg. et Maack) Voss VI/1 417
miser Ait. VI/1 434
multiflorus Ait. VI/1 420
mutabilis Ait. VI/1 431
mutabilis Willd. VI/1 431
Novae Angliae L. VI/1 429
Novi Belgii L. VI/1 431
officinalis All. VI/1 475
pallens Willd. VI/1 419
paludosus L. VI/1 420
paniculatus A. Gray VI/1 431, 433
parviflorus Nees VI/1 434
patulus Lam. VI/1 419
pendulus Ait. VI/1 420
praealtus Poir. VI/1 433
prenanthoides Muehlenb. VI/1 419
ptarmicoides Torr. et Gray VI/1 420
pulicarius Scop. VI/1 488
punctatus W. et K. VI/1 417
puniceus L. VI/1 419
Pyrenaeus Desf. VI/1 417
rigidus Moench VI/1 479
rubricaulis Lam. VI/1 430
salicifolius Lam. VI/1 433
salicifolius Scholler VI/1 431
salicinus Scop. VI/1 479
salignus Willd. VI/1 431
sedifolius L. VI/1 417
Shortii Hook. VI/1 418
Sibiricus L. VI/1 417
simplex Willd. VI/1 433
spectabilis Ait. VI/1 419
squarrosus All. VI/1 481
tanacetifolius H. B. et Kth. VI/1 417
tardiflorus Willd. VI/1 431
Tataricus L. f. VI/1 417
tenuifolius Elliot VI/1 420
tenuifolius L. VI/1 420
Tradescanti L. VI/1 434
Tradescanti Nees VI/1 420
trinervius Roxb. VI/1 417
Tripolium L. VI/1 423
umbellatus Mill. VI/1 420
undulatus L. VI/1 419
Vaillantii All. VI/1 477
versicolor Willd. VI/1 431
villosus (DC.) Schultz-Bip. VI/1 417
vimineus Lam. VI/1 420
„ virgatus Moench VI/1 420
Astereae VI/1 400, 448; VII 209
Asterias lutea Borkh. V/3 1988
Asteriscus aquaticus Less. VI/1 495
Asterocephalus Adam VI/1 303
canescens Spr. VI/1 307
graminifolius Spr. VI/1 304
ochroleucus Wallr. VI/1 310
suaveolens Wallr. VI/1 307
Succisa Wallr. VI/1 288
„ Vestinus Rchb. VI/1 305
Asterocytisus radiatus Schur IV/3 1193
Asterolinum Hoffmgg. et Lk. V/3 1729
Adoënse Kunze V/3 1729
Linum stellatum (L.) Duby V/3 1729
lysimachioideum St. Lag. V/3 1729
minimum (C. Bauh.) St. Lag. V/3 1729
serpyllifolium Ball V/3 1729
stellatum Hoffmgg. et Lk. V/3 1729
Astilbe Hamilt. VII 179
Aruncus Trevir. IV/2 671
grandis Stapf IV/2 566
Japonica Miqu. IV/2 566
rivularis Hamilt. IV/2 566
rubra Hook. et Thoms. IV/2 566
Thunbergii (Sieb. et Zucc.) Maxim. IV/2 566
Astragaloides Cicera Moench IV/3 1422
„ syphilitica Moench IV/3 1409
Astragalus L. IV/3 1402; VII 182
alopecuroides L. IV/3 1406
alpinus L. IV/3 1415
arenarius Huds. IV/3 1428
arenarius L. IV/3 1427
aristatus L'Hérit. IV/3 1437
asper Wulfen IV/3 1426
australis (L.) Lam. IV/3 1412
Austriacus Jacquin IV/3 1425
Baeticus L. IV/3 1405
Bayonnensis Loisel. IV/3 1406
campestris L. IV/3 1444
chloranthus Pall. IV/3 1426
chlorocarpus Griseb. IV/3 1430
Cicer L. IV/3 1422
cruciatus Lk. IV/3 1406
Cylleneus Boiss. et Heldr. IV/3 1404
Danicus Retz. IV/3 1428
depressus L. IV/3 1411
dichopterus Pall. IV/3 1425
diphysus Gray IV/3 1405
dubius Mielichhofer IV/3 1449
edulis Dur. IV/3 1405
exscapus L. IV/3 1409
falcatus Lam. IV/3 1405
foetidus Vill. IV/3 1451
frigidus (L.) A. Gray IV/3 1416; VII 183 Fig. 1227
galegiformis L. IV/3 1405
Astragalus glaucoides Gmel. IV/3 1473
Glaux Vill. IV/3 1429
glycyphyllus L. IV/3 1420
gummifer Labille IV/3 1404
Halleri All. IV/3 1451
hamosus L. IV/3 1406
Hedysaroides L. IV/3 1485
helminthocarpus Vill. IV/3 1411
Hypoglottis L. IV/3 1428
Jacquini Janka IV/3 1424
incanus Gilib. IV/3 1427
incanus Kotula IV/3 1413
Juvenalis Del. IV/3 1406
Leontinus All. IV/3 1428
Leontinus Wahlenb. IV/3 1414
Leontinus Wulf. IV/3 1432
leptostachys Pall. IV/3 1424
leucanthus Salis-Marschlins IV/3 1434
lunatus Gilib. IV/3 1420
Madioti Rouy IV/3 1443
Massiliensis Lam. IV/3 1405
microphyllus Schübl. et Mart. IV/3 1422
microphyllus Willd. IV/3 1428
mollissimus Torr. IV/3 1405
Monspessulanus L. IV/3 1435
montanus L. IV/3 1439; VII 109 Fig. 1142
Murrii Hut. IV/3 1453
Narbonensis Gouan IV/3 1406
nitens Host IV/3 1449
odoratus Lam. IV/3 1406
Onobrychis L. IV/3 1430
Onobrychis Poll. IV/3 1428
oroboides Hornem. IV/3 1414; VII 182
Parvopassuae Burn. IV/3 1443
penduliflorus Lam. IV/3 1418
pilosus L. IV/3 1444
Ponticus Pall. IV/3 1406
Pseudo-Tragacantha Ten. IV/3 1437
purpureus Lam. IV/3 1429
Rochelianus Heuff. IV/3 1430
sempervirens Lam. IV/3 1437
sericeus Lam. IV/3 1449
sesameus L. IV/3 1406
sordidus Willd. IV/3 1448
sulcatus L. IV/3 1424
Tragacantha L. IV/3 1405
Tragacantha Vill. IV/3 1437
triflorus (Hoppe) Gams IV/3 1443
Tyrolensis Sieb. IV/3 1448
Uralensis Vill. IV/3 1447
Uralensis Wulf. IV/3 1449
variabilis Rouy IV/3 1449
velutinus Sieb. IV/3 1451
Venostanus Kern. IV/3 1434
verus Oliv. IV/3 1404
vesicarius L. IV/3 1433
vesicarius Lam. IV/3 1422

Astrantia L. V/2 961; VII 193
alpina Brügger V/2 968
alpina Clairv. V/2 972
australis Hut. et Porta V/2 967
Bavarica F. Schultz V/2 969
Biebersteinii Trautv. V/2 965
Carinthiaca Hoppe V/2 967
Carinthiaca Stur V/2 969
Carinthiaca Wettst. V/2 965
Carniolica Baumg. V/2 967
Carniolica Koch V/2 969
Carniolica Wulf. V/2 971
Caucasica Spr. V/2 963
Caucasica Ten. V/2 965
Colchica Alboff V/2 963
Croatica Tomm. V/2 967
Diapensia Scop. V/2 957
digitata Moench V/2 972
elatior Friv. V/2 965
Epipactis Scop. V/2 959
gracilis Bartl. V/2 971
gracilis Doll. V/2 969
helleborifolia Salisb. V/2 963
heterophylla Willd. V/2 963
intermedia Bieb. V/2 963
intermedia Schur V/2 967
involucrata Dalla Torre et Sarnth. V/2 967
maior L. V/2 964
maior Velen. V/2 965
major Zederbauer V/2 963
maxima Pall. V/2 963
minor L. V/2 972
montana Clairv. V/2 965
neglecta C. Koch et Bouché V/2 965
nigra (Lobel) Scop. V/2 965
Ossica Woronoff V/2 965
pallida Presl V/2 967
pauciflora Bertol. V/2 963
Pontica Alboff V/2 963
ranunculifolia Rchb. V/2 965
Rissensis Gremblich V/2 974
saniculifolia Salisb. V/2 965
saniculifolia Stur V/2 965
speciosa hort. V/2 963
tridentata Parr. V/2 963
„ trifida Hoffm. V/2 963
Astrebla triticoides (Lindl.) F Muell. VII 155
Astrocarpus sesamoides (L.) Duby IV/1 483; VII 178
Astrodaucus Orientalis (L.) Drude V/2 1060
Astrolinon pusillum Bub. V/3 1729
Astrolobium ebracteatum DC. IV/3 1476
„ scorpioides DC. IV/3 1466
Astronium Jacq. V/1 217
Astrophytum myriostigma (Salm-Dyck) Lem. V/2 694
Astydamia DC. V/2 1349
Asyneuma Griseb. et Schenk VI/1 368; VII 208
Asyneuma canescens (W. et K.) Griseb. et Schenk VI/1 368
Atalantia Correa V/3 54
Atenia Hook. V/2 1181
Athamanta L. V/2 1276; VII 194
Ajowan Wall. V/2 1168
alpina Stok. V/2 1278
annua L. V/2 1278
Cervaria L. V/2 1389
Cretensis Baumg. V/2 1319
Cretensis L. V/2 1278
daucifolia Host V/2 1247
Golaka Hacq. V/2 1087
Haynaldii Borb. V/2 1282
hirsuta Pohl V/2 1278
latifolia Viv. V/2 1391
Libanotis L. V/2 1243, 1246
Lobelii Parl. V/2 1278
Macedonica Bolzon V/2 1281
Matthioli auct. Tirol. V/2 1281
Matthioli Jacq. V/2 1282
Meum L. V/2 1300
mutellinoides Beck V/2 1282
mutellinoides Lam. V/2 1281
Oreoselinum L. V/2 1386
pubescens Retz. V/2 1247
Pyrenaica Jacq. V/2 1247
Reichenbachii Nym. V/2 1247
Turbith Brot. V/2 1228
„ Vestina Kern. V/2 1281
Athrocnemum Moqu. III 257; VII 171
Athyrium Roth I 33; VII 149 und 66 Fig. 1100
alpestre Rylands I 34
Filix femina Roth I 33; VII 66 Fig. 1100
„ Raeticum Dalla Torre I 34
Atirsita Rafin. V/2 974
Atossa Clusii Alef. IV/3 1540
„ sepium Alef. IV/3 1538
Atractylis cancellata L. VI/2 824
gummifera L. VI/2 824
„ lanata Scop. VI/2 989
Atragene alpina L. III 509
Austriaca Jacq. III 509
„ clematidis Crtz. III 509
Atraphaxis L. VII 170
Atrophaeis III 165
Atrema DC. V/2 1074
Atriplex L. III 237; VII 171
acuminatum Bieb. III 239
acuminatum W. et K. III 238
alba Crtz. III 225
ambrosioides Crtz. III 233
arenarium Woods III 247
axillare Ten. III 246
Babingtonii Woods III 245
Benghalense Lam. III 239
Bonus Henricus Crtz. III 219
Botrys Crtz. III 218
Calotheca Fries III 244
campestre Koch et Ziz III 241
Atriplex crassifolium Fries III 245
farinosum Dum. III 247
glauca Crtz. III 229
hastatum Fries nec L. III 244
hastatum L. III 243
holocarpum F Muell. III 260
hortense L. III 239
hybrida Crtz. III 222
laciniatum auct. nec L. III 247
laciniatum L. III 244
latifolium Wahlenb. III 243
litorale L. III 240
lucidum Desf. III 238
marinum L. III 240
maritimum Hallier III 247
micranthum C. A. Mey. III 243
monoicum Moench III 246
multifidum Desf. III 245
muralis L. III 223
nitens Schkuhr III 238
oblongifolium W et K. III 241
patulum L. III 242
pedunculatum L. III 235
polymorphum Coss. et Germ. III 242
polysperma Crtz. III 222
portulacoides L. III 235
procumbens Jundz. III 242
roseum Bab. nec L. III 245
roseum L. III 246
rubra Crtz. III 230
sabulosum Rouy III 247
sagittatum Borkh. III 238
salicinum Gmel. III 240
salinum Desv. III 240
scoparia Crtz. III 251
spinacifolium Stok. III 243
sulcatum Kit. III 240
sulcatum Mich. III 240
Tataricum L. III 247
urbica Crtz. III 224
verticillatum Lagasca III 246
virgatum Roth III 239
„ Vulvaria Crtz. III 221
Atropa L. V/4 2565; VII 203
acuminata Miers V/4 2565
Baetica Willk. V/4 2565
Belladonna L. V/4 2566
pallida Bornm. V/4 2565
„ physaloides L. V/4 2560
Atropis Trin. I 323; VII 155
angusta Stapf I 325
distans (L.) Griseb. I 323
„ maritima Griseb. I 324
Attacia Presl VII 163
Attingia excelsa Noronha IV/2 656
Aubrietia deltoides (L.) DC. IV/1 396
„ Libanotica Boiss. IV/1 397
Aucuba Himalaica Hook. et Thom. V/2 1539
„ Japonica Thunb. V/2 1539
Aucuparia silvestris Med. IV/2 708

Augustia Natalensis Kl. V/1 668
Aulacomniaceae VII 146
Aulacospermum Ledeb. V/2 1089
Auricula lutea Opiz V/3 1760
Auriculariaceae VII 141
Auriculariales VII 141
Aurinia saxatilis C. A. Mey. IV/1 452
Austrotaxus Compton VII 150
Autobasidiomycetes VII 142
Avena L. I 251; VII 154
agraria Brot. I 253
alpina Sm. I 259
argentea Willd. I 249
barbata Pott VII 154
brevis Roth I 254
bulbosa Willd. I 261
caespitosa Griesselich I 243
calycina Vill. I 263
capillaris Mert. et Koch I 240
caryophyllea Wigg. I 240
Cavanillesii Koch. I 247
desertorum Less. I 257; VII 154
disticha Lam. I 250
distichophylla Vill. I 250
dubia Leers I 251
elatior L. I 260
fatua L. I 253
flavescens L. I 248
flexuosa Leers I 245
fragilis L. I 262
Hispanica Ard. I 253
lanata Hoffm. I 238
Loeflingiana Cav. I 247
nervosa Lam. I 253
nigra Wallr. I 253
nuda L. I 254
Orientalis Schreb. I 255
Parlatorei Woods I 256
planiculmis Schrad. I 260
praecox Pal. I 241
pratensis L. I 258
precatoria Thuill. I 261
pubescens Huds. I 256
pusilla Web. I 241
sativa L. I 254
Scheuchzeri All. I 258
sempervirens Host I 256
sesquitertia Krause I 254
setacea Parl. I 256
spicata Bell. I 263
spicata Sarnth. I 247
strigosa Schreb. I 253; VII 154
subspicata Clairv. I 247
tenuis Moench I 251
triaristata Vill. I 251
tuberosa Gilib. I 261
Valesiaca Nym. I 247
versicolor Vill. I 258
Avenastrum alpinum Fritsch I 259
Parlatorii Beck I 256
planiculme Jess. I 260
pratense Jess. I 258
versicolor Fritsch I 258
Aveneae I 264; VII 154
Avenella cuprina Schur I 245
„ uliginosa Parl. I 246
Averrhoa L. IV/3 1645
Avicennia nitida Jacq. V/3 2238
officinalis L. V/3 2238
„ tomentosa Jacq. V/3 2238
Axilliflorae VII 190
Axolopha hirsuta Alef. V/1 470
Axyris amarantoides L. VII 171
hybrida L. III 260
Azadirachta Indica L. V/1 85
Azalea Canadensis O. Kuntze V/3 1634
Dahurica K. Koch V/3 1633
Japonica Gray V/3 1634
Indica L. V/3 1632, 1634
lutea L. V/3 1634
mollis auct. V/3 1634
Pontica L. V/3 1627, 1634
procumbens L. V/3 1647
rhombica O. Kuntze V/3 1634
Sinensis auct. V/3 1634
„ viscosa L. V/3 1634
Azara Ruiz et Pav. V/1 656
Azarolus arbutifolia Borkh. IV/2 706
crataegoides Borkh. IV/2 730
„ intermedia Borkh. IV/2 716
Azolla Caroliniana Willd. I 47; VII 149
filiculoides Lam. VII 149
Azorella Gilliesii Hook. et Arn. V/2 946
caespitosa Cav. V/2 946

B.

Baccharis Pingraea DC. VI/1 448
Bacillariaceae VII 137
Bacillariophyta VII 137
Bacopa Aubl. VII 204
Bacteriaceae VII 135
Bacterium radicicola (Beyerinck) Prazmowski IV/3 1117
Baeckea frutescens L. V/2 789
„ virgata Andr. V/2 789
Baeomyces VII 144
Baeothryon nanum Dietr. II 41
Baeria chrysostoma Fisch. et Mey. VI/1 534
„ Coronaria Gray VI/1 534
Balanites Aegyptiaca Del. V/1 41
Balanophoraceae VII 170
Balanopsidaceae VII 167
Balanopsidales VII 167
Balantium Kaulf. VII 148
Baldellia ranunculoides Parl. I 155
Baldingera arundinacea Dum. I 196
„ colorata Fl. Wettst. I 196
Ballota L. V/4 2399; VII 201
acuta (Moench) Briq. V/4 2399
alba L. V/4 2400, 2401
aristata Rchb. V/4 2401
foetida Lam. V/4 2400, 2401
Ballota hirsuta Schult. V/4 2401
Italica Benth. V/4 2399
lanata L. V/4 2390
nigra L. V/4 2400
Pseudodictamnus (L.) Benth. V/4 2399
ruderalis Sw. V/4 2401
rupestris Vis. V/4 2399
sepium Paulet V/4 2401
silvestris Hoffm. et Lk. V/4 2401
Balsamina Gaertn. V/1 310
„ hortensis DC. V/1 313
Balsaminaceae V/1 309; VII 187
Balsamita Schultz-Bip. VI/2 591
annua DC. VI/2 600
maior Desf. VI/2 599
suaveolens Pers. VI/2 599
„ vulgaris Willd. VI/2 599
Balsamodendron Gileadense Kth. V/1 84
Bambuseae I 402; VII 155
Banffya petraea Baumg. III 310
Bangiales VII 139
Bankesia Abyssinica Bruce IV/2 666
Banksia L. f. VII 169
Baptisia australis (L.) R. Br. IV/3 1146
leucantha Torrey et Gray IV/3 1146
„ tinctoria (L.) R. Br. IV/3 1146
Barbacenia Vand. VII 163
Barbaracea Beckm. IV/1 299; VII 177
abortiva Hausskn. IV/1 305
arcuata Rchb. IV/1 302
Augustana Boiss. IV/1 303
intermedia Bor. IV/1 303
Lippicensis Car. IV/1 315
lyrata Aschers. IV/1 301
palustris Hegetschw. IV/1 302
parviflora Fries IV/1 300
patula Fries IV/1 304
praecox R. Br. IV/1 304
praecox Schnitz. IV/1 303; VII 149
pseudo-stricta A. Vocke IV/1 302
Schulzeana Hausskn. IV/1 305
stricta Fries IV/1 300
Taurica DC. IV/1 302
verna (Mill.) Aschers. IV/1 304
vulgaris R. Br. IV/1 301, 476 Fig. 885 b
Barclaya Wall. III 439
Barkhausia apargioides Spr. VI/2 1077
cernua Rchb. VI/2 1170
graveolens Rchb. VI/2 1174
hispida Lk. VI/2 1171
rubra Moench VI/2 1135
setosa DC. VI/2 1171
„ taraxacifolia DC. VI/2 1177
Barleria L. VI/1 178; VII 205

Barosma betulinum (Thunb.) Bartl. V/1 49
crenulatum (L.) Hook. V/1 49
foetidissimum Bartl. et Wendl. VI/1 49
serratifolium (Curt.) Willd. V/1 49
Barringtonia Forst. V/2 767; VII 191
acutangula (L.) Gaertn. V/2 767
insignis Miq. V/2 767
racemosa L. V/2 767
speciosa Gaertn. V/2 767
Vriesei Teijsm. et Binn. V/2 767
Bartonia siehe Mentzelia V/1 662
Bartramiaceae VII 146
Bartschia L. VI/1 82
alpina L. VI/1 82; VI/2 1362
Trixago L. VI/1 6
„ viscosa L. VI/1 101
Basella rubra L. III 267
Basellaceae III 267; VII 172
Basidiolichenes VII 144
Basidiomycetes VII 141
Basilicum Moench V/4 2270
citratum Rumph. V/4 2268
„ Indicum Rumph. V/4 2268
Basilima sorbifolia Rafin. IV/2 681
Bassia All. VII 171
Bassia VII 197
Bassia hirsuta (L.) Aschers. III 248
„ latifolia Roxb. V/3 1897
Batatas edulis Thunb. V/3 2076
Batidales VII 167
Batrachium aquatile Wimm. III 581
Baudotti van den Bosch III 579
divaricatum Wimm. III 580
fluitans Wimm. III 577
hederaceum Dum. III 577
hololeucum van den Bosch III 583
marinum Fries III 579
„ Petiveri van den Bosch III 583
Batrachospermum VII 139
Bauera rubioides Andr. IV/2 566
sessiliflora F. v. Muell. IV/2 566
Baueroideae VII 179
Bauhinia L. IV/3 1133
Beaucarnea recurvata Lem. II 280
Beaumerta G. M. Sch. Fl. Wettst. IV/1 319
Beaumontia grandiflora Wallr. V/3 2051
grandiflora (Roxb.) Wallr. V/3 2064
Beckmannia eruciformis Host I 265
Befaria Mutis V/3 1610; VII 115
Beggiatoaceae VII 136
Begonia albo-picta hort. V/1 667
argyrostigma Fisch. V/1 667
asplenifolia Hook. V/1 667
Baumanni Lem. V/1 664
Boliviensis DC. V/1 666
Begonia caulohybrida hort. V/1 668
cinnabarina Hook. f. V/1 666
coccinea Hook. V/1 668
Credneri Haage et Schmidt V/1 688
cucullata Willd. V/1 667
Davisii Hook. f. V/1 666
discolor Sm. V/1 666
Dregei Otto et Dietr. V/1 666
Evansiana Andr. V/1 664, 666
Froebelii DC. V/1 666
fuchsioides Hook. f. V/1 668
fulgens Lem. V/1 666
gracilis H. B. et Kth. V/1 666
Griffithii Hook. f. V/1 667
heracleifolia Cham. et Schlecht. V/1 667
Hoegeana Regel et Schmidt V/1 667
imperialis Lem. V/1 667
Lubbersii Morr. V/1 667
maculata Raddi V/1 667
magnifica Warsc. V/1 667
manicata Brogn. V/1 668
metallica G. Smith V/1 667
Natalensis Hook. f. V/1 668
nitida Ait. V/1 667
octopetala L'Hérit. V/1 666
Pearcei Hook. f. V/1 666
peponifolia Vis. V/1 667
phyllomaniaca Mast. V/1 664
Rex Putzeys V/1 666
rhizohybrida hort. V/1 667
ricinifolia A. Dietr. V/1 667
scandens Sw. V/1 668
Scharffiana Reg. V/1 668
Schmidtiana Reg. V/1 667
semperflorens Lk. et Otto V/1 667
Socotrana Hook. f. V/1 666
spathulata Lodd. V/1 667
suaveolens Lodd. V/1 667
Thwaitesii Hook. f. V/1 666
tuberhybrida hort. V/1 666
Veitchii Hook. f. V/1 666
„ xanthina Hook. f. V/1 667
Begoniaceae V/1 663; VII 190
Begoniella Oliv. V/1 664
Begoniineae VII 190
Bejaria racemosa Vent. V/3 1610
Belladonna Ludw. V/4 2565
Belladonna Sweet VII 162
baccifera Lam. V/4 2566
„ trichotoma Scop. V/4 2566
Bellardia Trixago (L.) All. VI/1 6
Bellevalia comosa Kth. II 259
Romana Rchb. II 279
„ tenuiflora Nym. II 259
Bellia aurata Bub. V/2 1003
hirsuta Bub. V/2 1006
„ temulenta Bub. V/2 996
Bellidiastrum Michelii Cass. VI/1 425
Bellis L. VI/1 414; VII 209
Bellis annua L. VI/1 414
pappulosa Boiss. VI/1 414
perennis L. VI/1 414; VI/2 1365
rotundifolia Boiss. et Reut. VI/1 414
Bellium L. VI/1 448; VII 209
Beloperone Nees VI/1 178
Belvisiaceae V/2 766; VII 191
Benettidaceae VII 150
Benettidales VII 150
Benincasa cerifera Fisch. VI/1 315
Benthamia Lindl. V/2 1543; V/3 2127; VII 195
fragifera Lindl. V/2 1543
„ intermedia Druce V/3 2127
Benzoin Nees VII 176
officinale Hayne V/3 1900
Berardia subacaulis Vill. VI/2 992
Berberidaceae IV/1 5; VII 175
Berberidioideae VII 175
Berberis IV/1 6; VII 175
Aquifolium Pursh IV/1 6
buxifolia Lam. IV/1 6
Chinensis Desf. IV/1 6
Darwinii Hook. IV/1 6
ilicifolia hort. IV/1 6
Neuberti Baum. IV/1 6
repens Lindl. IV/1 6
Thunbergii DC. IV/1 6
vulgaris L. IV/1 6
Berchemia racemosa Sieb. et Zucc. V/1 324
scandens Koch V/1 324
Bergenia cordifolia (Haw.) A. Br. IV/2 566
crassifolia (L.) Engl. IV/2 566; VII 179
ligulata (Wallr.) Engl. IV/2 566
Stracheyi (Hook. et Thoms.) Engl. IV/2 566
Bergia L. V/1 535
Berinia andryaloides Brign. VI/2 1161
Berkheya pinnatifida (Thunb.) Thellung VI/2 1367
Berla Bubani V/2 1216
Berneuxia Tibetica Decne. V/3 1713
Bernoullia Oliv. VII 188
Berteroa DC. IV/1 458; VII 177
Bertholletia Humb. et Bonpl. V/2 768
excelsa Humb. et Bonpl. V/2 768
„ nobilis Miers V/2 768
Bertolonia Raddi VII 192
Berula Hoffm. V/2 1216
angustifolia Mert. et Koch V/2 1217
„ erecta Coville V/2 1217
Beryllis Pyrenaica Salisb. II 255
Beschorneria Kunth II 320; VII 163
Bessera azurea Schult. V/3 2211
Beta L. III 214; VII 171 u. Fig. 1109 b

Beta Cicla L. III 215
esculenta Salisb. III 215
hortensis Mill. III 215
Rapa Dum. III 215
vulgaris L. III 214; VII 74 Fig. 1109 b
Betonica (L.) Benth. V/4 2407
annua L. V/4 2413
Alopecuros Jacq. V/4 2434
Alopecuros L. V/4 2432
decumbens Moench V/4 2410
foliosa Presl V/4 2428
grandiflora Steven V/4 2408
hirsuta L. V/4 2431
hirta Gouan V/4 2410
hirta Leysser V/4 2429
Jacquini Gren. et Godr. V/4 2432
legitima Lk. V/4 2428
macrantha C. Koch V/4 2408
officinalis L. V/4 2428
Orientalis Thuill. V/4 2408
serotina Host V/4 2429
„ stricta Ait. V/4 2429
Betula L. III 75; VII 168 und Fig. 1058, 1101
alba L. III 76, 78
Alnobetula Ehrh. III 87
alpestris Fries III 84
ambigua Hampe III 77
Aschersoniana Hayek III 84
Carpatica W. et K. III 77
carpinifolia Ehrh. III 75
Dahurica Wats. III 82
Ermani Cham. III 75
fruticosa Wats. III 84
glutinosa Lam. III 91
humilis Schrank III 82; VII 168, 169 Fig. 1208
hybrida Bechst. III 84
incana L. III 89
intermedia Thom. III 84
lagopina Hartm. III 84
lenta L. III 75
lobulata Kanitz III 78
lutea Michx. III 75
maior Gilib. III 78
Murithii Gaud. III 77
myrsinoides Tausch III 82
nana L. III 78; VII 168 und Fig. 1173
nigra L. III 75
nigra Murith III 77
odorata Bechst. III 76
palustris Salisb. III 91
papyrifera Marsh. III 75
pendula Roth III 78
Plettkei P. Junge III 85; VII 35 Fig. 1058
pubescens Ehrh. III 76
Quebeckensis Burgsdorf III 82
Seideliana R. Missbach III 85
Sibirica Wats. III 82
verrucosa Ehrh. III 78
Betula viridis Chaix III 87
Warnstorfii Hegi III 84
„ Zimpelii P. Junge III 84
Betulaceae II 65; VII 167
Biarum Schott VII 158
Biasolettia Balcanica Velen. V/2 993
cynapioides (Guss.) Drude V/2 993
nodosa Bert. V/2 994
„ tuberosa Koch V/2 993
Biauricula amara Bub. IV/1 107
pinnatifida Bub. IV/1 109
„ saxatilis Bub. IV/1 104
Bicornes V/3 1713; VII 195
Bicuculla formosa O. Kuntze IV/1 20
Bidens L. VI/1 515; VII 211
acmelloides Berg VI/1 528
Beckii Torr. VI/1 516
bipinnatus L. VI/1 522
cernuus L. VI/1 521
comosus Wieg. VI/1 521
connatus Muehlenberg VI/1 520
dahlioides S. Wats. VI/1 516
decipiens Warnst. VI/1 520
fastigiatus Michal. VI/1 518
Fennicus Teyber VI/1 523
frondosus auct. VI/1 519
leucanthus Poepp. VI/1 516
melanocarpus K. M. Wieg. VI/1 519
pilosus L. VI/1 516
platycephalus Oersted. VI/1 518
Polakii Velen. VI/1 523
radiatus Thuill. VI/1 518
„ tripartitus L. VI/1 516
Bifolium cordatum Gaertn., Mey. et Scherb. II 267
Bifora Hoffm. V/2 1074; VII 194
radians Bieb. V/2 1075
testicularis Bub. V/2 1075
testiculata (L.) DC. V/2 1075
„ testiculata Rchb. V/2 1075
Biforis Spr. V/2 1074
radians Spr. V/2 1075
testiculata Roth V/2 1075
„ testiculata Spr. V/2 1075
Bigamia König VII 190
Bignoniaceae VI/1 175; VII 204
Biophytum sensitivum DC. IV/3 1645
Biota Endl. I 82; VII 151
commixta DC. VI/1 419
corymbosa DC. VI/1 417
„ macrophylla DC. VI/1 418
Biovularia Kam. VII 205
Biscutella L. IV/1 96; VII 177
alpestris W. et K. IV/1 99
Apula L. IV/1 97
auriculata All. IV/1 100
auriculata L. IV/1 101
cichoriifolia Loisel. IV/1 100
Columnae Ten. IV/1 97
depressa Willd. IV/1 97
Biscutella didyma L. IV/1 97
erigerifolia DC. IV/1 101
eriocarpa DC. IV/1 97
levigata L. IV/1 97
lyrata L. IV/1 97
marginata Ten. IV/1 97
„ rupestris Ehrh. IV/1 99
Biserrula Pelecinus L. IV/3 1400
Bistorta maior Gray III 194
„ vivipara L. III 196
Bivonaea DC. VII 177
Bixa Americana Poir. V/1 584
„ Orellana L. V/1 584
Bixaceae V/1 584; VII 189
Blackstonia grandiflora (Viv.) V/3 1966
imperfoliata (L.) V/3 1966
„ perfoliata (L.) Huds. V/3 1966
Blakea P Br. V/2 795
Blastosporaceae VII 138
Blattia Adans. V/2 761
Blattiaceae V/2 761; VII 191
Blechnum L. I 35; VII 149
„ spicant With. I 35
Blighia sapida Kön. V/1 307
Blitum ambrosioides G. Beck III 233
capitatum L. III 232
carinatum Moqu. III 232
glaucum Koch III 229
polymorphum C. A. Mey. III 230
rubrum L. III 230
„ virgatum L. III 231
Blumea DC. VII 209
Blumenbachia Schrad. V/1 662
Blysmus Panz. II 42; VII 156
compressus Panz. II 43
„ rufus Lk. II 43
Blyxa Noronha I 159
Bocconia cordata Willd. IV/1 19
„ frutescens L. IV/1 19
Boehmeria nivea (L.) Hook. et Arn. III 137
Boerhavia plumbaginea Cav. III 266
Bohadschia Crtz. IV/1 146
Bohatschia Scop. IV/1 146
„ alliacea Med. IV/1 147
Boisduvalia densiflora (Lindl.) Wats. V/2 799
Boissiera bromoides Hochst. I 372; VII 155
Bolax gummifer Spr. V/2 946
Boletaceae VII 143
Boltonia asteroides (L.) L'Hérit. VI/1 448, 449
„ latisquama A. Gray VI/1 448
Bomarea Mirb. II 320
Bombaceae V/1 489; VII 188
Bombax Buonopozense Beauv. V/1 489
Ceiba L. V/1 489
„ Malabaricum DC. V/1 489
Bonannia Presl IV/1 204
Bonapartea hort. II 279

Bonaveria Scop. VII 182
Securidaca Desv. IV/3 1461
Bonjeania Boiss. IV/3 1352, 1377
hirsuta Rchb. IV/3 1378
hirta Jord. et Fourr. IV/3 1379
Italica Jord. et Fourr. IV/3 1379
Bonplandia geminiflora Cav. V/3 2114
Bootia ocymoides (L.) Rchb. III 345
Boottia Wall. I 159
Boraginaceae V/3 2122; VII 200
Boraginoideae VII 200
Borago L. V/3 2230; VII 201
cordifolia Moench V/3 2128
laxiflora DC. V/3 2230
longifolia Poir. V/3 2230
officinalis L. V/3 2230
„ Orientalis L. V/3 2128
Borassoideae VII 156
Borderea Pyrenaica Miègv. II 280
Boreava Orientalis Jaub. et Spach IV/1 192
Boretta Cantabrica O. Kuntze V/3 1620
Borkhausenia cava Gaertn., Mey., Scherbius IV/1 38
lutea Gaertn., Mey., Scherbius IV/1 42
solida Gaertn., Mey., Scherbius IV/1 39
Boronia alata Sm. V/1 48
crenulata Sm. V/1 48
denticulata Sm. V/1 48
elatior Bartl. V/1 48
„ pinnata Sm. V/1 48
Boswellia Crateri Birdwood V/1 84
Botryanthus Atlanticus Nym. II 258
neglectus Kth. II 258
odorus Kth. II 257
„ vulgaris Kth. II 258
Botrychium Sw. I 44; VII 88, 148
lanceolatum Angström I 45
Lunaria L. I 44
Matricariae Spr. I 46
ramosum Aschers. I 45
rutaceum Sw. I 46
rutaefolium A. Br. I 46
simplex Hitchcock I 46
„ Virginianum Sw. I 46
Botrydiaceae VII 138
Botrydium aromaticum Spach. III 218
Botryocarpum nigrum Opiz IV/2 653
„ petraeum Opiz IV/2 650
Botryococcaceae VII 137
Bougainvillea spectabilis Willd. III 266; VII Fig. 1213
Boussingaultia baselloides H. B. et Kth. III 267
Bouteloua Lagasca I 265
Bouvardia Salisb. VI/1 197; VII 206 Fig. 1253
Bowdichia virgilioides Kth. IV/3 1144
Bowenia Hook. f. VII 170
Bowiea volubilis Harvey II 277
Bowlesia brevipes Phil. et Reiche V/2 956
geraniifolia Cham. V/2 956
incana Ruiz et Pav. V/2 956
nodiflora Presl V/2 956
rotundifolia Phil. V/2 956
„ tenera Spr. V/2 956
Boykinia aconitifolia Nutt. IV/2 567
lycoctonifolia (Maxim.) Engl. IV/2 567
Brachychiton Endl. VII 188
Brachycome iberidifolia Benth. VI/1 449
Brachyderaea grandiflora Schultz-Bip. VI/2 1149
Brachylaena R. Br. VII 209
Brachylobus officinalis Dul. IV/3 1243
Brachypodium Pal. I 370; VII 155
caespitosum R. et Sch. I 371
distachyon R. et Sch. I 372
gracile P. B. I 371
loliaceum Lk. I 381
pinnatum (L.) P. B. I 370; VII 155, Fig. 1138
rupestre R. et Sch. I 371
„ silvaticum R. et Sch. I 371
Brachysema lanceolatum Meissn. IV/3 1147
Brachytheciaceae VII 146
Bradburva Raf. VII 183
Bradlaeia Neck. V/2 1464
Bradlea Adanson V/2 1464
Brasenia peltata Michx. III 438
„ purpurea (Michx.) Casp. III 438
Brassica L. IV/1 229; VII 177
Aelleniana O. E. Schulz et Thellung IV/1 263
alpina L. IV/1 399
armoracioides Czerniajew IV/1 235
arvensis Scheele IV/1 263
Austriaca Jacq. IV/1 441
Besseriana Andrz. IV/1 241
Botrytis Mill. IV/1 248
bracteolata Fisch. et Mey. IV/1 237
brevicaulis Bub. IV/1 209
Cheiranthus Willd. IV/1 269
Dillonii Del. IV/1 241
dissecta Boiss. IV/1 206
elongata Ehrh. IV/1 233, 235
Eruca L. IV/1 201
Erucastrum Vill. IV/1 220
erucoides Boiss. IV/1 217
fruticulosa Cyr. IV/1 230
geniculata Ball IV/1 229
incana F. Schultz IV/1 226
integrifolia O. E. Schulz IV/1 242
Brassica iuncea (L.) Coss. IV/1 240
laciniata Steud. IV/1 246
lanceolata Lange IV/1 241
Monensis Huds. IV/1 271
montana DC. IV/1 272
muralis Huds. IV/1 211
Napella Chaix IV/1 259
Napo-Brassica Mill. IV/1 255
Napus L. IV/1 252
Napus L. var. arvensis (Lam.) Thellung IV/1 254
Napus L. var. Napobrassica (L.) Peterm. IV/1 255
nigra (L.) Koch IV/1 236
obtusangula St. Lager IV/1 222
oleifera Moench IV/1 254
oleracea L. IV/1 242, 244
var. acephala DC. IV/1 245
var. Botrytis L. IV/1 248
var. capitata L. IV/1 247
var. foliosa Rchb. IV/1 245
var. gemmifera DC. IV/1 247
var. gongylodes L. IV/1 247
var. laxifolia Kirschl. IV/1 245
„ var. Sabauda L. IV/1 246
Orientalis L. IV/1 440
pinnatifida Desf. IV/1 203
palustris Pirona IV/1 235
Pollichii Shuttlew. IV/1 224
pubescens Ard. IV/1 231
Rapa L. IV/1 257
var. Rapa (L.) Thellung IV/1 261
var. silvestris (Lam.) Purch. et Ley IV/1 259
Rapa oleifera Metzger IV/1 259
rapifera Dalla Torre et Sarnth. IV/1 261
Sabellica Pers. IV/1 246
silvestris Mill. IV/1 245
Sinapistrum Boiss. IV/1 263
tenuifolia Fries IV/1 214
Timoreana F. v. Muell. IV/1 241
Tournefortii Gouan IV/1 231
tuberosa Salisb. IV/1 261
Turicensis O. E. Schulz et Thellung IV/1 263
Uechtritziana Janka IV/1 202
Urbaniana O. E. Schulz IV/1 242
varia Dur. IV/1 219
vesicaria L. IV/1 203
viminea Boiss. IV/1 209
„ virgata Boiss. IV/1 208
Brassicaria Gillet et Magne IV/1 219
„ Pomel IV/1 229
Brassicastrum Lk. IV/1 229
Brassicella Tourr. IV/1 268; VII 177
Cheiranthos Fourr. IV/1 269
Erucastrum (L.) O. E. Schulz IV/1 269

Brassicella Monensis (L.) O. E. Schulz IV/1 271
Bravoa La Llave et Lexarza II 319; VII 162
Braya Sternb. et Hoppe IV/1 461; VII 178
alpina Sternb. et Hoppe IV/1 461
pinnatifida Koch IV/1 157
„ supina Koch IV/1 163
Brayera anthelmintica Kth. IV/2 666
Brefeldiaceae VII 136
Bretschneideriaceae VII 178
Bricourtia Adans. IV/1 186
Britoa Sellowiana Berg V/2 776
Brittonastrum canum (Hook.) Briq. V/4 2368
Mexicanum (Kth.) Briq. V/4 2368
Briza L. I 292; VII 155
Clusii Schult. I 292
Eragrostis L. I 280
geniculata L. I 292
maxima L. I 292
media L. I 292
minor L. I 292
oblonga Moench I 280
„ tremula Koeler I 292
Brodiaea uniflora (Lindl.) Engl. II 278
Bromeliaceae II 142; VII 158
Bromus L. I 355; VII 155
affinis Dum. I 365
agrestis All. I 357
altissimus Gil. I 364
altissimus Web. I 356
Anatolicus Boiss. et Heldr. I 368
angustifolius Schrank I 357
arenarius Thom. I 366
arundinaceus Roth I 344
arvensis L. I 364
asper Murray I 356
avenaceus Pourr. I 360
Benekeni Lange I 357
brachystachys Hornung I 369
briziformis Fisch. et Mey. I 369
caespitosus Host I 371
Canariensis Zucc. I 369
catharticus Vahl I 355
ciliatus L. I 369
commutatus Schrad. I 366
corniculatus Lam. I 370
cristatus L. I 387
Dertonensis All. I 326
diandrus Curt. I 362
dilatatus Lam. I 362
distachyos L. I 372
elatior Koeler I 343
erectus Huds. I 357
Gaudini R. et Sch. I 366
giganteus L. I 345
glomeratus Scop. I 294
gracilis Weig. I 341
Bromus grandiflorus Weig. I 361
gynandrus Roth I 362
hordaceus Gmel. I 364
hordaceus L. I 365
hordaceus Wahlenb. I 366
Japonicus Thunb. I 367
inermis Leysser I 359
intermedius Guss. I 369
jubatus Ten. I 361
lanceolatus Roth I 369
macrostachys Desf. I 369
Madritensis L. I 362
Mango Desv. I 355
maximus Desf. I 369
maximus Gilib. I 362
mollis L. I 365
mollis L. subsp. Thominii Aschers. et Graebn. I 366
montanus Fl. Wett. I 357
montanus Scop. I 356
multiflorus Host I 366
multiflorus Sm. I 364
multiflorus Weig. I 364
murorum Bernh. I 360
mutabilis F. Schultz I 362
nemorosus Vill. I 356
Noëanus Boiss. I 368
ovinus Scop. I 330
patulus Mert. et Koch I 367
pinnatus L. I 370
purpurascens Del. I 369
racemosus L. I 365
ramosus Huds. I 356
rigens L. I 369
rigidus Rchb. I 369
rubens L. I 369
rupestris Host I 371
scabriflorus Opiz I 360
scoparius L. I 369
scoparius Mauri I 369
secalinus L. I 362
silvaticus Poll. I 371
simplex Gaud. I 366
squarrosus L. I 368
sterilis L. I 361
strictus Schwabe I 369
tectorum L. I 360
temulentus Bernh. I 376
Tenorianus Schult. I 361
triflorus Ehrh. I 352
triflorus Poll. I 251
truncatus Scop. I 386
unioloides (Willd.) Humb. et Kth. I 355, 369
versicolor Poll. I 364
villosus Forsk. I 369
Willdenowii Kth. I 369
Wolgensis (Fisch.) hort. Gorenk. I 368
Brongniartia Humb. IV/3 1386
Brosimum Sw. VII 169
Broussonetia Kazinoki Sieb. III 136
„ papyrifera L'Hérit. III 136
Browallia Roezli hort. V/4 2555
Browallia demissa L. V/4 2555
grandiflora Grah. V/4 2555
pulchella hort. V/4 2555
„ viscosa H. B. et Kth. V/4 2555
Brucea antidysenterica Lam. V/1 79
Sumatrana Roxb. V/1 79
Bruckenthalia spiculifolia (nicht spiculiflora) (Salisb.) Rchb. V/3 1622, 1701
Bruguiera Lam. V/2 769
Brunella V/4 2733; VII 200 Fig. 1242
alpina Timb. V/2 2382
officinalis Crtz. V/4 2380
pinnatifida Pers. V/4 2384
vulgaris L. V/4 2380
Brunelliaceae IV/2 65; VII 179
Brunfelsia Americana Sw. V/4 2555
Hopeana Benth. V/4 2555
Bruniaceae IV/2 655; VII 180
Bruniera vivipara Franch. II 142
Brunoniaceae VI/2 1359; VII 209
Brunsvigia Heister II 319; VII 162
Bryaceae VII 146
Bryales VII 145
Bryanthus Gmelini Don V/3 1610
taxifolius Gray V/3 1621
Bryocarpum Hook. et Thoms. V/3 1728
Bryonia L. VI/1 316; VII 208
alba L. VI/1 317
„ dioeca Jacq. VI/1 318
Bryoniaceae VI/1 311; VII 208
Bryonopsis laciniosa Naud. VI/1 316
Bryophyllum calycinum Salisb. IV/2 513
Bryophyta VII 144
Bryopogon VII 144
Bryopsidaceae VII 138
Bubon L. V/2 1363
eriocephalus Spr. V/2 1227
gummifer L. V/2 1227
Libanotis Dumort. V/2 1243
„ rigidior L. V/2 1356
Buceras Monspeliacum All. IV/3 1230
Buchloë dactyloides Engelm. I 265
Bucida buceras L. V/2 773
Bucklandia populnea R. Br. VII 180
Buda media Dum. III 423
„ rubra Dum. III 422
Buddleia L. V/3 1952
albiflora Hemsley V/3 1952
Colvilei Hook. et Th. V/3 1952
capitata Jacq. V/3 1952
globosa Lam. V/3 1952
Japonica Hemsley V/3 1952
Lindleyana Fort. V/3 1952
„ variabilis Hemsley V/3 1952
Buettneria L. VII 188
Buffonia L. III 389; VII 173
annua DC. III 389
macrosperma J. Gay III 389
paniculata Dub. III 389
spicata Delarbre III 389
tenuifolia L. III 389

Buglossum Barrelieri All. V/3 2198
elatum Moench V/3 2201
sempervirens All. V/3 2198
„ tinctorium Lam. V/3 2205
Bugula Chamaepitys Scop. V/4 2539
densiflora Ten. V/4 2541
Genevensis Scop. V/4 2543
pyramidalis Mill. V/4 2545
„ reptans Scop. V/4 2541
Bulbine L. VII 159
Bulbocapnos fabaceus Bernh. IV/1 41
Bulbocastanum Mill. V/2 1188, 1189
ferulaceum Griseb. V/2 1190
„ incrassatum Lange V/2 1190
Bulbocodium vernum L. II 194; VII 159
Bulga Chamaepitys O. Kuntze V/4 2539
„ pyramidalis O. Kuntze V/4 2545
Bulliarda aquatica DC. IV/2 515; VII 179
Bulnesia Gray V/1 40
Bumalda Thunb. VII 187
Bumelia lanuginosa Pers. V/3 1897
lycioides Gaertn. V/3 1897
Bunias L. IV/1 472; VII 178
Cakile L. IV/1 182
edentula Bigel. IV/1 182
Erucago L. IV/1 473
myagroides L. IV/1 186
Orientalis L. IV/1 474
Syrica Gaertn. IV/1 463
„ verrucosa Moench IV/1 474
Bunium L. V/2 1188; VII 194
alpinum W. et K. V/2 1189
ammoides Cesati V/2 1175
Bulbocastanum L. V/2 1191
bulbosum Dulac V/2 1191
Carvi Bieb. V/2 1182
Copticum Spr. V/2 1167
corydalinum DC. V/2 1190
cynapioides Bertol. V/2 993
denudatum DC. V/2 1195
divaricatum Bertol. V/2 1190
Falcaria Bieb. V/2 1177
ferulaceum Sibth. et Sm. V/2 1190
ferulifolium Desf. V/2 1190
flexuosum With. V/2 1195
incrassatum (Boiss.) Battand. et Trabut V/2 1190
Linnaei Schur V/2 1191
luteum Willd. V/2 1298
minus Gouan V/2 1193
montanum Koch V/2 1190
petraeum Ten. V/2 1190
peucedanoides Bieb. V/2 1298
verticillatum Gren. et Godr. V/2 1187
„ virescens DC. V/2 1298
Buphane Herb. VII 162
Buphthalmum L. VI/1 490; VII 211
Buphthalmum aquaticum L. VI/1 495
cordifolium W. et K. VI/1 492
grandiflorum L. VI/1 490
salicifolium L. VI/1 490; VI/2 1366; VII 210 Fig. 1262
speciosissimum Ard. VI/1 493
speciosum Schreb. VI/1 492
„ succisaefolium Rchb. VI/1 491
Bupleurum L. V/2 1094; VII 194
Aegyptiacum Nectoux V/2 1099
affine auct. Gall. V/2 1116
affine Ces. V/2 1120
affine Sadler V/2 1116
alpigenum Jord. V/2 1130
amplexicaule Clairv. V/2 1103
angulosum L. V/2 1103
angulosum Wahlenb. V/2 1124
apiculatum Friv. V/2 1099
aristatum Guss. V/2 1099
Aucheri Boiss. V/2 1101
aureum Fisch. V/2 1111
aureum Fuss V/2 1110
australe Jord. V/2 1102
badium Roch. V/2 1114
Baldense Host V/2 1122
Baldense Marzari-Pencati V/2 1114
Baldense Turra V/2 1099
Banaticum Kotschy V/2 1129
bicalyculatum Bell. V/2 1121
brassicifolium Arvet-Touv. V/2 1130
brevicauleSchlechtend. V/2 1101
breviradiatum (Rchb.) Wettst. V/2 1116
Burserianum Willd. V/2 1124
Canalense Wulf. V/2 1125
caricifolium Willd. V/2 1125
Carinthiacum Pach. V/2 1126
cernuum Ten. V/2 1129
coloratum Schur V/2 1110
Columnae Guss. V/2 1120
commutatum Boiss. et Bal. V/2 1101
Corbariense Timbal-Lagrave V/2 1128
croceum Fenzl V/2 1098
denticulatum Bell. V/2 1121
divaricatum Lam. V/2 1099
diversifolium Roch. V/2 1129
exaltatum Bieb. V/2 1128
falcatum L. V/2 1126
filicaule Brot. V/2 1102
flexuosum Moench V/2 1127
frutescens Hill V/2 1103
fruticescens L. V/2 1103
fruticosum L. V/2 1103
Gaudini Woloszczak V/2 1110
Gerardi All. V/2 1102
Gerardi auct. V/2 1102
Gerardi Schultes V/2 1116
Gerardi α typicumFiori V/2 1102
glaucocarpum Borb. V/2 1101
Bupleurum glaucum Robill. et Cast. V/2 1103
glumaceum Sibth. et Sm. V/2 1099
gramineum Velen. V/2 1130
gramineum Vill. V/2 1125
graminifolium Georgi V/2 1129
graminifolium Vahl V/2 1121
Guinetii Briq. V/2 1111, 1131
heterophyllum Lk. V/2 1098
heterophyllum Roch. V/2 1129
humile Vest V/2 1100
Jacquinianum Jord. V/2 1102
incurvum Bell. V/2 1122
intermedium Poir. V/2 1098
iunceum L. V/2 1114
iunceum Pall. V/2 1128
junceum Sadl. V/2 1101
lancifolium Hornem. V/2 1098
Lisae Briq. V/2 1129
longifolium L. V/2 1108
longiradiatum Turcz. V/2 1111
Mareoticum Del. V/2 1101
minimum Clarke V/2 1101
Morisonii Timbal-Lagrave V/2 1122
nanum Bald. V/2 1100
neglectum Cesati V/2 1129
nodiflorum Sibth. et Sm. V/2 1101
obtusatum Lapeyr. V/2 1103, 1124
obtusifolium Ten. V/2 1129
Odontites L. V/2 1100
opacum Lange V/2 1099
pachnospermum Pančič V 2 1101
patens Jord. V/2 1102
petraeum Georgi V/2 1128
petraeum L. V/2 1121
petraeum Rchb. V/2 1112
Polense Murr V/2 1100
Pollichii Gmel. V/2 1119
procumbens Bertol. V/2 1120
procumbens Desf. V/2 1120
proliferum Del. V/2 1101
protactum Hoffmgg. et Lk. V/2 1098
pruinosum Pančič V/2 1101
pseudodontites Rouy V/2 1103
Pyrenaeum Gouan V/2 1103
Pyrenaicum Willd. V/2 1103
quadridentatum Halacsy V/2 1114
ranunculiforme St. Lager V/2 1122
ranunculoides L. V/2 1122
ranunculoideum St. Lager V/2 1122
Rissonii Rich. V/2 1116
rotundifolium L. V/2 1106
saxatile Pall. V/2 1128
scabrum Griseb. V/2 1101
Scheffleri Hampe V/2 1102

Bupleurum semicompositum L. V/2 1103
semiperfoliatum Griseb. V/2 1098
Sibthorpianum Sm. V/2 1130
stellatum L. V/2 1112
subfalcatum Schur V/2 1129
subovatum Lk. V/2 1098
subpinnatum Ledeb. V/2 1154
subrubrum Dulac V/2 1122
sulphureum Velen. V/2 1099
tenue Salisb. V/2 1119
tenuifolium Pourret V/2 1129
tenuissimum L. V/2 1118
terminale Salisb. V/2 1103
Transsilvanicum Schur V/2 1129
trifidum Ten. V/2 1114
Vapincense Vill. V/2 1111
variabile Baldacci V/2 1099
Veronense Turra V/2 1099
virgatum Brot. V/2 1103
„ virgatum Cav. V/2 1102
Burgsdorfia montana Rchb. V/4 2404
Burmanniaceae II 395; VII 164
Burnatia I 150
Bursa Wigg. IV/1 363
pastoris Wigg. IV/1 364
procumbens O. Kuntze IV/1 361
Burseraceae V/1 83; VII 185
Butea monosperma (Lam.) Taub. IV/3 1626
Butneria florida Kearney IV/1 14
Butomaceae I 157; VII 153
Butomus L. I 157; VII 153 u. 6 Fig. 978
Caesalpini Necker I 157
floridus Gaertn. I 157
„ umbellatus L. I 157; VII 153
Butyrospermum Parkii Kotschy V/3 1896
Buxaceae V/1 202; VII 186
Buxus L. V/1 204; VII 186
Balearica Willd. V/1 204
Fortunei Carr. V/1 204
Japonica Muell.-Aarg. V/1 204
longifolia Boiss. V/1 204
microphylla Sieb. et Zucc. V/1 204
„ sempervirens L. V/1 204
Byblidaceae VII 179

C.

Cabomba aquatica Aubl. III 438
„ Caroliniana A. Gray III 438
Cacabus Bernh. V/4 2560
Cacalia L. VI/1 403
albifrons L. fil. VI/1 404
alpina L. VI/1 403
glabra Vill. VI/1 403
hybrida Vill. VI/1 406
Petasites Lam. VI/1 404
Cacalia Sarracenica L. VI/2 763
„ tomentosa Jacq. VI/1 404
Caccinia strigosa Boiss. V/3 2127
Cachrys alata Bieb. V/2 1093
cylindracea Guss. V/2 1093
ferulacea Guss. V/2 1093
Libanotis L. V/2 1093
„ maritima Spr. V/2 1224
Cactaceae V/2 679; VII 190
Cactales VII 190
Cactodendron Bigelow V/2 688
Cactus Indicus Roxb. V/2 689
Pereskia L. V/2 687
Tuna L. V/2 689
Caesalpinia Bonducella (L.) Roxb. IV/3 1127
Brasiliensis L. IV/3 1127
coriaria Willd. IV/3 1127
echinata Lam. IV/3 1127
„ Sappan (L.) Rheede IV/3 1127
Caesalpinioideae IV/3 1127; VII 181
Cajanus argenteus Spr. IV/3 1160
„ Indicus Spr. IV/3 1625
Cajophora Presl V/1 662; VII 190
Cakile Mill. IV/1 182; VII 177
Aegyptiaca Willd. IV/1 184
Cakile Karst. IV/1 183
edentula Hook. IV/1 182
lanceolata O. E. Schulz IV/1 242
maritima Scop. IV/1 183; VII 74 Fig. 1109 d
myagroides Poir. IV/1 186
rugosa L'Hérit. IV/1 290
„ Serapionis Gaertn. IV/1 183
Caladium Vent. II 131; VII 157
Calamagrostis Adanson I 229; VII 154
acutiflora (Schrad.) Rchb. I 236
agrostiflora Beck I 230
alpina Host I 232
argentea Lam. et DC. I 206
arundinacea (L.) Roth I 235
Baltica Hartm. I 236
Bihariensis Simonkai I 236
Calamagrostis Karst. I 231
canescens Druce I 231
Epigeios (L.) Roth I 233
Halleriana P. B. I 232
Hartmanniana Fries I 236
Haussknechtiana Torges I 236
indagata Torges et Haussknecht I 236
lanceolata Roth I 231
laxa Host I 234
littorea P. B. I 234
montana DC. I 235
montana Host I 235
Prahliana Torges I 236
Pseudophragmites (Hall.) Baumg. I 234
pseudophragmites Rchb. I 232
speciosa Host I 206
Calamagrostis tenella (Schrad.) Lk. I 230
tenella Host I 232
Torgesiana Haussknecht I 236
varia (Schrad.) Host I 235
villosa Mutel I 232
„ Wirtgeniana Haussknecht I 236
Calamintha Moench V/4 2279
Acinos Clairv. V/4 2297, 2548 Fig. 338 A
alpina Lam. V/4 2299
arvensis Lam. V/4 2297
ascendens Jord. V/4 2294
ascendens Briq. V/4 2294
Bosniaca Maly V/4 2293
Clinopodium Moris V/4 2295
coccinea Benth. V/4 2280
Degenii Murr V/4 2294
Einseleana F. Schultz V/4 2294
Fenzlii Vis. V/4 2293
glandulosa Benth. V/4 2292
grandiflora Moench V/4 2288
hederacea Scop. V/4 2373
hybrida Kern. V/4 2301
intermedia Lejeune V/4 2294
menthaefolia Gren. et Godr. V/4 2294
menthaefolia Host V/4 2294
mollis Jord. V/4 2293
montana Lam. V/4 2290
Nepeta Clairv. V/4 2292
Nepeta Host V/4 2293
nepetoides Beck non Jord. V/4 2293
Nuttalli Benth. V/4 2281
obliqua Host V/4 2292
officinalis Moench V/4 2290, 2294
parviflora Lam. V/4 2292
rupestris Host V/4 2287
silvatica Briq. V/4 2290
silvatica Bromfield V/4 2294
stricta Rchb. V/4 2294
subisodonta Borb. V/4 2293
subnuda Host V/4 2293
thymifolia Rchb. V/4 2287
„ trichotoma Moench V/4 2292
Calandrinia H. B. et Kth. III 268, 269; VII 172
Calathea G. F. W. Meyer II 321; VII 164
Calceolaria arachnoidea Grah. VI/1 5
chelidonioides H. B. et Kth. VI/1 6
corymbosa Grah. VI/1 5
crenatifolia Grah. VI/1 5
hybrida L. VI/1 6; VII 202 Fig. 1245
scabiosaeflora Sims VI/1 6; VI/2 1360
Calceolus alternifolius St. Lager II 326
Marianus Crtz. II 326

Calcitrapa Benedicta Lam. VI/2 990
solstitialis Lam. VI/2 980
„ stellata Lam. VI/2 978
Caldesia Parl. I 153; VII 153
„ parnassifolia (Bassi) Parl. I 153
Calendula L. VI/2 799; VII 212
arvensis L. VI/2 804
fruticosa L. VI/2 806
officinalis L. VI/2 801
„ suffruticosa Vahl VI/2 799
Calenduleae VI/2 806; VII 212
Calepina Adans. IV/1 186; VII 177
Corvini Desv. IV/1 189
Corvini Ten. IV/1 189
irregularis (Asso) Thellung IV/1 189
„ Ruellii Bub. IV/1 189
Calicocorsus Schmidt VI/2 1076
Calla L. II 136; VII 157
Aethiopica L. II 131; I/CXI Fig. 183 a
Aethiopica Gaertn. II 136
palustris L. II 136; VII 77 Fig. 1113
Calliandra grandiflora (Willd.) Benth. IV/3 1123
Callianthemum C. A. Mey. III 460; VII 174
amenonoides Schott III 461
bipinnatum Dulac III 463
coriandrifolium Rchb. nec Willk. III 463
Kernerianum Freyn III 462
rutifolium Rchb. III 461
„ rutifolium C. A. Mey. III 463
Callicarpa Americana L. V/3 2236
„ Japonica Thunb. V/3 2236
Calligonum L. III 165; VII 170
Calliopsis bicolor Rchb. VI/1 529
„ tinctoria DC. VI/1 529
Callirhoe involucrata A. Gray V/1 476
Papaver A. Gray V/1 476
triangulata A. Gray V/1 476
„ verticillata hort. V/1 476
Callisia Loeffl. VII 158
Callistemma hortense Nees VI/1 448
Callistemon R. Br. V/2 788
lanceolatus DC. V/2 788
Phoeniceus Lindl. V/2 788
salignus DC. V/2 788
„ speciosus DC. V/2 788
Callistephus Chinensis (L.) Nees VI/1 448; VI/2 1355 Fig. 959
„ hortensis Cass. VI/1 448
Callitrichaceae V/1 190; VII 186
Callitriche L. V/1 193; VII 186
androgyna L. V/1 200
antumnalis L. V/1 194
cophocarpa Sendtner V/1 197
hamulata Kütz. V/1 198
hermaphroditica L. V/1 194
intermedia (Hoffm.) V/1 198
obtusangula Le Gall. V/1 199
Callitriche platycarpa Kütz. V/1 196
polymorpha Boennroth VII 186
truncata Scop. V/1 196
verna L. V/1 200
„ virens Kütz. V/1 194
Callitris Vent. VII 151
quadrivalvis Vent. I 108; VII 151
Calloideae VII 157
Calluna Salisb. V/3 1689; VII 196
Erica DC. V/3 1689
sagittaefolia Gray V/3 1689
„ vulgaris (L.) Hull V/3 1689
Calobotrya sanguinea Spach IV/2 643
Calocephalus Brownii (Cass.) F. v. Muell. VI/1 495
Calochortus venustus Benth. II 278
Calonyction speciosum Choisy V/3 2076
Calophaca grandiflora Reg. IV/3 1402
„ Wolgarica Fisch. IV/3 1402
Calophylloideae V/1 499; VII 189
Calophyllum inophyllum L. V/1 500
Calothamnus Labill. V/2 789
Calotis cuneifolia R. Br. VI/2 1365
dentex R. Br. VI/2 1365
hispidula F. v. Muell. VI/2 1365
lappulacea R. Br. VI/2 1365
multicaulis (Turcz.) Thellung „ VI/2 1365
Calotropis gigantea R. Br. V/3 2063
„ procera R. Br. V/3 2063
Caltha L. III 457; VII 174 und Fig. 969
Moench VI/2 799
alpestris Schott, Nym. et Kotschy III 458
cornuta Schott, Nym. et Kotschy III 458
Freyniana Heldr. III 458
laeta Schott, Nym. et Kotschy III 458
officinalis Moench VI/2 801
palustris L. III 457; VII 58 Fig. 1094 e
Calycanthaceae IV/1 14; VII 175
Calycanthus fertilis Walt. IV/1 14
florida L. IV/1 14
occidentalis Hook. et Arn. IV/1 14
Calyceraceae VI/1 394; VI/2 1359; VII 209
Calycomorphum subterraneum Presl IV/3 1282
Calycotome spinosa (L.) Lk. IV/3 1148
Calydermus Ruiz et Pav. V/4 2560
„ crosus Ruiz et Pav. V/4 2560
Calypso borealis Salisb. II 323
Calyptospora V/3 1668; VII 142
Calystegia R. Br. V/3 2078; VII 199
silvestris Roem. et Schult. V/3 2083
„ Soldanella R. Br. V/3 2083
Camelina Crtz. IV/1 368; VII 178
Alyssum (Mill.) Thellung IV/1 371
Austriaca Roth IV/1 308
grandiflora Boiss. IV/1 368
microcarpa Andrz. IV/1 370
pilosa (DC.) Zinger IV/1 370
pinnatifida Hornem. IV/1 371
Rumelica Vel. IV/1 368
sagittata Crtz. IV/1 371
sagittata Moench IV/1 370
sativa (L.) Crtz. IV/1 268, 370
„ saxatilis Pers. IV/1 143
Camellia L. V/1 497; VII 189
Camelliaceae V/1 494; VII 189
Cammasia Lindl. VII 162
Campanopsis graminifolia O. Kuntze VI/1 389
Campanula L. VI/1 330; VII 22 Fig. 1035
abietina Griseb. VI/1 331
aggregata Willd. VI/1 340
alliariaefolia Willd. VI/1 331
Allionii Vill. VI/1 331
alpestris All. VI/1 331
alpina Jacq. VI/1 337
angustifolia Lam. VI/1 352
barbata L. VI/1 335
Baumgarteni Becker VI/1 359
Beckiana Hayek VI/1 358
betonicifolia Sibth. et Sm. VI/1 331
Bononiensis L. VI/1 341
caespitosa Scop. VI/1 348
Carnica Schiede VI/1 355
Carpatica Jacq. VI/1 331
Cenisia L. VI/1 362; VI/2 1364
Cervicaria L. VI/1 339
cochleariifolia Lam. VI/1 349
consanguinea Simk. VI/1 354
digenea Wettst. VI/2 1364
dilecta Schott, Nym. et Kotschy VI/1 357
divergens Willd. VI/1 335
diversifolia Dum. VI/1 352
elliptica Kit. VI/1 341
Erinus L. VI/1 331
excisa Schleich. VI/1 347; VI/2 1364
farinosa Roch. 340
filiformis Moretti VI/1 346
flaccida Dalla Torre et Sarnth. VI/1 361
fragilis Cyr. VI/1 331
Garganica Ten. VI/1 331
Gisleri Brügger VI/1 364
glaucophylla Schloss. et Vukot. VI/1 340
glomerata L. VI/1 340

Campanula glomeratiformis Murr VI/1 364
Hausmanni Rchb. VI/1 364
hederacea L. VI/1 388
heterophylla Gray VI/1 352
hirta Schultz VI/1 359
Hochstetteri Schott, Nym. et Kotschy VI/1 349
Hostii Witasek VI/1 358
hybrida L. VI/1 367
inconcessa Schott, Nym. et Kotschy VI/1 356
isophylla Moretti VI/1 331
Justiniana Witasek VI/1 355
Kladniana (Schur) Witasek VI/1 354
Kladniana Witasek subsp. mentiens Witasek VI/1 354
lamiifolia Bieb. VI/1 331
lanceolata Beck VI/1 358
lancifolia Witasek VI/1 359
latifolia L. VI/1 344
linifolia Haenke VI/1 357
linifolia Scop. VI/1 355
macrostyla Boiss. et Heldr. VI/1 331
Marchesetti Witasek VI/1 354
Medium L. VI/1 331
minor Lam. VI/1 352
minuta Savi VI/1 352
Morettiana Rchb. VI/1 346
Murrii Dalla Torre et Sarnth. VI/1 364
neglecta Bess. VI/1 343
nobilis Lindl. VI/1 331
patula L. VI/1 361; VI/2 1359 Fig. 963
Pechlaneri Murr VI/1 364
persicifolia L. VI/1 360
petraea L. VI/1 364
Portenschlagiana Roem. et Schult. VI/2 1364
prostrata Dulac VI/1 357
pseudolanceolata (Sag.) Beck VI/1 358
pulla L. VI/1 347
pulla Pollini VI/1 346
pusilla Haenke VI/1 349
pyramidalis L. VI/1 345
Raineri Perpenti VI/1 345
rapunculoides L. VI/1 342
Rapunculus L. VI/1 361
Reboudiana Gren. et Godr. VI/1 352
reniformis Pers. VI/1 352
rhomboidalis L. VI/1 359; VI/2 1364
rotundifolia L. VI/1 352; VI/2 1364
rotundifolia L. subsp. confertifolia (Reut.) Witasek VI/1 353
rotundifolia L. subsp. Pennina (Reut.) Witasek VI/1 353
Campanula rotundifolia L. subspr. praesignis (Beck) Hay. VI/1 353
rotundifolia L. subsp. racemosa Kras.) Witasek VI/1 353
rotundifolia L subsp. solstitialis (Kern.) Witasek VI/1 353
rotundifolia L. var. lancifolia Mert. et Koch VI/1 359
rotundifolia L. var. maior Neilr. VI/1 358
rotundifolia L. var. multiflora Neilr. VI/1 358
rotundifolia L. var. pusilla Neilr. VI/1 349
Scheuchzeri March. VI/1 354
Scheuchzeri Vill. VI/1 357; VI/2 1364
Scheuchzeri Vill. subsp. Kerneri (Witasek) Hayek VI/1 358
Scheuchzeri Vill. subsp. Witasekiana (Vierh.) Hay. VI/1 358
Semproniana Beauv. VI/1 364
Sibirica L. VI/1 334; VII 208 Fig. 1258
simplex DC. VI/1 341
speciosa Hornem. VI/1 341
Speculum Veneris L. VI/1 366
spicata L. VI/1 337
strigosa Rusell VI/1 331
Tauscheri Kern. VI/1 342
Thaliana Wallr. VI/1 341
thyrsoides (nicht thyrsoidea) L. VI/1 338; VI/2 1364
Trachelium L. VI/1 343; VI/2 1364
Tridentina Poll. VI/1 346
Truedingeri Murr VI/2 1364
uniflora Vill. VI/1 357
ursaria Brügger VI/1 364
Vidalii Wats. VI/1 331
„ Zoysii Wulf. VI/1 363
Campanulaceae VI/1 328; VII 208
Campanulatae VI/2 1358; VII 208
Campelepis Falc. VII 199
Campella caespitosa Lk. I 243
Campomanesia Ruiz et Pav. V/2 776
Campotheca Decne. V/2 770
Campsis radicans (L.) Seem. VI/1 175
Camptosema Hook. et Arn. VII 183
Campylopus Brid. VII 145
Campylospermae V/2 934
Campylostemon Welw. V/1 256
Campynematoideae VII 163
Cananga odorata (Lam.) Hook. f. et Thoms. IV/1 14
Canarina Campanula L. VI/1 329
Canarium edule Engl. V/1 83
„ Luzonicum A. Gray V/1 83
Canavalia ensiformis DC. IV/3 1625
Candollea adnata (R. Br.) F. v. Muell. VI/1 394
Candolleaceae VI/1 394; VI/2 1359
Canella alba Murray V/1 585
Canellaceae V/1 585; VII 190
Canna L. VII 164
edulis Ker-Gawler II 321
„ Indica L. II 321
Cannabis L. III 133; VII 92
„ sativa L. III 133
Cannaboideae III 123
Cannaceae II 320, 321; VII 163
Canscora Lam. V/3 1956
Cantharellaceae VII 142
Cantharellales VII 142
Cantua buxifolia Juss. V/3 2114
Capnoides cava Moench IV/1 38
intermedia Beck IV/1 41
pumila Beck IV/1 40
„ solida Moench IV/1 39
Capnophyllum peregrinum (L.) Lange V/2 1354
Capparidaceae IV/1 490; VII 176
Capparis coriacea Burch. IV/1 491
decidua Pax IV/1 491
„ spinosa L. IV/1 490
Caprifoliaceae VI/1 233; VII 207
Caprifolium alpinum Lam. VI/1 253
caeruleum Lam. VI/1 254
dimorphum Kuntze VI/1 257
distinctum Moench VI/1 255
dumetorum Lam. VI/1 252
Etruscum Roem. et Schult. VI/1 257
flavum Raf. VI/1 257
Germanicum Delarbre VI/1 258
Germanicum Roehl. VI/1 255
hortense Lam. VI/1 258
Italicum Roem. et Schult. VI/1 258
pallidum Schur VI/1 258
perfoliatum Roehl. VI/1 258
Periclymenum Roem. et Schult. VI/1 255
rotundifolium Moench VI/1 258
silvaticum Lam. VI/1 255
vulgare Med. VI/1 258
„ Xylosteum Gaertn. VI/1 252
Capsella Med. IV/1 363; VII 177
alpina Rchb. IV/1 358
Bursa pastoris (L.) Med. IV/1 364
Gelmii Murr IV/1 368
gracilis Gren. IV/1 367
grandiflora (Bory et Chaub.) Boiss. IV/1 363
Heegeri Solms IV/1 365
hybrida Albert IV/1 367
nudicaulis Prantl IV/1 72
petraea Fries IV/1 360
procumbens (L.) Fries IV/1 361
„ rubella Reut. IV/1 367
Capsicum L. VII 203
annuum L. V/4 2556
fastigiatum Bl. V/4 2556
frutescens L. V/4 2556

Capsicum longum DC. V/4 2556
Caragana Lam. IV/3 1400; VII 182
Altagana (Pall.) Poir. IV/3 1401
arborescens Lam. IV/3 1401
argentea Lam. IV/3 1400
aurantiaca Koehne IV/3 1401
Caragana Karsten IV/3 1401
chamlagu Lam. IV/3 1401
ferox Lam. IV/3 1401
frutex (L.) C. Koch IV/3 1401
grandiflora (Bieb.) DC. IV/3 1401
inermis Moench IV/3 1401
jubata Poir. IV/3 1401
microphylla Lam. et DC. IV/3 1401
pygmaea (L.) DC. IV/3 1401
spinosa (L.) DC. IV/3 1401
spinosissima C. Koch IV/3 1401
„ tragacanthoides hort. IV/3 1401
Caralluma Europaea (Guss.) N.E.Br. V/3 2059
Carapa procera DC. V/1 85
Carbenia Benedicta Benth. et Hook. VI/2 990
Cardamine L. IV/1 333; VII 177
acaulis Berg IV/1 348
alpina Willd. IV/1 350
amara L. IV/1 348
ambigua O. E. Schulz IV/1 353
apetala Moench IV/1 339
arenosa Roth IV/1 421
asarifolia L. IV/1 338
Austriaca O. Kuntze IV/1 308
bellidifolia L. IV/1 350
brachycarpa Opiz IV/1 339
bulbifera (L.) Crtz. IV/1 325
chenopodiifolia Pers. IV/1 69, 335
Degeniana Janchen IV/1 333
digitata O. E. Schulz IV/1 329
Draba Desv. IV/1 78
enneaphyllos Crtz. IV/1 330
flexuosa With. IV/1 342
Fringsii F. Wirtg. IV/1 352
glandulosa Schmalh. IV/1 332
Grafiana O. E. Schulz IV/1 333
Halleri Prantl IV/1 423
Haussknechtiana O. E. Schulz IV/1 352
heterophylla Host IV/1 350, 351
hirsuta Bess. IV/1 342
hirsuta L. IV/1 340
impatiens L. IV/1 339
impatiens O. F. Muell. IV/1 342
integrifolia Gilib. IV/1 345
intermedia Hornem. IV/1 340
Keckii Kern. IV/1 353
latifolia Lejeune IV/1 345
Matthioli Moretti IV/1 346
Nasturtium O. Kuntze IV/1 319
nemorosa Wender. IV/1 345
Cardamine Opizii Celak. IV/1 349
paludosa Knaf IV/1 346
palustris L. IV/1 316
palustris Peterm. IV/1 346, 347
parviflora Bess. IV/1 340
parviflora Lam. IV/1 348
parviflora L. IV/1 344
Paxiana O. E. Schulz IV/1 333
pentaphylla R. Br. IV/1 329
petraea L. IV/1 419
pinnata R. Br. IV/1 328
polyphylla O. E. Schulz IV/1 327
pratensis L. IV/1 345; VII 33 Fig. 1055
praticola Jord. IV/1 347
resedifolia L. IV/1 351
Savensis O. E. Schulz IV/1 324
saxatilis Salisb. IV/1 339
silvatica Lk. IV/1 342
silvestris O. Kuntze IV/1 312
stricta Hayne IV/1 346
tetrandra Hegetschw. IV/1 340
trifolia L. IV/1 336
trifoliolata Baumg. IV/1 336
umbrosa Andrz. IV/1 341
uniflora Sternb. et Hoppe IV/1 348
Wettsteiniana O. E. Schulz IV/1 353
Zahlbruckneriana O. E. Schulz IV/1 352
Cardaminopsis (C. A. Mey.) Hay. IV/1 419; VII 178
arenosa (L.) Hay. IV/1 421
Halleri (L.) Hayek IV/1 423; VII 177 Fig. 1220
Halleri (L.) Hay. subsp. Ovirensis (Wulf.) IV/1 424
hispida (Mygind) Hay. IV/1 419
„ neglecta (Schult.) Hay. IV/1 425
Cardaminum Moench IV/1 319
Cardaria crassifolia Spach IV/1 89
„ latifolia Spach IV/1 89
Cardiaca arvensis Lam. V/4 2415
crispa Moench V/4 2393
silvatica Lam. V/4 2441
trilobata Lam. V/4 2393
„ vulgaris Moench V/4 2392
Cardionema ramosissimum Thellung VII 173
Cardiospermum Halicacabum L. V/1 307
Carduncellus Juss. VI/2 990
Cardunculus lanatus Moris VI 2 989
Carduus L. VI/2 845; VII 212
acanthifolius Lam. VI/2 898
acanthoides L. VI/2 858
acaulis L. VI/2 876
acicularis Bertol. VI/2 845
agrestis A. Kern. VI/2 857
albidus Lam. VI/2 861
alpestris Willd. VI/2 854
arctioides Koch VI/2 854
Carduus arctioides Vill. VI/2 856
Argemone Pourr. VI/2 851
arvensis Sm. VI/2 903
Aschersonianus Ruhm. VI/2 865
Ausserdorferi Hut. VI/2 863
Autareticus Vill. VI/2 912
axillaris Gaud. VI/2 858, 865
Brunneri Döll VI/2 863
Burnati Genty VI/2 865
candicans Koch VI/2 849
canus L. VI/2 883
Carduelis A. Kern. VI/2 854
carlinaefolius Lam. VI/2 851
carlinaefolius Schult. VI/2 853
Carniolicus Pers. VI/2 895
Carniolicus Rech. VI/2 864
chrysacanthus auct. VI/2 848
cirsioides Vill. VI/2 850
collinus W. et K. VI/2 849
comosus Lam. VI/2 901
Conrathii Hay. VI/2 865
crassifolius Döll VI/2 851
crispus Gouan nec L. VI/2 862
crispus L. VI/2 860
cyanoides Bieb. VI/2 841
cylindricus Borb. VI/2 850
Decandollei Moretti VI/2 846
defloratus L. VI/2 850
digeneus Beck VI/2 865
elatior Döll VI/2 865
eriophorus L. VI/2 869
Erisithales Jacq. VI/2 896
Erisithales Vill. VI/2 893
glaucus Baumg. VI/2 851
Grenieri Schultz-Bip. VI/2 864
hamulosus Ehrh. VI/2 855
heterophyllus L. VI/2 885
Juratzkae Beck VI/2 863
Killiasii Brügg. VI/2 865
lanceolatus L. VI/2 873
laxus Beck VI/2 865
leiophyllus Petrov. VI/2 845
leptocephalus Peterm. VI/2 865
litigiosus Nocca et Balb. VI/2 846
litoralis Posp. VI/2 848
lycopifolius Vill. VI/2 929
Marianum L. VI/2 917
medius Ten. VI/2 853
Michaletii Beck VI/2 865
micropterus Teyber VI/2 848
mollis L. VI/2 843
Moritzii Brügg. VI/2 865
Naegelii Brügg. VI/2 865
nigrescens Vill. VI/2 846
nutans L. VI/2 846
nutans L. subsp. platylepis (Saut.) Gugl. VI/2 848
„ oleraceus Vill. VI/2 898
orthocephalus Wallr. VI/2 864
palustris L. VI/2 878
Pannonicus L. f. VI/2 881
pauciflorus Pers. VI/2 894
Peisonis Teyber VI/2 864

Carduus Personata Jacq. VI/2 856
polyacanthus Schleich. VI/2 864
polyanthemus Döll VI/2 864
polyanthus Schreb. VI/2 858
Poolii Brügg. VI/2 864
praticolus Beck VI/2 865
pycnocephalus L. VI/2 861
pygmaeus Jacq. VI/2 836
pyrochroos Less. VI/2 923
Raeticus A. Kern. VI/2 853
rivularis Jacq. VI/2 890
Schulzeanus Beck VI/2 865
Schulzeanus Rühm. VI/2 865
sepincolus Fleisch. VI/2 861
sepincolus Hausskn. VI/2 857
serratuloides Jacq. VI/2 881
spiniger Jord. VI/2 846
spinosissimus Vill. VI/2 901
spinulosus Bertol. VI/2 853
Stangii Buek VI/2 864
subinteger Murr VI/2 865
summanus Poll. VI/2 852
Tataricus Jacq. VI/2 912
tenuiflorus Curt. VI/2 862
tinctorius Scop. VI/2 927
transalpinus Suter VI/2 852
Tridentinus Evers VI/2 853
tuberosus L. VI/2 889
uncinatus Bieb. VI/2 845, 846
Vindobonensis Beck VI/2 864
„ Weizensis Hay. VI/2 865
Carex L. II 51; VII 156
acuta All. II 121
acuta Curt. II 120
acuta L. II 80
acutiformis Ehrh. II 120
affinis Kth. II 56
alba Scop. II 99
alluvialis Figert II 83
alopecurus Lap. II 21
alpestris All. II 97
alpestris Lam. II 87
alpina Sw. II 84
Alsatica Zahn II 115
ampullacea Good. II 118
androgyna Balb. II 83
Appeliana Zahn II 115
approximata All. II 90
approximata Hoppe nec All. II 74
approximata Schum. II 69
arenaria L. II 62
argentea Chaix II 99
aristata Clairv. II 58
aristata R. Br. II 123
Arthuriana Beckm. II 76, 78
aterrima Hoppe II 86
atrata L. II 85
atrofusca Schkuhr II 106
Austriaca Schkuhr II 61
axillaris Good. II 66, 77
badia Pers. II 87
Baldensis L. II 59
Banatica Heuffel II 79
Beckmannia Figert II 124
Carex Bellardi All. II 49
bicolor Bell. II 83
Binderi Podpěra II 115
binervis Sm. II 114
Binnensis Kneucker II 86
bipartita Bell. II 50
Blytii Nyl. II 76
Boenninghauseniana Kth. II 70, 77
Bohemica Schreb. II 58
bolina Lang II 79
brachystachys Schrank II 102
brevifolia Host II 107
brizoides L. II 64
brunnescens (Pers.) Poir. II 75
Buekii Wimm. II 79
Buxbaumii Wahlenb. II 84
caesia Griseb. II 88
caespitosa Good. II 81
caespitosa L. II 79
Candriana Kneucker II 86
canescens L. II 75; VII 100 Fig. 1128
canescens Leers II 67
capillaris L. II 97
capitata L. II 55
caryophyllea La Touretti II 90
Caucasica Stev. II 85
Cenisia Balb. II 83
chordorrhiza L. II 60; VII 69 Fig. 1103
cinerea Poll. II 75
clandestina Good. II 99
claviformis Hoppe II 94
Čokae Podpěra II 83
compacta Hoppe II 82
contigua Hoppe II 67
Corsicana Lk. II 115
crassa Ehrh. II 121
Csomadensis Schmidt II 124
curta Good. II 75
curvula All. II 70; VII 51 Fig. 1082
cuspidata Bert. II 61
cyperoides L. II 58
Davalliana Sm. II 54
decolorans Wimm. II 83
decumbens Ehrh. II 87
depauperata Good. II 111
depauperata Hornem. II 95
diandra Schrank II 69
digitata L. II 100
diluta Janka II 114
dioica L. II 53
distans L. II 114
disticha Huds. II 62
divergens Thuill. II 72
diversifolia Host II 97
divisa Huds. II 61
divulsa Good. II 86
Drejeri O. F. Lang II 79
Drymeia Ehrh. II 110
Dufftii Hausskn. II 102
Duriaei Fr. Schultz II 68
Carex echinata Murray II 67
elata All. II 78
elegans Willd. II 92
elongata L. II 72
elytroides Fries II 83
Emmae Gross II 70, 78
ericetorum Poll. II 90
evoluta Hartm. II 124
extensa Good. II 116
Ferdinandi Sauteri Aschers. et Graebn. II 87, 91
ferruginea Schkuhr II 103
ferruginea Scop. II 107
Figertii Aschers. et Graebner II 54
filiformis Good. II 122
filiformis Poll. II 87
filiformis Thuill. II 88
fimbriata Schkuhr II 107
firma Host II 104; VII 112 Fig. 1147
flacca Schreb. II 94
flava L. II 117
Fleischeri Podpěra II 124
foetida All. nec Vill. II 66
Frankii Podpěra II 82
frigida All. II 105
frigida Wahlenb. II 105
Fritschii Waisbecker II 91
fuliginosa Schkuhr II 105
fulva auct. II 114
fulva Good. II 115
funiformis Clairv. II 60
fusca All. II 84
Fussii Simonkai II 70, 73
Gaudiniana Guthnick II 56, 73
Gebhardi Hoppe II 75
geniculata Host II 105
Gerhardtii Figert II 73, 76
Germanica Richter II 70
glauca Murray II 94
globularis L. II 88
globularis Sut. II 90
glomerata Gilib. II 65
glomerata Host II 61
glomerata Schkuhr II 86
Goodenowii Gay II 81
gracilis Curtis II 80
gracilis Moench II 89
Grossii Fiek II 124
gynobasis Vill. II 97
Halleri Gunn. II 84
Halleriana Asso II 97
Heleonastes Ehrh. II 73
helodes Lk. II 109
Helvetica Honck. II 105, 120
Helvetica Schleich. II 115
hirta L. II 122
hispidula Gaud. II 107
hordeiformis Host II 113
hordeiformis Wahlenb. II 112
hordeistichos Vill. II 112, 113
Hornschuchiana Hoppe II 114
Hosteana Nym. II 114

Carex Hostiana DC. II 114
Hostii Schkuhr II 61
Hudsonii Arth. II 78
humilis Leyss. II 99
hymenocarpa Drej. II 119
hyperborea Wimm. II 83
Jaegeri F. Schultz II 95
Ilseana Ruhmer II 73, 76
incurva Lightf. II 60
inflata Sut. II 118
interiecta Waisbecker II 91
intermedia Good. II 62
intermedia Urv. II 62
inversa R. Br. VII 156
irrigua Sm. II 93
iuncifolia All. nec Host II 60
iuncifolia Gmel. II 102
iuncifolia Host II 61
Justi Schmidtii P. Junge II 124
Kochiana DC. II 121
Kohtsii Richt. II 124
Kuekenthalii Dörfl., Zahn II 66 67
Lachenalii Schkuhr II 74
Lackowitziana A. R. Paul II 88, 91
laevis Hoppe II 53
Laggeri Wimm. II 66, 73
lagopina Wahlenb. II 74
lasiocarpa Ehrh. II 122
Laussii Podpěra II 95
laxula Tineo II 110
Leersii F. Schultz II 66
Leersii Willd. II 72
leoporina L. II 71
lepidocarpa Tausch II 117
leptostachys Ehrh. II 111
leucantha Schur II 96
leucoglochin Ehrh. II 57
Leutzii Kneucker II 115
levigata Sm. II 109
levirostris (Blytt) Fries VII 156
Ligerica Gay II 63
Ligniciensis Figert II 83
limnogena Appel II 70
limosa L. II 92
Linnaeana Host II 53
loliacea L. II 76
loliacea Schkuhr II 67
longifolia Host II 91
longirostris Krock. II 109
ludibunda Gay II 70, 76
Lusitanica Schkuhr II 69
Magellanica Lam. II 93
maxima Scop. II 98
melanostachys Willd. II 121
membranacea Hoppe II 90
Michelii Host II 112
microcephala C. A. Mey. II 56
microglochin Wahlenb. II 58
microstachya Ehrh. II 54, 76
microstyla Gay II 66
mollis Gilib. II 71
montana L. II 89
Carex montana Leers II 90
mucronata All. II 102
Muelleriana F. Schultz II 115
multiceps Gaud. II 72
multiflora Muehlenberg II 68
multiformis Thuill. II 62
muricata Hoppe et Sturm II 66
muricata Huds. II 72
muricata L. II 67, 68
Murrii Appel II 109
myosuroides Vill. II 49
neglecta Degl. II 114
nemorensis Gmel. II 93
nemorosa Schrank II 99
nervosa Desf. II 116
nigra Beck II 81
nigra Bell. II 86
nitida Hoppe II 102
nitida Host II 87
nutans Host II 121
obtusangula Ehrh. II 118
obtusata Liljeblad II 56
obtusata Rchb. f. II 86
Oederi Ehrh. II 117
Ohmuelleriana O. F. Lang II 65, 77
ornithopoda Willd. II 101
ornithopodioides Hausm. II 101
ornithopus Willd. II 101
orthostachys Rupr. II 123
ovalis Gmel. II 71
pacifica Dreyer II 79
Pairaei F. Schultz II 67
pallescens L. II 96
paludosa Good. II 120
palustris Sut. II 120
panicea L. II 95
paniculata L. II 69
Pannewitziana Figert II 124
Paponii Muret II 55, 73
paradoxa Willd. II 69
parviflora Host II 86
patula Hudson II 57
patula Scop. II 110
pauciflora Lightf. II 57
Paulii Aschers. et Graebn. II 88, 91
pediformis C. A. Mey. II 100
pellucida Turcz. II 100
pendula Hudson II 98
peraffinis Appel II 83
Persoonii Sieb. II 75
petraea Wahlenb. II 56
pilosa Scop. II 93
pilulifera L. II 87
Ploettneriana R. Beyer II 73, 78
polyandra Schkuhr II 81
polygama Schkuhr II 84
polyrrhiza Wallr. II 91
Portae Hut. II 76
praecox Jacq. nec Schreb. II 90
praecox Schreb. nec Jacq. II 64
Carex praetutiana Parl. II 94
prostrata All. II 99
pseudoarenaria Rchb. II 63
pseudocyperus L. II 118
pseudovulpina Richt. II 66
psyllophora Ehrh. II 57
pulicaris All. II 54
pulicaris L. II 57
punctata Gaud. II 115
reflexa Hoppe II 91
refracta Willd. II 108
remota L. II 77
reversa Gilib. II 118
rhynchophysa A. Mey. VII 156
Rieseana Figert II 77
rigida Good. II 82
rigida Schrank II 104
riparia Curt. II 121
rostrata Stokes II 118
Rotae de Not. II 69
Ruedtii Kneucker II 118
rufa Beck II 80
rupestris Bell. II 56
Sanionis Richt. II 91
saxatilis Scop. II 86
saxatilis Wahlenb. II 82
scabra Hoppe II 54
Scheuchzeri Gaud. II 102
Schkuhrii Willd. II 86
schoenoides Lasch II 63
schoenoides Thuill. II 61
Schraderi Schkuhr II 109
Schreberi Schrank II 64
Schuetzeana Figert II 70, 76
secalina Wahlenb. II 113
sempervirens Vill. II 103; VII 109 Fig. 1143
Siegertiana Uechtr. II 123
silvatica Hudson II 110
spadicea Gilib. II 62
spadicea Host II 107
spadicea Roth II 120
spadicea Schkuhr II 105
sparsiflora Steud. II 95
sphaerocarpa Ehrh. II 88
spicata Brot. II 70
spicata Poll. II 62
spicata Schkuhr II 56
spicata Thuill. II 65
stellulata Good. II 72
stenophylla Wahlenb. II 61
stricta Good. II 78; VII 69 Fig. 1104
strigosa Huds. II 111
Sudetica Presl II 95
sulcata Schur II 121
supina Wahlenb. II 86
tenax Reut. II 108
tenella Schkuhr II 76
tenuis Host II 102
teretiuscula Good. II 70
tetrastachya Traunst. II 73, 76
Toezensis Simonk. II 124
tomentosa L. II 88

Carex triflora Willd. II 111
trinervis Degl. II 94
turfacea Gmel. II 120
turfacea Kit. II 69
turfosa Fries II 83
Uechtritziana Richt. II 124
uliginosa L. II 43
uliginosa Sut. II 62
umbrosa Host II 91
undulata Schur II 96
ustulata Wahlenb. II 106
vaginata Tausch II 95
Vahlii Schkuhr II 84
ventricosa Curt. II 111
verna Chaix II 90
vesicaria L. II 120
vesicaria Leers II 121
Viadrina Figert II 83
Villarsii Schkuhr II 66
virens Thuill. II 80
Vismariensis Hausskn. II 91
Vratislaviensis Figert II 83
vulgaris Fries II 81
vulpina L. II 65
vulpinoidea Rich. II 68
Winkelmanni Aschers. et Graebn. II 95
Wolteri Rud. Gross. II 124
xanthocarpa Degl. II 115
Zahnii Kneucker II 75
„ Zimpeliana P. Junge II 83, 95
Cargillia R. Br. V/3 1898
Carica Cundinamarcensis Hook. V/1 661
„ Papaya L. V/1 660
Caricaceae V/1 660; VII 190
Caricoideae VII 156
Carlina L. VI/2 816; VII 212
acaulis L. VI/2 817
aggregata Waldst. et Kit. VI/2 819
Chamaeleon Vill. VI/2 817
grandiflora Moench VI/2 817
gummifera Less. VI/2 824
intermedia Schur VI/2 823
longifolia Rchb. VI/2 823
Nebrodensis Koch VI/2 823
simplex Waldst. et Kit. VI/2 819
stricta Rouy VI/2 823
subacaulis DC. VI/2 817
„ vulgaris L. VI/2 821
Carludovica palmata Ruiz et Pav. II 131; VII 157
Carmichaelia australis R. Br. IV/3 1390
„ Muelleriana Reg. IV/3 1390
Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton et Rose V/2 691
Caroselinum Chabraei Griseb. V/2 1375
Carota Rupr. V/2 1501
sativa Rupr. V/2 1516
silvestris Rupr. V/2 1514
Carpesium L. VI/1 489; VII 211
abrotanoides L. VI/1 489
„ cernuum L. VI/1 489
Carpinus L. III 66; VII 168
Betulus L. III 66
Caroliniana Walt. III 66
cordata Blume III 66
Duinensis Scop. III 66
Italica Scop. III 69
Japonica Blume III 66
Orientalis Mill. III 66
Ostrya Wangenh. III 69
sepium Lam. III 66
„ vulgaris Mill. III 66
Carpoceras A. Rich. VII 205
Carpódinus R. Br. V/3 2049
Carrictera annua (L.) Prantl VII 177
Carthamus L. VI/2 985; VII 212
caeruleus L. VI/2 986
involucratus Lam. VI/2 901
lanatus L. VI/2 989
oxyacanthus Bieb. VI/2 986
„ tinctorius L. VI/2 986
Carum L. V/2 1181; VII 194
Ajowan Baill. V/2 1168
alpinum Benth. et Hook. V/2 1189
Ammi Sprague V/2 1168
ammoides Arcangeli V/2 1175
Anisum Baill. V/2 1209
aromaticum Salisb. V/2 1182
brachycarpum Boiss. V/2 1190
Bunius L. V/2 1173
Carvi L. V/2 1182
decussatum Gilib. V/2 1182
Falcaria Lange V/2 1177
ferulaceum Arcangeli V/2 1190
flexuosum Fries V/2 1195
incrassatum Boiss. V/2 1190
Korolkowii Lipsky V/2 1168
latifolium Jackson V/2 1180
magnum Baill. V/2 1199
maius Rendle et Britton V/2 1195
Meum Stokes V/2 1300
montanum Arcangeli V/2 1190
nigrum Baill. V/2 1206
officinale S. F. Gray V/2 1182
Petroselinum Benth. et Hook. V/2 1155
Podagraria Roth V/2 1212
Ridolfia Benth. et Hook. V/2 1161
Saxifraga Baill. V/2 1202
segetum Arcangeli V/2 1154
segetum O. Kuntze V/2 1161
Sisarum Baill. V/2 1222
sulcatum Steud. V/2 1311
verticillatum (L.) Koch V/2 1187
„ vulgare Druce V/2 1155
Carvi flexuosum Bub. V/2 1195
Carvifolia Vill. V/2 1310
Crantzii Vill. V/2 1311
Carya Nutt. III 7; VII 167
Caryocaraceae V/1 493, 494; VII 189
Caryolopha sempervirens Fisch. et Trautv. V/3 2198
Caryophyllaceae III 271; VII 172
Caryophyllata aquatica Lam. IV/2 915
montana Lam. IV/2 909
officinalis Moench IV/2 917
reptans Lam. IV/2 911
rivalis Scop. IV/2 915
urbana Scop. IV/2 917
„ vulgaris Lam. IV/2 917
Caryophyllus aridus Moench III 315
Armerius Moench III 320
barbatus Moench III 321
deltoides Moench III 328
plumarius Moench III 338
„ superbus Moench III 342
Caryopteris incana Miqu. V/3 2238
Mastacanthus Schauer V/3 2238
„ Mongolica Bunge V/3 2238
Casimiroa edulis Llav. et Lex. V/3 53
Cassandra D. Don V/3 1654
„ calyculata Don V/3 1654
Cassebeeria margaritacea (Lindl.) Krasser V/2 796
Casselia paniculata Dum. V/3 2128
„ Virginica Dum. V/3 2128
Cassia acutifolia Del. IV/3 1131
angustifolia Vahl IV/3 1131
fistulosa L. IV/3 1131
floribunda Cav. IV/3 1132
lanceolata Royle IV/3 1131
Marylandica L. IV/3 1131
medicinalis Bischoff IV/3 1131
obovata Coll. IV/3 1131
„ occidentalis L. IV/3 1131
Cassida galericulata Moench V/4 2510
hastifolia Scop. V/4 2511
„ major Gilib. V/4 2510
Cassine L. V/1 245; VII 187
Cassiope tetragona (L.) Don V/3 1621
Cassytha filiformis L. IV/1 11
Castalia Salisb. III 440
alba Wood III 441; VII 62 Fig. 1097
candida Schinz et Keller III 443; VII 110 Fig. 1144
speciosa Salisb. III 441
tetragona Lawson III 440
Castanea Mill. III 101; VII 169
Americana Raf. III 101
Castanea Karst. III 101
crenata Sieb. et Zucc. III 101
sativa Mill. III 101; VII 27 Fig. 1050
vesca Gaertn. III 101
„ vulgaris Lam. III 101
Castanopsis Spach III 95
Castiloa elastica Cerv. III 123
Casuarinaceae VII 165

Catabrosa Pal. I 288; VII 155
„ aquatica (L.) Pal. I 288
Catalpa bignonioides Walt. VI/1 175; VII Fig. 1243, 1251
Kaempferi Sieb. et Zucc. VI/1 175
Catananche caerulea L. VI/2 1007
„ lutea L. VI/2 1007
Catanthera lysipetala F. v. Muell. V/3 1611
Catapodium unilaterale Griseb. I 330
Cataria paniculata Moench V/4 2371
„ vulgaris Moench V/4 2369
Catha edulis Forsk. V/1 244
Catharinaea Ehrh. VII 146
Cathartolinum Gallicum Rchb. V/1 14
pratense Rchb. V/1 6
„ tenuifolium Rchb. V/1 12
Catopheria Benth. V/4 2267; VII 201
Catopheroideae VII 201
Cattleya labiata Lindl. II 323
Caucalis L. V/2 1061; VII 193
Anthriscus Huds. V/2 1051
arvensis Huds. V/2 1054
capitata Salisb. V/2 957
carnosa Roth V/2 1514
Carota Crtz. V/2 1514
coniifolia Wall. V/2 1051
daucoides Bischoff V/2 1063
daucoides L. V/2 1062
divaricata Heller V/2 1056
echinophora Benkö V/2 1062
elata D. Don V/2 1051
elongata Lk. V/2 1050
Gingidium Crtz. V/2 1508
grandiflora L. V/2 1069
Helvetica Jacq. V/2 1056
Hispanica Lam. V/2 1503
humilis Jacq. V/2 1050
humilis Viv. V/2 1058
infesta Curt. V/2 1056
latifolia L. V/2 1064
leptophylla L. V/2 1050
leptophylla Viv. V/2 1058
linearifolia Requien V/2 1057
maritima Lam. V/2 1062
maxima Baumg. V/2 1461
microcarpa E. H. L. Krause V/2 1053
muricata Bischoff V/2 1064
neglecta Arcangeli V/2 1055
nodiflora Lam. V/2 1057
nodosa All. V/2 994
nodosa Crtz. V/2 1057
Orientalis Lour. V/2 1051
Orientalis L. V/2 1060
parviflora Lam. V/2 1050
platycarpos L. V/2 1068
pulcherrima Willd. V/2 1060
purpurea Ten. V/2 1057
Royeni Crtz. V/2 1060
Sanicula Crtz. V/2 957
Scandix Scop. V/2 1030
Caucalis tenerrima Scheele V/2 1057
tenuifolia Salisb. V/2 1062
„ xanthotricha Stev. V/2 1050
Caulerpaceae VII 138
Caulinia flexilis Willd. I 145
„ fragilis Willd. I 146
Caulis cheiranthus E. H. L. Krause IV/1 269
muralis E. H. L. Krause IV/1 211
Pollichius E. H. L. Krause IV/1 224
raphanister E. H. L. Krause IV/1 276
sinapiaster E. H. L. Krause IV/1 263
tenuifolia E. H. L. Krause IV/1 214
Caulophyllum Michx. VII 175
Cavanillesia Ruiz et Pav. VII 188
Ceanothus Americanus L. V/1 324, 325
azureus Desf. V/1 325
cuneatus Nutt. V/1 325
dentatus Torr. et Gray V/1 325
Fendleri Gray V/1 325
Nevadensis Kellogg V/1 325
prostratus Benth. V/1 325
sanguineus Pursh V/1 325
velutinus Dougl. V/1 325
Versaillensis C. K. Schneid. V/1 325
Cebatha Forsk. IV/1 16
Cecropia palmata Willd. III 124
„ peltata L. III 124
Cedrela odorata L. V/1 84
Cedronella Canariensis (L.) Willd. V/4 2368
Mexicana Hook. V/4 2368
„ triphylla Moench V/4 2368
Cedrus (Trew) Link VII 151
atlantica Manetti I 81
deodara Loudon I 81
„ Libani Loudon I 81
Ceiba pentandra Gaertn. V/1 489
Celastraceae V/1 243; VII 186
Celastrales V/1 202; VII 186
Celastrus angulata Maxim. V/1 245
articulata DC. V/1 245
dependens Wallr. V/1 245
flagellaris Rupr. V/1 245
orbiculata Thunb. V/1 245
paniculata Willd. V/1 245
punctata Thunb. V/1 245
„ scandens L. V/1 246
Celeri Adans. V/2 1139
Celosia argentea L. III 261
„ cristata L. III 261
Celsia Orientalis Rchb. VI/2 1360
Celtis L. III 121; VII 168
australis L. III 122
Caucasica Willd. III 121
lutea Pers. III 122
occidentalis L. III 121
Celtis orientalis Mill. III 121
„ Tournefortii Lam. III 121
Celtoideae III 117
Cenangella BresadolaeRehmV/3 1631
Rhododendri (Ces.) Rehm V/3 1631
Cenchrus racemosus L. I 186
„ tribuloides L. I 194
Cenolophium Koch V/2 1326; VII 194
Fischeri (Spr.) Koch V/2 1326
„ Golaka Caruel V/2 1087
Centaurea L. VI/2 934; VII 212
acaulis L. VI/2 936
acuta Lam. VI/2 930
acutiloba DC. VI/2 940
adonidifolia Rchb. VI/2 942
adpressa (Ledeb.) Gugl. VI/2 977
affinis Friv. VI/2 937
alba Vis. VI/2 940
Algeriensis Coss. et Dur. VI/2 937
alpestris (Hegetschw.) Hay. VI/2 977
alpina L. VI/2 939
Americana Nutt. VI/2 936
angustifolia Miller VII 212
arvensis Moench VI/2 961
Aschersoniana VI/2 985
aspera L. VI/2 937
atropurpurea W. et K. VI/2 936
australis Panc. VI/2 971
Austriaca Hausm. VI/2 955
Austriaca Rohr et Mey. VI/2 960
Austriaca Willd. VI/2 958
austriacoides Woloizczak VI/2 985
axillaris Willd. VI/2 967
Babylonica L. VI/2 937
Badensis (Tratt.) Gugl. VI/2 977
Baldensis Pers. VI/2 939
balsamita L. VI/2 937
Beckiana M. F. Müllner VI/2 984
Behen Lam. VI/2 936
Benedicta L. VI/2 990
Besseana Beauv. VI/2 985
Biebersteinii DC. VI/2 971
bracteata (Scop.) Hay. VI/2 946
brevipappa Boiss. et Heldr. VI/2 951
Brixinensis Heimerl VI/2 984
Burnati F. O. Wolf VI/2 985
Calcitrapa L. VI/2 978
calcitrapoides Trev. VI/2 937
calolepis Boiss. VI/2 973
Carpatica Form. VI/2 967
Castriferri Borb. et Waisb. VI/2 960
cerinthaefolia Sibth. VI/2 936
Cineraria L. VI/2 936
cirrhata Griseb. et Schenk VI/2 960

Centaurea cirrhata Rchb. VI/2 955
collina L. VI/2 937
collina Scop. nec L. VI/2 942
coriacea Borb. VI/2 977
coriacea Rchb. VI/2 976
coriacea W. et K. VI/2 974
Cornuti Rchb. VI/2 939
cristata Bartl. VI/2 940
Crucheti Beauv. et Bess. VI/2 985
Crupina L. VI/2 930
cyanoides Berggr. et Wahlenb. VI/2 936, 937
Cyanus L. VI/2 961
dealbata Willd. VI/2 937
Debeauxii (Gren. et Godr.) Gugler VI/2 954
depressa Bieb. VI/2 936
dichroantha A. Kern. VI/2 941
diffusa Lam. VI/2 973
dilutata Ait. VI/2 937
dissecta Ten. VI/2 937
dubia Suter VI/2 950
elatior Hay. VI/2 959
eriophora L. VI/2 937
eu-maculosa Gugl. VI/2 971
extranea Beck VI/2 984
Fritschii Hay. VI/2 976
fuliginosa Doll. VI/2 977
Gallica Gugler VI/2 937
Gaudini Beck VI/2 946
Gaudini (Boiss. et Reut.) Gremli VI/2 946
Gerstlaueri Erdner VI/2 985
GrabowskianaAschers. VI/2 985
Grafiana DC. VI/2 985
Grineensis Reut. VI/2 976
Hausmannii Hay. VI/2 984
Hayekiana Teyber VI/2 985
Haynaldi (Borb.) Hay. VI/2 947
helenifolia Arcangeli VI/2 932
Hippophaestum Gaertn. VI/2 978
Hoedliana J. Wagn. VI/2 984
Jacea L. VI/2 944
Javornikensis Form. VI/2 967
Iberica Trev. VI/2 937
involucrata Desgl. VI/2 937
Juvenalis Del. VI/2 984
Kotschyana Koch VI/2 977
lanata DC. VI/2 989
leucolepis Hay. VI/2 940
longifolia Posp. VI/2 985
lyrata Bell. VI/2 933
macrocephala Willd. VI/2 936
macroptilon (Borb.) Hay. VI/2 948
maculata Koch VI/2 970
maculosa Lam. VI/2 969
maculosa Lam. var. Vallesiaca DC. VI/2 972
Matziana Teyber VI/2 984
Melitensis L. VI/2 983
Menteyerica Chaix VI/2 977
Centaurea Michaeli Beck VI/2 985
micranthos Gmel. VI/2 971
micranthos (Gmel.) Gugl. VI/2 971
mollis (W. et K.) Gugl. VI/2 967
montana L. VI/2 965
Moritziana Hegetschw. VI/2 955
moschata L. VI/2 937
napifolia L. VI/2 937
Nemenyiana J.Wagn. VI/2 984
nemoralis Jord. VI/2 954
nervosa Willd. VI/2 956
nigra L. VI/2 952
nigra Sadl. VI/2 960
nigrescens Willd. VI/2 950
ochroleuca Willd. VI/2 937
odorata Koch VI/2 937
Orientalis L. VI/2 936
ovina Pall. VI/2 937
oxylepis (Wimm. et Grab.) VI/2 948
pallescens Del. VI/2 937
paniculata Jacq. VI/2 969, 970
paniculata Lam. VI/2 937
Parlatorei Heldr. VI/2 937
parviflora Pers. VI/2 973
pectinata Krock. VI/2 959
Pernhofferi Hay. VI/2 984
Phrygia L. VI/2 958
Phrygia Rchb. VI/2 956
Picris Pall. VI/2 936
Pinardi Boiss. VI/2 937
plumosa Kern. VI/2 956
pratensis Thuill. VI/2 952
psammogena Gugl. VI/2 984
pseudophrygia (C. A. Mey.) Gugler VI/2 959
pubescens Nym. VI/2 985
Raetica Moritzi VI/2 955
Ragusina L. VI/2 936
repens L. VI/2 936
Rhaponticum L. VI/2 932
Rhenana (Boreau) Gugler VI/2 970
rufipappa Hay. VI/2 984
Rumelica Boiss. VI/2 937
rupestris L. VI/2 942
rupestris Pach. VI/2 941
Ruthenica Lam. VI/2 937
Sadleriana (Janka) Aschers. et Graebn. VI/2 977
Salmantica L. VI/2 936
Scabiosa L. VI/2 974
sclerophylla Boiss. VI/2 937
Seusana Chaix VI/2 967
Shouwii DC. VI/2 937
similata Hausskn. VI/2 985
solstitialis L. VI/2 980
sordida Hausm. VI/2 976
sordida Huter VI/2 941
sordida Willd. VI/2 985
spinulosa (Rochel) Hayek VI/2 976
splendens L. VI/2 940
Centaurea stenolepis (A. Kern.) Gugler VI/2 960
stereophylla Griseb. et Schenk VI/2 976
Stoebe Krock. VI/2 970
Stoebe Schinz et Thellung VI/2 969
stricta W. et K. VI/2 967
tenuifolia (Schleich.) Hay. VI/2 976
thrinciaefolia DC. VI/2 937
transalpina Schleich. VI/2 951
Triumfetti All. VI/2 967; VII 212
ustulata DC. VI/2 937
Vallesiaca (DC.) Jord. VI/2 972
variabilis Léveille VI/2 944
variegata Lam. VI/2 967
venutrum L. VI/2 937
Vochinensis Bernh. VI/2 951
Vossii Justin VI/2 984
vulgaris Presl VI/2 961
Zimmermanniana Zinsm. VI/2 974
Centaurium Hill V/3 1968; VII 198
Aschersonianum Seemen V/3 1973
Chilense V/3 1971
inapertum Raf. V/3 1972
maritimum (L.) Fritsch V/3 1968
minus Moench V/3 1969
pulchellum (Sw.) Druce V/3 1972
spicatum (L.) Fritsch V/3 1968
tenuiflorum (Hoffgg. et Lk.) Fritsch V/3 1968
umbellatum Gilib. V/3 1969
vulgare Raf. V/3 1969, 1971; VII 199 Fig. 1240
Centaurodes Centaurium O. Kuntze V/3 1969
Centella Asiatica (L.) Urban V/2 955
Centhriscus fumarioides Sprengel V/2 1026
Centinodium axillare Montand. III 191
Centradenia G. Don V/2 795
floribunda Planch. V/2 795
inaequilateralis (Schlecht. et Cham.) G. Don V/2 795
„ rosea Lindl. V/2 795
Centranthus DC. VI/1 277
Centromadia Fitchii Greene VI/2
Centrolepidaceae II 142; VII 158 1366
Centropogon Presl VII 209
Centrosis abortiva Sw. II 382
Centrospermae VII 171
Centunculus L. V/3 1873; VII 197
alpinus Scop. III 373
arvensis Scop. III 374
lanceolatus Michx. V/3 1873
minimus L. V/3 1873
semidecandrus Scop. III 365

Centunculus simplex Hornem. V/3 1873
Cepa flava Moench II 225
Schoenoprasum Moench II 223
ventricosa Moench II 233
„ Victorialis Moench II 219
Cephaëlis Ipecacuanha Rich. VI/1 196
Cephalanthera Rich. II 379; VII 164
alba Sim. II 380
angustifolia Sim. II 381
ensifolia Rich. II 381
grandiflora S. F. Gray II 380
longifolia Fritsch II 381
pallens Rich. II 380; VII 164
rubra (L.) Rich. II 380; VII 164
„ Xiphophyllum Rchb. f. II 381
Cephalanthus occidentalis L. VI/1 196
Cephalaria Schrad. VI/1 286; VII 208
alpina Schrad. VI/1 286
leucantha (L.) Schrad. VI/1 286
pigosa Gren. et Godr. VI/1 285
Tatarica (L.) Schrad. VI/1 286
Transsilvanica (L.) Schrad. VI/1 287
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiffer V/2 693
Cephalotaxaceae VII 150
Cephalotaxus Sieb. et Zucc. I 79; VII 150
Cephalotus follicularis Labill. IV/2 511
Ceramacarpus Wittst. V/2 1071
Ceramiaceaea VII 139
Ceramiales VII 139
Cerastium L. III 360; VII 173
alpinum L. III 373
anomalum Waldst. et Kit. III 362
aquaticum L. III 348
argenteum Bieb. III 360
arvense L. III 374
arvum Schur III 375
barbatum Ducros III 364
Beckianum Handel-Mazzetti et Stadlmann III 376
Beeringianum Cham. et Schlecht. III 373
Biebersteinii DC. III 360
brachypetalum Desp. III 364
breviflorum Gilib. III 365
Brueggerianum Dalla Torre et Sarnth. III 376
caeruleum Boiss. III 380
caespitosum Gilib. III 366
campanulatum Viv. III 360
candidissimum Correns III 376
Carinthiacum Vest III 372
cerastoides (L.) Britton III 360
dichotomum L. III 360
Edmonstonii (Watson) Murbeck III 370
filiforme Schleich. III 369
Cerastium fontanum Baumg. III 367
glabratum Hartm. III 374
glaciale Gaud. III 368
glomeratum Thuill. III 363
glutinosum Fries III 366
gramineum Crtz. III 356
grandiflorum W. et K. III 360
holosteum Crtz. III 354
lanuginosum Willd. III 374
Lapponicum Crtz. III 360
latifolium L. III 367
Lerchenfeldianum Schur III 372
Manticum L. III 379
medium Crtz. III 352
microcarpum Kit. III 370
mixtum Hut. III 376
murale Salisb. III 377
nemorum Crtz. III 350
obscurum Chaub. III 366
ovale Pers. III 363
ovatum Hoppe III 372
pedunculatum Gaud. III 369
pentandrum Krock. III 365
pseudoalpinum Murr III 376
pumilum Curt. III 366
quaternellum Fenzl III 378
repens L. III 376
rigidum Vitm. III 376
silvaticum W. et K. III 370
silvaticum W. et K. var. Carniolicum Preissm. III 371
Sonticum Beck III 371
stellarioides Hartm. III 360
sterile Hausskn. III 376
strictum Hänke III 375
Sturmianum Hay. III 367
subtetrandrum (Lange) Murb. III 366
subtriflorum Rchb. III 372
suffruticosum L. III 375
tetragonum Baumg. III 359
tetrandrum Curt. III 364; VII 172
tomentosum L. III 376
trigynum Vill. III 360
triviale Lk. III 366
umbellatum Crtz. III 377
uniflorum Clairv. III 368
villosum Baumg. III 374
viscidum Lk. III 365
viscosissimum Schur III 374
viscosum Poll. III 364
vulgare Hartm. III 366
vulgatum auct. III 366
„ vulgatum L. III 363
Cerasus (L.) Pers. IV/2 1068
avium Moench IV/2 1078
borealis Mich. IV/2 1069
Caproniana DC. IV/2 1074, 1076
Chamaecerasus Loisel. IV/2 1072
dulcis Fl. Wetterau IV/2 1078
effusa Host IV/2 1084
glauca Moench IV/2 1084
humilis Host IV/2 1072
Cerasus incana Spach IV/2 1084
intermedia Host IV/2 1084
Japonica Loisel. IV/2 1084
Laurocerasus Loisel. IV/2 1061
Mahaleb Mill. IV/2 1070
nigra Mill. IV/2 1078
Padus DC. IV/2 1064
persicifolia Desf. IV/2 1069
prostrata Loisel. IV/2 1084
„ vulgaris Mill. IV/2 1074
Ceratiola Michx. V/3 1602
Ceratiomyxaceae VII 136
Ceratocarpus salinus Pall. III 235
Ceratocephala spicata Moench III 544
Ceratocephalus falcatus Pers. III 544
orthoceras DC. III 545
„ testiculatus A. Kern. III 545
Ceratochloa festucoides Pal. I 369
„ unioloides Pal. I 369
Ceratocnemon Cossen et Balansia IV/1 287
Ceratodon Brid. VII 145
Ceratonia Siliqua L. IV/3 1132
Ceratophyllaceae III 449; VII 174
Ceratophyllum L. III 449; VII 174
asperum Lam. III 450
cornutum Rich. III 450
demersum L. III 450
inerme Dum. III 451
muticum Cham. III 451
submersum L. III 451
tricuspidatum Dum. III 450
verrucosum Gray III 451
„ verruculosum Rich. III 451
Ceratopteris thalictroides (L.) Brogn. VII 149
Ceratosanthus Ajacis Schur III 487
„ Consolida Tournef. III 487
Ceratostigma plumbaginoides (Boiss.) Bunge V/3 1879
Ceratostomataceae VII 141
Ceratozamia Brogn. VII 150
Cerbera L. V/3 2050
„ Odollam Gaertn. V/3 2050
Cercidiphyllaceae IV/1 16; VII 174
Cercidiphyllum Japonicum Sieb. et Zucc. IV/2 655
Cercis L. IV/3 1133; VII 181
Californica Torrey IV/3 1133
Canadensis L. IV/3 1133
Chinensis Bunge IV/3 1133
Occidentalis Torr. et Gray IV/3 1133
„ Siliquastrum L. IV/3 1134
Cercocarpus H. B. et Kth. V/2 666; VII 181
Cerefolium Bess. V/2 1015
Cerefolium Britt. V/2 1027
fumarioides G. Beck V/2 1026
nitidum Čelak. V/2 1023
sativum Bess. V/2 1027, 1029
Siculum Beck V/2 1025
silvestre Bess. V/2 1017
vulgare Bubani V/2 1030

Cereus Haw. V/2 691, 692, 693
flagelliformis L. V/2 692
„ nycticalus Lk. V/2 693
Cereoideae V/2 691; VII 190
Cerinthe L. V/3 2186; VII 200
acuta Moench V/3 2190
alpina Kit. V/3 2188
aspera Gaud. V/3 2188
aspera Roth V/3 2188
auriculata Ten. V/3 2188
cleiostoma Boiss. et Spruner V/3 2188
glabra Mill. V/3 2188
gymnandra Gasparr. V/3 2188
lamprocarpa Murb. V/3 2188
macrophylla Boiss. et Heldr. V/3 2188
maculata All. et Vis. V/3 2191
maculata Bieb. V/3 2188
major L. V/3 2187
major Schleich. V/3 2188
minor L. V/3 2190
onosmoides Scop. V/3 2186
quinquemaculata Wahlenb. V/3 2188
retorta Sibth. et Sm. V/3 2188
Smithiae Kern. V/3 2188
tenuiflora Bertol. V/3 2188
„ tristis A. Teyber V/3 2188
Ceriops Arn. VII 192
Ceropegia L. V/3 2066
Candelabrum L. V/3 2066
elegans Wall. V/3 2066
Sandersonii Dcne. V/3 2066
stapeliiformis Haw. V/3 2066
Woodii Schlechter V/3 2066
Ceroxyloideae VII 156
Cervaria Gaertn. V/2 1363
glauca Gaud. V/2 1389
nigra Borkh. V/2 1389
Oreoselinum Gaud. V/2 1386
„ Rivini Gaertn. V/2 1389
Cestrum Parqui L'Hérit. V/4 2554
aurantiacum Lindl. V/4 2554
elegans Schlecht. V/4 2554
„ nocturnum L. V/4 2554
Ceterach officinarum Willd. I 26; VII Fig. 1172
Cetraria VII 144
Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. IV/2 693
Maulei (Moore) C. K. Schneid. IV/2 694
„ Sinensis Koehne IV/2 694
Chaenorrhinum Lange VI/1 29; VII 204
minus (L.) Lange VI/1 29
minus Simk. VI/1 30
praetermissum Lange VI/1 30
„ viscidum Simk. VI/1 29, 30
Chaerefoliophyllum Loretii (Rouy et Camus) Thellung V/2 1027
Chaerefolium Haller V/2 1014; VII 193
Chaerefolium Anthriscus (L.) Schinz et Thellung V/2 1030
Cerefolium (L.) Schinz et Thellung V/2 1027
silvestre (L.) Schinz et Thellung V/2 1017
Chaerophyllum Neck. V/2 994
L. V/2 994, 1015; VII 193
alpestre Jord. V/2 1013
alpinum Kit. V/2 1009
alpinum Schleich. V/2 1011
alpinum Vill. V/2 1020
angulatum Kit. V/2 1019
Anthriscus Crtz. V/2 1030
aromaticum L. V/2 1002
aureo-silvestre Loret V/2 1027
aureum L. V/2 1003
australe Crtz. V/2 1035
Biasoletti Beck V/2 993
bevipilum Rohlena V/2 1003
bulbosum L. V/2 998
Calabricum Guss. V/2 1010
Canadense Crtz. V/2 1169
Cerefolium Crtz. V/2 1027
Cicutaria Vill. V/2 1008
Cynapioides Arcangeli V/2 993
daucifolium Desf. V/2 1023
elegans Gaud. V/2 1011
fumarioides Rchb. V/2 1026
Friedrichsthalii Cesati V/2 1054
geniculatum Gilib. V/2 996
grandiflorum Crtz. V/2 1035
hirsutum L. V/2 1006
hirsutum Vill. V/2 1012
Hladnikianum Rchb. V/2 1026
lactescens Kit. V/2 1025
maculatum Willd. V/2 1005
Magellense Ten. V/2 1014
nemorosum Bieb. V/2 1025
nemorosum Rchb. V/2 1026
nitidum Wahlenb. V/2 1023
nodosum Crtz. V/2 994
odoratum Crtz. V/2 1041
pallescens Presl V/2 1009
palustre Lam. V/2 1006
pecten-veneris Crtz. V/2 1037
pinnatifidum Poir. V/2 1032
Prescottii DC. V/2 1000
pumilum Wierzb. V/2 1008
rapaceum Alef. V/2 998
rapaceum Prescottii Alef. V/2 1000
sativum Lamm. V/2 1029
Siculum Guss. V/2 1025
silvestre L. V/2 1017
temulum L. V/2 996
torquatum DC. V/2 1020
trichospermum Schult. V/2 1028
tuberculosum Poir. V/2 1026
tumidum Gilib. V/2 1017
umbrosum Jord. V/2 1009
verticillatum hort. Paris. V/2 998
Chaerophyllum Villarsii Koch V/2 1012
„ Villarsii Schur V/2 1008
Chaetopeltidaceae VII 138
Chaetophoraceae VII 138
Chaetospora ferruginea Rchb. II 46
intermedia Beck II 46
„ nigricans Kth. II 45
Chaeturus fasciculatus Link VII 154
Chaiturus leonuroides Ehrh. V/4 2390
„ Marrubiastrum Rchb. V/4 2390
Chamaebatia foliolosa Benth. IV/2 666
Chamaebetula humilis Opiz III 82
„ nana Opiz III 80
Chamaebuxus alpestris L. V/1 91
„ vulgaris Schur V/1 91
Chamaecistus serpyllifolius S. F. Gray V/3 1647
Chamaeclema hederacea Moench V/4 2373
Chamaecyparis Spach I 82; VII 151
Chamaecytisus purpureus Lk. IV/3 1180
Chamaedaphne Moench V/3 1654
„ calyculata Moench V/3 1654
Chamaedrys Botrys Moench V/4 2532
officinalis Moench V/4 2527
„ Scordium Moench V/4 2530
Chamaeledon procumbens Lk. V/3 1647
Chamaelinum paniculatum Host IV/1 371
Chamaemeles coriacea Lindl. IV/2 664
Chamaemelum discoideum All. VI/1 537
inodorum Vis. VI/2 587
Tchihatchewii Boiss. VI/2 580
tinctorium All. VI/1 537
„ Triumfetti All. VI/1 538
Chamaemespilus humilis Roem. IV/2 721
Chamaenerium angustifolium Scop. V/2 814
montanum Scop. V/2 827
„ palustre Scop. V/2 819
Chamaeorchis alpinus Rich. II 361; VII 164
Chamaepericlymenum Suecicum Aschers. et Graebn. V/2 1554
Chamaepeuce Cass. VI/2 866; VII 212
Casabonae DC. VI/2 923
diacantha DC. VI/2 923
„ nivea DC. VI/2 923
Chamaepitys trifida Dum. V/4 2539
„ vulgaris Spenn. V/4 2539
Chamaeplium officinale Wallr. IV/1 164
Chamaeranthemum Nees VII 205
Chamaerhododendron ferrugineum Bubani V/3 1639

Chamaerops excelsa Thunb. II 130
„ humilis L. II 130
Chamaesiphonaceae VII 136
Chamaesyce Preslii A. Torrey V/1 143
Chamagrostis minima Borkh. I 220
Chamarea Eckl. et Zeyh. V/2 1181
Chamitea reticulata Kern. III 29
Chamomilla discoidea Gay VI/2 584
„ vulgaris K. Koch VI/2 581
Chamorchis L. VII 164
Characeae VII 138
Chardinia cylindrica Desv. VI/2 813
Charophyta VII 138
Chasmone argentea E.Mey. IV/3 1160
Chasmonia spinosa Presl V/4 2440
Chayota edulis Jacq. VI/1 314
Cheilanthes Sw. VII 149
Cheiranthus (L.) R. Br. IV/1 442; VII 178
alpinus Jacq. IV/1 435
annuus L. IV/1 469
Cheiri L. IV/1 442
decumbens Schleich. IV/1 439
erysimoides Jacq. IV/1 435, 436
erysimoides Thuill. IV/1 426
fruticulosus L. IV/1 442, 471
Helveticus Jacq. IV/1 437
hortensis Lam. IV/1 469
Ibericus Jord. IV/1 301
incanus L. IV/1 469
maritimus L. IV/1 464
muralis Salisb. IV/1 442
scapigerus Willd. IV/1 428
silvestris Crtz. IV/1 437
„ silvestris Lam. IV/1 427
Cheiri vulgare Clairv. IV/1 442
Cheirinia cheiranthoides Lk. IV/1 427
hieraciifolia Lk. IV/1 432
„ repanda Lk. IV/1 428
Chelidonium L. IV/1 21; VII 176
aurantiacum Salisb. IV/1 24
corniculatum Donn. IV/1 23
glabrum Hill. IV/1 24
Glaucium Hill. IV/1 23
haematodes Moench IV/1 21
hybridum L. IV/1 19
litorale Salisb. IV/1 23
luteum Gilib. IV/1 21
maius L. IV/1 21; VII 96 Fig. 1124
murale Ren. IV/1 21
„ ruderale Salisb. IV/1 21
Chelone L. VI/1 6; VII 204
Chenopodiaceae III 209; VII 171
Chenopodina maritima Moqu. III 257
„ salsa Moqu. III 258
Chenopodium L. III 217; VII 171
album L. III 225
ambrosioides L. III 233; V/1 497
angustanum All. III 249
anthelminticum L. III 233
arenarium Gaertn. III 250
Chenopodium Berlandieri Moqu. III 232
Blitum Müller III 231
Bonariense Ten. III 232
Bonus Henricus L. III 219; VII 74 Fig. 1109 b
Borbasii Murr III 233
botryodes Sm. III 231
Botrys L. III 218
capitatum (L.) Aschers. III 232
carinatum R. Br. III 232
crassifolium Hornem. III 231
erosum Bast. III 228
esculentum Salisb. III 219
ficifolium Sm. III 228
foetidum Lam. III 221
foetidum Schrad. III 233
foliosum Aschers. III 231
glaucum L. III 229
hastatum Dum. III 243
hircinum Schrad. III 232
„ hybridum L. III 222
interiectum Murr III 227
Issleri Murr III 227
Krasani Beck III 227
leptophyllum Nutt. III 232
litorale Thunb. III 240
Ludwigii Murr III 233
marginatum Spreng. III 222
maritimum L. III 257
microphyllum Coss. et Germ. III 227
murale L. III 223
olidum Curt. III 221
opulifolium Schrad. III 228
paganum Murr III 226
Pallasianum R. et Sch. III 248
polyspermum L. III 222
portulacoides Dum. III 235
Preismanni Murr III 233
pseudoficifolium Murr III 226
pseudostriatum Zschacke III 227
pygmaeum Menyh. III 231
Quinoa L. III 232
rubrum L. III 230
sagittatum Lam. III 219
salsum L. III 258
Schulzeanum Murr III 233
Scoparia L. III 251
serotinum L. III 228
solitarium Murr III 233
subopulifolium Murr III 233
Suecicum Murr III 226
Thellungii Murr III 233
triangulare Dulac III 219
triangulare Issler III 228
Tridentinum Murr III 233
urbicum L. III 224
villosum Lam. III 249
virgatum (L.) Jessen III 231
viride Loisel. III 228
„ Vulvaria L. III 221
Cherleria caespitosa Lam. III 392
Cherleria imbricata Ser. III 391
octandra Sieb. III 391
„ sedoides L. III 392
Chesneya Bertol. V/2 1196
Chilochloa arenaria Pal. I 214
aspera Pal. I 213
Boehmeri Pal. I 214
„ Michelii Trin. I 215
Chimaphila Pursh V/3 1593; VII 195
corymbosa Pursh V/3 1593
„ umbellata (L.) DC. V/3 1593
Chimara R. Br. V/3 1593
Chimonanthus praecox Lk. IV/1 14
Chiogenes hispidula Torrey et Gray V/3 1622
Chionachne Brown I 178
Chionanthus Chinensis Maxim. V/3 1906
retusa Lindl. V/3 1906
„ Virginica L. V/3 1905
Chionodoxa Luciliae Boiss. II 279
„ Sardensis Drude II 279
Chironia Centaurium Curt. V/3 1969
Fischeri Paxton V/3 1956
„ floribunda Paxton V/3 1956
Chlaenaceae V/1 426; VII 188
Chlamydobacteriaceae VII 135
Chlamydocarya H. Baill. VII 187
Chlora L. VII 198
Chlora acuminata Rchb. V/3 1967
intermedia Ten. V/3 1967
perfoliata L. V/3 1966
„ serotina Koch V/3 1967
Chlorangium Jussuffii Lk. V/1 547
Chloranthaceae III 209; VII 165
Chloranthus Sw. VII 165
Chlorideae I 265; VII 155
Chloris Sw. I 265; VII 155
Chlorocrepis staticifolia Griseb. VI/2 1349
Chlorocyperus flavescens Rikli II 11
glomeratus Palla II 14
longus Palla II 14
Pannonicus Rikli II 11
„ serotinus Palla II 11
Chloromonadales VII 137
Chlorophora tinctoria D. Don III 124
Chlorophyceae VII 137
Chlorophytum comosum Bak. II 277; VII 139 Fig. 1166
„ Sternbergianum Steud. II 277
Chlorosplenium VII 62, 141
Chloroxylon DC. V/1 52
Choerophyllum Brongn. V/2 994
Choisya ternata Knuth V/1 48
Chondrilla L. VI/2 1072; VII 212
apargioides Schultz-Bip. VI/2 1077
chondrilloides (Ard.) Fritsch VI/2 1075
graminea Bieb. VI/2 1072
juncea L. VI/2 1072
muralis Lam. VI/2 1111

Chondrilla paniculata Lam. VI/2 1075
prenanthoides Vill. VI/2 1075
pulchra Lam. VI/2 1178
purpurea Lam. VI/2 1180
„ viminea Lam. VI/2 1129
Chondrosea Aizoon Haw. IV/2 591
Burseriana Haw. IV/2 585
caesia Haw. IV/2 583
diapensioides Haw. IV/2 587
mutata Haw. IV/2 595
pyramidalis Haw. IV/2 593
tenella Haw. IV/2 599
„ Vandellii Haw. IV/2 586
Chordaceae VII 138
Choripetalae III 6; V/3 1567; VII 165
Chorispora DC. VII 178
„ tenella (Pallas) DC. IV/1 476
Christophoriana spicata Moench III 477
„ vulgaris Rupr. III 477
Chroococcaceae VII 136
Chroolepidaceae VII 138
Chrozophora plicata (Vahl) Juss. V/1 120
„ tinctoria Juss. V/1 120
Chrysanthemum L. VI/2 590, 592; VII 211
achilleifolium Bieb. VI/2 596
alpinum L. VI/2 603
annuum (L.) VI/2 600
argenteum (Willd.) VI/2 600
atratum Jacq. VI/2 607
aureum Aschers. VI/2 624
Balsamita L. VI/2 599
Biebersteinii Gresc. VI/2 596
carinatum Schousboue VI/2 593
Caucasicum DC. VI/2 596
Chamomilla Bernh. VI/2 581
cinerariifolium (Trev.) Vis. VI/2 596
Clusii Handel-Mazzetti VI/2 615
Coronarium L. VI/2 592
coronifolium Vill. VI/2 607
corymbiferum Schrank VI/2 614
corymbosum L. VI/2 614
foeniculaceum DC. VI/2 596
frutescens L. VI/2 596
grandiflorum Broussonet VI/2 596
Halleri Suter VI/2 607
heterophyllum Willd. VI/2 612
hybridum Guss. VI/2 594
Indicum L. VI/2 594
inodorum L. VI/2 587
intersitum Hausskn. VI/2 622
Leucanthemum L. VI/2 609
leucolepis (Briquet et Cav.) VI/2 611
macrophyllum Waldst. et Kit. VI/2 616
maritimum (L.) Pers. VI/2 589
Chrysanthemum Marshallii Aschers. VI/2 599
maximum Ramond VI/2 612
montanum All. VI/2 611
multicaule Desf. VI/2 593
Myconis L. VI/2 593
partheniifolium (Willd.) Pers. VI/2 618
parthenioides(Bernh.) Voss VI/2 618
Parthenium (L.) Bernh. VI/2 617
parthenoides (Bernh.) Voss VI/2 596
perpusillum Lois. VI/2 674
pinnatifidum L. VI/2 596
praealtum Vent. VI/2 618
Pseudachillei C. Winkl. VI/2 596
Rohlenae Domin VI/2 622
saxicolum Briq. VI/2 612
segetum L. VI/2 601
serotinum L. VI/2 594
suaveolens Aschers. VI/2 584
Tanacetum Karsch VI/2 619
Tchihatchewii hort. VI/2 580
tricolor hort. VI/2 593
tripartitum Sw. VI/2 594
uliginosum Pers. VI/2 594
„ vulgare Bernh. VI/2 619
Chryseïs Californica Torr. et Gray IV/1 19
Chrysobalanoideae IV/2 667; VII 181
Chrysobalanos Icaco L. IV/2 667
Chrysocoma Coma-aurea L. VI/1 448, 449
graminifolia L. VI/1 413
Linosyris L. VI/1 420
tenuifolia Jacq. VI/2 1365
„ villosa L. VI/1 417
Chrysomonadales VII 136
Chrysomyxa Rhododendri (DC.) De Bary V/3 1619, 1631; VII 142
Chrysophyllum Cainito L. V/3 1896
„ monopyrenum Sw. V/3 1896
Chrysopogon Gryllus Trin. I 183
Chrysopsis alba Nutt. VI/1 420
„ villosa Nutt. VI/1 448
Chrysosplenium L. IV/2 633; VII 179
alternifolium L. IV/2 634
„ oppositifolium L. IV/2 633
Chrysostemma tripteris Less. VI/1 529
Chrysurus cynosuroides Pers. I 372
„ echinatus P. B. I 298
Chytridiales VII 140
Cibotium Kaulf. VII 148
Cicendia Adans. V/3 1964; VII 198
Candollei(Bat.) Griseb. V/3 1956
filiformis Delarbre V/3 1965
„ pusilla (Lam.) Griseb. V/3 1956
Cicer L. IV/3 1498; VII 183
arietinum L. IV/3 1499
Lens Willd. IV/3 1502
Cicerbita Wallr. VI/2 1096; VII 212
alpina (L.) Wallr. VI/2 1099
Bourzaei (Boiss.) Beauv. VI/2 1097
corymbosa Wallr. VI/2 1128
Favrati Wilczek VI/2 1101
macrophylla (Willd.) Wallr. VI/2 1097
muralis Wallr. VI/2 1111
Plumieri (L.) Kirschl. VI/2 1098
racemosa (Willd.) Beauv. VI/2 1097
tenerrima (Pourret) Beauv. VI/2 1097
Cicercula alata Moench IV/3 1604
anceps Moench IV/3 1603
„ sativa Alef. IV/3 1604
Cichorieae VII 212
Cichorineae VI/2 1006
Cichorium L. VI/2 992; VII 212
divaricatum Schousboe VI/2 998
Endivia L. VI/2 998
glandulosum Boiss. et Huet. VI/2 993
Intybus L. VI/2 993
„ spinosum L. VI/2 993
Cicuta L. V/2 1163; VII 194
Amomum Crtz. V/2 1162
angustifolia Kit. V/2 1165
aquatica Dumort. V/2 1164
Cynapium Targ. V/2 1272
latifolia Crtz. V/2 1219
maculata Gaertn. V/2 1082
Monnieri Crtz. V/2 1304
nodiflora Crtz. V/2 1148
officinalis Crtz. V/2 1082
tenuifolia Froel. V/2 1165
„ virosa L. V/2 1164
Cicutaria H. Koch V/2 1015
Cicutaria Lam. V/2 1163
aquatica Lam. V/2 1164
dioeca Moench V/2 1132
„ verticillata Moench V/2 1046
Cienfuegosia Cav. V/1 454
Ciliaria aspera Haw. IV/2 597
„ bryoides Haw. IV/2 598
Cilioflagellatae VII 137
Cimicifuga L. III 479; VII 174
foetida L. III 497
„ frigida O. Kuntze III 479
Ciminalis Pneumonanthe Borkh. V/3 2000
Cinchona Calisaya Wedd. VI/1 196
„ succirubra Pav. VI/1 196
Cinclidotus Pal. VII 145
Cineraria alpestris Hoppe var. lejocarpa Koch VI/2 737, 738
alpina L. VI/2 747
aspera Thunb. VI/2 1366
aurantiaca Hoppe VI/2 745
cacaliformis Rchb. VI/2 797
campestris Lam. et DC. VI/2 740
campestris Retz. VI/2 743

Cineraria cernua Thore VI/2 706
Clusiana Host VI/2 738
cordifolia L. f. VI/2 747
cordifolia L. f. var. auriculata Jacq. VI/2 749
crassifolia Rchb. VI/2 737
crispa Jacq. VI/2 734
cruenta Masson VI/2 728
Fladnizensis Paehler VI/2 795
hybrida hort. VI/2 728
integrifolia Wallr. VI/2 740
integrifolia Wallr. var. alpina Jacq. VI/2 737
integrifolia Wallr. var. pratensis Jacq. VI/2 749
integrifolia Willd. VI/2 738
lanceolata Lam. VI/2 740
longifolia Jacq. VI/2 737
longifolia Lapeyr. VI/2 751
longifolia Willd. VI/2 739
lyrata DC. VI/2 1367
maritima L. VI/2 728
palustris L. VI/2 732
pratensis Hoppe VI/2 743
rivularis Waldst. et Kit. VI/2 734
„ tenuifolia DC. VI/2 739
Cinna L. I 238; VII 154
Cinnamomum Camphora Nees et Ebermayr IV/1 11
Cassia Blume IV/1 11
„ Zeylanicum Breyn IV/1 11
Cintractia caricis (Pers.) P. Magnus II 62; VII 142
Circaea L. V/2 873; VII 192
alpina L. V/2 874
cordifolia Stok. V/2 874
intermedia Ehrh. V/2 879
Lutetiana L. V/2 876
minima Lam. V/2 874
„ mollis Sieb. et Zucc. V/2 873
Circinnus vulnerarioides Med. IV/3 1352
Cirsium Mill. VI/2 866; VII 212
acanthifolium A.-T. VI/2 893
acaule (L.) Web. VI/2 876
acauliforme Čelak. VI/2 909
adustum Waisb. VI/2 911
affine Tausch VI/2 912
Aleutrense Porta VI/2 913
alpestre Naeg. VI/2 909
altissimum (L.) DC. VI/2 868
ambiguum All. VI/2 912
arctioides Scop. VI/2 854
argenteum (L.) Scop. VI/2 868
argentoides Porta VI/2 915
arvense (L.) Scop. VI/2 903
Aschersonianum Čelak. VI/2 911
Ausserdorferi Hausm. VI/2 910
Austriacum Khek VI/2 916
Austro-Pannonicum Simk. VI/2 911
Autareticum Mutel. VI/2 912
Cirsium Babingtonii Rouy VI/2 915
Bavaricum Harz VI/2 916
Beckii Petr. VI/2 911
Bellunense Pamp. VI/2 909
Benacense Strobl VI/2 914
Benzii Murr VI/2 910
Bertolini Spr. VI/2 902
Bipontinum F. Schultz VI/2 908
Bohemicum Fleischer VI/2 915
brachyatum Porta VI/2 910
brachycephalum Juratzka VI/2 880
Braunii F. Schultz VI/2 913
Breunium Goll. et Huter VI/2 908
breviscapum Eichenf. VI/2 909
Brunneri A. Br. VI/2 913
bulbosum DC. VI/2 889; VII 211 Fig. 1265
Candolleanum Naeg. VI/2 914
canum (L.) All. VI/2 883
Carniolicum Scop. VI/2 895
Casabonae Lam. et DC. VI/2 923
Castiferrei Borb. VI/2 911
Čelakovskyanum Knaf VI/2 915
cervini Koch VI/2 912
Cervini Strobl VI/2 914
Chailletii Juratzka VI/2 880
ciliatum Bieb. VI/2 868
complicatum Schweigg. VI/2 868
Concilii Porta VI/2 910
congestum Fisch. et Mey. VI/2 868
conspicuum Voss VI/2 923
Csepeliense Borb. VI/2 915
decoloratum Koch VI/2 909
diacanthum DC. VI/2 868
discolor Goller VI/2 910, 915
discolor Spr. VI/2 868
distans Hut. VI/2 915
Dominii M. Schulze VI/2 908
Dravicum Goller VI/2 916
Duerrenbergeri Murr VI/2 914
eriophorum (L.) Scop. VI/2 869
Erisithales (Jacq.) Scop. VI/2 896
erisithaliforme Preissm. VI/2 915
erisithaloides Treuinf. VI/2 911
erucagineum DC. VI/2 913
extraneum Beck VI/2 910
Fabium Porta VI/2 913
fissibracteum Peterm. VI/2 909
flavescens Koch VI/2 914
Fleischeri Podp. VI/2 908
Fleischmanni Khek VI/2 908
foliosum Rhin. VI/2 910
Forsteri Franchet VI/2 906
Freyerianum Koch VI/2 909
Cirsium Fritschianum L. Keller VI/2 916
Gamingense Beck VI/2 913
Ganderi Hut. VI/2 914
Gerhardtii Schultz-Bip. VI/2 908
giganteum Spr. VI/2 868
glabrum DC. VI/2 902
glaucescens (Naeg.) Dalla Torre et Sarnth. VI/2 909
glutinosum Lam. VI/2 896
Godronii Schultz-Bip. VI/2 908
Golleri Hut. VI/2 915
grandiflorum Kittl. VI/2 908
Grettstadtianum Gross VI/2 916
Gueuckianum Loehr VI/2 909
Hallerianum Gaud. VI/2 912
Harzii Khek VI/2 912
hastatum (Lam.) Thellung VI/2 912
Hausmanni Treuinf. VI/2 912
Heerianum Naeg. VI/2 909
hemipterum Borb. VI/2 910
heterophyllum (L.) All. VI/2 885
Heuseri Uechtr. VI/2 908
Huteri Hausm. VI/2 910
hybridum Koch VI/2 910
Joschii Pacher VI/2 915
Itticense Goller VI/2 915
Juratzkae Reichardt VI/2 912
Kerneri Ausserd. VI/2 916
Khekianum Porta VI/2 911
Khekii Murr VI/2 912
Kirschlegeri C. H. Schultz VI/2 909
Kochianum Löhr VI/2 910
Kornhuberi Heimerl VI/2 911
Lachenalii Koch VI/2 909
laciniatum Döll VI/2 910
lacteum Schleich. VI/2 910
lanceolatum (L.) Hill VI/2 873
Lanseriae J. Murr VI/2 1367
lappaceum Lam. VI/2 856
Linkianum Loehr VI/2 911
Lundquistii Hay. VI/2 908
medium All. VI/2 909
micranthum Treuinf. VI/2 910
Mielichhoferi Saut. VI/2 912
molle Scop. VI/2 843
Monspessulanum Ait. VI/2 868
montanum (Waldst. et Kit.) Spr. VI/2 893
Muellneri Beck VI/2 911
Murrianum Khek VI/2 911
Neumanni Khek VI/2 916
Nevoleanum Hay. VI/2 914
niveum Spr. VI/2 868, 923
Nolitangere Borb. VI/2 908
ochroleucum DC. VI/2 896
Oenanum Treuinf. VI/2 910
Oenipontanum Treuinf. VI/2 914

Cirsium oleraceum (L.) Scop. VI/2 898
Pacheri F. Schultz VI/2 912
palustre (L.) Scop. VI/2 878
palustriforme Čelak. VI/2 910
Pannonicum (L. f.) Gaud. VI/2 881
paradoxum Hay. VI/2 915
parviflorum DC. VI/2 910
pauciflorum Koch VI/2 912
pauciflorum (Waldst. et Kit.) Spr. VI/2 894
persimile Beck VI/2 911
Podpćrae Fleisch. VI/2 916
Polivkae Podp. VI/2 915
Porta Hausm. VI/2 911
praealpinum Beck VI/2 913
praemorsum Michl. VI/2 913
Prantlii Gremblich VI/2 915
Przibilskyi Eichenfeld VI/2 913
pseudo-erisithaloides Pamp. VI/2 915
pseudopalustre Schur VI/2 880
purpureum All. VI/2 912
Pustariacum Ausserd. VI/2 916
Pyrenaicum All. VI/2 893
Reichardti Juratzka VI/2 910
Reichenbachianum Loehr VI/2 915
Rellichianum Sabransky VI/2 913
rigens Wallr. VI/2 909
rigidum Porta VI/2 910
rivulare (Jacq.) Lk. VI/2 890
rivuliforme Waisb. VI/2 911
rubrum Porta VI/2 911
Sabaudum Ruhmer VI/2 908
saboleraceum Beck VI/2 912
Sarntheinii Murr VI/2 913
Sauteri F. Schultz VI/2 913
Schroeteri J. Braun VI/2 915
Schulzeanum Naeg. VI/2 1367
scolopendron Porta VI/2 909
semidecurrens Richt. VI/2 910
semipectinatum Rchb. VI/2 913
Sennholzii Eichenfeld VI/2 912
serotinum Porta VI/2 913
serratuloides Scop. VI/2 881
sessile Rchb. VI/2 915
setosum Bieb. VI/2 904
Sextenum Ausserd. VI/2 915
Siegerti Schultz-Bip. VI/2 911
Silesiacum Schultz VI/2 910
simillimum Petr. VI/2 912
Soroksarense J. Wagn. VI/2 915
spathulatum Gaud. VI/2 872
spectabile DC. VI/2 867
spinifolium Beck VI/2 910
spinosissimoides Ausserd. VI/2 912
spinosissimum (L.) Scop. VI/2 901
spurium Delastre VI/2 906
Cirsium Stiriacum Fritsch VI/2 913
Stoderianum Duerrnberger VI/2 910
Stonum Porta VI/2 913
Strobilii Hay. VI/2 914
subalpinum Gaud. VI/2 910
subcanum Beck VI/2 911
suberisithales Beck VI/2 914
subrivulare Beck VI/2 911
subspinuligerum Peterm. VI/2 908
suspiciesum Beck VI/2 910
Tappeineri (Rchb.) Treuinf. VI/2 912
Tataricum (Jacq.) All. VI/2 911
Thomasii Naeg. VI/2 915
Tonalense Gelmi VI/2 909
Travignoli Eichenf. VI/2 910
tricephaloides DC. VI/2 890, 893
Triebenense Hay. VI/2 916
trigeneum Bornm. VI/2 915
trinum Goller VI/2 916
triphylinum Treuinf. VI/2 916
triplex Hay. VI/2 916
trispinosum Moench VI/2 868, 923
triste Kern. VI/2 913
tuberosum (L.) All. VI/2 889; VII 211 Fig. 1265
uliginosum Custer VI/2 910
uliginosum Delastre VI/2 906
urbanum Beck VI/2 910
variabile Porta VI/2 910
Vindobonense Halacsy VI/2 916
Virgenum Goller VI/2 916
Wankelii Reichardt VI/2 910
Wimmeri Čelak. VI/2 910
Winklerianum Čelak. VI/2 909
Woodwardii Watson VI/2 906
Zapolowiczii Khek VI/2 908
„ Zizianum Koch VI/2 909
Cissampelops Pareira L. IV/1 15
Cissus L. V/1 354
cactiformis Gilg V/1 354
discolor Vent. V/1 354
gongyloides (Burch.) Planch. V/1 354
rotundifolia (Forsk.) Vahl V/1 354
Cistaceae V/1 552; VII 189
Cistineae V/1 493? VII 189
Cistus L. V/1 554; VII 189
albidus L. V/1 556
crispus L. V/1 556
heterophyllus Desf. V/1 556
hirsutus Lam. V/1 556
ladaniferus L. V/1 556
laurifolius L. V/1 556
Monspeliensis L. V/1 556
ochreatus Chr. Sm. V/1 556
parviflorus Lam. V/1 556
populifolius L. V/1 556
Cistus salviifolius L. V/1 556
symphytifolius Lam. V/1 556
„ villosus L. V/1 556
Citharexylum L. V/3 2236; VII 201
Citriobatus multiflorus Cunn. IV/2 655
Citrullus Colocynthis (L.) Schrad. VI/1 314, 316
„ vulgaris Schrad. VI/1 313
Citrus L. V/1 54; VII 184
aurantium L. V/1 59; VII 1078, 1093
Aurantium L. subsp. amara Engler V/1 59
Aurantium L. subsp. Bergamia (Risso et Poiteau) Wight et Arn. V/1 60
Aurantium L. subsp. decumana Thellung V/1 63
Aurantium L. subsp. Keonia Engl. V/1 64
Aurantium L. subsp. Sinensis Gall. V/1 61
Aurantium L. subsp. Suntara Engl. V/1 64
Aurantium Sinense Rumph. V/1 64
Bigaradia Risso V/1 59
hystrix DC. V/1 68
latipes Hook. f. V/1 68
Madurensis Lour. V/1 59
medica L. V/1 64
medica L. subsp. Bajoivia V/1 64
medica L. subsp. Limonum (Risso) Hook. V/1 66
nobilis Lour. V/1 59
Papeda Miqu. V/1 68
Pompelmos Risso V/1 63
„ trifoliata L. V/1 58
Cladanthus Arabicus (L.) Cass. VI/2 674
proliferus (Pers.) DC. VI/2 674
Cladium P. Browne II 47; VII 156
Germanicum Schrad. II 47
Jamaicense Crtz. II 47
Mariscus (L.) R. Br. II 47; VII 156 Fig. 1183
Cladoniaceae VII 144
Cladophoraceae VII 138
Cladrastis Amurensis C. Koch IV/3 1146
lutea (Michx.) C. Koch IV/3 1145
„ tinctoria Raf. IV/3 1145
Clandestina rectiflora Lam. VI/1 128
Clarkia elegans Dougl. V/2 800
„ pulchella Pursh V/2 799
Clathraceae VII 143
Clathroptychiaceae VII 136
Clausena Wampii Bl. V/3 54
Clavariaceae VII 142

Claviceps purpurea Tul. I 389; VII 141
Clavija ornata Don V/3 1714
Clavula Baeothryon Dum. II 40
„ multicaulis Rchb. II 40
Claytonia perfoliata Donn. III 268
Clematis L. III 507; VII 174
alpina (L.) Mill. III 509
apiifolia DC. III 508
cirrhosa L. III 509
coccinea Engelm. III 508
cordata Pursh III 509
crispa L. III 508
Davidiana Decaisne III 508
erecta All. III 515
Flammula L. III 513
florida Thunb. III 508
fragrans Ten. III 513
glauca Willd. III 508
inclinata Scop. III 514
integrifolia L. III 514
Jackmanni hort. III 508
lanuginosa Lindl. III 508
nutans Crtz. III 514
Orientalis L. III 508, 509
paniculata Thunb. III 508
patens Morren et Decaisne III 508
recta L. III 515
Virginiana L. III 509
Vitalba L. III 511
„ Viticella L. III 516
Cleome pungens Willd. IV/1 490
„ spinosa L. IV/1 490
Cleomella Mexicana DC. IV/1 490
Cleonia Lusitanica L. V/4 2378
Clerodendron L. V/3 2237
fallax Lindl. V/3 2238
foetidum Bunge V/3 2238
fragrans Vent. V/3 2238
Kaempferi Fisch. V/3 2238
paniculatum L. V/3 2238
scandens Beauv. V/3 2238
splendens C. Don V/3 2238
Thomsonae Balf. V/3 2238
trichotomum Thunb. V/3 2238
„ umbellatum Poir. V/3 2238
Clethra acuminata L. V/3 1713
alnifolia L. V/3 1713; VII 195
arborea Ait. V/3 1713; VII 196 Fig. 1236
barbinervis Sieb. et Zucc. V/3 1713
Clethraceae V/3 1713; VII 195
Clianthus Dampieri A. Cunn. IV/3 1456; VII 89 Fig. 1220
puniceus Banks et Soland. IV/3 1456
speciosus (Don) Aschers. et Graebn. IV/3 1456
Cliffortia L. IV/2 666; VII 181
Cliftonia ligustrina Banks V/1 233
„ monophylla Britton V/1 233
Climaciaceae VII 146
Clinopodium L. V/4 2279
Acinos O. Kuntze V/4 2297
Aegyptiacum Lam. V/4 2295
alpinum O. Kuntze V/4 2299
Calamintha O. Kuntze V/4 2290
Graecum O. Kuntze V/4 2286
grandiflorum O. Kuntze V/4 2288
hortense O. Kuntze V/4 2282
montanum O. Kuntze V/4 2284
plumosum Sieb. V/4 2295
„ vulgare L. V/4 2295
Clitandra Kilimandscharica Warburg V/3 2049
Clitoria L. IV/3 1626
Clivia Lindl. VII 162
miniata Regel II 319
„ nobilis Lindl. II 318
Clostridium V/4 2604; VII 135
Clusia L. V/1 500, 502
Clusioideae V/1 499; VII 189
Clymenum Ochrus Alef. IV/3 1565
„ uncinatum Moench IV/3 1565
Clypeola L. IV/1 457; VII 178
alliacea Crtz. IV/1 147
alyssoides L. IV/1 448
auriculata Crtz. IV/1 101
didyma Crtz. IV/1 97
Gaudini Trachsel IV/1 458
Jonthlaspi L. IV/1 457
„ montana L. IV/1 449
Cneoraceae V/1 44; VII 184
Cneorum tricoccum L. V/1 44
Cnicus acaulis Hofm. VI/2 876
alsophilus Poll. VI/2 893
arvensis Hoffm. VI/2 903
Benedictus L. VI/2 990
canus Roth VI/2 883
Carniolicus Willd. VI/2 895
Cervini Thom. VI/2 912
discolor Schult. VI/2 837
dubius Willd. VI/2 877
eriophorus Roth VI/2 869
Erisithales L. VI/2 896
heterophyllus Willd. VI/2 885
lanceolatus Willd. VI/2 873
oleraceus L. VI/2 898
palustris Willd. VI/2 878
Pannonicus Vest VI/2 881
parviflorus Heller VI/2 910
pauciflorus Waldst. et Kit. VI/2 894
praemorsus Michl VI/2 913
pratensis Lam. VI/2 898
pygmaeus L. VI/2 836
rivularis Willd. VI/2 890
serratuloides Schult. VI/2 881
spathulatus Moretti VI/2 872
spinosissimus L. VI/2 901
spurius Hoffm. VI/2 889
Tataricus Bernh. VI/2 912
tuberosus Schult. VI/2 883
tuberosus Willd. VI/2 889
Cnidium Cuss. V/2 1303; VII 194
Alsaticum Colla V/2 1381
Alsaticum Spr. V/2 1379
apioideum St. Lager V/2 1308
apioides Spr. V/2 1308
Athoum Griseb. V/2 1309
confertum Moench V/2 1304
dubium (Schkuhr) Thellung V/2 1305
Fischeri Spr. V/2 1326
Monnieri (L.) Spr. V/2 1304
Orientale Boiss. V/2 1309
palustre Rchb. V/2 1305
pratense Bubani V/2 1296
Pyrenaeum Spr. V/2 1317
silaifolium (Jacq.) Simonkai V/2 1307
Silaus Spr. V/2 1296
silvestre Mutel V/2 1305
tenuifolium Moench V/2 1140
venosum Koch V/2 1305
„ virescens Bubani V/2 1298
Cobaea scandens Cav. V/3 2112
Cobresia Pers. II 50; VII 156
Bellardii Degland II 49
bipartita (Bell.) Dalla Torre II 50
„ caricina Willd. II 50
Coccaceae VII 135
Coccinia Wight VII 208
Coccoloba L. III 166; VII 171
Coccoloboideae VII 171
Cocculus DC. V/1 15, 16
Cochlearia L. IV/1 134; VII 177
acaulis Desf. IV/1 101
alpina Kolb IV/1 146
amphibia Peterm. IV/1 310
Anglica L. IV/1 139; VII 176 Fig. 1219
Armoracia L. IV/1 305
auriculata DC. IV/1 143
Austriaca Ledeb. IV/1 308
Batavica Gandoger IV/1 139
brevicaulis Facch. IV/1 146
Coronopus L. IV/1 93
Corvini Chaub. et Bory IV/1 189
Danica L. IV/1 141
Draba L. IV/1 78
excelsa Zahlbr. IV/1 138
fenestrata R. Br. IV/1 138
glastifolia L. IV/1 135
hastata Moench IV/1 141
lapathifolia Gilib. IV/1 305
longifolia Med. IV/1 139
lyrata Sibth. et Sm. IV/1 189
maritima Crtz. IV/1 296
micacea Marshall IV/1 142
nilotica Del. IV/1 93
officinalis L. IV/1 136, 137
Pyrenaica DC. IV/1 137
renifolia Stok. IV/1 137
rhizobotrya Walp. IV/1 146
rusticana Lam. IV/1 305

Cochlearia sativa Cav. IV/1 368
saxatilis L. IV/1 143
vulgaris Bubani IV/1 137
Cochliostema Jacobinianum C. Koch et Linden II 143
Cochlospermaceae V/1 493; VII 189
Cochlospermineae V/1 493; VII 189
Cochranea anchusifolia (Poir.) Gürke V/3 2131
Cocos nucifera L. II 130; VII 157
Codiaceae VII 138
Codiaeum Rumph. V/1 118
„ variegatum Bl. V/1 125
Codonoprasum carinatum Rchb. II 227
Coelanthe asclepiadea Don V/3 1998
Coelastraceae VII 138
Coeloglossum Hartman II 363; VII 164
albidum Hartman II 368
„ viride (L.) Hartman II 363
Coelogyne cristata Lindl. II 323
Coelospermae V/2 934
Coenogoniaceae VII 144
Coenolophium Rchb. V/2 1326
Cóffea Arabica L. VI/1 196; VII 206 Fig. 1254
„ Liberica Bull. VI/1 196
Coïx lacryma Jobi L. I 181
Cola acuminata R. Br. V/1 492
„ vera K. Schum. V/1 492
Colchicum L. II 195; VII 159
alpinum Lam. et DC. II 198
autumnale L. II 195; VII 43 Fig. 1074
Bulbocodium Ker-Gawl. II 194
„ multiflorum Brot. II 195
Coleanthus Seidel I 220; VII 154
„ subtilis Seidl. I 220; VII 154
Coleonema Bartl. V/1 50
Coleosporiaceae VI/2 680; VII 142
Coleostephus Myconis Cass. VI/2 593
Coleus Loureiro V/4 2271
aromaticus (Roxb.) Benth. V/4 2272
barbatus Andr. Benth. V/4 2271
Huberi Regel V/4 2271
Malabaricus Benth. V/4 2272
Rehneltianus Berger V/4 2271
Schimperi Vatke V/4 2271
scutellarioides (L. em. Miq.) Benth. V/4 2271
„ Walkeri Benth. V/4 2272
Collemataceae VII 144
Colletia cruciata Gill. et Hook. V/1 322
„ spinosa Lam. V/1 322
Collinsia bicolor Benth. VI/1 5, 6
Collinsonia Canadensis L. V/4 2272
Collomia Nutt. V/3 2117; VII 200
biflora (Ruiz et Pav.) Brand V/3 2117
Collomia Cavanillesii Hook. et Arn. V/3 2117
coccinea Lehm. V/3 2117
grandiflora Dougl. V/3 2117
heterophylla Hook. V/3 2117
„ linearis Nutt. V/3 2117
Colobanthus Bartl. VII 173
Colocasia antiquorum Schott II 131; VII 157
Colocasioideae VII 157
Colpodium aquaticum Trin. I 288
Colubrina Brongn. V/1 325
intorta Montand. III 194
„ vivipara L. III 196
Columellaceae VI/1 178; VII 205
Columniferae V/1 425; VII 188
Colutea L. IV/3 1457; VII 182
alpina Lam. IV/3 1418
aperta Moench IV/3 1457
arborescens L. IV/3 1458
australis Lam. IV/3 1412
frigida Poir. IV/3 1416
galegifolia R. Br. IV/3 1456
hirsuta Roth IV/3 1458
media Willd. IV/3 1457
melanocalyx Boiss. et Heldr. IV/3 1458, 1460
Nepalensis Sims IV/3 1458
Orientalis Miller IV/3 1457
Persica Boiss. IV/3 1458
sanguinea Pall. IV/3 1457
„ vesicaria Séguier IV/3 1458
Comandra elegans Rchb. f. III 151
Comaropsis Sibirica Ser. IV/2 928
Comarum L. IV/2 805; VII 180
flavum Roxb. IV/2 854
fragarioides Roth IV/2 826
palustre L. IV/2 805; VII Fig. 1129
rubrum Gilib. IV/2 805
„ supinum Alef. IV/2 854
Combogio gutta L. V/1 501
Combretaceae V/2 771; VII 192
Combretum L. V/2 772; VII 192
coccineum Lam. V/2 772
„ purpureum Vahl V/2 773
Commelina L. VII 158
coelestis Willd. II 143
„ communis L. II 143
Commelinaceae II 143; VII 158
Commiphora Abyssinica (Berg) Engl. V/1 83
Opobalsamum (L.) Engl. V/1 84
„ Schimperi (Berg) Engl. V/1 83
Compositae VI/1 394; VII 209 und 21 Fig. 1031
Comptonia Banks III 10; VII 107
Condylocarpus Hoffm. V/2 1457, 1460
Apulus Hoffm. V/2 1459
humilis Koch V/2 1460
„ officinalis Koch V/2 1459
Confervales VII 138
Coniferae I 76; VII 150
Coniocarpineae VII 143
Conioselinum Fisch. V/2 1328; VII 194
cenolophioides Turcz. V/2 1329
Fischeri Wimm. et Grab. V/2 1329
Ingricum Fisch. V/2 1331
Tataricum Fisch. V/2 1329
vaginatum (Sprengel) Thellung V/2 1329; VII 194
Conirostrum Dul. IV/1 219
Conium L. V/2 1081; VII 194
Cicuta Neck. V/2 1082
divaricatum Boiss. et Orph. V/2 108
leiocarpum Stapf V/2 1084
maculatum L. V/2 1082
maculosum Pall. V/2 1082
maior Lam. V/2 1082
Royeni L. V/2 1060
„ Royeni Willd. V/2 1062
Conjugatae VII 137
Connaraceae IV/2 662; VII 181
Conopodium denudatum Koch V/2 1195
maius (Gouan) Loret et Barrandson V/2 1195
Contortae V/3 1901; VII 197
Conringia Adans. IV/1 440; VII 178
Austriaca Rchb. IV/1 441
Orientalis (L.) Dum. IV/1 440
perfoliata Lk. IV/1 440
planisiliqua Fisch. et Mey. IV/1 440
„ Thaliana Rchb. IV/1 392
Consolida Ajacis Schur III 488
„ arvensis Opitz III 487
Convallaria L. II 273; VII 162
bifolia L. II 267
latifolia Jacq. II 270
Linnaei Gaertn. II 274
majalis L. II 274; VII 102 Fig. 1132
multiflora L. II 270
odorata Mill. II 270
Polygonatum L. II 270
„ verticillata L. II 273
Convolvulaceae V/3 2073; VII 199
Convolvuloideae VII 199
Convolvulus L. V/3 2078; VII 199
althaeoides L. V/3 2079
arvensis L. V/3 2086
Cantabricus L. V/3 2085
Cherleri Ag. V/3 2087
evolvuloides Desf. V/3 2080
humilis Jacq. V/3 2080
inflatus Desf. V/3 2083
lucanus Ten. V/3 2083
maritimus Lam. V/3 2083
Mauritanicus Boiss. V/3 2080
minor Gilib. V/3 2086
pentapetaloides L. V/3 2080
pubescens (Lindl.) Thellung V/3 2079

Convolvulus Scammonia L. V/3 2080
scoparius L. V/3 2079
sepium L. V/3 2080
Siculus L. V/3 2079
silvaticus W. et K. V/3 2083
Soldanella L. V/3 2083
tenuissimum Sibth. et Sm. V/3 2080
„ tricolor L. V/3 2079
Conyza ambigua DC. VI/1 437
Britannica Morison VI/1 483
salicina Rupr. VI/1 479
squarrosa L. VI/1 483
„ vulgaris Lam. VI/1 485
Cookia punctata Sonnerat V/1 54
Copaiba Mill. VII 181
Copaifera L. IV/3 1130; VII 181
Coptis Salisb. VII 174
Coppoleria manantha Tod. IV/3 1514
Corallorrhiza Chatelain II 394; VII 165
Coralliorrhiza Karsten II 394
innata R. Br. II 394
„ trifida Chatelain II 394 522
Corchorus capsularis L. V/1 428
„ olitorius L. V/1 428
Cordaitaceae VII 151
Cordaitales VII 151
Cordia Myxa L. V/3 2124
Cordioideae VII 200
Cordyline terminalis Kth. II 279
Corema Don V/3 1602
Coreopsis coronata Hook. VI/1 529
Drummondii Torr. et Gray VI/1 529
elegans hort. VI/1 529
grandiflora Hogg (nec Nutt.) VI/1 529; VI/2 1354
lanceolata L. VI/1 529
maritima Hook. VI/1 529
palmata Nutt. VI/1 529
tinctoria Nutt. VI/1 529
trifida Lam. VI/1 531
„ tripteris L. VI/1 529
Coriandrum L. V/2 1071; VII 194
aquilegiifolium All. V/2 1081
Cicuta Roth V/2 1164
Cynapium Crtz. V/2 1272
didymum Stok. V/2 1075
diversifolium Gilib. V/2 1071
globosum Salisb. V/2 1071
latifolium Crtz. V/2 1219
maculatum Roth V/2 1082
maius Gouan V/2 1071
radians Prantl V/2 1075
sativum L. V/2 1071
testiculatum L. V/2 1075
Coriaria Japonica Asa Gray V/1 213
myrtifolia L. V/1 213
ruscifolia L. V/1 213
sarmentosa Forst. V/1 213
„ thymifolia Humb. V/1 213
Coriariaceae V/1 213; VII 186
Corideae VII 171
Corion Hoffmgg. et Lk. V/2 1074
Coris (Tournef.) L. VII 197
Corispermum L. III 251; VII 171
canescens Kit. III 254; VII 98 Fig. 1126
hyssopifolium L. III 252
intermedium Schweigg. III 253
Marschallii Fenzl III 254
microspermum Host III 253
nitidum Kit. III 253
patens Fisch. III 253
Redowskii Fisch. III 252
squarrosum Bieb. nec L. III 254
squarrosum L. III 252
Stauntonii Moqu. III 252
„ tenue Lk. III 253
Coristospermum Bertol. V/2 1314
Cormus domestica Spach IV/2 711
Cornaceae V/2 1538; VII 195
Cornicina circinnata Boiiss. IV/3 1352
Cornucopiae cucullatum L. VII 154
Cornus L. V/2 1540; VII 195
alba L. V/2 1544
alba L. subsp. stolonifera (Michx.) Wangerin V/2 1544
alba L. subsp. Tatarica (Mill.) Wangerin V/2 1544
alternifolia L. V/2 1542
amomum hort. V/2 1543
amomum Mill. V/2 1543
brachypoda Koch V/2 1542
Canadensis L. V/2 1543
candidissima Marsh. V/2 1543
capitata Wallr. V/2 1543
controversa Hemsley V/2 1542
corynostylis Koehne V/2 1542
femina Mill. V/2 1543
florida L. V/2 1543
ignorata K. Koch V/2 1543
macrophylla Koehne V/2 1542
macrophylla Wall. V/2 1542
mas L. V/2 1548
Nuttalii Audubon V/2 1543
paniculata L'Hérit. V/2 1543
pumila Koehne V/2 1543
Purpusii Koehne V/2 1543
rugosa Lam. V/2 1543
sanguinea L. V/2 1545
stricta Lam. V/2 1543
„ Suecica L. V/2 1554
Corolliflorae V/3 1567; VII 195
Coronaria Flos Jovis A. Br. III 296
tomentosa A. Br. III 297; VII 71 Fig. 1106
Coronilla L. IV/3 1465; VII 182
Cappadocica Willd. IV/3 1466
coronata Hornung et Gaud. IV/3 1470
coronata L. IV/3 1469
Cretica L. IV/3 1466
Emerus L. IV/3 1467
juncea L. IV/3 1465
minima Jacq. IV/3 1472
minima L. IV/3 1470
Coronilla montana Jacq. IV/3 1469
montana Schrank IV/3 1472
parviflora Moench IV/3 1466
repanda Boiss. IV/3 1466
scorpioides L. Koch IV/3 1465
serradella E. H. L. Krause IV/3 1478
vaginalis L. IV/3 1470
„ varia L. IV/3 1472
Coronilleae VII 182
Coronopus J. G. Zinn IV/1 92; VII 177
didymus (L.) Sm. IV/1 93
niloticus (Del.) Spr. IV/1 93
pinnatifidus Dul. IV/1 93
procumbens Gilib. IV/1 93
Ruellii All. IV/1 93
verrucarius Muschler et Thellung IV/1 93
Corothamnus diffusus Presl IV/3 1208
Halleri Presl IV/3 1207
„ procumbens Presl IV/3 1207
Correa alba Andr. V/1 49
„ speciosa Ait. V/1 49
Corrigiola L. III 427; VII 173
litoralis L. III 427; VII 74 Fig. 1109a
„ telephifolia Pourr. III 427
Corsiaceae VII 164
Cortaderia Selloana Aschers. et Graebn. VII 155
Corthusia Matthiolei Rouy V/3 1817
Corticiaceae VII 142
Cortusa L. V/3 1816; VII 196
glabrescens Gandoger V/3 1818
glabrescens Schur V/3 1817
grandissima Schur V/3 1817
Matthioli L. V/3 1817
Sibirica Andrz. V/3 1817
Welwitschiana Gandoger V/3 1818
Corvisartia Caucasica Don VI/1 492
„ Helenium Mérat VI/1 475
Corydalis Med. IV/1 36; VII 176
bulbosa DC. IV/1 39
bulbosa Pers. IV/1 38
capnoides Wahlenb. IV/1 43
cava (Mill.) Schweigg. et Körte IV/1 38
claviculata DC. IV/1 44
digitata Pers. IV/1 39
fabacea Pers. IV/1 41
Gebleri Ledeb. IV/1 43
Hausmanni R. v. Klebelsberg IV/1 45
intermedia (Ehrh.) Gaudin IV/1 41
Kirschlegeri E. Issler IV/1 45
Lobelii Tausch IV/1 45
lutea (L.) DC. IV/1 42
ochroleuca Koch IV/1 42
pumila Rchb. IV/1 40
solida (Mill.) Sw. IV/1 39
tuberosa DC. IV/1 38

Corylopsis Sieb. et Zucc. IV/2 655
Corylus L. III 71; VII 168
arborescens Münchh. III 71
Avellana L. III 71; VII Fig. 1105, 1107, 1118
colurna L. III 71
maxima Mill. III 71
silvestris Salisb. III 71
tubulosa Willd. III 71
Corynephorus canescens Pal. I 242
Corynocarpaceae V/1 233; VII 186
Corynolobus R. Roem. IV/1 219
Corypha L. VII 156
Coryphoideae VII 156
Corytholoma (Benth.) Decne. VI/1 177
Coscinodon Spreng. VII 145
Cosmanthus fimbriatus Nolte V/3 2121
„ viscidus DC. V/3 2121
Cosmophyllum cacaliodes C. Koch VI/1 528
Cosmos bipinnatus Cav. VI/1 532
„ sulphureus Cav. VI/1 532
Costus L. II 321; VII 164
Cota Austriaca Schultz VI/1 539
„ Triumfetti J. Gray VI/1 538
Cotinus Mill. V/1 226; VII 186
„ Coggygria Mill. V/1 226
Cotoneaster Med. IV/2 682; VII 181
acuminata IV/2 683
coccinea Steud. IV/2 685
Cotoneaster Karsten IV/2 686
horizontalis Decne. IV/2 683
integerrima Med. IV/2 686
intermedia Coste IV/2 688
lucida Schlecht. IV/2 683
melanocarpa Lodd. IV/2 684
microphylla Wallr. IV/2 683
Nebrodensis K. Koch IV/2 685
nigra Fries IV/2 684
peduncularis Boiss. IV/2 684
Pyracantha Spach IV/2 688
rotundifolia Wallr. IV/2 683
Simonsi Bak. IV/2 683
tomentosa (Ait.) Lindl. IV/2 685
vacciniiflora K. Koch IV/2 683
„ vulgaris Lindl. IV/2 686
Cotula L. VI/2 622; VII 211
anthemoides L. VI/2 623
aurea L. VI/2 624
Australis (Less.) Hook. f. VI/2 624
coronopifolia L. VI/2 624
dichrocephala Schultz-Bip. VI/2 623
globifera Thunb. VI/2 1366
heterocarpa DC. VI/2 1366
pygmaea Poir. VI/2 674
„ tenella E. Mey. VI/2 1366
Cotulina aurea Pomel VI/2 624
Cotyledon agavoides Bak. IV/2 514
arborescens Mill. IV/2 515
Cotyledon gibbiflora Moç. et Sess. IV/2 514
pulvinata Hook. f. IV/2 514
retusa Bak. IV/2 513
secunda Bak. IV/2 513
„ Umbilicus L. IV/2 513
Coumarorina odorata Aubl. IV/3 1497
Cousinia Cass. VI/2 923
Cracca atropurpurea Gren. et Godr. IV/3 1509
Bertolonii Gren. et Godr. IV/3 1538
dasycarpa Alef. IV/3 1537
disperma Gren. et Godr. IV/3 1508
major Franken IV/3 1529
minor Gren. et Godr. IV/3 1515
monanthos Gren. et Godr. IV/3 1514
tenuifolia Gren. et Godr. IV/3 1533
varia Gren. et Godr. IV/3 1537
villosa Gren. et Godr. IV/3 1535
Crambe Adans. IV/1 287
Crambe L. IV/1 295; VII 177
cordifolia Stev. IV/1 296
Corvini All. IV/1 189
laciniata Lam. IV/1 298
maritima L. IV/1 296
Orientalis Jacq. IV/1 296
„ Tataria Jacq. IV/1 298
Craniolaria L. VII 205
Crantzia Scop. VII 205
Craspedia chrysantha (Schlecht.) Benth. VII 211
Crassula L. IV/2 514; VII 179
aquatica (L.) Schoenland IV/2 515
arborescens Willd. IV/2 515
Bolusii Hook. f. IV/2 515
falcata Willd. IV/2 514
lactea Ait. IV/2 515
quadrifolia Baker IV/2 515
lycopodioides Lam. IV/2 515
muscosa (L.) Schoenland IV/2 517
„ rubens L. IV/2 515
Crassulaceae IV/2 511; VII 179
Crataegomespilus Bronvauxii hort. IV/2 742
Dardari Simon-Louis IV/2 742
grandiflora (Smith) Camus IV/2 743
Crataegus L. IV/2 725; VII 181
alpina Mill. IV/2 721
Amelanchier Desf. IV/2 756
apiifolia Med. IV/2 735
apiifolia Michx. IV/2 731
Aria L. IV/2 713
azarolus L. IV/2 730
Bibas Lour. IV/2 664
Crataegus Chamaemespilus Jacq. IV/2 721
coccinea L. IV/2 727
cordata Ait. IV/2 730
Crus galli L. IV/2 724
curvisepala Lindman IV/2 738
dissecta Borkh. IV/2 737
Douglasii Lindl. IV/2 729
elliptica Ait. IV/2 730
flava Ait. IV/2 730
intermixta Beck IV/2 739
laciniata Stev. IV/2 737
lagenaria Fisch. et Mey. IV/2 738
macrantha Koehne IV/2 729
Maroccana Pers. IV/2 730
media Bechst. IV/2 739
mollis Scheele IV/2 727
monogyna Jacq. IV/2 735
nigra Waldst. et Kit. IV/2 730
Oxyacantha L. IV/2 732
oxyacanthoides Thuill. IV/2 733
parvifolia Ait. IV/2 729
Pontica Koch IV/2 730
populifolia Walt. IV/2 730
prunifolia Bosc IV/2 728
punctata Jacq. IV/2 728
purpurea Bosc IV/2 729
Pyracantha Med. IV/2 688
Reginae hort. IV/2 737
rotundifolia Borkh. IV/2 727
rotundifolia Lam. IV/2 756
sanguinea Pall. IV/2 729
Scandica L. IV/2 716
Sinaica Boiss. IV/2 726
splendens hort. IV/2 733
succulenta Lk. IV/2 729
tanacetifolia Pers. IV/2 731
tomentosa L. IV/2 728
torminalis L. IV/2 719
uniflora Münchb. IV/2 729
viridis L. IV/2 728
„ xanthocarpa Med. IV/2 729
Crawfurdia Wall. V/3 1954; VII 198
Credneria Zenk. IV/2 657; V/1 353
Crenosciadium Boiss. et Heldr. V/2 1359
Crepis L. VI/2 1134; VII 212
adenantha Vis. VI/2 1167
Adonis Spr. VI/2 1161
agrestis Fr. VI/2 1167
alpestris (Jacq.) Tausch VI/2 1151
andryaloides A. Kern. VI/2 1161
Apargia Pers. VI/2 1077
apargioides Willd. VI/2 1077
aurea (L.) Cass. VI/2 1147
Austriaca Jacq. VI/2 1141
Bauhiniana Tausch VI/2 1169
biennis L. VI/2 1162
blattarioides (L.) DC. VI/2 1141

Crepis bulbosa Tausch VI/2 1135
capillaris (L.) Wallr. VI/2 1168
cernua Ten. VI/2 1170
chondrilloides Jacq. VI/2 1161
chondrilloides Rchb. VI/2 1144
chrysantha Koch VI/2 1147
conyzifolia (Gouan) Dalla Torre VI/2 1149
Croatica Schloss. et Vukot. VI/2 1156
Curiensis Brügg. VI/2 1180
Dioscuridis Pall. VI/2 1165
Druceana Murr VI/2 1180
foeniculacea Froel. VI/2 1161
foetida L. VI/2 1173, 1174
Froelichiana DC. VI/2 1160
grandiflora Tausch VI/2 1149
Heerii Moritzi VI/2 1147
Helvetica Brügg. VI/2 1179
hieracioides Waldst. et Kit. VI/2 1156
hispida Waldst. et Kit. VI/2 1171
hybrida Kern. VI/2 1180
hyoseridifolia Tausch VI/2 1142
Jacquini Tausch VI/2 1144
incarnata (Wulf.) Tausch VI/2 1160
jubata Koch VI/2 1147
lacera Ten. VI/2 1135
Lachenalii Gochn. VI/2 1166
lapsanoides (Gouan) Froel. VI/2 1135
latifolia Balb. VI/2 1140
Lodomiriensis Bess. VI/2 1163
longifolia Hegetschw. et Kern. VI/2 1180
mollis (Jacq.) Aschers. VI/2 1155
montana Tausch VI/2 1138
muricata Sibth. et Sm. VI/2 1135
neglecta L. VI/2 1170
Nicaeensis Balb. VI/2 1167
nudicaulis L. VI/2 1032
Oenipontana Murr VI/2 1180
paludosa Moench VI/2 1153
Pannonica (Jacq.) Koch VI/2 1140
parviflora Desf. VI/2 1135
parviflora Sabransky VI/2 1160
polymorpha Wallr. VI/2 1168
pontana (L.) Dalla Torre VI/2 1138
„ praecox Balb. VI/2 1177
pulchra L. VI/2 1178
pygmaea L. VI/2 1146
Raetica Hegetschw. VI/2 1147
rigida Waldst. et Kit. VI/2 1140
rubra L. VI/2 1135
scabra DC. VI/2 1167
setosa Hall. f. VI/2 1171
Crepis Sibirica L. VI/2 1137
stricta Schultz-Bip. VI/2 1166
stricta Scop. VI/2 1170
succisifolia Tausch VI/2 1155
taraxacifolia Thuill VI/2 1177
tectorum L. VI/2 1165
Tergloviensis (Hacquet) A. Kern. VI/2 1142
vesicaria L. VI/2 1176
vesicaria L. subsp. taraxacifolia DC. VI/2 1177
„ virens L. VI/2 1168
Crescentia Cujete L. VI/1 176
Cribrariaceae VII 130
Crinodendron Mol. VII 188
Crinum L. II 319; VII 162
Cristaria coccinea Sonn. V/2 773
„ grandiflorum Don. V/2 773
Critamus Bess. V/2 1176
Critamus Hoffm. V/2 1139
Critamus Wittstein V/2 1176
ammoides Bluff et Fing. V/2 1175
heterophyllus Mert. et Koch V/2 1173, 1174
latifolius Bluff et Fing. V/2 1180
Crithmum Canariense Cavan. V/2 1224
Libanotis Lk. V/2 1093
maritimum L. V/2 1224
mediterraneum Bieb. V/2 1326
„ Pyrenaicum L. V/2 1247
Crocoideae VII 163
Crocosma Plach.-Tritonia Ker-Gawl. II 305; VII Fig. 1198
Crocus L. II 297; VII 163
albi lorus Kit. II 299; VII 125 Fig. 1165
aureus Sibth. et Sm. II 297
Banaticus Gay. II 297
biflorus Mill. II 301
chrysanthus Herb. II 297
circumscissus Haw. II 301
Imperati Ten. II 297
levigatus Bory et Chaub. II 297
minimus Lam. et DC. II 297
Neapolitanus II 300; VII 125 125 Fig. 1165
nudiflorus Sm. II 297
officinalis Martyn II 297
pusillus Ten. II 301
reticulatus Bieb. II 301
Salzmanni Gay. II 297
sativus L. II 297
Sieberi Gay. II 297
speciosus Bieb. II 297
Susianus Ker-Gawler II 297
variegatus Hoppe et Hornschuch II 301
nernus (L.) Wulf. II 299; VII Fig. 1165
Cronartiaceae IV/2 644; VII 142
Crossopetalum gentianoides Roth V/3 2028
Crossosomataceae IV/2 654; VII 180
Crotalaria burhia Buch.-Ham. IV/3 1147
juncea L. IV/3 1147
„ retusa L. IV/3 1147
Croton L. VII 185
Eluteria (L.) Bennet V/1 124
lacciferus L. V/1 120
Philippinense Lam. V/1 125
spinosus L. V/1 120
„ Tiglium L. V/1 124
Crotonoideae VII 185
Crowea Sm. VII 184
Crucianella angustifolia L. VI/1 197
latifolia L. VI/1 197
patula L. VI/1 197
„ stylosa Trin. VI/1 196
Crucifera aëthionema Krause IV/1 112
Aleppica E. H. L. Krause IV/1 186
alliaria Krause IV/1 149
altissima E. H. L. Krause IV/1 176
apetala Krause IV/1 84
biscutella Krause IV/1 197
Boreava E. H. L. Krause IV/1 192
brassica E. H. L. Krause IV/1 242
caerulescens Krause IV/1 124
Cardaria Krause IV/1 78
Cheiranthus E. H. L. Krause IV/1 269
cochlearia Krause IV/1 136
Columnae E. H. L. Krause IV/1 179
Corvini E. H. L. Krause IV/1 189
Danica Krause IV/1 141
Dioscoridis Bubani IV/1 89
dissecta E. H. L. Krause IV/1 208
divaricata Krause IV/1 105
diversifolia Krause IV/1 87
elongata E. H L. Krause IV/1 233
erucoides E. H. L. Krause IV/1 217
graminifolia Krause IV/1 91
Iberis Krause IV/1 107
Jonopsidium Krause IV/1 102
Irio E. H. L. Krause IV/1 169
Lamarckii E. H. L. Krause IV/1 221
lampsana E. H. L. Krause IV/1 206
latifolia Krause IV/1 89
lepidioides Krause IV/1 80
Lepidium Krause IV/1 79
Loeselii E. H. L. Krause IV/1 174

Crucifera montana Krause IV/1 126
myagrum E. H. L. Krause IV/1 186
napus E. H. L. Krause IV/1 252
odorata Krause IV/1 103
perfoliata Krause IV/1 121
petrocallis Krause IV/1 115
pinnata Krause IV/1 109
Pollichii E. H. L. Krause IV/1 224
rapa E. H. L. Krause IV/1 257
rapistra E. H. L. Krause IV/1 288
rotundifolia E. H. L. Krause IV/1 132
rugosa E. H. L. Krause IV/1 290
Ruellii Krause IV/1 93
semperflorens Krause IV/1 102
Senebiera Krause IV/1 93
sinapis E. H. L. Krause IV/1 236
sinapistra E. H. L. Krause IV/1 263
Sisymbrium E. H. L. Krause IV/1 164
sophia E. H. L. Krause IV/1 160
strictissima E. H. L. Krause IV/1 165
subularia Krause IV/1 70
supina E. H. L. Krause IV/1 163
Teesdalea E. H. L. Krause IV/1 72
tenuifolia E. H. L. Krause IV/1 214
thlaspoides Krause IV/1 120
umbellata Krause IV/1 106
viminea E. H. L. Krause IV/1 209
Virginica Krause IV/1 85
Wolgensis E. H. L. Krause IV/1 167
Cruciferae IV/1 51; VII 176 und 19 Fig. 1021
Crupina Cass. VI/2 930; VII 212
Crupinastrum (Moris.) Vis. VI/2 930
„ vulgaris Cass. VI/2 930
Cryphaeaceae VII 146
Crypsis Ait. I 200; VII 154
aculeata (L.) Ait. I 209
alopecuroides Schrad. I 210
macrostachya Brot. I 210
„ schoenoides Lam. I 210
Cryptadenia Meisn. V/2 702
Crypteroniaceae VII 191
Cryptogamae cellulares VII 135
„ vasculares VII 147
Cryptogramme R. Br. VII 149
„ crispa R. Br. I 36
Cryptomeria Japonica (L. f.) Don I 81; VII 151 Fig. 1179 B
Cryptomonadales VII 137
Cryptonemiales VII 130
Cryptostegia grandiflora (Roxb.) R. Br. V/3 2063
Cryptostemma R. Br. VI/2 806
Cryptotaenia Canadensis (L.) DC. V/2 1169
Cucubalus L. III 307; VII 173
acaulis L. III 294
alpinus Lam. III 280
baccatus Gueld. III 307
baccifer L. III 307
Behen L. III 279
chloranthus Willd. III 289
conicus Lam. III 281
dioicus Gilib. III 290
fasciculatus Lam. III 285
glaucus Willd. III 280
horizontalis Moench III 307
Hungaricus Kit. III 291
inflatus Salisb. III 279
Italicus L. III 293
multiflorus Ehrh. III 291
noctiflorus Mill. III 302
nutans Lam. III 292
Otites L. III 290
parviflorus Lam. III 290
Pumilio L. III 347
quadrifidus L. III 305
Royeni Bieb. III 302
saxifragus Lam. III 284
secundus Gilib. III 290
Tataricus L. III 290
venosus Gilib. III 279
viscidus Krock. III 302
viscosus L. III 302
Cucumis L. VI/1 319; VII 208
Anguria L. VI/1 319
flexuosus L. VI/1 319, 320
Grossularia hort. VI/1 316
Melo L. VI/1 320
metuliferus E. Meyer VI/1 319
myriocarpus Naud. VI/1 316
prophetarum L. VI/1 316
sativus L. VI/1 321; VII 35 Fig. 1059
Cucurbita L. VI/1 323; VII 208
citrullina Alef. VI/1 326
Citrullus L. VI/1 313
clipeiformis Blackwell VI/1 326
clypeata Alef. VI/1 328
depressa hort. VI/1 328
ficifolia Bouché VI/1 316, 326
giromontia Alef. VI/1 326
Lagenaria L. VI/1 314
maxima Duch. VI/1 326
melanosperma A. Br. VI/1 326
Melopepo L. VI/1 326
moschata Duch. VI/1 327
ovifera L. VI/1 328
Pepo VI/1 324
piriformis Lobel VI/1 326
pomiformis Roem. VI/1 326
pyxidaria DC. VI/1 326
Cucurbita turbaniformis Roem. VI/1 326
„ verrucosa L. VI/1 326
Cucurbitaceae VI/1 311; VII 208
Cucurbitales VII 208
Cucurbitariaceae VII 141
Cujunia grandiflora Alef. IV/3 1543
Culcitium H. B. et Kth. VI/2 798; VII 212
Cuminia Cyminum J. F. Gmelin V/2 1138
Cuminoides obliqua Moench V/2 992
Cuminum L. VII 194
Aegyptiacum Mérat V/2 1138
cuminoides O. Kuntze V/2 992
Cyminum L. V/2 1138
Cyminum Wallich V/2 1071
Hispanicum Mérat V/2 1138
„ odoratum Salisb. V/2 1138
Cunila coccinea Nutt. V/4 2280
„ origanoides Britt. V/4 2281
Cunninghamia R. Br. VII 151
Cunoniaceae IV/2 654; VII 180
Cupania L. VII 187
Cuphea Adans. V/2 741
cyanea DC. V/2 745
fuchsiifolia St. Hilaire V/2 745
lanceolata Ait. V/2 745
micropetala Humb., Bonpl. et Kth. V/2 745
petiolata (L.) Koehne V/2 745
„ platycentra Lemaire V/2 745
Cupressaceae VII 151
Cupressus L. VII 151
Lawsoniana Murray I 82
„ sempervirens L. I 82
Curatella L. VII 188
Curculigo recurvata Dryand. II 320
Curcuma longa L. II 321
„ zedoaria Roscoe II 321
Curtisia faginea Ait. V/2 1539
Cuscuta L. V/3 2089; VII 199
alba Glück V/3 2100
alba Presl V/3 2099
Americana L. V/3 2108
Arabica Fresen V/3 2091
arvensis Beyrich V/3 2104
australis R. Br. V/3 2105
breviflora Vis. V/3 2106
Cesatiana Bertol. V/3 2106
Chilensis Bertero V/3 2106
corymbosa Choisy V/3 2106
densiflora Soyer-Will. V/3 2102
diaphana Wend. V/3 2106
Epicnidea Bernh. V/3 2100
Epilinum Weihe V/3 2102
Epithymum (L.) Murray V/3 2094
Epithymum Murray subsp. Trifolii (Babingt. et Gibs.) V/3 2096
Europaea L. V/3 2100
filiformis Lam. V/3 2100

Cuscuta globularis Bert. V/3 2091
graveolens Humb., Bonpl. et Kth. V/3 2091
Gronovii Willd. V/3 2108
Gussoni Gasp. V/3 2099
halophila Sum Veg. V/3 2100
halophyta Fries V/3 2100
Hassiaca Pfeiffer V/3 2106
hyalina Boiss. V/3 2100
Ligustri Aresch. V/3 2100
lupuliformis Krocker V/3 2109
maior DC. V/3 2106
major Koch V/3 2102
monogyna auct. V/3 2109
monogyna Schmidt V/3 2100
obtusiflora Humb., Bonpl. et Kth. V/3 2105
Palaestina Boiss. V/3 2091
Polygonorum Cesati V/3 2106
Popayanensis Poeppig V/3 2106
Schkuhriana Pfeiffer V/3 2101
segetum Rota V/3 2100
stenoloba Bornm. et Schwarz V/3 2098
suaveolens Pfeiffer V/3 2106
suaveolens Séringe V/3 2106
subulata Tineo V/3 2099
tetrandra Moench V/3 2100
tetrasperma Jan. V/3 2100
tubulosa Presl. V/3 2100
umbellata Humb., Bonpl. et Kth. V/3 2091
umbrosa Beyrich V/3 2108
vulgaris Pers. V/3 2100
vulgaris Presl V/3 2102
„ vulgivaga Engelm. V/3 2108
Cuscutina suaveolens Pfeiffer V/3 2106
Cuscutoideae VII 199
Cusparia trifoliata (Willd.) Engl. V/1 51
Cuspidocarpus rupestris Spenner V/4 2287
„ thymifolius O. Kuntze V/4 2287
Cussonia Thunb. VII 193
Cutleriaceae VII 138
Cutleriales VII 138
Cyanantha lobatus Wall. VI/1 329
Cyanastraceae II 144; VII 158
Cyanophyceae VII 136
Cyanophyllum magnificum Lindl. V/2 796
Cyanotis vittata Lindl. II 143
Cyanus coriaceus Baumg. VI/2 976
Jacea Presl VI/2 944
paniculatus Presl VI/2 969
Scabiosa Presl VI/2 974
segetum Lam. VI/2 961
„ solstitialis Baumg. VI/2 980
Cyatheaceae VII 148
Cyathoselinum Benth. V/2 1226
Cycadaceae VII 150
Cycadales I 73; VII 150
Cycadofilicales VII 150
Cycas L. I 3; VII 150 und 55 Fig. 1090
Cyclachaena xanthiifolia Fres. VI/1 533
Cyclamen L. V/3 1836; VII 197
aestivum Rchb. V/3 1844
Africanum Boiss. et Reut. V/3 1836
Atkinsi T. Moore V/3 1849
autumnale J. Boos V/3 1848
Balearicum Willk. V/3 1836
Clusii Lindl. V/3 1844
cordifolium Stokes V/3 1844
Coum Rchb. V/3 1844
Creticum Dörfl. V/3 1848
Europaeum L. V/3 1844
Europaeum Savi V/3 1847
Europaeum Smith V/3 1848
ficariaefolium Rchb. V/3 1848
floribundum Salisb. V/3 1844
hederifolium Ait. V/3 1847, 1848
linearifolium DC. V/3 1848
litorale Sadler V/3 1844
Neapolitanum Ten. V/3 1848
officinale Wender. V/3 1844
orbiculatum Mill. V/3 1844
Persicum Mill. V/3 1842
purpurascens Mill. V/3 1844
repandum Sibth. et Sm. V/3 1836
retroflexum Moench V/3 1844, 1847
Rohlfsianum Aschers. V/3 1836
romanum Griseb. V/3 1847
subhastatum Rchb. V/3 1848
„ vernum Lob. V/3 1847
Cyclamineae VII 197
Cyclanthaceae II 131; VII 157
Cyclanthera explodens Naud. VI/1 313
Cyclocarpineae VII 143
Cycloloma platyphyllum (Michx.) Moqu. III 260
Cyclospermum DC. V/2 1139
Cydonia Mill. IV/2 689; VII 181
Cydonia Karst. IV/2 689
Japonica Pers. IV/2 693
oblonga Mill. IV/2 689
„ vulgaris Pers. IV/2 689
Cylindrocapsaceae VII 138
Cylindrothecium Bryol. eur. VII 146
Cymbalaria Baumg. VII 204
Cymbalaria Wettst. VI/1 27
„ muralis G. M. Sch. VI/1 27
Cyminon longeinvolucellatum St. Lager V/2 1138
Cymodocea König I 120; VII 152
Cynanchoideae V/4 2064; VII 199
Cynanchum acutum L. V/3 2059
Monspeliacum L. V/3 2059
„ Vincetoxicum B. Br. V/3 2068
Cynapium Nutt. V/2 1314
Rupr. V/2 1272
vulgare Bubani V/2 1272
Cynara L. VI/2 923; VII 212
Cardunculus L. VI/2 923
Scolymus L. VI/2 924
„ Syriaca Boiss. VI/2 925
Cynareae VI/2 990, 992; VII 212
Cynocardamum Virginicum Webb et Berth. IV/1 85
Cynocrambaceae III 266; VII 172
Cynodon Rich. I 264; VII 155
dactylon (L.) Pers. I 264
Cynoglossospermum deflexum O. Kuntze V/3 2140
Lappula O. Kuntze V/3 2139
Cynoglossum L. V/3 2147; VII 200
amplexicaule Lam. V/3 2152
Apenninum Gouan V/3 2152
Apenninum Roth V/3 2148
argenteum Lam. V/3 2147
Austriacum Rechinger V/3 2153
cheirifolium Jacq. V/3 2152
cheirifolium L. V/3 2147
coelestinum hort. V/3 2147
coelestinum Lindl. V/3 2147
Columnae Ten. V/3 2147
Creticum Mill. V/3 2152
deflexum Roth V/3 2140
Germanicum Jacq. V/3 2148
glochidiatum Wallich V/3 2147
Haenkei Roem. et Schult. V/3 2148
Lappula Scop. V/3 2139
longiflorum Benth. V/3 2147
Modorense Rechinger V/3 2152
montanum Lam. V/3 2148
Moeszii Jav. V/3 2153
Nebrodense Guss. V/3 2147
officinale L. V/3 2149
Omphalodes L. V/3 2145
pellucidum Lapeyr. V/3 2148
pictum Ait. V/3 2152
scorpioides Haenke V/3 2144
sylvaticum Haenke V/3 2148
vesiculosum Wallich V/3 2147
virens Schreb. V/3 2148
Wallichii G. Don V/3 2147
Cynometra L. IV/3 1130; VII 181
Cynomoriaceae V/2 698; VII 193
Cynomorineae V/2 698; VII 193
Cynomorium coccineum L. III 160; V/2 698
Cynosurus L. I 296; VII 155
caeruleus L. I 268
cristatus L. I 296
distichus Hoffm. I 266
durus L. I 299
echinatus L. I 298
elegans Desf. I 298
fertilis De Lens I 298
ovatus Hoppe I 266
„ sphaerocephalus Wulf. I 267
Cyperaceae II 5; VII 155
Cyperus L. II 9; VII 155
aureus Ten. II 10

Cyperus badius Desf. II 15
Bolusii Boeck. II 10
cinnamomeus Retz. II 14
congestus Vahl II 10
diandrus Biv. II 13
esculentus L. II 10
fastigiatus Willd. II 14
ferrugineus Forsk. II 13
flavescens L. II 10
fuscus L. II 13
glaber L. II 10
glomeratus L. II 14
Heldreichianus Boiss. II 14
hyalinus Vahl II 10
longus L. II 14
Michelianus Link II 12
Monti L. II 11
Pannonicus Jacq. II 11
Papyrus L. II 10
protractus Del. II 13
serotinus Rottb. II 11
tenuiflorus Rottb. II 10
tenuiflorus Willd. II 14
thermalis Dum. II 15
umbilensis Boeck. II 10
„ vegetus Willd. II 10
Cyphellaceae VII 142
Cyphomandra betacea Sendtn. V/4 2559
Cypripedium L. II 326; VII 164
acaule Ait. II 326
Calceolus L. II 326
parviflorum Salisb. II 326
pubescens Willd. II 326
„ spectabile Swartz II 326
Cyrilla racemiflora L. V/1 233
Cyrillaceae V/1 233; VII 186
Cyrtandra Forst. VI/1 177; VII 205
Cyrtanthus Ait. II 319; VII 162
Cystopteris Bernh. I 9; VII 148
fragilis Milde I 9
montana Link I 10
Sudetica A. Br. I 11; VII 149 Fig. 1176
Cytinus L. III 165; V/1 558
Hypocistus L. III 165; V/1 558; VII 170
Cytisanthus Lam. IV/3 1193; VII 182
„ radiatus (L.) Lang IV/3 1193
Cytisophyllum sessilifolium Lang IV/3 1173
Cytisus L. IV/3 1167; VII 182
Adami Poit. IV/3 1166
albidus DC. IV/3 1168
albus Hacq. IV/3 1175
albus Link IV/3 1168
alpinus Mill. IV/3 1165
ambiguus Schur IV/3 1181
angustifolius Moench IV/3 1165
Ardoini Fourr. IV/3 1168
argenteus L. IV/3 1160
Austriacus L. IV/3 1173
Cytisus biflorus L'Hérit. IV/3 1178, 1179
Canariensis (L.) O. Kuntze IV/3 1168
capitatus Scop. IV/3 1175
Cetius Beck IV/3 1181
ciliatus Wahlenb. IV/3 1178
cinereus Host IV/3 1179
collinus Schur IV/3 1179
communis Lindem. IV/3 1177
Dalimorei hort. IV/3 1182
decumbens Rchb. IV/3 1206
decumbens Spach IV/3 1207
diffusus Vis. IV/3 1208
elongatus Waldst. et Kit. IV/3 1179
emeriflorus Rchb. IV/3 1171
falcatus Waldst. et Kit. IV/3 1178
fragrans Welden IV/3 1148
Germanicus Vis. IV/3 1210
glaber Lam. IV/3 1173
glabrescens Sartorelli IV/3 1171
hirsutus L. IV/3 1177
humifusus Nyman IV/3 1208
Kerneri Schulz, Kanitz et Knapp var. Austriacus Kanitz IV/3 1173
Kewensis hort. IV/3 1168
Laburno-purpureus Mann IV/3 1166
Laburnum L. IV/3 1162
leucanthus Waldst. et Kit. IV/3 1175
Linkii Janka IV/3 1168
Lobelii Tausch IV/3 1173
macrospermus Bess. IV/3 1179
Maderensis (Webb) Masf. IV/3 1168
multiflorus (Ait.) Sweet IV/3 1168
nigricans L. IV/3 1169
pauciflorus Beck IV/3 1174
pilosus Lam. IV/3 1177
pilosus Vis. IV/3 1203
praecox Bean IV/3 1168
procumbens Spreng. IV/3 1207
prostratus Simonk. IV/3 1207
purgans (L.) Benth. IV/3 1168
purpureus Scop. IV/3 1180
pyramidalis hort. IV/3 1168
radiatus Mert. et Koch IV/3 1193
ramentaceus Sieb. IV/3 1148
Ratisbonensis Schäffer IV/3 1178 und 1639 Fig. 1605
Ruthenicus (Fisch.) Wol. IV/3 1179
sagittalis Koch IV/3 1196
scoparius Link IV/3 1182
sericeus Vis. IV/3 1205
sessilifolius L. IV/3 1173
sessilis Mill. IV/3 1173
silvestris Vis. IV/3 1212
Cytisus spinescens Presl IV/3 1168
supinus L. IV/3 1175
supinus L. subsp. Austriacus Briq. IV/3 1173
supranubius (L. f.) O. Kuntze IV/3 1168
Tommasinii Vis. IV/3 1174
Tournefortianus Loisel. IV/3 1177
triflorus Lam. IV/3 1177
unibracteatus Lindem. IV/3 1169
versicolor hort. IV/3 1181
virescens (Kovacs) Kern. IV/3 1181
Cyttarium dioecum Peterm. VI/1 456
Czackia Liliastrum Andrz. II 200
Czekelia Transsilvanica Schur II 297
Czernya Presl VII 155

D.

Daboecia Cantabrica (Huds.) K. Koch V/3 1620
„ polifolia Don V/3 1620
Dacrydium Soland. I 78, 79; VII 150
Dacryomycetaceae VII 142
Dactylis L. I 294; VII 155
Aschersoniana Graebn. I 296; VII 155
cristata Bieb. I 286
„ glomerata L. I 294, 295
Dactylon officinale Vill. I 264
„ sanguinale Vill. I 187
Dactylopyllum Anserina Spenn. IV 889
Fragariastrum Schimp. et Spenn. IV/2 826
„ Sibbaldia Spenn. IV/2 893
Dactylotenium Aegyptiacum W. I 265
Daedalacanthus P. And. VII 205
Daema cordifolia (Retz.) K. Schum. V/3 2063
Dahlia Cav. VI/1 529; VII 211
arborea hort. VI/1 531
Barkeriae Knowl. et Westc. VI/1 531
coccinea Cav. VI/1 530
excelsa Benth. VI/1 531
glabrata Lindl. VI/1 531
imperata Roezl VI/1 531
Merckii Lehm. VI/1 531
pinnata Cav. VI/1 530
scapigera Knowl. VI/1 531
variabilis (Willd.) Desf. VI/1 530
Dais L. V/2 702
Dalbergia melanoxylon Guill. et Perr. IV/3 1496
Dalbergieae VII 183
Dalea alopecuroides Willd. IV/3 1386
„ mutabilis Willd. IV/3 1385
Dalechampia Roezliana Muell.-Aarg. V/1 125
Dalibarda ternata Stephan IV/2 928

Damasonium stellatum Pers. I 150
Dammara Lambert VII 150
Danaa All. V/2 1080
aquilegiifolia All. V/2 1081
Cornubiensis (L.) Burn. V/2 1081
verticillata (Waldst. et Kit.) Janchen V/2 1081
Danaë Med. VII 162
Danaea Nym. V/2 1080
Danthonia Lam. et DC. I 263; VII 154
alpina Vest I 263
calycina (Vill.) Rchb. I 263
decumbens Lam. et DC. I 275
provincialis Lam. et DC. I 263
„ strigosa P. B. I 253
Daphne L. V/2 703; VII Fig. 982
albiflora Wolf V/2 710
alpina Baumg. V/2 722
alpina L. V/2 713
arbuscula Čelak. V/2 722
Blagayana Freyer V/2 722
cannabina Wall. V/2 705
Caucasica Pall. V/2 705, 714
Cneorum L. V/2 716
Cneorum Wahlenb. V/2 719
collina Sm. V/2 705
Genkwa Sieb. et Zucc. V/2 705
Gnidium L. V/2 703, 704
Laureola L. V/2 706
Lerchenfeldiana Schur V/2 722
Mezereum L. V/2 708
odorata Don V/2 705
odorata Lam. V/2 716
odorata Thunb. V/2 705
oleoides Schreb. V/2 705
papyracea Sieb. V/2 701
papyrifera Ham. V/2 705
pendula Sm. V/2 705
petraea Leyb. V/2 721
Pontica L. V/2 705
Pseudomezereum Gray V/2 705
rupestris Facchini V/2 721
sericea Vahl V/2 705
striata Trattinik V/2 719
Thauma R. Farrer V/2 725
„ Wallichii Meisn. V/2 705
Daphniphyllum Blume VII 185
Darlingtonia Californica Torrey IV/2 510
Dasiphora fruticosa Rydberg IV/2 816
„ riparia Raf. IV/2 816
Dasycladaceae VII 138
Dasylirion acrotrichum Zucc. II 279
Dasyloma DC. V/2 1249
Dasyspermum Neck. V/2 1014, 1048
Dasystephana asclepiadea Borkh. V/3 1998
Datisca cannabina L. V/1 663
Datiscaceae V/1 663; VII 190
Datiscineae VII 190
Datura L. V/4 2612; VII 203
arborea L. V/4 2612
Datura Bertolonii Parl. V/4 2614
ferox L. V/4 2613
inermis Jac. V/4 2613
laevis L. V/4 2613
Metel L. V/4 2613
sanguinea Ruiz et Pav. V/4 2612
Stramonium L. V/4 2613
suaveolens Humb. et Bonpl. V/4 2612
„ Tatula L. V/4 2612
Daucaceae Alef. V/2 926; VII 193
Daucalis Pomel V/2 1048
„ leptophylla Pomel V/2 1050
Dauceae VII 195
Daucus L. V/2 1501; VII 195
Abyssinicus C. A. Meyer V/2 1516
Abyssinicus Hochst. V/2 1503
Abyssinicus Prantl V/2 1514
Allionii Link V/2 1514
aureus Desf. V/2 1505
bicolor Sibth. et Sm. V/2 1504
Bocconei Guss. V/2 1520
brachiatus Sieb. V/2 1503
Broteri Ten. V/2 1504
carnosus Moench V/2 1514
Carota L. V/2 1508, 1514; VII 126
Carota β maior Vis. V/2 1515
Carota γ commutatus Paoletti V/2 1519
Carota L. subsp. Fontanesii Thellung V/2 1520
caucalis E. H. L. Krause V/2 1062
communis Rouy et Camus V/2 1508
Copticus Lam. V/2 1167
Daucorlaya Drude V/2 1068
dentatus Bertol. V/2 1521
Durieua Lange V/2 1503
exiguus Pers. V/2 1514
Gingidium auct. V/2 946
Gingidium L. V/2 1508
Gingidium Loisel. V/2 1520
glaber Opiz V/2 1514
glochidiatus (Labill.) Fisch., Mey. et Lallemant V/2 1503
grandiflorus Desf. V/2 1519
grandiflorus Scop. V/2 1069
gummifer All. V/2 1519
gummifer Lam. V/2 1520
guttatus Sibth. et Sm. V/2 1504
Hispanicus Gouan V/2 1519
Hispanicus L. V/2 1503
hispidus A. Callier V/2 1475
hispidus Gilib. V/2 1514
hispidus Mill. V/2 1520
infestus E. H. L. Krause V/2 1056
Lappula Weber V/2 1062
latifolius Baill. V/2 1064
lucidus L. V/2 1522
maior Pospichal V/2 1515
Daucus maritimus Lam. V/2 1513
maritimus With. V/2 1520
Mauritanicus All. V/2 1514
Mauritanicus L. V/2 1503, 1518
Mauritanicus Willd. V/2 1514
maximus Desf. V/2 1518
maximus Tommasini V/2 1515
Michelii Caruel V/2 1504
microcarpus E. H. L. Krause V/2 1053
microphyllus Presl V/2 1504
montanus Humb. et Bonpl. V/2 1503
Montevidensis Link V/2 1504
muricatus L. V/2 1505
neglectus E. H. L. Krause V/2 1055
nodosus E. H. L. Krause V/2 1057
Orientalis Aschers. V/2 1060
platycarpos Čelak. V/2 1068
platycarpos Scop. V/2 1062
pulcherrimus Koch V/2 1060
pusillus Michx. V/2 1504
pusillus Urban V/2 1504
setulosus Guss. V/2 1504
toriloides DC. V/2 1503
Turgenia E. H. L. Krause V/2 1064
Visnaga L. V/2 1170
„ vulgaris Necker V/2 1514
Davallia Sm. VII 149
Davidia Baill. V/2 770; VII 192
Deeringia Canadensis O. Kuntze V/2 1169
Deguelia Aubl. VII 183
Deilosma matronalis Beck IV/1 466
„ tristis Spach IV/1 465
Delesseriaceae VII 139
Delia Dum. III 424; VII 173
„ segetalis Dum. III 425
Delphinium L. III 485; VII 174
Ajacis L. III 488
ambiguum Mill. III 489
azureum Michx. III 486
cardiopetalum DC. III 486
Clusianum Host III 490
Consolida L. III 487
cultorum Voss III 486
Davuricum Georgi III 489
diffusum Stokes III 487
elatum L. III 490
fissum Waldst. et Kit. III 489
grandiflorum L. III 486
hybridum hort. III 486
intermedium Soland. III 490
intermedium Vest III 491
leiocarpum Huth III 490
monophyllum Gilib. III 487
montanum DC. III 491
nudicaule Torr. III 486
Orientale Gay. III 486
oxysepalum Pax et Borb. III 491

Delphinium paniculatum Host III 486
Ponticum Hausskn. et Bornm. III 489
segetum Lam. III 487
simplex Salisb. III 488
Staphysagria L. III 486
Tauricum Pall. III 489
Tiroliense A. Kern. III 491
triste Fisch. III 486
triste A. Kern. III 491
urceolatum Jacq. III 490
„ versicolor Salisb. III 487
Deltocarpus L'Hérit. IV/1 186
Dendromicon Benth. VII 176
Dendrosicyos Balf. VII 208
Dentaria L. IV/1 321; VII 177
angustifolia Ten. IV/1 328
bulbifera L. IV/1 325
Clusiana Rchb. IV/1 329
digenea Gremli IV/1 333
digitata Lam. IV/1 329
enneaphylla L. IV/1 330
glandulosa Waldst. et Kit. IV/1 332
hybrida Arvet-Touvet IV/1 333
intermedia Merklein IV/1 333
intermedia Sonder IV/1 329
Killiasii Brügg. IV/1 333
ochroleuca Gaud. IV/1 327
pentaphyllos L. IV/1 238
pinnata Lam. IV/1 328
polyphylla Waldst. et Kit. IV/1 327
Rapini Rouy et Foucaud IV/1 333
„ trifolia Waldst. et Kit. IV/1 324
Dentidia Nankinensis Lour. V/4 2272
Derbesiaceae VII 138
Dermasea nivalis Haw. IV/2 623
Dermateaceae VII 144
Derris Lour. VII 183
Deschampsia Pal. I 243; VII 154
caespitosa (L.) Pal. I 243
discolor Roem. et Schult. I 246
flexuosa (L.) Trin. I 245
media Roem. et Schult. VII 154
paludosa Richt. I 245
setacea Richt. I 246
Thuillieri Gren. et Godr. I 246
„ Wibeliana Parl. I 245
Descurainia appendiculata (Griseb.) O. E. Schulz VII 177
Irio Webb IV/1 169
pinnatifida Webb IV/1 157
Richardsonii O. E. Schulz VII 177
Sophia Webb IV/1 160
„ tanacetifolia Prantl IV/1 159
Desfontainea spinosa Ruiz et Pavon V/3 1952
Desfontaineaceae VII 197
Desmidiaceae VII 137
Desmodium Desv. VII 183
Canadense (L.) DC. IV/3 1462
gyrans DC. IV/3 1462
penduliflorum Oudem. IV/3 1463
tiliaefolium Don IV/3 1463
„ triquetrum (L.) DC. IV/3 1462
Deutzia crenata Sieb. et Zucc. IV/2 565
gracilis Sieb. et Zucc. IV/2 565
Lemoinei Lem. IV/2 565
scabra Thunb. IV/2 565
Sieboldiana Maxim. IV/2 565
Devillea Bub. V/2 1314
„ Pyrenaea Bub. V/2 1318
Deyeuxia silvatica Kunth I 235
„ varia Kunth I 235
Diandrae VII 169
Dianthus L. III 318; VII 173
acuminatus Tausch III 337
alpinus L. III 332
ambiguus Salisb. III 337
arenarius L. III 341
Armeria L. III 320
asper Willd. III 327
atrorubens auct. III 325
atrorubens Paulin III 325
Balbisii Bartling III 326
barbatus L. III 321
Borussicus Vierhapper III 341
caesius Sm. III 335
caespitosus Poiret III 335
callizonoides Sünderm. III 343
Carthusianorum L. III 323
Caryophyllus III 319
Chinensis L. III 319
collinus Gaud. III 327
Courtoisii Rchb. III 343
crenatus Gilib. III 328
Cyri Fisch. et Mey. III 319
deltoides L. III 328
Domini Hegi III 343
Dufftii Hausskn. III 343
fallax Kern. III 343
Fritschii L. Keller III 343
Gizellae Borb. III 343
glacialis Haenke III 333
glaucus Huds. III 335
gratianopolitanus Vill. III 335
Gremblichii Aschers. III 343
Hellwigii Borb. III 343
hirsutus Lam. III 320
Huebneri Seehaus III 343
Hungaricus Pers. III 340
hyssopifolius L. III 337
Jaczonis Aschers. III 343
inodorus Wulf. III 330; VII 119 Fig. 1155
Krasanii Kern. III 343
Laucheanus Bolle III 343
Leitgebii Reichardt III 343
Liburnicus Bartling III 326
Lucae Aschers. III 343
Lumnitzeri Wiesbauer III 340
Dianthus Mammingiorum Murr III 343
microlepis Boiss. III 319
Monspellanus L. III 337
moschatus Mayer III 338
Mukii Reichardt III 343
neglectus Loisel. III 334
Oenipontanus Kern. III 343
oreades Ball. III 338
paradoxus Rob. Keller III 343
plumarius Borb. III 340
plumarius L. III 338
Pontederae Kern. III 325
Preismanni Hayek III 343
prolifer L. III 315
pulcherrimus Loisel. III 321
Reuteri Jord. III 330
sabuletorum Heuffel III 325
sanguineus Vis. III 326
saxifragus L. III 316
scaber Schleich. III 327
Seehausianus Aschers. III 343
Seguierii Vill. III 327
serrotinus Waldst. et Kit. III 340
silvester Wulf. III 330; VII 119 Fig. 1155
speciosus Rchb. III 342
spurius Kern. III 343
Sternbergii Sieb. III 338
suavis Willd. III 335
suffruticosus Willd. III 319
superbus L. III 342
supinus Lam. III 328
Tergestinus (Rchb.) Kern. III 329
uniflorus Gilib. III 341
vaginatus Chaix III 325
varians Rouy et Fouc. III 343
villosus Gilib. III 320
virgineus Jacq. III 329
Waldsteinii Sternb. III 338
Wolfii Vetter III 343
Wulfenii Dietr. III 330
Zschackeanus Aschers. et Graebn. III 343
Diapensia Helvetica L. V/3 1795
„ Lapponica L. V/3 1713
Diapensiaceae V/3 1713; VII 195
Diapensiales VII 195
Diaphycarpus incrassatus Calestani V/2 1190
Diaphyllum longifolium Hoffm. V/2 1108
Diarrhena Americana Pal. I 372
Diatomaceae VII 137
Diatropa Dumort. V/2 1094
„ rotundifolia Dumort. V/2 1106
Diatrypaceae VII 141
Dicentra formosa (Andr.) DC. IV/1 20
„ spectabilis (L.) DC. IV/1 20
Dichapetalaceae V/1 113; VII 185
Dichapetalineae VII 185

Dichelachne Endl. VII 154
Dichodon anomalum Rchb. III 362
„ cerastoides Rchb. III 362
Dichostylis Michelianus Nees II 12
Dichotophyllum demersum Moench III 450
Dichroa febrifuga Lour. IV/2 566
Dicksoniaceae VII 148
Diclidantheraceae VII 197
Diclytra IV/1 20
Dicotyledones III 5; VII 165
Dicranaceae VII 145
Dicranostigma leptopodum (Maxim.) Fedde IV/1 20
Dictamnus L. V/1 74; VII 184
alba L. V/1 74
„ Fraxinella Pers. V/1 74
Dictyolomoideae VII 184
Dictyosteliaceae VII 136
Dictyotales VII 139
Dicypellium Nees VII 176
Didesmus Desv. IV/1 286
Didiereaceae VII 187
Didiscus DC. V/2 956
caeruleus (Graham) DC. V/2 956
„ cyaneus DC. V/2 956
Didymiaceae VII 136
Didymocarpus Wall. VII 205
Didymopelta Turkestanica Regel et Schmalh. IV/3 1400
Dieryilla L. VII 207; VII 44 Fig. 1d75
Canadensis Willd. VI/1 235
florida Sieb. et Zucc. VI/1 235
rosea Walpers VI/1 235
„ trifida Moench VI/1 235
Digera alternifolia (L.) Aschers. III 261
Digitalis L. VI/1 66; VII 204
ambigua Murray VI/1 66, 68
aurea Lindl. VI/1 66
ferruginea L. VI/1 66; VI/2 1362
grandiflora Jacq. VI/1 68
lanata Ehrh. VI/1 66
levigata Waldst. et Kit. VI/1 69
lutea L. VI/1 69
media Roth VI/1 70
ochroleuca Lam. VI/1 68
purpurascens Roth VI/1 70
purpurea L. VI/1 66; VI/2 1362; VII 91 Fig. 1121
Digitaria filiformis Koeler I 188
humifusa Rich. I 188
sanguinalis Scop. I 187
„ stolonifera Schrad. I 264
Digraphis arundinacea Trin. I 196
Dileptium Virginicum Rafin. IV/1 85
Dillenia Indica L. V/1 494
Dilleniaceae V/1 493; VII 188
Dimorphandra Schott IV/3 1129
Dimorphanthus elatus Miq. V/2 913
Dimorphotheca aurantiaca DC. VI/2 806
Dimorphotheca fruticosa Less. VI/2 806
„ pluvialis (L.) Moench VI/2 806
Dinoflagellatae VII 137
Dionaea muscipula Ellis IV/2 498; I/CVII Fig. 175 d
Dionysia Fenzl V/3 1728, 1790
Dioon Lindl. I 73; VII 150
Dioscorea alata L. II 281
Balcanica Košanin VII 163
batatas Decaisne II 280
elephantipes Graebn. II 281
„ Pyrenaica Bub. II 280
Dioscoreaceae II 280; VII 163
Diosma vulgaris Schlechtend. V/1 50
Diospyrales V/3 1895; VII 197
Diospyros Dalech. V/3 1898
Ebenum König V/3 1898
Kaki L. V/3 1898
Lotus L. V/3 1898
Melanoxylon Roxb. V/3 1898
mespiliformis Hochst. V/3 1898
Philippinensis (Desr.) Gürke V/3 1898
„ Virginiana L. V/3 1898
Diotis atriplicina Spreng. III 235
„ atriplicoides Bieb. III 235
Dipcadi serotinum Medic. II 279
Dipelta Maxim. VII 207
Diphylleia Michx. VII 175
Diphysciaceae VII 146
Diplachne Pal. I 278; VII 155
„ serotina (L.) Link I 278
Dipladenia acuminata Hook. V/3 2051
Diplarche Hook. et Th. V/3 1647
Diplocyathium Schmidt V/1 141
Diploknema sebifera Pierr. V/3 1896
Diplopappus albus Hook. VI/1 420
annuus Bluff et Fingerh. VI 1 447
asperrimus DC. VI/1 417
„ dubius Cass. VI/1 447
Diplostephium umbellatum Cass. VI/1 420
Diplotaxis DC. IV/1 208; VII 177
auriculata Durieu IV/1 209
brevicaulis Bluff et Fingerh. IV/1 209
erucoides (L.) DC. IV/1 217
muralis (L.) DC. IV/1 211
tenuifolia (L.) DC. IV/1 214
tenuisiliqua Delile IV/1 209
viminea (L.) DC. IV/1 209
virgata (Cav.) DC. IV/1 208
„ Wirtgeni Hausskn. IV/1 216
Dipsacaceae VI/1 279; VII 208
Dipsacus L. VI/1 281; VII 208
fullonum L. VI/1 281, 283
laciniatus L. VI/1 284
pilosus L. VI/1 285
sativus (L.) Honckeny VI 1 283
„ silvester Huds. VI/1 281
Dipterocarpaceae V/1 533; VII 189
Dipterocarpus Gaertn. V/1 534
Dipteryx odorata Willd. IV/3 1497
Dirca palustris L. V/2 702
Discaria febrifuga Mart. V/1 322
Dischidia R. Br. V/3 2059
Discocactus V/2 696
Diselma J. D. Hooker VII 151
Diserneston gummiferum Jaub. et Spach V/2 945
Dispermotheca viscosa Beauverd VI/1 101
Dissotis Benth. VII 192
Distimus flavescens Raf. II 11
Distomatales VII 136
Dobinea Ham. V/1 218
Dobineae VII 186
Dodecatheon L. V/3 1732
Clevelandii Greene V/3 1732
frigidum Cham. et Schlech. V/3 1732
Hendersonii A. Gray V/3 1732
integrifolium Michx. V/3 1732
Jeffreyi L. V/3 1732
Meadia L. V/3 1732
„ pauciflorum Greene V/3 1732
Dodonaea L. VII 187
Doellingeria ptarmicoides Nees VI/1 420
„ umbellata Nees VI/1 420
Dolia Lindl. VII 203
Dolichos biflorus L. IV/3 1624
Lablab L. IV/3 1624
max L. IV/3 1620
polystachyos Thunb. IV/3 1387
Sinensis L. IV/3 1623
„ Soja Jacq. IV/3 1620, 1621
Dollinaria ciliata Sauter IV/1 410
Dombeya Cav. VII 188
Donatia VI/2 1359
Donax Pal. VII 155
arundinaceus Pal. I 270
borealis Trin. I 317
Donax Aschers. et Graebn. 270
festucacea Pal. I 317
Dondia Spreng. V/2 959
Epipactis Spr. V/2 959
maritima Druce III 257
Dondisia Scop. IV/1 272
„ Epipactis Rchb. V/2 959
Donia digyna R. Br. III 188
punicea G. et D. Don IV/3 1456
speciosa G. et D. Don IV/3 1456
Dorema Ammoniacum D. Don V/2 945
Aucheri Boiss. V/2 945
aureum Stocks V/2 945
„ hirsutum Loftus V/2 945
Doronicum L. VI/2 710; VII 212
Austriacum Jacq. VI/2 712
Bellidiastrum L. VI/1 425

Doronicum calcareum Vierh. VI/2 723
cataractarum Widder VI/2 715
Caucasicum Bieb. VI/2 711
Caucasicum Roch. VI/2 714
Clusii (All.) Tausch VI/2 724
Columnae Ten. VI/2 714
cordatum Lam. VI/2 718
cordatum (Wulf.) Schultz-Bip. VI/2 714
cordifolium Sternb. VI/2 714
glaciale (Wulf.) Nym. VI/2 722
grandiflorum Lam. VI/2 720, 1354
Halleri Tausch VI/2 720
Helveticum Mill. VI/2 751
Jacquini Tausch VI/2 720
macrophyllum Bernh. VI/2 718
Matthioli Tausch VI/2 718
Orientale Hoffm. VI/2 711
orientale Rchb. VI/2 714
Pardalianches L. VI/2 718
plantagifolium Stokes VI/2 711
plantagineum L. VI/2 711
procurrens Dum. VI/2 718
Romanum Gars. VI/2 718
scorpioides Willd. VI/2 711
scorpioides Willk. et Lange VI/2 720
scorpioides Wimm. et Grab. VI/2 712
Stiriacum Dalla Torre VI/2 724
Dorstenia L. III 124; VII 168
„ Contrajerva L. III 124
Doryanthes Correa II 320
Dorycnium Mill. IV/3 1376; VII 182
Bicknellianum Berger et Dinter IV/3 1382
diffusum Janka IV/3 1381
fruticosum Reching. IV/3 1381
Germanicum Rouy IV/3 1380
Hercegovinum v. Degen IV/3 1380
hirsutum (L.) Ser. IV/3 1378
intermedium Ledeb. IV/3 1381
pentaphyllum Scop. IV/3 1379
Sabaudum Rchb. IV/3 1381
„ suffruticosum auct. IV/3 1380
Doryophora Sassafras Endl. VII 176
Dothideales VII 141
Douglasia Lindl. V/3 1787
„ Vitaliana (L.) Pax V/3 1787
Draba L. IV/1 372; VII 178
affinis Host IV/1 378
aizoidea St. Lager IV/1 377
aizoides L. IV/1 377
aizoides L. var. montana Koch IV/1 378
aizoon Wahlenb. IV/1 375
androsacea Baumg. IV/1 383
androsacea Wahlenb. IV/1 380
aspera Bertol. IV/1 379
Austriaca Crantz IV/1 381
Draba Beckeri Hayek IV/1 378
Bertolonii Nym. IV/1 379
Carinthiaca Hoppe IV/1 384
cheiranthifolia Lam. IV/1 458
cheiriformis Lam. IV/1 458
ciliaris Host IV/1 410
ciliata Scop. IV/1 410
clypeata Bergeret IV/1 456
confusa Ehrh. IV/1 385
contorta Ehrh. IV/1 385
cuspidata Gren. et Godr. IV/1 379
dubia Suter IV/1 383
elongata Host IV/1 378
ficta Camus IV/1 391
Fladnizensis Wulf. IV/1 380
flavicans Murr IV/1 392
frigida Sauter IV/1 383
glacialis Hoppe et Koch IV/1 376
greggioides Griseb. IV/1 374
Helvetica Schleich. IV/1 380
hirsuta Crantz IV/1 381
hirta All. IV/1 384
hirta Jacq. IV/1 381
Hoppeana Rchb. IV/1 376
Hoppei Trachsel IV/1 392
incana L. IV/1 385
intermedia Hegetschw. IV/1 392
Johannis Host IV/1 384
Kerneri Huter IV/1 391
Kotschyi Stur IV/1 383
Ladina Br.-Bl. VII 178
Lapponica Willd. IV/1 381
lasiocarpa Rochel IV/2 375
Lemaniana Briq. IV/1 391
levigata Hoppe IV/1 381
mollis Scop. IV/1 408
muralis L. IV/1 386
nemoralis Ehrh. IV/1 388
nemorosa All. IV/1 388
nemorosa L. IV/1 388
nivalis DC. IV/1 384
nivalis Rchb. IV/1 391
Pyrenaica L. IV/1 115
rubra Crantz IV/1 115
Sauteri Hoppe IV/1 375
saxatilis Koch IV/1 381
Schiewereckia Janka IV/1 374
sclerophylla Gaud. IV/1 381
setulosa Leresche IV/1 392
spathulata Bergeret IV/1 451
stellata Jacq. IV/1 381
stellata Koch IV/1 383
Sturii Strobl IV/1 391
Subularia Lam. III 170
Thomasii Koch IV/1 386
tomentosa Wahlenb. IV/1 382
Trachselii Dalla Torre IV/1 392
Traunsteineri Hoppe IV/1 391
Uralensis Willd. IV/1 374
verna L. IV/1 388
Wahlenbergii Hartm. IV/1 380
Draba Wiemanni Handel-Mazzetti O. E. Schulz VII 178
„ Zahlbruckneri Host IV/1 376
Dracaena Draco L. II 279
„ fragrans Ker-Gawler II 279
Dracaenoideae II 279; VII 162
Dracocephalum L. V/4 2360; VII 201
Altaiense Laxm. V/4 2362
Argunense Fisch. V/4 2365
aristatum Bert. V/4 2362
Austriacum L. V/4 2365
bipinnatum Rupr. V/4 2362
canescens L. V/4 2362
grandiflorum auct. non L. V/4 2362
hyssopifolium Mart. V/4 2363
Ibericum Bieb. V/4 2362
intermedium Nutt. V/4 2472
lancifolium Moench V/4 2472
Mexicanum Kunth V/4 2368
Moldavica L. V/4 2361
nutans Friren V/4 2361
nutans L. V/4 2361
ocymifolium Mill. V/4 2362
parviflorum Nutt. V/4 2361
peltatum L. V/4 2362
Ruprechtii Regel V/4 2362
Ruyschiana L. V/4 2363
Sibiricum L. V/4 2368
speciosum Benth. V/4 2362
thymiflorum L. V/4 2361
variegatum Vent. V/4 2472
„ Virginianum L. V/4 2472
Dracontomelon Bl. VII 186
Dracopsis amplexicaulis Cass. VI/1 504
Dracunculus Miller II 134; VII 157
Dracunculus Voss II 134
„ polyphyllos Blume II 134
Drapetes Banks V/2 702
Drepanophyllum Hoffm. V/2 1216
Drepanophyllum Wibel V/2 1176
Drimys Winteri Forst. IV/1 13, 14
Drosera L. IV/2 498; VII 179
Aldrovanda F. v. Muell. IV/2 506
Americana Willd. IV/2 505
Anglica Huds. IV/2 504
Beleziana Camus IV/2 506
binata Labill. IV/2 499
Capensis L. IV/2 499
foliosa Elliot IV/2 505
intermedia Hayne IV/2 505
intermedia Soyer-Willemet et Hayne IV/2 506
longifolia L. IV/2 504, 505
Lusitanica L. IV/2 498
neglecta Lehm. IV/2 506
obovata Mert. et Koch IV/2 506
pygmaea DC. IV/2 499
rotundifolia L. IV/2 502
septentrionalis Stokes IV/2 502
sessiliflora Raf. IV/2 498

Drosera spathulata Labill. IV/2 499
„ uniflora Raf. IV/2 498
Droseraceae IV/2 497; VII 179
Drosophyllum Lusitanicum (L.) Link IV/2 498; VII 179
Drupaceae IV/2 667, 1053; VII 181
Druparia Clairv. IV/2 1053
Amygdalus Clairv. IV/2 1086
Cerasus Clairv. IV/2 1074
insititia Clairv. IV/2 1106
Padus Clairv. IV/2 1064
Prunus Clairv. IV/2 1106
„ spinosa Clairv. IV/2 1101
Dryandra R. Br. VII 169
Dryas L. IV/2 922; VII 181
DrummondiiRichards. IV/2 922
„ octopetala L. IV/2 922
Dryobalanops aromatica Gaertn. V/1 534
„ Camphora Colebrooke V/1 534
Drypis L. III 308; VII 173
„ spinosa L. III 308
Duboisia R. Br. V/4 2558
Hopwoodii F. v. Muell. V/4 2558
„ myoporides R. Br. V/4 2558
Duchesnea Sm. IV/2 907; VII 180
chrysantha Miq. IV/2 907
Filipendula (Hemsl.) IV/2 907
fragarioides Sm. IV/2 907
fragiformis Don IV/2 907
Indica (Andrew) Focke IV/2 907
Dulcamara flexuosa Moench V/4 2589
Dulichium spathaceum Pers. II 9; VII 155
Durandea Delarbre IV/1 272
Duranta L. V/3 2236
Duriaea Lindl. V/2 1501
Durieua Boiss. et Reut. V/2 1501
Hispanica Boiss. et Reut. V/2 1503
Durio Rumph zibethinus L. V/1 489
Duschekia ovata Opiz III 87

E.

Eatonia obtusata (Michx.) A. Gray VII 155
Ebenaceae V/3 1897; VII 197
Ebenales V/3 1895; VII 197
Ebenus Cretica L. IV/3 1462
Ebulum humile Garcke VI/1 236
Ecballium Elaterium (L.) A. Rich. VI/1 313, 316
Eccremocarpus scaber Ruiz et Pav. VI/1 176
Echeveria gibbiflora DC. IV/2 514
retusa Lindl. IV/2 513
„ secunda Lindl. IV/2 513
Echidnopsis cereiformis Hook. f. V/3 2067
Echinacea purpurea Moench VI/1 504
Echinanthriscus vulgaris Lantzius-Beninga V/2 1030
Echinocactus Williamsii Lem. V/2 684
Echinocereus Eng. V/2 693
Echinochloa Crus galli Roem. et Schult. I 189
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray VI/2 1364; VII 208
Echinodorus Rich. I 154; VII 152
natans Engelm. I 153
parnassifolius Engelm. I 153
„ ranunculoides (L.) Engelm. I 155
Echinopanax horridus (Sm.) Decne. et Planch. V/2 911
Echinophora maritima Gouan V/2 992
„ spinosa L. V/2 992
Echinophoreae V/2 950; VII 193
Echinopogon ovatum (Forst.) Pal. VII 154
Echinops L. VI/2 807; VII 212
albidus Boiss. et Sprun. VI/2 807
Banaticus Rochel VI/2 807
commutatus Juratzka VI/2 810
exaltatus Rchb. et auct. VI/2 810
globifer Janka VI/2 810
microcephalus L. VI/2 807
mollis Schur VI/2 810
multiflorus Lam. VI/2 808
niveus Wallr. VI/2 807
Persicus Fisch. VI/2 807
Ritro L. VI/2 807
Ruthenicus Bieb. VI/2 811
sphaerocephalus L. VI/2 808
sphaerocephalus Maly VI/2 810
spinosus L. VI/2 807
„ viscosus L. VI/2 807
Echinopsilon Moqu. III 248; VII 171
crassifolium Moqu. III 248
hirsutum (nicht hirsutus) Moqu. III 248
Echinopsis Zucc. V/2 693
Echinospermum Swartz V/3 2138; VII 200
deflexum Lehm. V/3 2140
Lappula Lehm. V/3 2139
patulum Lehm. V/3 2138
patulum Schleich. V/3 2140
squarrosum Rchb. V/3 2140
„ vulgare Swartz V/3 2139
Echioides grandiflora Steven V/3 2205
„ palustris Moench V/3 2161
Echites peltata Vell. V/3 2051
Echitoideae VII 199
Echium L. V/3 2192; VII 200
altissimum Jacq. V/3 2197
asperrimum Lam. V/3 2197
candicans DC. V/3 2193
cynoglossoides Desf. V/3 2193
distachyum Viv. V/3 2193
fastuosum Jacq. V/3 2193
giganteum L. V/3 2193
Italicum L. V/3 2197
Echium nervosum Ait. V/3 2193
plantagineum L. V/3 2192
prostratum Oel. V/3 2193
pyramidale Lapeyr. V/3 2197
pyramidatum DC. V/3 2197
rubrum Forsk. V/3 2193
rubrum Jacq. V/3 2196
sericeum Vahl V/3 2193
simplex Jacq. V/3 2193
strictum L. V/3 2193
violaceum Mert. et Koch V/3 2192
vulgare L. V/3 2193
„ Wildprettii Pearson V/3 2193
Ectocarpales VII 138
Ecuraria (L.) Halácsy VII 177
Edgeworthia Meisn. V/2 701
Edosmia Nutt. V/2 1181
Edraianthus A. DC. VI/1 389; VII 208
caricinus Schott, Nym. et Kotschy VI/1 389
graminifolius (L.) DC. VI/1 389
Kitaibelii DC. VI/1 389
pumilio DC. VI/1 389
„ tenuifolius DC. VI/1 389
Ehretia L. V/3 2124
Ehretioideae V/3 2124; VII 200
Eichhornia crassipes Schlecht. II 143; I/XCIII, Fig. 137
Elaeagnaceae V/2 724, 727; VII 191
Elaeagnus angustifolia L. V/2 730
argentea Nutt. V/2 729
argentea Pursh V/2 730
crispa Dipp. V/2 731
ferruginea Dipp. V/2 731
hortensis Bieb. V/2 730
longipes Gray V/2 731
multiflora Thunb. V/2 731
pungens Thunb. V/2 731
„ umbellata Thunb. V/2 731
Elaeocarpaceae V/1 426; VII 188
Elaeocarpis cyanea Sims V/1 426
Elaeoselinum Asclepium (L.) Bertol. V/2 1492
Elaphoboscum Rupr. V/2 1404
Elaphomycetaceae VII 140
Elaterium Jacq. VII 208
Elatinaceae V/1 535
Elatine L. V/1 535; VII 189
Alsinastrum L. V/1 536
ambigua Wight V/1 539
campylosperma Seubert V/1 543
hexandra (Lapierre) DC. V/1 540
Hungarica Moesz V/1 543
Hydropiper L. V/1 538, 540, 541
Oederi Moesz V/1 541
orthosperma Düben V/1 543
paludosa Seubert V/1 540
paludosa Seubert var. octandra Gren. et Godr. V/1 541
Schkuhriana Hayne V/1 541
triandra Schkuhr V/1 538

Elatine verticillata Lam. V/1 536
Elatinoides Wettst. VI/1 28; VII 204
Elatine Wettst. VI/1 28
„ spuria Wettst. VI/1 28
Elatostema sessile Forst. III 137
Elegia L. VII 158
Eleocharis R. Br. II 37; VII 156
Elephantopus scaber L. VI/1 408
Elettaria Cardamomum White et Maton II 321
Eleusine Coracana Gaertn. I 265
„ tristachya Kunth I 265
Eleutherococcus Henryi Oliv. V/2 913
senticosus Maxim. V/2 913
„ Simonii C. K. Schneid. V/2 913
Eleutheropetalae VII 165
Eleutherospermum C. Koch V/2 1089
Elisanthe noctiflora Döll III 302
Elisma Buchenau I 153; VII 153
„ natans Buchenau I 153
Elodea Michx. I 160; VII 153 u. 6 Fig. 977
Elsholtzia Willd. V/4 2272; VII 201
Californica hort. V/4 2273
eriostachya Benth. V/4 2273
„ Patrini Garcke V/4 2273
Elsneria Walp. V/2 956
Elymus L. I 400; VII 155
arenarius L. I 401
Canadensis L. I 400
caninus L. I 382
caput Medusae L. I 400
„ Europaeus L. I 401
Elyna Schrad. II 49; VII 156
Bellardii (All.) K. Koch II 49
caricina Mert. et Koch II 50
myosuroides (Vill.) Fritsch II 49
scirpina Pax II 49
spicata Schrad. II 49
„ stricta Hoppe II 49
Embelia micrantha DC. V/3 1714
„ Ribes Burm. V/3 1714
Embryophyta asiphonogama VII 144
siphonogama VII 150
„ zoidiogama VII 144
Emex centropodium Meissn. III 166; VII 170
Emilia flammea Cass. VI/2 728
purpurea Cass. VI/2 728
sagittata DC. VI/2 728
„ sonchifolia DC. VI/2 728
Empetraceae V/1 202, 213; V/3 1602, 1611; VII 196
Empetrum L. V/3 1602; VII 196
nigrum L. V/3 1603; VII 43 Fig. 1072
„ rubrum Willd. V/3 1603
Empleurum ensatum (Thunb.) Eckl. et Zeyh. V/1 50
Enalus L. C. Rich. I 159
Enantioblastae VII 158
Enantiosparton radiatum C. Koch IV/3 1193
Encalypta Schreb. VII 145
Encephalartos Lehmann VII 150
Endiusa hirsuta Alef. IV/3 1515
Endomycetales VII 140
Endophyllum Sempervivi (Alb. et Schwein.) DeBary IV/2 546, 551
Endoprothalliatae VII 150
Endymion non scriptum Garcke II 249 312 = Scilla non scripta
= „ nutans Dum. II 249 312
Engelhardtia Leschen. III 7; VII 167
Engelmannia migrans Pfeiff. V/3 2106
Enkianthus campanulatus (Miq.) Nichols. V/3 1621
cernuus (Miq.) Mak. V/3 1621
Meisteria Max. V/3 1621
„ subsessilis (Miq.) Mak. V/3 1621
Enodium caeruleum Gaud. I 276
Entada scandens Adans. IV/3 1127
Entelea arborescens R. Br. V/1 428
Entodontaceae VII 146
Entomophthoraceae VII 140
Enymonospermum Spreng. V/2 1089
Epacridaceae V/3 1712; VII 196
Epacris Cav. VII 196
Epacris impressa Labill. V/3 1713
longiflora Cav. V/3 1713
„ obtusifolia Sm. V/3 1713
Ephebaceae VII 144
Ephedra L. I 75
distachya L. I 75; VII 151
Helvetica C. A. Meyer I 76; VII 104 Fig. 104
„ vulgaris Rich. I 75
Ephemeraceae VII 158
Ephemerum nemorosum Schur V/3 1854
„ nummularia Schur V/3 1852
Epigaea Asiatica Maxim. V/3 1610
„ repens L. V/3 1610, 1622
Epilinella Cuscutoides Pfeiff. V/3 2102
Epilobium L. V/2 806; VII 192
abortivum Hausskn. V/2 856
acidulum Borb. V/2 855
adenocaulon Hausskn. V/2 807
adnatum Griseb. V/2 842
Aernatum Čelak. V/2 855
aggregatum Čelak. V/2 856
alatum Hegetschw. V/2 850
alpestre (Jacq.) Krocker V/2 837, 856
alpestre Schmidt V/2 850
alpicolum Brügg. V/2 855
alpicolum Rouy et Cam. V/2 855
alpinum L. V/2 848
alpinum Willd. V/2 847
alsinifolium Vill. V/2 850
ambigens Hausskn. V/2 856
amphibolum Hausskn. V/2 855
amplexicaule Lam. V/2 823
anagallidifolium Lam. V/2 848
anceps Fries V/2 855
angustifolium L. V/2 814
Epilobium angustissimum Rchb. V/2 821
aquaticum Thuill. V/2 823
attennatum Schur V/2 855
Beckhausii Hausskn. V/2 856
Boissieri Hausskn. V/2 854
Borbasianum Hausskn. V/2 855
Bordereanum Hausskn. V/2 854
boreale Hausskn. V/2 807
brachiatum Čelak. V/2 855
brevipilum Hausskn. V/2 855
canescens (Döll) Thellung V/2 843
chordorrhizum Fries V/2 845
chordorrhizum Griseb. V/2 854
collinum Gmel. V/2 831
confine Hausskn. V/2 854
crassicaule Gremli V/2 854
Dacicum Borb. V/2 855
Darreri Richt. V/2 854
dasycarpum Fries V/2 854
decipiens F. Schultz V/2 856
decurrens Spreng. V/2 842
Dodonaei Vill. V/2 819
Dodonaei Vill. var. Fleischeri Hausskn. V/2 821
Duftii Hausskn. V/2 855
Duriaei Gai V/2 830
Eriksoni Lévl. V/2 856
erroneum Hausskn. V/2 853
fallacinum Hausskn. V/2 856
finitimum Hausskn. V/2 855
Fleischeri Hochstett. V/2 821
Freynii Čelak. V/2 856
Friburgense Thellung V/2 856
gemmascens Michalet V/2 855
gemmiferum Boreau V/2 855
gemmiferum Lange V/2 845
Gerardi Rouy et Camus V/2 855
Gerstlaueri K. Rubner V/2 855
Görzii K. Rubner V/2 855
Graebneri K. Rubner V/2 807
grandiflorum Weber V/2 823
Grenieri Rouy et Camus V/2 856
Haussknechtianum Borb. V/2 856
HaynaldianumHausskn. V/2 854
Hectori-Leveilleanum Thellung V/2 856
heterocaule Borb. V/2 856
heterophyllum Hegetschw. V/2 847
hirsutum L. V/2 823
Huguenini Brügg. V/2 856
Huteri Borb. V/2 856
hybridum Arvet-Touv. V/2 855
hybridum Schur V/2 853
hypericifolium Tausch V/2 829
intermedium Hegetschw. V/2 854
intermedium Rchb. V/2 853
intersitum Hausskn. V/2 854
Knafii Čelak. V/2 855
Knafii K. Rubner V/2 856

Epilobium Krausei Uechtr. V/2 855
Krausei Uechtr. et Hausskn. V/2 856
Lamotteanum Hausskn. V/2 856
Lamyi F. Schultz V/2 843
lanceolatum Seb. et Mauri V/2 834
Larambergianum F. Schultz V/2 854
Laschianum Hausskn. V/2 854
limosum Schur V/2 854
lingulatum Baker V/2 854
Matrense Borb. V/2 854
micranthum Lge. V/2 824
microphyllum Less. et A. Rich. V/2 807
mixtum Simkov. V/2 855
molle Lam. V/2 825
montaniforme Knaf V/2 856
montanum L. V/2 827
montanum L. var. collinum Spenn. V/2 831
montanum L. var. Duriaei F. Schultz V/2 830
montanum L. var. Hoheneckianum Kirschleg. V/2 830
montanum γ roseum Pohl V/2 835
Mouillefarinei Lévl. V/2 854
mutabile Boiss. et Reut. V/2 856
Neogradense Borb. V/2 854
Ninckii Corb. V/2 856
nutans Schmidt V/2 847
obscurum Schreb. V/2 845
obscurum Schur V/2 854
oreodoxum Gaud. V/2 854
origanifolium Lam. V/2 850
Palatinum F. Schultz V/2 855
pallidum Tausch V/2 856
palustre L. V/2 839
palustre L. γ alpinum Grab. V/2 848
palustre L. nutans Grab. V/2 847
palustriflorum F. Schultz V/2 855
parviflorum Schreb. V/2 825
persicinum Rchb. V/2 855
phyllonema Knaffh. V/2 854
Probstii Lévl. V/2 855
pseudo-nivale Lévl. V/2 856
pseudotrigonum Borb. V/2 856
pubescens Lej. et Court. V/2 854
pubescens Roth V/2 825
purpureum Fries V/2 854
pycnotrichum Borb. V/2 853
Ratisbonense K. Rubner V/2 855
rivolicolum Hausskn. V/2 855
rivulare Čelak. V/2 854
rivulare Hegetschw. V/2 825
rivulare Kirschleg. V/2 853
rivulare Nolte V/2 855
Epilobium rivulare Wahlenb. V/2 855
roseum Schreb. V/2 835
rosmarinifolium Haenke V/2 819
rosmarinifolium Haenke var. alpinum Lam. et DC. V/2 821
salicifolium Facch. V/2 856
sarmentosum Čelak. V/2 855
scaturiginum Kern. V/2 839
scaturiginum Wimm. V/2 856
Schmalhausenianum M. Schulze V/2 855
Schmidtianum Rostkov V/2 839, 854
Schultzeanum Hausskn. V/2 854
semiadnatum Borb. V/2 855
semiobscurum Borb. V/2 855
Sempronianum Lévl. V/2 855
sericeum Schuhm. V/2 853
silvaticum Boreau V/2 827
similatum Hausskn. V/2 854
spicatum Lam. V/2 814
stenophyllum Borb. V/2 855
subhirsutum Gennaris V/2 853
Tarni Larambergue V/2 854
tetragonum Herb. V/2 835
tetragonum L. V/2 842
tetragonum L. β canescens Döll V/2 843
tetragonum Pollich V/2 845
Thuringiacum Hausskn. V/2 855
Treuinfelsianum Ausserd. V/2 854
trigonum Schrank V/2 837
Turicense Lévl. V/2 856
Uechtritzianum Pax V/2 854
villosum Curt. V/2 825
villosum Thunb. V/2 823
virgatum Lam. V/2 845
Weissenburgiense F. Schultz V/2 855
Wimmeri F. Schultz V/2 854
„ Winkleri Kern. V/2 855
Epimedium L. IV/1 9; VII 175
„ alpinum L. IV/1 9
Epipactis Adans. II 374; VII 970
abortiva Scop. II 382
alba Crtz. II 380
atropurpurea Rafin. II 376
atrorubens Schult. II 376
cordata All. II 387
grandiflora All. II 381
latifolia All. II 375
longifolia All. II 378
longifolia Wettst. II 381
Mayeri W Zimmermann VII 164
microphylla Sw. II 377
monophyllos Schmidt II 392
myodes Schmidt II 329
Nidus avis Crtz. II 388
paludosa Schmidt II 391
palustris (Mill.) Crtz. II 378
Epipactis repens Crtz. II 390
rubiginosa auct. II 376
rubra All. II 380
Schmalhausenii Richt. II 379
speciosa Wettst. II 379
spiralis Crtz. II 385
varians Fleischm. et Rechinger II 376
Epiphyllum truncatum Haw. V/2
Epipogium Sw. II 383; VII 165
abortivum (Schmidt) Sw. II 383 cf. hybridum. I/570
Epipogon Epipogium Karst. II 383
„ Gmelini Rich. II 383
Equisetaceae I 51; VII 147
Equisetales I 4; VII 147
Equisetum I 53; I/XCIX Fig. 154; VII 147 u. 102 Fig. 1133
arvense L. I 57
eburneum Schreb. I 54
elongatum Willd. I 59
Heleocharis Ehrl. I 59
hiemale L. I 60; VII 148
limosum Willd. I 59
litorale Kühlewein I 62
maximum Lam. I 54
multiforme Vaucher I 59
Naegelianum Walo Koch VII 148
palustre L. I 58
pratense Ehrh. I 54
ramosissimum Desf. I 59; VII 148
ramosum DC. I 59
scirpoides Michx. I 62
silvaticum L. I 54
Telmateia Ehrh. I 54
trachyodon A. Br. I 61; VII 147
umbrosum G. Mey. I 54
variegatum Schleich. I 61; VII 147
Eragrostis Host I 279; VII 15
Aegyptiaca Del. I 280
Caroliniana Scribner I 280
Cilianensis (All.) Vignolo-Lutati I 280
maior Host I 280
megastachya (Koeler) Lk. I 280
minor Host I 280
multiflora Aschers. I 280
pilosa Pal. I 279
poaeformis Lk. I 280
poaeoides Pal. I 280
„ Purshii Schrad. I 280
Eranthemum L. VII 205
Eranthis Salisb. III 472; VII 174
Eranthis hiemalis (L.) Salisb. III 472; VII 987 d
Erechthites Raf. VI/2 701
hieracifolius (L.) Raf. VI/2 702
praealta Raf. VI/2 702
prenanthoides (A. Rich.) DC. VI/2 1367

Eremogone graminifolia Fenzl III 408
„ procera Rchb. III 408
Eremosparton Fisch. et Mey. VII 182
Eremostachys laciniata (L.) Bunge V/4 2436
Eremurus Bieb. II 277; VII 159
Erianthus Ravennae Pal. I 186
Erica L. V/3 1700; VI 196
arborea L. V/3 1705
blanda Andr. V/3 1700
botuliformis Salisb. V/3 1708
Bruckenthalii Spr. V/3 1701
carnea L. V/3 1701
ciliaris L. V/3 1701
cinerea L. V/3 1711
Daboecia L. V/3 1620
elata Bubani V/3 1705
floribunda Lodd. V/3 1701
herbacea L. V/3 1701
hiemalis hort. V/3 1700
humilis Neck. V/3 1711
mediterranea L. V/3 1705
mutabilis Salisb. V/3 1711
procera Salisb. V/3 1705
saxatilis Salisb. V/3 1701
scoparia Pieri V/3 1705
spiculifolia Salisb. V/3 1701
tenuifolia Bubani V/3 1711
Tetralix L. V/3 1708
vagans L. V/3 1701
viridi-purpurea Gouan V/3 1711
„ vulgaris L. V/3 1689
Ericaceae V/3 1609; VII 195
Ericales V/3 1713; VII 195
Ericoideae V/3 1611; VII 196
Ericoila alpina Don V/3 2013
Bavarica Borkh. V/3 2021
nivalis Borkh. V/3 2025
pumila Don V/3 2020
utriculosa Borkh. V/3 2023
„ verna Borkh. V/3 2014
Erigeron L. VI/1 435; VII 209
acer L. VI/1 437; VI/2 1365
acer L. subsp. angulosus Gaud. VI/1 438
alpinus L. VI/1 438
alpinus L. var. neglectus Briq. VI/1 439
alpinus L. var. uniflorus Hook. VI/1 443
annuus (L.) Pers. VI/1 447; VI/2 1365
Arcticus Rouy VI/1 443
Atticus Vill. VI/1 440; VI/2 1365
aurantiacus Regel VI/1 436
Breunius Murr VI/1 442
Canadensis L. VI/1 445
Carpaticus Griseb. et Schenk VI/1 440
Christii Chenevard VI/1 447
Erigeron crispus Pour. VI/1 436
Droebachiensis Koch VI/1 438
Engadinensis Brügg. VI/1 447
eriocephalus Regel et Schmalh. VI/1 436
eriocephalus Vahl VI/1 443
Favrati Gremli VI/1 447
glabratus Hoppe VI/1 442
glandulosus Cariot VI/1 440
glandulosus Hegetschw. VI/1 442; VI/2 1365
glareosus Brügg. VI/1 446
grandiflorus Hook. VI/1 436
Hegetschweileri Brügg. VI/1 439
Helveticus Brügg. VI/1 447
heterophyllus Kth. et Bouché VI/1 436
heterophyllus Mühlenbeck VI/1 447
Hülsenii Vatke VI/1 446
intermedius Schleich. VI/1 438
intermedius Trachsel VI/1 447
Karwinskyanus DC. VI/1 436
Khekii Murr VI/1 442
leucanthemifolius Schauer VI/1 436
linifolius Willd. VI/1 436
mixtus Arvet-Touvet VI/1 442
neglectus A. Kern. VI/1 439
polymorphus Scop. VI/1 442
Prantlii Dalla Torre VI/1 438
pulchellus DC. VI/1 436
Raeticus Brügger VI/1 447
ramosus (Walter) Britton, Sterns et Poggenburg VI/2 1365
Schleicheri Gremli VI/1 442
Schleicheri Moritzi VI/1 439
serotinus Weihe VI/1 437
squarrosum Clairv. VI/1 485
strigosus Muehlenb. VI/2 1365
Trachselii Dalla Torre VI/1 447
uniflorus L. VI/1 443
Villarsii Bell. VI/1 440
Villarsii Bell. var. albus Gaud. VI/1 442
Erinacea Anthyllis Lk. IV/3 1148
„ pungens Boiss. IV/3 1148
Eringium Gaterau V/2 974
Erinosma vernum Herb. II 310
Erinus L. VI/1 70; VII 204
„ alpinus L. VI/1 70
Eriobotrya Japonica Lindl. IV/2 664
Eriocaulaceae II 142; VII 158
Eriocoma tomentosa O. Kuntze IV/1 528
Eriodictyon Californicum (Hook. et Arn.) Greene V/3 2119
„ glutinosum Benth. V/3 2119
Eriogonoideae VII 170
Erioglossum Bl. VII 187
Eriogonum L. III 166; VII 170
Eriogynia Hook. VII 180
Eriophorum L. II 15, 18; VII 155
alpinum L. II 23
angustifolium Roth II 20
caespitosum Host II 18
capitatum Host II 19
Chamissonis C. A. Mey. II 19
gracile Koch II 21
latifolium Hoppe II 21
medium Anderss. II 19
polystachyon L. II 20
pubescens Sm. II 21
Scheuchzeri Hoppe II 19
vaginatum L. II 18
„ vulgare Pers. II 21
Eriophyes alpestris Nal. V/3 1631
Eriosolena (nicht Erioselma!) Bl. V/2 704
Eriostachys Rchb. V/4 2407
Eriostemon Sm. VII 184
Eriostomum alpinum Hoffm. et Lk. V/4 2422
lanatum Hoffm. V/4 2427
lanatum Hoffm. et Lk. V/4 2424
„ polystachyum Presl V/4 2424
Eritrichium Schrad. V/3 2133; VII 200
barbigerum Gray V/3 2134
densiflorum Duthie V/3 2134
Hacquetii Koch V/3 2135
nanum (Allioni) Schrad. V/3 2134
Terglovense Putterl. V/3 2135
Tergloviense Dalla Torre et Sarnthein V/3 2134
„ Tergloviense Kern. V/3 2135
Erodium L'Hérit. IV/3 1716; VII 184
alpinum (Burm.) L'Hérit. IV/3 1718
althaeoides Jord. IV/3 1717
bipinnatum Willd. IV/3 1722
Botrys C. A. Mey. IV/3 1717
Botrys (Cav.) Bertol. IV/3 1717
brachycarpum (Godr.) Thellung IV/3 1717
„ chamaedryoides (Cav.) L'Hérit. IV/3 1717
cheilanthifolium Boiss. IV/3 1718
Chium Sibth. et Sm. IV/3 1717
chrysanthum L'Hérit. IV/3 1718
ciconium (L.) L'Hérit. IV/3 1717
cicutarium (L.) L'Hérit. IV/3 1719
cicutifolium L. IV/3 1719
Corsicum Leman IV/3 1717
cygnorum Nees IV/3 1717
dryadifolium Salisb. IV/3 1717
floribundum Battandier IV/3 1717
geoides St. Hil. IV/3 1717

Erodium glabrum Pomel IV/3 1717
glandulosum (Cav.) Willd. IV/3 1718
glaucophyllum (L.) L'Hérit. IV/3 1717
gruinum (Car.) Bertol. IV/3 1717
hirsutum Jord. IV/3 1722
hispidum Presl IV/3 1717
hymenodes L'Hérit. IV/3 1717
Jacquinianum Boiss. et Reut. IV/3 1722
laciniatum (Cav.) Willd. IV/3 1717
litoreum auct. IV/3 1717
longipes Bub. IV/3 1718
macradenum L'Hérit. IV/3 1718
malacoides (L.) Willd. IV/3 1717
Manescavi Cosson IV/3 1718
moschatum (Burm.) L'Hérit. IV/3 1724
pelargoniiflorum Boiss. et Heldr. IV/3 1717
pilosum Steudel IV/3 1719
Reichardi (Murray) DC. IV/3 1717
Romanum Ait. IV/3 1723
Texanum A. Gray IV/3 1717
trichomanifolium L'Hérit. IV/3 1718
trifolium Cav. IV/3 1717
„ trilobatum Jacq. IV/3 1717
Erophila DC. VII 178
brachycarpa Jord. IV/1 389
„ verna (L.) E. Mey. IV/1 389
Eruca Mill. IV/1; VII 177
elongata Baumg. IV/1 233
lativalvis Boiss. IV/1 203
pinnatifida Pomel IV/1 203
sativa Coss. IV/1 200, 201
tanacetifolia Mill. IV/1 159
tenuifolia Moench IV/1 214
„ vesicaria (L.) Cav. IV/1 200
Erucago runcinata Hornem. IV/1 473
Erucaria myagroides (L.) Halácsy IV/1 186
Erucastrum Presl. IV/1 218; VII 177
Abyssinicum (A. Rich.) O. E. Schulz IV/1 220
Arabicum hort. bot. IV/1 220
Cheiranthus Lk. IV/1 269
elongatum Rchb. IV/1 233
Erucastrum Huth IV/1 224
fruticulosum Presl IV/1 230
Gallicum (Willd.) O. E. Schulz IV/1 224
incanum Koch IV/1 226
Monense Lk. IV/1 271
nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz IV/1 220
Erucastrum obtusangulum Rchb. IV/1 221
palustre Vis. IV/1 235
Pollichii Schimper et Spenner IV/1 224
Thellungii O. E. Schulz IV/1 219
Tournefortii Gouan IV/1 231
varium Dur. IV/1 219
„ Zanonii Ball IV/1 153
Ervilia Cassubica Schur IV/3 1523
hirsuta Schur IV/3 1515
Orobus Schur IV/3 1525
pisiformis Schur IV/3 1519
sativa Lk. IV/3 1512
tetrasperma Schur IV/3 1517
„ vulgaris Godr. IV/3 1515
Ervum L. IV/3 1506
aristatum Raf. IV/3 1518
Cassubicum Peterm. IV/3 1523
Cracca Trautv. IV/3 1531
Ervilia L. IV/3 1512
gracile DC. IV/3 1518
hirsutum L. IV/3 1515
Lenticula Schreb. IV/3 1502
monanthos L. IV/3 1514
nigricans Bieb IV/3 1503
parviflorum Bert. IV/3 1508
pisiforme Peterm. IV/3 1519
plicatum Moench IV/3 1512
silvaticum Peterm. IV/3 1526
Soloniense Wulf. IV/3 1502
stipulaceum Willd. IV/3 1514
tenuifolium Lag. IV/3 1518
tenuifolium Trautv. IV/3 1533
tetraspermum L. IV/3 1517
uniflorum Ten. IV/3 1502
„ villosum Trautv. IV/3 1535
Erxlebenia rosea Opiz V/3 1583
Eryngium L. V/2 974; VII 193 und 64 Fig. 1098 A
alpinum L. V/2 981
alpinum Pallas V/2 983
amethystinum Comolli V/2 987
amethystinum Gmelin V/2 983
amethystinum L. V/2 985
amethystinum Lam. V/2 977
aquaticum L. V/2 976, 977
asperifolium Delaroche V/2 976
australe Wulf. et Vest V/2 985
Billardieri Macch. V/2 987
Bourgatii Gouan V/2 977
bracteosum Griseb. V/2 977
bromeliifolium Delaroche V/2 977
caeruleum Lk. V/2 985
campestre L. V/2 987
Creticum Lam. V/2 977
crinitum Nyman V/2 987
cyaneum Sibth. et Sm. V/2 977
Dalmaticum Teyber V/2 992
dichotomum DC. V/2 977
Eryngium dilatatum Rchb. V/2 985
ebracteatum Lam. VII 64 Fig. 1098
eburneum Decaisne V/2 977
foetidum L. V/2 976
giganteum Bieb. V/2 976
glaucum Adami Hoffm. V/2 976
Haussknechtii Bornmüller V/2 976
heteracanthum Teyber V/2 992
intermedium Dalla Torre et Sarnth. V/2 992
intermedium Weinm. V/2 983
Lassauxii Decaisne V/2 977
Lycicum Stapf et Wettst. V/2 990
macrocalyx Schrenk V/2 981
marinum Garsault V/2 979
maritimum L. V/2 979
maritimum Tauricum Fisch. V/2 979
microcephalum Sieb. et Steud. V/2 977
multifidum Guss. V/2 985
multifidum Sibth. et Sm. V/2 987
multifidum Ten. V/2 987
Olivierianum Delaroche V/2 992
planifolium Pallas V/2 983
planum L. V/2 983
planum Lapeyr. V/2 977
Sanguisorba Cham. et Schlecht. V/2 977
Serbicum Pančić V/2 977
Tournefortii Bubani V/2 977
trifidum L. V/2 987
virens Lk. V/2 990
viride Fraas V/2 990
Visiani Teyber V/2 992
yuccifolium Michx. V/2 977
„ Zabelii hort. V/2 992
Erysibaceae VII 140
Erysimum L. IV/1 426; VII 178
albidum O. Kuntze IV/1 396
Alliaria L. IV/1 149
alpinum Roth IV/1 399
altissimum Lej. IV/1 434
arcuatum Opiz IV/1 302
Arkansanum Nutt. IV/1 427
arvense Thore IV/1 271
Austriacum DC. IV/1 441
Austriacum Roth IV/1 440
Barbaraea L. IV/1 301
bracteatum St. Lager IV/1 224
canescens Roth IV/1 435
cheiranthoides L. IV/1 427
Cheiranthus Pers. IV/1 436
Cheiranthus Presl IV/1 430
Cheiri Crtz. IV/1 442
crepidifolium Rchb. IV/1 430
cuspidatum DC. IV/1 427
denticulatum Presl IV/1 432, 433
diffusum Ehrh. IV/1 435

Erysimum dubium (Suter) Thellung IV/1 439
Erucastrum Scop. IV/1 220
erysimoides (L.) Fritsch IV/1 434
glastifolium Crtz. IV/1 393
Helveticum (Jacq.) DC. IV/1 437
hieraciifolium L. IV/1 432, 433
hieraciifolium L. subsp. durum (Presl) IV/1 433
inodorum Rchb. IV/1 224
intermedium Wettst. IV/1 445
Irio Rupr. IV/1 169
lanceolatum R. Br. IV/1 436
longisiliquosum Schleich. IV/1 434
lyratum Gilib. IV/1 301
montanum Crtz. IV/1 434
murale Desf. IV/1 426, 436
murale Lam. IV/1 442
obtusangulum Clairv. IV/1 221
ochroleucum DC. IV/1 439
odoratum Ehrh. IV/1 434
officinale L. IV/1 164
Orientale Mill. IV/1 440
pallens Wallr. IV/1 430
Pannonicum Crtz. IV/1 434
parviflorum Pers. IV/1 427
perfoliatum Crtz. IV/1 440
Perowskianum Fisch. et Mey. IV/1 426
pulchellum (Willd.) Boiss. IV/1 426
Pyrenaicum Vill. IV/1 172, 173
Raeticum DC. IV/1 437
ramosissimum Crtz. IV/1 428
repandum L. IV/1 428
silvestre (Crtz.) Kern. IV/1 436
strictum DC. IV/1 434
strictum Fl. Wett. IV/1 432, 433
subbipinnatifidum Lange IV/1 224
suffruticosum Spreng. IV/1 426
supinum Lk. IV/1 163
tanacetifolium Clairv. IV/1 159
tenuifolium Clairv. IV/1 214
virgatum Presl IV/1 433
„ virgatum Roth IV/1 432, 434
Erysiphaceae VII 140
Erythraea Necker V/3 1968; VII 198, 199 Fig. 1240
Conchalaguan Roem. et Schult. V/3 1971
Centaurium Pers. V/3 1969
compressa Hayne V/3 1971
inaperta Schlecht. V/3 1972
linearifolia Pers. V/3 1971
litoralis Fries V/3 1971
nana Hegetschw. V/3 1973
pulchella Fries V/3 1972
ramosissima Pers. V/3 1972
ramosissima Pers. var. pulchella Griseb. V/3 1973
Erythraea simplicissima Schmidt V/3 1973
Erythrina Corallodendron L. IV/3 1626
Crista galli L. IV/3 1626
„ Indica Lam. IV/3 1626
Erythrochiton Nees et Mart. V/1 51
Erythrolaena Swt. VI/2 866
„ conspicua Swt. VI/2 923
Erythronium L. II 245; VII 159
dens canis L. II 245
„ maculatum Lam. II 245
Erythrophloeum Afz. IV/3 1129; VII 181
Erythroxylaceae V/2 37; VII 184
Erythroxylon Coca Lam. V/2 37; VII 185 Fig. 1229
Escallonia floribunda H. B. et Kth. IV/2 566
„ rubra Pers. IV/2 566
Escallonioideae VII 179
Eschscholtzia Californica Cham. IV/1 19; VII Fig. 1109 g
Esenbeckia H. B. et Kth. V/1 51
Euascomycetes VII 140
Eubacteria VII 135
Eucalyptus L'Hérit. V/2 781
amygdalina Labill. V/2 781, 782, 785
calophylla R. Br. V/2 781
diversicolor F. v. Muell. V/2 781, 786
globulus Labill. V/2 783
Gunnii Hook. V/2 782
marginata Sm. V/2 781
occidentalis Endl. V/2 786
resinifera Sm. V/2 782
robusta Sm. V/2 785
„ viminalis Labill. V/2 782, 785
Eucharidium Breweri A. Gray V/2 800
concinnum Fisch. et Mey. V/2 800
grandiflorum Fisch. et Mey. V/2 800
Eucharis Planch. VII 162
Euchlaena Mexicana Schrad. I 178
Euclea Pseudebenus E. Mey. V/3 1897
„ undulata Thunb. V/3 1897
Euclidium R. Br. IV/1 463; VII 178
„ Syriacum (L.) R. Br. IV/1 463
Eucomis regia Ait. II 279
Eucommiaceae VII 180
Eucryphiaceae V/1 493; VII 189
Eucyperus fuscus Rikli II 13
Eudyanthe coeli-rosa Rchb. III 277
Eugenia aromatica Baill. V/2 777
caryophyllata Thunb. V/2 776, 777
Jambos L. V/2 779
Javanica Lam. V/2 779
Malaccensis L. V/2 779
Samarangensis Berg V/2 779
Eugenia Tabasco G. Don V/2 777
„ uniflora Berg V/2 780
Euglenales VII 137
Eulalia Japonica Trin. I 186
Eulophus peucedanoides (Humboldt, Bonpl. et Kth.) Benth. et Hook. V/2 1298
Eumeum Baill. V/2 1300
„ athamanticum Baill. V/2 1300
Eumycetes VII 139
Eunomia DC. VII 177
Euparea bractealis Baudo V/3 1871
Eupatorieae VI/1 400, 408; VII 209
Eupatorium L. VI/1 401; VI/2 1364; VII 209
ageratoides L. VI/1 401
atrorubens Voss VI/1 401
Ayapana Vent. VI/1 402
cannabinum L. VI/1 401
Dalea L. VI/1 402
ianthinum Voss VI/1 401
incarnatum Walt. VI/1 401
indigoferum Pohl VI/1 403
ligustrinum DC. VI/1 401
perfoliatum L. VI/1 403
purpureum L. VI/1 401, 403
riparium C. H. Schultz VI/1 401
serotinum Michx. VI/1 401
sessilifolium L. VI/1 401
„ triplinerve Vahl VI/1 402
Euphorbia L. V/1 134; VII 186
acuminata Lam. V/1 185
agraria Bieb. V/1 141
ambigua Waldst. et Kit. V/1 156
amygdaloides L. V/1 164
amygdaloides Lumn. V/1 166
angulata Jacq. V/1 156
antiquorum L. V/1 136
arvensis Kit. V/1 184
Austriaca A. Kern. V/1 149
Baselices Facch. V/1 182
biglandulosa Desf. V/1 136
Bojeri Hook. V/1 136
Canariensis L. V/1 136
capitulata Rchb. V/1 141
Carniolica Jacq. V/1 156
Chamaesyce L. V/1 145
cyathophora Murray V/1 136
Cybirensis Boiss. V/1 141
Cyparissias L. V/1 167
Dalmatica Vis. V/1 141
depressa Torrey V/1 145
dulcis L. V/1 154; VII 186 Fig. 1230
dulcis Sm. V/1 157
Engelmanni Thellung V/1 145
epithymoides Jacq. V/1 153
epithymoides L. V/1 152
Esula L. V/1 170
exigua L. V/1 187
falcata L. V/1 184
Figerti Dörfler V/1 189
flavicoma DC. V/1 159
foetida Hoppe V/1 161

Euphorbia fragifera Jan. V/1 152
Gayi Salis V/1 182
Gerardiana Jacq. V/1 177
glareosa Bieb. V/1 141
Graeca Boiss. V/1 141
granulata Forsk. V/1 141
Helioscopia L. V/1 163
heterodoxa Müll.-Aarg. V/1 140
heterophylla L. V/1 136
humifusa Willd. V/1 144
hypericifolia Hill. V/1 143
Kerneri Hut. V/1 182
Lathyris L. V/1 146
lineariaefolia Lam. V/1 177
lucida Waldst. et Kit. V/1 172
maculata L. V/1 145
marginata Pursh V/1 141
mucronata Lam. V/1 184
Myrsinites L. V/1 137
Myrsinites Wulf. V/1 180
Nicaeensis All. V/1 180
nuda Velen. V/1 141
nutans Lagasca V/1 143
obscura Loisel. V/1 185
pallida Willd. V/1 166
palustris L. V/1 150
Pannonica Host V/1 181
paradoxa Schur V/1 166, 189
Paralias L. V/1 136
Peplus L. V/1 186
pilosa L. V/1 148
platyphyllos L. V/1 160
polychroma Kern. V/1 153
polygonifolia Jacq. V/1 145
Preslii Guss. V/1 143
procera Bieb. V/1 148
prostrata Bauer V/1 145
pulcherrima Willd. V/1 136
refracta Lowe V/1 143
resinifera Berg V/1 124
rotundifolia Loisel. V/1 187
salicifolia Host V/1 166
saxatilis Jacq. V/1 181
saxatilis Poll. V/1 182
Schurii Simk. V/1 166
segetalis L. V/1 183
Seguieri Vill. V/1 177
Seguieriana Necker V/1 177
serotina Host V/1 180
serratula Thuill. V/1 161
silvatica Jacq. V/1 164
solisequa Rchb. V/1 154
splendens Bojer V/1 136
stricta L. V/1 161
supina Rafin. V/1 145
Taurinensis All. V/1 141
terracina L. V/1 141
variabilis Cesati V/1 182
verrucosa L. V/1 157
villosa Waldst. et Kit. V/1 146
„ virgata Waldst. et Kit. V/1 173
Euphrasia L. VI/1 83; VII 204
alpestris Freyn VI/1 94
alpina Baumg. VI/1 97
Euphrasia alpina Lam. VI/1 96
arguta A. Kern. VI/1 93
Brandisii Freyn VI/1 91
brevipila Burn. et Gremli VI/1 87
brevipila Burnat et Gremli subsp. tenuis (Brenner) Wettst. VI/1 88
caerulea Gremli VI/1 86
caerulea Kern. VI/1 89
calvescens Beck VI/1 100
Carniolica A. Kern. VI/1 98
Christii Favrat VI/1 96
condensata Jord. VI/1 86
curta (Fr.) Wettst. VI/1 88
curta (Fr.) Wettst. subsp. caerulea (Tausch) Wettst. VI/1 89
cuspidata Host VI/1 98
cuspidatissima St. Lager VI/1 97
digenea Wettst. VI/1 100
ericetorum Jord. VI/1 86
ericetorum Jord. var. maialis Gremli VI/1 85
Favrati Wettst. VI/1 100
Freynii Wettst. VI/1 100
gracilis Fries VI/1 89
Gremlii Wettst. VI/1 100
Haussknechtii Wettst. VI/1 100
Hegii Vollmann VI/1 91
hirtella Jord. VI/1 91
hybrida Wettst. VI/1 100
Illyrica Wettst. VI/1 98
intercedens Wettst. VI/1 100
intermedia Kern. VI/1 91
Jaeggii Wettst. VI/1 100
Jordanii Wettst. VI/1 100
Kerneri Wettst. VI/1 93
Lepontica Wettst. VI/1 100
lutea L. VI/1 101
maialis Jord. VI/1 85
Markgrafii W. Beck. VI/2 1362
Mattfeldii W. Beck. VI/2 1362
micrantha Rchb. VI/1 89
minima Jacq. VI/1 90; VI/2 1362
minima Jacq. subsp. drosocalyx (Freyn) Hay. VI/1 91
minima Jacq. subsp. Tatrae (Wettst.) Hay. VI/1 91
mixta Gremli VI/1 100
nemorosa Reichenb. VI/1 86
nemorosa (Pers.) Gremli VI/1 89; VI/2 1362
nemorosa (Pers.) Gremli var. pectinata Rchb. VI/1 91
nitidula Reut. VI/1 89
Odontites L. VI/1 101
officinalis Buchenau VI/1 88
officinalis Hayne VI/1 86
officinalis var. alpestris Gremli VI/1 95
officinalis var. alpestris Wimm. et Grab. VI/1 89, 94
Euphrasia officinalis montana Fr. VI/1 87
officinalis var. neglecta Koch VI/1 91
officinalis var. nemorosa Koch VI/1 86
officinalis var. parviflora Rchb. VI/1 89
officinalis var. Salisburgensis Neilr. VI/1 97
parviflora Wettst. VI/1 87
pectinata Ten. VI/1 85
picta Wimm. VI/1 94
picta Wimm. subsp. alpigena Vollmann VI/1 95
picta Wimm. subsp. praecox (Vollmann) Hay VI/1 95
Portae Wettst. VI/1 96
pratensis Fr. VI/1 92
Preussiana W Becker VI/2 1362
puberula Jord. VI/1 86
pudibunda Simk. VI/1 86
pulchella Kern. VI/1 91
Rechingeri Wettst. VI/1 100
Reuteri Wettst. VI/1 100
rigidula Jord. VI/1 86, 89
Ronnigeri J. Murr VI/2 1362
Rostkoviana Hayne VI/1 92
Rostkoviana Hayne subsp. campestris (Jord.) Hayek VI/1 93
Rostkoviana Hayne subsp. montana (Jord.) Wettst. VI/1 93
Salisburgensis Hoppe VI/1 97; VI/2 1362
Schinzii Wettst. VI/1 100
serotina Lam. VI/1 101
speciosa A. Kern. VI/1 93
Stiriaca Wettst. VI/1 99
stricta Host VI/1 86
stricta Host subsp. pumila (A. Kern.) Hayek VI/1 87
stricta Host subsp. Suecica Murbeck et Wettst. VI/1 87
Tatarica Fisch. VI/1 86; VI/2 1362
Tatarica Fisch. subsp. Bicknelli Wettst. VI/1 86
tetraquetra Arrond. VI/1 89
transiens Borb. VI/1 98
tricuspidata L. VI/1 99
tricuspidata Reichenb. VI/1 98
variabilis Freyn VI/1 90
versicolor Hal. et Braun VI/1 94
versicolor A. Kern. VI/1 95
„ Vestinensis Wettst. VI/1 100
Eupomatiaceae VII 175
Euprotococcales VII 137
Eupteris Newmann VII 149
Eurotia ceratoides C. A. Mey. III 260
Eurya Japonica Thunb. V/1 498
Euryale Europaea Web. III 439

Euryale ferox Salisb. III 439
„ Indica Planch. III 439
Euryangium Kauffm. V/2 1354
„ Sumbul Kauffm. V/2 1357
Eurybia corymbosa Cass. VI/1 417
„ macrophylla Cass. VI/1 418
Euscaphis staphyleoides Sieb. et Zucc. V/1 257
Eutaxia R. Br. IV/3 1147
Eutoca Mexicana hort. V/3 2121
„ viscida Benth. V/3 2121
Euxolus Blitum Gren. III 264, 265
deflexus Rafin. III 263
„ viridis Moqu. III 264
Euzomum Lk. IV/1 199
Evaiezoa aizoides Rafin. IV/2 596
androsacea Rafin. IV/2 605
biflora Rafin. IV/2 577
bulbifera Rafin. IV/2 616
Burseriana Rafin. IV/2 585
caesia Rafin. IV/2 583
diapensioides Rafin. IV/2 587
exarata Rafin. IV/2 609
mutata Rafin. IV/2 595
oppositifolia Rafin. IV/2 579
„ pungens Rafin. IV/2 586
Evallaria bifolia Neck. II 267
polygonata Neck. II 270
„ verticillata Neck. II 273
Evax R. Br. VII 209
Evernia VII 144
Evodia Forst. V/1 47
Evolvulus alsinoides L. V/3 2075
Evonymus L. V/1 246; VII 187
Americana L. V/1 247, 248
atropurpurea Jacq. V/1 247, 248
Bulgarica Velen. V/1 251
Bungeana Maxim. V/1 248
Europaea L. V/1 249
Hamiltoniana (Wall.) Maxim. V/1 251
hians Koehne V/1 249
Japonica Thunb. V/1 247
latifolia Mill. V/1 254
linifolia hort. V/1 248
micranthus Rehd. V/1 248
nana Bieb. V/1 247
obovata Nutt. V/1 249
oxyphylla Miq. V/1 248
planipes Koehne V/1 249
Przewalskii Maxim. V/1 251
rosmarinifolia hort. V/1 248
striata Loesener V/1 248
tingens Wall. V/1 247
Tobira Thunb. IV/2 654
velutina Fisch. et Mey. V/1 251
verrucosa Scop. V/1 252
vulgaris Mill. V/1 249
„ Yedoënsis Koehne V/1 249
Exaculum pusillum Car. V/3 1956
Exacum affine Balf. f. V/3 1956
filiforme Willd. V/3 1965
pedunculatum L. V/3 1956
pusillum DC. V/3 1956
Excoecaria Agallocha L. V/1 120
Exoascaceae VII 140
Exoascales VII 140
Exoascus cerasi Sadebeck IV/2 1056
deformans Fuckel IV/2 1056
„ pruni Fuckel IV/2 1056
Exobasidiaceae VII 142
Exobasidium Japonicum Shir. V/3 1631
Rhododendri (Fuckel) Cram. V/3 1631
Exocarpus cupressiformis Labill. III 151
Exochorda Lindl. IV/2 663; VII 180
Exogonium Purga (Wender.) Benth. V/3 2076
Eysenhardtia amorphoides Humb. IV/3 1385

F.

Faba bona Med. IV/3 1553
equina Rchb. IV/3 1557
Narbonensis Schur IV/3 1553
sativa Bernh. IV/3 1556
sepium Bernh. IV/3 1538
„ vulgaris Moench IV/3 1556
Fabiana imbricata Ruiz et Pav. V/4 2556
Fabroniaceae VII 147
Facchinia lanceolata Rchb. III 392
Faeniculum Hill V/2 1284
Fagaceae III 94; VII 168
Fagales VII 167
Fagara L. V/1 47
Fagonia L. V/2 38
Fagopyrum Miller III 207; VII 171
carinatum Moench III 205
Cereale Rafin. III 207
dentatum Moench III 209
dumetorum Schreb. III 205
esculentum Moench III 207
Fagopyrum Aschers. III 207
rotundatum Bab. III 209
sagittatum Gilib. III 207
Sarracenicum Dum. III 207
„ Tataricum Gaertn. III 209
Fagus L. III 95; VII 168
Americana Sweet III 95
Castanea L. III 101
ferruginea Ait. III 95
silvatica L. III 96; VII 36 Fig. 1060
Falcaria Bernh. V/2 1176; VII 194
apiifolia Wohlf. V/2 1180
Falcaria Karst. V/2 1177
glauca Dulac V/2 1177
heterophylla Willk. V/2 1174
latifolia Koch V/2 1180
pastinacifolia Rchb. f. V/2 1180
Rivini Host V/2 1177
saxifraga Rchb. f. V/2 1173
sioides Aschers. V/2 1177
vulgaris Bernh. V/2 1177
Falcatula falsotrifolium Brot. IV/3 1279
Farfugium grande Lindl. VI/2 796
Farinosae II 142; VII 158
Farsetia R. Br. IV/1 456; VII 178
clypeata (L.) R. Br. IV/1 456
incana R. Br. IV/1 458
„ utriculata Roth IV/1 460
Fatsia Japonica (Thunb.) Dcne. et Planch. V/2 914
Fauratia Zoysii Feer VI/1 363
Fauria crista galli Makino V/3 1953
Fedia Auricula Roem. et Schult. VI/1 265
carinata Mert. et Koch VI/1 265
Cornucopiae DC. VI/1 262
Locusta Rchb. VI/1 266
mixta Vahl VI/1 264
Morisonii Spr. VI/1 264
„ olitoria Vahl VI/1 266
Fegimaura Africana Pierre V/1 80
Felicia amelloda Voss VI/1 449
microphylla Voss VI/1 449
tenella DC. VI/1 449
tenella (L.) Nees VI/2 1365
„ tenella Nees VI/1 448
Feniculum commune Bubani V/2 1284
Ferdinanda eminens Lag. VI/1 528
Ferocactus Britton et Rose V/2 694
Feronia elephantum Correa V/1 54
Ferula L. V/2 1354; VII 195
alliacea Boiss. V/2 944
Assa foetida L. V/2 944, 1356
brevifolia Lk. V/2 1356
campestris Bess. V/2 1358
candelabrum Heldr. et Sart. V/3 1356
ceratophylla Regel et Schmalh. V/2 945
communis L. V/2 946, 1355
communis L. var. gummifera Battandier V/2 945
elegans Spr. V/2 1385
erubescens Boiss. V/2 945
Ferulago L. V/2 1358
foetida (Bunge) Regel V/2 944, 1356
foetida St. Lager V/2 1356
galbanifera Mill. V/2 1358
galbaniflua Boiss. et Buhse V/2 945
glauca DC. V/2 1356
glauca L. V/2 1356
graveolens Spr. V/2 1291
hispida Friv. V/2 1362
Lobeliana Vis. V/2 1355
montana Spr. V/2 1385
Neapolitana Ten. V/2 1356
nodiflora L. V/2 1355, 1356
nodiflora Scop. V/2 1358
Persica Willd. V/2 946
peucedanoides Spr. V/2 1385

Ferula puberula Boiss. et Buhse V/2 946
Rablensis Wulf. V/2 1385
rubricaulis Boiss. V/2 945
Ruthenica Spr. V/2 1368
sancta Boiss. V/2 945, 1356
Schaïr Borszczow V/2 945
scorodosma Bentley et Trimen V/2 944, 1356
Silphium (Oersted) Thellung V/2 1357
suaveolens Ait. et Hemsl. V/2 943, 1357
sulcata Bertol. V/2 1358
Sumbul (Kauffm.) Hook. f. V/2 943, 1357
Szowitziana DC. V/2 946
Tingitana L. V/2 945, 1356
Vesceritensis Coss. et Dur. V/2 1356
Ferulago Koch V/2 1357; VII 195
campestris Grecescu V/2 1358
„ nodiflora Koch V/2 1358
Festuca L. I 327; VII 155
adscendens Lk. I 381
alpina Host I 347; VII 155
alpina Suter I 337
altissima All. I 352
amethystina L. I 337
arenaria Osbeck I 342
arundinacea Fr. I 317
arundinacea Schreb. I 344
atrorubens Wulf. I 351
aurata Gaud. I 339
aurea Lam. I 346
Austriaca Hackel I 337
Baltica Homann I 342
borealis Mert. et Koch I 317
Bosniaca Kumm. et Sendtner I 348
brizoides Wulf. I 347
caerulea Lam. et DC. I 276
canescens Host I 349
capillaris Wulf. I 337
capillata Lam. I 331
Carniolica Richter I 351
cernua Schult. I 351
ciliata Danthoine I 325
cristata L. I 287
cristata Vill. I 286
Danthonii Aschers. et Graebn. I 325
decumbens L. I 275
distans Kth. I 323
drymea Mert. et Koch I 353
dura Vill. I 299
duriuscula L. I 332
elatior L. I 343
erecta Wallr. I 357
fallax Thuill. I 342
flavescens Rchb. I 347
Fleischeri Rohlena I 354
fluitans L. I 319
fusca Vill. I 346
Festuca Gaudini Kth. I 335
gigantea (L.) Vill. I 345
glauca Lam. I 332
glaucescens Roth I 282
glomerata All. I 294
Guestphalica Boenningh. I 331
Hackelii Beck I 353
Halleri All. I 335
Halleri Caflisch I 336
Haussknechtii Torges I 354
heteromalla Pourr. I 343
heterophylla Lam. I 339
hirsuta Lam. I 282
inermis Lam. et DC. I 359
iuncea Moench I 386
Lachenalii (Gmel.) Spenner I 329
latifolia Host I 352
laxa Host I 349
Leysseri Moench I 359
linearis Gilib. I 326
longiseta Hegetschw. I 339
Madritensis Desf. I 362
maritima L. I 330
maritima Nym. I 324
montana Bieb. I 353
montana Savi I 357
montana Sternb. et Hoppe I 304
mutica Wulf. I 331
myurus L. I 325
nigrescens Mert. et Koch I 339
nigricans Schleich. I 339
nutans Host I 351
ovina L. I 330
paludosa Gaud. I 331
phleoides Vill. I 287
picta Kit. I 339
pilosa Hall. f. I 301
pratensis Huds. I 343
Puccinellii Parl. I 338
pulchella Schrad. I 351
pumila Vill. I 349
pungens Kit. I 348
Raetica Sut. I 301
rubra L. I 340
rupicaprina (Nym.) Hackel I 336
Scheuchzeri Gaud. I 351
Schlickumi Grantzow I 354
sciuroides Roth I 326
serotina L. I 278
Sieberi Tausch I 350
silvatica Host I 353
silvatica (Poll.) Vill. I 352
spadicea L. I 346; VII 155
spadicea Moench I 344
spectabilis Hackel I 350
splendens Pourr. I 283
sulcata I 333
supina Schur I 332
thalassica Kth. I 324
Tirolensis Kern. I 337
Festuca Uechtritziana (Wiesbauer) I 345
vaginata Waldst. et Kit. I 333
Vallesiaca Schleich. I 333
varia Haenke I 347
varia Haenke subsp. alpestris Roem. et Schult. I 347
varia Haenke subsp. brachystachys Hackel I 348
varia Haenke subsp. calva Hakkel I 348
varia Haenke subsp. pungens Hackel I 348
versicolor Tausch I 347
villosa Schweigg. I 342
„ violacea Gaud. I 338
Festuceae I 372; VII 154
Festulolium ascendens Aschers. et Graebn. I 381
Brinkmanni Aschers. et Graebn. I 381
Fibichia umbellata Koeler I 264
Fibigia Med. VII 178
Fibigia clipeata (L.) Med. IV/1 456
Ficaria calthaefolia Rchb. nec Gren. et Godr. III 543
polypetala Gilib. III 542
ranunculoides Roth III 542
„ verna Huds. III 542
Ficoidaceae III 267; VII 172
Ficus L. III 124; VII 169; I/LII Fig. 150
Benghalensis L. III 124
Carica L. III 125
elastica Roxb. III 124; VII 169 Fig. 1209
pumila L. III 125
religiosa L. III 124
repens hort. III 125
stipulata Thunb. III 125
„ Sycomorus L. III 124
Fiebera nodosa Opiz V/2 994
Filago L. VI/1 450; VII 209
acaulis Krock. VI/1 466
apiculata G. E. Sm. VI/1 452
arvensis L. VI/1 453
Gallica L. VI/1 454
Germanica L. VI/1 451
Jussiaei Coss. et Germ. VI/1 452
Leontopodium L. VI/1 458
lutescens Jord. VI/1 452
minima (Sm.) Pers. VI/1 453
mixta Holuby VI/1 455
montana L. VI/1 453
neglecta DC. VI/1 455
pyramidata L. VI/1 451
rotundata Moench VI/1 451
spathulata Presl VI/1 452
tenuifolia Presl VI/1 454
„ vulgaris Lam. VI/1 451
Filicales I 4; VII 148
Filices I 5
Filipendula Mill. IV/2 970

Filipendula Voss IV/2 974
hexapetala Gilib. IV/2 974
lobata (Gronov.) Murray IV/2 971
Ulmaria (L.) Maxim. IV/2 971
„ vulgaris Moench IV/2 974
Fimbristylis Vahl II 22; VII 156
annua (All.) Roem. et Schult. II 22
Cioniana Savi II 22
dichotoma Vahl II 22
laxa Vahl II 22
Micheliana Rchb. II 12
polymorpha Böckeler II 22
„ squarrosa Vahl II 22
Fissidentaceae VII 145
Fistularia (L.) Wettst. VI/1 102
angustifolia Wettst. VI/1 109
Crista galli Wettst. VI/1 111
maior Wettst. VI/1 108
„ Rumelica Wettst. VI/1 106
Fistulinaceae VII 142
Fittonia E. Coem. VI/1 178
Fitzroya J. D. Hook. VII 151
Flacourtiaceae V/1 656; VII 190
Flacourtineae VII 1900
Flagellariaceae II 142
Flagellatae VII 136
Flaveria australasica Hook. VI/2 1366
Flindersia R. Br. V/1 52
Flindersioideae VII 184
Floerkea Willd. VII 186
Florideae VII 139
Fluéggea VII 185
Fluviales I 164; VII 152
Fluvialis minor Pers. I 146
Foeniculum Mill. V/2 1284; VII 194
Azoricum Mill. V/2 1287
capillaceum Gilib. V/2 1284, 1286
Carvi Lk. V/2 1182
dulce DC. V/2 1287
dulce Mill. V/2 1287
Foeniculum Karsten V/2 1284
officinale All. V/2 1284; VII 193 Fig. 1234
peucedanoides Jackson V/2 1298
piperatum Ten. V/2 1286
piperitum Presl V/2 1286
sativum Bertol. V/2 1287
segetum Presl V/2 1161
sylvestre Brot. V/2 1287
vulgare Mill. V/2 1284; VII 193 Fig. 1234
Foenugraecum officinale Alef. IV/3 1231
Fokienia Henry et Thomas VII 151
Foliosae VII 190
Folliculigera caerulea Pasquale IV/3 1233
„ graveolens Pasquale IV/3 1231
Fontanesia phillyreoides Labill. V/3 1903
Fontinalaceae VII 146
Forsteronia G. F. W Mey. V/3 2049
Forstiera acuminata Poir. V/3 1905
Forsythia Vahl V/3 1903
Europaea Degen et Baldacci V/3 1904
suspensa (Thunb.) Vahl V/3 1904
„ viridissima Lindl. V/3 1904
Fothergilla L. IV/2 655, 657
Fouquiera splendens Engelm. V/1 493
Fouquieraceae V/3 1895
Fouquierineae V/1 493; VII 200
Fourcróya Schult. VII 163
Fourcroya Cubensis Jacq. II 317
„ gigantea Vent. II 317, 320
Fragaria L. IV/2 895; VII 180 und 84 Fig. 1117
abnormis Tratt. IV/2 900
Ananassa Duchesne IV/2 896
Anserina Crtz. IV/2 889
aurea Crtz. IV/2 872
Breslingea Duchesne IV/2 904
calycina Mill. IV/2 896
campestris Stev. IV/2 904
Chiloënsis (L.) Ehrh. IV/2 896
collina Ehrh. IV/2 904
drymophila Jord. et Fourreau IV/2 906, 907
elatior Ehrh. IV/2 902
fruticosa Crtz. IV/2 816
grandiflora Ehrh. IV/2 896, 897
Hagenbachiana Lang et Koch IV/2 907
hybrida Duchesne IV/2 897
Indica Andrew IV/2 907
intermedia Bach IV/2 907
magna Thuill. IV/2 902
media Schur IV/2 906
moschata Duchesne IV/2 902
neglecta Lindem. IV/2 906, 907
palustris Crtz. IV/2 805
Pentaphyllum Crtz. IV/2 887
praecox Kit. IV/2 826
praestabilis Beck IV/2 907
pratensis Duchesne IV/2 902
reptans Crtz. IV/2 887
reversa Kit. IV/2 902
rubens Crtz. IV/2 875
rupestris Crtz. IV/2 831
sericea Christ IV/2 907
sterilis L. IV/2 826
Tormentilla Crtz. IV/2 882
umbelliformis F. Schultz IV/2 896
verna Crtz. IV/2 876
vesca L. IV/2 899
villosa Crtz. IV/2 868
Virginiana Duchesne IV/2 896
viridis Duchesne IV/2 904
vulgaris Ehrh. IV/2 899
Franciscea uniflora Pohl V/4 2555
Francoa appendiculata Cav. IV/2 567
„ ramosa Don IV/2 567
Francoideae VII 179
Frangula Mill. V/1 343; VII 187
Alnus Mill. V/1 344; VII 187
Californica Gray V/1 344
latifolia (L'Hérit.) V/1 343
latifolia Mill. V/1 340
pentaphylla Gilib. V/1 344
rupestris Brogniard V/1 349; VII 187
tomentella (Gray) V/1 344
vulgaris Borkh. V/1 344
„ Wulfenii Rchb. V/1 349
Frankenia hirsuta L. V/1 544
laevis L. V/1 544
„ pulverulenta L. V/1 544
Frankeniaceae V/1 543; VII 189
Franquevillea Salisb. V/3 1964
Franseria ambrosioides Cav. VI/1 497
Fraxinella Dictamnus Moench V/1 74
Fraxinus L. V/3 1919; II 197
Americana L. V/3 1922
aucubaefolia Kirchn. V/3 1934
Biltmoreana Beadle V/3 1934
Caroliniana Mill. V/3 1922
Catawbiensis Ashe V/3 1934
Chinensis Roxb. V/3 1920
coriariaefolia Scheele V/3 1920
excelsior L. V/3 1926; VII 54 Fig. 1088
floribunda hort. V/3 1922
florifera Scop. V/3 1922
glabra Lawson V/3 1934
Griffithii C. B. Clarke V/3 1920
integrifolia Moench V/3 1928
jaspidea Desf. V/3 1928
lanceolata Borkh. V/3 1922
Mariesii Hook. f. V/3 1922
monophylla Desf. V/3 1928
obliqua Tausch V/3 1922
Oregona Nutt. V/3 1920
Ornus L. V/3 1922; VII 198 Fig. 1238
oxycarpa Willd. V/3 1922
Pallisae Wilmot V/3 1921
Pennsylvanica C. K. Schneid. V/3 1922
Pennsylvanica Marsh. V/3 1922
rotundifolia DC. V/3 1924
serratifolia hort. V/3 1922
Sieboldiana Dippel V/3 1922
simplicifolia Willd. V/3 1928
Spaethiana Lingelsh. V/3 1922
Willdenowiana Koehne V/3 1922
Freesia refracta Klatt II 306; VII 165 Fig. 1199
Frerea Dalz. VII 199

Freycinetia Gaud. VII 152
Freyera cynapioides Griseb. V/2 993
„ tuberosa Rchb. V/2 993
Fritillaria L. II 239; VII 159
Burnati Planch. II 241
imperialis L. II 239, 241
Meleagris L. II 240
tenella Bieb. II 242
„ Tombeanensis Boiss. II 241
Fucaceae VII 139
Fucales VII 139
Fuchsia L. V/2 801; VII 31 Fig. 1053
arborescens Sims V/2 802
coccinea Ait. V/2 802
corymbiflora Ruiz et Pav. V/2 802
fulgens DC. V/2 802
globosa Lindl. V/2 802
gracilis Lindl. V/2 802
macrostemma Ruiz et Pav. V/2 801
microphylla Kunth V/2 801
procumbens R. Cunn. V/2 802
splendens Zucc. V/2 802
triphylla Humb. Bonpl. et Kth. „ V/2 802
Fucus VII 139
Fuirena pubescens (Lam.) Kunth VII 155
Fumana (Dunal) Spach V/1 579; VII 189
ericoides (Cavan.) Pau V/1 580
montana Pomel V/1 580
nudifolia (Lam.) Janchen V/1 581
Spachii Gren. et Godr. V/1 580
„ vulgaris Spach V/1 581
Fumaria Adans. IV/1 45, 176
acrocarpa Peterm. IV/1 50
Anatolica Boiss. IV/1 45
calycina Kit. IV/1 48
capnoides L. IV/2 43
capnoides Scop. IV/1 42
capreolata L. IV/1 46
cava Mill. IV/1 38
densiflora DC. IV/1 49
fabacea Retz. IV/3 41
Halleri Willd. IV/1 39
intermedia Ehrh. IV/1 41
Kraliki Jord. IV/1 45
lutea L. IV/1 42
media Loisel. IV/1 47
micrantha Lagasca IV/1 49
muralis Sonder IV/1 47
officinalis L. IV/1 47
parviflora Lam. IV/1 50
Petteri Koch IV/1 47
pumila Host IV/1 40
rostellata Knaf. IV/1 48
Schleicheri Soyer-Willemet IV/1 50
solida Mill. IV/1 39
spicata L. IV/1 45
Fumaria Sturmii Opiz IV/1 47
tenuifolia Gaertn., Mey., Scherb. IV/1 50
Vaillantii Loisel. IV/1 49
Wirtgeni auct. IV/1 50
„ Wirtgeni Koch IV/1 48
Fumarioideae IV/1 20; VII 176
Funariaceae VII 145
Fungi VII 135
„ imperfecti VII 143
Funkia lancifolia Spr. II 277
ovata Spr. II 277; VII 160 Fig. 1188
Funtunia Africana Benth. V/3 2049
Fusanus acuminatus R. Br. III 151

G.

Gaerdtia maculata Kl. V/1 667
Gagea Salisb. II 205; VII 159
arvensis Dum. II 207
Belgica Dum. II 209
Bohemica Roem. et Schult. II 207
Haeckelii Dufft et M. Schulze II 213
intermedia Rchb. II 212
Liotardi (Sternb.) Roem. et Schult. II 210
lutea Ker-Gawler II 211
minima Ker-Gawler II 209; VII 159
pratensis (Pers.) Roem. et Schult. II 211
pusilla Roem. et Schult. II 212
saxatilis Koch II 207
serotina Ker-Gawler II 213
silvatica Loud. II 211
spathacea Salisb. II 209; VII 159
stenopetala Rchb. II 211
Szovitsii Bess. II 208
Theobaldii Brügg. II 212
villosa Duby II 207
Welwitschii Beck II 213
Zauschneri Pascher II 208, 176
Gahnia Mariscus F. v. Muell. II 47
Gaillardia aristata Pursh VI/1 534
lanceolata Michx. VI/1 534
„ pulchella Fouq. VI/1 534
Galactites tomentosa Moench VI/2 926
Galanthus L. II 307; VII 162
Fosteri Baker II 308
latifolius Rupr. II 308
nivalis L. II 307
Octobrensis hort. II 309
„ Scharlokii Caspary II 308
Galasia villosa Cass. VI/2 1067
Galatella cana Nees VI/1 422
canescens Cass. VI/1 422
Dahurica DC. VI/1 417
Hauptii Lindl. VI/1 417
Linosyris Rchb. VI/1 420
Galax aphylla L. V/3 1713; VII 195
Gale Belgica Dum. III 11
Gale K. C. Schneid. III 11
„ palustris Chev. III 11
Galearia fragifera Presl IV/3 1316
„ resupinata Presl IV/3 1319
Galega L. IV/3 1387; VII 182
bicolor Boiss. et Hausskn. IV/3 1388
montana Schultes IV/3 1388
officinalis L. IV/3 1388, 1642 Fig. 1607
„ Orientalis Lam. IV/3 1388
Galegeae IV/3 1382; VII 182
Galeobdolon amplexicaule Moench V/4 2452
galeopsis Curt. V/4 2441
luteum Huds. V/4 2441
montanum Rchb. V/4 2443
„ vulgare Pers. V/4 2441
Galeopsis L. V/4 2457; VII 203
acuminata Rchb. V/4 2468
angustifolia Ehrhart V/4 2459
bifida Boenningh. V/4 2467
canescens Schult. V/4 2460
cannabina Gmel. V/4 2463
cannabina Pollich V/4 2462
cannabina Roth V/4 2467
dubia Leers V/4 2462
elegans Bor. V/4 2462
Eversi Evers V/4 2465
Eversiana Murr V/4 2465
Galeobdolon L. V/4 2441
glandulosa C. Koch V/4 2461
grandiflora Bluff et Fingerhut V/4 2459
grandiflora Roth V/4 2462
infallibilis Erdner V/4 2468
intermedia Heidenr. V/4 2468
intermedia Vill. V/4 2460
Ladanum L. V/4 2460
latifolia Hoffm. V/4 2461
latifolia Sut. V/4 2462
leiotricha Borb. V/4 2467
leucantha Jord. V/4 2466
Ludwigii Hausskn. V/4 2468
nodosa St. Lager V/4 2465
ochrerythra E. H. L. Krause V/4 2468
ochroleuca Lam. V/4 2462
parviflora Lam. V/4 2460
parviflora Murith V/4 2462
polychroma Beck V/4 2468
Poolii Brügg. V/4 2468
prostrata Vill. V/4 2462
pubescens Bess. V/4 2463
Pyrenaica Bartl. V/4 2458
Reichenbachii Reut. V/4 2466
Reuteri Rchb. f. V/4 2457
segetum Reichard V/4 2462
speciosa Mill. V/4 2467
tetrachista Wimm. et Grab. V/4 2465
Tetrahit L. V/4 2465

Galeopsis Tetrahit L. subsp. bifida Fries V/4 2467
variegata Wanderoth V/4 2463
versicolor Curt. V/4 2467
versicolor Curtis var. parviflora Metsch V/4 2467
versicolor Spenn. V/4 2463
villosa Huds. V/4 2462
Walteriana Schlecht. V/4 2463
„ Wirtgeni Ludwig V/4 2468
Galinsoga Ruiz et Pav. VI/1 523; VII 211
brachystephana hort. Berol. VI/1 524
brachystephana Reg. VI/1 524
Caracasana Schultz-Bip. VI/1 523
hispida Benth. VI/1 523
parviflora Cavan. VI/1 524
quadriradiata Ruiz et Pav. VI/1 523
quinqueradiata Ruiz et Pav. VI/1 524
Galinsogaea Zucc. VI/1 523; VII 211
Galipea Aubl. V/1 51; VII 184
Galium L. VI/1 207; VII 207
aberrans Beck VI/1 230
agreste Wallr. var. echinospermum Wallr. VI/1 229
agreste Wallr. var. leiospermum Wallr. VI/1 229
Anglicum Huds. VI/1 230
anisophyllum Vill. VI/1 218
Aparine L. VI/1 228; VII 75 Fig. 1111
approximatum Gren. et Godr. VI/1 230
arenarium Loisel. VI/1 208
aristatum auct. VI/1 210
aristatum L. VI/1 210
asperum Schreber VI/1 217
Baldense Spreng. VI/1 220
Bauhini R. et Sch. VI/1 225
Baumgartneri Beck VI/1 230
boreale L. VI/1 223
chloranthum Brotero VI/1 226
cinereum All. VI/1 214
cruciatum (L.) Scop. VI/1 225
digeneum Kern. VI/1 230
eminens Gren. et Godr. VI/1 230
erectum DC. VI/1 213
Gerardi Vill. VI/1 213
glabrum Hoffm. VI/1 217
glabrum Röhl. VI/1 225
glaucum L. VI/1 202
gracile Wallr. VI/1 230
Grenchense Lüscher VI/1 230
Helveticum Rchb. VI/1 220
Helveticum Weig. VI/1 219
Hercynicum Weig. VI/1 219
infestum Waldst. et Kit. VI/1 229
Insubricum Gaud. VI/1 213
intercedens Kern. VI/1 230
intermedium Schur VI/1 210
Galium levigatum L. VI/1 210
litigiosum DC. VI/1 230
lucidum All. VI/1 213
margaritaceum A. Kern. VI/1 221
mesocarpon H. Br. VI/1 224
Mollugo L. VI/1 212; VI/2 1363
Mollugo L. subsp. erectum (Huds.) Briq. VI/1 213
Mollugo L. subsp. Gerardi Briq. VI/1 213
Mollugo L. subsp. Tiroliense (Willd.) Hay. VI/1 213
murale L. VI/1 208
ochroleucum Wolff VI/1 230
Palatinum F. Schultz VI/1 230
palustre L. VI/1 221
Parisiense L. VI/1 229
Pedemontanum (Bell.) All. VI/1 226; VI/2 1362
Preissmanni Hay. VI/1 230
pumilum Koch VI/1 218
pumilum Lam. VI/1 208
purpureum All. VI/1 214
purpureum L. VI/1 216
pusillum L. VI/1 208
pusillum Sm. VI/1 217
retrorsum DC. VI/1 226
rigidum Vill. VI/1 213
rivale Griseb. VI/1 200
rotundifolium L. VI/1 224; VI/2 1363
rubidum Jord. VI/1 215
rubioides L. VI/1 224; VI/2 1363
rubrum L. VI/1 214
saccharatum All. VI/1 227
saxatile (L.) Fl. Wettst. VI/1 219
scabrum Jacq. VI/1 217
scabrum Mert. et Koch VI/1 214
Schultesii Vest VI/1 210
silvaticum L. VI/1 209; VI/2 1363
silvaticum Schultes VI/1 210
silvestre Poll. VI/1 217
spurium L. VI/1 229
Sudeticum Tausch VI/1 219
tenuissimum Bieb. VI/1 208
tricorne Stok. VI/1 227
trifidum L. VI/1 222
triflorum Michx. VI/1 230
uliginosum L. VI/1 221
umbellatum Lam. VI/1 217
Vaillantia Aschers. VI/1 227
Vaillantii DC. VI/1 229
Valantia Web. VI/1 227
vernum Scop. VI/1 225
verum L. VI/1 215; VI/2 1363
verum L. subsp. praecox (Lang) Petrak VI/1 216
Wirtgeni F. Schultz VI/1 216
Gallitrichum virgatum Jord. et Fourr. V/4 2495
Galtonia candicans Decaisne II 279
Gamopetalae III 6; V/3 1567; VII 195
Garcinia Cola Heckel V/1 502
Hanburyi Hook. f. V/1 501
Indica L. V/1 502
Mangostana L. V/1 502
Morella Desr. V/1 501
„ pictoria (Roxb.) Pierre V/1 501
Gardenia florida L. VI/1 197
Gardoquia betonicoides Lindl. V/4 2368
grandiflora Kth. V/2 2281
„ Hookeri Benth. V/4 2280
Garryaceae VII 167
Garryales VII 167
Gasparrinia peucedanoides (Bieb.) Thellung V/2 1298
„ virescens Bertol. V/2 1298
Gasteria disticha Haw. II 277
Gasteromycetes VII 143
Gastridium lendigerum (L.) Gaud. I 222
Gaudinia fragilis Pal. I 262, 154
Gaultheria procumbens L. V/3 1620, 1621; VII 196
„ Shallon Pursh V/3 1621; VII 196
Gaura biennis L. V/2 800
Lindheimeri Engelm. V/2 800
„ parviflora Dougl. V/2 800
Gaya Gaud. V/2 1314
„ simplex Gaud. V/2 1323
Gaylussacia dumosa (Andr.) Torr. et Gray V/3 1621
„ resinosa Torr. et Gray V/3 1622
Gazania Gaertn. VI/2 806
longiscapa DC. VI/2 806
Pavonia R. Br. VI/2 806
pinnata (Thunb.) Less. VI/2 806
rigens R. Br. VI/2 806
„ uniflora Sims VI/2 806
Geissolomataceae V/2 697; VII 191
Geissospermum Vellozii Fr. Allem. V/3 2050
Geitonoplesium A. Cunn. VII 162
Gelsemium nitidum Michx. V/3 1951
„ sempervirens Ait. V/3 1951, 1952
Genista L. IV/3 1198; VII 182
alpilaburnum Krause IV/3 1165
Anglica L. IV/3 1209; VII 182
angulata Poir. IV/3 1182
argentea Noulet IV/3 1160
Austriaca Scheele IV/3 1173
Brutia Parl. IV/3 1209
capitata Scheele IV/3 1175
decumbens Willd. IV/3 1203
elatior Koch IV/3 1202
Fritschii Rechinger IV/3 1213
Genuensis Pers. IV/3 1199
Germanica L. IV/3 1210
glabra Spach IV/3 1182
glabrescens Briquet IV/3 1171

Genista gracilis Poir. IV/3 1202
Halleri DC. IV/3 1207
herbacea Lam. IV/3 1196
Hispanica Ger. IV/3 1213
Hispanica Wulf. IV/3 1212
humifusa Jacq. IV/3 1208
humifusa Thore IV/3 1203
Januensis Viv. IV/3 1199
Laburnum Krause IV/3 1162
minor Lam. IV/3 1209
monosperma (L.) Lam. IV/3 1199
nigricans Scheele IV/3 1169
nubigena Lk. IV/3 1168
pilosa L. IV/3 1203
ovata Waldst. et Kit. IV/3 1202
pedunculata L'Hérit. IV/3 1206
Perreymondi Loisel. IV/3 1202
polytricha Scheele IV/3 1177
prostrata Lam. IV/3 1207
purpans L. IV/3 1168
purpurea Scheele IV/3 1180
radiata Scop. IV/3 1193
repens Lam. IV/3 1203
sagittalis L. IV/3 1196
scoparia Lam. IV/3 1182
sericea Wulf. IV/3 1205
Sibirica Rchb. IV/3 1202
silvestris Scop. IV/3 1212
Tabernaemontani Scheele IV/3 1173
tinctoria L. IV/3 1199
triangularis Kit. IV/3 1199
triquetra Waldst. et Kit. IV/3 1199
villosa Lam. IV/3 1210
„ vulgaris Gray IV/3 1182
Genisteae IV/3 1147; VII 182
Genistella Moench IV/3 1195; VII 182
racemosa Moench IV/3 1196
sagittalis (L.) Gams IV/3 1196
Genistoides tinctoria Moench IV/3 1202
„ tuberculata Moench IV/3 1203
Gentiana Tournef. V/3 1979; VII 198
acaulis L. V/3 2007
acaulis L. var. alpina Griseb. V/3 2013
acaulis L. var. latifolia Gren. et Godr. V/3 2011
aestiva Koch V/3 2016
aestiva R. et Sch. V/3 2016
algida Pall. V/3 2003
algida Pall. var. frigida Kusnez. V/3 2003
alpina Rchb. V/3 2003
alpina Strobl V/3 2011
alpina Vill. V/3 2013
Amarella L. V/3 2044
Amarella L. subsp. lingulata Hartm. V/3 2045
Gentiana Amarella L. subp. uliginosa Willd. V/3 2045
Amarella Mert. et Koch V/3 2045
ambigua Hay. V/3 2047
amoena Clarke V/3 1979
angulosa auct. V/3 2016
angulosa Bieb. V/3 2016
angulosa Rchb. V/3 2016
angustifolia Rchb. V/3 2003
angustifolia Vill. V/3 2013
anisodonta Borb. V/3 2032
antecedens Wettst. V/3 2033
asclepiadea L. V/3 1998
aspera Hegetschw. V/3 2035
Austriaca A. et J. Kern. V/3 2041
axillaris F. W. Schmidt V/3 2045
Bavarica L. V/3 2021
Bavarica L. var. subacaulis Schleich. V/3 2022
Bavarica Schur V/3 2018
borealis Bunge V/3 2026
brachyphylla Vill. V/3 2017
brachyphylla Vill. var. subacaulis Gremli V/3 2018
Burseri Lapeyr. V/3 1982
calycina Wettst. V/3 2032
calycina (Koch) Wettstein f. Engadinensis Wettst. V/3 2033
campanulata Jacq. V/3 1994
campestris L. V/3 2029
campestris L. subsp. Baltica Murbeck V/3 2031
campestris L. subsp. campestris (L.) V/3 2030
Carinthiaca Froel. V/3 1977
Carnica Welw. V/3 2003
Caucasica Janka V/3 2043
Centaurium L. V/3 1969
Charpentieri Thomas V/3 2046
chlorifolia Nees V/3 2037
ciliata L. V/3 2028
Clusii Perr. et Song. V/3 2007
compacta Hegetschw. V/3 2040
coriacea St. Lager V/3 2007
Costei Br.-Bl. V/3 2010
Cruciata L. V/3 2004
Denneri Goldschmid V/3 2047
digenea Jak. V/3 2047
Doerfleri Ronn. V/3 2046
Engadinensis (Wettst.) Br.-Bl. et Samuelsson V/3 2033
excisa Koch V/3 2011
Fatrae Borb. V/3 2042, 2044
Favrati Rittener V/3 2018
filiformis L. V/3 1965
firma A. Kern. V/3 2007
frigida Haenke V/3 2003
Froelichii Jan V/3 2003
Gaudiniana Thomas V/3 2046
Germanica Willd. V/3 2036, 2038
Gentiana Germanica Willd. subsp. Kerneri (Dörfl. et Wettst.) Schinz et Thellung V/3 2038
grandiflora Lam. V/3 2007
Guinieri Beauv. V/3 2047
Hegetschweileri Ronniger V/3 2046
Hellwegeri Hut. V/3 2047
Hladnikiana Host V/3 2003
humilis Roch. V/3 2025, 2026
hybrida Schleich. V/3 2046
hybrida Vill. nec Schleich. V/3 2046
Jaccardii Wilczek V/3 2046
imbricata auct. V/3 2022
imbricata Froel. V/3 2020
imbricata Willk. V/3 2020
intermedia Harz V/3 2046
Kesselringii Reg. V/3 1981
Kochiana Perr. et Song. V/3 2011
Koenigii Gunn. V/3 2026
Kummeriana Sendtner V/3 2046
Kusnezowiana Ronniger V/3 2047
Laengstii Hausm. V/3 2046
lancifolia Rafin. V/3 2045
latifolia Jakowatz V/3 2011
Livornica Eschscholtz V/3 2045
lutea L. V/3 1988
macrocalyx Čelak. V/3 2047
minima Lob. V/3 2025
minima Vill. V/3 2026
montis Benedicti Harz V/3 2046
Murbeckii Wettst. V/3 2040
nana Wulf. V/3 2027
nivalis L. V/3 2025
nutans Bunge V/3 2006
obtusifolia Boiss. V/3 2018
obtusifolia Koch V/3 2037
obtusifolia Rchb. V/3 2040
obtusifolia Willd. V/3 2035
obtusifolia Willd. var. Uechtritzii Sag. et Schneid. V/3 2043
orbicularis Schur V/3 2018, 2019, 2022
palustris All. V/3 1974
paniculata Lam. V/3 1974
Pannonica Scop. V/3 1997
perfoliata L. V/3 1966
Peruviana Lam. V/3 1971
phlogifolia Schott et Kotschy V/3 1982
pilosa Wettst. V/3 2034
Pneumonanthe L. V/3 2000
praecox A. et J. Kern. V/3 2043
praeflorens Wettst. V/3 2042
pratensis Froel. V/3 2045
prostrata Haenke V/3 2006
pseudo-symphyandra Ronniger V/3 2046
pulchella Sw. V/3 1972

Gentiana pumila Jacq. V/3 2020
punctata Jacq. nec L. V/3 1997
punctata L. V/3 1994
purpurascens Griseb. V/3 2046
purpurea Gebhard V/3 1997
purpurea L. V/3 1995
pyramidalis Rchb. V/3 2044
Pyrenaica L. V/3 2007
Raetica A. et J. Kern. V/3 2039
ramosa Hegetschw. V/3 2040
ramosissima Vill. V/3 1972
Richenii Wettst. V/3 2047
Rostani Reut. V/3 2023
rotundifolia Hoppe V/3 2022
rubra Clairv. V/3 2046
Ruebeliana Wettst. V/3 2047
Sabauda Beauv. V/3 2047
Sabauda Boiss. et Reut. V/3 2013
Schinzii Ronniger V/3 2047
Schroeteri Wettst. V/3 2047
septemfida Pall. V/3 1956
solstitialis Wettst. V/3 2037
spathulata Bartl. V/3 2043
spuria Lebert V/3 2046
Sturmiana A. et J. Kern. V/3 2035
tenella Rottboell V/3 2026
Tergestina Beck V/3 2016
Terglouensis Hacq. V/3 2020
tetragona Roth V/3 2026
Thomasii Gillaboz V/3 2046
Thomasii Hall. f. V/3 2046
Tiroliensis Handel-Mazzetti V/3 2047
Triglaviensis Paulin V/3 2020
utriculosa L. V/3 2023
verna Arcangeli V/3 2016
verna Bertoloni V/3 2017
verna L. V/3 2014
verna L. subvar. pseudo-Tergestina Schinz et Thellung V/3 2016
verna L. var. brachyphylla Grisebach V/3 2017
verna L. var. Hinterhuberi Schultz V/3 2018
verna L. var. pumila Arcangeli V/3 2020
Victorinii Fern. V/3 2029
Villarsii Griseb. V/3 1982
vulgaris Beck V/3 2007
Wettsteinii Murbeck V/3 2036, 2038
Gentianaceae V/3 1953; VII 197
Gentianella ciliata Borkh. V/3 2028
Gentianoideae V/3 1954; VII 197
Geoglossaceae VII 141
Georgiaceae VII 146
Georgina Willd. VI/1 529
„ coccinea Willd. VI/1 530
Geracium chondrilloides Rchb. VI/2 1144
incarnatum Rchb. VI/2 1160
Geracium paludosum Rchb. VI/2 1153
parviflorum Rchb. VI/2 1160
„ praemorsum Rchb. VI/2 1157
Geraniaceae IV/3 1656; VII 184
Geraniales IV/3 1643; VII 183
Geraniospermum odoratissimum O. Kuntze IV/3 1665
zonale O. Kuntze IV/3 1663
Geranium L. IV/3 1668; VII 184
acaule L. IV/3 1723
aconitifolium Eichw. IV/3 1688
aconitifolium L'Hérit. IV/3 1686
aconitifolium Schur IV/3 1682
acrocarpum Ledeb. IV/3 1705
Africanum Cav. IV/3 1665
albiflorum Hook. IV/3 1671
angulatum Curt. IV/3 1682
angustifolium Gilib. IV/3 1681
arenarium Burm. f. IV/3 1724
argenteum L. IV/3 1675
argenteum Lucé IV/3 1701
asphodeloides Burm. IV/3 1675
atrum Moench IV/3 1671
Austriacum Wiesbaur IV/3 1691
batrachioides Cav. IV/3 1682
batrachioides Rupr. IV/3 1688
Besseranum Camus IV/3 1715
bipinnatum Cav. IV/3 1722
Bohemicum Krock. IV/3 1696
Bohemicum L. IV/3 1697
caeruleatum Schur IV/3 1687
caeruleo-purpureum Gilib. IV/3 1682
caeruleum Gilib. IV/3 1688
caeruleum Moench IV/3 1697
Caroli principis Pantu IV/3 1687
Carolinianum L. IV/3 1671
cicutarium L. IV/3 1719
cinereum Cav. IV/3 1672
collinum Steph. IV/3 1671
columbinum L. IV/3 1679
Core Kostel. IV/3 1705
crassifolium Forskal IV/3 1717
diffusum Picard IV/3 1679
dissectum L. IV/3 1681
divaricatum Ehrh. IV/3 1696
divaricatum Loisel. IV/3 1697
dubium Chaix IV/3 1703
duplicatum Kit. IV/3 1707
Endressii Gay. IV/3 1671
foetidum Gilib. IV/3 1712
furcatum Kit. IV/3 1692
gracile Schrenk IV/3 1679
grandiflorum Andr. IV/3 1665
grandiflorum Gilib. IV/3 1676
grandiflorum Güldenst. IV/3 1671
graveolens Stok. IV/3 1712
hybridum Hausskn. IV/3 1715
Ibericum Cav. IV/3 1671
Geranium incisum Nutt. IV/3 1671
inquinans L. IV/3 1664
laevigatum Royle IV/3 1710
lanuginosum Jacq. IV/3 1671
Lavergneanum Léveillé IV/3 1694
Lebelii Bor. IV/3 1714
linearilobum DC. IV/3 1672
lividum L'Hérit. IV/3 1690, 1692
longipedatum St. Lager IV/3 1671
Lucanum Gasp. IV/3 1701
lucidum L. IV/3 1710
Luganense Chenevard IV/3 1702, 1715
lugubre Salisb. IV/3 1708
macropetalum Posp. IV/3 1703
macrorrhizum L. IV/3 1708
macrostylum Boiss. IV/3 1672
maculatum L. IV/3 1671
malvaceum Burm. IV/3 1679
malvaefolium Schleich. IV/3 1701
malvaefolium Scop. IV/3 1703
maritimum Ucria IV/3 1717
molle Fl. Wetterau IV/3 1700
molle L. IV/3 1701
molloides Formánek IV/3 1692
napellifolium Schur IV/3 1689
Neapolitanum Nyman IV/3 1688
nodosum L. IV/3 1707
novum Winterl IV/3 1696
odoratum Burm. f. IV/3 1664
Oenense Borbás IV/3 1716
oreades Pančič. IV/3 1687
pallidum Salisb. IV/3 1679
palmatum Picard IV/3 1681
palustre L. IV/3 1692
parviflorum Curt. IV/3 1703
patulum Vill. IV/3 1692
pentandrum Gilib. IV/3 1719
peregrinum Thellung IV/3 1671
perenne Huds. IV/3 1700
phaeum L. IV/3 1690
potentilloides L'Hérit. IV/3 1681
pratense L. IV/3 1688
propinquum Salisb. IV/3 1705
purpureum Gilib. IV/3 1692
purpureum Vill. IV/3 1714
pusillum Burm. IV/3 1703
Pyrenaeum Bub. IV/3 1700
Pyrenaicum Burm. IV/3 1700
radicatum Bieb. IV/3 1672
reflexum L. IV/3 1690, 1692
revolutum Jacq. IV/3 1665
Richardsonii Fisch. IV/3 1671
rivale Vill. IV/3 1686
rivulare Vill. IV/3 1686
Robertianum L. IV/3 1712
roseo-caeruleum Gilib. IV/3 1679

Geranium rotundifolium L. IV/3 1705
rotundifolium Poll. IV/3 1703
rubellum Moench IV/3 1712
Rupertianum Beckh. IV/3 1712
Ruthenicum Uechtr. IV/3 1696
sanguineum IV/3 1676
saxatile Bub. IV/3 1710
semiorbiculare hort. IV/3 1705
Sibiricum L. IV/3 1694
silvaticum L. IV/3 1682
striatum Clairv. IV/3 1686
striatum L. IV/3 1672
subcoeruleum Schleich. IV/3 1692
Tauricum Steph. IV/3 1671
Transsilvanicum Schott et Kotschy IV/3 1687
tuberosum L. IV/3 1672
variabile Moench IV/3 1694
venosum Pers. IV/3 1682
Villarsianum Jord. IV/3 1714
villosum Rchb. IV/3 1702
viscidulum Fries IV/3 1705
viscosum Gilib. IV/3 1705
viscosum Mill. IV/3 1719
Wallichianum D. G. Don IV/3 1672
Winterl Roth IV/3 1696
Wlassowianum Fisch. IV/3 1671
Zermattense F. O. Wolf IV/3 1715
„ zonale L. IV/3 1663
Gerbera Anandria (L.) Schultz-Bip. VI/2 992
Germanea urticifolia Lam. V/4 2270
Geropogon glaber L. VI/2 1043
Gesnera hort. VI/1 177
Gesneraceae VI/1 176; VII 205
Geum L. IV/2 913; VII 181
Aleppicum Jacq. IV/2 920
ambiguum Schur IV/2 921
Billietii Gillot IV/2 921
Canadense Murray IV/2 920
Caryophyllata Gilib. IV/2 917
chamaedrifolium Crtz. IV/2 922
coccineum Sibth. et Sm. IV/2 914
heterocarpum Boiss. IV/2 914
hispidum Klinggraeff IV/2 920
Jankae Beck IV/2 921
Japonicum Thunb. IV/2 914
inclinatum Hegetschw. IV/2 913
inclinatum Schleich. IV/2 921
inclinatum Schur IV/2 920
intermedium Bieb. IV/2 920
intermedium Ehrh. IV/2 921
Laxmanni hort. IV/2 921
macrophyllum Willd. IV/2 914
Meinshausenii Gams IV/2 921
montanum L. IV/2 909
Geum nutans Crtz. IV/2 915
Pyrenaicum Willd. IV/2 914
reptans L. IV/2 911
rivale L. IV/2 915
rubifolium Lejeune IV/2 921
Sadleri Friv. IV/2 914
spurium Fisch. et Mey. IV/2 921
strictum Ait. IV/2 920
Teszlense Simonkai IV/2 921
Thomasianum Ser. IV/2 921
urbano-rivale Schiede IV/2 921
urbanum L. IV/2 917
„ vicanum Schur IV/2 919
Ghinia Bub. IV/1 333
alpina Bub. IV/1 350
amara Bub. IV/1 348
hirsuta Bub. IV/1 340
impatiens Bub. IV/1 339
pratensis Bub. IV/1 345
resedifolia Bub. IV/1 351
„ silvatica Bub. IV/1 342
Gifola Germanica Rchb. VI/1 451
„ vulgaris Cass. VI/1 451
Gigachilon Polonicum Seidl I 394
Gigartinaceae VII 139
Gigartinales VII 139
Gilia aggregata Spr. V/3 2114
capitata Dougl. V/3 2114
densiflora Benth. V/3 2113
grandiflora A. Gray V/3 2117
liniflora Benth. V/3 2113
lutea Steud. V/3 2113
„ tricolor Benth. V/3 2113
Ginkgo biloba L. I 74; VII 150
Ginkgoales I 74; VII 150
Giradinia heterophylla Decne. III 137
Githago segetum Lk. III 273
Gladiolus L. II 302; VII 163
Boucheanus Schlechtend. II 303
cardinalis Curt. II 302
communis L. II 302
communis Sibth. et Sm. II 303
dubius Guss. II 303
Galiciensis Bess. II 304
Gandavensis van Houtte II 302
Illyricus Koch II 305
imbricatus L. II 304
neglectus Schult. II 304
paluster Gaud. II 303; VII 81 Fig. 1115
pratensis Dietr. II 303
psittacinus Hook. II 302
refractus Jacq. II 306
segetum Ker-Gawler II 303
tenuis Bieb. II 304
„ vittatus Hornem. II 302
Glastum Rupp. IV/1 192
Glaucium Hill IV/1 23; VII 176
corniculatum (L.) Curt. IV/1 24
Glaucium Diedickianum Reinecke IV/1 24
flavum Crtz. IV/1 23
fulvum Loisel. IV/1 23
„ luteum Scop. IV/1 23
Glaux L. V/3 1865; VII 197
„ maritima L. V/3 1865
Glechoma L. V/4 2372; VII 201
arvensis L. V/4 2415
Cataria O. Kuntze V/4 2369
hederaceum L. V/4 2373
hirsuta Waldst. et Kit. V/4 2375
magna Mérat V/4 2375
Marrubiastrum Vill. V/4 2415
nuda O. Kuntze V/4 2371
rigida Kern. V/4 2375
„ Sibirica O. Kuntze V/4 2368
Gleditschia L. VII 181
aquatica Marsh. IV/3 1129
Caspica Desf. IV/3 1129
horrida Willd. IV/3 1129
Japonica Miq. IV/3 1129
Sinensis Lam. IV/3 1129
spinosa Marsh. IV/3 1128
„ triacanthos L. IV/3 1128
Gleicheniaceae VII 148
Glinus L. VII 172
Globba L. II 321; VII 163
Globocarpus Caruel V/2 1249
Globularia L. VI/1 172; VI/2 1363; VII 205 und 22 Fig. 1037
bellidifolia Ten. VI/1 174
cordifolia L. VI/1 173
elongata Hegetschw. et Heer VI/1 173
Linnaei Rouy VI/1 172
nudicaulis L. VI/1 174
vulgaris L. VI/1 172
„ Willkommii Nym. VI/1 172
Globulariaceae VI/1 171; VII 205
Gloriosa superba L. II 199
Glossostemon Brugueri Desf. V/1 492
Glumiflorae II 130; VII 152 u. 5 Fig. 975
Gluta Renghas L. V/1 216
Glyceria R. Br. I 318; VII 155
airoides Rchb. I 288
altissima Garcke I 321
aquatica Presl I 288
aquatica (L.) Wahlenb. I 321
Borreri Bab. I 323
distans Wahlenb. I 323
fluitans R. Br. I 319
intermedia Klinggraeff I 323
intersita Hausskn. I 323
loliacea Godr. I 381
maritima Wahlenb. I 324
nemoralis Uechtr. et Koern. I 321
Norwegica Sommerf. I 322
pendula Blytt I 322
permixta Guss. I 323

Glyceria plicata (L.) Fries I 320
plicata Ritschl I 321
remota Aschers. I 321
remota Fries I 322
„ spectabilis Mert. et Koch I 321
Glycine L. VII 183
Apios L. IV/3 1625
frutescens L. IV/3 1387
hispida (Moench) Maxim. IV/3 1620
Sinensis Sims IV/3 1386
Soja (L.) Sieb. et Zucc. IV/3 1621
subterranea L. f. IV/3 1624
Ussuriensis Regel et Maack IV/3 1621
Glycyrrhiza L. IV/3 1453; VII 182
echinata L. IV/3 1454
„ glabra L. IV/3 1454
Glyptostrobus Endl. VII 151
Gnaphalium L. VI/1 462; VII 209
alpinum Sturm VI/1 457
ambiguum Brügg. VI/1 469
angustifolium Lam. VI/1 470
arenarium L. VI/1 470
arvense L. VI/1 453
Carpaticum Wahlenb. VI/1 457
dioecum L. VI/1 456
Einseleanum Dalla Torre et Sarnth. VI/1 463
fuscatum Pers. VI/1 464
fuscum Lam. VI/1 464
Gallicum L. VI/1 454
Germanicum L. VI/1 451
Hoppeanum Koch VI/1 465
Indicum L. VI/1 462
Italicum Roth VI/1 470
lanatum hort. VI/1 470
Leontopodium Pospichal VI/1 460
Leontopodium Scop. VI/1 458
lutea-album L. VI/1 467
margaritaceum L. VI/1 494
minimum L. VI/1 454
montanum L. VI/1 454
neglectum Soy.-Will. VI/1 455
Norvegicum Gunnerus VI/1 464
nudum Hoffm. VI/1 469
petiolatum L. VI/1 470
plantagineum L. VI/1 462
pusillum Haenke VI/1 466
Rompelii Murr VI/1 469
silvaticum L. VI/1 463
silvaticum L. var. alpinum Neilr. VI/1 465
Stoechas Host VI/1 470
supinum L. VI/1 466
supinum L. var. Hoppeanum Fiori VI/1 465
tomentosum Hoffm. VI/1 469
Traunsteineri Murr VI/1 469
uliginosum L. VI/1 468
undulatum L. VI/1 462
Gnaphalodes Adans. VI/1 449; VII 209
Gnetales I 74; VII 151
Gnetum I 74; VII 151
Gnidia L. V/2 701
Gnomoniaceae VII 141
Godetia Spach V/2 865; VII 192
Goethea strictiflora Hook. V/1 457
Gohoria Necker V/2 1170
Goldfussia Nees VI/1 178; VII 215
Gomortegaceae IV/1 16; VII 176
Gomphocarpus fruticosus (L.) R. Br. V/3 2059
Gomphrena globosa L. III 261
Gonatopus Engl. VII 157
Goniolimon Boiss. VII 197
Goniolimon Tataricum Boiss. V/3 1880
Goniolobium Austriacum Beck IV/1 441
Gonioma E. Mey. VII 198
Gonystilaceae V/1 426; VII 188
Goodeniaceae VI/1 393; VI/2 1359; VII 209
Goodyera R. Br. II 390; VII 165
„ repens R. Br. II 390
Gordonia Altamaha Sarg. V/1 498
„ Lasianthus L. V/1 498
Gorinkia campestris Presl IV/1 441
Gossypium L. V/1 460; VII 188
Gouania L. V/1 322; VII 187
Grabowskia Schlecht. VII 203
Grafia Rchb. V/2 1087; VII 194
Golaka (Hacquet) Rchb. V/2 1087
Gramina I 165; VII 153 u. 5 Fig. 975
Graminales VII 153
Grammarthron biligalatum Cass. VI/2 724
„ scorpioides Cass. VI/2 720
Grammitis leptophylla Sw. I 40
Grammocarpus caeruleus Schur IV/3 1233
„ procumbens Schur IV/3 1234
Grammopetalum C. A. Mey. V/2 1131
Grammopetalum Hoffmannii C. A. Mey. V/2 1132
Grantia Griff. VII 158
„ globosa Griff. II 142
Graphephorum Desv. I 317; VII 155
arundinaceum Aschers. I 317
„ festucaceum A. Gray I 317
Graphidineae VII 143
Gratiola L. VI/1 38; VII 204
officinalis L. VI/1 38; VI/2 1360; I/LXXXIX Fig. 107
„ Virginiana L. VI/1 38
Gravesia guttata Triana V/2 796
Gravia Steud. V/2 1087
Greggia montana Griseb. IV/1 374
Gregoria Duby V/3 1787; VII 196
Vitaliana Duby V/3 1787
Grevillea R. Br. VII 170 Fig. 1210
Grewia L. V/1 429
Greyia Sutherlandii Harv. V/1 309
Grielum L. VII 181
Grimmiaceae VII 145
Grindelia decumbens Greene VI/1 448
squarrosa (Pursh) Dum. VI/1 448
Gronovia scandens L. V/1 662
Grossularia rubra Scop. IV/2 648
Uva-crispa Mill. IV/2 645
uvi Scop. IV/2 645
„ vulgaris Spach IV/2 645
Grubbiaceae III 160; VII 169
Gruinales IV/3 1643; VII 183
Grusonia F. Rchb. V/2 668
Guajacum officinale L. V/1 39
„ sanctum L. V/1 39
Guenthera Andrz. IV/1 229
„ elongata C. A. Mey. IV/1 233
Guepinia Iberis Desv. IV/1 72
„ nudicaulis Bast. IV/1 72
Guilandina dioeca L. IV/3 1129
Guizotia Abyssinica (L.) Cass. VI/1 532
„ oleïfera DC. VI/1 532
Gunnera Chilensis Lam. V/2 895
insignis (Oerst.) DC. V/2 895
Magellanica Lam. V/2 895
„ scabra Ruiz et Pav. V/2 895
Gurania Cogn. VII 208
Gutierrezia Euthamiae Torr. et Gray VI/1 449
Guttiferae V/1 498; VII 189
Guttulinaceae VII 136
Gymnadenia R. Br. II 367; VII 164
Abelii Hay. II 367
albida (L.) Rich. II 368
bifolia Mey. II 372
Chodati Lendner II 371
conopea R. Br. II 369; VII 3 Fig. 970 c
cucullata Rich. II 368; VII 164
Facchinii Dalla Torre et Sarnth. II 371
Heufleri Wettst. II 367
Legrandiana Camus II 371
lucida Schur II 368
micrantha Wettst. II 367
pseudoconopea Gren. II 370
rubra Wettst. II 366
Schweinfurthii Hegelmaier II 371
Strampfii Aschers. II 371
„ viridis Lindl. II 363
Gymnanacamptis Aschers. et Graebn. II 371
Gymnema silvestre (Willd.) R. Br. V/3 2063
Gymnigritella Abelii Aschers. et Graebn. II 367

Gymnigritella Heufleri G. Camus II 367
„ suaveolens G. Camus II 367
Gymnoascaceae VII 140
Gymnocladus Canadensis Lam. IV/3 1129
„ dioeca (L.) Koch IV/3 1129
Gymnocarpeae VII 143
Gymnochine leucocephala Cass. VI/2 616
macrophylla Bluff et Fingerh. VI/2 616
Gymnogramme Desv. I 40; VII 149
leptophylla (L.) Desv. I 40
„ Marantae Mett. I 39
Gymnospermae I 72; VII 150
Gymnosporangium sabinae (Dicks.) Winter IV/2 703
Gymnosporia Wight et Arn. VII 187
Gynandrae VII 164
Gynandria II 395; VII 164
Gynerium argenteum Nees I 173, 372; VII 155
Gypsophila L. III 309; VII 173
acutifolia Fisch. III 310
agrestis Pers. III 310
arenaria Waltst. et Kit. III 313
arvensis Borckh. III 310
cerastoides Don III 310
digenea Borb. III 314
elegans Bieb. III 310
fastigiata L. III 313; VII 173 Fig. 1215
muralis L. III 310
paniculata L. III 314
parviflora Moench III 314
perfoliata Beck nec L. III 310
producta Stapf III 310
purpurea Gilib. III 310
repens L. III 311
saxifraga L. III 316
scorzonerifolia DC. III 310
Steveni Fisch. III 310
Suendermanni Fritsch III 310, 314
Transsilvanica Spr. III 310
„ viscosa Murray III 310
Gyrophoraceae VII 144

H.

Habenaria albida Swartz II 368
cucullata Höfft II 368
„ viridis R. Br. II 363
Haberlea Ferdinandi Coburgi Urumov VI/1 176
„ Rhodopensis Friv. VI/1 176
Hablitzia tamnoides Bieb. III 260
Habrothamnus elegans Scheidw. V/4 2554
Hackelia deflexa Opiz V/3 2140
Hacquetia Neck. V/2 959
„ Epipactis (Scop.) DC. V/2 959
Haemanthus Katherinae Baker II 319
Haemanthus puniceus L. II 319
tigrinus Jacq. II 319; VII 68 Fig. 1102
Haematoxylon campechianum L. IV/3 1127
Haemodoraceae II 320; VII 162
Haenslera Steud. V/2 1080
Hagenia Abyssinica Willd. IV/2 666
Mougeotii C. K. Schneid. IV/2 717
„ torminalis Med. IV/2 719
Hahnia Chamaemespilus Med. IV/2 721
Hakea Schrad. VII 169
Halesia Carolina L. V/3 1901
diptera Ellis V/3 1901
„ tetraptera Ellis V/3 1901
Halianthus peploides Fries III 403
Halimocnemis triandra (Pall.) Moqu. III 260
Halimodendron argenteum Fisch. IV/3 1400
halodendron (L.) Voss IV/3 1400
Halimus pedunculatus Wallr. III 235
„ portulacoides Dum. III 235
Halodule Endl. I 120
Halophila Du Pet. Thouars I 159
Halorrhagidaceae V/2 894; VII 192
Halorrhagis Forst. V/2 894; VII 192
Haloscias Fries V/2 1314
Haloxylon Ammodendron Bunge III 209
Hamamelidaceae IV/2 655; VII 180
Hamamelis Japonica Sieb. et Zucc. IV/2 656
mollis Oliv. IV/2 656
„ Virginiana L. IV/2 656
Hamiltonia Nutt. VII 169
Hancornia speciosa Gom. V/3 2049
Hansenia Turcz. V/2 1314
Haplophyllum Juss. V/1 69
linifolium Rchb. V/1 73
„ Patavinum A. Juss. V/1 73
Haquetia Dietr. V/2 959; VII 193
Hardenbergia Benth. VII 183
Hariota DC. V/2 697
Harpagophytum procumbens DC. VI/1 176; VI/2 1363
Harpalium rigidum Cass. VI/1 508
Hartmannia macrantha Spach V/2 865
Hartwegia comosa Nees II 277
Hasselquistia L. V/2 1457
„ Syriaca Boiss. V/2 1463
Hauya Moc. et Sessé V/2 799
Haynaldia villosa Schur I 396
Hebeclinium ianthinum Hook. VI/1 401
Hebenstreitia L. VI/1 5; VII 204
Hebradendron Cambogioides Grah. V/1 501
Hedeoma glabra Nutt. V/4 2281
Hedeoma pulegioides (L.) Pers. V/4 2281
Hedera L. V/2 914; VII 193
arborea hort. V/2 917
Canariensis Willd. V/2 915
Colchica C. Koch V/2 915
conglomerata hort. V/2 917
Helix L. V/2 915
Himalaica Fr. Tobler V/2 915
Japonica Fr. Tobler V/2 915
„ poëtarum Bertol. V/2 915
Hederaceae V/2 910; VII 193
Hedraeanthus A. DC. VI/1 389
Hedwigiaceae VII 146
Hedychium König II 321; VII 163
Hedyphylla vulgaris Stev. IV/3 1420
Hedypnois autumnalis Huds. VI/2 1018
biennis Huds. VI/2 1162
paludosa Scop. VI/2 1092
Pyrenaica Vill. VI/2 1021
rhagadioloides (L.) Willd. VI/2 1008
Taraxaci Vill. VI/2 1020
„ tubaeformis Ten. VI/2 1008
Hedysareae IV/3 1461; VII 182
Hedysarum L. IV/3 1484
alpinum Jacq. IV/3 1485
arenarium Kit. IV/3 1488
Canadense L. IV/3 1462
Caucasicum Bieb. IV/3 1485
controversum Crtz. IV/3 1485
coronarium L. IV/3 1485
echinatum Gilib. IV/3 1488
exaltatum Kern. IV/3 1486
Hedysaroides Schinz et Thellung IV/3 1485
Mackenzii Rich. IV/3 1485
montanum Pers. IV/3 1491
multijugum Maxim. IV/3 1485
obscurum L. IV/3 1485
Onobrychis L. IV/3 1488
Sibiricum Poir. IV/3 1485
„ varium Willd. IV/3 1485
Heeria Meissn. V/1 217
Heimia salicifolia (H. B. et Kth.) Lk. V/2 746
„ syphilitica DC. V/2 746
Heinekenia peliorrhyncha Webb IV/3 1365
Heleastrum album DC. VI/1 420
Helenieae VI/1 533; VII 211
Helenium autumnale L. VI/1 534
grandiflorum Gilib. VI/1 475
Hoopesii A. Gray VI/1 534
nudiflorum Nutt. VI/1 534
tenuifolium Nutt. VI/1 534
„ vulgare Bauhin VI/1 475
Heleocharis R. Br. II 37; VII 156
acicularis (L.) R. Br. II 41
atropurpurea (Retz.) Kth. II 39
„ Baeothryon Nees II 40

Heleocharis Bartoliana De Not. II 42
caespitosa Lk. II 24
Carniolica Koch II 42
fluitans Hook. II 44
leptophylla Schult. II 36
Lereschii Shuttlew. II 39
Micheliana Rchb. II 12
multicaulis Sm. II 40
ovata (Roth) R. Br. II 39
palustris (L.) R. Br. II 38; VII 156
parvula (Roem. et Schult.) W. J. Hook. II 41
pauciflora (Lightf.) Lk. II 40
„ pygmaea Torrey II 41
Heleochloa alopecuroides Host I 210
aquatica Fries I 321
diandra Host I 209
„ schoenoides Host I 210
Heleogiton glaucum Rchb. II 30
pungens Rchb. II 36
trigonum Rchb. II 37
„ triquetrum Rchb. II 35
Heliamphora Benth. IV/2 510; VII 178
Heliantheae VI/1 527; VII 211
Helianthemum Mill. V/1 561; VII 189
Aegyptiacum Mill. V/1 562
alpestre Gross V/1 577
alpestre C. A. Mey. V/1 578
Apenninum (L.) Mill. V/1 563
canum (L.) Baumg. V/1 573
Chamaecistus Mill. V/1 565
ericoides Dun. V/1 580
Farquetii Christ V/1 579
Fumana Dun. V/1 580
Fumana Mill. V/1 581
guttatum Mill. V/1 559
hirsutum Mérat V/1 568
Italicum Pers. V/1 575
Italicum Ten. V/1 573
Kerneri Gottlieb et Janchen V/1 579
marifolium Mill. V/1 573, 578
nummularium (L.) Mill. V/1 565
nummularium (L.) Mill. subsp. glabrum (Koch) Wilczek V/1 569
nummularium (L.) Mill. subsp. grandiflorum (Lam. et DC.) Schinz et Thellung V/1 568
nummularium (L.) Mill. subsp. ovatum (Viv.) Schinz et Thellung V/1 568
nummularium (L.) Mill. subsp. tomentosum (Scop.) Schinz et Thellung V/1 567
Oelandicum Koch V/1 573
penicellatum Thibaut V/1 578
polifolium Mill. V/1 563
procumbens Dun. V/1 581
Helianthemum pulverulentum Lam. et DC. V/1 563
rupifragum Kern. V/1 578
salicifolium (L.) Mill. V/1 572
velutinum Jord. V/1 563
vineale Spreng. V/1 573
„ vulgare Gaertn. V/1 565
Helianthus L. VI/1 507; VII 211
altissimus L. VI/1 508
annuus L. VI/1 510
argophyllus Torrey et Gray VI/1 507
atrorubens VI/1 509
cucumerifolius hort. VI/1 508
debilis Nutt. VI/1 507
decapetalus L. VI/1 509
doronicoides Lam. VI/1 509
giganteus L. VI/1 508
macrophyllus Willd. VI/1 509
Maximiliani Schrad. VI/1 508
mollis Lam. VI/1 508
multiflorus L. VI/1 509
orgyialis DC. VI/1 507
pubescens Vahl VI/1 508
rigidus (Cass.) Desf. VI/1 508
scaberrimus Ell. VI/1 508
serotinus Tausch VI/1 509
strumosus L. VI/1 509
tomentosus Michx. VI/2 1366
trachelifolius Mill. VI/2 1366
„ tuberosus L. VI/1 514
Helichrysum Gaertn. VI/1 469; VI/2 1365; VII 211
angustifolium DC. VI/1 473
apiculatum DC. VI/1 470
arenarium (L.) DC. VI/1 471
brachyrhynchum Sonder VI/1 470
bracteatum (Vent.) Willd. VI/1 469
crassifolium (L.) D. Don VI/1 470
fulgidum (L.) Willd. VI/1 470
HumboldtianumGaud. VI/1 470
Italicum (Roth) Guss. VI/1 472
macranthum Benth. VI/1 470
Orientale (L.) Gaertn. VI/1 470
Pallasii Boiss. VI/1 470
petiolatum DC. VI/1 470
plicatum DC. VI/1 470
sanguineum Boiss. VI/1 470
serotinum Boiss. VI/1 470
„ Stoechas (L.) DC. VI/1 470
Helicideros muscivorus Engl. VII 157
Heliconia L. II 320; VII 163
Helicotrichum planiculme Bess. I 260
„ sempervirens Bess. I 257
Heliocarpus L. VII 188
Heliocereus V/2 693
Heliochroa Linnaeana Rafin. VI/1 504
Heliophila L. VII 177
Heliopsis annua Hemsl. VI/1 528
buphthalmoides Dun. VI/1 528
Heliopsis helianthoïdes (L.) Sweet VI/1 528
laevis Pers. VI/1 528
„ scabra Torr. et Gray VI/1 528
Heliosperma Rchb. III 304; VII 173
alpestre (Jacq.) Rchb. III 305
eriophorum Juratzka III 306
glutinosum (Zois) Rchb. III 306
quadridentatum (Murray) Schinz et Thellung VII 173
quadrifidum (L.) Rchb. III 305; VII 173
„ Veselskyi Janka III 306
Heliotropaceae VII 200
Heliotropoideae VII 200
Heliotropium L. V/3 2130; VII 200
Bocconei Guss. V/3 2130
Carduchorum C. Koch V/3 2133
corymbosum Ruiz et Pav. V/3 2131
Curassavicum (L.) V/3 2130
Europaeum L. V/3 2132
grandiflorum Don V/3 2131
odoratum Moench V/3 2131
odorum Steven V/3 2130
Peruvianum L. V/3 2131
suaveolens Bieb. V/3 2130
subcanescens Stev. V/3 2133
„ supinum L. V/3 2130
Helipterum Manglesii F. v. Muell. VI/1 495
Helleboraster foetidus Moench III 464
„ virides Moench III 470
Helleborine atropurpurea Schinz et Thellung II 376
latifolia Druce II 375
microphylla (Ehrh.) Schinz et Thellung II 377
palustris Schrank II 378
„ purpurata Druce II 376
Helleboroideae VII 174
Helleborus L. III 463; VII 174
albus Güldenstaedt II 193
altifolius Kern. III 468
angustifolius Host III 469
atropurpureus Schultes III 472
atrorubens Waldst. et Kit. III 472
Bocconii Fleischm. III 469
decorus Le Bêle III 468
dumetorum Waldst. et Kit. III 471
foetidus L. III 464; VII 9 Fig. 987 a bis c
grandiflorus Salisb. III 466
graveolens Rchb. III 468
hiemalis L. III 472
involucratus Stok. III 472
macranthus Fritsch III 468
monanthos Moench III 472
multifidus Vis. III 469
niger L. III 466

Helleborus odorus Waldst. et Kit. III 468
pallidus Host III 471
thalictroides Lam. III 476
„ viridis L. III 470
Helminthia echioides Gaertn. VI/2 1040
Helminthostachys Kaulf. VII 148
Helobiae I 164; VII 152
Helodea Michx. I 160; VII Fig. 977
Canadensis Michx. I 160; VII 6 Fig. 977
„ densa Casp. VII 153
Helodes palustris Spach V/1 509
Helodium Dumort. V/2 1139
„ repens Dumort. V/2 1150
Helonias borealis Willd. II 189, 190
bullata L. II 199
„ nigra Ker-Gawler II 192
Helosciadium Koch V/2 1139; VII 194
Falcaria Hegetschw. V/2 1177
inundatum Koch V/2 1152
leptophyllum DC. V/2 1140
nodiflorum Koch V/2 1147
oppositifolium Reuss V/2 1155
repens Koch V/2 1150
„ rutaceum St. Lag. V/2 1142
Heloseris palustris Rchb. VI/2 732
Helotiaceae VII 141
Helvellaceae VII 141
Helwingia Japonica (Thunb.) Dietr. V/2 1539
„ rusciflora Willd. V/2 1539
Hemerocallis L. II 204; VII 159
crocea Lam. II 204
flava L. II 205; VII 42 Fig. 1070 u. 119 Fig. 1154
fulva L. II 204
„ Liliastrum L. II 200
Hemiambrosia Delp. VI/1 496
Hemiasci VII 140
Hemigraphis Nees VI/1 178; VII 205
Hemiptelia Planch. VII 168
Hemisphaeriales VII 141
Hemitelia R. Br. VII 148
Hemizonia Fitchii Gray VI/2 1366
Kelloggii Greene VI/2 1366
pungens (Hook. et Arn.) Torr. et Gray VI/2 1366
„ ramosissima Benth. VI/1 533
Hepatica Spreng. VII 174
anemonoides Vest III 528
Hepatica Karst. III 528
nobilis Mill. III 528
„ triloba Gilib. III 528
Hepaticae VII 144
Heracantha lanata Lk. VI/2 989
Heracleum L. V/2 1415; VII 195
absinthiifolium Vent. V/2 1456
alpinum O. Naegeli V/2 1442
alpinum Vill. V/2 1441
amplifolium Lapeyr. V/2 1448
Heracleum amplissimum Wender. V/2 1423
angustifolium Jacq. V/2 1434
angustifolium L. V/2 1435/43
asperum Hohenacker V/2 1421/26
asperum Mert. et Koch V/2 1441/45
Austriacum L. V/2 1454
barbatum Ledeb. V/2 1422/26
Caspicum hort. V/2 1422/26
Caucasicum Steven V/2 1423
chloranthum Borb. V/2 1436
dissectum Ledeb. V/2 1422/26
Douglasii DC. V/2 1421/22
dubium Ten. V/2 1433
dulce Fisch. V/2 1422
elegans Bertol. V/2 1440
elegans Jacq. V/2 1443
eminens Lange V/2 1421
flavescens Willd. V/2 1434/39
giganteum hort. Angl. V/2 1423
glaberrimum Dalla Torre V/2 1456
Granatense Boiss. V/2 1446
gummiferum Willd. V/2 1423
intermedium Gaud. V/2 1442
Juranum Genty V/2 1450
laciniatumHornem. V/2 1421/25
lanatum Michx. V/2 1421/25
latifolium Gilib. V/2 1437
Lehmannianum Bunge V/2 1422/26
Leichtlini hort. V/2 1403, 1423, 1425
longifolium Jacq. V/2 1444
longifolium Rchb. V/2 1435
Mantegazzianum Somm. et Lev. V/2 942, 1422/27
Moellendorfii Hance V/2 1422
montanum Hay. V/2 1445
montanum Schleich. V/2 1441
occidentale Bor. V/2 1438
Orsinii Guss. V/2 1433
palmatum Baumg. V/2 1432
Panaces Bertol. V/2 1433/41/42
Persicum Desf. V/2 1423/27
platytaenium Boiss. V/2 1421/25
Pollinianum Bertol. V/2 1445/48
polyphyllum Peterm. V/2 1405
protheïforme Crtz. V/2 1427
pubescens Bieb. V/2 1423/24
pulchrum Zumaglini V/2 1447
Pyrenaicum Bieb. V/2 1421
Pyrenaicum Lam. V/2 1448
redolens Jord. V/2 1448
setosum Lapeyr. V/2 1446/47
Sibiricum L. V/2 1432
siifolium Rchb. V/2 1456
Heracleum speciosum Weinm. V/2 1423/27
Sphondylium L. V/2 1427
Sphondylium L. subsp. australe (Hartm.) Neuman V/2 1437
Stiriacum Hay. V/2 1440
Suecicum Fries V/2 1436
Tauricum „Fischer" V/2 1423
Tordylium Spreng. V/2 1461
trichocarpum Borb. V/2 1423
„ villosum Fisch. V/2 1421
Heriteria anthericoides Schrank II 189
Heritiera Ait. VII 188
„ litoralis Dryand. V/1 492
Hermannia L. V/1 492; VII 188
Hermesia spicata Hoppe IV/2 621
Herminiera Guill. et Perr. IV/3 1462; VII 183
Herminium R. Br. II 362; VII 164
alpinum Lindl. II 361
clandestinum Gren. et Godr. II 362
„ Monorchis (L.) R. Br. II 362
Hermione tazetta Haw. II 313
Hermodactylus tuberosus L. VII 163
Hernandiaceae IV/1 16; VII 176
Herniaria L. III 430; VII 173
alpestris Lam. III 431
alpina Loisel. III 430
alpina Vill. III 431
ciliata Clairv. III 431
fruticosa Host III 430
glabra L. III 432
hirsuta Bieb. III 430
hirsuta L. III 432
incana L. III 430
macrocarpa Sibth. III 430
„ vulgaris L. III 432
Herodium cicutarium Rchb. IV/3 1719
„ moschatum Rchb. IV/3 1724
Herpotrichia nigra Fuckel I 104
Herrerioideae VII 159
Herschelia Bowd. V/4 2579
Hesiodia bicolor Moench V/4 2404
„ montana Dum. V/4 2404
Hesperideae VII 177
Hesperidium triste Beck IV/1 465
Hesperis L. IV/1 464; VII 178
Africana L. IV/1 465
alba Fleischm. IV/1 467
Alliaria Lam. IV/1 149
bicuspidata Willd. IV/1 464
candida Kit. IV/1 467
glutinosa Vis. IV/1 464
inodora L. IV/1 467
maritima L. IV/1 464
matronalis L. IV/1 466
Provincialis L. IV/1 471
runcinata Waldst. et Kit. IV/1 467
silvestris Crtz. IV/1 467
speciosa Swartz IV/1 476

Hesperis tristis L. IV/1 465
violacea Boiss. IV/1 464
„ violaria Lam. IV/1 469
Hesperomannia A. Gray VII 212
Heteranthera graminea Vahl II 143
„ reniformis Ruiz et Pav. II 143
Heterocarpus Philippi IV/1 333
Heterocrambe Coss. et Durieu IV/1 229
Heteropogon Allionii Roem. et Schult. I 184
„ glaber Pers. I 184
Heteropyxidaceae VII 191
Heterostachyae VII 156
Heterotoma lobelioides Zucc. VI/1 392
Heterotrichum Bieb. VI/2 835
Heuchera L. VII 179
Americana L. IV/2 567
rubescens Torr. IV/2 567
„ sanguinea Engelm. IV/2 567
Heuffelia planiculmis Schur I 260
Heurnia R. Br. V/3 2067; VII 199
„ Penzigii N. E. Br. V/3 2067
Hevéa Aubl. VII 185
Brasiliensis Müll.-Aarg. V/1 118
Hibisceae V/1 457; VII 188
Hibiscus L. VII 188
cannabinus L. V/1 454, 460
elatus L. V/1 454, 460
insignis Mart. V/1 460
mutabilis L. V/1 460
Rosa-Sinensis L. V/1 460
Sabdariffa L. V/1 454, 460
Syriacus L. V/1 459
tiliaceus L. V/1 454, 460
Trionum L. V/1 458
„ vesicarius Cav. V/1 460
Hicoria Raf. III 7; VII 167
Hieracium L. VI/2 1182; VII 213
*Abbatiscellanum Dutoit VI/2 1305[1])
*Abnobae Zahn VI/2 1334
*absconditum (Hut.) N. P. VI/2 1266
*acariaceum N. P. VI/2 1206
*achnolepium N. P. VI/2 1212
*acrocladium N. P. VI/2 1205
acrocomum N. P. VI/2 1226/27
acroleucum (Dahlst.) Zahn VI/2 1291
*acrostictum N. P. VI/2 1241
*acrothyrsum N. P. VI/2 1242
*acrovillosum N. P. VI/2 1253
*actinanthoides Zahn VI/2 1236
*actinanthum N. P. VI/2 1236
*acuminatissimum Zahn VI/2 1201
*acuminatum (Jord.) Sudre VI/2 1285
Hieracium acuminatum (Jord.) Zahn VI/2 1284
*acutisquamum N. P. VI/2 1204
*acutum N. P. VI/2 1203
*adenocalathium Zahn VI/2 1326
*adenocymigerum Gerstlauer et Zahn VI/2 1236
*adenocymum N. P. VI/2 1225, 1239
adenodermum Zahn VI/2 1320
*adenodes N. P. VI/2 1205
*adenophyton Zahn VI/2 1311
*adenosciadium Zahn VI/2 1242
*adesum Bernoulli et Zahn VI/2 1273
adriaticiforme Zahn VI/2 1231, 1232
Adriaticum Naeg. VI/2 1232
adusticeps Zahn VI/2 1285
*aechmetes N. P. VI/2 1257
aëriostolonum Zahn VI/2 1239
*affine N. P. VI/2 1236
*albidobracteum N. P. VI/2 1230
albidum Vill. VI/2 1319
*Albinum (Fr.) Zahn VI/2 1326
albipedunculum N. P. VI/2 1237
*albipes Dahlst. VI/2 1290
*albofloccosum N. P. VI/2 1199
*Albulanum N. P. VI/2 1231
*alethes N. P. VI/2 1231
Aletschense Zahn VI/2 1210
*Alfenzinum (Evers) Zahn VI/2 1262
*Algoviae Zahn VI/2 1312
*aligerum (A.-T.) Zahn VI/2 1325
*Allensteinense Zahn VI/2 1219
*Almagellense Zahn VI/2 1324
alpestre Jacq. VI/2 1151
alpicola Schleich. VI/2 1210
*alpigenum N. P. VI/2 1205
alpinum L. VI/2 1305
*Alsaticum N. P. VI/2 1237
altissimum Lap. VI/2 1156
*amauracron Missb. et Zahn VI/2 1218
*amaureilema N. P. VI/2 1204
*amauriforme Touton VI/2 1206
*amaurocalathium Zahn VI/2 1204
amaurocephalum N. P. VI/2 1215
*amaurochlorum Zahn VI/2 1282
*amaurocranum Zahn VI/2 1313
*amaurolepis Murr et Zahn VI/2 1335
Hieracium *amauron N. P. VI/2 1200
*ambigens A.-T. VI/1 1338
ambiguum Ehrh. VI/2 1226
*amblylepium N. P. VI/2 1224
*amblyphyllum N. P. VI/2 1233
*amoenicolor Zahn VI/2 1287
*amoenotephrodes Murr et Zahn VI/2 1291
*Ampezzanum (N. P.) Zahn VI/2 1247
*amphichaetophorum Zahn VI/2 1232
*amphichromum (nicht amphiobromum) Wilczek et Zahn VI/2 1300
*amphileucum N. P. VI/2 1201
*amphipolium N. P. VI/2 1203
*amphiporphyreum Zahn VI/2 1213
*amphisericum Zahn VI/1 1260
amplexicaule L. VI/1 1317
*amplexicauliforme Zahn VI/2 1319
anchusoides Arv.-Touv. VI/2 1237
andryaloides (Vill.) Zahn VI/2 1235
aneimenum N. P. VI/2 1235
anfractum (Fr.) Zahn VI/2 1283
angustifolium Tausch VI/2 1323, 1338
*angustissimum N. P. VI/2 1201
*angustius N. P. VI/2 1200
*anisobrachiophorum (nicht fallaciniforme) Bornm. et Zahn VI/2 1232
Annae Toutoniae Zahn VI/2 1249
*Annae Vetterae Zahn VI/2 1211
*anolasium N. P. VI/2 1236
Antholzense Zahn VI/2 1317
*anthyllidifolioides Murr et Zahn VI/2 1294
*anthyllidifolium Murr VI/2 1293
apatelium N. P. VI/2 1220
aphyllum N. P. VI/2 1265
apiculatum (Tausch) Zahn VI/2 1307
*apophyadium N. P. VI/2 1233
approximatum (Jord.) Zahn VI/2 1279
*apricum Zahn VI/2 1338
*Aquaenovae Coquoz et Zahn VI/2 1316
*Aquileiense Zahn VI/2 1345
*Arbenzii Zahn VI/2 1290

[1]) Die mit einem * versehenen Namen bedeuten Unterarten (subspecies).

Hieracium arenarium (Schultz-Bip.) Zahn VI/2 1279
*argentellum Zahn VI/2 1232
*argenticapillum N. P. VI/2 1200
*argillaceum (Jord.) Zahn VI/2 1280
*argyrocalyx N. P. VI/2 1231
*argyrocephalum N. P. VI/2 1231
*argyropodum Zahn VI/2 1275
aridum Freyn VI/2 1232
Arlbergense Evers VI/2 1263
armerioides A.-T. VI/2 1265
armerioides (A.-T.) Zahn VI/2 1266
*Arnoldianum Zahn VI/2 1272
Arolae Murr VI/2 1315
*aroliflorum Murr et Zahn VI/2 1314
*arrectarium (Jord.) Zahn VI/2 1279
*arvense (Tausch) N. P. VI/2 1243
Arvetii (Verlot) Zahn VI/2 1246
arvicola N. P. VI/2 1234, 1235
*arvicoliforme N. P. VI/2 1235
*arvorum N. P. VI/2 1240
*Asciburgense Zahn VI/2 1317
*asperatulum Zahn VI/2 1335
*aspernatum (Jord.) Zahn VI/2 1285
*asperrimum (Schur) N.P. VI/2 1243
*asperulum (Freyn) Zahn VI/2 1330
*aspreticolum (Jord.) Zahn VI/1 1276
*assimile N. P. VI/2 1231
*asterinum (A.-T.) Zahn VI/2 1259
*asyngamicum (A. Kern.) Zahn VI/2 1283
atramentarium (N. P.) Zahn VI/2 1234
atratum Fr. VI/2 1310
*atrellum Zahn VI/2 1310
*atriceps N. P. VI/2 1240
*atricroceum Peter VI/2 1219
*atripaniculatum Zahn VI/2 1274
*atripurpureum N. P. VI/2 1213
*atrobrunneum Zahn VI/2 1313
*atronitens (Dst.) Zahn VI/2 1284
*atroviride N. P. VI/2 1235
aurantellum N. P. VI/2 1215
aurantiacum L. VI/2 1211/12
*auratum (Fr.) Zahn VI/2 1342
aureum Scop. VI/2 1147
auricula Lam. et DC. VI/2 1203
Hieracium *auriculiflorum N. P. VI/2 1214
auriculiforme Fr. VI/2 1205
auriculinum Almq. VI/2 1226
auriculoides Láng VI/2 1243
*auriculoides (Láng) N. P. VI/2 1243
*Aurigeranum (Loret et Timb.) Zahn VI/2 1337
*auropurpureum N. P. VI/2 1212
*aurulentum (Jord.) Zahn VI/2 1281
*Ausserdorferi (Hausm.) Zahn VI/2 1284
australe Fr. VI/2 1347
Austriacum Britt. V/2 1247
*Austribavaricum Vollmann et Zahn VI/2 1282
*Austrohercynicum Zahn VI/2 1292
*Austrotirolense N. P. VI/2 1236
*Ausugum Murr et Zahn VI/2 1292
autumnale Griseb. VI/2 1341
*aviicolum (Jord.) Zahn VI/2 1285
*axiflorum (A.-T. et Briq.) Zahn VI/2 1265
*Babantinum Zahn VI/2 1222
*Baenitzii N. P. VI/2 1219
*Bahnmaieri Käser et Zahn VI/2 1316
*Balatonense (Borb.) Zahn VI/2 1228
Balbisianum (A.-T.) Zahn VI/2 1304
Baldense N. P VI/2 1250
*baldensiforme N. P. VI/2 1250
*barbatum Tausch VI/2 1345
*barbicaule Čelak. VI/2 1346
*barbisquamum N. P. VI/2 1200
*basalticum (Schultz-Bip.) Zahn VI/2 1270
*basicuneatum Zahn VI/2 1288
*basifolium (Fr., Almq.) Zahn VI/2 1290
basifurcum N. P. VI/2 1208
*basiglaucum N. P. VI/2 1255
Bauhini Bess. VI/2 1238/39
*Bavaricum N. P. VI/2 1233
*Beauverdianum Bess et Zahn VI/2 1328
*Beckeri Zahn VI/2 1271
Beckianum Gremli VI/2 1323
*Bedolense Zahn VI/2 1260
Beerianum Zahn VI/2 1231
*Begeri Zahn VI/2 1343
*bellidiforme N. P. VI/2 1201
Hieracium Benzianum Murr et Zahn VI/2 1296
Berardianum A.-T. VI/2 1318
*berardianoides Zahn VI/2 1318
Bernense (Christ.) Zahn VI/2 1259
*Berninae (Griseb.) N. P VI/2 1230
*Besseanum (A.-T.) Zahn VI/2 1300
*Besserianum (Spr.) N. N. VI/2 1239
*Beverianum N. P. VI/2 1204
*Bialkanum Zahn VI/2 1226
*bichromoglossum Vetter et Zahn VI/2 1215
bienne Karsch VI/2 1162
bifidellum Zahn VI/2 1315
bifidum Kit. VI/2 1285
bifidum (Kit.) Zahn VI/2 1286
biflorum Arv.-Touvet VI/2 1226
bifrons (A.-T.) Zahn VI/2 1344
bifurcum Bieb. VI/2 1228/29
*Binzii Zahn VI/2 1316
Bivonae Zahn VI/2 1269
blattarioides L. VI/2 1141
Blyttianum Fr. VI/2 1214
Bocconei Griseb. VI/2 1312
*bocconeiforme Murr et Zahn VI/2 1315
*Bohemicum Vollmann VI/2 1235
Bohemicum (Fr.) Zahn VI/2 1329
*Boicum N. P. VI/2 1217
Boissieri (Huet) Zahn VI/2 1258
*Boraeanum Sudre VI/2 1334
boreale Fr. VI/2 1340
*bounophilum (Jord.) Zahn VI/2 1270
*brachiatiforme N. P. VI/2 1233
brachiatum Bertol. VI/2 1232, 1240
brachycomum N. P. VI/2 1208
*brachygonium Zahn VI/2 1288
*brachylepium N. P. VI/2 1205
*brachyphyllum (Vukot.) Zahn VI/2 1340
*brachypodum N. P. VI/2 1205
brachypogon Zahn VI/2 1313
*bracteolossum N. P. VI/2 1232
*brassicoides (A.-T.) Zahn VI/2 1324
Braunianum Zahn VI/2 1259
*brevicaule N. P. VI/2 1234

Hieracium *brevidentatum (Jord.) Zahn VI/2 1285
*brevifolioides Zahn VI/2 1339
brevifolium Tausch VI/2 1340
*brevistoloniferum Zobel et Zahn VI/2 1237
*Bridelianum Zahn VI/2 1272
Briquetianum A.-T. VI/2 1267
*Bructerum (Fr.) Zahn VI/2 1308
*Bruennense N. P. VI/2 1200
*Budaianum Zahn VI/2 1242
*buglossoides (A.-T.) Zahn VI/2 1271
*bupleurifolioides Zahn VI/2 1322
*bupleurifolium (Tausch) Zahn VI/2 1322
bupleuroides Gmel. VI/2 1244
*bupleuropsis Zahn VI/2 1251
*cacuminatum (Dst.) Zahn VI/2 1283
*Cadinense (Evers) Zahn VI/2 1318
*caesiifloriforme Käser et Zahn VI/2 1315
*caesiiflorum (Almq.) Zahn VI/2 1287
caesioides A.-T. VI/2 1299
*caesium Fr. VI/2 1289
*Caflischianum Zahn VI/2 1315
*calanthodium Peter VI/2 1215
*calcarcum (Bernh.) N. P. VI/2 1250
*calcigenum (Rehm.) Zahn VI/2 1291
callimorphoides Zahn VI/2 1221
callimorphum N. P. VI/2 1221
calocymum Zahn VI/2 1336
calodon Tausch VI/2 1238
calomastix N. P. VI/2 1241
*calomelanum Rehmann VI/2 1226
calophyton N. P. VI/2 1223
*calopogon Tout. et Zahn VI/2 1259
calvifolium N. P. VI/2 1253
*calvifrons Zahn VI/2 1275
*calvulum N. P. VI/2 1261
*campylodontum Zahn VI/2 1291
*candicans (Tausch) Zahn VI/2 1269
Candollei VI/2 1210
*canelliceps Zahn VI/2 1322
canescens Schleich. VI/2 1295
*canifloccum Zahn VI/2 1273
*caniforme Zahn VI/2 1223
Hieracium *canitiosum (Dst.) Zahn VI/2 1287
canofloccosum Čel. VI/2 1273
canum N. P. VI/2 1223
*cardiobasis Zahn VI/2 1288
*cardiophyllum (Jord.) Zahn VI/2 1277
*caricinum (Arv.-Touv.) Zahn VI/2 1232
*carinthicola N. P. VI/2 1257
*carnosum (Wiesb.) Zahn VI/2 1290
*Caroli Muelleri Zahn VI/2 1224
*carpathicola N. P. VI/2 1212
Carpaticum Bess. VI/2 1328
*Carpaticum (Bess.) Zahn VI/2 1328
*catoschistum N. P. VI/2 1223
Cavillieri Zahn VI/2 1327
*Čelakovskyanum Zahn VI/2 1272
*celsicaule (Jord.) Zahn VI/2 1279
*Cenisium (A.-T.) Zahn VI/2 1257
cerinthoides Knaf VI/2 1157
cerinthoides L. VI/2 1266
cernuatum (Sudre) Zahn VI/2 1215
cernuiforme (N. P.) Zahn VI/2 1219
cernuum Fr. VI/2 1215
Chaberti F. O. Wolf VI/2 1224
chaetocephalum Hofmann VI/2 1217
*chaetoscapum Zahn VI/2 1205
*chalicobium Zahn VI/2 1233
chamaeadenium Oborny et Zahn VI/2 1347
*chartaceum (Čelak.) Zahn VI/2 1288
chaunanthes Zahn VI/2 1213
*chaunothyrsum N. P. VI/2 1224
*Chenevardianum (A.-T.) Zahn VI/2 1318
*chlorellum (Sael. et Norrl.) Zahn VI/2 1277
chlorifolium A.-T. VI/2 1261
chlorocephalum (Wimm.) Zahn VI/2 1330
*chlorodes (Dst.) Zahn VI/2 1283
*chloromelanum Peter VI/2 1214
*chlorophyton Preissmann et Zahn VI/2 1347
*chloropolium (N. P.) Zahn VI/2 1223
chlorops N. B. VI/2 1218
Hieracium *Chodatianum Rom. et Zahn VI/2 1337
chondrillifolium Fr. VI/2 1257
chondrilloides L. VI/2 1144
*Christeneri N. P. VI/2 1261
*Christii (A.-T.) Zahn VI/2 1332
*chromonotum Wilczek et Zahn VI/2 1315
*chrysanthes N. P. VI/2 1214
chrysochroum N. P. VI/2 1215
chrysoniphobium N. P. VI/2 1213
*chrysophanum Zahn VI/2 1214
*chrysostyloides Zahn VI/2 1308
chrysostylum Uechtr. VI/2 1308
*cichoriaceum (A.-T.) Zahn VI/2 1325
cinerascens (Jord.) Zahn VI/2 1271
cinereiforme Meissner et Zahn VI/2 1229
cinereum (Tausch) Zahn VI/2 1228/29
cinerosiforme (N. P.) Zahn VI/2 1233
*cinerosum N. P. VI/2 1233
*circumstellatum Zahn VI/2 1277
*circumvelatum Zahn VI/2 1199
*cirritoides Zahn VI/2 1277
cirritum A.-T. VI/2 1295
*Clairvillei Wilczek et Zahn VI/2 1300
*claropurpureum N. P. VI/2 1212
*Claustri Zahn VI/2 1336
*Clusii (Dichtl) Zahn VI/2 1295
cochleare Kern. VI/2 1266
*cochleare (Huter) Zahn VI/2 1308
cochlearioides Zahn VI/2 1266
cochleatum (N. P.) Zahn VI/2 1220
coeruleum Scop. VI/2 1099
*colliniforme N. P. VI/2 1217
collinum N. P. VI/2 1216
*coloratulum Zahn VI/2 1200
*comatulum N. P. VI/2 1254
*comigerum Zahn VI/2 1254
*commixtum (Jord.) Sudre VI/2 1279
*commune Fr. VI/2 1338
*comolepium N. P. VI/2 1258
*concinnum (Jord.) Zahn VI/2 1343
*confinium N. P. VI/2 1220
conicum A.-T. VI/2 1339
*conicum (A.-T.) Zahn VI/2 1339
*coniophorum N. P. VI/2 1204

Hieracium conjunctum G. Schneid. VI/2 1290
*conringiifolium (A.-T.) Zahn VI/2 1331
*consociatum (Jord.) Zahn 1281
conyzifolium Gouan VI/2 1149
copulatum G. Schneid. VI/2 1290
*Coquozianum Besse et Zahn VI/2 1299
*Coquozii Zahn VI/2 1319
*coracolepium Korb et Zahn VI/2 1219
Corconticum (Knaf. fil.) Čelak. VI/2 1330
*coronopifolium Bernh. VI/2 1338
Correnſii Käser VI/2 1263
*corrosum Murr et Zahn VI/2 1283
corymbuliferum A.-T. VI/2 1223
*coryphodes N. P. VI/2 1206
Cottetii Godet VI/2 1304
*Cottianum (A.-T.) Zahn VI/2 1324
*crepidanthes Zahn VI/2 1275
*crepidiflorum (Polak) Zahn VI/2 1275
*crepidiforme N. P. VI/2 1235
*crepidopsis Zahn VI/2 1326
crinifolium N. P. VI/2 1245
crinigerum (Fr.) Zahn VI/2 1271
crinitum (Sibth. et Sm.) Zahn VI/2 1346
crinopodum N. P. VI/2 1250
Croaticum Waldst. et Kit. VI/2 1156
croceum Zahn VI/2 1212
*crociflorum N. P. VI/2 1233
Crucimontis Zahn VI/2 1250
*cruentifolium (Dahlst. et Lüb.) Zahn VI/2 1282
*cruentifrons Zahn VI/2 1283
cruentum N. P. VI/2 1225
cryptadenum Arv.-Touv. VI/2 1258
cryptomastix N. P. VI/2 1239
ctenodon N. P. VI/2 1256
*Cuneense N. P. VI/2 1231
*curvidens (Jord.) Sudre VI/2 1342
cyaneum (A.-T.) Zahn VI/2 1269
cydoniifolium Vill. VI/2 1324
*cymanthum N. P. VI/2 1239
cymiflorum N. P. VI/2 1223, 1237
*cymigeriforme N. P. VI/2 1226
*cymigerum (Reichb.) N. P. VI/2 1222
Hieracium *cymosella N. P. VI/2 1223
*cymosifolium N. P. VI/2 1236
cymosum L. VI/2 1221/22
dasytrichum A.-T. VI/2 1265
*Davallianum Zahn VI/2 1292
*decipiens Tausch VI/2 1309
decipiens (Tausch) Zahn VI/2 1308
*declivium N. P. VI/2 1235
*decolor N. P. VI/2 1239
*deductiforme Zahn VI/2 1278
*deltophyllum (A.-T.) Zahn VI/2 1343
densicapillum N. P. VI/2 1224
*dentatiforme N. P. VI/2 1257
dentatum Hoppe VI/2 1256
*dentatum (Hoppe) N. P. VI/2 1257
*dermophyllum (A.-T.) Zahn VI/2 1327
Deseglisei N. P. VI/2 1230
*Dettenbergense Käser et Zahn VI/2 1235
*devexicolum Zahn VI/2 1312
*Diabolinum N. P. VI/2 1259
diaphanoides Lbg. VI/2 1278
*diaphanum (Fr.) Zahn VI/2 1283
*diaporphyrum N. P. VI/2 1205
*diatentum N. P. VI/2 1220
*Dichtlianum (Wiesb.) Zahn VI/2 1290
*digenes N. P. VI/2 1224
*discolor N. P. VI/2 1240
dispalatum Sudre VI/2 1342
*dissolutum N. P. VI/2 1217
*distans N. P. VI/2 1232
*divisum (Jord.) Sudre VI/2 1279
divisum (Jord.) Zahn VI/2 1279
*Dohlenbergense Bornm. et Zahn VI/2 1243
*dolichaetoides Zahn VI/2 1311
*dolichellum A.-T. VI/2 1273
dolichocephalum N. P. VI/2 1258
Dollineri Schultz-Bip. VI/2 1249
*Dolomiticum (Hausm.) Zahn VI/2 1288
*doratolepium N. P. VI/2 1256
*doronicifolium (A.-T.) Zahn VI/2 1324
dragicola (N. P.) Zahn VI/2 1252
*Drumense Korb et Zahn VI/2 1241
dubium (L.) Lbg. VI/2 1226
*Duereri Zahn VI/2 1243
*Duerkheimense Zahn VI/2 1230
*Duftii Zahn VI/2 1272
*dumosum Jord. VI/2 1341
Hieracium *dunense Reyn. VI/2 1339
*durisetum N. P. VI/2 1229
Dybowskianum Rehm. VI/2 1241
*echinodermum Zahn VI/2 1336
*echinozum Rom. et Zahn VI/2 1345
*echiocephalum N. P. VI/2 1243
*echiogenes N. P. VI/2 1243
echioides Lumnitzer VI/2 1227
editicaule Jord. VI/2 1342
effusiforme Benz et Zahn VI/2 1241
effusum N. P. VI/2 1239
*Eginense N. P. VI/2 1206
*elegans N. P. VI/2 1229
*Engadinense Zahn VI/2 1312
*Engleri (Uechtr.) Zahn VI/2 1328
epimedium Fr. VI/2 1327
*epitiltum N. P. VI/2 1233
erectum (N. P.) Zahn VI/2 1212
*eremocephalum N. P. VI/2 1261
*ericetorum A.-T. VI/2 1338
*ericophilum Zahn VI/2 1197
erioleucum Zahn VI/2 1301
*eriopodoides Zahn VI/2 1289
eriopodum (Kern.) Zahn VI/2 1249
*ermineum N. P. VI/2 1199
*erythriophyllum (Vuk.) N. P. VI/2 1239
*erythrochristum N. P. VI/2 1235
*erythrodes N. P. IV/2 1224
erythrodontum Zahn VI/2 1228
*erythroglossum Tout. et Zahn VI/2 1233
*erythrogrammum N. P. VI/2 1206
*erythropodum (Uechtr.) Zahn 1282
*erythrosabinum N. P. VI/2 1224
*eucaphalum N. P. VI/2 1205
*euchaetiiforme (nicht cuchaetiiforme) Zahn VI/2 1232
euchaetium N. P. VI/2 1243
*eucomoides N. P. VI/2 1203
*euconspicuum Zahn VI/2 1334
*eudeltophylloides Zahn VI/2 1335
*eu-Fritzii Zahn VI/2 1316
eu-Pilosella Zahn VI/2 1199
*Eurobalticum Zahn VI/2 1339
*Eurobreunium Zahn VI/2 1292
*euronotum N. P. VI/2 1201
*euryanthes N. P. VI/2 1215
*eurybasis N. P. VI/2 1253
eurylepium N. P. VI/2 1207

Hieracium *euumbelliferum Zahn VI/2 1242
Eversianum A.-T. VI/2 1296
*Evolenae Besse et Zahn VI/2 1224
excellens Murr VI/2 1249
exilentum (A.-T.) Zahn VI/2 1328
*exorrhabdum N. P. VI/2 1220
*exotericum (Jord.) Sudre VI/2 1277
*expansiforme Feuerst. et Zahn VI/2 1315
*extensum (Lüb.) Zahn VI/2 1272
falcatum A.-T. VI/2 1249
fallacinum F. Schultz VI/2 1237
fallax Willd. VI/2 1229
*fallens (Jord.) Zahn VI/2 1270
*farinifolium N. P. VI/2 1232
*farinosum N. P. VI/2 1236
*farinulentum (Jord.) Zahn VI/2 1298
*fastigians Zahn (nicht fastigiatum N.P.) VI/2 1239
*fastigiatum (Fr.) Zahn VI/2 1280
fastuosum Zahn VI/2 1263
*Faucillense N. P. VI/2 1254
*faucium (Sudre) Zahn VI/2 1278
*Fauconnetii Besse et Zahn VI/2 1299
Faurei A.-T. VI/2 1209
Favratii Muret VI/2 1343
*Favreanum (A.-T.) Zahn VI/2 1266
*festinum (Jord.) Zahn VI/2 1282
*Ficini Zahn VI/2 1284
*Fiekii (Uechtr.) Zahn VI/2 1322
*filiferum (Tausch) N. P. VI/2 1239
*filifolium Fr. VI/2 1338
Finalense N. P. VI/2 1208/09
*fissicladum Zahn VI/2 1292
*fissidens Zahn VI/2 1200
flagellare Willd. VI/2 1218
flagellariforme G.Schneid. VI/2 1218
flagelliferum Ravaud VI/2 1343
*flammans N. P. VI/2 1212
*flavicolor Zahn VI/2 1212
*flexile Kotula VI/2 1255
*flexuosum (Waldst. et Kit.) N. P. VI/2 1255
*floccicuspis Zahn VI/2 1203
*floccipedunculum N. P. VI/2 1231
*floccivelatum Zahn VI/2 1203
floccosum N. P. VI/2 1231
Florentinum All. VI/2 1229
Hieracium florentinum (All.) Zahn VI/2 1231
floribundum Wimm. et Grab. VI/2 1219
Franconicum Griseb. VI/2 1247
*Franconum Bornm. et Zahn VI/2 1229
fraternum (Jord.) Zahn VI/2 1271
*Freynianum Velen. VI/2 1330
*Friburgense N. P. VI/2 1259
*Friesii (Hartm.) Zahn VI/2 1335
frigidarium N. P. VI/2 1234
*Fritschii (Pernh.) Zahn VI/2 1275
Fritzii Fr. Schultz VI/2 1316
*fruticetorum (Jord.) Zahn VI/2 1342
*Fuchsii Zahn VI/2 1199
Fuckelianum Touton et Zahn VI/2 1229
Fuernrohri Vollmann VI/2 1223
*fulcratiforme Zahn VI/2 1262
fulcratum A.-T. VI/2 1249
fulgens N. P. VI/2 1215
fulvauricula N. P. VI/2 1215
*fulvescens N. P. VI/2 1220
*fulviflorum N. P. VI/2 1200
*furcatum N. P. VI/2 1207
*furcillatum (Jord.) Zahn VI/2 1271
*Furcotae Deg. et Zahn VI/2 1210
*fuscescens N. P. VI/2 1225
fuscescens (N. P.) Zahn VI/2 1225
*fusciforme N. P. VI/2 1214
fuscoatrum N. P. VI/2 1221
*fuscum N. P. VI/2 1214
fuscum Vill. VI/2 1213
*Gadense (Wiesb.) Zahn VI/2 1249
*Gamsii Zahn VI/2 1332
Ganderi (Hausm.) VI/2 1248
*Gautingense Harz et Zahn VI/2 1275
*Geisenheyneri Zahn VI/2 1271
*Gelmianum Sarnth. VI/2 1294
*Gelmii Zahn VI/2 1223
*Genevense Zahn VI/2 1230
*gentile (Jord.) Sudre VI/2 1277
*Germanicum N. P. VI/2 1237
*gigantodontum Murr et Zahn VI/2 1288
glabratum Hoppe VI/2 1255
*glabratum (Hoppe) N.P. VI/2 1256
*glabrescens N. P. VI/2 1261
*glabrescens (F. Schultz) Dalla Torre et Sarnth. VI/2 1256
glaciale (Reynier) Lachenal VI/2 1206
Hieracium glaciellum N. P. VI/2 1209
glanduliferum Hoppe VI/2 1264
*glandulinervum Zahn VI/2 1259
glandulosodentatum (Uechtr.) Zahn VI/2 1312
*glareicola N. P. VI/2 1231
*glareigenum Murr et Zahn VI/2 1283
*glareosum N. P. VI/2 1231
*Glatzense N. P. VI/2 1218
*glaucifolioides Zahn VI/2 1197
*glaucifrons N. P. VI/2 1253
*glaucinum (Jord.) Zahn VI/2 1270
glaucisetigerum Zahn VI/2 1238
*glaucochlorellum Zahn VI/2 1218
*glaucochlorum N.P. VI/2 1234
*glaucoides (Muelln.) N. P. VI/2 1249
glaucomorphum Zahn VI/2 1247
*glaucopallens Zahn VI/2 1269
*glaucophyllum N.P. VI/2 1197
*glaucoviride N. P. VI/2 1206
glaucum All. VI/2 1245/46
*Gleichenbergense Zahn VI/3 1297
*Gletschense Zahn VI/2 1314
*gnaphalium N. P. VI/2 1217
Godetii (Christ.) Zahn VI/2 1259
Goemoerense Borb. VI/2 1250
Gombense (Lagger et Christ.) Zahn VI/2 1330
*gothiciforme Dahlst. VI/2 1334
Gothicum (Fr.) Zahn VI/2 1333
*Gougetianum Gren. et Godron VI/2 1270
*Grabowskianum (N. P.) Zahn VI/2 1261
*gracile Tausch VI/2 1223
*gracilipes Sudre VI/2 1335
*graminicolor Zahn VI/2 1276
*grande (Wimm.) Zahn VI/2 1307
*grandidens (Dahlst.) Zahn VI/2 1277
*grandidentatum (Martr.) Zahn VI/2 1342
grandiflorum All. VI/2 1149
*Grandimontis Zahn VI/2 1263
*graniticum (Schultz-Bip.) Zahn VI/2 1269
*Gremblichii N. P. VI/2 1213
*Gremlii (A.-T.) Zahn VI/2 1259
*Grimsulanum Zahn VI/2 1332
*grimsulicolum Zahn VI/2 1311
*Grisebachii (A. Kern.) Zahn VI/2 1348
*grossilacerum Bornm. et Zahn VI/2 1305

Hieracium *Gumbinnense N. P. VI/2 1241
Gurhofianum Kern. VI/2 1338
Guthnickianum (Hegetschw. et Heer) Thellung VI/2 1225
*Guyotianum Zahn VI/2 1299
gymnodermum Benz et Zahn VI/2 1349
*gymnophyllum N. P. VI/2 1256
*gypsogenum Bornm. et Zahn VI/2 1228
*gypsophilum (Griseb.) Zahn VI/2 1277
*hadromastix N. P. VI/2 1231
*haematochromum Zahn VI/2 1280
*haematophyllum Dahlst. VI/2 1283
haematopodum Zahn VI/2 1327
*Hahnii Zahn VI/2 1218
*halimifolium (Fröl.) Zahn VI/2 1340
*Halleri (Vill.) Zahn VI/2 1307
Handel-Mazzettianum VI/2 1209
*Hanhartii Zahn VI/2 1203
Harzianum Zahn VI/2 1251
*Hausmannii (Rchb.) N. P VI/2 1213
Hayekii Murr VI/2 1248
*Hegetschweileri Zahn VI/2 1325
*Heilandii Zahn VI/2 1284
*Hellwegeri Zahn VI/2 1340
*Helvetiorum Käser et Zahn VI/2 1226
hemiplecum (A.-T.) Zahn VI/2 1325
*heothinum N. P. VI/2 1239
*Hermanni Zahn VI/2 1229
Hermanni Zahnii Zahn VI/2 1332
*heterocephalum N. P. VI/2 1255
*heterochromum N. P. VI/2 1215
heterodoxiforme Zahn VI/2 1238
heterodoxum (Tausch) N. P. VI/2 1238
*heterogonoides Zahn VI/2 1332
*heterophylloides Zahn VI/2 1253
*heteroschistum Zahn IV/2 1271
*Hinterhuberi (Schultz-Bip.) Zahn VI/2 1212
*hirsuticeps N. P. VI/2 1230
*hirsutulum N. P. VI/2 1230
*hispidellum Zahn VI/2 1224
*hispidissimum Rehm. VI/2 1239
*hispidulum Arv.-Touvet VI/2 1304
Hieracium *Hittense Murr VI/2 1293
*Hoegeri Zahn VI/2 1323
*Hollandiae Zahn VI/2 1339
*Holmii Zahn VI/2 1227
*hololeptum N. P. VI/2 1264
*holomnoon N. P. VI/2 1240
*holopolium N. P. VI/2 1228
*holostenum N. P. VI/2 1200
Hoppeanum Schult. VI/2 1196
*Hosigoviense N. P. VI/2 1220
*Hostianum (Wiesb.) Zahn VI/2 1347
Hugueninianum (A.-T.) Zahn VI/2 1294
*humidicola N. P. VI/2 1224
humile Jacq. VI/2 1302
*humiliforme Murr VI/2 1294
*Huteri (Hausm.) Zahn VI/2 1321
hybridiforme Zahn VI/2 1232
hybridum Chaix VI/2 1223
hyoseridifolium Vill. VI/2 1142
hypastrum Zahn VI/2 1285
hyperdoxum Sag. VI/2 1242
hypeuryium N. P. VI/2 1202
*hypeuryotropum (nicht hypeuryodes) Käser et Zahn VI/2 1200
*hypochoerideum (A.-T.) Zahn VI/2 1295
hypoleucum (A.-T.) Zahn VI/2 1209
Jablonicense Wol. VI/2 1297
*Jaborneggii (Pacher) Zahn VI/2 1258
*Jaccardii Zahn VI/2 1281
*jaceoides (A.-T.) Zahn VI/2 1326
*Jacquetianum Zahn VI/2 1322
Jacquini Vill. VI/2 1302
*Jansenii Zahn VI/2 1288
*Jenzigense Bornm. et Zahn VI/2 1272
*ignotum N. P. VI/2 1224
Illyricum Fr. VI/2 1250
Illyricum (Fr.) Zahn VI/2 1250
*imbecillum N. P. VI/2 1232
*impexum Zahn VI/2 1199
*inalpestre N. P. VI/2 1201
incanum L. VI/2 1030
incanum (DC.) Zahn VI/2 1201
incarnatum Wulf. VI/2 1160
incisum Hoppe VI/2 1292
incisum (Hoppe) Zahn VI/2 1293/94
*inclinatiforme Zahn VI/2 1299
*ingens N. P. VI/2 1230
*ingentiforme Käser et Zahn VI/2 1235
*insigne N. P. VI/2 1236
insuetum Jord. VI/2 1347
Hieracium integrifolium Hoppe VI/2 1156
*interjectum G. Beck VI/2 1261
intumescens N. P. VI/2 1260
intybaceum (Wulf.) Jacq. VI/2 1319
*intybellifolium (A.-T.) Zahn VI/2 1328
intybelloides (A.-T.) Zahn VI/2 1263
inuloides Tausch VI/2 1337
*inuloides (Tausch) Zahn VI/2 1337
Jordanii A.-T. VI/2 1301
*irriguiceps Zahn VI/2 1282
irriguum (Fr.) Dahlst. VI/2 1282
*irriguum (Fr.) Zahn VI/2 1282
*Isaricum N. P. VI/2 1246
isatidifolium A.-T. VI/2 1323
Iseranum Uechtritz VI/2 1220
*isochromum N. P. VI/2 1232
*Issense Murr et Zahn VI/2 1305
*Istricum (Freyn) Nym. VI/2 1346
*istrogenes Zahn VI/2 1336
*istrogeton N. P. VI/2 1237
juraniforme Zahn VI/2 1327
*juranigenum Zahn VI/2 1327
*juranopsis Zahn VI/2 1327
Juranum Fr. VI/2 1324
*jurassiciforme Murr VI/2 1263
Juratzkae Zahn VI/2 1250
*Juratzkanum VI/2 1281
*Justinianum Zahn VI/2 1248
*Kaeseri N. P. VI/2 1215
Kaeserianum Zahn VI/2 1249
kajanense Sag. et Schn. VI/2 1212
Kalsianum Huter VI/2 1263
Kerneri Ausserdorfer VI/2 1304
Kerneri (Ausserd.) Zahn VI/2 1305
*Kerneri N. P. VI/2 1239
*kerneriforme Zahn VI/2 1305
Khekianum Zahn VI/2 1320
*Kiebleri Käser et Zahn VI/2 1200
*Killiasii Zahn VI/2 1291
*Kloeberi Rehm. VI/2 1218
*Knafii (Čelak.) Zahn VI/2 1333
*Knappianum Pal. et Zahn VI/2 1304
*knautiifrons Zahn VI/2 1305
Koernickeanum N. P. VI/2 1241
*Korbianum Zahn VI/2 1246
*Kraettlii Candrian VI/2 1206
Krafftianum Schw. et Zahn VI/2 1216

Hieracium *Krausei N. P. VI/2 1223
*Krempelhuberi (nicht pseudo-galbanum) Harz et Zahn VI/2 1288
*Kriwanense Wol. et Zahn VI/2 1316
*Kuekenthalianum Zahn VI/2 1313
Lachenalii Gmel. VI/2 1279
*laceridens Murr VI/2 1288
*lacerisectum Zahn VI/2 1276
*lacerum (Reut.) Zahn VI/2 1303
*lachnocaulon N. P. VI/2 1218
*laetum N. P. VI/2 1205
Laggeri Schultz-Bip. VI/2 1224
*lampreilema N. P. VI/2 1204
*lamprocomum N. P. VI/2 1203
lanatellum A.-T. VI/2 1300
lanatum Vill. VI/2 1300
lanceolatum (Vill.) Zahn VI/2 1322/23
*lancidens Zahn VI/2 1336
lancifolium N. P. VI/2 1231
*lancifrons Zahn VI/2 1326
*Langii N. P. VI/2 1228
*Lantoscanum (Burn. et Gr.) Zahn VI/2 1321
*laricicola Bernoulli et Zahn VI/2 1327
Laschii Zahn VI/2 1223
*lasianthelum Rom. et Zahn VI/2 1209
*lasiophyllum (Koch) Zahn VI/2 1269
*lasiothrix N. P. VI/2 1202
lathraeum N. P. VI/2 1208
*latisquamum N. P. VI/2 1205
*latisquamiforme Touton VI/2 1214
latisquamum N. P. VI/2 1205
*Latobrigorum Zahn VI/2 1337
*latiusculum N. P. VI/2 1200
laurinum A.-T. VI/2 1335, 1339
*Lavacense Murr VI/2 1304
Lawsonii Vill. VI/2 1266
*laxum N. P. VI/2 1214
*leiobium Murr et Zahn VI/2 1346
leiocephalum (Bartl.) Griseb. VI/2 1251
leiocephalum Pospichal VI/2 1251
leiopogon Gren. VI/2 1299
*leiosoma N. P. VI/2 1251
*leontodontoides (A.-T. et Briq.) Zahn VI/2 1309
*lepidiceps Dahlst. VI/2 1282
*leptocaulon N. P. VI/2 1217
Hieracium leptoclados N. P. VI/2 1235
*leptolepium N. P. VI/2 1206
leptophyton N. P. VI/2 1240
*Leucense (Wolf) Zahn VI/2 1232
*leucobasis Zahn VI/2 1294
leucochlorum (A.-T.) Zahn VI/2 1266
leucophaeum Gren. et God. VI/2 1259
*leucotrichocephaloides Käser et Zahn VI/2 1314
levicaule Jord. VI/2 1291
*levifolium N. P. VI/2 1208
levigans Zahn VI/2 1335
levigatum Willd. VI/2 1332
*Limonense (Burn. et Gr.) Zahn VI/2 1246
*linariifolium Wallr. VI/2 1338
Linderi F. O. Wolf VI/2 1209
*Liotardii (Vill.) Zahn VI/2 1301
Liptoviense Borb. VI/2 1312
*lissolepium Zahn VI/2 1335
*lithogenes Zahn VI/2 1272
*Lithuanicum N. P. VI/2 1204
*lividellum Zahn VI/2 1231
*lobodontum Zahn VI/2 1305
*lonchodes Murr VI/2 1292
*Longanum A.-T. et Belli VI/2 1248
*longicrinis Hofm. VI/2 1203
longifolium Schleich. VI/2 1267
*longisarmentum N. P. VI/2 1233
longiscapum Boiss. et Kotschy VI/2 1220
*longisetum N. P. VI/2 1243
longistolonosum Vollm. VI/2 1240
*Luesscheri Zahn VI/2 1343
*Lugdunense Rouy VI/2 1342
*Lugiorum VI/2 1290
*Lusenicum Zahn VI/2 1235
*luteoglaucescens Zahn VI/2 1272
*lutescens Huter VI/2 1331
*lycopifolioides Zahn VI/2 1344
lycopifolium (Fröl.) Zahn VI/2 1344
*macilentiforme Murr et Zahn VI/2 1328
*macilentum (Fr.) Zahn VI/2 1327
*macradenocladum Vetter et Zahn VI/2 1314
*macranthoides Zahn VI/2 1293
*macristolonum (N. P.) Zahn VI/2 1203
Hieracium *macrocalathium Zahn VI/2 1316
macrocephalum Huter VI/2 1321
*macro-Hoppeanum Beger et Zahn VI/2 1197
*macrolobophorum Harz et Zahn VI/2 1305
*macrorhombum Zahn VI/2 1327
*macrostolonum G. Schneid. VI/2 1219
*macrotus (Rchb.) Zahn VI/2 1324
maculatum Sm. VI/2 1278
maculifolium N. P. VI/2 1257
*Magistri (Godron) Zahn VI/2 1334
*Magnaetatrae Zahn VI/2 1291
*magnauricula N. P. VI/2 1204
*magnum N. P. VI/2 1204
Magyaricum N. P. VI/2 1238, 1239
*maledictum Zahn VI/2 1294
*manothyrsum N. P. VI/2 1242
Marchesettianum Zahn VI/2 1347
*marginale N. P. VI/2 1239
*Margittaianum Zahn VI/2 1347
*marmoratum N. P. VI/2 1257
*Matreiense Zahn VI/2 1308
*Matrense N. P. VI/2 1233
*Maureri Zahn VI/2 1293
Mayeri Vollmann VI/2 1240
*Medelingense (Wiesb.) Zahn VI/2 1273
*mediofurcum N. P. VI/2 1200
*Mediorhenanum Zahn VI/2 1243
*medium (Jord.) Zahn VI/2 1271
*megaladenium N. P. VI/2 1200
*megalodon (Dahlst.) Zahn VI/2 1278
*megalodontoides Zahn (nicht megalodon N. P.) VI/2 1259
*megalogonium Zahn VI/2 1281
*megalomastix N. P. VI/2 1239
*megalophyllum N. P. VI/2 1206
*melachaetum (Tausch) N. P. VI/2 1240
*melanadenium N. P. VI/2 1233

Hieracium *melananthum N. P. VI/2 1258
*melanauricula Zahn VI/2 1224
*melaneilema N. P. VI/2 1204
*melanocalyx N. P. VI/2 1251
*melanocephalum Tausch VI/2 1307
*melanophyton Zahn VI/2 1241
melanops A.-T. VI/2 1285
*melanops N. P. VI/2 1200
*melanotrichum (Reut.) Zahn VI/2 1323
*melanoxanthum N. P. VI/2 1223
*Mendelii N. P. VI/2 1206
*meringophorum N. P. VI/2 1213
*mesomorphum N. P. VI/2 1265
mespilifolium (A.-T.) Zahn VI/2 1324
*Michelii (Tausch) N. P. VI/2 1231
*micrasterophorum Zahn VI/2 1201
*microbium N. P. VI/2 1206
*microcephaloides Zahn VI/2 1200
*microcranum Zahn VI/2 1276
*micropsilon (Jord.) Zahn VI/2 1276
*Mielichhoferi Zahn VI/2 1310
*minuticeps N. P. VI/2 1201
mirabile N. P. VI/2 1214
Misaucinum N. P. VI/2 1259
*mixopolium Dahlst. VI/2 1335
*Moesiacum (A. Kern.) Zahn VI/2 1346
*Molendianum N. P. VI/2 1235
Molinierianum A.-T. et Gaut. VI/2 1285
molle Jacq. VI/2 1155
*mollipellis Zahn VI/2 1254
*Montafonense Murr et Zahn VI/2 1293
montanum Jacq. VI/2 1138
montanum N. P. VI/2 1235
montanum Scop. VI/2 1160
*monticola Jord. VI/2 1338
Morisianum Rchb. VI/2 1254
*Morlonense Zahn VI/2 1250
*Morteysense Zahn VI/2 1324
*Morthieri (Favrat) Zahn IV/2 1300
Mougeotii Fröl. VI/2 1267
Muellerianum A.-T. VI/2 1293
*multifidum N. P. VI/2 1236
Hieracium *multiglandulum (N. P.) Zahn VI/2 1264
*Muretianum Wilczek VI/2 1294
*Muretii (Gremli) Zahn VI/2 1248
*Murithianum (Favre) Zahn VI/2 1266
murorum L. VI/2 1273
murorum silvaticum L. z. Tl. VI/2 1285
Murrianum (A.-T.) Zahn VI/2 1292/93
*mycomum N. P. VI/2 1255
*Nadravicum Zahn VI/2 1241
Naegelii Norrlin VI/2 1225
*naevuliferum (Jord.) Zahn VI/2 1279
Nalunsicum Zahn VI/2 1265
*Nassovicum Zahn VI/2 1238
*Naxense N. P. VI/2 1232
neglectum A.-T. VI/2 1310
*Neilreichii (G. Beck) Zahn VI/2 1294
*Neilreichii N. P. VI/2 1242
*nemorense (Jord.) Zahn VI/2 1276
*nemorivagum (Jord.) Zahn VI/2 1342
neocerinthoides A.-T. VI/2 1267
*Neocomense Zahn VI/2 1296
*neogracile Zahn VI/2 1223
*neo-Hayekii Zahn VI/2 1311
*neozinkenense Zahn VI/2 1316
nigrescens Willd. VI/2 1308
*nigrescentiforme Zahn VI/2 1309
nigricarinum N. P. VI/2 1208
nigriceps N. P. VI/2 1220
*Nigrifontimontanum Zahn VI/2 1226
*nigripilum N. P. VI/2 1201
nigritellum (A.-T.) Zahn VI/2 1265
nigritum (Uechtr.) Zahn VI/2 1329
*nigrosetosum G. Schneid. VI/2 1307
niphobium N. P. VI/2 1209
*niphogeton Zahn VI/2 1293
*nipholepium N. P. VI/2 1246
*nivale (Fröl.) Zahn VI/2 1333
nivale Gelmi VI/2 1294
*nivescens N. P. VI/2 1200
niveum (Muell.-Aarg.) Zahn VI/2 1202
nivicolum Zahn VI/2 1314
*nivigemmum N. P. VI/2 1231
*Nivimontis Oborny et Zahn VI/2 1308
Norvegicum Fr. VI/2 1336
Hieracium *nothum N. P. VI/2 1235
*nudatum (Roch.) N. P VI/2 1251
*nudipedunculum N. P. VI/2 1233
*nutans Holler VI/2 1215
*Oberleitneri Schultz-Bip. VI/2 1303
*oblongifolioides Zahn VI/2 1234
Obornyanum N. P VI/2 1241
*obovatifolium Zahn VI/2 1236
*obscuratum N. P. VI/2 1233
obscurum (Rchb.) N. P. VI/2 1230
*obtusifolium N. P. VI/2 1197, 1202
*occiduum Zahn VI/2 1289
*Occitanicum (Jord.) Zahn VI/2 1342
*ochrocephaloides Harz et Zahn VI/2 1242
*ochrocephalum N. P. VI/2 1242
*Oenipolitanum Zahn VI/2 1219
*Ohlavicum Zahn VI/2 1218
*oliganthes N. P. VI/2 1235
oligocephalum (A.-T.) Zahn VI/2 1302
oligocephalum Neilr. VI/2 1288
oligodon N. P. VI/2 1247
oligophyllum N. P. VI/2 1260
olivaceum Gen. et Godr. VI/2 1267
onosmoides Fr. VI/2 1271
*oorhombum Zahn VI/2 1343
*orbicans (Almq.) Zahn VI/2 1277
oreades (Fr.) Zahn VI/2 1272
*oreites (A.-T.) Zahn VI/2 1288
*oreium N. P. VI/2 1220
*origines N. P VI/2 1222
*Ormontense N. P. VI/2 1257
*orthophyllum (G. Beck) Zahn VI/2 1323
*Ottmanense Benz et Zahn VI/2 1242
*ovale Murr VI/2 1294
*ovalifolium (Jord.) Sudre VI/2 1270
oxyodon Fr. VI/2 1248
*oxytorum N. P. VI/2 1203
*Ozanonis (F. Schultz) N. P. VI/2 1256
*pachyanthoides Zahn VI/2 1200
*pachyanthum N. P. VI/2 1199
*pachycephalum (Fr.) Zahn VI/2 1337
pachylodes N. P. VI/2 1203
*pachypodum Zahn VI/2 1233
*pachysoma N. P. VI/2 1213

Hieracium Paicheanum A.-T. VI/2 1294
*Palatinatus Zahn VI/2 1240
*Palatinense Zahn VI/2 1282
*Palatinum N. P VI/2 1206
*pallescens (Waldst. et Kit.) Zahn VI/2 1293
pallidiflorum Jord. VI/2 1321
pallidulum (Jord.) Zahn VI 2 1271
pallidum Bivona VI/2 1268
paludosum L. VI/2 1153
Pannonicum Jacq. VI/2 1140
*Pannonicum N. P. VI/2 1243
*Papperitzii (Reichb.) Zahn VI/2 1250
pappoleucum Vill. VI/2 1149
paragogiforme Besse et Zahn VI/2 1234
paragogum N. N. VI/2 1234
parcepilosum A.-T. VI/2 1324
*parcifloccum N. P. VI/2 1231
parvifolium Uechtr. VI/2 1323
*parvulum N. P. VI/2 1200
*pascuorum N. P. VI/2 1234
*patulum N. P. VI/2 1258
*Paulowae Zahn VI/2 1307
*Paznaunicum Zahn VI/2 1314
*pectinosiforme Zahn VI/2 1291
*pectinosum (Dst.) Zahn VI/2 1291
pedunculare Tausch VI/2 1329
*pedunculatum (Wallr.) N. P. VI/2 1233
*peletierianoides Zahn VI/2 1232
Peletierianum Mérat VI/2 1197
pellitum Fr. VI/2 1302
*pellucidum (Laest.) Zahn VI/2 1274
*perbellum Zahn VI/2 1233
*percrinitum Murr et Zahn VI/2 1200
*perelectum Zahn VI/2 1229
*perfoliatum (Fröl.) Zahn VI/2 1322
*periphanes N. P. VI/2 1203
periphanoides Zahn VI/2 1203
*permixtum N. P. VI/2 1214
permutatum N. P. VI/2 1208
*pernigrescens Zahn VI/2 1200
*perpurpurans Zahn VI/2 1276
*perrigidum Zahn VI/2 1335
*perscissum (Jord.) Zahn VI/2 1281
*persimulans Zahn VI/2 1283
*persinuatum Zahn VI/2 1277
perstriatum Zahn VI/2 1203
*perviride Zahn VI/2 1275
Peterianum Käser VI/2 1214
*petraeum (Hoppe) Zahn VI/2 1318
*petrophilum (Godet) Zahn VI/2 1259
Hieracium *Petryanum Zahn VI/2 1345
picroides Vill. VI/2 1331
*Pictaviense (Sauzé et Maill.) Zahn VI/2 1336
pictiforme Zahn VI/2 1299
pictum Pers. VI/2 1298
Pietroszense Degen et Zahn VI/2 1313
*pilicaule Sagorski VI/2 1217
*piliferitropum Harz et Zahn VI/2 1266
piliferum Hoppe VI/2 1264
*piliferum (Hoppe) N. P. VI/2 1264
Pilosella L. VI/2 1198
*Pilosella (L.) N. P. VI/2 1201
piloseliaeforme Hoppe VI/2 1196
piloselliforme N. P. VI/2 1221
pilosellinum (F. Schultz) Zahn VI/2 1237
piloselloides Vill. VI/2 1229
*piloselloides (Vill.) Zahn VI/2 1231
*pingue N. P. VI/2 1202
*pinguistolonum (N. P.) Zahn VI/2 1203
*pinnatifidum (Loennr.) Zahn VI/2 1280
*Piscinae Zahn VI/2 1219
*Plaidtense Schlick. et Touton VI/2 1226
platyphyllum A.-T. VI/2 1347
*pleianthum N. P. VI/2 1223
*pleiastrum Besse et Zahn VI/2 1237
pleiophyllum Schur VI/2 1296
*pleiotrichum Zahn VI/2 1277
*plicatulum Zahn VI/2 1240
*plicatum N. P. VI/2 1240
*plumbeum (Fr.) Zahn VI/2 1290
*Poellianum Zahn VI/2 1337
Poeverleinii Vollmann VI/2 1223
*pogonites N. P. VI/2 1301
*poliocladum N. P. VI/2 1231
*Pollichiae (Schultz-Bip.) Zahn VI/2 1279
*Polonicum N. P. VI/2 1215
*polyadenium (A.-T.) Zahn VI/2 1347
*polyanthemum N. P. VI/2 1240
*polybracteum N. P. 1255
*polycephalum (Velen.) Zahn 1311
*polychaetium N. P. VI/2 1205
*polychaetobium Zahn VI/2 1219
*polychaetoides Zahn VI/2 1218
*polysarcum N. P. VI/2 1224
pontanum L. VI/2 1138
porrectum Fr. VI/2 1262
Hieracium porrifolium L. VI/2 1243
porrigens (Almq.) Zahn VI/2 1290
Pospichalii Zahn VI/2 1252
praealtum Vill. VI/2 1229/30
praecox Schultz-Bip. VI/2 1269
*praecox (Schultz-Bip.) Zahn VI/2 1270
praecurrens Vukot. VI/2 1297
praemorsum L. VI/2 1157
praemorsum Poll. VI/2 1160
*praeruptorum (Godr.) Zahn VI/2 1323
Prantlii (N. P.) Zahn VI/2 1242
*Prapiozinum Wilczek et Zahn VI/2 1267
*prasinicolor Besse et Zahn VI/2 1308
*prasinifolium (Jord.) Sudre VI/2 1270
*prasinodermum Romieux et Zahn VI/2 1279
*prasinops Tout. et Zahn VI/2 1300
prasiophaeum A.-T. et Gaut. VI/2 1270
*Prassbergense Zahn VI/2 1248
*pratensifolium Zahn VI/2 1217
*pratensiforme Zahn VI/2 1236
*praticola (Tausch) N. P. VI/2 1229
*praticolum Sudre VI/2 1342
Predilense (N. P.) Zahn VI/2 1248
prenanthoides Vill. VI/2 1321
*Prenzlaviense Zahn VI/2 1281
*primulaceum N. P. VI/2 1237
Prinzii Käser VI/2 1285
*prionatum A.-T. VI/2 1259
prunellaefolium Gouan VI/2 1146
Prussicum N. P. VI/2 1217
*psammogenes Zahn VI/2 1288
*psammogeton Zahn VI/2 1291
*psammophilum N. P. VI/2 1238
*pseudalbinum (Uechtr.) Zahn VI/2 1326
*pseudalpinum N. P. VI/2 1266
*pseudargyrocalyx Zahn VI/2 1230
*pseudarolae Murr VI/2 1314
*pseudaurantiacum N. P. VI/2 1212
*pseudauricula N. P. VI/2 1220
*pseudauriculiforme Zahn VI/2 1206
*pseudaustriacum Zahn VI/2 1249
pseudeffusum N. P. VI/2 1243
*pseudelatum Zahn VI/2 1325
*pseudellipticum Zahn VI/2 1215
pseudelongatum N. P. VI/2 1261
*pseudeminens Zahn VI/2 1344

Hieracium *pseuderiopodum Zahn VI/2 1248
*pseud-Eversianum Murr et Zahn VI/2 1294
*pseudeximium (G. Schneid.) Zahn VI/2 1329
pseudextensum Zahn VI/2 1272
*pseudobasicuneatum Touton VI/2 1288
*pseudobicolor Dalla Torre et Sarnth. VI/2 1225
*pseudoblongum Touton VI/2 1275
pseudoboreale N. P. VI/2 1252
*pseudobrachiatum N. P. VI/2 1233
*pseudobscurum N. P. VI/2 1235
pseudobupleuroides N. P. VI/2 1252
*pseudocaesioides Romieux et Zahn VI/2 1300
pseudocalodon N. P. VI/2 1238
pseudocerinthe (Gaud.) Koch VI/2 1319
pseudochondrilloides Zahn VI/2 1258
pseudocirritum Zahn VI/2 1295
*pseudocollinum N. P. VI/2 1235
pseudocorymbosumGremliVI/2 1344
*pseudo-Cottetii Zahn VI/2 1303
*pseudocyaneum Zahn VI/2 1270
*pseudocymosum N. P. VI/2 1237
*pseudodiaphanum (Dst.) Zahn 1283
pseudodolichaetum Benz et Zahn VI/2 1315
pseudodollineri Zahn VI/2 1289
pseudoflexuosum N. P. VI/2 1256
*pseudoflorentinum N. P. VI/2 1234
pseudofritzei Zahn VI/2 1307
pseudofuscescens Zahn VI/2 1225
*pseudogaudinii Zahn VI/2 1259
*pseudogentile Zahn VI/2 1276
*pseudogothicum (A.-T.) Zahn 1334
pseudograndidentatum Zahn VI/2 1342
*pseudo-Halleri Zahn VI/2 1309
*pseudohemiplecum Zahn VI/2 1325
*pseudohumile Zahn VI/2 1304
pseudohybridum A.-T. VI/2 1237
Hieracium pseudojuranum (A.-T.) Zahn VI/2 1325
*pseudo-Kerneri Zahn VI/2 1239
*pseudo-Laggeri Zahn VI/2 1302
*speudoleptophyton Zahn VI/2 1221
*pseudoligocephalum Zahn VI/2 1288
*pseudoligusticum (Gremli) Zahn VI/2 1318
*pseudolycopifolium Zahn VI/2 1344
pseudomagyaricum Zahn VI/2 1243
*pseudominuticeps Zahn VI/2 VI/2 1201
*pseudomirabile Touton VI/2 1214
*pseudomurrianum Zahn VI/2 1293
*pseudonothum Zahn VI/2 1235
*pseudopantotrichum Zahn VI/2 1255
*pseudopenninum Zahn VI/2 1262
*pseudopersonatum (G. Schneid.) Zahn VI/2 1316
*pseudoplantagineum Zahn VI/2 1263
*pseudopollichiae Oborny et Zahn VI/2 1281
*pseudopsammogenes Touton VI/2 1289
*pseudoraeticum Zahn VI/2 1309
*pseudorionii Zahn VI/2 1299
*pseudorupigenum Zahn VI/2 1269
*pseudo-Schroeterianum Rom. et Zahn VI/2 1311
*pseudoschultesiiforme Zahn VI/2 1221
*pseudosilvularum Zahn VI/2 1275
*pseudosparsum Zahn VI/2 1239
pseudostenoplecum Zahn VI/2 1332
pseudosulphureum Touton VI/2 1238
*pseudotomentosum N. P. VI/2 1301
*pseudotrachselianum Zahn VI/2 1294
pseudotrichodes Zahn VI/2 1224
*pseudotridentinum Zahn VI/2 1294
pseudovallesiacum Zahn VI/2 1344
*pseudovenetianum Zahn VI/2 1232
Hieracium *pseudoversicolor N. P. VI/2 1213
*pseudovillosum N. P. VI/2 1257
*pseudo-Zizianum Vollm. VI/2 1222
*pseuduliginosum Zahn VI/2 1218
*pseudumbrosum Zahn VI/2 1278
pteropogon A.-T. VI/2 1301
*pteropogon (A.-T.) N. P. VI/2 1301
*pubigerum N. P. VI/2 1206
*pulchellum (Gren.) Zahn VI/2 1300
pulchrum (A.-T.) Zahn VI/2 1258
pulmonarioides (Vill.) Zahn VI/2 1318
*pulveratum N. P VI/2 1222
*pulverosum Zahn VI/2 1270
*pulverulentum N. P. VI/2 1201
*pumilum Hoppe VI/2 1307
pumilum L. VI/2 1146
*punctillaticeps Dahlst. VI/2 1283
purpurans Pernh. VI/2 1276
*purpurellum Zahn VI/2 1333
*Pustaricum N. P. VI/2 1215
Pyrenaicum L. VI/2 1141
pyrrhanthes N. P. VI/2 1214, 1215
*pyrrhanthoides N. P. VI/2 1215
*pyrrhophorum N. P. VI/2 1212
quercetorum Jord. VI/2 1342
*racemosiforme Zahn VI/2 1252
racemosum Waldst. et Kit. VI/2 1345
*radiatum N. P. VI/2 1231
*radiocaule (Tausch) N. P. VI/2 1239
*radula Uechtr. VI/2 1338
*Raetoromanum Zahn VI/2 1346
*Raeticum (Fr.) Zahn VI/2 1310
Raiblense Huter VI/2 1231
*Ramolicum Zahn VI/2 1205
ramosissimum Schl. VI/2 1331
ramosum Waldst. et Kit. VI/2 1296
*ramosum (Waldst. et Kit.) Zahn VI/2 1296
*ramulosum Zahn VI/2 1281
*raphiolepium N. P. VI/2 1261
rapunculoides A.-T. VI/2 1326
*raripilum N. P. VI/2 1215
*rarovelutum N. P. VI/2 1201

Hieracium *Rauricorum Zahn VI/2 1230
Rauzense Murr VI/2 1313
*Rauzense (Murr) Zahn VI/2 1314
Ravaudii A.-T. VI/2 1302
*Raxense G. Beck VI/2 1206
*Rebholzii Zahn VI/2 1236
*recensitum (Jord.) Sudre VI/2 1271
*Regiomontanum N. P. VI/2 1220
*regressum N. P. VI/2 1232
*Rehmannii N. P. VI/2 1224
*Reichardtii (N. P.) Zahn VI/2 1246
*Reichartense Zahn VI/2 1309
*Reidigense Zahn VI/2 1213
*retardatum Zahn VI/2 1335
Reuterianum Boiss. VI/2 1348
*Rhenopalatinum Zahn VI/2 1232
*Rhenovallis Zahn VI/2 1236
*rhoeadifolium (A. Kern.) Zahn VI/2 1293
Rhyparum N. P. VI/2 1237
Richenii Murr VI/2 1262
*rigens (Jord.) Zahn VI/2 1342
*rigidipilum N. P. VI/2 1200
rigidisetum Besse et Zahn VI/2 1237
rigidum Hartm. VI/2 1332
rigidum (Hartm.) Zahn VI/2 1334, 1336
*Rionii (Gremli) Zahn VI/2 1300
Riphaeum Uechtr. VI/2 1329
*Roffavieri (Jord.) Zahn VI/2 1342
*Rosaemontis N. P. VI/2 1232
*roseopictum Zahn VI/2 1241
Rostanii N. P. VI/2 1260
*rosuliferum N. P. VI/2 1234
Rothianum Wallr. VI/2 1228
rotundatum Kit. VI/2 1296
Rouyanum F. O. Wolf VI/2 1210
*Rowensburgense Zahn VI/2 1242
Roxense Sag. et Schneid. VI/2 1239
rubellum Zahn VI/2 1225
*rubricatum N. P. VI/2 1205
*rubripilosella G. Schneid. VI/2 1215
*rubrisabinum N. P. VI/2 1224
*rubrocroceum N. P. VI/2 1212
rubrum Peter VI/2 1221
*Ruebelianum Zahn VI/2 1260
rupicoliforme Zahn VI/2 1273
Hieracium rupicolum (Fr.) Zahn VI/2 1269
rupigenum Čelak. VI/2 1272
*Saasinum Rom. et Zahn VI/2 1336
Sabaudum L. VI/2 1340
*sabulicolum Zahn VI/2 1231
*sabulifovae Harz et Zahn VI/2 1231
Salaevense Rapin VI/2 1324
Salayense Zahn VI/2 1209
*Salvanicum Zahn VI/2 1304
*Samadense N. P. VI/2 1236
*Samoënsicum Zahn VI/2 1328
Samoviae N. P. VI/2 1241
Sanctum N. P. VI/2 1252
Sandozianum Zahn VI/2 1299
*sanguineum N. P. VI/2 1224
*Sarmaticum Zahn VI/2 1257
*sarmentosum (Froel.) Zahn VI/2 1243
*Sartonsicum Tout. et Zahn VI/2 1276
Sauteri Schultz-Bip. VI/2 1213
saxatile Jacq. VI/2 1250
saxifragum Fr. VI/2 1272
*saxigenum (Wiesb.) Zahn VI/2 1287
*Saxonicum N. P. VI/2 1242
*scabiosum Sudre VI/2 1342
*Scandinaviorum Zahn VI/2 1287
*Scanicum (Dahlst.) Zahn VI/2 1280
*Scharlockianum N. P. VI/2 1217
schizocladum Zahn VI/2 1255
*Schlickumianum Touton VI/2 1220
Schmidtii Tausch VI/2 1268
*Schmidtii (Tausch) Zahn VI/2 1269
*schmidtiiforme Zahn VI/2 1269
Schraderi Schleich. VI/2 1264
Schroeterianum Zahn VI/2 1311
Schultesii F. Schultz VI/2 1205, 1206
*Schultziorum N. P. VI/2 1206
*Schwarzii Harz et Zahn VI/2 1316
*Schweidtnitzense N. P. VI/2 1227
sciadophorum N. P. VI/2 1223
*sciadophorum N. P. VI/2 1224
*sciaphiloides Zahn VI/2 1292
sciaphilum (Uechtr.) Zahn VI/2 1280
scitulum Woloszczak VI/2 1316
scorzonerifolium Vill. VI/2 1255
Hieracium *scutatum (A.-T.) Zahn VI/2 1288
*Sedunense (Gremli) Zahn VI/2 1341
Segureum A.-T. VI/2 1329
*semiatratum Zahn VI/2 1314
*semiirriguum Zahn VI/2 1276
*seminigriceps Zahn VI/2 1220
*semipraealtum Born. et Zahn VI/2 1234
*semirupicolum Zahn VI/2 1269
*semisilvaticiforme Zahn VI/2 1276
*semisilvaticum Zahn VI/2 1277
semivulgatum (nicht vulgatifolium) Zahn VI/2 1296
Sempronianum (Wolf) Zahn VI/2 1271
*Sendtneri (Näg.) Zahn VI/2 1290
senescens Backh. VI/2 1308
*senile (A. Kern.) Zahn VI/2 1288
*sericophorum N. P. VI/2 1209
*serratifolium (Jord.) Zahn VI/2 1275
serratum N. P. VI/2 1316
*setiparum Zahn VI/2 1229
Sibiricum L. VI/2 1137
*Siderense Zahn VI/2 1291
*Sieberi (Tausch) Zahn VI/2 1331
*Silesiacum (Krause) Zahn VI/2 1349
Silsinum N. P. VI/2 1262
*silvaticiforme Zahn VI/2 1311
silvaticum auct. VI/2 1273
silvicolum (Fr.) Zahn VI/2 1217
*silvularum (Jord.) Zahn VI/2 1277
simia Huter VI/2 1313
*similatum (Jord.) Zahn VI/2 1270
*simulans Pernh. VI/2 1283
*singulare N. P. VI/2 1206
*sinuosifrons (Almq.) Zahn VI/2 1287
Smithii A.-T. VI/2 1209
Sommerfeltii Lbg. VI/2 1295
*Sonklarianum Zahn VI/2 1294
*spanochaetium N. P. VI/2 1212
sparsiflorum Fr. VI/2 1348
*sparsiramum N. P. VI/2 1247
sparsum Friv. VI/2 1348
*sparsum N. P. VI/2 1239

Hieracium *spathodonton (A.-T.) Zahn VI/2 1293
spathophyllum N. P. VI/2 1220
*spathulifrons Zahn VI/2 1316
speciosum (Willd.) Hornem. VI/2 1263
*Spelugense N. P. VI/2 1215
*speluncarum (A.-T.) Zahn VI/2 1318
spaerocephalum Froel. VI/2 1207
*sphaleron N. P. VI/2 1238
*Spinalense Touton VI/2 1214
*Sprecheri Zahn VI/2 1293
squalidum A.-T. VI/2 1304
staticifolium All. VI/2 1349
stellipilum N. P. VI/2 1210
*stellulatum Zahn VI/2 1310
*stenobium N. P. VI/2 1199
*stenocephalum N. P. VI/2 1217
*stenolepium N. P. VI/2 1205, 1206
* stenophyllum N. P. VI/2 1200
stenoplecum A.-T. et Huter VI/2 1332
Sternbergii Horn. VI/2 1156
sterrochaetium N. P. VI/2 1228
Sterzingense Zahn VI/2 1317
*stipatiforme (Dahlst.) Zahn VI/2 1283
stipitatum Jacq. VI/2 1077
Stiriacum A. Kern. VI/2 1346
stoloniflorum Waldst. et Kit. VI/2 1213
*Straehleri Zahn VI/2 1284
*striatobrachiatum (N. P.) Zahn VI/2 1233
*strictipilum Zahn VI/2 1305
*strictissimum (Froel.) Zahn VI/2 1322
*stygium (Uechtr.) Zahn VI/2 1330
*subacuminatum Zahn VI/2 1281
subalpinum (A.-T.) Zahn VI/2 1326
*subambiguum N. P. VI/2 1226
*subampliatum (Dahlst.) Zahn VI/2 1284
*subaurantiacum N. P. VI/2 1212
*subauricula N. P. VI/2 1220
*subbifidiforme Zahn VI/2 1247
*subbifidum Zahn VI/2 1300
*subcaesiiceps Zahn VI/2 1288
subcaesiiforme Zahn VI/2 1296
subcaesium (Fr.) Zahn VI/2 1288
Hieracium *subcaulescens N. P. VI/2 1200
*subcomatulum Zahn VI/2 1269
subcontractum Zahn VI/2 1327
*subcoriifolium Zahn VI/2 1250
subcymiflorum Oborny et Zahn VI/2 1243
subcymigerum Zahn VI/2 1231
*subdentatum N. P. VI/2 1265
*subdoronicifolium Zahn VI/2 1263
*subeglandulosum N. P. VI/2 1206
*subelongatum N. P. VI/2 1262
subeminens Touton VI/2 1215
*subepimedium Zahn VI/2 1328
*subexilentum Zahn VI/2 1326
*subeximium Zahn VI/2 1309
*subexpallens Zahn VI/2 1257
*subexpansum Zahn VI/2 1315
*subfallacinoides Touton VI/2 1233
*subfarinellum Zahn VI/2 1275
*subfarinosum Zahn VI/2 1236
*subfasciculans Zahn VI/2 1220
*subfasciculatum N. P. VI/2 1220
*subfrigidarium N. P. VI/2 1230
subfusciforme Käser et Zahn VI/2 1216
subgermaniciforme Zahn VI/2 1242
subglaberrimum (Sendtner) Zahn VI/2 1247
*subglabrescens Zahn VI/2 1261
*subglomeratum Arv.-Touvet VI/2 1222
*subgracilipes Zahn VI/2 1335
*subhumile Zahn VI/2 1304
subhyperdoxum Touton VI/2 1242
*subincisiforme Zahn VI/2 1287
*subinsigne Zahn VI/2 1236
*subintermedium Zahn VI/2 1294
*subintermixtum Zahn VI/2 1332
subirriguiforme Zahn VI/2 1277
*subirriguifrons Zahn VI/2 1283
*subirriguum Dahlst. VI/2 1282
Hieracium *subisaricum Murr et Zahn VI/2 1246
*subkajanense Zahn VI/2 1212
*sublactucaceum Zahn VI/2 1342
*sublanciferum Zahn VI/2 1231
*sublevicaule Zahn VI/2 1280
*sublevigatum G. Beck VI/2 1248
sublongifolium Zahn VI/2 1256
*sublongisquamum Zahn VI/2 1203
*submolliceps Zahn VI/2 1287
*subneglectum Zahn VI/2 1310
*subnemorense Zahn VI/2 1275
subnigrescens (Fr.) Zahn VI/2 1310
*subnigriceps Zahn VI/2 1220
*suboleicolor Zahn VI/2 1326
*subpallescens G. Beck VI/2 1248
*subparviflorum Zahn VI/2 1200
subpatulum Zahn VI/2 1258
*subpeletierianum N. P. VI/2 1198
*subperfoliatum (A.-T.) Zahn VI/2 1325
*subphaeodes Vollm. VI/2 1230
*subpiliferum (A.-T.) Zahn 1265
*subpilosella N. P. VI/2 1203
*subpumilum Zahn VI/2 1309
*subraeticum Zahn VI/2 1309
subrubens A.-T. VI/2 1208
*subrude (A.-T.) Zahn VI/2 1271
*subruncinatum N. P. VI/2 1257
subsagittatum Zahn VI/2 1289
subsenile Zahn VI/2 1315
subserratosinuatum Zahn VI/2 1331
*subsetosum Touton VI/2 1203
*subsinuatum N. P. VI/2 1260
*subspeciosum N. P. VI/2 1258
subspurium Bornm. et Zahn VI/2 1223
subsquarrosulum Zahn VI/2 1305
*substipatiforme Bornm. et Zahn VI/2 1284
substoloniflorum N. P. VI/2 1213
*subtardans N. P. VI/2 1203
subtardans (N. P.) Zahn VI/2 1203

Hieracium *subtenellum Zahn VI/2 1295
*subtile N. P. VI/2 1233
subtilissimum Zahn VI/2 1324
*subtrichotum Zahn VI/2 1217
*subtridentatum Zahn VI/2 1337
subumbellare Zahn VI/2 1251
*subumbellosum N. P. VI/2 1231
*subvaldepilosum Zahn VI/2 1261
*subvillosulipes (nicht subvillosuliceps) Käser et Zahn VI/2 1296
*subvirenticeps Zahn VI/2 1200
*subvirentisquamum Touton VI/2 1202
*subvirescens N. P. VI/2 1200
*subvirgatum Zahn VI/2 1338
*subviriduliceps Zahn VI/2 1282
*subvulgare (N. P.) Zahn VI/2 1200
*subwiesbaurianum Zahn VI/2 1272
*subzinkenense Zahn VI/2 1309
*succisifolium All. VI/2 1155
*Sudavicum N. P. VI/2 1220
Sudeticum (Sternb.) Zahn VI/2 1329
*Sudetorum N. P. VI/2 1217
*Suecicum (Fr.) N. P VI/2 1220
*Sulgerianum Käser et Zahn VI/2 1205
sulphureum Döll VI/2 1233
*sulphureum (Döll) N. P VI/2 1234
*superpratense Korb et Zahn VI/2 1241
suprafloccosum (N. P.) Zahn VI/2 1223
Sylticum Zahn VI/2 1335
symphytaceum A.-T. VI/2 1347
sympodiale Borb. VI/2 1228
*tanythrix N. P. VI/2 1243
tardans N. P. VI/2 1202
tardiusculum N. P VI/2 1206
*Tatrense N. P. VI/2 1218
Tauschii Zahn VI/2 1242
tectorum Karsch VI/2 1165
Tendinum N. P. VI/2 1224
tenellum Huter VI/2 1295
*tenerum N. P. VI/2 1246
*tenuiceps N. P. VI/2 1238
tenuiflorum (A.-T.) Zahn VI/2 1277
*tenuifolium Host VI/2 1346
*tenuiscapum N. P. VI/2 1206
tephrodermum Zahn VI/2 1315
tephrodes N. P. VI/2 1232
tephrogiaucum N. P. VI/2 1229
*tephrolepium N. P. VI/2 1246
Hieracium tephrophyton Oborny et Zahn VI/2 1229
tephropogon Zahn VI/2 1294
*tephroprenanthes Zahn VI/2 1326
*tephrops N. P. VI/2 1239
tephrosoma (N.P.) Zahn VI/2 1313
*Teplicense N. P. VI/2 1219
*tephrosanthes Peter VI/2 1225
*tephrosphaera Zahn VI/2 1203
*testimoniale N. P. VI/2 1197
*thaumasioides N. P. VI/2 1239
*thaumasium N. P. VI/2 1239
*Thayngenense Zahn VI/2 1277
*Theissenii Zahn VI/2 1262
*Thellungianum Palézieux et Zahn VI/2 1313
Thomasianum Zahn VI/2 1316
*Thuringiacum Zahn VI/2 1287
*tigridinaevum Zahn VI/2 1257
*tigrinum N. P. VI/2 1237
*tiltophyllum N. P. VI/2 1206
*Timaviense N. P. VI/2 1251
*Tiroliense (J. Kerner) Zahn VI/2 1214
tomentosum All. VI/2 1300
*torticeps (Dahlst.) Zahn VI/2 1276
*tortifolium (Jord.) Zahn VI/2 1285
Toutonianum Zahn VI/2 1304
*Toutonii Zahn VI/2 1289
*trachselianoides Zahn VI/2 1293
Trachselianum Christ. VI/2 1293
trachybium Zahn VI/2 1334
*transalpinum (A.-T.) Zahn VI/2 1323
*transiens Zahn VI/2 1233
Transsilvanicum Heuff. VI/2 1296
*Trautmannii Uechtr. VI/2 1330
Trebevicianum K. Maly VI/2 1297
Trefferianum N. P. VI/2 1257
*trichadenium N. P. VI/2 1200
*tricheilema N. P. VI/2 1204
*trichocymum Touton et Zahn VI/2 1243
trichodes N. P. VI/2 1224
*trichojuranum Zahn VI/2 1324
*tricholepium N. P. VI/2 1200
*trichoneuron Prantl VI/2 1256
*trichophorum N. P. VI/2 1199
*trichopicris Zahn VI/3 1332
trichopraecox Zahn VI/2 1270
*trichoprenanthes Zahn VI/2 1344
trichopsis Zahn VI/2 1295
Hieracium *trichoscapum N. P. VI/2 1199
*trichosoma N. P. VI/2 1200
*trichothecum Zahn VI/2 1312
*trichotum N. P. VI/2 1217
*tridentatifolium Zahn VI/2 1337
*tridentatoides Zahn VI/2 1284
tridentatum Fr. VI/2 1332
tridentatum (Fr.) Zahn VI/2 1334
*Tridentinum N. P. VI/2 1224
triviale (Norrl.) Zahn VI/2 1291
*trivialiforme Zahn VI/2 1313
*Trothanum Zahn VI/2 1336
*Tscherningii Zahn VI/2 1243
tubulascens Norrl. VI/2 1226
tubulosum (Tausch) Zahn VI/2 1307
*Tuorsinum N. P. VI/2 1215
*turbinatum N. P. VI/2 1246
*Turrilacense Zahn VI/2 1243
turritiforme N. P VI/2 1257
*Uechtritzianum (G. Schneid.) Zahn VI/2 1316
*Uechtritzii N. P VI/2 1217
*Ullepitschii Blocki VI/2 1210
umbella N. P VI/2 1225
umbellatum L. VI/2 1337; VII 213
umbelliferum N. P. VI/2 1242
umbrosum Jord. VI/2 1326
*umbrosum (Jord.) Zahn VI/2 1326
*undulifolium N. P. VI/2 1253
*Uratense N. P. VI/2 1231
urticaceum A.-T. VI/2 1319
*vagum Jord. VI/2 1342
Vaillantii (Tausch) Zahn VI/2 1222
*valdefastigiatum Zahn VI/2 1276
valdepilosum Vill. VI/2 1260
valdepilosum (Vill.) Zahn VI/2 1261
*valdescabrum Zahn VI/2 1347
*valdestriatum N. P VI/2 1233
Vallesiacum (Fr.) Zahn VI/2 1344
Valloddae Zahn VI/2 1305
*Valsanctae Zahn VI/2 1343
*Valzifenzicum Feurst. et Zahn VI/2 1315
*variegatum N. P. VI/2 1214
*variidens Murr et Zahn VI/2 1293
*varium N. P. VI/2 1200
*Vasconicum (Jord.) Zahn VI/2 1339
*velutifolium N. P. VI/2 1201
*velutinoides Zahn VI/2 1201
Venetianum N. P. VI/2 1232

Hieracium *ventricatum N. P. VI/2 1204
*Veragrorum Zahn VI/2 1237
*Verlotii (Jord.) Zahn 1271
*vernum (Sauzé et Maill.) Zahn VI/2 1270
Vetterianum Zahn VI/2 1349
*Vierhapperi Zahn VI/2 1349
*Villarsii (F Schultz) N. P. VI/2 1233
villosiceps N. P. VI/2 1254
*villosifolium N. P. VI/2 1254
*villosiforme N. P. VI/2 1257
*villosissimum N. P. VI/2 1253
villosum L. VI/2 1252
*Vindobonae Zahn VI/2 1229
*violascens (Almq.) Zahn VI/2 1283
Vipetinum Zahn VI/2 1326
*virenticanum N. P. VI/2 1223
*virenticeps (Dahlst.) Zahn VI/2 1290
*virentisquamum N. P. VI/2 1197
*virescens (Sonder) Zahn VI/2 1342
*virgatum Peter VI/2 1338
virgicaule N. P. VI/2 1251
*virgultorum (Jord.) Zahn VI/2 1342
viride A.-T. VI/2 1329
*viridiatrum N. P. VI/2 1197
*viridicollum (Jord.) Zahn VI/2 1276
*viscidulum (Tausch) N. P. VI/2 1240
viscosum A.-T. VI/2 1331
*viscosum (A.-T.) Zahn VI/2 1331
*Visianii N. P. VI/2 1232
*vittatiflorum N. P. VI/2 1207
*vittiferum N. P. VI/2 1235
Vogesiacum Moug. VI/2 1267
Vollmannii Zahn VI/2 1311
*Vorarlbergense Murr et Zahn VI/2 1278
*vulcanicum (Griseb.) Zahn VI/2 1269
*vulgare (Tausch) N. P. VI/2 1200
vulgatum Dahlst. VI/2 1291
vulgatum Fr. VI/2 1279
vulgatum var. alpestre Uechtr. VI/2 1284
*Vulpianum N. P. VI/2 1262
*vulsum Zahn VI/2 1237
*Weissianum N. P. VI/2 1240
*Weitfeldense Murr VI/2 1331
Wiesbaurianum Uechtr. VI/2 1272
Wilczekianum A.-T. VI/2 1263
Wilczekii Zahn VI/2 1267
*Willdenowianum Zahn VI/2 1261
Hieracium *Willdenowii (Monn.) N. P. VI/2 1246
*Wimmeri (Uechtr.) Zahn VI/2 1328
*wimmerioides Zahn VI/2 1328
*Wollinense Zahn VI/2 1229
*xanthoprasinum Zahn VI/2 1227
*xantothyrsum Fest et Zahn VI/2 1242
*xystolepium N. P. VI/2 1205
*Zahnii Oborny VI/2 1256
Zeneggenense Wilcz. et Zahn VI/2 1232
*Zinkenense (Pernh.) Zahn VI/2 1310
Zizianum Tausch VI/2 1236
*Znoymende N. P. VI/2 1229
*Zobelianum Zahn VI/2 1295
*Zollikoferi N. P. VI/2 1224
„ *Zoyae Zahn VI/2 1312
Hierochloë R. Br. I 200; VII 154
australis Roem. et Schult. I 202
„ odorata (L.) Wahlenb. I 201
Hillebrandia Oliv. V/1 664
Himantandraceae VII 175
Himantoglossum Spreng. II 360; VII 164
caprinum Spreng. II 360
cucullatum Rchb. II 368
hircinum Spreng. II 360; VII 166 Fig. 1204
Hippeastrum Herb. II 319; VII 162 Fig. 1195
Hippion alpinum F. W. Schmidt V/3 2013
Bavaricum F. W. Schmidt V/3 2021
ciliatum Schmidt V/3 2028
Cruciatum Schmidt V/3 2004
longe-pedunculatum F. W. Schmidt V/3 2026
nanum Schmidt V/3 2027
nivale F. W. Schmidt V/3 2025
prostratum Schmidt V/3 2006
pumilum F. W. Schmidt V/3 2020
pusillum F. W. Schmidt V/3 2020
utriculosum F. W. Schmidt V/3 2023
Hippocastanaceae V/1 296; VII 187
Hippocastanum vulgare Gaertn. V/1 301
Hippocrataceae V/1 256; VII 187
Hippocrepis L. IV/3 1481; VII 182
ciliata Willd. IV/3 1481
comosa L. IV/3 1482
multisiliquosa auct. IV/3 1481
perennis L. IV/3 1482
„ unisiliquosa L. IV/3 1481
Hippoglossum maritimum Martin. V/3 2128
Hippomane Mancinella L. V/1 118
Hippomarathrum Roehl. V/2 1226
Bocconei Boiss. V/2 1093
Libanotis Koch V/2 1093
pelviforme Gaertn., Meyer et Scherb. V/2 1230
„ vulgare Roehl. V/2 1229
Hippophaë L. V/2 731; VII 191
argentea Pursh V/2 729
Canadensis L. V/2 730
rhamnoides L. V/2 732
salicifolia Don V/2 732
„ Thibetana Schlecht. V/2 731
Hippophaestum vulgare S. F Gray VI/2 978
Hipposelinum Britton et Rose V/2 1349
Hippuridaceae V/2 905; VII 193
Hippuridineae V/2 698; VII 193
Hippuris L. V/2 905; VII 193
maritima Hellenius V/2 905
montana Ledeb. V/2 905
vulgaris L. V/2 906; VII 106 Fig. 1139
Hirculus punctatus Rafin. IV/2 621
„ ranunculoides Haw. IV/2 621
Hirschfeldia Moench IV/1 219, 226; VII 177
geniculata Pomel IV/1 229
incana (L.) Lagrèze-Fossat IV/1 226
Pollichii Fritsch IV/1 224
„ varians Pomel IV/1 219
Hladnikia Koch V/2 1087; VII 194
Rchb. V/2 1180
Golacensis Koch V/2 1087
Golaka Rchb. V/2 1087
„ pastinacifolia Rchb. V/2 1180
Hohenwarthia Pumilio Pacher III 347
Holachne Ehrenb. V/1 545
Holcus L. I 238; VII 154
australis Schrad. I 202
avenaceus Scop. I 260
borealis Schrad. I 201
bulbosus Schrad. I 261
lanatus L. I 238
mollis L. I 239
odoratus L. I 201
„ triflorus Poll. I 251
Hollboellia Wall. VII 175
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. IV/2 663
Holoschoenus australis Rchb. II 28
exserens Rchb. II 28
„ vulgaris Lk. II 28
Holosteum L. III 377; VII 173
dichotomum C. Koch III 362
succulentum L. III 403
„ umbellatum L. III 377
Holostigma Bothae Spach V/2 866
Homalocarpus Hook. et Arnold V/2 956
Homalocenchrus oryzoides Poll. I 194
Homogyne Cass. VI/2 696; VII 211

Homogyne alpina (L.) Cass. VI/2 698
Ausserdorferi Hut. VI/2 701
discolor (Jacq.) Cass. VI/2 700
silvestris (Scop.) Cass. VI/2 697
Homostachyae VII 156
Honckenya Ehrh. III 403; VII 173
„ peploides Ehrh. III 403
Hoodia Sweet V/3 2067
Hookera Salisb. II 278
Hookeriaceae VII 147
Hoplestigmataceae VII 197
Hoplismenus undulatifolius Pal. I 190
Hoppea Sibirica Rchb. VI/2 797
Hordeae I 402; VII 155
Hordeum L. I 396; VII 155
arenarium Aschers. I 401
caput Medusae Coss. I 400
ciliatum Gilib. I 398
cylindricum Murray I 401
distichon L. I 397
elymoides Vest I 401
Europaeum All. I 401
geniculatum All. I 400
Hystrix Roth I 400
jubatum L. I 396
leporinum Lk. I 399
marinum Huds. I 400
maritimum With. I 400
montanum Schrank I 401
murinum L. I 398
nodosum L. I 399
polystichon Haller I 398
pratense Huds. I 399
secalinum Schreb. I 399
silvaticum Huds. I 401
spontaneum K. Koch I 397
tetrastichum Körn. I 398
villosum Moench I 401
„ Zeocrithon L. I 398
Horkelia Rchb. VII 158
Horminum L. V/4 2472; VII 203
coccineum Moench V/4 2479
coloratum Moench V/4 2488
Pyrenaicum L. V/4 2472
sativum Mill. V/4 2487
verbenaceum Mill. V/4 2495
„ verticillatum Mill. V/4 2503
Hormomyia poae I 315
Hornungia petraea (L.) Rchb. IV/1 360
Hortensia Commers. IV/2 563; VII 179
opuloides Lam. IV/2 564
„ speciosa Pers. IV/2 564
Hosackia Dougl. IV/3 1352
Hosta caerulea Tratt. II 277; VII 160 Fig. 1188
„ Japonica Voss II 277
Hoteia Japonica Morr. et Decne. IV/2 566
Hottonia L. V/3 1832; VII 197
Hottonia millefolium Gilib. V/3 1832
„ palustris L. V/3 1832
Houstonia caerulea L. VI/1 196
„ purpurea L. VI/1 196
Houttuynia cordata Thunb. III 209
Hovea R. Br. VII 182
Hovenia dulcis Thunb. V/1 324
Howittia F. v. Muell. V/1 455
Hoya Ariadne Decne. V/3 2067
australis R. Br. V/3 2067
bella Hook. V/3 2067
carnosa R. Br. V/3 2067
imperialis Lindl. V/3 2067
„ Rumphii Bl. V/3 2067
Huegelia Rchb. V/2 956
Huertea Ruiz et Pav. VII 187
Hugueninia tanacetifolia Rchb. IV/1 159
Humiriaceae V/1 36; VII 184
Humulus L. III 130; VII 169
Japonicus Sieb. et Zucc. III 130
Lupulus L. III 130; VII 80 Fig. 1114
Hunnemannia Sweet VII 176
Hura crepitans L. V/1 118
Hutchinsia R. Br. IV/1 337; VII 178
affinis Gren. IV/1 359
alpina (L.) R. Br. IV/1 358
brevicaulis Hoppe IV/1 359
cepeaefolia DC. IV/1 133
pauciflora Loret IV/1 363
petraea (L.) R. Br. IV/1 360
procumbens (L.) Desv. IV/1 361
procumbens (L.) Desv. var. pauciflora (Koch) Lecoq et Lamotte IV/1 362
Prostii J. Gay IV/1 363
rotundifolia R. Br. IV/1 132
Schoenachii Murr IV/1 363
speluncarum Jord. IV/1 363
„ Torreana Ten. IV/1 128
Hyacinthella angustifolia Med. II 279
„ leucophaea Schur II 279
Hyacinthus non scriptus L. II 249
amethystinus L. II 279
comosus L. II 259
fuliginosus Pall. II 259
leucophaeus Stev. II 279
Orientalis L. II 279
pratensis Lam. II 249
racemosus L. II 257
„ Romanus L. II 279
Hyalolaena Bunge V/2 1310
Hybanthus Ipecacuanha (L.) Taubert V/1 586
Hydatica stellaris S. F. Gray IV/2 624
Hydnaceae VII 142
Hydnophytum Jack. VII 207
Hydnoraceae III 165; VII 170
Hydora Lithuanica Andrz. I 159
Hydrangéa L. IV/2 563
arborescens L. IV/2 564
Hortensia Sieb. IV/2 564
nivea Mich. IV/2 564
opuloides Koch IV/2 564
paniculata Sieb. IV/2 564
radiata Walt. IV/2 564
„ scandens Maxim. IV/2 564
Hydrangeoideae VII 179
Hydrastioideae VII 174
Hydrastis Canadensis L. III 453
Hydrilla L. VII 193
„ verticillata Caspary I 159
Hydrocaryaceae V/2 882; VII 192
Hydrocharis L. I 163; VII 153
Asiatica Miq. I 159
„ Morsus ranae L. I 164
Hydrocharitaceae I 158; VII 153
Hydrochloa aquatica Hartm. I 321
distans Hartm. I 323
fluitans Host I 319
„ maritima Hartm. I 324
Hydrocleis nymphoides (Willd.) Buchenau I 157
Hydrocotyle L. V/2 951; VII 193
Asiatica L. V/2 955
inundata Sm. V/2 1152
lunata Lam. V/2 955
multiflora Ruiz et Pav. V/2 952
natans Cyr. V/2 952
pleiantha Cesati V/2 954
prolifera Maratti V/2 954
ranunculoides L. V/2 952
Schkuhriana Rchb. V/2 954
umbellata L. V/2 952
vulgaris L. V/2 952
„ vulgaris Schkuhr V/2 954
Hydrocotyloideae V/2 949; VII 193
Hydrodictyaceae VII 138
Hydrogastraceae VII 138
Hydroléa spinosa L. V/3 2122
„ Zeylanica (L.) Vahl V/3 2119
Hydromystria G. F. W. Mey. I 159
Hydropeltis purpurea Michx. III 438
Hydrophyllaceae V/3 2119; VII 200
Hydrophyllum Canadense L. V/3 2122
capitatum Dougl. V/3 2119
„ Virginianum L. V/3 2122
Hydropterides I 47
Hydropyrum esculentum Lk. I 196
Hydrostachydaceae IV/2 654; VII 179
Hyerocotyle Schur V/2 951
Hygrophoraceae VII 142
Hymenaea Courbaril L. IV/3 1131
Hymenanthera crassifolia Hook. f. V/1 586
Hymenidium Lindl. V/2 1089
Hymenocallis Salisb. VII 159 Fig. 1186
Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi IV/3 1352

Hymenogastraceae VII 143
Hymenolaena DC. V/2 1089
Hymenolichenes VII 144
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. IV/1 361
Hymenophyllaceae I 7; VII 148
Hymenophyllum Tunbrigense Sm. et Sow. I 7; VII 148
Hyoscyamus L. V/4 2573; VII 203
albus L. V/4 2578
Bohemicus Schmidt V/4 2575
muticus L. V/4 2574
niger L. V/4 2574
reticulatus L. V/4 2574
„ Scopolia L. V/4 2570
Hyoseris L. VII 212
foetida L. VI/2 1002
minima L. VI/2 1004
radiata L. VI/2 1007
„ scabra L. VI/2 1007
Hypechusa hybrida Alef. IV/3 1509
„ lutea Alef. IV/3 1545
Hypecoideae IV/1 18; VII 176
Hypecoum grandiflorum Benth. IV/1 18
pendulum L. IV/1 19
„ procumbens IV/1 18
Hyperanthera Moringa Vahl IV/1 491
Hypericaceae V/1 498; VII 189
Hypericoideae V/1 499; VII 189
Hypericum L. V/1 502; VII 189
acutum Moench V/I 520
amplexicaule L. V/1 523
Androsaemum L. V/1 511
Ascyron L. V/1 504
bacciferum Lam. V/1 511
barbatum All. V/1 531
barbatum Jacq. V/1 532
calycinum L. V/1 504
Carinthiacum Froehlich V/1 533
cernuum Roxb. V/1 504
Coris L. V/1 513
Delphinense Vill. V/1 517
Desetangsii Lamotte V/1 518
dubium Leers V/1 517
elegans Stephan V/1 522
empetrifolium Willd. V/1 503
fimbriatum Lam. V/1 531
galioides Lam. V/1 505
grandifolium Choisy V/1 505
Helodes L. V/1 509
hircinum L. V/1 505
hirsutum L. V/1 515
Hookerianum Wight et Arn. V/1 504
humifusum L. V/1 514
Japonicum Thunb. V/1 505
intermedium Bellynck V/1 518
Kalmianum L. V/1 503
Kohlianum Spr. V/1 522
Laschii Froehlich V/I 533
lysimachioides Wall. V/1 505
Hypericum maculatum Crtz. V/1 517
medium Peterm. V/1 533
montanum L. V/1 524
mutilum L. V/1 505
obtusum Moench V/1 517
officinarum Crtz. V/1 526
Olympicum L. V/1 504
patulum Thunb. V/1 505
perforatum L. V/1 526
polyphyllum Boiss. et Heldr. V/1 505
prolificum L. V/1 504
pulchrum L. V/1 523
quadrangulum auct. V/1 517
quadrangulum Crtz. V/1 520
reptans Hook. f. et Thoms. V/1 505
Richeri Vill. V/1 530
stenophyllum Opiz V/1 528
tetraptero-quadrangulum Lasch V/1 533
tetrapterum Fries V/1 520
tomentosum L. V/1 505
verticillatum Lam. V/1 513
„ villosum Crtz. V/1 515
Hyphomycetes VII 143
Hypnaceae VII 147
Hypochoeris L. VI/2 1008; VII 212
Achyrophorus L. VI/2 1008
arachnoides Poiret var. erostris Coss. et Germ. VI/2 1016
ascendens Brot. VI/2 1015
Balbisii Koch VI/2 1016
Balbisii Loisel. VI/2 1016
dimorpha Brot. VI/2 1015
glabra L. VI/2 1015
Helvetica Wulf. VI/2 1011
maculata Facch. VI/2 1012
maculata L. VI/2 1009
radicata L. VI/2 1013
stellata Gat. VI/2 1015
uniflora Vill. VI/2 1011, 1355 Fig. 960; VII 212 Fig. 1266
uniflora Vill. subsp. Facchiniana (Ambr. pro sp.) VI/2 1012
Hypocreales VII 140
Hypoglottis polyspermus Torrey et Gray IV/3 1428
Hypopitys Monotropa Crtz. V/3 1597
Hypoxoideae II 320; VII 163
Hyptis Jacq. VII 201
„ altissima St. Hil. V/4 2267
Hyssopus L. V/4 2357; VII 201
alopecuroides hort. V/4 2359
altissimus Mill. V/4 2359
angustifolius Bieb. V/4 2359
bracteatus Gmel. V/4 2273
cinerascens Jord. V/4 2359
Fischeri hort. V/4 2359
foeniculum Spr. V/4 2368
myrtifolius Desf. V/4 2359
ocymifolius Lam. V/4 2273
officinalis L. V/4 2357
Hyssopus Orientalis Adam V/4 2359
Hysteriales VII 141
Hystrix Moench VII 155

I.

Iberidella rotundifolia Hook. IV/1 132
Iberis L. IV/1 102; VII 177
acutiloba Bertol. IV/1 103
amara Gouan IV/1 109
amara L. IV/1 107
amara Scop. IV/1 105
angustifolia Roth IV/1 85
Arabica L. IV/1 111
arbuscula Spach IV/1 102
arvatica Jord. IV/1 108
Badensis L. IV/1 126
Boppardensis Jord. IV/1 105
campestris Wallr. IV/1 79
cepeaefolia Wulf. IV 1 133
ceratophylla Reut. IV/1 110
corymbosa Moench IV/1 106
crenata Lam. IV/1 110
cuneata Moench IV/1 102
decipiens Jord. IV/1 108
dentata Moench IV/1 102
divaricata Tausch IV/1 105
florida Salisb. IV/1 102
Gibraltarica L. IV/1 102
graminifolia Roth IV/1 91
hortensis Jord. IV/1 106
intermedia Guersent IV/1 105
Lagascana DC. IV/1 102
nudicaulis L. IV/1 72
odorata L. IV/1 103
panduriformis Gren. IV/1 110
pectinata Boiss. IV/1 103
petraea Wahlenb. IV/1 360
pinnata L. IV/1 109
Pruitii Tineo IV/1 102
pulchra Salisb. IV/1 106
rotundifolia L. IV/1 132
ruderalis Crtz. IV/1 83
ruficaulis Lej. IV/1 108
saxatilis L. IV/1 104
semperflorens L. IV/1 102
sempervirens L. IV/1 102
serrulata Vis. IV/1 102
spathulata Lag. IV/1 102
speciosa Salisb. IV/1 102
Tenoreana DC. IV/1 102
umbellata L. IV/1 106
„ Virginica Rchb. IV/1 85
Icacinaceae V/1 261; VII 187
Icica Aubl. VII 185
Idesia polycarpa Maxim. V/1 656
Ignatia amara L. V/3 1951
Ilex L. V/1 234; VII 186
affinis Gardn. V/1 235
amara (Vell.) Loes. V/1 235
Aquifolium L. V/1 236
Caroliniana (Lam.) Loes. V/1 235
Cassine Walt. V/1 235

Ilex crenata Thunb. V/1 236
decidua Walt. V/1 236
dipyrena Wall. V/1 236
dubia (Don) Britt. V/1 236
geniculata Maxim. V/1 236
glabra (L.) Gray V/1 236
Glazioviana Loes. V/1 235
integra Thunb. V/1 236
opaca Ait. V/1 236
Paraguariensis St. Hil. V/1 235, 245
pedunculosa Miq. V/1 236
Pernyi Franchet V/1 236
theezans Mart. V/1 235
verticillata (L.) Gray V/1 236
„ vomitoria Ait. V/1 235
Iliciaceae VII 186
Illecebrum L. III 428; VII 173
atrorubens Thuill. III 429
Lugdunense Vill. III 428
Paronychia Wulf. III 428
serpyllifolium Host III 428
„ verticillatum L. III 429
Illicium anisatum L. IV/1 14; VII 175 Fig. 1218 f, g
„ verum Hook. f. IV/1 14
Illipe König VII 197
butyracea Engl. V/3 1896
„ latifolia Engl. V/3 1896
Impatiens L. V/1 310; VII 187
Balsamina L. V/1 313
biflora Walt. V/1 314
biglandulosa Moon V/1 314
fulva Nutt. V/1 314
glandulifera Royle V/1 313
glanduligera Lindl. V/1 313
grandis Heyne V/1 314
Holstii Engl. et Warb. V/1 314
Hookeriana Arn. V/1 314
Insubrica Beauv. VII 187
latifolia hort. V/1 314
Marianae Rchb. V/1 313
Mathildae Chiovenda VII 187
Noli tangere L. V/1 314
Oliveri C. H. Wright V/1 314
parviflora DC. V/1 317
platyclada Lindl. V/1 314
pulcherrima Dalzell V/1 314
Roylei Walpers V/1 313
scabrida DC. V/1 314
Sultani Hook. f. V/1 314
„ tricorne Lindl. V/1 313
Imperata arundinacea Cyr. I 186; VII 155
Imperatoria L. V/2 1363, 1367; VII 195
Angelica Borkh. V/2 1333
angustifolia Bell. V/2 1399
latifolia Bell. V/2 1398
maior Lam. V/2 1397
montana DC. V/2 1336
nodiflora Lam. V/2 1299
Ostruthium L. V/2 1397
palustris Bess. V/2 1345
Imperatoria Seguieri Spr. V/2 1318
silvestris Lam. V/2 1333
triternata Viv. V/2 1399
„ verticillaris DC. V/2 1401
Impia Germanica Bluff et Fingerh. VI/1 451
Incarvillea Delavayi Franchet VI/1 176
„ Olgae Regel VI/1 176
Indigofera L. IV/3 1383
Anil L. IV/3 1384
argentea L. IV/3 1384
arrecta Hochst. IV/3 1384
decora Lindl. IV/3 1384
Delavayi Franchet IV/3 1384
Dosua Don IV/3 1384
Gerardiana Wall. IV/3 1384
macrostachya Bunge IV/3 1384
pendula Franchet IV/3 1384
tinctoria L. IV/3 1383
Inga Willd. IV/3 1123; VII 181
Inocarpus edulis Forst. IV/3 1497
Intybellia praemorsa Monn. IV/2 1157
Intybus praemorsus Fr. VI/2 1157
Inula L. VI/1 473; VII 211
Adriatica Borb. VI/1 486
angustifolia Wender. VI/1 483
-Bastarde VI/1 486
Britannica L. VI/1 483; VI/2 1366
Bubonium Jacq. VI/1 481
campestris Bess. VI/1 485
candida (L.) Cass. VI/1 474
Caucasica Pers. VI/1 492
cinerea Lam. VI/1 477
Conyza DC. VI/1 485
crithmoides L. VI/1 474
cylindrica With. VI/1 488
dysenterica L. VI/1 487
ensifolia L. VI/1 483
fasciculata Gilib. VI/1 478
Gelmii Murr VI/1 486
Germanica L. VI/1 477
Germanica Lam. VI/1 481
glabra Gilib. VI/1 479
graveolens (L.) Desf. VI/1 474; VII 210 Fig. 1261
Halleri Dick VI/1 477
Hausmanni Hut. VI/1 486
Helenium L. VI/1 475
hetrusca Moretti VI/1 479
hispida Schur VI/1 486
hirsuta Suffr. VI/1 482
hirta L. VI/1 482
hybrida Baumg. VI/1 486
intermixta J. Kern. VI/1 487
involucrata Kaleniczenko VI/1 482
lanuginosa Gilib. VI/1 485
linifolia Wender. VI/1 483
litoralis Borb. VI/1 486
macrophylla Bieb. VI/1 492
media Bieb. VI/1 486
Inula melanolepidea Kaleniczenko VI/1 482
micranthos Poir. VI/1 478
montana L. VI/1 474
montana Poll. VI/1 482
montana Vis. VI/1 485
Neilreichii Beck VI/1 486
Oculus Christi VI/1 485
Orientalis Frivaldsky VI/1 478
praealta Dumort. VI/1 478
prostrata Gilib. VI/1 488
Provincialis Gouan VI/2 764
Pseudo-Bubonium Schur VI/1 479
pseudogermanica Beck VI/1 486
Pulicaria L. VI/1 487
ramosissima Clairv. VI/1 477
rigida Döll VI/1 486
salicina L. VI/1 479
semiamplexicaulis Vis. VI/1 481
semiamplexicaulis Reut. VI/1 486
semicordata Borb. VI/1 486
sericea Kit. VI/1 485
serrata Gilib. VI/1 484
spiraeifolia L. VI/1 481
spuria Kern. VI/1 486
squarrosa Bernh. VI/1 485
squarrosa L. VI/1 481
stricta Tausch VI/1 486
suaveolens Jacq. VI/1 487
Transsilvanica Schur VI/1 486
uliginosa Bluff. et Fing. VI/1 488
Vaillantii (All.) Vill. VI/1 477
viscosa (L.) Ait. VI/1 474
Vrabelyiana Kern. VI/1 486
„ vulgaris Trevisan VI/1 485
Inuleae VI/1 400, 494; VII 209
Ipomoea aculeata O. Kuntze V/3 2076
aquatica Forsk. V/3 2077
Batatas Lam. V/3 2076
bonanox L. V/3 2076
chrysorrhiza (Soland.) V/3 2076
eriocarpa R. Br. V/3 2077
lobata (Cerv.) Thellung V/3 2076
Nil Roth V/3 2077
Orizabensis Ledanois V/3 2076
paniculata R. Br. V/3 2076
pes caprae Swartz V/3 2077
punctata Pers. V/3 2077
purpurea Lam. V/3 2077
Quamoclit L. V/3 2076
scabra Gmel. V/3 2077
sessiliflora Roth V/3 2077
triflora Velasco V/3 2076
„ triloba L. V/3 2077
Iresine Herbstii Hook. III 261
Iridaceae II 283; VII 163
Iridoideae VII 163
Iris L. II 283; VII 163

Iris angustifolia Gilib. II 296
aphylla L. II 288
arenaria Waldst. et Kit. II 287
Benacensis Kern. II 291
Bohemica Fiek II 289
Bohemica F. W. Schmidt II 288
Cengialti Ambrosi II 292
Clusiana Rchb. II 286
diantha K. Koch II 286
erratica Tod. II 287
Florentina L. II 284
Germanica L. II 291
glauca Salisb. II 292
graminea L. II 295
Hungarica Waldst. et Kit. II 289
longifolium Lam. et DC. II 293
lutescens Koch II 288
lutescens Lam. II 287
nudicaulis Lam. II 288
odoratissima Jacq. II 292
pallida auct. II 292
pallido-caerulea Pers. II 292
palustris Moench II 293
pratensis Lam. II 296
Pseudacorus L. II 292
pumila L. II 286
sambucina L. II 290
Sibirica L. II 296
spuria L. II 293
Susiana L. II 283
variegata L. II 289
violacea Savi II 291
virescens Delarb. II 288
vulgaris Pohl II 291
„ xiphium L. II 284
Irvingia Gabonensis Baill. V/1 80
„ Oliveri Pierre V/1 80
Isatis L. IV/1 192; VII 177
alpina Vill. IV/1 196
corymbosa Boiss. IV/1 193
glauca Gilib. IV/1 193
Lusitanica Desf. IV/1 193
„ tinctoria L. IV/1 193
Ischaleon Ehrh. V/3 1964
Ischnosiphon Körnicke II 321; VII 164
Ismelia versicolor Cass. VI/2 593
Isnardia palustris L. V/2 804
Isochilus R. Br. VII 165
Isoëtaceae I 40; VII 147
Isoëtales VII 147
Isoëtes L. I 50; VII 147
echinosporum Durieu I 50; VII 147
„ lacustre L. I 50; VII 147
Isolepis R. Br. II 44
acicularis Schlecht. II 41
fluitans R. Br. II 44
Holoschoenus Roem. et Schult. II 28
Micheliana Roem. et Schult. II 12
Isolepis setacea (L.) R. Br. II 44
„ supina R. Br. II 34
Isoloma (Benth.) Decne. VII 205
Isomeris graveolens Raf. IV/1 490
Isonandra Gutta Hook. V/3 1895
Isophyllum affine Schur V/2 1116
australe Fourr. V/2 1102
Baldense Hoffm. V/2 1128
falcatum Hoffm. V/2 1126
Gerardi Hoffm. V/2 1102
glaucum Fourr. V/2 1103
Jacquinianum Fourr. V/2 1102
iunceum Hoffm. V/2 1114
petraeum Hoffm. V/2 1121
segetum Presl V/2 1101
semicompositum Presl V/2 1103
„ tenuissimum Presl V/2 1119
Isopyrum L. III 476; VII 174
album Dulac III 476
aquilegioides L. III 476
thalictrifolium Gilib. III 476
„ thalictroides L. III 476
Isotoma Lindl. VII 209
senecioides DC. VI/1 392
Itea Virginica L. IV/2 566
Ittnera minor Gmel. I 146
Iva xanthiifolia Nutt. VI/1 533
Ixia maculata L. II 305; VII 164 Fig. 1197
„ patens Soland. II 305
Ixioideae VII 163
Ixiolaena leptolepis (DC.) Benth. VI/2 1366
Ixylirion Fisch. VII 162

J.

Jacaratia Hassleriana V/1 661
Jacea Scabiosa Lam. VI/2 974
„ plumosa Lam. VI/2 956
Jacobaea incana Gilib. VI/2 781
paludosa Gaertn., Meyer et Scherb. VI/2 753
„ vulgaris Gaertn. VI/2 773
Jacobinia Moric. VII 205
Pohliana (Nees) Lindau VI/1 178
Jacquinia aurantiaca Ait. V/3 1714
„ barbasco L. V/3 1714
Jalapaceae VII 172
Jambosa Caryophyllus (Spreng.) Niedenzu V/2 777
„ vulgaris DC. V/2 779
Jamesia Americana Torr. et Gray IV/2 566
Jankaea Heldreichii Boiss. VI/1 176
Jasione L. VI/1 390; VII 209
montana L. VI/1 391
„ perennis L. VI/1 390
Jasminioideae V/3 1906; VII 197
Jasminum L. V/3 1906; VII 197
Beesianum Forrest et Diels V/3 1908
fruticans L. V/3 1907; VII 198 Fig. 1239
Jasminum gardeniodorum Gilg V/3 1906
grandiflorum L. V/3 1906
heterophyllum Moench V/3 1907
humile hort. V/3 1907
nudiflorum Lindl. V/3 1907
odoratissimum L. V/3 1906
officinale L. V/3 1907
primulinum Hemsl. V/3 1907
Sambac (L.) Ait. V/3 1906
„ viminale Salisb. V/3 1907
Jatropha curcas L. V/1 120
„ Manihot L. V/1 119
Jatrorrhiza palmata (Lam.) Miers IV/1 15
Jeffersonia Barton VII 173
Jirasekia alpina Schmidt V/3 1871
„ tenella Rchb. V/3 1871
Joannesia princeps Velloz. VII 185
Jochroma tubulosum Benth. V/4 2554
Jondraba cichoriifolia Webb et Berth. IV/1 100
„ sulfurea Med. IV/1 101
Jonidium Vent. V/1 586
Jonopsidium acaule (Desf.) Rchb. IV/1 101
Jonorchis abortiva Beck II 382
Jonthlaspi clypeolatum St. Lag. IV/1 457
Jubaea spectabilis Humb., Bonpl. et Kth. II 130
Juglandaceae III 6; VII 167
Juglandales VII 167
Juglans L. III 7; VII 167
cinerea L. III 7
cordiformis Maxim. III 7
Mandschurica Maxim. III 7
nigra L. III 7
regia L. III 7; VII 36 Fig. 1061
rupestris Engelm. III 7
„ Sieboldiana Maxim. III 7
Julianiaceae VII 167
Julianiales VII 167
Juncaceae II 144; VII 158
Juncaginaceae I 146; VII 152
Juncella F. v. Muell. VII 158
Juncellus serotinus C. B. Clarke II 11
Juncinella pygmaea Fourr. II 167
Juncoides Adans. VII 158
Juncus L. II 145; VII 158 und Fig. 1169 u. 1185
acutiflorus Ehrh. II 169
acutiflorus Griseb. II 170
affinis Gaud. II 171
ambiguus Guss. II 157
anceps Laharpe II 172
aquaticus All. II 171
aquaticus Brot. II 169
Arcticus Willd. II 154
articulatus L. II 167, 171
atratus Fries II 172
atratus Krock. II 170
atratus Lam. nec Krock. II 152

Juncus atricapillus Drejer II 172
aureus Pourr. II 177
Balticus Willd. II 153
bicephalus Viv. II 167
biglumis L. VII 158 Fig. 1185
bufonius L. II 155
Bogotensis Humb., Bonpl. et Kth. II 151
Bottnicus Wahlenb. II 159
Broteri Steud. II 165
Buchenaui Dörfl. II 173
bulbosus L. II 158, 167
campestris L. II 183
capitatus Weig. II 162
castaneus Sm. II 164; VII 159
compressus Jacq. II 158
conglomeratus L. II 150
Czetzii Schur II 164
diffusus Hoppe II 173
divaricatus Gilib. II 155
divergens Koch II 166
Dudleyi Wiegand II 160, 173
effusus L. I/CXV Fig. 196; II 151
filiformis L. II 154
foliosus Hoppe II 171
Forsteri Sm. II 175
Gerardi Loisel. II 159
glaucus Ehrh. II 149
gracilis Lej. II 157
gracilis Sm. II 159
gramineus Dum. II 167
Hancockii Hance II 163
Haussknechtii Ruhmer II 173
helodes Lk. II 153
Hostii Tausch II 161
hybridus Brot. II 167
Jacquini L. II 152
Jacquini Sm. II 154
Jacquini Symons II 164
inflexus L. II 149
inflexus Retz. II 153
intermedius Meigen II 150
inundatus Drejer II 173
Kochii Fr. W. Schultz II 168
lampocarpus Ehrh. II 171
Langii E. Erdner II 173
Leersii Marsson II 150
luteolus Chaix II 177
luteus All. II 177
nanus Dubois II 167
maritimus Lam. II 165
maximus Rchb. II 177
melananthos Rchb. II 170
micranthus Desv. II 169
monanthus Jacq. II 161
multiflorus Ehrh. II 183
mutabilis Cav. II 162
nemorosus Lam. II 176
nemorosus Poll. II 178
nigricans Wolff II 169
niveus L. II 179
niveus Leers II 178
Juncus obtusiflorus Ehrh. II 166; VI 129 Fig. 1169
pallidus Willd. II 159
parviflorus Kit. II 158
pygmaeus Rich. II 167
ranarius Song. et Perr. II 156
retroflexus Rafin. II 166
rigidus Desf. II 165
Ruhmeri Aschers. et Graebn. II 173
Scalovicus Aschers. et Graebn. II 173
serotinus Schur II 170
setifolius Ehrh. II 167
silvaticus auct. II 169
silvaticus Huds. II 177
Sorrentinii Parl. II 167
spadiceus All. II 181
sphaerocarpus Nees II 157
spicatus L. II 182
spinosus Forsk. II 165
Sprengelii Willd. II 161
squarrosus L. II 161; VII 159
stygius L. II 163; VII 158
subnodulosus Schrank II 166
supinus Moench II 167
tenagea Ehrh. II 157
Tenagea Host II 157
tenax Soland. II 149
tenuis auct. amer. II 173
tenuis Willd. II 159
trichodes Steud. II 154
trifidus L. II 160
triglumis L. II 163
uliginosus Roth II 167
Vaillantii Thuill. II 157
„ vernalis Brotero II 175
Jungermanniaceae VII 144
Jungermanniales VII 144
Juniperoideae VII 151
Juniperus L. I 89; VII 151
communis L. I 89
drupacea Lab. I 89; VII 151
excelsa Bieb. I 89
foetidissima Willd. I 89
nana Willd. I 91; VII 151 u. 152 Fig. 1180
oxycedrus L. I 89
Phoenicea L. I 89
„ Sabina L. I 92; VII 151
Jurinea Cass. VI/2 841; VII 212
cyanoides (L.) Rchb. VI/2 841
mollis (L.) Rchb. VI/2 843
„ monoclona Aschers. VI/2 841
Jussieua repens L. V/2 799; VII 192
Justicia L. VI/1 178; VII 205

K.

Kadsura Juss. VII 175
Kablikia minima Opiz V/3 1782
Kaempferia L. II 321; VII 163
Kageneckia Ruiz et Pav. IV/2 663; VII 180
Kakile Desf. IV/1 182
„ maritima Desf. IV/1 183
Kali Soda Moench III 258
Kalmia angustifolia L. V/3 1620; VII 195
latifolia L. V/3 1620
„ polifolia Wangenh. V/3 1621
Kalmiella hirsuta (Walt.) Small V/3 1610
Kandelia Wight et Arn. V/2 769
Karwinskia Humboldtiana (H. B. et Kth.) Zucc. V/1 320
Kedrostis Medic. VI/1 316; VII 208
Kennedya Vent. IV/3 1626; VII 183
Kenolophium Herm. V/2 1326
Kentranthus DC. VI/1 277; VII 208
angustifolius (Cav.) DC. VI/1 278
Calcitrapa DC. VI/1 262, 277
macrosiphon Boiss. VI/1 262
„ ruber (L.) DC. VI/1 278
Kentrophyllum lanatum Duby VI/2 989
„ luteum Cass. VI/2 989
Keramocarpus Fenzl V/2 1071
Keraskomion Rafin. V/2 1163
Kernera Med. IV/1 142; VII 177
alpina (Tausch) Prantl IV/1 146
auriculata DC. IV/1 144
glastifolia Rchb. IV/1 135
polysperma Willk. et Costa IV/1 145
„ saxatilis (L.) Rchb. IV/1 143
Kerria DC. VII 181
„ Japonica DC. IV/2 665
Kerstingiella geocarpa Harms IV/3 1625
Keteleeria Carr. VII 150
Kibera officinalis Calestani IV/1 164
Kickxia Dum. VI/1 28; VII 204
Africana Benth. V/3 2049
elastica Preuss V/3 2049
Elatine (L.) Dum. VI/1 28
spuria (L.) Dum. VI/1 28; VI/2 1360
Kielmeyera Mart. V/1 499; VII 189
Kielmeyeroideae V/1 499; VII 189
Kigelia Africana (Lam.) Benth. et Hook. VI/1 176
Killinga Adanson V/2 1276
Kingia R. Br. VII 159
Kitaibelia vitifolia Willd. V/1 455; VII 188
Klasea heterophylla Cass. VI/2 929
Kleinia DC. VI/2 727; VII 212
Klonion Rafin. V/2 974
Klugia Schlecht. VI/1 177; VII 205
Klukia officinalis Andrz. IV/1 164
polycerata Andrz. IV/1 154
„ supina Andrz. IV/1 163
Knappia agrostidea Sm. I 220
Knautia L. VI/1 290; VII 208
Albanica Briquet var. velutina Szabó VI/1 296

Knautia alpestris Brügg. VI/1 293
ambigua (Friv.) Boiss. et Orph. VI/1 291
arvensis Coult. silvatica Neilr. VI/1 300
arvensis L. VI/1 292
asterocephala Georges VI/1 294
Badensis Szabó VI/1 303
Baldensis A. Kern. VI/1 294
brachytricha Briq. VI/1 294
collina Briq. VI/1 296
collina Wettst. VI/1 297
Danubialis Gandoger VI/1 294
decalvata Borb. VI/1 303
diversifolia DC. VI/1 293
drymeia Heuff. VI/1 301
Godeti Legrand VI/1 301
Godeti Reut. VI/1 299
gracilis Szabó VI/1 299
Illyrica Beck VI/1 297
integrifolia (L.) Bert. VI/1 291
intermedia Pernh. et Wettst. VI/1 301
Kohleri Briq. VI/1 303
lancifolia Beck VI/1 303
longifolia Gren. et Godr. VI/1 301
longifolia Kirschleger VI/1 301
longifolia (Waldst. et Kit.) Koch VI/1 298
magnifica A. Kern. VI/1 294
magnifica Kern. var. persicina Szabó VI/1 295
Pannonica Wettst. VI/1 301
persicina A. Kern. VI/1 295
Proteus Heuff. VI/1 294
purpurea (Vill.) Borb. VI/1 296
ramosissima Szabó VI/1 303
Ressmanni (Pach. et Jab.) Briq. VI/1 297
rigidiuscula (Hladn.) Borb. VI/1 297
rigidiuscula Kern. VI/1 297
rimosa Borb. VI/1 295
sambucifolia Briq. VI/1 303
silvatica (L.) Duby VI/1 300
silvatica (L.) Duby var. longifolia Gaud. VI/1 299
silvatica (L.) Duby var. perneglecta Beck VI/1 303
silvatica (L.) Duby var. Ressmanni Pach. et Jab. VI/1 297
silvatica (L.) Duby var. Sixtina Briq. VI/1 299
Sixtina Briq. VI/1 299
Transalpina (Christ) Briq. VI/1 295
velutina Briq. VI/1 296
„ virgata Jordan VI/1 293
Kniphofia aloides Moench II 277
„ uvaria Hook. II 277
Kochia Roth III 248; VII 171
arenaria Roth III 250; VII 171 Fig. 1212
Kochia dasyantha C. A. Mey. III 250
hirsuta Nolte III 248
prostrata (L.) Schrad. III 249
sanguinea Willk. III 250
scoparia (L.) Schrad. III 251
„ trichophylla Schmeiss. III 251
Koeberlinia Zucc. VII 176
Koeleria Pers. I 281; VII 155
ambigua Schur I 286
aurata Bub. I 283
Cimbrica Aschers. et Graebn. I 282
cristata auct. I 284, 286
dactyloides Spr. I 287
eriostachya Panč. I 286
Genevensis Domin I 285
glauca (Schkuhr) DC. I 282
gracilis Pers. I 286
hiemalis Biria III 472
hirsuta Gaud. I 282
intermedia Ahlq. I 282
intricata Genty I 283
mollis Mann I 284
pallida Wallr. I 286
phleoides (Vill.) Pers. I 287
puberula Opiz I 286
pyramidata (Lam.) Domin I 284
setacea DC. I 283
splendens Druce I 283
tuberosa Pers. I 283
Vallesiaca Gaud. I 283
„ Vallesiana (All.) Bert. I 283
Koelreuteria paniculata Laxm. V/1 307, 308; VII 187
Koenigia Islandica L. III 165; VII 171
Kohleria Regel VII 205
Kohlrauschia prolifera Kth. III 315
Kongia maritima R. Br. IV/1 447
Kopsia ramosa Dum. VI/1 136
Kosaria Forsk. VII 168
Kosteletzkya Presl V/1 455
Krameria triandra Ruiz et Pav. IV/3 1135
Kraunhia floribunda Taub. IV/3 1386
Krockeria oligocerata Moench IV/3 1365
Krubera leptophylla Hoffm. V/2 1354
„ peregrina Hoffm. V/2 1354
Krynitzkia barbigera Fisch. et Meyer V/3 2134
Kuhnistera Lam. VII 182
Kunzea Rchb. V/2 788

L.

Labiatae V/4 2255; VII 201
Lablab vulgaris Savi IV/3 1624
Labrea crassifolia Rchb. III 359
„ palustris Fuss III 358
Laboulbeniales VII 141
Laburnocytisus Adami auct. IV/3 1166
Laburnum Med. IV/3 1161; VII 182
alpinum (Mill.) Presl IV/3 1165
Laburnum anagyroides Med. IV/3 1162
Caramanicum Benth. et Hook. IV/3 1161
glabrescens Tanfani IV/3 1171
Laburnum Voss IV/3 1162
nigricans Presl IV/3 1169
praecox Fuss IV/3 1164
ramentaceum Griseb. IV/3 1148
serotinum hort. IV/3 1166
sordidum C. Koch IV/3 1166
vulgare Griseb. IV/3 1162
Watereri (Kirchner) Dippel IV/3 1166
Lachenalia aloides hort. II 279
„ tricolor Thunb. II 279
Lachnaea L. V/2 702
Laciniaria Hill VII 209
Lacis Dulac V/2 1131
„ vulgaris Dulac V/2 1132
Lacistemaceae III 209; VII 189
Lacistemineae VII 189
Lacmellia edulis Karst. V/3 2051
Lactaceae VII 142
Lactoridaceae IV/1 16; VII 175
Lactuca L. VI/2 1113; VII 212
alpina Benth. et Hook. VI/2 1099
altissima Bieb. VI/2 1128
Canadensis L. VI/2 1125
Chaixii Vill. VI/2 1128
Fischeriana DC. VI/2 1113
muralis Fresenius VI/2 1111
perennis L. VI/2 1114
prenanthoides Scop. VI/2 1075
quercina L. VI/2 1127
sagittata Waldst. et Kit. VI/2 1128
saligna L. VI/2 1125
sativa L. VI/2 1118; VII 74 Fig. 1109
Scariola L. VI/2 1116
Serriola L. VI/2 1116
silvestris Lam. VI/2 1122
silvestris Lam. subsp. stricta (Waldst. et Kit.) Hayek VI/2 1128
silvestris Lam. var. silvestris Bisch. VI/2 1116
Tatarica (L.) C. A. Mey. VI/2 1130
versicolor Schultz-Bip. VI/2 1113
viminea (L.) Presl VI/2 1129
„ virosa L. VI/2 1122
Lactucopsis Plumieri Schultz-Bip. VI/2 1098
Ladanum dubium O. Kuntze V/4 2462
luteum Gilib. V/4 2462
purpureum Gilib. V/4 2460
„ Tetrahit O. Kuntze V/4 2465
Ladenbergia Klotzsch VII 207

Laelia cochlearioides Pers. IV/1 190
Corvini Sampaio IV/1 189
iberioides Pers. IV/1 189
„ Orientalis Desv. IV/1 474
Lafoënsia Vand. V/2 746
Lagarosiphon Harv. I 159
Lagenaria Lagenaria Voss VI/1 314
„ vulgaris Ser. VI/1 314, 316
Lagerstroemia Indica L. V/2 746
„ speciosa (L.) Pers. V/2 746
Lagetta Juss. V/2 701; VII 191
Lagochilus inebrians Bungen V/4 2390
Lagoecia cuminoides L. V/2 992
Lagopus flexuosus Bernh. IV/3 1342
glaber Bernh. IV/3 1346
„ montanus Bernh. IV/3 1344
Lagoseris sancta (L.) K. Maly VI/2 1134
Laguncularia Gaertn. V/2 773
Lagurostemon pygmaeus Cass. VI/2 836
Lagurus L. VII 154
„ ovatus L. I 237
Lallemantia Fisch. et Mey. V/4 2362; VII 201
canescens (L.) Fisch. et Mey. V/4 2362
Iberica (Bieb.) Fisch. et Mey. V/4 2362
peltata (L.) Fisch. et Mey. V/4 2362
„ sulphurea C. Koch V/4 2362
Lamarckia aurea Moench I 173, 372; VII 155
Laminariaceae VII 138
Laminariales VII 138
Lamium L. V/4 2438; VII 203
affine Ten. V/4 2449
album L. V/4 2445
amplexicaule L. V/4 2452
capitatum Sm. V/4 2445
Coesfeldiae Weihe V/4 2455
Columnae Ten. V/4 2449
dissectum With. V/4 2455
erythrotrichum Boiss. V/4 2440
foliosum Crtz. V/4 2447
Galeobdolon (L.) Crtz. V/4 2441
Garganicum L. V/4 2440
grandiflorum Pourr. V/4 2447
Holsaticum E. H. L. Krause V/4 2457
hybridum Vill. V/4 2455
hybridum Vill. subsp. dissectum Gams V/4 2455
hybridum Vill. subsp. intermedium Gams V/4 2455
Ladanum Crtz. V/4 2460
laevigatum DC. V/4 2440
levigatum All. V/4 2447
longiflorum Ten. V/4 2440
luteum Krock. V/4 2441
maculatum L. V/4 2447
Lamium melissaefolium Mill. V/4 2447
mutabile Dumort. V/4 2448
nudum Crtz. V/4 2450
ocymifolium Sims V/4 2450
Orvala All. V/4 2440
Orvala L. V/4 2444
Pannonicum Scop. V/4 2444
Pedemontanum Rchb. V/4 2440
purpureum L. V/4 2450
rubrum Wallr. V/4 2447
Schroeteri Gams V/4 2457
Tetrahit Crtz. V/4 2465
vulgare Fritsch V/4 2442
vulgatum var. album Benth. V/5 2445
vulgatum rubrum Benth. V/4 2447
Lamourouxia H. B. et Kth. VII 204
Lampsana Juss. VI/2 1000; VII 212
capillaris L. VI/2 1168
foetida Scop. VI/2 1002
gracilis Lam. VI/2 1004
minima Lam. VI/2 1004
„ pulchra Vis. VI/2 1178
Landolphia L. V/3 2049
Lankesteria Lindl. VII 205
Lannea Rich. V/1 217; VII 186
Lantana L. VII 201
aculeata L. V/3 2235
Camara L. V/3 2235
involucrata L. V/3 2235
„ nivea Vent. V/3 2235
Lapageria rosea Ruiz et Pav. II 280
Lapathum Acetosa Scop. III 180
alpestre Scop. III 183
alpinum Lam III 171
aquaticum L. III 171
crispum Moench III 176
digynum Lam. III 188
giganteum Opiz III 178
hortense Moench III 177
maritimum Moench III 168
minus Lam. III 168
obtusifolium Moench III 171
pratense Lam. III 180
pulchrum Moench III 170
scutatum Lam. III 183
„ sinuatum Lam. III 170
Laportea Canadensis Gaudich. III 137
Lappa Adans. VI/2 825; VII 212
ambigua Čelak. VI/2 834
communis Coss. et Germ. var. tomentosa Neilr. VI/2 832
glabra Lam. VI/2 831, 834
intermedia Rchb. VI/2 829
macrosperma Wallr. VI/2 829
maior Gaertn. VI/2 827
mixta Simk. VI/2 834
minor Hill VI/2 831
nemorosa Koernicke VI/2 829
notha Rhumer VI/2 834
officinalis All. VI/2 827
Lappa Ritschliana Aschers. VI/2 834
tomentosa Lam. VI/2 832
vulgaris Hill var. major Neilr. VI/2 827
vulgaris Hill var. minor Neilr. VI/2 831
Lappago racemosa Schreb. I 186
Lappula Moench V/3 2138; VII 200
deflexa (Wahlenb.) Garcke V/3 2140
echinata Gilib. V/3 2139
Lappula Karst. V/3 2139
Myosotis Moench V/3 2139
patula (Lehm.) Aschers. V/3 2138
„ Szovitsiana Thellung V/3 2138
Lappularia Pomel V/2 1048
infesta Pomel V/2 1056
neglecta Pomel V/2 1055
„ nodosa Pomel V/2 1057
Lapsana L. VI/2 1000; VII 212
cancellata Borb. VI/2 1000
communis L. VI/2 1000
grandiflora Boiss. VI/2 1000
intermedia Bieb. VI/2 1000
peduncularis Boiss. VI/2 1000
Pisidica Boiss. VI/2 1000
pusille Willd. VI/2 1004
„ stellata L. VI/2 1008
Larbrea aquatica Ser. III 348
„ uliginosa Rchb. III 357
Lardizabalaceae IV/1 16
Larix Mill. I 95; VII 151
decidua Mill. I 95; VII 131 Fig. 1171
Europaea Lam. et DC. I 95
Larix Karst. I 95
„ Sibirica Ledeb. I 95
Laser Baumg. V/2 1472
Borkh. V/2 1464; VII 195
aquilegifolium Roehling V/2 1465
trilobum Baumg. V/2 1484
„ trilobum (L.) Borkh. V/2 1464
Laserpitieae V/2 951; VII 195
Laserpitium L. V/2 1467, 1472; VII 195
alpinum Gaud. V/2 1486
angustifolium L. V/2 1474
angustifolium Scop. V/2 1486
angustissimum Schlosser et Vukot. V/2 1470
aquilegiaefolium Jacq. V/2 1464
aquilegifolium DC. V/2 1468
aquilegiifolium DC. V/2 1484
aquilegiifolium Ten. V/2 1081, 1299
Archangelica Geners. V/2 1090
Archangelica Wulf. V/2 1489
Aruncus Fritsch V/2 1485
asperum Crtz. V/2 1480
Besseanum A. Schmidely V/2 1499

Laserpitium Chironium L. V/2 1360
Chironium Scop. V/2 1479
crispum Turra V/2 1481
cynapiifolium (Viv.) Salisb. V/2 1495
Dauricum Pollini V/2 1315
ferulaceum L. V/2 1093
Gallicum Jacq. V/2 1495
Gallicum L. V/2 1474
Garganicum Bertol. V/2 1471
Gaudini Moretti V/2 1485
Gaveanum Beauverd V/2 1499
glabrum Crtz. V/2 1480
Halleri Crtz. V/2 1492
hirsutum Gilib. V/2 1495
hirsutum Lam. V/2 1492
hirtellum Gaud. V/2 1491
hispidum Bieb. V/2 1475
Krapfii Crtz. V/2 1481
latifolium L. V/2 1477
lineatum Tausch V/2 1475
lucidum Ait. V/2 1323
luteolum Gaud. V/2 1485
marginatum Rchb. V/2 1481
marginatum Waldst. et Kit. V/2 1484
micranthum Gandoger V/2 1498
montanum Lam. V/2 1468
Mutellinoides Crtz. V/2 1323
Nebrodense Jan V/2 1471
Nestleri Soy.-Will. V/2 1468
nitidum Zantedeschi V/2 1491
Panax Gouan V/2 1492
Panax K. Wein V/2 1244
peucedanoides L. V/2 1486
pilosum Moretti V/2 1491
pilosum Willd. V/2 1475
Prutenicum Lapeyr. V/2 1499
Prutenicum L. V/2 1495
Pruthenicum Spr. V/2 1495
Pseudo-Siler Schur V/2 1479
pubescens Lag. V/2 1480
selinoides Crtz. V/2 1495
selinoides Mill. V/2 1474
Siculum Spr. V/2 1471
silaifolium Jacq. V/2 1307
Siler L. V/2 1468
trifurcatum Lam. V/2 1474
trilobum Murith V/2 1477
trilobum Sut. V/2 1485
ulopterum Trev. V/2 1474
verticillatum Waldst. et Kit. V/2 1081
„ Zernyi v. Hay. V/2 1471
Lasia Lour. VII 157
Lasiandra Fontainesiana DC. V/2 795
Lasioideae VII 157
Lasiogrostis Link VII 154
„ calamagrostis Lk. I 206
Lasiospermum bipinnatum (Thunb.) Druce VI/2 1366
Lastila hirsuta Alef. IV/3 1602
Lathraea L. VI/1 128; VII 204
clandestina L. VI/1 128
Rhodopea Dingler VI/1 128
„ Squamaria L. VI/1 128
Lathyrus L. IV/3 1562; VII 183
alatus Sibth. IV/3 1565
albus Kittel IV/3 1579
angulatus All. IV/3 1604, 1606
annuus L. IV/3 1567
Aphaca L. IV/3 1590
asphodeloides Gouan IV/3 1579
auriculatus Bertol. IV/3 1565
Bauhini Genty IV/3 1578
Bithynicus L. IV/3 1509
canescens Gren. et Godr. IV/3 1577
Cicer Gaud. IV/3 1603
Cicera L. IV/3 1603
cirrhosus Ser. IV/3 1595
Clymenum L. IV/3 1565
coccineus All. IV/3 1606
Davidii Hance IV/3 1570
denudatus Gilib. IV/3 1587
dubius Ten. IV/3 1603
ensifolius (Lap.) J. Gay IV/3 1558, 1577
esculentus Grab. IV/3 1502
Ewaldi Meinsh. IV/3 1571
filiformis (Lam.) Gay IV/3 1577; VII 184 Fig. 1228
gracilis Ducommun IV/3 1575
grandiflorus Láng IV/3 1597, 1598
grandiflorus Sibth. et Sm. IV/3 1565
heterophyllus L. IV/3 1599
Hierosolymitanus Boiss. IV/3 1567
hirsutus L. IV/3 1602
hirtus Ten. IV/3 1602
inconspicuus L. IV/3 1566
incurvus Rchb. IV/3 1582
latifolius L. 1597
Lens Bernh. IV/3 1502
Lenticula Peterm. IV/3 1502
Linnaei Rouy IV/3 1569
longifolius Ten. IV/3 1599
Lusseri Heer IV/3 1589
luteus (L.) Peterm. IV/3 1569
luteus Moench IV/3 1567
macranthus Voss IV/3 1570
macrorrhizus Wimm. IV/3 1580
maritimus (L.) Bigelow IV/3 1585; VII 183
megalanthus Steud. IV/3 1597, 1598
membranaceus Presl IV/3 1599
miniatus Bieb. IV/3 1594
monanthus Willd. IV/3 1514
montanus (L.) Bernh. IV/3 1580
Lathyrus montanus Scop. IV/3 1569
multiflorus Peterm. IV/3 1576
mutabilis Klinggr. IV/3 1585
niger (L.) Bernh. IV/3 1572
nigricans Lamotte IV/3 1503
Nissolia L. IV/3 1608
Noëanus Alef. IV/3 1595
ochraceus Kittel IV/3 1570
Ochrus (L.) DC. IV/3 1565
odoratus L. IV/3 1564
paluster L. IV/3 1582
Pannonicus (Kramer) Garcke IV/3 1579; VII 184 Fig. 1228
parviflorus Roth IV/3 1566
peduncularis Poiret IV/3 1594
phylloideus St. Lager IV/3 1668
pilosus Steud. et Hochst. IV/3 1603
pisiformis L. IV/3 1585
platyphyllos Retz. IV/3 1596
pratensis L. IV/3 1587
purpureus Desf. IV/3 1565
purpureus Presl IV/3 1603
roseus Stev. IV/3 1565
rotundifolius Willd. IV/3 1594
sativus L. IV/3 1604
Scopolii Fritsch IV/3 1571
segetum Lam. IV/3 1590
sepium Scop. IV/3 1589
setifolius L. IV/3 1607
silvester L. IV/3 1593, 1595
sphaericus Retz. IV/3 1606
stans Vis. IV/3 1567
Tingitanus L. IV/3 1565
tuberosus L. IV/3 1591
tumidus Willd. IV/3 1509
turgidus L. IV/3 1509
variegatus Gilib. IV/3 1595
variegatus Gren. et Godr. IV/3 1576
variegatus Host IV/3 1602
varius C. Koch IV/3 1580
Venetus (Mill.) Wohlfarth IV/3 1576
vernus (L.) Bernh. IV/3 1574
versicolor Beck IV/3 1580
„ vicioides DC. IV/3 1540
Lauraceae IV/1 10; VII 176
Laurembergia tetrandra Kanitz V/2 895
Laurentia Necker VII 209
Michelii DC. VI/1 392
„ tenella DC. VI/1 392
Laurocerasus Lusitanica Roem. IV/2 1063
„ officinalis Roem. IV/2 1061
Laurus L. IV/1 11; VII 176
Camphora L. IV/1 11
„ nobilis L. IV/1 11
Lavandula L. V/4 2274; VII 201
angustifolia Ehrh. V/4 2277
argentina E. H. L. Krause V/4 2276, 2279

Lavandula Burnati Briq. V/4 2279
dentata L. V/4 2275
latifolia (L.) Vill. V/4 2276
officinalis Chaix V/4 2277
Spica All. V/4 2276
stoechas L. V/4 2275
„ vera DC. V/4 2277
Lavatera L. V/1 471; VII 189
arborea L. V/1 472
Olbia L. V/1 472
Thuringiaca L. V/1 472
„ vitifolia Tausch V/1 472
Lavauxia triloba (Nutt.) Raim. V/2 865
Lawsonia L. V/2 747
alba V/2 747
inermis L. V/2 747
„ spinosa L. V/2 747
Layia (nicht Laya) calliglossa A. Gray VI/1 532
glandulosa Hook. et Arnold VI/1 532
„ platyglossa Gray VI/1 532
Lebretonia coccinea Schrank V/1 457
Lecanora desertorum Krempelh. V/1 547
„ esculenta Eversm. V/1 547
Lecanoraceae VII 144
Lecidiaceae VII 144
Lecythidaceae V/2 766; VII 191
Lecythis Pisonis Camb. V/2 767
„ Zabucajo Aubl. V/2 768
Ledeburia Lk. V/2 1196
„ pimpinelloides Lk. V/2 1197
Ledum L. V/3 1623; VII 195
columbianum Piper V/3 1623
glandulosum Nutt. V/3 1623
Groenlandicum Oeder V/3 1623
latifolium Ait. V/3 1623
„ palustre L. V/3 1623; VII 195
Leea L. V/1 351
Leersia oryzoides Swartz I 194
Legousia Durande VI/1 366; VII 208
Legouzia Delarbre VI/1 366; VII 208
arvensis Durande VI/1 366
Pentagonia L. VI/1 366
Speculum Veneris (L.) Fisch. VI/1 366
Legumen orotuberosum Krause IV/3 1580
„ rubriflorum Krause IV/3 1603
Leguminosae IV/3 1113; VII 181
Leiophyllum buxifolium Ell. V/3 1610, 1622
Leitneriaceae VII 167
Leitneriales VII 167
Lemaireocereus V/2 692
Lemaneaceae VII 139
Lembotropis nigricans Griseb. IV/3 1169
Lemma L. II 140; VII 158
arrhiza L. II 142
cruciata Roxb. II 140
gibba L. II 141
globosa Roxb. II 142
maior C. A. Mey. II 141
minor L. II 140
minuta Humb., Bonpl. et Kth. II 140
orbicularis Kit. II 141
orbiculata Roxb. II 141
polyrrhiza L. II 141
thermalis P. B. II 141
trichorrhiza Thuill. II 141
„ trisulca L. II 140
Lemnaceae II 137; VII 158
Lennoaceae V/3 1568, 1611; VII 200
Lens Mill. IV/3 1501; VII 183
Biebersteinii Lamotte IV/3 1503
culinaris Med. IV/3 1502
esculenta Moench IV/3 1502, 1504
Lens Huth IV/3 1502
Lenticula (Schreb.) Alef. IV/3 1502
monantha Moench IV/3 1514
nigricans Godr. IV/3 1503
sativa Hell. IV/3 1502
„ vulgaris Delarbre IV/3 1502
Lentibulariaceae VI/1 155; VII 205
Lenticula gibba Moench II 141
palustris Indica Pluk. IV/2 506
trisulca Scop. II 140
„ vulgaris Scop. II 140
Leontice L. VII 175
Leontodon L. VI/2 1017; VII 212
alpinus Hoppe VI/2 1091
ambiguus Fleischer VI/2 1034
Apenninus Ten. VI/2 1091
aureum L. VI/2 1147
autumnalis L. VI/2 1018
autumnalis (L.) Banks subsp. taraxacoides (Vill.) Schinz et Thellung VI/2 1033
Berinii (Bartl.) Roth VI/2 1024
Bessarabicus Hornem. VI/2 1081
corniculatus Kit. VI/2 1095
crispus Vill. VI/2 1025
croceus Haenke VI/2 1023
croceus Hegetschw. VI/2 1021
croceus Hegetschw. subsp. croceus Nym. VI/2 1023
Danubialis Jacq. VI/2 1028
dentatum L. VI/2 1146
dentatus Tausch VI/2 1081
dentatus L. var. glabratus Koch VI/2 1028
glaucescens Bieb. VI/2 1095
hastilis L. VI/2 1028
hastilis L. var. vulgaris Koch VI/2 1028
Leontodon hirtus auct. VI/2 1032
hispidaster Beauv. VI/2 1034
hispidus Beck VI/2 1028
hispidus L. VI/2 1026
hispidus L. var. hispidus Neilr. VI/2 1028
Huguenini Brügg. VI/2 1035
incanus (L.) Schrank VI/2 1030
Jouffroyi Rouy VI/2 1035
Kaiseri Murr VI/2 1035
Kerneri Murr VI/2 1035
leptocephalus Schloss. VI/2 1082
levigatus Willd. VI/2 1095
lividus Waldst. et Kit. VI/2 1092
montanus Lam. VI/2 1020
nigricans Kit. VI/2 1093
nudicaulis (L.) Banks VI/2 1032
nudicaulis (L.) Banks subsp. Rothii (Ball.) Schinz et Thellung VI/2 1033
paludosus Lightf. VI/2 1092
paluster Sm. VI/2 1092
pinnatifidus Opiz VI/2 1019
protëiformis Vill. VI/2 1026
Pyrenaicus Gouan VI/2 1021
Pyrenaicus Gouan var. aurantiacus Koch VI/2 1023
Raji Gouan VI/2 1092
Richenii Murr VI/2 1035
Rothii Ball. VI/2 1033
saxatilis Lam. VI/2 1033
saxatilis Rchb. VI/2 1025
saxatilis (L.) Schrank subsp. tenuiflorus (Gaud.) VI/2 1031
serotinus Waldst. et Kit. VI/2 1081
squamosus Lam. VI/2 1021
Taraxaci Loisel. VI/2 1020
taraxacoides Hoppe VI/2 1095
taraxacoides (Vill.) Mérat VI/2 1032
Taraxacum L. VI/2 1088
tenuiflorus Rchb. VI/2 1031
Terglouensis Hacq. VI/2 1142
„ tuberosus L. VI/2 1017
Leontopodium Cass. VI/1 457, 458; VI/2 1365; VII 209
alpinum Cass. VI/1 458
Himalayanum DC. VI/1 458
Japonicum Miquel VI/1 458
intermedium Sünderm. VI/1 458
leontopodioides (Willd.) Beauv. VI/1 458
Leontopodium Reiser VI/1 458
Lindavicum Sünderm. VI/1 458
macranthum Sünderm. VI/1 458
Sibiricum Cass. VI/1 458
umbellatum Bluff et Fingerh. VI/1 458
Leonurus L. V/4 2389; VII 2389
campestris Andrz. V/4 2392
canescens Dum. V/4 2393

Leonurus Cardiaca L. V/4 2392
condensatus Hornem. V/4 2393
Galeobdolon Scop. V/4 2441
lanatus (L.) Spr. V/4 2390
Marrubiastrum L. V/4 2390
u. 2549 Fig. 3380 B
neglectus Schrank V/4 2393
Sibiricus L. V/4 2389
„ villosus Desf. V/4 2393
Leopoldia comosa Parl. II 259
graminifolia Heldr.. et Holzm. II 259
„ tenuiflora Heldr. II 259
Lepachis columnaris Torr. et Gray VI/1 504
pinnata Torr. et Gray VI/1 505
„ pinnatifida Rafin. VI/1 505
Lepargyrea Canadensis Greene V/2 730
Lepia campestris Desv. IV/1 79
Lepicaune intybacea Lapeyr. VI/2 1149
„ turbinata Lapeyr. VI/2 1141
Lepidium L. IV/1 74; VII 177
alpinum L. IV/1 358
Anglicum Huds. IV/1 95
bonariense Mill. IV/1 95
campestre (L.) R. Br. IV/1 79
Candollei Desv. IV/1 89
cartilagineum (J. Mayer) Thellung IV/1 88
Chalepense (L.) Thellung IV/1 79
crassifolium Waldst. et Kit. IV/1 89
densiflorum Schrad. IV/1 84
didymum L. IV/1 95
Draba L. IV/1 78
fragrans Willd. IV/1 448
glaucescens Dum. IV/1 83
gramineum Lam. IV/1 91
graminifolium L. IV/1 91
heterophyllum (DC.) Benth. IV/1 80
hortense Forsk. IV/1 81
incisum O. Kuntze IV/1 84
intermixtum Ten. IV/1 91
latifolium L. IV/1 89
leiocarpum DC. IV/1
Linnaei Crtz. IV/1 360
nudicaule L. IV/1 72
obovatum Kit. IV/1 81
perfoliatum L. IV/1 87
petraeum L. IV/1 360
Pollichii Roth IV/1 85
procumbens L. IV/1 361
rotundifolium All. IV/1 132
ruderale L. IV/1 83
ruderale Richardson IV/1 84
salinum Pall. IV/1 89
sativum L. IV/1 81
scapiferum Wallr. IV/1 72
Smithii Hook. IV/1 80
subulatum auct. Helv. IV/1 83
Lepidium triandrum Stok. IV/1 85
verrucosum DC. IV/1 89
violiforme DC. IV/1 102
Virginicum L. IV/1 85
Virginicum L. subsp. Texanum (Buckley) Thellung IV/1 87
Lepidocaryoideae VII 156
Lepidodendraceae I 70
Lepigonum Fries III 421
marginatum Koch III 424
marinum Wahlenb. III 424
medium Fries III 423
rubrum Wahlenb. III 422
salinum Fries III 423
„ segetale Koch III 425
Lepismium (Pfeiff.) K.Schum. V/2 697
Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Dcne. V/3 2063
Leptasea aizoides Haw. IV/2 596
„ Hirculus Small IV/2 621
Leptobasis pinnatipartita Dulac IV/1 159
Leptocarpaea Loeselii DC. IV/1 174
Leptocaulis Nutt. V/2 1140
Leptochloa Chinensis (L.) Nees VII 155
Leptopteris Presl VII 148
Leptopyrum fumarioides (L.) Rchb. III 477
Leptospermoideae V/2 780; VII 192
Leptospermum arachnoideum Sm. V/2 788
flavescens Sm. V/2 788
myrtifolium Sieb. V/2 789
„ scoparium Forst. V/2 788
Leptostachya Mitch. VII 205
Lepturus R. Br. I 381; VII 155
compressus Steudel I 382
filiformis Koch I 381
filiformis Lange I 381
incurvatus Trin. I 381, 382
Pannonicus Kth. I 381
„ strigosus Dum. I 381
Lepyrodiclis holosteoides Fenzl III 436
Lerchenfeldia flexuosa Schur I 245
Lerchia maritima O. Kuntze III 257
Lerouxia nemorum Mérat V/3 1854
Leskeaceae VII 147
Lespedeza bicolor Turcz. IV/3 1462, 1463
formosa Koehne IV/3 1463
macrocarpa Bunge IV/3 1463
racemosa Dippel IV/3 1463
„ Sieboldi Miq. IV/3 1463
Lesquerella Wats. VII 177
Lessertia perennans DC. IV/3 1457
Lessonia Bertero V/2 974
Leucadendron argenteum R. Br. III 145
Leucanthea cyanifolia Gray VI/2 980
Leucanthemum Adanson VI/2 591, 592
alpinum L. VI/2 603
Leucanthemum alpinum var. Rollense Briq. VI/2 552
coronopifolium Gren. et Godr. VI/2 607
corymbosum Gren. et Godr. VI/2 614
heterophyllum DC. VI/2 612
maximum DC. VI/2 612
Parthenium Gren. et Godr. VI/2 617
„ vulgare Lam. VI/2 609
Leuchtenbergia principis Hook. V/2 694
Leucobryaceae VII 145
Leucodontaceae VII 146
Leucoglochin pauciflorus Heuff. II 57
Leucoiaceae VII 162
Leucoium L. II 309; VII 162
aestivum L. II 311
Cheiri Med. IV/1 442
vernum L. II 310
Leuconymphaea alba O. Kuntze III 441
candida O. Kuntze III 443
tetragona O. Kuntze III 440
Leucosinapis alba Spach IV/1 206
Leucothoë acuminata Don V/3 1651
Catesbaei Gray V/3 1651
„ racemosa Gray V/3 1651
Leucoxylum Blume V/3 1898
Levisticum Hill V/2 1349
Levisticum Karst. V/2 1349
officinale Koch V/2 1349
„ vulgare Rchb. V/2 1350
Lewisia rediviva Pursh III 268
Leycesteria Wall. VII 207
Liabum Adans. VI/2 798
Liatris Schreb. VII 209
elegans Willd. VI/1 408
pycnostachya Michx. VI/1 408
„ spicata Willd. VI/1 408
Libanotis Böhmer V/2 1226; VII 194
athamantina Roehl. V/2 1244
athamantoides DC. V/2 1248
Cretensis Gaertn. V/2 1244
Cretensis Scop. V/2 1278
daucifolia Rchb. V/2 1247
daucoides Scop. V/2 1244
elata C. Koch V/2 1247
gummifera Crtz. V/2 1227
intermedia Rupr. V/2 1247
leiocarpa Simonkai V/2 1248
Libanotis Karst. V/2 1243
minor Gouan V/2 1246
montana Crtz. V/2 1243
praecox Kern. V/2 1247
Pyrenaica Bourg. V/2 1247
Riviniana Scop. V/2 1247
Sibirica C. A. Mey. V/2 1247
Turbith Crtz. V/2 1277
„ vulgaris DC. V/2 1244
Libertia formosa Grah. II 306

Libocedrus Endl. VII 151
„ decurrens Tor. I 82
Lichenastra VII 144
Lichenes VII 143
Lidbeckia bipinnata Thunb. VI/2 1366
Liebichia alpina Opiz IV/2 651
Ligularia Cass. VI/2 796; VII 212
glauca (L.) O. Hoffm. VI/2 796
„ Sibirica (L.) Cass. VI/2 797
Ligusticum L. V/2 1313; VII 194
Ajawain Fleming V/2 1168
Ajouan Roxb. V/2 1168
albo-marginatum Rupr. V/2 1325
alpinum Drude V/2 1325
alpinum Ten. V/2 1190
athamantoides Spr. V/2 1248
Austriacum L. V/2 1090
Austriacum Ten. V/2 1087
Brancionis Schrank V/2 1090
Bulbocastanum Crtz. V/2 1191
Bunius Lk. V/2 1173
capillaceum Lam. V/2 1301
Carniolicum Host V/2 1087
Carvi Roth V/2 1182
Carvifolia Caruel V/2 1311
cicutifolium Vill. V/2 1308
Cornubiense L. V/2 1081
Cretense Börner V/2 1278
cuminum Crtz. V/2 1138
cuneifolium Guss. V/2 1318
decussatum Moench V/2 1375
ferulaceum All. V/2 1315, 1318
ferulaceum Lapeyr. V/2 1246
Fischeri Lk. V/2 1326
Foeniculum Crtz. V/2 1284
Garganicum Ten. V/2 1471
Gmelini Gham. et Schlecht. V/2 1329
Gmelini Vill. V/2 1090
Hacquetii Guss. V/2 1087
hirsutum Crtz. V/2 1006
Lobelii Vill. V/2 1307
lucidum Mill. V/2 1316
Meum Crtz. V/2 1300
minus Lam. V/2 1304
Monnieri Calestani V/2 1304
Mutellina (L.) Crtz.) V/2 1318; VII 129 Fig. 1169
mutellinoides (Crtz.) Vill. V/2 1323
mutellinum Clairv. V/2 1318
nodiflorum All. V/2 1299
officinale Pilger V/2 1350
Peloponense Vill. V/2 1046
Peloponnesiacum L. V/2 1046
Persicum Freyn. et Bornm. V/2 1349, 1352
Phellandrium Crtz. V/2 1265
Podagraria Crtz. V/2 1212
pratense Börner V/2 1296
Pyrenaeum Gouan V/2 1317
Pyrenaeum Griessl. V/2 1347
Ligusticum Pyrenaicum Koch V/2 1318
Seguieri Koch V/2 1318
Seguieri Vill. V/2 1315
Sibiricum Spr. V/2 1247
silaifolium Gaud. V/2 1307
Silaus Vill. V/2 1296
simplex All. V/2 1323
Sprengelii Sieb. V/2 1087
tripartitum Dum. V/2 1296, 1297
vaginatum Spr. V/2 1329
„ venosum Calestani V/2 1305
Ligustrales V/3 1901
Ligustrum L. V/3 1944; VII 197
acuminatum Koehne V/3 1946
Amurense Carr. V/3 1946
ciliatum Rehd. V/3 1946
coriaceum V/3 1945
Japonicum Thunb. V/3 1945
Ibota Sieb. V/3 1946
Italicum Mill. V/3 1948
lucidum Ait. V/3 1946
medium Franchet et Savatier V/3 1946
medium hort. V/3 1946
obtusifolium Sieb. et Zucc. V/3 1946
ovalifolium Hassk. V/3 1946
Regelianum Koehne V/3 1946
„ vulgare L. V/3 1946
Lilaea subulata H. B. et Kth. I 147
Liliaceae II 184, 159
Liliiflorae II 320; VII 158
Lilioideae II 278; VII 159
Lilium L. II 234; VII 159, 52 Fig. 1085, 105 Fig. 1137
Albanicum Heuff. II 235
auratum Lindl. II 235
Brownii Poit. II 235
bulbiferum L. II 187, 237, 238
Canadense L. II 235
candidum L. II 234
Carniolicum Bernh. II 238
Chalcedonicum Jacq. II 238
Chalcedonicum L. II 235
croceum Chaix II 238
elegans Thunb. II 235
Humboldtii Roezl et Leicht. II 235
Jankae Kern. II 235
Leichtlini Hook. f. II 235
longiflorum Thunb. II 235
Martagon L. II 236; VII 159 u. 52 Fig. 1085, 105 Fig. 1137
monadelphum Bieb. II 235
odorum Planch. II 235
pardalinum Kellogg II 235
speciosum Thunb. II 235
superbum L. II 235
Thunbergianum Schult. II 235
„ tigrinum Ker-Gawler II 235
Limnanthaceae V/1 213; VII 186
Limnanthes R. Br. VII 186
Limnanthes Douglasii R. Br. V/1 213
„ Floerkea Willd. V/1 213
Limnanthemum S. G. Gmel. V/3 1961; VII 198
nymphaeoides Lk. V/3 1961
„ pellatum Gmel. V/3 1961
Limnobium L. C. Rich. I 159
Limnocharis H. B. et Kth. I 157
Limnochloa acicularis Rchb. II 41
alpina Drejer II 23
alpina Rchb. II 26
caespitosa Rchb. II 24
„ parvula Rchb. II 41
Limnophyton Miq. I 150
Limodorum Swartz II 382; VII 165
abortivum (L.) Swartz II 382
„ Epipogium Swartz II 383
Limonia acidissima L. V/1 54
Limonium Mill. V/3 1879; VII 197
Bonduellei (Lestib.) O. Kuntze V/3 1881
Bourgeaui (Webb) O. Kuntze V/3 1881
callicomum (C. A. Mey.) O. Kuntze V/3 1881
Carolinianum (Walt.) Britton V/3 1879
elatum (Fisch.) O. Kuntze V/3 1880
eximium (Schrank) O. Kuntze V/3 1881
fruticans (Webb) O. Kuntze V/3 1881
Gmelini (Willd.) O. Kuntze V/3 1880
Kaufmannianum (Regel) O. Kuntze V/3 1881
latifolium (Sm.) O. Kuntze V/3 1880
macrophyllum (Brouss.) O. Kuntze V/3 1881
puberulum Webb V/3 1881
rariflorum O. Kuntze V/3 1883
Sareptanum (Becker) V/3 1880
sinuatum (L.) Mill. V/3 1881
Suworowii (Regel) O. Kuntze V/3 1880
Thouini (Viv.) O. Kuntze V/3 1881
tomentellum (Boiss.) O. Kuntze V/3 1880
„ vulgare Mill. V/3 1882
Limosella L. VI/1 381; VII 204
„ aquatica L. VI/1 38
Linaceae V/1 1; VII 184
Linagrostis alpina Scop. II 23
polystachya Scop. II 20
„ vaginata Scop. II 18
Linaria L. VI/1 20; VII 204
alpina (L.) Mill. VI/1 21; VI/2 1360
angustifolia Rchb. VI/1 25
arvensis (L.) Desf. VI/1 23
bipartita Willd. VI/1 23

Linaria chalepensis (L.) Mill. VI/1 21
chloraefolia Rchb. VI/1 26
commutata Bernh. VI/2 1360
Cymbalaria L. VI/1 27
Dalmatica Rchb. VI/2 1360
Elatine Mill. VI/1 28
genistifolia (L.) Mill. VI/1 26
grandiflora Godr. VI/1 27
intermedia Schur VI/1 26
Italica Trev. VI/1 25
Loeselii Schweigg. VI/1 24
Linaria Wettst. VI/1 25
Maroccana Hook. VI/2 1360
minor Desf. VI/1 29
Monspessulana(L.) Mill.VI/1 22
ochroleuca Bréb. VI/1 27
odora Chav. VI/1 24
oligotricha Borb. VI/1 27
origanifolia (L.) Chazelles VI/2 1360
Pelisseriana DC. VI/1 21
pilosa (Jacq.) Chazelles VI/2 1360
pilosa (Jacq.) DC. VI/1 21
pinifolia (Poir.) Thellung VI/1 21
purpurea (Mill.) VI/1 21
Pyrenaica DC. VI/1 20
repens Mill. VI/1 22
reticulata (Sm.) Desf. VI/1 21
rubrifolia DC. VI/1 21
saxatilis Hoffmgg. et Lk. VI/1 21
sepium Allm. VI/1 27
simplex (L.) DC. VI/1 23
spartea (L.) Hoffmgg. et Lk. VI/1 21
spuria Mill. VI/1 28
striata DC. VI/1 22
supina (L.) Desf. VI/1 21
thymifolia (Vahl) DC. VI/1 21
triphylla (Jacq.) Hal. VI/1 21
versicolor Moench VI/1 21
villosa (L.) DC. VI/1 21
„ vulgaris Mill. VI/1 25
Lindelofia Lehm. VII 200
longiflora (Benth.) Gürke V/3 2147
„ spectabilis Lehm. V/3 2147
Lindera Adans. V/2 995
Aschers. V/2 1041
Thunb. VII 176
„ odorata Aschers. V/2 1041
Lindernia All. VI/1 39; VII 204
Pyxidaria All. VI/1 39; VI/2 1361
Lindheimera Texana A. Gray et Engelm. VI/1 528
Lindleya mespiloides H. B. et Kth. IV/2 663
Linnaea Gronov. VI/1 245; VII 207
borealis L. VI/1 245; VII 22 Fig. 1034
Linostrophum sativum Schrank IV/1 368
Linosyris villosa DC. VI/1 417
„ vulgaris Cass. VI/1 420
Linum L. V/1 3; VII 184
Abyssinicum Hochst. V/1 14
Africanum hort. V/1 21
album Nichols. V/1 19
alpinum Fleischm. V/1 16
alpinum Jacq. V/1 15
Americanum album hort. V/1 21
Anglicum Mill. V/1 17
angustifolium Tomaschek V/1 12
aureum DC. V/1 5
Austriacum L. V/1 19
Austriacum Pacher V/1 16
barbulatum Schur V/1 19
Bavaricum F. Schultz V/1 17
Berlandieri Hook. V/1 5
bienne Mill. V/1 21
campanulatum L. V/1 5
Catanense Strobel V/1 21
catharticum L. V/1 6
Cilicicum Fenzl V/1 12
corymbulosum Rchb. V/1 5
Darmstadinum Alef. V/1 17
diversifolium Gilib. V/1 6
flavum L. V/1 8
Gallicum L. V/1 14
grandiflorum Desf. V/1 5
hirsutum L. V/1 11
Julicum (Hay.) V/1 16
laeve Fritsch V/1 16
laeve Rchb. V/1 14
laeve Scop. V/1 16
Leonii F. Schultz V/1 17, 18
Liburnicum Hal. V/1 14
Liburnicum Scop. V/1 5
luteolum Bieb. V/1 5
maritimum L. V/1 5
monadelphum Kit. V/1 15
montanum Schleich. V/1 16
multiflorum Lam. V/1 2
Narbonense L. V/1 14
nodiflorum L. V/1 5
nudifolium Borb. V/1 12
Orientale Boiss. V/1 5
Pannonicum Kern. V/1 12
perenne L. V/1 17
Petryi R. Beyer V/1 18
Radiola L. V/1 2
Suecicum Murbeck V/1 7
suffruticosum L. V/1 5
tenuifolium L. V/1 12
tetrapetalum Gilib. V/1 2
trigynum L. V/1 14
usitatissimum L. V/1 20
„ viscosum L. V/1 10
Liparis Rich. II 393; VII 165
„ Loeselii Rich. II 393
Liparophyllum dulcis Trev. V/3 2236
Gunnii Hook. V/3 1953
Lippia L. VII 201
nudiflora (L.) Michx. V/3 2236
repens Spr. V/3 2233
triphylla (L'Hérit.) O. Kuntze V/3 2235
Lipusa multiflora Alef. IV/3 1637
Liquidambar L. IV 2 655; VII 180
Orientalis Mill. IV/2 655, 656
„ styraciflua L. IV/2 655, 656
Liquiritia officinalis Moench IV/3 1454
Liriodendron L. VII 175
Liriodendron tulipifera L. IV/1 13
Liriope Lour. VII 162
Lisianthus L. V/3 1956
Lissocarpa Benth. VII 197
Lissocarpaceae VII 197
Listera R. Br. II 386; VII 165
cordata R. Br. II 387
Nidus avis Hook. II 388
„ ovata R. Br. II 386
Litchi Chinensis Sonn. V/1 307
Lithosciadium Turcz. V/2 1304
Lithospermum L. V/3 2153; VII 200
Apulum (L.) Vahl V/3 2153
arvense L. V/3 2158
cornutum Ledeb. V/3 2128
decumbens Vent. V/3 2128
fruticosum L. V/3 2153
Gasparrinii Heldreich V/3 2159
graminifolium Kern. V/3 2153
Lehmanni Tineo V/3 2205
Leithneri Heldreich et Sartor. V/3 2153
medium Chevalier V/3 2159
officinale L. V/3 2156
Pallasii Ledeb. V/3 2128
paniculatum Lehm. V/3 2128
pulchrum Lehm. V/3 2128
purpureo-caeruleum L. V/3 2154
rosmarinifolium L. V/3 2153
Sibiricum Lehm. V/3 2128
Splitgerberi Gussone V/3 2159
suffruticosum Kern. V/3 2153
tenuiflorum L. f. V/3 2153
„ tinctorium L. V/3 2205
Litorella Bergius VI/1 194; VII 205
australis Griseb. VI/1 194
juncea Bergius VI/1 194
lacustris L. VI/1 194
„ uniflora (L.) Aschers. VI/1 194
Litsea Lam. VII 176
„ sebifera Bl. IV/1 11
Littonia modesta Hook. II 199
Livistona Chinensis R. Br. II 130
Lloydia Salisb. II 213; VII 159
alpina Salisb. II 213
„ serotina Rchb. II 213
Loasa Adans. V/1 662
Loasaceae V/1 661; VII 190
Lobaria VII 144

Lobaria cernua Haw. IV/2 617
Lobelia L. VI/1 392; VII 209
cardinalis L. VI/1 392
Dortmanna L. VI/1 393
Erinus VI/1 392
fulgens Willd. VI/1 392
inflata L. VI/1 392
laxiflora H. B. et Kth. VI/1 392
splendens Willd. VI/1 392
syphilitica L. VI/1 393
„ urens L. VI/1 392
Lobeliaceae VI/1 391; VII 209
Lobostemon argenteus Buek V/3 2193
formosum Buek V/3 2193
glaucophyllos (Pers.) Buek V/3 2193
Lobularia Desv 178
calycina Beck IV/1 448
Lybica (Viv.) Webb IV/1 448
„ maritima (L.) Desv. IV/1 447
Lochnera rosea (L.) Rchb. V/3 2051
Loeflingia Hispanica L. III 436
Loeselia L. VII 200
Loganiaceae V/3 1949; VII 197
Logfia Gallica Cosson VI/1 454
„ subulata Cass. VI/1 454
Loiseleuria Desv. V/3 1647; VII 195
procumbens (L.) Desv. V/3 1647
Loisineae V/1 493; VII 190
Lolium L. I 375; VII 155
annuum Gilib. I 376
arvense Schrad. I 377
festucaceum Lk. I 381
hybridum Hausskn. I 381
Italicum A. Br. I 378
linicolum A. Br. I 377
multiflorum Lam. I 378
perenne L. I 379
remotum Schrank I 377
rigidum Gaud. I 380
temulentum L. I 376
„ vulgare Host I 379
Lomatia obliqua R. Br. V/1 235
Lomatogonium A. Br. V/3 1976; VII 198
Carinthiacum (Wulf.) Rchb. V/3 1977
rotatum (L.) Eschsch. V/3 1977
Lomentaceae IV/1 63, 273
Lonas inodora (L.) Gaertn. VI/2 673
Lonchocarpus H. B. et Kth. VII 183
Lonicera L. VI/1 249; VII 207
alpigena L. VI/1 253
caerulea L. VI/1 254; VII 207 Fig. 1257
Caprifolium L. VI/1 258
Caucasica Pall. VI/1 250
cotinifolia C. A. Mey. VI/1 252
Cyrenaica Viviani VI/1 257
Lonicera dumetorum Moench VI/1 252
Etrusca Santi VI/1 257
Germanica Dietr. VI/1 255
Helvetica Brügg. VI/1 259
hispida Pall. VI/1 251
Japonica Thunb. VI/1 251
Iberica Bieb. VI/1 251
involucrata Banks VI/1 251
Italica Edwards VI/1 258
Marylandica L. V/3 1952
microphylla Willd. VI/1 251
misera Zabel VI/1 259
nigra L. VI/1 253
pallida Host VI/1 258
perfoliata Schm. VI/1 258
Periclymenum L. VI/1 255
Pyrenaica L. VI/1 250
rubra Gilib. VI/1 252
saxatilis Tausch VI/1 257
semperflorens Goldring VI/1 256
sempervirens L. VI/1 250
suavis Salisb. VI/1 258
Tatarica L. VI/1 250
vulgaris Roehling VI/1 252
„ Xylosteum L. VI/1 252
Lopezia Cavan. V/2 803
coronata Andr. V/2 803
frutescens R. et Sch. V/2 803
grandiflora hort. V/2 803
macrophylla Benth. V/2 803
miniata DC. V/2 803
racemosa Cav. V/2 803
Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth. V/4 2368
Lophiostomataceae VII 141
Lophocereus V/2 692
Lophodermium VII 141
Lophopetalum toxicum Loher V/1 245
Lophophora Lewinii Thompson V/2 684
Williamsii (Lem.) Coulter V/2 684, 694
Lophophytum Schott et Endl. VI 170
Lophospermum Don VII 204
Loranthaceae III 145; VII 170
Loranthus L. III 149; VII 170
„ Europaeus Jacq. III 149
Loroglossum anthropophorum Rich. II 359
hircinum Rich. II 360; VII 166 Fig. 1204
Loropetalum R. Br. VII 180
Lotea ornithopodioides Moench IV/3 1366
Loteae IV/3 1352; VII 182
Lotononis DC. VII 182
Lotus L. IV/3 1364; VII 182
angustissimus L. IV/3 1360
Arabicus L. IV/3 1366
Argolicus Lk. IV/3 1369
Lotus aristatus DC. IV/3 1366
Berthelotii Masf. IV/3 1365
ciliatus Fisch. IV/3 1368
Coimbrensis Willd. IV/3 1366
corniculatus L. IV/3 1367
Crantzii Vis. IV/3 1381
crassifolius Pers. IV/3 1369
decumbens Forst. IV/3 1369
diffusus Soland. IV/3 1366
Dorycnium Crtz. IV/3 1381
Dorycnium L. IV/3 1379
exilis Schleich. IV/3 1369
Germanica Krause IV/3 1368
glacialis Bourg. IV/3 1369
glareosus Boiss. et Reut. IV/3 1367
gracilis Waldst. et Kit. IV/3 1366
hirsutus L. IV/3 1378
hispidus Desf. IV/3 1366
Jacobaeus L. IV/3 1365
intermedius Deslong IV/3 1370
major Scop. IV/3 1370
major Sm. IV/3 1372
minor Bishop IV/3 1369
Noëanus Boiss. IV/3 1369
nummularius Rchb. IV/3 1372
odoratus Holl IV/3 1372
oligoceratus Scop. IV/3 1366
ornithopodioides L. IV/3 1366
peliorrhynchus (Webb) Hook. IV/3 1365
pentaphyllus Gilib. IV/3 1367
pisifolius Lowe IV/3 1372
pratensis Rouy IV/3 1369
siliquosus L. IV/3 1373
silvaticus Wierzl. IV/3 1369
suaveolens Pers. IV/3 1366
Tchihatcheffii Boiss. IV/3 1369
tenuifolius Rchb. IV/3 1369
tenuis Kit. IV/3 1369
Tetragonolobus L. IV/3 1375
uliginosus Schkuhr IV/3 1372
valdepilosus Schur IV/3 1369
„ villosus auct. IV/3 1369
Loudonia Lindl. V/2 894; VII 192
Loxopterygium P. Browne VII 186
Luciola Forsteri Sm. II 175
Luculia gratissima Swartz VI/1 197
Lucuma glycyphloea Mart. et Eichl. V/3 1897
Ludwigia L. V/2 804; VII 192
apetala Walt. V/2 804
„ palustris (L.) Elliot V/2 804
Luerssenia Cyminum O. Kuntze V/2 1138
Luetkea Bong. VII 180
Luffa L. VII 208
Luffa acutangula (L.) Roxb. VI/1 315
Aegyptiaca Mill. VI/1 314
„ cylindrica (L.) Röm. VI/1 314
Lumnitzera Willd. V/2 773; VII 192

Lunaria L. IV/1 353; VII 177
alpina Bergeret IV/1 353
annua L. IV/1 355
biennis Moench IV/2 355
odorata Lam. IV/1 353, 354
rediviva L. IV/1 353; VII 213 Fig. 1268
Lupinaster albus Lk. IV/3 1313
alpinus Presl IV/3 1314
pentaphyllus Moench IV/3 1312
Lupinus L. IV/2 1148; VII 182 u. 75 Fig. 1110
albus L. IV/3 1153
angustifolius L. IV/3 1158
aridus Douglas IV/3 1155
Bivonae Presl IV/3 1153
Cruckshanksii Hook. IV/3 1155
grandifolius Beechey IV/3 1154
hirsutus L. IV/3 1154
hybridus hort. IV/3 1160
laxiflorus Douglas IV/3 1155
leucophyllus Douglas IV/3 1155
linifolius Rchb. IV/3 1158
litoralis Douglas IV/3 1155
luteus L. IV/3 1156
macrophyllus Benth. IV/3 1154
mutabilis Sweet IV/3 1155
niger hort. IV/3 1157
odoratus hort. IV/3 1156
ornatus Douglas IV/3 1155
perennis L. IV/3 1155
pilosus Murray IV/3 1154
polyphyllus Lindl. IV/3 1154
prolifer Desr. IV/3 1153
pubescens Benth. IV/3 1155
reticulatus Desv. IV/3 1159
sativus Gaertn. IV/3 1153
subcarnosus Hook. IV/3 1155
termis Forskal IV/3 1153
„ varius L. IV/3 1154
Lupsia Necker VII 212
Lupulina aurata Noulet IV/3 1255
Luteola tinctoria Webb et Berth. IV/1 487
Luxemburgiaceae VII 189
Luzula Lam. et DC. II 173; VII 158
albida Lam. et DC. II 178
angustifolia Wender. II 178
Bornmuelleriana Kükenthal II 84
Borreri Bromfield VII 159
campestris (L.) Lam. et DC. II 183
erecta Desv. II 183
Favrati Richt. II 184
flavescens (Host) Gaud. II 176; VII 42 Fig. 1071
Forsteri (Sm.) DC. II 175
glabrata Desv. II 180
Hermanni Muelleri Aschers. et Graebn. II 184
Luzula Hostii Desv. II 176
Johannis principis Murr VII 159
lutea (All.) DC. II 176
luzulina (Vill.) Dalla Torre et Sarntheim II 176; VII 42 Fig. 1071
maxima Lam. et DC. II 177; VII 53 Fig. 1086
multiflora II 183
nemorosa (Poll.) E. Mey. II 178
nigricans Desv. II 182
nivea Baumg. II 178
nivea Lam. et DC. II 179
obtusata Steud. II 182
pilosa (L.) Willd. II 176
Schultzorum Dalla Torre et Sarnthein II 184
silvatica (Huds.) Gaud. II 177; VII 53 Fig. 1086
spadicea Lam. et DC. II 181; VII 159
spicata (L.) Lam. et DC. II 182
Sudetica (Willd.) II 184
vernalis Lam. et DC. II 176
„ vernalis Seb. et Mauri II 175
Luzuriagoideae II 280
Lycaste Lindl. VII 165
Lychnanthos volubilis Gmel. III 307
Lychnidea folio salicino Dillen. V/3 2113
Lychnis L. III 296; VII 173
acaulis Scop. III 294
alba Mill. III 301
alpestris L. f. III 305
alpina L. III 275
baccifera Scop. III 307
Behen Scop. III 279
Chalcedonica L. III 296
conica Scop. III 281
Coronaria (L.) Desr. III 297; VII 64 u. 71, Fig. 1106
dioeca L. III 300, 301
Flos cuculi L. III 298
Flos Jovis (L.) Desr. III 296; VII 64
fulgens Fisch. III 296
Githago Scop. III 273
grandiflora Jacq. III 296
laeta Ait. III 296
media Fisch. et Mey. III 299
noctiflora Schreb. III 302
nutans Scop. III 292
ocymoides Jess. III 345
officinalis Scop. III 344
Pumilio Scop. III 347
quadridentata Murray III 305
Saponaria Jess. III 344
saxifraga Scop. III 284
segetum Lam. III 273
silvestris Schkuhr III 300
Vaccaria Scop. III 317
Lychnis vespertina Sibth. III 301
„ Viscaria L. III 276
Lycium L. V/4 2562; VII 203
afrum L. V/4 2563
barbarum auct. V/4 2563
barbarum L. V/4 2563
Chinense Mill. subsp. rhombifolium (Moench) Thellung V/4 2565
Europaeum L. V/4 2562
halimifolium Mill. V/4 2563
lanceolatum Poir. V/4 2564
mediterraneum Dun. V/4 2562
megistocarpum var. lanceolatum Dun. V/4 2564
ovatum Poir. V/4 2565
pallidum Miers V/4 2563
rhombifolium (Moench) Dippel V/4 2565
salicifolium Mill. V/4 2562
spinosum Hasselquist V/4 2562
subglobosum Dun. V/4 2564
turbinatum Poir. V/4 2563
„ vulgare Dun. V/4 2563
Lycoperdaceae VII 143
Lycopersicum esculentum Mill. V/4 2607; VII 123 Fig. 1161
„ Humboldtii Dun. V/4 2585
Lycopodiaceae I 63; VII 147
Lycopodiales I 4; VII 147
Lycopodium L. I 64; VII 147
alpinum L. I 69
anceps Wallr. I 68; VII 148, Fig. 1174
annotinum L. I 65
Chamaecyparissus A. Br. I 68
clavatum L. I 66
complanatum L. I 67; VII 148, Fig. 1174
inundatum L. I 66
„ Selago L. I 65
Lycopsis L. V/3 2202; VII 201
arvensis L. V/3 2203
arvensis L. subsp. occidentalis Kusnezow V/3 2204
arvensis L. subsp. orientalis (L.) Kusnezow V/3 2204
bullata Cyr. V/3 2202
ciliata C. A. Mey. V/3 2206
ciliata Willd. V/3 2208
echioides L. V/3 2128
elongata Lehm. V/3 2198
hispidula Gandoger V/3 2204
lutea Desr. V/3 2208
micrantha Ledeb. V/3 2204
orientalis L. V/3 2204
pulla L. V/3 2206
setosa Lehm. V/3 2208
Taurica Stev. V/3 2204
variegata L. V/3 2202
„ vesicaria Horn. V/3 2206
Lycopus L. V/4 2384; VII 201
aquaticus Moench V/4 2385

Lycopus Europaeus L. V/4 2385
exaltatus L. fil. V/4 2388
intercedens Rechinger V/4 2389
mollis Kern. V/4 2386
palustris Lam. V/4 2385
pinnatifidus Pall. V/4 2388
„ vulgaris Pers. V/4 2385
Lygeum spartum L. I 196; VII 154
Lygia Passerina Fasano V/2 726
Lygodium Sw. VII 148
Lyngbyaccae VII 136
Lyonia calyculata Rchb. V/3 1654
„ ligustrina DC. V/3 1651
Lyperia atropurpurea Benth. II 298
Lysimachia (Tourn.) L. V/3 1850; VII 197
atropurpurea V/3 1851
Azorica Hornem. V/3 1854
barystachys Bunge V/3 1851
capitellata Raf. V/3 1855
ciliata L. V/3 1850
clethroides Duby V/3 1851
Ephemerum L. V/3 1850
Guestphalica Weihe V/3 1859
Japonica Thunb. V/3 1851
linifolia Salisb. V/3 1729
Linum stellatum L. V/3 1729
lutea Jiraseck V/3 1859
nemoralis Salisb. V/3 1854
nemorum Geners. V/3 1852
nemorum L. V/3 1854
Nummularia L. V/3 1852
paludosa Baumg. V/3 1859
pumila Poepp. V/3 1871
punctata L. V/3 1857
quadrifolia Mill. V/3 1857
repens Stok. V/3 1852
rotundifolia F. W. Schmidt V/3 1852
serpyllifolia Poir. V/3 1729
suaveolens Schoenheit V/3 1852
tenella L. V/3 1871
thyrsantha St. Lag. V/3 1855
thyrsiflora Geners. V/3 1859
thyrsiflora L. V/3 1855
tomentosa Presl V/3 1859
Trientalis Klatt V/3 1861
verticillaris Spr. V/3 1857
vulgaris L. V/3 1859
„ Zavadskii Wiesn. V/3 1852
Lysimachieae VII 197
Lythraceae V/2 741; VII 191
Lythrum L. V/2 752; VII 191
alternifolium Lorr. V/2 752
Austriacum Jacq. V/2 756
cinereum Griseb. V/2 758
flexuosum Lag. V/2 753
Graefferi Ten. V/2 753
Hyssopifolia L. V/2 754
maculatum Kiärskou V/2 752
Lythrum meonanthum Lk. V/2 753
palustre Salisb. V/2 757
Salicaria L. V/2 757
scabrum Simkovics V/2 761
spicatum S. F. Gray V/2 757
spiciforme Dulac V/2 757
thymifolia L. V/2 752
virgatum L. V/2 756

M.

Maackia Amurensis Rupr. et Maxim. IV/2 1146
Maba maior G. Forst. V/3 1897
Macgregoria F. v. Muell. VII 187
Machaeranthera tanacetifolia Nees VI/1 417
Machaerium Pers. VII 183
Mackinlaya F. v. Muell. V/2 58
Macleaya cordata R. Br. IV/1 19
Maclura aurantiaca Nutt. III 124, 136
Macrochloa tenacissima Kth. I 202
Macromeria Don V/3 2128
exserta Don V/3 2128
„ longiflora Don V/3 2128
Macropodandra Gilg VII 186
Macroselinum Schur V/2 1364
Macrothyrsus discolor Spach V/1 300
Macrotomia echioides (L.) Boiss. V/3 2128
Macrotybus luteus Dul. V/3 1788
Macrozamia Miq. I 73; VII 150
Madia glomerata Hook. VI/1 533
„ sativa Mol. VI/1 532
Maesa picta Hochst. V/3 1714
Maesopsis Engl. VII 187
Magnolia L. IV/1 14; VII 175
acuminata L. IV/1 13
denutata Lam. IV/1 13
glauca L. IV/1 13
grandiflora L. VII 175 Fig. 1218a bis e
hypoleuca Sieb. et Zucc. IV/1 13
macrophylla Michx. IV/1 13
obovata Thunb. IV/1 13
precia Corr. IV/1 13
tripetala L. IV/1 13
„ Yulan Desf. IV/1 13
Magnoliaceae IV/1 13; VII 175
Magonia St. Hil. VII 187
Mahonia IV/1 6; VII 175
Majana aurea Rumpf V/4 2271
scutellarioides O. Kuntze V/4 2271
Majanthemum Web. II 267; VII 162
bifolium (L.) F. W. Schmidt II ~~267~~ 334
Convallaria Web. II ~~267~~ 334
„ cordifolium Moench II 267
Majorana Mill. V/4 2332; VII 201
crassifolia Benth. V/4 2333
hortensis Moench V/4 2334
Maru (L.) Briq. V/4 2333
Onites (L.) Benth. V/4 2333
Mairania alpina Desv. V/3 1661
„ Uva-ursi Desv. V/3 1657
Malabaila Tausch V/2 1087
Golaka Walp. V/2 1087
Hacquetii Tausch V/2 1087
hispida Lacaita V/2 1362
„ Opopanax Baillon V/2 1360
Malachium Fries III 348; VII 172
aquaticum Fries III 348
erectum Gren. III 378
Manticum Rchb. III 379
„ palustre Hoffm. III 348
Malacospermae VII 190
Malaxis Solander II 391; VII 165
diphyllos Cham. II 393
Loeselii Swartz II 393
monophyllos Swartz II 392
„ paludosa Swartz II 391
Malcolmia Africana R. Br. IV/1 465
litorea (L.) DC. IV/1 465
„ maritima (L.) R. Br. IV/1 464
Malesherbiaceae VII 190
Mallotus Philippinensis Müll.-Aarg. V/1 125; VII 185
Malope malacoides L. V/1 455
multiflora Cav. V/1 455
„ trifida Cav. V/1 455
Malopeae V/1 455; VII 188
Malpighiaceae V/1 86; VII 185
Malpighinae VII 185
Malus Hill IV/2 743; VII 181
angustifolia (Ait.) Michx. IV/2 744
baccata Borkh. IV/2 743
communis Lam. IV/2 745
coronaria (L.) Mill. IV/2 744
dioeca Loisel. IV/2 747
floribunda Sieb. IV/2 743
hybrida Loisel. IV/2 744
paradisiaca Med. IV/2 745
praecox Borkh. IV/2 747
Ringo Sieb. IV/2 744
rivularis (Dougl.) Roem. IV/2 744
Rossica Med. IV/2 743
Scheideckeri Zabel IV/2 743
Sibirica Borkh. IV/2 743
Sieboldii Reg. IV/2 744
Sinensis Dum. IV/2 744
„ Toringo Sieb. IV/2 744
Malva L. V/1 474; VII 95 u. 17 Fig. 1015 a
adulterina Wallr. V/1 489
Alcea L. V/1 478
borealis Wallm. V/1 487
breviflora Gilib. V/1 476
circinnata Vis. V/1 477
crispa L. V/1 475
excelsa Presl V/1 477
Henningii Goldbach V/1 487
hybrida Čelak. V/1 489
intermedia Boreau V/1 489
involucrata Torrey et Gray V/1 476

Malva Mauritanica L. V/1 483
moschata L. V/1 479
neglecta Wallr. V/1 485
Nicaeensis All. V/1 477
Papaver Cav. V/1 476
parviflora L. V/1 477
pusilla Withering V/1 487
recta Opiz V/1 483
rotundifolia L. V/1 485, 487
setigera Spenn. V/1 470
silvestris L. V/1 481
Thuringiaca Vis. V/1 472
triangulata Leavenworth V/1 476
verticillata L. V/1 475
„ vulgaris Fries V/1 485
Malvaceae V/1 453; VII 188
Malvales V/1 425; VII 188
Malvastrum Capense Garcke V/1 456
Coromandelinum (Willd.) Garcke V/1 456
geranioides A. Gray V/1 456
tricuspidatum (Ait.) A. Gray V/1 456
Malvaviscus Dill. V/1 457
Malveae V/1 455; VII 188
Mammea Americana L. V/1 500
Mammillaria Harw. V/22 695
Mandragora Juss. VII 203
autumnalis Spr. V/4 2558
caulescens Clarke V/4 2558
Haussknechtii Heldr. V/4 2558
microcarpa Bert. V/4 2558
officinarum L. V/4 2558
„ vernalis Bert. V/4 2558
Manettia ignita K. Schum. VI/1 197
Mangifera Indica L. V/1 215
„ laurina Blume V/1 215
Manihot Aipi Pohl V/1 119
Glaziowii Müll.-Aarg. V/1 119
„ utilissima Pohl V/1 119
Mansonia Gagei I. R. Drumm. V/1 492
Maranta arundinacea L. II 321
Marantaceae II 320, 321; VII 164
Marathrum Lk. V/2 1220
montanum Lk. V/2 1238
„ tortuosum Lk. V/2 1227
Marcgraviaceae V/1 494; VII 189
Marchantiaceae VII 144
Marchantiales VII 144
Mariana Mariana (L.) Hill VI/2 917
Marianthemum grandiflorum hort. VI/1 331
Marianthus Hueg. IV/2 655
Marica caerulea Ker-Gawler II 306
Mariscus Zinn VII 156
Mariscus albus Gilib. II 48
„ setaceus Moench II 44
Marlierea Camb. V/2 777
Marattiaceae VII 148
Marrubium L. V/4 2393; VII 201
affine Host V/4 2399
album Gilib. V/4 2394
Marrubium Aschersonii Magnus V/4 2399
Ballota Lutz V/4 2400
candidissimum auct. Austr. V/4 2397
catariaefolium Desr. V/4 2394
Creticum Mill. V/4 2398
Germanicum Schrank V/4 2394
incanum Desr. V/4 2397
lanatum Kth. V/4 2394
nigrum Crtz. V/4 2400
Pannonicum Rchb. V/4 2399
pauciflorum Wallr. V/4 2398
peregrinum L. V/4 2398
peregrinum Rchb. V/4 2397
Pseudodictamnus L. V/4 2399
remotum Kit. V/4 2399
rupestre Biv. V/4 2399
supinum Scop. non L. V/4 2397
„ vulgare L. V/4 2394
Marsdenia Condurango Rchb. f. V/3 2062
tenacissima (Roxb.) W. et Arn. V/3 2063
Marsilia L. I 48; VII 149
„ quadrifolia L. I 48
Marsiliaceae I 48; VII 149
Marsypocarpus Neck. IV/1 363
Martinsia glastifolia Godr. IV/1 192
Martynia Proboscidea Glox. VI/1 176; VI/2 1363; VII 107 Fig. 1141
Martyniaceae VI/1 176; VII 205
Maruta Cotula DC. VI/1 544
„ foetida Cass. VI/1 544
Mascarenhasia elastica K. Schum. V/3 2049
„ lisianthiflora DC. V/3 2049
Masdevallia Ruiz et. Pav. VII 145
Mastixia tetrandra Clarke V/2 1538
Matisia Benth. VII 188
Matoniaceae VII 148
Matricaria L. VI/2 580; VII 211
aurea (L.) Boiss. VI/2 624
Chamomilla L. VI/2 581
corymbifera DC. VI/2 580
corymbosa Desr. VI/2 614
discoidea DC. VI/2 584
globifera (Thunb.) Druce VI/2 580, 1366
grandiflora (Thunb.) Fenzl VI/2 580
inodora L. var. maritima Wahlenb. VI/2 589
Leucanthemum Desr. VI/2 609
maritima L. VI/2 589
odorata Lam. VI/2 617
Parthenium L. VI/2 617
suaveolens Buchenau VI/2 584
suffruticosa (L.) Druce VI/2 580
Tchihatchewii (Boiss.) Voss VI/2 580
„ trichophylla Boiss. VI/2 580
Matrix rotundifolia Moench IV/3 1221
Matthiola R. Br. IV/1 468; VII 178
bicornis (Sibth. et Sm.) DC. IV/1 469
Graeca Sweet IV/1 469
incana R. Br. IV/1 469; VII 178 Fig. 1221
livida (Del.) DC. IV/1 469
oxyceras DC. IV/1 469
Sabauda Chodat IV/1 471
sinuata (L.) R. Br. IV/1 469
tricupidata R. Br. IV/1 469
tristis R. Br. IV/1 471
Vallesiaca Jaccard IV/1 471
„ varia DC. IV/1 471
Mauchartia Neck. V/2 1176
Maukschia laevis Heuff. II 53
„ scabra Heuff. II 54
Maundia triglochinoides F. Müll. I 147
Maurandia Barkleyana Lindl. VI/1 6
Maxillaria Ruiz et Pav. VII 165
Mayacaceae II 142; VII 158
Maydeae I 178; VII 153
Mayetiola poae Bosc. I LXI Fig. 73 und 315
Meconopsis Cambrica Viguier IV/1 19
Medeola asparagoides L. II 261
Medica lupulina Scop. IV/3 1255
Medicago L. IV/3 1248; VII 182
aculeata Gaertn. IV/3 1252
ambigua Jord. IV/3 1267
apiculata Willd. IV/3 1270/71
Arabica (L.) All. IV/3 1269
arborea L. IV/3 1250
arenaria Ten. IV/3 1252
Aschersoniana Urban IV/3 1253
caerula Less. et Leb. IV/3 1258
Carstiensis Wulf. IV/3 1266
Cibinensis Lerchenf. IV/3 1264
ciliaris (L.) Krock. IV/3 1251
circinnata L. IV/3 1352
constricta Durieu IV/3 1252
cordata Desr. IV/3 1269
corymbifera Schmidt IV/3 1255
denticulata Willd. IV/3 1271
disciformis DC. IV/3 1253
Echinus Lam. et DC. IV/3 1251
elegans Jacq. IV/3 1251
falcata L. IV/3 1259
Gerardi Kit. IV/3 1268
globosa Presl IV/3 1252
Helix Willd. IV/3 1252
hispida Gaertn. IV/3 1270
hybrida Trautv. IV/3 1251
intertexta (L.) Mill. IV/3 1251
laciniata (L.) Mill. IV/3 1253
litoralis Rohde IV/3 1252
lunata Rchb. IV/3 1251
lupulina L. IV/3 1255
maculata Sibth. IV/3 1269
minima (L.) Desr. IV/3 1273

Medicago mixta Sennholz IV/3 1274
Murex Willd. IV/3 1252
obscura Retz. IV/3 1251
orbicularis (L.) All. IV/3 1267
parviflora Gilib. IV/3 1255
Pironae Vis. IV/3 1268
polymorphaWilld.IV/3 1267/68, 1269
praecox DC. IV/3 1253
prostrata Jacq. IV/3 1265
radiata L. IV/3 1251
recta Willd. IV/3 1274
rigidula (L.) Desr. IV/3 1268
rugosa Desr. IV/3 1251
rupestris Pirona IV/3 1268
sativa L. IV/3 1257, 1260
SchimperianaHochst. IV/3 1253
scutellata (L.) All. IV/3 1251
striata Bast. IV/3 1252
subfalcata Schur IV/3 1264
tenuiflora Presl IV/3 1265
Terebellum Willd. IV/3 1272
tribuloides Desr. IV/3 1252
tricycla DC. IV/3 1252
trunculata Gaertn. IV/3 1252
tuberculata Willd. IV/3 1252
turbinata Willd. IV/3 1252
varia Martyn IV/3 1264
Willdenowii Boenningh. IV/3 1255
Medinilla bracteata hort. V/2 796
„ magnifica Lindl. V/2 796
Medium grandiflorumSpach VI/1 331
Medusagynaceae VII 188
Mcesaeaceae VII 146
Megastachya pulchella Roem. et Schult. I 354
Melaconiales VII 143
Melaleuca L. V/2 786
alba hort. V/2 787
armillaris Sm. V/2 787
fulgens R. Br. V/2 787
gibbosa Labill. V/2 788
hypericifolia Sm. V/2 788
Leucodendron L. V/2 787
pulchella R. Br. V/2 787
„ splendens hort. V/2 787
Melampsora V/1 139; VII 142
Melampsoraceae VII 142
Melampsora Larici-epitea III 32
Melampsorella VII 57 Fig. 1092 und S. 142
Melampyrum L. VI/1 72; VI/2 1362; VII 202
alpestre Pers. VI/1 80
angustissimum Beck VI/1 78
angustissimum Beck subsp. grandiflorum (A. Kern.) Ronniger VI/1 79
arvense L. VI/1 74
arvense L. subsp. arvense (L.) Ronniger VI/1 75
arvense L. subsp. pseudobarbatum (Schur) Ronniger VI/1 75
Melampyrum arvense L. subsp. Schinzii Ronniger VI/1 75
arvense L. subsp. Semleri Ronniger et Poeverlein VI/1 75
Austro-tiroliense Hut. et Porta VI/1 77
barbatum Waldst. et Kit. VI/1 75
barbatum Waldst. et Kit. subsp. barbatum (Waldst. et Kit.) Hay. VI/1 76
barbatum Waldst. et Kit. subsp. Tergestinum O. Dahl VI/1 76
Bohemicum Kern. VI/1 79
commutatum Tausch VI/1 80
cristatum L. VI/1 73
cristatum L. subsp. Ronnigeri (Poeverlein) Ronniger VI/1 74
cristatum L. subsp. solstitiale Ronniger VI/1 74
decrescens Čelak. f. VI/1 76
fallax Čelak. VI/1 79
hybridum Wolfner VI/1 75
laciniatum Koshinsky VI/1 80
nemorosum L. VI/1 76
nemorosum L. subsp. Moravicum (H. Br.) Ronniger VI/1 77
nemorosum L. subsp. Silesiacum Ronniger VI/1 76
pratense L. VI/1 79
pratense L. subsp. alpestre (Brügg.) Ronniger VI/1 80
pratense L. subsp. paradoxum (O. Dahl) Ronniger VI/1 80
pratense L. subsp. vulgatum (Pers.) Ronniger VI/1 80
saxosum Baumg. VI/1 81
silvaticum L. VI/1 80
silvaticum L. subsp. aestivale Ronniger VI/1 81
silvaticumL.subsp. intermedium Ronniger VI/1 81
silvaticum L. subsp. laricetorum (Kern.) Ronniger VI/1 81
stenophyllum Čelak. VI/1 79
subalpinum (Juratzka) Kern. VI/1 78
subalpinum (Juratzka) Kern. subsp. Hoermannianum (Maly) Ronniger VI/1 78
„ Velebiticum Borb. VI/1 77
Melandrium Roehl. III 299; VII 173
album (Mill.) Garcke III 301
dioecum Schinz et Thellung III 300
diurnum Fries III 300
dubium Hampe III 304
Elisabethae (Jan) Rohrb. III 304
Flos cuculi A. Br. III 298
macrocarpum Willk. III 299
noctiflorum (L.) Fries III 302
pratense Roehl. III 301
Preslii Nym. III 300
Melandrium rubrum Garcke III 300
silvestre Roehl. III 300
vespertinum Fries III 301
„ viscosum (L.) Čelak. III 302
Melanophylla Baker V/2 1539
Melanorrhoea usitata Wall. V/1 216
Melanosinapis Schimp. et Spenner IV/1 229
Melanthioideae II 199; VII 159
Melanthium album Thunb. II 193
Damascenum Med. III 474
„ nigrum Thunb. II 192
Melastomataceae V/2 794; VII 192
Melhania Forsk. VII 188
Melia Azedarach L. V/1 84, 85
Meliaceae V/1 84; VII 185
Melianthaceae V/1 309
Melianthoidea VII 159
Melianthus major L. V/1 309
Melicocca L. VII 187.
Melica L. I 289; VII 155
altissima L. I 292
Aschersonii M. Schulze I 292
ciliata L. I 289
glauca F. Schultz I 289
Lobelii Vill. I 290
montana Huds. I 291
nutans L. I 291
picta K. Koch I 292
Sibirica Lam. I 292
Transsilvanica Schur I 290; VII 154 Fig. 1182
uniflora Retz. I 290
„ viridiflora Czerniaëw I 292
Melilotus Hill IV/3 1236; VII 182
Abyssinica Baker IV/3 1238
agraria Desf. IV/3 1290
albus Med. IV/3 1245
altissimus Thuill. IV/3 1241
anomala Ledeb. IV/3 1290
arvensis Wallr. IV/3 1243
Brandisiana Wirtgen IV/3 1242
Bungeana Boiss. IV/3 1243
caeruleus Desr. IV/3 1233
collina Guss. IV/3 1238
compacta Salzm. IV/3 1238
dentatus (Waldst. et Kit.) IV/3 1239
diffusa Ser. IV/3 1239
elegans Salzm. IV/3 1238
expansa hort. IV/3 1243
gigantea Wender. IV/3 1241
gracilis DC. IV/3 1238
Haussknechtianus O. E. Schulz IV/3 1248
Indicus (L.) All. IV/3 1247
infestus Guss. IV/3 1239
Italicus (L.) Lam. IV/3 1238
Kochiana DC. IV/3 1243
Kochiana Willd. IV/3 1239
leiosperma Pomel IV/3 1238
leucantha Koch IV/3 1245
Lippoldiana Lowe IV/3 1238

Melilotus longifolia Rchb. IV/3 1238
lupulinus Trautv. IV/3 1255
macrorrhiza Pers. IV/3 1241
macrostochys Pomel IV/3 1239
Mauritanica Willd. IV/3 1238
melanosperma Bess. IV/3 1245
Messanensis All. IV/3 1238
microcarpa Balb. IV/3 1290
Neapolitana Ten. IV/3 1238
Nebrodunensis Jord. IV/3 1241
officinalis Aschers. et Graebn. IV/3 1243
officinalis (L.) Med. IV/3 1243
officinalis Willd. IV/3 1241
Olympica hort. IV/3 1239
ornithopodioides Desr. IV/3 1279
pallida Bess. IV/3 1243
perfrondosus Borb. IV/3 1241
Petitpierreana Willd. IV/3 1243
procumbens Bess. IV/3 1234
reticulatus Pomel IV/3 1248
rotundifolia Ten. IV/3 1238
rugosa Moench IV/3 1238
rugulosa Willd. IV/3 1245
Ruthenica Ser. IV/3 1238
Schoenheitianus O. E. Schulz IV/3 1248
Scythicus O. E. Schulz IV/3 1248
segetalis Ser. IV/3 1238
Siculus (Turra) Jackson IV/3 1239
sulcatus Desf. IV/3 1238
striatus Moench IV/3 1239
Tommasinii Jord. IV/3 1248
unidentata Wirtgen IV/3 1242
vulgaris Willd. IV/3 1245
„ Wolgicus Poiret IV/3 1238
Meliosma Bl. VII 187
Melissa L. V/4 2302; VII 201
Acinos Benth. V/4 2297
alba Waldst. et Kit. V/4 2287
alpina Benth. V/4 2299
altissima Sibth. et Sm. V/4 2304
Baumgarteni Simonkai V/4 2300
Clinopodium Benth. V/4 2295
coccinea Spruce V/4 2280
glandulosa Benth. V/4 2292
grandiflora L. V/4 2288
graveolens Host V/4 2302
Horminum Clairv. V/4 2472
maxima Ard. V/4 2272
Nepeta L. V/4 2292
officinalis L. V/4 2302
Pyrenaica Jacq. V/4 2472
Romana Mill. V/4 2304
sylvestris Lam. V/4 2469
„ vulgaris Treviranus V/4 2295
Melittis L. V/4 2468; VII 203
albida Gussone V/4 2471
Melittis grandiflora Sm. V/4 2469
Melissophyllum L. V/4 2469
„ nivea Kern. V/4 2471
Melocactus Link et Otto V/2 694
Melothria L. VI/1 316; VII 208
Memecyclon L. V/2 796
Menispermaceae IV/1 15; VII 175
Menispermum Tournef. IV/1 16; VII 175
Canadense L. IV/1 16
„ Dahuricum DC. IV/1 16
Mentha L. V/4 2235; VII 201
acuta Opiz V/4 2345
aquatica L. V/4 2344
arvensis L. V/4 2341
arvensis L. subsp. eu-arvensis Neuman V/4 2343
arvensis L. subsp. agrestis (Sole) Briq. V/4 2343
arvensis L. subsp. Austriaca (Jacq.) Briq. V/4 2342
arvensis L. subsp. haplocalyx Briq. V/4 2342
arvensis L. subsp. Lapponica (Wahlenb.) Neuman V/4 2342
arvensis L. subsp. parietariaefolia Briq. V/4 2342, 2343
borealis Michx. V/4 2342
Canadensis L. V/4 2342
candicans Crtz. V/4 2348
canescens Roth V/4 2353
capitata Opiz V/4 2345
Carinthiaca Host V/4 2356
cervina L. V/4 2338
cinerea Opiz V/4 2356
cordifolia Pers. V/4 2304
crispa auct. non L. V/4 2350, 2352, 2353
Dalmatica Tausch V/4 2356
denticulata Strail V/4 2345
dumetorum Schultes V/4 2354
foliosa Opiz V/4 2350
gentilis L. V/4 2356
Gibraltarica Willd. V/4 2340
gratissima Wigg. V/4 2353
Hercynica Roehling V/4 2352
hirsuta Hornem. V/4 2304
hirsuta L. V/4 2344
hortensis Tausch V/4 2356
Huguenini Désegl. et Dur. V/4 2350
intercedens Sagorski V/4 2354
intermedia Host V/4 2345
longifolia (L.) Huds. V/4 2348
longifolia (L.) Huds. subsp. grisella Briq. V/4 2350
Malinvaldi Camus V/4 2356
Maximilianea F Schultz V/4 2353
microphylla C. Koch V/4 2336, 2348
Muelleriana F. Schultz V/4 2356
nemorosa Willd. V/4 2353
Mentha nepetoides Lej. V/4 2354
Niliaca Jacq. V/4 2353
orientalis Briq. V/4 2348
palustris Sole V/4 2354
Patrini Lepechin V/4 2273
pedunculata Pers. V/4 2345
perilloides Lam. V/4 2272
piperita Huds. V/4 2354
pubescens Opiz V/4 2340
pulegioides Sieb. V/4 2340
Pulegium L. V/4 2339
punctata Moench V/4 2338
Requienii Benth. V/4 2336
rotundifolia (L.) Huds. V/4 2346
rubra Huds. V/4 2357
rugosa Lam. V/4 2346
sativa L. V/4 2355
semiintegra Opiz V/4 2350
silvatica Host V/4 2343
silvestris L. V/4 2348
spicata L. V/4 2351
suaveolens Ehrh. V/4 2353
suavis Gussone V/4 2353
tomentella Hoffgg. et Lk. V/4 2340
tomentella Kern. V/4 2340
tomentosa D'Urv. V/4 2348
tomentosa Sm. V/4 2340
umbrosa Opiz V/4 2345
undulata auct. non Willd. V/4 2353
undulata Willd. V/4 2350
velutina Lej. V/4 2353
verticillata L. V/4 2355
villosa Huds. V/4 2353
viridis L. V/4 2351
„ Weiheana Opiz V/4 2345
Mentzelia L. V/1 662
Menyanthes L. V/3 1957; VII 198
Nymphoides L. V/3 1961
„ trifoliata L. V/3 1957
Menyanthoideae V/3 1953; VII 198
Menziesa Sm. V/3 1610
Mercurialis L. V/1 126; VII 185
ambigua L. V/1 126
annua L. V/1 126
Ladanum Hartm. V/1 128
livida Portenschl. V/1 133
longifolia Host V/1 129
nemoralis Salisb. V/1 129
ovata Sternb. et Hoppe V/1 133
Paxii Graebn. V/1 134
perennis Halacsy V/1 133
perennis L. V/1 129
silvatica Hoppe V/1 129
„ tomentosa L. V/1 126
Merendera Bulbocodium Ram. VII 159
Meriandra dianthera (Roth) Briq. V/4 2506
Merophragma terrestre Dulac III 426

Mertensia denticulata (Roem. et Schult.) Don V/3 2128
maritima (L.) G. Don V/3 2128
Pallasii Don V/3 2128
paniculata (Ait.) Don V/3 2128
pulmonarioides Roth V/3 2128
Sibirica (L.) Don V/3 2128
„ Virginica (L.) DC. V/3 2128
Meruliaceae VII 142
Mesembrianthemaceae VII 172
Mesembrianthemum L. III 267
acinaciforme L. III 267; VII 38 Fig. 1063; I/CIV Fig. 165
cordifolium L. III 267
cristallinum L. edule L. III 267
Mesocarpaceae VII 137
Mesosphaerum R. Br. V/4 2267; VII 201
Mesotaeniaceae VII 137
Mespilus L. IV/2 739; VII 181
Amelanchier L. IV/2 756
apiifolia Marsh. IV/2 730
arborea Michx. IV/2 755
Aria Scop. IV/2 713
aucuparia All. IV/2 708
azarolus Willd. IV/2 730
Calpodendron Ehrh. IV/2 728
Canadensis L. IV/2 756
Chamaemespilus L. IV/2 721
coccinea Mill. IV/2 727
cordata Mill. IV/2 730
Cotoneaster L. IV/2 686
Crus galli Duroi IV/2 727
domestica All. IV/2 711
eriocarpa Waldst. et Kit. IV/2 685
Germanica L. IV/2 739
intermedia Poir. IV/2 733
lobata Poir. IV/2 743
monogyna All. IV/2 735
nebrodensis Bertol. IV/2 685
nigra Ehrh. IV/2 684
nigra Willd. IV/2 730
Orientalis Mill. IV/2 685
ovalifolia Hornem. IV/2 727
Oxyacantha Crtz. IV/2 732
punctata Loisel. IV/2 728
purpurea Poir. IV/2 729
Pyracantha L. IV/2 688
rotundifolia Moench IV/2 727
sanguinea Spach IV/2 729
Smithii DC. IV/2 743
succulenta Sweet IV/2 729
tomentosa Ait. IV/2 685
„ xanthocarpa L. IV/2 729
Mesua ferrea L. V/1 500
Metachlamydeae V/3 1567
Metaplexis R. Br. VII 199
Metaspermae VII 152
Metopium P. Br. VII 186
Metrosidéros (nicht Metrosíderos) Banks V/2 780
Metzgeria Raddi VII 144
Meum Mill. V/2 1300; VII 194
adonidifolium J. Gay V/2 1321
anethifolium Gaertn., Mey. et Scherb. V/2 1301
Athamanta Pers. V/2 1301
athamanticum Jacq. V/2 1300
athamanticum Salzer V/2 1319
capillaceum Dulac V/2 1301
Foeniculum Spr. V/2 1284
heterophyllum Moench V/2 1173
inundatum Spr. V/2 1152
Meum Karst. V/2 1300
Mutellina Gaertn. V/2 1318
nodiflorum Baill. V/2 1299
piperinum Colla V/2 1286
piperitum Schult. V/2 1286
Pyrenaeum J. Gay V/2 1317
Silaus Roth V/2 1296
„ venosum Baill. V/2 1305
Meziella Schindler V/2 895; VII 192
Mibora Adans. I 220; VII 154
minima Desv. I 220
„ verna Pal. I 220
Michauxia campanuloides L'Hérit. VI/1 329
Micrandra siphonioides Benth. V/1 119
Micrangelia Fourr. V/2 1331
„ Pyrenaea Fourr. V/2 1347
Micranthes hieraciifolia Haw. IV/2 622
„ nivalis Small IV/2 623
Microcachrys Hook. f. I 79; VII 150
Microcala Lk. et Hoffgg. V/3 1964; VII 198
filiformis (L.) Lk. V/3 1965
quadrangularis Griseb. V/3 1964
Microcycas DC. VII 150
Microloma R. Br. VII 154
Micromeles Decne. IV/2 664; VII 181
Micromeria Dalmatica Fenzl V/4 2293
Graeca Benth. V/4 2286
montana Rchb. V/4 2284
Kerneri Murb. V/4 2287
pygmaea Rchb. V/4 2285
„ variegata Rchb. V/4 2285
Micropodium (DC. Rchb. IV/1 229
Micropus L. VI/1 449; VII 209
bombycinus Lag. VI/1 449
erectus L. VI/1 449
„ supinus L. VI/1 449
Microspermae II 395; VII 164
Microstylis Nutt. VII 165
Microstylis diphyllos Lindl. II 393
„ monophyllos Lindl. II 392
Microtoena cymosa Prain V/4 2273
Mikania amara Willd. VI/1 408
cordifolia Willd. VI/1 408
scandens Lem. VI/2 728
scandens (L.) Willd. VI/1 408
Miliarium effusum Moench I 208
Milium L. I 208; VII 154
arundinaceum Sibth. et Sm. I 207
effusum L. I 208
lendigerum L. I 222
multiflorum Cav. I 207
paradoxum Scop. I 207
„ vernale Bieb. I 208
Miltonia Lindl. II 324
Mimosa elegans hort. IV/3 1123
„ pudica L. IV/3 1126
Mimosoideae IV/3 1123; VII 181
Mimulus L. VI/1 36; VI/2 1360; VII 204 und 74 Fig. 1109f.
guttatus DC. VI/1 37; VI/2 1360
Langsdorfii Donn. VI/1 37
luteus auctorum VI/1 37
„ moschatus Dougl. VI/1 37
Mimusops Balata Gaertn. V/3 1896
Balata L. V/3 1897
Djave Engler V/3 1896
elata Fr. All. V/3 1897
Elengi L. V/3 1896
Henriquesii Engler et Warb. V/3 1896
Mina lobata Llavé et Lex. V/3 2075; VII 199
Minuartia Loefling III 389; VII 173
aretioides (Somerauer) Schinz et Thellung III 391
Austriaca (Jacq.) Hay. III 397
biflora Schinz et Thell. III 399
flaccida Schinz et Thellung III 403
laricifolia Schinz et Thellung III 395
liniflora Schinz et Thellung III 396
recurva Schinz et Keller III 402
rupestris Schinz et Thellung III 392
sedoides Hiern III 392
setacea Hay. III 394
stricta Hiern III 399
tenuifolia Hiern III 398
verna (L.) Hiern III 400
viscosa Schinz et Thellung III 398
Mirabilis dichotoma L. III 266
Jalapa L. III 266
longiflora L. III 266
„ nyctaginea Mac Mill. III 266
Misandra Commers. VII 192
Miscanthus Andersson I 186
Miscopetalum cernuum S. F. Gray IV/2 617
Mitella diphylla L. IV/2 567
Japonica Miq. IV/2 567
„ pentandra Hook. IV/2 567
Mniaceae VII 146

Modiola Caroliniana (L.) Don V/1 457
Moehringia L. III 410; VII 173
Bavarica Kern. III 414
ciliata (Scop.) Dalla Torre III 416
Coronensis Behrendsen III 418
diversifolia Doll. III 412
glauca Leyb. III 415
glaucovirens Bert. III 415
heterophylla Doll. III 412
hybrida Kern. III 417
Malyi Hay. III 415
muscosa L. III 416
pendula (Waldst. et Kit.) Fenzl III 411
polyganoides Mert. et Koch III 416
Ponae Fenzl III 414
trinervia (L.) Clairv. III 411
„ villosa Fenzl III 413
Moenchia Ehrh. III 378; VII 173
cerastoides Spr. III 364
erecta (L.) Fl. Wett. III 378
glauca Pers. III 378
incana Roth IV/1 458
Mantica (L.) Bartling III 379
„ quaternella Ehrh. III 378
Mohria Sw. VII 148
Moldavica elata Moench V/4 2368
„ punctata Moench V/4 2361
Molinia Schrank I 276; VII 155
altissima Lk. I 277
aquatica Wib. I 288
arundinacea Schrank I 277
caerulea Moench I 276
depauperata Lindl. I 277
fluitans Hartm. I 319
maxima Hartm. I 321
obtusa Peterm. I 277
plicata Hartm. I 319
remota Hartm. I 322
serotina Mert. et Koch I 278
varia Schrank I 276
„ variabilis Wib. I 276
Mollisiaceae VII 141
Mollugo L. VII 172
Molopospermum Koch V/2 1046; VII 193
cicutarium DC. V/2 1046
cicutifolium Bubani V/2 1046
Peloponnesiacum (L.) Koch V/2 1046
Molospermum Kittel V/2 1046
Molpadia suaveolens Cass. VI/1 492
Moltkia Lehm. VII 200
graminifolia Nym. V/3 2153
suffruticosa (L.) Benth. et Hook. V/3 2153
Molucca laevis Moench V/4 2440
„ spinosa Moench V/4 2440
Molucella L. VII 203
Moluccella levis L. V/4 2440
spinosa L. V/4 2440
Momordica L. VII 208
Balsamina L. VI/1 315, 316; VII 203
„ Charantia L. VI/1 315
Monandrae VII 164
Monanthes polyphylla Haw. IV/2 514
Monarda L. V/4 2506; VII 203
affinis Lk. V/4 2507
allophylla Michx. V/4 2507
clinopodia L. V/4 2507
coccinea Michx. V/4 2507
didyma L. V/4 2507
fistulosa L. V/4 2507
fistulosa Sims V/4 2507
Kalmiana Pursh V/4 2507
longifolia Lam. V/4 2508
Oswegoënsis Bart. V/4 2507
punctata L. V/4 2507
purpurea Lam. V/4 2507
rugosa Ait. V/4 2507
Russelliana Nutt. V/4 2507
undulata Tausch V/4 2507
„ varians Bart. V/4 2507
Moneses reticulata Nutt. V/3 1589
„ uniflora Gray V/3 1589
Monimiaceae IV/1 16; VII 176
Monnieria trifoliata L. V/1 52
Monnina Ruiz et Pav. V/1 87
Monoblepharidaceae VII 140
Monochaetum Naud. V/2 795
alpestre Naud. V/2 795
„ hirtum Triana V/2 795
Monocharia vaginalis Presl II 143
Monochilon cordifolius Dul. V/4 2534
Monocotyledones I 109; VII 152
Monodora Myristica Dun. IV/1 14
Monolepis trifida Schrad. III 260
Monopetalae V/3 1567; VII 195
Monophyllaea glauca Clarke VI/1 177
„ Horsfieldii R. Br. VI/1 177
Monopsis Salisb. VII 209
Monostachyae VII 156
Monotropa L. V/3 1596; VII 105 Fig. 1136
glabra Bernh. V/3 1598
hypophagos Dum. V/3 1598
Hypophegea Wallr. V/3 1598
Hypopitys L. V/3 1597
„ multiflora K. Fritsch V/3 1598
Monotropaceae V/3 1568
Monotropis Schwein. V/3 1569; VII 195
Monsonia biflora DC. IV/3 1660
Monstera deliciosa Liebm. I/XCVII Fig. 149b; II 131
Monsteroideae VII 157
Montanoa grandiflora DC. VI/1 528
„ tomentosa Slav. et Lex. VI/1 528
Montbretia DC. II 305; VII 164 Fig. 1198
Montia L. III 270; VII 172
arvensis Wallr. III 270
fontana L. partim III 270
Montia minor Gmel. III 270
rivularis Gmel. III 270
terrestris Dum. III 270
„ verna Neck. III 270
Moraceae III 123; VII 168
Moraea irioides L. II 306
Moricandia arvensis DC. IV/1 476
sonchifolia J. D. Hook. IV/1 476
Morina longifolia Wall. VI/1 280
Persica L. VI/1 280
Moringa aptera Gaertn. IV/1 491; V/2 772
Arabica Pers. IV/1 491
oleifera Lam. IV/1 491
„ pterygospermaGaertn. IV/1 491
Moringaceae IV/1 491; VII 177
Moroideae III 123
Moronoboideae V/1 502; VII 189
Morus L. III 127 VII 168
alba L. III 128
nigra L. III 129
rubra L. III 128
Moscharia pinnatifida R. et P VI/2 992
Moschosma Rchb. V 4 2270; VII 201
Moutabea Aubl. V/1 87
Mucuna pruriens DC. IV/3 1626
„ urens DC. IV/3 1626
Mucoraceae VII 140
Muehlenbeckia platyclada Meissn. III 166; I/LXXVII Fig. 103
Muehlenbergia Mexicana (L.) Trin. VII 154
Mulgedium Cass. VI/2 1096; VII 212
albanum DC. VI/2 1097
alpinum Less. VI/2 1099
integrifolium Cass. VI/2 1125
macrophyllum DC. VI/2 1097
Plumieri DC. VI/2 1098
runcinatum Cass. VI/2 1130
„ Tataricum DC. VI/2 1130
Muraltia Heisteria DC. V/1 87
Murraya exotica L. V/1 54
„ paniculata Jacq. V/1 54
Musa L. II 320; I/LXCVII Fig. 320; VII 163
Cavendishii Hook. II 320
ensete J. F. Gmel. II 320
„ paradisiaca L. II 320
Musaceae II 320; VII 163
Musanga R. Br. VII 169
Muscari L. II 256; VII 162
botryoides Mill. II 258
comosum Mill. II 259
neglectum Guss. II 258
racemosum Lam. et DC. II 257; V/1 1934
tenuiflorum Tausch II 259
Muscaria stenopetala Haw. IV/2 602
Muscarinia rotundifolia Small V/1 360

Musci VII 145
„ frondosi VII 145
Muscineae VII 144
Mussaenda L. VII 207
Mutarda Bernb. IV/1 229
„ nigra Bernh. IV/1 236
Mutisieae VI/2 992; VII 212
Myagrum L. IV/1 186; VII 177
aquaticum Lam. IV/1 310
Austriacum Willd. IV/1 308
bursifolium Thuill. IV/1 189
Cakile Crtz. IV/1 183
clavatum Lam. IV/1 473
Coronopus Crtz. IV/1 93
Erucago Crtz. IV/1 473
foetidum Bergeret IV/1 371
irregulare Asso IV/1 189
monospermum Forsk. IV/1 290
Orientale Crtz. IV/1 474
Orientale L. IV/1 294
palustre Lam. IV/1 316
perenne L. IV/1 288
perfoliatum L. IV/1 186
prostratum Bergeret IV/1 311
rugosum L. IV/1 290
sativum L. IV/1 368
saxatile L. IV/1 143
Syriacum Crtz. IV/1 463
taraxacifolium Lam. IV/1 474
„ utriculatum Bergeret IV/1 460
Mycelis Cass. VI/2 1110; VII 212
angulosa Cass. VI/2 1111
muralis (L.) Dumortier (nicht Rchb.) VI/2 1111
Mycetozoa VII 136
Myconia Neck. VI/2 592
Chrysanthemum Schultz-Bip. VI/2 593
Mycosphaerellaceae VII 141
Mylinum Gaud. V/2 1310
Carvifolia Gaud. V/2 1311
„ Pyrenaeum Bubani V/2 1347
Myogalum Boucheanum Kth. II 254
„ nutans Lk. II 253
Myoporaceae VI/1 178; VII 205
Myosotis L. V/3 2159; VII 200
alpestris Schmidt V/3 2168
amoena (Rupr.) Boiss. V/3 2160
aprica Opiz V/3 2171
Apula L. V/3 2153
arenaria Schrad. V/3 2172
arvensis (L.) Hill V/3 2170
arvensis Lk. V/3 2171
arvensis Rchb. V/3 2172
Azorica H. C. Watson V/3 2160
basiantha Gmel. V/3 2172
-Bastarde V/3 2176
caespititia Kern. V/3 2164
caespitosa K. F. Schultz V/3 2164
Carnica Opiz V/3 2168
cognata Schott V/3 2169
collina Hoffm. V/3 2171
deflexa Wahlenb. V/3 2140
Myosotis filiformis Schleich. V/3 2171
grandiflora B. et K. V/3 2164
heteropoda Trautv. V/3 2170
hispida Schlecht. V/3 2171
intermedia Lk. V/3 2170
Lappula L. V/3 2139
laxa Lehm. V/3 2165
lingulata Lehm. V/3 2164
lithospermifolia Tommasini V/3 2168
lutea (Cav.) Pers. V/3 2173
micrantha Pall. V/3 2172
minutiflora Boiss. et Reut. V/3 2173
montana Bess. V/3 2166
multicaulis Gmel. V/3 2172
nana All. V/3 2134
nana Sm. V/3 2160
nemorosa Arv.-Touv. V/3 2169
obtusa Waldst. et Kit. V/3 2198
odorata Poir. V/3 2168
Olympica Boiss. V/3 2160
palustris Roth V/3 2161, 2163
pauciflora Vitm. V/3 2134
perennis Moench V/3 2161
pseudosilvatica Schur V/3 2170
pygmaea Bert. V/3 2171
Pyrenaica Pourr. V/3 2166
Rehsteineri Wartm. V/3 2164
rupicola Sm. V/3 2168
scorpioides L. V/3 2161
silvatica (Ehrh.) Hoffm. V/3 2165
sparsiflora Mikan V/3 2175
squarrosa Bieb. V/3 2138
squarrosa Retz. V/3 2140
staminea Lehm. V/3 2160
stricta Lk. V/3 2172
strigulosa Rchb. V/3 2163
suaveolens Waldst. et Kit. V/3 2168
Terglouensis Hacq. V/3 2135
uliginosa Schrad. V/3 2164
umbrata Mert. et Koch V/3 2170
variabilis Angelis V/3 2169
verna Opiz V/3 2172
„ versicolor Sm. V/3 2173
Myosoton aquaticum Moench III 348
Myosurus L. III 540; VII 175
„ minimus L. III 540
Myrceugenia Berg V/2 777
Myrcia DC. V/2 777
Myriactis Nepalensis Less. VI/1 448
Myriangales VII 140
Myrica L. III 10, 11; VII 167
cerifera L. III 11
Faya Ait. III 11
Gale L. III 11
„ palustris Lam. III 11
Myricaceae III 10; VII 167
Myricales VII 167
Myricaria Desv. V/1 548; VII 189
Dahurica Ehrenb. V/1 548
Myricaria Germanica (L.) Desv. V/1 548
„ squamosa Desv. V/1 550
Myriophyllum L. V/2 896; VII 192
alterniflorum DC. V/2 903
alternifolium Macoun V/2 903
Brasiliense Cambess. V/2 898
limosum Hect. V/2 899
montanum Martrin-Donos V/2 903
pectinatum DC. V/2 899
proserpinacoides Gill. V/2 898
spicatum L. V/2 901
„ verticillatum L. V/2 899
Myristica fragrans Houttuyn I/CLV Fig. 296; IV/1 15
„ speciosa Warb. IV/1 15
Myristicaceae IV/1 15; VII 175
Myrmecodia Jack. VII 207
Myrobalanus Bellerica Gaertn. V/2 771
Chebula Gaertn. V/2 771
„ citrina Gaertn. V/2 771
Myrothamnaceae IV/2 654
Myroxylon balsamum (L.) Harms IV/3 1144
„ peruiferum L. f. IV/3 1144
Myrrhinium Schott V/2 776
Myrrhis Mill. V/2 1041; VII 193
alpina Spr. V/2 1020
aromatica Spr. V/2 1002
aurea All. V/2 1003
aurea Czetz V/2 1005
australis All. V/2 1035
bulbosa Spr. V/2 998
Bunium Spr. V/2 1195
Canadensis (Morison) Gaertn. V/2 1169
chaerophyllaea Lam. V/2 1030
Cicutaria Spr. V/2 1008
cynapioides Guss. V/2 993
hirsuta All. V/2 1006
maculata Spr. V/2 1005
Magellensis Bert. V/2 1014
odorata Baumg. V/2 1003, 1005
odorata (L.) Scop. V/2 1041
palustris Delarbre V/2 1006
Pecten-Veneris All. V/2 1037
silvestris Spr. V/2 1017
sulcata Lag. V/2 1045
temula All. V/2 996
ternata Moench V/2 1169
torquata Schultes V/2 1020
„ Villarsii Bert. V/2 1012
Myrrhodes O. Kuntze V/2 1015
alpestre O. Kuntze V/2 1023
Anthriscus O. Kuntze V/2 1030
Cerefolium O. Kuntze V/2 1027
fumarioides O. Kuntze V/2 1026
nemorosum O. Kuntze V/2 1025
„ silvestre O. Kuntze V/2 1017
Myrsinaceae V/3 1714; VII 196
Myrsine Africana L. V/3 1714

Myrsiphyllum asparagoides Willd. II 261
Myrtaceae V/2 773; VII 191
Myrtales V/2 697; VII 191
Myrteola Berg V/2 775
Myrtiflorae V/2 697; VII 191
Myrtillus exigua Bubani V/3 1669
grandis Bubani V/3 1681
niger Gilib. V/3 1674
„ sylvatica Bubani V/3 1674
Myrtoineae V/2 698; VII 191
Myrtus L. V/2 789; VII 192
bullata Banks. V/2 790
communis L. V/2 790
Luma Barn. V/2 789
Meli Phil. V/2 789
Pseudocaryophyllus Gomez V/2 790
Myscolus microcephalus Cass. VI/2 1006
Myxobacteriaceae VII 135
Myxogasteres VII 136
Myxomycetes VII 136
Myxophyceae VII 136
Myxothallophyta VII 136
Myzodendraceae III 160; VII 169

N.

Naegelia Reg. VI/1 177; VII 205
„ amabilis Dec. VI/1 177
Najadaceae I 144; VII 152
Najas flexilis (Willd.) Rostkovius et Schmidt I 145
graminea Del. I 144
graminea Rostkovius I 145
maior All. I 145
marina L. I 145
minor All. I 146
monosperma Willd. I 145
subulata Thuill. I 146
„ tenuissima A. Br. I 144
Nananthea perpusilla (Lois.) DC. VI/2 674
Nandina domestica Thunb. IV/1 5
Napaea dioeca L. V/1 456
Napoleona Pal. V/2 767
Napus Schimp. et Spenn. IV/1 229
Agriasinapis Schimp. et Spenn. IV/1 263
oleifera Schimp. et Spenn. IV/1 254
Narcissus L. II 312; VII 162
angustifolius Salisb. II 316
aureus Lois. II 313
biflorus Curt. II 317
Hispanicus Gouan II 314
incomparabilis Mill. II 314
jonquilla L. II 312
Italicus Ker-Gawler II 313
iuncifolius Lagasca II 312
longipetalus Schleich. II 316
majalis Curt. II 315
moschatus L. II 314
odorus L. II 313
Narcissus poëticus L. II 315
Pseudonarcissus L. II 313
pumilus Red. II 312
radiiflorus Salisb. II 316
tazetta L. II 313
„ triander L. II 313
Nardosmia denticulata Cass. VI/2 680
frigida Hook. VI/2 681
„ levigata DC. VI/2 681
Nardostachys DC. VII 208
Nardurus Lachenalii Godr. I 329; VII 155
tenellus Duv.-Jouve I 329
„ tenellus Rchb. I 330
Nardus L. I 372; VII 155
„ stricta L. I 372; VII 82 Fig. 1116
Narketis Rafin. V/3 1976
Narthecium Huds. II 191; VII 159
anthericoides Hoppe II 191
boreale Wahlenb. II 190
flavescens Wahlenb. II 189
„ ossifragum Huds. II 191
Narthex Falconer V/2 1354
Nasturtiolum montanum S. F. Gray IV/1 360
petraeum (L.) Thellung IV/1 360
Nasturtium R. Br. IV/1 307, 319; VII 177
Alexandrinum Crtz. IV/1 87
alpinum Crtz. IV/1 358
altissimum E. H. L. Krause IV/1 176
amphibium R. Br. IV/1 310
anceps Grabowski IV/1 316
anceps Rchb. IV/1 311
Anglicum Krause IV/1 139
arcuatum Krause IV/1 302
Armoracia Fries IV/1 305
armoracioides Tausch IV/1 318
Austriacum Cr. IV/1 308
barbaraeoides Tausch IV/1 318
Bursa pastoris Roth IV/1 364
camelinicarpum G. Froel. IV/1 318
cochlearia Krause IV/1 136
crassifolium O. Kuntze IV/1 89
Danicum Krause IV/1 141
Draba Crtz. IV/1 78
fontanum Aschers. IV/1 319
heterophyllum O. Kuntze IV/1 80
latifolium Crtz. IV/1 89
Lippicense DC. IV/1 315
lyratum Krause IV/1 301
medium Krause IV/1 303
officinale R. Br. IV/1 319
palustre Crtz. IV/1 70
palustre DC. IV/1 316
perfoliatum L. IV/1 87
petraeum Crtz. IV/1 360
praecox Krause IV/1 304
Pyrenaicum R. Br. IV/1 314
rivulare Rchb. IV/1 313
Nasturtium ruderale Scop. IV/1 83
sativum Med. IV/1 81
saxatile Crtz. IV/1 143
silvestre R. Br. IV/1 312
Sisymbrium E. H. L. Krause IV/1 164
verrucarium Garsault IV/1 93
„ Wulfenianum Host IV/1 315
Naumburgia guttata Moench V/3 1855
„ thyrsiflora Duby V/3 1855
Navarettia pubescens (Benth.) Hook. et Arnold V/3 2114
„ pusilla Mich. V/3 2114
Nechamandra Planch. I 161
Neckeraceae VII 146
Nectandra Roland. VII 176
Neea theifera Oerstedt III 266
Neesia Bl. VII 188
Negundium fraxinifolium Rafin. V/1
Negundo aceroides Moench V/1 293
Negundo fraxinifolium Nutt. V/1 293
lobatum Raf. V/1 293
Negundo V/1 293
„ trifoliatum Raf. V/1 293
Neillia Don IV/2 663; VII 180
opulifolia Benth. et Hook. IV/2 680
„ Virginianum Med. V/1 293
Nelumbium speciosum Willd. III 438
Nelumbo lutea Pers. III 438
„ nucifera Gaertn. III 438
Nemalionales VII 139
Nematostylis Nutt. VII 163
Nemesia strumosa Benth. VI/1 6
Nemocharis radicans Beurl. II 32
„ silvatica Beurl. II 31
Nemopanthes mucronatus (L.) Trel. V/1 234; VII 186
Nemophila Nutt. VII 200
Nemophila aurita Lindl. V/3 2122
maculata Benth. V/3 2122
„ Menziesii Hook. et Arn. V/3 2122
Nenuphar luteum Hayne III 445
Neoceis Cass. VI/2 701
Neogaya Meissner V/2 1314
„ simplex Meissner V/2 1323
Neomammilaria Britton et Rose V/2 695
Neottia Ludwig II 388; VII 165
abortiva Clairv. II 382
aestivalis DC. II 385
autumnalis Ten. II 385
cordata Rich. II 387
latifolia Rich. II 386
Nidus avis Rich. II 388
ovata Bluff et Fingerh. II 386
repens Sw. II 390
„ vulgaris Kolbenheyer II 388
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter VII 164
Neottidium Nidus avis Schlecht. I 388
Nepenthaceae IV/2 510; VII 179
Nepenthes L. IV/2 510; VII 179

Nepeta L. V/4 2367; VII 201
alba Desf. V/4 2371
anaglecho Krause V/4 2374
Austriaca Host V/4 2367
Cataria L. V/4 2369
citriodora Beck V/4 2370
colorata Willd. V/4 2368
Croatica Spr. V/4 2287
cyanea Steven V/4 2368
cyanotricha Tausch V/4 2368
Glechoma Benth. V/4 2373
grandiflora Boiss. V/4 2368
graveolens Vill. V/4 2367
incana Bieb. V/4 2368
lamiifolia Hoffm. V/4 2368
lanceolata Lam. V/4 2367
longiflora O. A. Mey. V/4 2368
macrantha Fisch. V/4 2367
macrosiphon Boiss. V/4 2368
melissaefolia Pers. V/4 2368
minor Mill. V/4 2369
Mussini Henkel v. Donnersm. V/4 2368
nepetella L. V/4 2367
nuda L. V/4 2371
paniculata Crtz. V/4 2372
paniculata Mill. V/4 2367
Pannonica Jacq. V/4 2371/2
parviflora Bieb. V/4 2367
pumila Spr. V/4 2287
salviaefolia Pers. V/4 2368
Sibirica (L.) Aschers. V/4 2368
Sibirica Bieb. V/4 2367
Ucranica L. V/4 2367
„ vulgaris Lam. V/4 2369
Nephrodium Filix mas Rich. I 18
„ Thelypteris Desv. I 17
Nephrolepis Schott VII 149
Nophrophyllidium Gilg V/3 1953; VII 198
Neptunia oleracea Loud. IV/3 1127
Nerine undulata Herb. II 319
Nerium L. V.3 2056; VII 199
Indicum Mill. V/3 2056
odoratum Lam. V/3 2056
odorum Sol. V/3 2056
Oleander L. V/3 2056
„ tinctorium Roxb. V/3 2056
Nertera Banks et Sol. VI/1 197
Nesaea Comm. V/2 741
Neslia Desv. IV/1 371; VII 178
„ paniculata Desv. IV/1 371
Neumayera Austriaca Rchb. III 397
Neuradoideae IV/2 667; VII 181
Neuroloma speciosum Steud. IV/1 476
Neuwiedia Bl. VII 164
Neviusia Alabamensis A. Gray IV/2 665
Nicandra Adans. V/4 2560; VII 203
physaloides (L.) Gaertn. V/4 2560
physaloides viridis Bitter V/4 2561
Nicandra physaloides violacea Bitter V/4 2561
„ violacea hort. Berol. V/2 2561
Nicotiana L. V/4 2616; VII 203
acuminata (Grah.) Hook. V/4 2616
affinis Moore V/4 2616
alata Lk. et Otto V/4 2616
Collae Phil. V/4 2617
colossea E. André V/4 2617
glauca Grah. V/4 2616
Langsdorffii Weinm. V/4 2616
latissima Mill. V/4 2624
longiflora Cav. V/4 2616
macrophylla Spr. V/4 2624
micrantha Harv. V/4 2617
oulophylla Dun. V/4 2617
rustica L. V/4 2624
Sanderae hort. Sand. V/4 2617
suaveolens Lehm. V/4 2617
Tabacum L. V/4 2622
tomentosa Ruiz et Pav. V/4 2617
Nidulariaceae VII 143
Nierembergia anomala Dun. V/4 2617
frutescens Durieu V/4 2555
„ gracilis Hook. V/4 2555
Nigella L. III 474; VII 174
amoena Salisb. III 475
arvensis L. III 475
caerulea Lam. III 474
Damascena L. III 474
glauca Schkuhr III 475
Hispanica L. III 475
Indica Roxb. III 475
latifolia Mill. III 475
multifida Gatereau III 474
sativa L. III 475
tenuiflora Gilib. III 475
truncata Viv. III 475
„ unguiculata Stok. III 475
Nigera Bubani V/2 1061
„ daucoides Bubani V/2 1062
Nigeria parviflora Bubani V/2 1050
Nigritella Rich. II 364; VII 164
angustifolia Rich. II 365
Bornmuelleri Dalla Torre et Sarnth. II 367
fragrans Fleischm. II 366
Heufleri Kern. II 367
micrantha Kern. II 367
nigra (L.) Rchb. II 365
rubra (Wettst.) Richter II 366
suaveolens Doll. II 366
suaveolens Koch II 367
Wettsteiniana Ascherson et Graebn. II 367
Niphogeton Schlecht. V/2 1139
Nipoideae VII 157
Nissolia uniflora Moench IV/3 1608
Nitella VII 138
Nitraria L. V/1 41; VII 184
Nivaria aestivalis Moench II 311
Nivaria monadelpha Med. II 311
Noccaea alpina Rchb. IV/1 358
brevicaulis Rchb. IV/1 359
procumbens Rchb. IV/1 361
„ rotundifolia Moench IV/1 132
Nolana prostrata L. V/4 2625
Nolanaceae V/4 2625; VII 203
Nolina recurvata Hemsl. II 280
Nomochlora Pal. VII 156
Nonnea (Nonea!) Med. V/3 2205; VII 201
atra Griseb. V/3 2206
auriculata Boiss. V/3 2216
erecta Bernh. V/3 2206
lutea (Desr.) Rchb. V/3 2208
nigrescens DC. V/3 2205
pulla (L.) DC. V/3 2206
rosea (Bieb.) Fisch. et Mey. V/3 2205
setosa Roem. et Schult. V/3 2208
Taurica Ledeb. V/3 2206
„ versicolor Sweet V/3 2205
Nopalea Salm-Dyck V/2 688
cochenillifera (L.) Salm-Dyck V/2 684
Norantea Guyanensis Aubl. V/1 494
Norta altissima Britton IV/1 176
Irio Britton IV/1 169
„ strictissima Schur IV/1 165
Nostoc punctiforme V/2 896
Nostocaceae VII 127, 136
Nothofagus Blume III 95; VII 168
Notholcus Nash VII 154
Notholaena R. Br. I 39; VII 149
„ Marantae (L.) R. Br. I 39
Nothoscordum Kunth VII 159
Nothosmyrnium Miq. V/2 1077
Nothothlaspi Hook. f. VII 177
Nummularia centimorbia Fourr. V/3 1852
officinalis Erndt V/3 1852
prostrata Opiz V/3 1852
repens Gilib. V/3 1852
„ silvatica S. F. Gray V/3 1854
Nuphar Sm. III 444; VII 174
advena Ait. III 444
affine Harz III 446
centricavatum Schuster III 448
intermedium Ledeb. III 448
intermedium Rehsteiner III 448
Juranum Magnin III 448
luteum Sibth. et Sm. III 445
minimum Sm. III 444, 447
polysepalum Engelm. III 444
pumilum (Timm) DC. III 447; VII 174
Spennerianum Gaud. III 447, 448
Nuttalia cerasiformis Torr. et Gray IV/2 667
Nyctaginaceae III 266; VII 172
Nyctanthes Sambac L. V/3 1906
Nymphaea L. III 440; VII 174
affinis Hay. III 446

Nymphaea alba L. III 441; VII 62 Fig. 1097
biradiata Somerauer III 443
borealis Camus III 444
candida Presl. III 443; VII 110 Fig. 1144
Capensis Thunb. III 440
Daubenyana hort. angl. III 440
dentata Planch. III 440
Fennica Mela III 440
gigantea Hook. III 440
intermedia Schuster III 448
Lotus L. III 440
lutea L. III 445
Mexicana Zucc. III 440
minima Willd. III 447
odorata Ait. III 440
pauciradiata Bunge III 443
pumila G. F. Hoffm. III 447
pygmaea Ait. III 440
rubra Roxb. III 440
stellata Willd. III 440
umbilicalis Salisb. III 445
tetragona Georgi III 440
thermalis DC. III 440
tuberosa Paine III 440
vivipara Lehm. III 440
„ Zanzibariensis Casp. III 440
Nymphaeaceae III 438; VII 173
Nymphozanthus C. Rich. VII 174
Nymphoides Hill. V/3 196; VII 198
flava Hill V/3 1961
orbiculata Gilib. VII 198
peltata (Gmel.) O. Kuntze V/3 1961
Nyssa L. V/2 770; VII 192
capitata Walter V/2 770
denticulata Ait. V/2 770
multiflora Wangenh. V/2 770
Ogeche Marsh. V/2 770
silvatica Marsh. V/2 770
„ uniflora Wangenh. V/2 770
Nyssaceae V/2 769; VII 192

O.

Obaejaca silvatica Cass. VI/2 792
„ viscosa Cass. VI/2 790
Obione Gaertn. III 235; VII 171
pedunculata Moq. III 235
„ portulacoides Moq. III 235
Ochna atropurpurea DC. V/1 494
Ochnaceae V/1 494; VII 189
Ochrocarpus Thouars V/1 500
Ochtocosmus Benth. VII 184
Ochroma lagopus Sw. V/1 489
Ochrus inconspicuus A. Br. IV/3 1566
pallida Pers. IV/3 1565
„ uniflorus Moench IV/3 1565
Ocimoideae V/4 2267; VII 201
Ocimum L. V/4 2267; VII 201
asperum Roth V/4 2271
Barrelieri Roth V/4 2269
Basilicum L. V/4 2267
Ocimum Basilicum violaceum Alef. V/4 2269
caryophyllatum Roxb. V/4 2269
cinereum Br. V/4 2271
frutescens L. V/4 2272
gratissimum L. V/4 2270
incanescens Martius V/4 2270
integerrimum Willd. V/4 2269
medium Mill. V/4 2269
nigrum Thouin V/4 2269
saccharoides Willd. V/4 2271
sanctum L. V/4 2270
Ocotea Aubl. VII 176
Ocoteoxylon Tigurinum Schuster IV/1 11
Octoknemataceae VII 170
Octomeles Miq. V/1 663
Ocymum scutellarioides L. V/4 2271
Odontea Fourr. V/2 1094
Odontites Gilib. VI/1 100; VII 204
Spreng. V/2 1094
glauca Spr. V/2 1103
lutea (L.) Rchb. VI/1 101
procumbens Spr. V/2 1120
rubra Gilib. VI/1 101
semicomposita Spr. V/2 1103
serotina Rchb. VI/1 101
serotina Rchb. subsp. litoralis (Fries) Hay. VI/1 102
serotina Rchb. subsp. serotina (Lam.) Hay. VI/1 102
serotina Rchb. subsp. verna (Bell.) Hay. VI/1 102
tenuissima Spr. V/2 1119
verna Garcke VI/1 102
„ viscosa Rchb. VI/1 101
Odontospermum aquaticum (Coss. et Dur.) O. Hoffmann VI/1 495
Oedogoniaceae VII 138
Oenanthe L. V/2 1249; VII 194
anomala Cosson et Durieu V/2 1253
approximata Mérat V/2 1265
aquatica (L.) Poir. V/2 1265
Biebersteinii Simon V/2 1258
biloba Dul. V/2 1255
Californica S. Wats. V/2 1251
chaerophylloides Pourr. V/2 1252
comoides (Nolte) Lange V/2 1269
crocata L. V/2 1251
diversifolia Dul. V/2 1252
filipenduloides Thuill. V/2 1260
fistulifolia Stok. V/2 1255
fistulosa Asso V/2 1260
fistulosa L. V/2 1255
fluviatilis auct. Belg. V/2 1269
fluviatilis (Bab.) Coleman V/2 1270
gigantea Zumagl. V/2 1265
globulosa Pall. V/2 1252
globulosa Petter V/2 1258
gymnorrhiza Brignoli V/2 1262
Oenanthe involucrata Cav. V/2 1251
Lachenalii Bert. V/2 1258
Lachenalii C. C. Gmel. V/2 1262
lanceolata Poir. V/2 1255
luxurians auct. Belg. V/2 1269
media Bor. V/2 1261
media Griseb. V/2 1259
Megapolitana Willd. V/2 1262
meifolia Schlosser et Vukot. V/2 1255
Michelfeldensis Lachenal V/2 1262
patens Moench V/2 1260
peucedanifolia Baumg. V/2 1258
peucedanifolia Cogn. V/2 1269
peucedanifolia Poll. V/2 1260
peucedanoides Roth V/2 1260
Phellandrium Lam. V/2 1265
pimpinelloides L. V/2 1251
pimpinelloides Poir. V/2 1253
Pollichii C. C. Gmel. V/2 1260
prolifera Host V/2 1258
Rhenana DC. V/2 1262
sarmentosa Nutt. V/2 1251
silaifolia Bieb. V/2 1258
stenoloba Schur V/2 1261
Tabernaemontani Glück V/2 1257
Tabernaemontani C. C. Gmel. V/2 1257
tenuifolia Froel. V/2 1258
„ virgata Spr. V/2 1253
Oenosciadium Pomel V/2 1249
Oenothera L. V/2 857; VII 192
acaulis Cav. V/2 865
albicaulis Nutt. V/2 865
amoena Lehm. V/2 865
anisoloba Sw. V/2 865
Argentinae Lévl. et Thellung V/2 864
biennis L. V/2 866; VII 192 Fig. 1233
biennis L. subsp. muricata Rouy et Camus V/2 871
Bistorta Nutt. V/2 866
Braunii Döll V/2 873
cruciata Nutt. V/2 857
Drummondii Hook. V/2 864
fallax V/2 862
fallax Renner V/2 873
Franciscana Bartlett V/2 862
fruticosa L. V/2 865
gigas V/2 860
glauca (Michx.) Spach V/2 865
grandiflora Ait. V/2 868
Hookeri Torr. et Gray V/2 861
humifusa Nutt. V/2 864
humifusa Nutt. f. erecta Fr. Zimmermann V/2 864
laciniata Hill V/2 864
Lamarckiana Ser. V/2 859, 864
Missouriensis Sims. V/2 865

Oenothera muricata L. V/2 871; VII 192 Fig. 1233
odorata Jacq. V/2 864
pinnatifida Humb., Bonpl. et Kth. V/2 866
prostrata Ruiz et Pavon V/2 864
pumila (L.) Spach V/2 865
Romanzowii Ledeb. V/2 866
rosea Sol. V/2 865
rubrinervis V/2 860
silaifolia Bieb. V/2 866
sinuata Michx. V/2 864
suaveolens (Pers.) Rouy et Camus V/2 868
syrticola Bartl. V/2 872
taraxacifolia Sw. V/2 865
tetraptera Cav. V/2 865
Veitchiana hort. V/2 866
„ Withneyi A. Gray V/2 866
Oenotheraceae V 797; VII 192
Oglifa arvensis Cass. VI/1 453
„ minima Rchb. VI/1 454
Olacaceae III 160; VII 169
Oldenlandia Plum. VII 207
Oldfieldia Africana Hook. V/1 120
Olea L. V/3 1934; VII 197
Aquifolium Sieb. et Zucc. V/3 1905
Capensis L. V/3 1934
chrysophylla Lam. V/3 1934
cuspidata Wall. V/3 1934
Delavayi Franchet V/3 1905
Europaea L. V/3 1935
Fortunei Carr. V/3 1905
fragrans Thunb. V/3 1905
Gallica Mill. V/3 1936
lancifolia Moench V/3 1936
laurifolia Lam. V/3 1934
officinarum Crtz. V/3 1936
Oleaster Hoffm. et Lk. V/3 1936
„ undulata Jacq. V/3 1934
Oleaceae V/3 1901; VII 197
Olearia argophylla F. v. Müll. VI/1 449
ramulosa Benth. VI/1 449
„ stellulata DC. VI/1 449
Oleoideae V/3 1903; VII 197
Oligosporus condimentarius Cass. VI/2 635
Oliniaceae V/2 698; VII 191
Olpidiaceae VII 139
Omalochine prunellifolia Cass. VI/2 1146
Omalotheca Einseleana F. Schultz VI/1 463
„ supina DC. VI/1 466
Omphalea L. V/1 120
Omphalocarpum Pal. Beauv. VII 197
Omphalodes Moench V/3 2142; VII 200
longiflora DC. V/3 2147
Omphalodes omphalodes Voss V/3 2145
repens Schrank V/3 2145
scorpioides (Haenke) Schrank V/3 2144
sempervirens Don V/3 2198
„ verna Moench V/3 2145
Onagra Tournef. VII 192
biennis Scop. V/2 866; VII 192
„ muricata Moench V/2 871
Onagraceae V/2 797; VII 192
Oncidium Sw. II 324
Onobrychis (Tourn.) Mill. IV/3 1487; VII 182
alpicola Arv.-Touv. IV/3 1491
arenaria Ser. IV/3 1490
Caput galli (L.) Lam. IV/3 1488
conferta Desv. IV/3 1491
montana Lam. et DC. IV/3 1491
Onobrychis Karst. IV/3 1488
procumbens Stev. IV/3 1491
reticulata Opiz IV/3 1491
sativa Lam. IV/3 1488
spicata Moench IV/3 1488
supina Gaud. IV/3 1490
Transsilvanica Simonk. IV/3 1491
viciifolia Scop. IV/3 1488, 1492
„ vulgaris Güldenst. IV/3 1488
Onoclea L. I 12; VII 148
„ Struthiopteris (L.) Hoffm. I 12
Ononis L. IV/3 1215; VII 182
alopecuroides L. IV/3 1216
altissima Lam. IV/3 1224
antiquorum Vill. IV/3 1226
Apula Ten. IV/3 1219
arvensis L. IV/3 1224
arvensis Lightf. IV/3 1225
Austriaca Beck IV/3 1224
biflora Desf. IV/3 1217
campestris Koch et Zitz IV/3 1226
Cherleri Bert. IV/3 1219
Cherleri Desf. IV/3 1219
Columnae All. IV/3 1219
foetens auct. IV/3 1224
fruticosa L. IV/3 1216
hircina Jacq. IV/3 1224
latifolia Asso IV/3 1221
laxiflora Viv. IV/3 1219
minutissima Jacq. IV/3 1219
Miniana Plan IV/3 1225
mitissima L. IV/3 1216
mollis Savi IV/3 1219
Natrix L. IV/3 1217
parviflora Lam. IV/3 1219
pinguis L. IV/3 1217
procurrens Wallr. IV/3 1225
pusilla L. IV/3 1219
reclinata L. IV/3 1219
repens L. IV/3 1225
rotundifolia L. IV/3 1221
Schmuckii Dalla Torre et Sarnth. IV/3 1226
Ononis serrata Forsk. IV/3 1216
spinosa L. IV/3 1222
subocculta Vill. IV/3 1219
„ vulgaris Rouy IV/3 1222
Onopordon L. VI/2 919; VII 212
Acanthium L. VI/2 920
bracteatum Boiss. et Heldr. VI/2 920
horridum Viv. VI/2 920
Illyricum L. VI/2 920
Sibthorpianum Boiss. et Heldr. VI/2 920
„ Tauricum Willd. VI/2 920
Onopordum L. VI/2 919
Onosma L. V/3 2177; VII 200
arenarium auct. tir. V/3 2184
arenarium Lamotte V/3 2179
arenarium Waldst. et Kit. V/3 2180
arenarium Waldst. et Kit. subsp. Penninum Br.-Bl. V/3 2183
arenarium Waldst. et Kit. subsp. pyramidatum Br.-Bl. V/3 2181
Austriacum Beck V/3 2184
decumbens auct. V/3 2128
echioides L. V/3 2179
echioides Gaud. V/3 2180
echioides Jacq. V/3 2183
echioides Wettst. V/3 2185
Helveticum Boissier var. Vaudense Borb. V/3 2180
Helveticum F. O. Wolf V/3 2183
Javorkae Simonk. V/3 2186
lingulatum Freyn V/3 2184
montanum Posp. V/3 2186
montanum Sibth. et Sm. V/3 2185
Orientale Pall. V/3 2128
pseudoarenarium Schur V/3 2184, 2185
pseudoarenarium Schur subsp. Tridentinum Wettst. V/3 2184
stellulatum auct. tir. V/3 2184
stellulatum Waldst. et Kit. V/3 2185
Tauricum Willdenow V/3 2185
Tauricum Willdenow subsp. Dalmaticum Scheele V/3 2186
Vaudense Gremli V/3 2180
„ Visianii Clementi V/3 2183
Onothera VII 192
Oocystaceae VII 138
Oomycetes VII 140
Operculina tuberosa (L.) Meiss. V/3 2077
Turpethum (L.) Peter V/3 2077
ventricosa (Choisy) Peter V/3 2077
Ophelia Chirata Griseb. V/3 1974
Ophiocaryon Schomb. VII 187
Ophiocytiaceae VII 138
Ophioglossaceae I 43; VII 148

Ophioglossum L. I 43; VII 148
Lusitanicum L. I 43
„ vulgatum L. I 44
Ophiopogon Japonicus Ker-Gawler VII 192
Ophiopogonoideae II 280; VII 162
Ophioscorodon ursinum Wallr. II 229
Ophrys L. II 328; VII 164
aestivalis Lam. II 385
Albertiana G. Camus II 334
alpina L. II 361
anthropophora L. II 359
apifera Huds. II 333
Arachnites (Scop.) Murray II 330
arachnitiformis Gren. et Phil. II 334
aranifera Huds. II 331
Bertolonii Moretti II 332
Botteronii (Chodat) II 334
cordata L. II 387
Devenensis Rchb. II 334
epeirophora Peter II 337
fuciflora Crtz. II 330
Hausmanni Porta II 332
Loeselii L. II 393
monophyllos L. II 392
Monorchis L. II 362
muscifera Huds. II 329
myodes Jacq. II 329
Nidus avis L. II 388
ovata L. II 386
paludosa L. II 391
pseudo-apifera Cald. II 333
rostrata Ten. II 333
Speculum Bert. II 332
sphecodes Mill. II 331
„ spiralis L. II 385
Opiliaceae III 160; VII 169
Oplismenus Crus galli Dum. I 189
„ undulatifolius Pal. I 190
Opopanax Koch V/2 1359
Chironium (L.) Koch V/2 946, 1360
hispidus (Friv.) Griseb. V/2 1362
Opopanax Karst. V/2 1360
Orientalis Boiss. V/2 1362
„ Siculus Huet V/2 1360
Opulaster opulifolius O. Kuntze IV/2 680
Opulus vulgaris Borkh. VI/1 243
Opuntia (Tournefort) Mill. V/2 688; VII 190
Ficus Indica (L.) Mill. V/2 689; VII 191 Fig. 1232
Italica Ten. V/2 690
monacantha Haw. V/2 689
nana Visiani V/2 690
Opuntia Karst. V/2 690
pumila Vierhapper et Handel-Mazzetti V/2 690
Rafinesquei Engelm. V/2 689
Opuntia Tuna (L.) Mill. V/2 689
vulgaris Mill. V/2 690
„ vulgaris Ten. V/2 689
Opuntiales VII 190
Opuntioideae VII 190
Orchi-Aceras Bergoni Camus II 360
Orchicoeloglossum mixtum Aschers. et Graebn. II 364
Orchidaceae II 321; VII 164
Orchigymnadenia Vollmanni Max Schulze II 371
Orchis L. II 335; VII 164
abortivus L. II 382
alatus Fleury II 358
alpinus Crtz. II 368
alpinus Schrank II 361
ambiguus Kern. II 357
amoenus Crtz. II 340
angusticruris Franchet II 357
angustifolius Wimm. et Grab. II 351
anthropophorus All. II 359
aphyllus Schmidt II 383
Aschersonianus Hausskn. II 357
atropurpureus Tausch II 367
Austriacus Kern. II 357
Badensis Zimm. II 357
Beyrichii Kern. II 357
bicornis Gilib. II 334
bifolius Crtz. II 373
bifolius L. II 372
bracteatus Willd. II 364
Braunii Halascy II 357
brevicornis Marcilly II 346
Brunianus Brügg. II 371
Canuti Richt. II 357
cassideus Bieb. II 340
Chenevardii Max Schulze II 357
chloranthus Custer II 373
cimicinus Bréb. II 357
cimicinus Crtz. II 339
Columnae Schmidt II 340
cómosus Schur II 354 458
conopeus L. II 369
cordiger Fries II 355; VII 164
coriophorus L. II 339
crenulatus Gilib. II 335
cruentus Roch. II 355
cucullatus L. II 368
Cyrilli Ten. II 349
Darcisii Murr II 357
Dietrichianus Bogenh. II 357
divaricatus Rich. II 351
Dufftianus Max Schulze II 357
Ennensis Guss. II 342
ensifolius Vill. II 350
Erdingeri Sennholz II 364
Franzonii Max Schulze II 357
fuscus Jacq. II 344
galeatus Lam. II 343
Gelmianus Dalla Torre et Sarnthein II 357
Orchis globosus L. II 345; VII 3 Fig. 970 a
Guestphalicus Richt. II 358
haematodes Rchb. II 351
Halleri Crtz. II 345
Haussknechtii Max Schulze II 357
Heinzelianus Reichhardt II 371
Huteri Max Schulze II 357
hybridus Boenningh. II 357
Jenensis Brand II 357
imbricatus Vest II 340
incarnatus L. II 351
influenzus Sennholz II 357
intermedius Gadeceau II 357
Italicus Lam. II 342
Kromayeri Max Schulze II 357
Ladurneri Murr II 357
latifolius L. II 354; VII 3 Fig. 970 d
latifolius Rchb. II 351
laxiflorus Lam. II 350
longibracteatus Schmidt II 353
Lorezianus Brügg. II 357
macer Lindl. II 342
maculatus L. II 353
majalis Rchb. II 354
masculus L. II 346; VII 166 Fig. 1201
Mediterraneus Guss. II 349
militaris L. II 343
mimusops Thuill. II 343
Monorchis All. II 362
monticulus Klinge II 355
monticulus K. Richter II 357
Morio L. II 335; VII 164
morioides Brand II 357
Moritzianus Brügg. II 367
Muscaria Scop. II 329
niger Scop. II 365
ovalis Schmidt II 346
pallens L. II 348
pallens Moritzi II 350
pallens Savi II 349
paludosus Pall. II 391
paluster Doell II 350
paluster Jacq. II 349
papilionaceus L. II 356
pictus Loisel. II 339
Pollinianus Spr. II 340
Provincialis Balb. II 349
purpureus Huds. II 344; VII 165 Fig. 1200
pyramidalis L. II 334
Regelianus Brügg. II 371
Rivini Gouan II 343
rivularis Heuff. II 355
Rouyanus G. Camus II 357
Ruppertii Max Schulze II 357
Ruthei Max Schulze II 354
saccatus Rchb. II 356
sambucinus L. II 356

Orchis Sauzaianus G. Camus II 357
Schleicheri Sweet II 356
Schulzei Hausskn. II 357
serotinus (Hausskn.) II 352
signifer Vest II 343
Simia Lam. II 342; VII 166 Fig. 1202
Simia Vill. II 341
speciosissimus Wettst. II 357
Spitzelii Sauter II 346
suaveolens Vill. II 367
sulphureus Sims II 348
„ Tabernaemontani Gmel. II 350
Tauricus Lindl. II 341
tephrosanthos Vill. II 342
Timbali Velen. II 537
Traunsteineri Sauter II 352
tridentatus Scop. II 341
Uechtritzianus Hausskn. II 357
ustulatus L. II 340; VII 166 Fig. 1202
Vallesiacus Spiess II 371
variegatus All. II 341
variegatus Vis. II 342
Vilmsii G. Camus II 357
Wilmsii Richt. II 357
„ zoophorus Thuill. II 342
Oreocereus V/2 693
Oreochloa disticha Lk. I 266
Oreocome Edgew. V/2 1314
Oreodaphne Nees VII 176
Oreosciadium Weddell V/2 1140
Oreoselinum Mill. V/2 1363/67
album Hoffm. V/2 1326
Chabraei Bieb. V/2 1375
elaphoboscum Delarbre V/2 1389
legitimum Bieb. V/2 1386
montanum Hoffm. V/2 1385
nigrum Delarbre V/2 1386
„ Pyrenaicum Hoffm. V/2 1347
Origanum L. V/4 2327; VII 201
Creticum Sut. V/4 2330
Dictamnus L. V/4 2333
Heracleoticum Rchb. V/4 2330
hirtum Vogel V/4 2327
Majorana L. V/4 2334
majoranoides hort. V/4 2330
majoranoides Willd. V/4 2334
Maru L. V/4 2333
neglectum Vogel V/4 2327
Onites L. V/4 2333
Smyrneum Sibth. et Sm. V/4 2327
virens C. A. Mey. V/4 2329
vulgare L. V/4 2328
vulgare L. subsp. prismaticum Gaud. V/4 2331
Orixa Thunb. VII 184
Orlaya Hoffm. V/2 1066; VII 193
Daucorlaya Murb. V/2 1068
grandiflora (L.) Hoffm. V/2 1069
Orlaya maritima Koch V/2 1503
platycarpos (L.) Koch V/2 1068
„ pumila Halacsy V/2 1503
Ormosia Jacks. VII 182
Ornithogalum (L.) Salisb. II 250; VII 162
arvense Pers. II 207
autumnale Lam. II 248
bifolium Neck. II 247
Bohemicum Ten. II 207
Boucheanum Aschers. II 254
Bungei Boiss. II 251
caudatum Ait. II 250
chloranthum Sauter II 254
Clusii Tausch II 212
comosum L. II 251
fistulosum Ram. II 210
flavescens (Lam.) Baker II 255
gramineum Gilib. II 203
Gussonii Ten. II 252
hyalinum Granier II 253
Liotardi Sternb. II 210
luteum L. II 207, 211
maius Gilib. II 211
maritimum Brot. II 278
minimum L. II 209
minus Gilib. II 209
montanum Cyr. II 250
Narbonense L. II 250
Narbonense Neilr. II 255
nutans L. II 253; V/1 414
patulum Raf. II 250
pratense Pers. II 211
pusillum Schmidt II 212
pyramidale L. II 255
Pyrenaicum L. II 255
ramosum Lam. II 202
refractum Guss. II 253
Ruthenicum P. C. Bouché II 252
spathaceum Hayne II 209
speciosum Rafin. II 247
sulphureum Schult. II 255
tenuifolium Guss. II 252; VII 162
„ umbellatum L. II 252
Ornithopodium compressum All. IV/3 1476
scorpioides Scop. IV/3 1465
„ triphyllum Moench IV/3 1465
Ornithopus L. IV/3 1475; VII 182
compressus L. IV/3 1476
ebracteatus DC. IV/3 1476
exstipulatus Thore IV/3 1476
Huelseni Aschers. et Graebn. IV/3 1480
istmocarpus Coss. IV/3 1479
Martini Giraudias IV/3 1480
perpusillus L. IV/3 1477
pinnatus (Mill.) Druce IV/3 1476
roseus Dufour IV/3 1479
sativus Lk. IV/3 1477
Ornithopus scorpioides L. IV/3 1465
subumbellatus Gilib. IV/3 1477
„ trifoliatus Lam. IV/3 1465
Ornithorhynchium Syriacum Röhl. IV/1 463
Ornus Europaea Pers. V/3 1922
„ rotundifolia Loud. V/3 1924
Orobanchaceae VI/1 132; VII 205
Orobanche L. VI/1 132; VI/2 1362
alba Steph. VI/1 149
alpestris F. W Schultz VI/1 146
Alsatica Kirschl. VI/1 144
amethystea Thuill VI/1 151
amethystina Rchb. VI/1 151
apiculata Wallr. VI 1 153
arenaria Borkh. VI/1 138
Artemisiae Vaucher VI/1 152
atrorubens F. G. Schultz VI/1 141
barbata Poiret VI/1 153
brachysepala F. G. Schultz VI/1 144
Buekii Dietr. VI/1 142
caerulea Vill. VI/1 137
caerulescens Steph. VI/1 139
caesia Rchb. VI/1 137
Cardui Saut. VI/1 150
caryophyllacea Sm. VI/1 141; VI/2 1362
Centaureae Scabiosae Schultz VI/1 143
cernua Loefling VI/1 140
Cervariae Kirschl. VI/1 144
Cirsii Fr. VI/1 151
crenata Forsk. VI/1 134
cruenta Bertol. VI/1 148
cumana Mutel VI/1 140
elatior Koch et Ziz VI/1 142
elatior Sutton VI/1 143
Epithymum DC. VI/1 149
Eryngii Duby VI/1 151
flava Mart. VI/1 145; VI/2 1362
fragrans Koch VI/1 143
Froehlichii Rchb. VI/1 145
Galii Duby VI/1 141
gracilis Sm. VI/1 148
Hederae Duby VI/1 154
Kochii F. G. Schultz VI/1 143
Laserpitii Sileris Reut. VI/1 144
laurina Rchb. VI/1 154
Libanotidis Opiz VI/1 144
loricata Rchb. VI/1 152; VI/2 1362
lucorum A. Br. VI/1 147
lutea Baumg. VI/1 142
maior L. VI/1 143
maior Lam. VI/1 148
Medicaginis Rchb. VI/1 154
micrantha Kern. VI/1 147
minor Sm. VI/1 153
nudiflora Wallr. VI/1 153

Orobanche pallidiflora Wimm. et Grab. VI/1 151
Picridis F. W. Schultz VI/1 152
platystigma Rchb. VI/1 150
purpurea Jacq. VI/1 137
ramosa L. VI/1 136
Rapum Genistae Thuill. VI/1 148
Rapum Koch VI/1 148
reticulata Wallr. VI/1 150; VI/2 1363
rubens Wallr. VI/1 142
Salviae F. W. Schultz VI/1 146; VI/2 1362
sativa DC. VI/1 134
Sauteri F. W. Schultz VI/1 150
Scabiosae Koch VI/1 150
stigmatodes Wimm. VI/1 143
Teucrii Holandre VI/1 141
Trifolii pratensis F. W. Schultz VI/1 153
Tussilaginis Mutel VI/1 145
„ vulgaris Poiret VI/1 141
Orobus albus L. fil. IV/3 1579
alpestris Maly IV/3 1580
angustifolius Vill. IV/3 1577
anomalus C. Koch IV/3 1509
Aphaca Döll IV/3 1590
aristatus Lapeyr. IV/3 1525
Austriacus Crtz. IV/3 1579
Caucasicus Spr. IV/3 1509
Clusii Spr. IV/3 1540
ensifolius Lapeyr. IV/3 1578
Ewaldi Meinsh. IV/3 1571
filiformis Lam. IV/3 1577
flaccidus Radius IV/3 1575
glaberrimus Schur IV/3 1571
gracilis Gaud. IV/3 1575
grandiflorus Boiss. IV/3 1570
inconspicuus A. Br. IV/3 1566
Kolenatii C. Koch IV/3 1570
lacteus Bieb. IV/3 1579
levigatus Waldst. et Kit. IV/3 1571
linifolius Reichard IV/3 1582
luteus L. IV/3 1569
montanus Scop. IV/3 1569, 1571
multiflorus Sieb. IV/3 1576
niger L. IV/3 1572
Nissolia Döll IV/3 1608
orientalis Boiss. IV/3 1570
palustris Rchb. IV/3 1582
Pannonicus Kramer IV/3 1579
Paradensis Kit. IV/3 1572
pratensis Döll IV/3 1587
prostratus Host IV/3 1580
purpureo-coeruleus Gilib. IV/3 1574
Pyrenaicus Scop. IV/3 1576
roseus Ledeb. IV/3 1565
Orobus serotinus Presl IV/3 1576
setifolius Alef. IV/3 1607
setiformis Schleich. IV/3 1575
silvaticus L. IV/3 1525
sphaericus Alef. IV/3 1606
Styriacus Gremli IV/3 1571
subalpinus Ledeb. IV/3 1571
tenuifolius Baumg. IV/3 1580
tenuifolius Roth IV/3 1582
tuberosus L. IV/3 1580
variegatus Ten. IV/3 1576
varius Soland. IV/3 1580
Venetus Mill. IV/3 1576
vernus L. IV/3 1574
versicolor Gmel. IV/3 1580
„ vicioides Ser. IV/3 1540
Orontium aquaticum L. VII 157
Oroxylum Vent. VII 204
Orphanidesia gaultherioides Boiss. V/3 1610
Orthantha lutea Kern. VI/1 101
Orthopogon undulatifolius Spr. I 190
Orthopterygum Hemsl. VII 167
Orthosiphon Schinzianus Briquet V/4 2270
„ stamineus Benth. V/4 2270
Orthospermae V/2 933
Orthothecium VII 146
Orthotrichaceae VII 145
Orvala Garganica L. V/4 2444
lamioides Lam. et DC. V/4 2444
Orychophragmus sonchifolius Reg. IV/2 476
Oryxa Japonica Thunb. V/1 48
Oryza L. I 194; VII 154
clandestina (Web.) A. Br. I 194
oryzoides Dalla Torre et Sarnth. I 194
Oryzeae I 196; VII 154
Oryzopsis Mich. I 207; VII 154
miliacea Aschers. et Schweinfurth I 207
„ virescens (Trin.) Beck I 207
Osbeckia L. V/2 795
Oscillatoriaceae VII 127, 136
Osmanthus fragrans Lour. V/3 1905
Osmunda regalis L. I 42; VII 148
Osmundaceae I 42; VII 148
Osteomeles Lindl. IV/2 663
Osteospermum L. VII 212
Ostericum Hoffm. V/2 1331; VII 196
palustre Bess. V/2 1345
„ pratense Hoffm. V/2 1345
Osteriscium Walp. V/2 1331
Ostrowskia magnifica Reg. VI/1 329
Ostruthium Lk. V/2 1363; VII 195
„ officinale Lk. V/2 1397
Ostrya Scop. III 68; VII 168
carpinifolia Scop. III 69; VII 168 Fig. 1207
„ vulgaris Willd. III 69
Ostryopsis Davidiana Decne. III 65
Ósyris (nicht Osýris) alba L. III 151
„ arborea Wall. III 151
Othonna crassifolia Harv. VI/2 799
integrifolia L. VI/2 742
„ Sibirica L. VI/2 797
Otites nutans Opiz III 292
„ viridiflora Opiz III 292
Otocarpus Durieu IV/1 287
Ottelia Pers. I 159
Ourouparia Gambir Baill. VI/1 196
Ouvirandra Thouars I 164
Oxalidaceae IV/3 1644; VII 183
Oxalis L. IV/3 1645; VII 24 Fig. 1044
Acetosella L. IV/3 1650
alba Gilib. IV/3 1650
ambigua L. IV/3 1654
articulata Savign. IV/3 1646
Barrelieri L. IV/3 1646
bifida Thunb. IV/3 1646
bipunctata Hook. IV/3 1646
carnosa Molina IV/3 1646
cernua Thunb. IV/3 1646
corniculata L. IV/3 1655
corymbosa DC. IV/3 1646
crenata Jacq. IV/3 1647
cymosa Small IV/3 1654
Deppei Lodd. IV/3 1646
elegans Humb. IV/3 1646
enneaphylla Cav. IV/3 1646
esculenta Dietr. IV/3 1647
Europaea Jord. IV/3 1654
floribunda Lehm. IV/3 1646
hirta L. IV/3 1646
lasiandra Zucc. IV/3 1646
lobata Sims IV/3 1646
lutea Steud. IV/3 1654
Martiana Zucc. IV/3 1646
mutabilis Sond. IV/3 1646
Ortgiesii Reg. IV/3 1646
purpurata Jacq. IV/3 1646
purpurea Thunb. IV/3 1646
pusilla Salisb. IV/3 1655
repens Thunb. IV/3 1655
rosea Jacq. IV/3 1646
rusciformis Mikan IV/3 1647
sessiliflora L. IV/3 1646
tetraphylla Cav. IV/3 1647
tetraphylla Lk. et Otto IV/3 1647
tubiflora Jacq. IV/3 1646
urbica St. Hil. IV/3 1646
Valdiviensis Barnéoud IV/3 1646
variabilis Lindl. IV/3 1646
„ violacea L. IV/3 1646
Oxymitra Bl. VII 175
Oxycoccus Hill V/3 1685; VII 196
erythrocarpus (Michx.) Pers. V/3 1686
Europaeus Pers. V/3 1686
Japonicus Miq. V/3 1686
macrocarpus Pursh V/3 1685
palustris Pers. V/3 1686

Oxycoccus quadripetalus Gilib. V/3 1686
quadripetalus Gilib. subsp. microcarpus (Turcz.) V/3 1687
„ vulgaris Pursh V/3 1686
Oxydendron arboreum DC. V/3 1610, 1622
Oxygraphis glacialis Dalla Torre III 573
„ vulgaris Freyn III 573
Oxylapathon digynum St. Lag. III 188
Oxylobium Andr. IV/3 1147; VII 182
Oxypetalum R. Br. V/3 2059, 2066
Oxyria Hiller III 188; VII 170
digyna (L.) Hill III 188
reniformis Hook. III 188
Oxys (Tournef.) Adans. IV/3 1645
Acetosella Scop. IV/3 1650
lutea Lam. IV/3 1655
lutea Moench IV/3 1654
„ stricta All. IV/3 1654
Oxytropis DC. IV/3 1402, 1438; VII 182
alpina Ten. IV/3 1449
campestris DC. IV/3 1447
cyanea Gaud. IV/3 1443
dichoptera DC. IV/3 1425
foetida DC. IV/3 1451
Halleri Bunge IV/3 1449
hybrida Brügg. IV/3 1448
intricans Thomas IV/3 1451
Lapponica O. Kuntze IV/3 1441
montana DC. IV/3 1439; VII 109 Fig. 1142
montana Spr. IV/3 1428
Parvopassuae Parlatore IV/3 1443
pilosa DC. IV/3 1444
Raetica Brügg. IV/3 1448
sericea Simonk. IV/3 1449
sordida DC. IV/3 1448
triflora Hoppe IV/3 1443
Uralensis DC. IV/3 1449
velutina Schur IV/3 1449
„ viscosa Pers. IV/3 1451
Ozodia Wight et Arn. V/2 1284
foeniculacea Wight et Arn. V/2 1284

P.

Pachlypleurum Ledeb. V/2 1314; VII 194
albo-marginatum Rupr. V/2 1325
alpinum Ledeb. V/2 1325
„ simplex Rchb. V/2 1323
Pachycereus aut. V/2 692
Pachylobus hexandrus (Griseb.) Engl. V/1 84
Pachypodium Columnae Webb IV/1 179
erysimoides Webb IV/1 155
Pannonicum Endlicher IV/1 176
Pachyrrhizus bulbosus (L.) Britton IV/3 1624
Pachysandra Michx. VII 186
procumbens Michx. V/1 203
„ terminalis Sieb. et Zucc. V/1 203
Padus (L.) Mert. et Koch IV/2 1060
avium Mill. IV/2 1064
Laurocerasus Mill. IV/2 1061
Mahaleb Borkh. IV/2 1070
racemosa C. K. Schneider IV/2 1064
„ vulgaris Borkh. IV/2 1064
Paederota Bonarota L. VI/1 43; VI/2 1361
caerulea L. f. VI/1 43
Egeria L. VI/1 42
„ lutea Scop. VI/1 42
Paeonia L. III 454; VII 174 und 38 Fig. 1064
albiflora Pall. III 455
anomala L. III 455
corallina Retz. III 455
foemina Garsault III 455
integra Murr. III 455
integrifolia Lk. III 455
lobata Rchb. III 456
mas Garsault III 455
officinalis L. III 455
peregrina Mill. III 455
rosea Host III 455
tenuifolia L. III 455
„ Wittmanniana Stev. III 455
Paeonioideae VII 174
Palafoxia Hookeriana Torr. et Gray VI/1 534
„ Texana DC. VI/1 534
Palaquium Borneense Burck V/3 1895
Gutta Burck V/3 1895
oblongifolium Burck V/3 1895
oleosum Blanco V/3 1896
pisang Burck V/3 1896
Supfianum Schlechter V/3 1895
„ Treubii Burck V/3 1895
Palava flexuosa Mast. V/1 455
Palimbia DC. V/2 1364
carvifolia Koch V/2 1375
„ Chabraei DC. V/2 1375
Paliurus Gaertn. V/1 326; VII 187
aculeatus Lam. V/1 326
australis Gaertn. V/1 326
„ Spina-Christi Mill. V/1 326
Palmae II 130; VII 156
Panax arboreus Forst. V/2 914
Ginseng C. A. Mey. V/2 912
quinquefolius L. V/2 912
sambucifolius Sieb. V/2 914
„ trifolius L. V/2 912
Pancicia Vis. V/2 1196
Pancratium maritimum L. II 319
Panda oleosa Pierre IV/3 1643
Pandales VII 183
Pandanaceae I 116; VI 1102
Pandanales I 116; VII 102
Paniceae I 194; VII 153
Panicum L. I 186; VII 153
ambiguum Hausskn. I 192
amplexifolium Hochst. I 190
capillare L. I 190
colonum L. I 190
compressum Bivona I 190
cruciforme Sibth. et Sm. I 190
crus galli L. I 189
dactylon L. I 264
dichotomum L. I 190
filiforme Garcke I 188
glabrum Gaud. I 188
glaucum L. I 191
Italicum L. I 193
lineare Krock. I 188
miliaceum L. I 188
proliferum Lam. I 190
racemosum Spr. I 190
repens L. I 190
sanguinale L. I 187
Scribnerianum Lam. I 190
undulatifolium Ard. I 190
vaginatum Gren. et Godr. I 190
verticillatum L. I 191
„ viride L. I 192
Pantostomatales VII 136
Panzeria multifida Moench V/4 2390
„ Sibirica Moench V/4 2389
Papaver L. IV/1 25; VII 176 und 18 Fig. 1016
alpinum Baumg. IV/1 27
alpinum Fedde IV/1 27
alpinum L. IV/1 27
alpinum Viv. IV/1 27
amplexicaule Stok. IV/1 33
Argemone L. IV/1 33
aurantiacum Hay. IV/1 27
bracteatum Lindl. IV/1 26
Burseri Crtz. IV/1 27
Burseri Rchb. IV/1 27
Cambricum L. IV/1 19
cinerascens K. Wein IV/1 30
clavatum Gilib. IV/1 33
clavigerum Lam. IV/1 33
commutatum Fisch. IV/1 25
dubium L. IV/1 31
dubium L. var. Lecoquii (Lamotte) Fedde IV/1 32
exspectatum Fedde IV/1 36
fastidiosum K. Wein IV/1 30
Feddeanum K. Wein IV/1 36
flavum Moench IV/1 19
Heldreichii Boiss. IV/1 25
hispidum Lam. IV/1 32
hybridum L. IV/1 32
intricatum K. Wein IV/1 30
Kerneri Hayek IV/1 27
maritimum With. IV/1 33
nigrum Crtz. IV/1 33
nudicaule L. IV/1 26
obtusifolium Desf. IV/1 31
opiiferum Forsk. IV/1 33
Orientale L. IV/1 25

Papaver parviflorum Lam. IV/1 31
pseudo-Haussknechtii Fedde IV/1 30
Pyrenaicum A. Kern. IV/1 26
Raeticum Leresche IV/1 27
Rhoeas L. IV/1 29; I/XLIX Fig. 51
Rumelicum Velen. IV/1 30
Sendtneri A. Kern. IV/1 27
setigerum DC. IV/1 35
somniferum L. IV/1 33
spurium K. Wein IV/1 30
strigosum (Bönningh.) Schur IV/1 30
subpiriforme Fedde IV/1 25
tenuissimum (Heldr.) Fedde IV/1 25
thaumasiosepalum Fedde IV/1 30
trilobum Wallr. IV/1 30
„ Vetteri Beauverd IV/1 36
Papaveraceae IV/1 16; VII 176
Papaveroideae IV/1 19; VII 176
Papaya vulgaris DC. V/1 660
Papayaceae V/1 660; VII 190
Papayineae V/1 493
Paphiopedilum Pfitzer II 324; VII 164
Papilionatae IV/3 1135; VII 182
Papyrius Japonicus Poir. III 136
Parapactis W. Zimm. VII 165
Paracaryum coelestinum (Lindley) Voss V/3 2147
Paradisia Liliastrum (L.) Bert. II 200; VII 159
Parallosa monantha Alef. IV/3 1514
Parameria vulneraria Radlk. V/3 2050
Parentucellia Stev. VI/1 5
Parietales V/1 492; VII 188
Parietaria L. III 142; VII 169
debilis Forster III 142
diffusa Mert. et Koch III 144
erecta Mert. et Koch III 143
judaica L. III 144
officinalis L. III 143
„ ramiflora Moench III 144
Paris L. II 275; VII 162
„ quadrifolius L. II 275
Parkeriaceae VII 149
Parkinsonia aculeata L. IV/3 1128
Parmeliaceae VII 144
Parmentiera cerifera Seem. VI 1 176
Parnassia L. IV/2 636; VII 179
„ palustris L. IV/2 637; VII 179
Parnassioideae VII 179
Parochetus Hamilt. VII 182
Paronychia Juss. III 428; VII 173
argentea Lam. III 428
Bonariensis DC. III 428
Brasiliana DC. III 428
capitata DC. III 428
Kapela (Hacq.) Kern. III 428
Kochiana Boiss. III 428
pubescens DC. III 432
verticillata Lam. III 429
Paronychieae III 272
Parrotia Persica (DC.) C. A. Mey. IV/2 655, 657
Siderodendron C. A. Mey. IV/2 657
Parrya integerrima Don IV/1 476
Parthenium Willk. VI/2 591
„ argentatum A. Gray VI/1 533
Parthenocissus Planch. V/1 356; VII 187
Engelmanni Graebn. V/1 358
Henryi Graebn. V/1 356, 359
hirsuta Graebn. V/1 357
quinquefolia (L.) Planch. V/1 356, 358
Thunbergii Sieb. et Zucc. V/1 362
tomentosa Heyne V/1 362
tricuspidata Planch. V/1 356/357
Veitchi Graebn. V/1 356/357
„ vitacea Hitchcock V/1 356/357
Pasania Miq. III 95
Paspalum L. I 194; VII 153
„ umbellatum Lam. I 264
Passerina filiformis L. V/2 726
Passiflora L. VII 190
caerulea L. V/1 658
edulis Sims V/1 658
incarnata L. V/1 659
kermesina Lk. et Otto V/1 660
quadrangularis L. V/1 660
racemosa Brot. V/1 660
Raddiana DC. V/1 660
violacea Vell. V/1 660
„ vitifolia H. B. et Kth. V/1 659
Passifloraceae V/1 657; VII 190
Pastinaca L. V/2 1404; VII 195
altissima Lam. V/2 1360
Anethum Spr. V/2 1291
Caspica Calestani V/2 1422
Germanica Kirschleger V/2 1406
graveolens Bernh. V/2 1291
hispida Fenzl V/2 1362
latifolia Hohenacker V/2 1413
opaca Bernh. V/2 1408/09
opaca Sweet V/2 1411
pratensis H. Martius V/2 1408
propinqua Jord. V/2 1410
sativa L. V/2 1405
selinoides Vis. V/2 1377
silvestris Mill. V/2 1411
taraxacifolia Fisch. V/2 1409
tereticaulis Bor. V/2 1412
urens Requien V/2 1412
„ vulgaris Bubani V/2 1406
Patagonula L. VII 200
Patrinia scabiosifolia Lk. VI/2 1363
Paulinia Japonica Thunb. V/1 355
Paullinia Cupana H.B. et Kth. V/1 307
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc. VI/1 5; VII 203 Fig. 1249
„ tomentosa Baill. VI/1 5
Pavetta L. VII 207
Pavia alba Poir. V/1 300
Pavia lutea Poir. V/1 300
Ohioensis Michx. V 1 299
„ rubra Poir. V/1 300
Pavonia L. V/1 457
Payena Bankensis Burck V/3 1896
„ Leerii Benth. et Hook. V 3 1895
Pecten Lam. V/2 1032
„ Veneris Lam. V/2 1037
Pectinaria Bernh. V/2 1032
„ vulgaris Bernh. V/2 1037
Pedaliaceae VI/1 176; VII 205
Pedicellaria pentaphylla Schrank IV/1 490
Pedicularis L. VI/1 112; VI/2 1362; VII 204
acaulis Scop. VI/1 126
adscendens Gaud. VI/1 115
affinis Steininger VI/1 128
asplenifolia Floerke VI/1 117
atrorubens Schleich. VI/1 128
Barrelieri Rchb. VI/1 115
Bohatschii Steininger VI/1 128
caespitosa Sieb. VI/1 117
comosa L. VI/1 122
comosa L. var. Rehmanniana Aschers. et Graebn. VI/1 123
elongata A. Kern. VI/1 114
erubescens Kern. VI/1 128
exaltata Bess. VI/1 123
flammea Wulf. VI/1 127
foliosa L. VI/1 124
Ganderi Kern. VI/1 128
Gaudini Arv.-Touv. VI/1 115
geminata Gebhard VI/1 118
geminiflora Rchb. VI/1 118
gyroflexa Vill. VI/1 119
Hacquetii Graf VI/1 123
Hausmanni Hut. VI/1 128
hirsuta Vill. VI/1 126
Hoermanniana Maly VI/1 124
Huguenini Rchb. VI/1 119
Huteri Kern. VI/1 128
Jacquini Koch VI/1 116
incarnata Jacq. VI/1 116
Kauffmanni Pinzger VI/1 123
Kerneri Dalla Torre VI/1 117
Kerneri Hut. VI/1 128
Oederi Vahl VI/1 127
pallescens Brügg. VI/1 128
palustris L. VI/1 120
Penzigii Steininger VI/1 128
Portenschlagii Saut. VI/1 118
pseudo-asplenifolia Steininger VI/1 128
Raetica A. Kern. VI/1 117; VI/2 1362
recutita L. VI/1 125
rosea Wulf. VI/1 126
rostrata L. VI/1 116
rostrato-capitata Crtz. VI/1 116
rostrato-spicata Crtz. VI/1 116
Sceptrum Carolinum L. VI/1 125; VI/2 1362; VII 113 Fig. 1147 f u. 202 Fig. 1248

Pedicularis silvatica L. VI/1 121; VI/2 1362
Sudetica Willd. VI/1 122; VII 204 Fig. 1250
Summana Auct. VI/1 123
tuberosa L. VI/1 114
Verloti Arv.-Touv. VI/1 128
versicolor Wahlenb. VI/1 127
verticillata L. VI/1 119
„ Vulpii Solms VI/1 128
Pedrosia Berthelotii Lowe IV/3 1365
Peganum Harmala L. V/1 41
Peireskia (Plumier) Mill. V/2 687
„ aculeata Mill. V/2 687
Peireskioideae V/2 686; VII 190
Pelargonium Burm. IV/3 1660; VII 184
cucullatum (L.) Ait. IV/3 1663
densiflorum (Eckl. et Zeyh.) IV/3 1663
grandiflorum Willd. IV/3 1665
inquinans (L.) Ait. IV/3 1664
multifidum Salisb. IV/3 1665
odoratissimum (L.) Ait. IV/3 1664
odorum Salisb. IV/3 1664
peltatum (L.) Ait. IV/3 1664
pinguifolium Sweet IV/3 1656
Radula (Cav.) L'Hérit. IV/3 1665
roseum Willd. IV/3 1665
rosodorum hort. IV/3 1665
triste (L.) Ait. IV/3 1663
„ zonale (L.) Ait. IV/3 1663
Pelecyphora aselliformis Ehrenb. V/2 695
Pellaea Link VII 149
Pelletiera A. St. Hil. V/3 1729
Pellionia Daveauana N. E. Br. III 137
Peltandra Raf. VII 157
Peltaria Jacq. IV/1 146; VII 177
„ alliacea Jacq. IV/1 147
Peltidium Zollikofer VI/2 1076
Peltigeraceae VII 144
Peltiphyllum peltatum (Torr.) Engl. IV/2 566
Pemphis acidula Forster V/2 745
Penaeaceae V/2 698; VII 191
Pennisetum Pers. I 173, 194
glaucum R. Br. I 191
Italicum R. Br. I 193
„ typhoideum Rich. I 194
Pentacaena ramosissima Hook. et Arn. VII 173
Pentaclethra macrophylla Benth. V/1 80
Pentacyclicae V/3 1567
Pentadesma butyraceum Don V/1 502
Pentaphiltrum Rchb. V/4 2579
Pentaphylacaceae V/1 233; VII 186
Pentaphyllum Lupinaster Moench IV/3 1312
Pentas carnea Benth. VI/1 197
Pentstemon Mitchell VI/1 6
„ crassifolius Lindl. VI/1 6
Pentstemon glaber Pursh VI/1 6
„ levigatus Ait. VI/1 6
Peperomia Ruiz et Pav. III 209
Peplis L. V/2 748
„ Portula L. V/2 749
Peramium repens Salisb. II 390
Peraphyllum ramosissimum Nutt. IV/2 664
Pereskia Pereskia Karst. V/2 687
Pereskiopsis Britton et Rose V/2 687
Perfoliata Fourr. V/2 1094
protracta Fourr. V/2 1098
„ rotundifolia Fourr. V/2 1106
Pericallis cruenta Webb. VI/2 728
Periclymenum Italicum Mill. VI/1 258
perfoliatum S. J. Gray VI/1 258
„ vulgare Mill. VI/1 255
Peridexaea aurea Willk. VI/2 624
Peridinaceae VII 137
Peridinales VII 137
Perilla arguta Benth. V/4 2272
macrostachya Benth. V/4 2272
Nankinensis Decaisne V/4 2272
„ ocimoides L. V/4 2272
Perilomia cordifolia Cham. et Schlecht. V/4 2509
fruticosa Cham. et Schlecht. V/4 2509
Periploca Graeca L. V/3 2064
„ sepium Bge. V/3 2064
Periplocoideae V/3 2064; VII 199
Perisporiaceae VII 140
Perisporiales VII 140
Peristrophe Nees VI/1 178; VII 205
Peristylus albidus Lindl. II 368
„ Islandicus Lindl. II 364
Pernettya mucronata (L.) Gaudichaud V/3 1621
„ rupicola Phil. V/3 1621
Peronosporaceae VII 140
Perowskia atriplicifolia Benth. V/4 2506
Persea gratissima Gaertn. IV/1 11
Persica Davidiana Carr. IV/2 1085
„ vulgaris Mill. IV/2 1091
Persicaria acris Gilib. III 202
amphibia Gray III 197
decipiens R. Br. III 204
Hydropiper Opiz III 202
maculosa Gray III 200
minor Opiz III 204
„ mitis Gilib. III 200
Persicariaceae III 165; VII 170
Pertusariaceae VII 144
Pervinca maior Scop. V/3 2052
minor Scop. V/3 2053
Petagnia saniculifolia Krašan V/2 1169
Petalostemon candidus Mich. IV/3 1386
„ purpureus Ryd. IV/3 1386
Petasites Mill. VI/2 680
albus (L.) Gaertn. VI/2 693
alpestris Brügg. VI/2 696
alpinus Baumg. VI/2 698
Celakovskyi Matenschek VI/2 696
Deschmanni Hay. VI/2 696
Deschmanni Kern. VI/2 686
Deschmanni A. Kern. VI/2 688
Doerfleri Hay. VI/2 681
fragrans Presl VI/2 680
frigidus (L.) Fries VI/2 681
glabratus (Maly) Borb. VI/2 690
hybridus (L.) Fl. Wett. VI/2 683
intercedens Matenschek VI/2 696
Kablikianus Tausch VI/2 690
levigatus Rchb. VI/2 681
Lorezianus Brügg. VI/2 696
Lorezianus Sennholz VI/2 688
niveus Baumg. VI/2 686
niveus Gortani VI/2 688
officinalis Moench VI/2 683
ovatus Hill VI/2 683
Petasites Karst. VI/2 683
paradoxus (Retz.) Baumg. VI/2 686
Rechingeri Hay. VI/2 696
spurius (Retz.) Rchb. VI/2 691
„ tomentosus DC. VI/2 691
Petilium imperiale Jaume II 239
Petiveria alliacea L. III 267
Petrocallis R. Dr. IV/1 114; VII 177
Pyrenaea Janka IV/1 115
„ Pyrenaica (L.) R. Br. IV/1 115
Petrocarvi Tausch V/2 1276
„ Cretense Tausch V/2 1278
Petrophytum Nutt. IV/2 673; VII 180
Petroselinum Hill V/2 1154; VII 194
ammoides Rchb. fil. V/2 1175
hortense Hoffm. V/2 1155
Petroselinum Karst. V/2 1155
Romanum Sweet V/2 1155
sativum Hoffm. V/2 1155
segetum (L.) Koch V/2 1154
„ vulgare Kirschleger V/2 1155
Petteria ramentacea (Sieber) Presl IV/3 1148; VII 182
Petunia Juss. VII 203
axillaris (Lam.) Britt. V/4 2554
integrifolia (Hook.) Schinz et Thellung V/4 2554
nyctaginiflora Juss. V/4 2554
violacea Lindl. V/4 2554
viscosa Colla V/4 2617

Peucedaneae V/2 951; VII 194
Peucedanum L. V/3 1363; VII 195
Alsaticum Desf. V/2 1372
Alsaticum L. V/2 1379
altissimum Desf. V/2 1372
altissimum (Mill.) Thellung V/2 1401
anethum Jess. V/2 1291
Angelica Caruel V/2 1333
angustifolium Rchb. f. V/2 1399
arenarium Waldst. et Kit. V/2 1370
Austriacum (Jacq.) Koch V/2 1383
Bellardii Balbis V/2 1385
Besserianum DC. V/2 1368
campestre Janka V/2 1368
Carvifolia Loisel. V/2 1311
Carvifolia Vill. V/2 1375
carvifolium Bieb. V/2 1298
Cervaria (L.) Lapeyr. V/2 1389
Chabraei Rchb. V/2 1375
coriaceum Fritsch V/2 1369
coriaceum Rchb. V/2 1368
crassifolium Halacsy V/2 1391
Ferula Baill. V/2 1355
flavum Salisb. V/2 1296
Gallicum Benth. V/2 1374
Gallicum Latourette V/2 1370
graveolens Clarke V/2 1291
Idanense Gandoger V/2 1396
Imperatoria Endlicher V/2 1396
imperatorioides Koch V/2 1399
involucratum Koch V/2 1385
Italicum Mill. V/2 1374
lancifolium (Hoffm. et Lk.) Lange V/2 1395
Latourrettii Cuss. V/2 1370
longifolium Schur V/2 1368
minus Huds. V/2 1132
montanum Koch V/2 1385
Narbonense (Lobel) Bub. V/2 1374
Neumayeri (Vis.) Rchb. V/2 1370
officinale L. V/2 1372
Oreoselinum (L.) Moench V/2 1386
Ostruthium (L.) Koch V/2 1396
palustre Grecescu V/2 1385
palustre (L.) Moench V/2 1393
Parisiense DC. V/2 1370
Parisiense Koch V/2 1369
Pastinaca Baill. V/2 1405
petraeum Noë V/2 1379
Petteri Vis. V/2 1368
Plinii Spr. V/2 1393
pratense Lam. V/2 1296
Pyrenaicum Costa V/2 1381
Pyrenaicum Loisel. V/2 1347
Rablense Koch V/2 1385
Rochelianum Heuffel V/2 1368
Peucedanum Ruthenicum Bieb. V/2 1368
Ruthenicum Rochel V/2 1368
sativum S. Wats. V/2 1405
Schottii Bess. V/2 1377
selinoides DC. V/2 1325
Silaus L. V/2 1296
silvestre DC. V/2 1393
silvestre Hegetschw. V/2 1396
Sowa Kurz V/2 1291
Sowa Roxb. V/2 1291
Tauricum Bieb. V/2 1368
trilobatum Gilib. V/2 1296
Venetum (Spr.) Koch V/2 1381
„ verticillare Vest. V/2 1401
Peumus Boldus Mol. VII 176
Pezizaceae VII 141
Pezizales VII 141
Pfeiffera Salm-Dyck V/2 696; VII 191
Phaca L. IV/3 1402, 1418; VII 182
alpina L. IV/3 1418
aristata Clairv. IV/3 1437
astragalina DC. IV/3 1415
australis L. IV/3 1412
Baetica L. IV/3 1405
campestris Wahlenb. IV/3 1441
frigida L. IV/3 1416; VII 183 Fig. 1227
Lapponica Wahlenb. IV/3 1441
minima All. IV/3 1415
montana Crtz. IV/3 1439
montana Wahlenb. IV/3 1441
ochreata Crtz. IV/3 1416
oroboides DC. IV/3 1414
Tragacantha All. IV/3 1437
Uralensis Wahlenb. IV/3 1449
„ viscosa Clairv. IV/3 1451
Phacelia Juss. VII 200; VII 200
binnarifida Michx. V/3 2122
ciliata Benth. V/3 2122
conferta G. Don V/3 2121
congesta Hook. V/3 2121
divaricata (Benth.) A. Gray V/3 2121
fimbriata Pursh V/3 2121
linearis (Pursh) Holzinger V/3 2121
Menziesii Torr. V/3 2121
minor (Harv.) Thellung V/3 2122
Parryi Torr. V/3 2121
Purshii Buckley V/3 2121
tanacetifolia Benth. V/3 2119
tanacetifolia DC. V/3 2121; VII 11 Fig. 989
viscida (Benth.) Torr. V/3 2121
Whitlavia A. Gray V/3 2121, 2122
Phacidiales VII 141
Phaecasium prenanthoides Cass. VI/2 1178
pulchrum Benth. et Hook. VI/2 1178
Phaedranthus buccinatorius (P. DC.) Miers. VI/1 176
Phaenocoma prolifera Don VI/1 495
Phaeophyceae VII 138
Phaeophyta VII 138
Phajus Lour. II 324
Phalaenopsis Bl. VII 165
Phalangium Liliago Schreb. II 203
Liliastrum Red. II 200
„ ramosum Poir. II 202
Phalaonopsis Bl. II 324
Phalarideae II 202; VII 154
Phalaris L. I 196; VII 154
alpina Haenke I 215
arenaria L. I 214
arundinacea L. I 196
aspera Retz. I 213
brachystachys Lk. I 198
caerulescens Desf. I 198
Canariensis L. I 197
minor Retz. I 198
oryzoides Sw. I 194
paradoxa L. I 198
phleoides L. I 214
„ picta L. I 197
Phalaroideae I 202
Phallaceae VII 143
Phalona echinata Dum. I 298
Phanerogamae I 72; II 150
Pharbitis hispida Choisy V/3 2077
Nil (L.) Choisy V/3 2077
nivea G. Don V/3 2077
„ purpurea (L.) Voigt V/3 2077
Pharus L. 196; VII 154
Phaseoleae IV/3 1619; VII 183
Phascum L. VII 145
Phaseolus L. IV/3 1626; VII 183
bipunctatus Jacq. IV/3 1628
coccineus L. IV/3 1637
compressus Mart. IV/3 1632
hispidus Oken IV/3 1620
lunatus L. IV/3 1628
lupinoides Fingerh. IV/3 1633
multiflorus Lam. IV/3 1637
Mungo L. IV/3 1627
nanus L. IV/3 1631
ovalispermus Fingerh. IV/3 1633
Romanus Savi IV/3 1632
sphaericus Savi IV/3 1633
triangularis Fingerh. IV/3 1632
„ vulgaris L. IV/3 1629
Phegopteris I 15
Dryopteris Fée I 16
polypodioides Fée I 15; VII 380 Fig. 1269
„ Robertiana R. Br. I 16
Phelipaea arenaria Walpers VI/1 138
caerulea C. A. Mey. VI/1 137
caesia Rchb. VI/1 137
„ ramosa C. A. Mey. VI/1 136
Phellandrion Dodonaei Bub. V/2 1255
Matthioli Bub. V/2 1252

Phellandrion Pollichii Bub. V/2 1260
Phellandrium L. V/2 1249; VII 194
annuum Clairv. V/2 1240
aquaticum L. V/2 1265
conioides Nolte V/2 1269
divaricatum Gilib. V/2 1265
fistulosum Clairv. V/2 1255
„ Mutellina L. V/2 1318
Phelline Labill. V/1 234
Phellodendron Amurense Rupr. V/1 52
Japonicum Maxim. V/1 53
„ Sachalinense Sarg. V/1 53
Pherosphaera Archer VII 150
Philadelphus L. IV/2 639; VII 179
coronarius L. IV/2 639; VII 180 Fig. 1224
coronarius Maly IV/2 640
inodorus L. IV/2 639
latifolius Schrad. IV/2 639
Lemoinei Lem. IV/2 640
pallidus Hay. IV/2 640
Pekinensis Rupr. IV/2 639
pubescens Loisel. IV/2 639
„ Schrenkii Rupr. IV/2 639
Philesia Commers VII 162
Phillyrea L. V/3 1917; VII 197
angustifolia L. V/3 1917
decora Boiss. et Bal. V/3 1917
latifolia L. V/3 1918
laurifolia hort. V/3 1917
Medwediera Sred. V/3 1917
spinosa Mill. V/3 1919
Vilmoriana Boiss. et Bal. V/3 1917
Philodendroideae VII 157
Philodendron pertusum II 131; I/XCVII Fig. 1496
Philonotis Brid. VII 146
Philotria Raf. VII 153
Philydraceae II 144; VII 158
Phippsia algida Br. I 238
Phleogenaceae VII 142
Phleum L. I 211; VII 154
alpinum L. I 213
arenarium L. I 214
asperum Jacq. I 213
autumnale Scop. I 270
Boehmeri Wibel I 214
bulbosum Host I 212
crinitum Schreb. I 221
cristatum Scop. I 296
hirsutum Sut. I 215
Michelii All. I 215
microstachyum Ruiz I 212
paniculatum Huds. I 213
phalaroides Koeler I 214
phleoides Simonk. I 214
praecox Jord. I 212
pratense L. I 211
schoenoides L. I 210
stoloniferum Host I 212
„ ventricosum Moench I 213
Pleurocarpi (Musci) VII 146
Phlomis L. V/4 2435; VII 203
Phlomidopsis tuberosa Lk. V/4 2436
Armeniaca Willd. V/4 2436
aurea Decaisne V/4 2436
Cashmiriana Royle V/4 2436
chrysophylla Boiss. V/4 2436
crinita L. V/4 2436
fruticosa L. V/4 2436
Herba venti L. V/4 2436
Lychnitis L. V/4 2436
Russeliana L. (Sims) Lag. ex Benth. V/4 2436
Samia L. V/4 2436
superba C. Koch V/4 2436
tuberosa L. V/4 2436
„ viscosa Boiss. V/4 2436
Phlomitis tuberosa Nees V/4 2436
Phlomoides tuberosa Moench V/4 2436
Phlox L. VII 199
acuminata Pursh V/3 2113
amoena Sims V/3 2113
divaricata L. V/3 2113
Drummondii Hook. V/3 2113
maculata L. V/3 2113
ovata L. V/3 2113
paniculata L. V/3 2113
pyramidalis Sm. V/3 2113
reptans Michx. V/3 2113
subulata L. V/3 2113
„ undulata Lam. V/3 2113
Phoenix L. II 130; VII 156
Phoenixopus decurrens Cass. VI/2 1129
muralis Koch VI/2 1111
„ vimineus DC. VI/2 1129
Pholiurus Trin. VII 155.
Phoradendron Nutt. III 145; VII 170
Phormium Cookianum Le Jolis II 277
„ tenax Forster II 277
Photinia Lindl. IV/2 664; VII 181
Phragmites Adans. I 271; I/LXXXIII Fig. 120; VII 155
communis Trin. I 271
flavescens Hegetschw. et Heer I 273
humilis de Notaris I 273
Isiaca Rchb. I 273
maritimus Mabille I 273
Phragmites Karst. I 271
„ vulgaris Druce I 271
Phrygia maior Gray VI/2 974
Phrymaceae VI/1 178; VII 205
Phryne Bubani IV/1 151
Columnae Bubani IV/1 179
pinnatifida Bubani IV/1 157
Sophia Britton IV/1 160
„ tanacetifolia Bubani IV/1 159
Phrynium Willd. II 321
Phthirusa Mart. III 145; VII 170
Phuopsis stylosa Griseb. VI/1 196
Phycobacteriaceae VII 155
Phycomycetes VII 140
Phygelius Capensis E. Mey. VI/1 6; VII 202 Fig. 1246
Phylica buxifolia L. V/1 326
„ ericoides L. V/1 326
Phyllanthoideae VII 185
Phyllanthus L. VII 185
anabaptizatus DC. 125
angustifolius Müll.-Aarg. V/1 125
emblica Willd. V/1 120
Niruri L. V/1 117
oreophyllus Müll.-Aarg. V/1 125
„ speciosus Jacq. V/1 125
Phyllitis Ludwig VII 149
Phyllocactus Link V/2 696
Phyllocladus Rich. I 78, 79; VII 150
Phyllocytisus sessilifolius Fourr. IV/3 1173
Phyllodoce caerulea (L.) Salisb. V/3 1621
„ taxifolia Salisb. V/3 1621
Phylloglossum Kunze I 64; VII 147
Phylloschoenus acutiflorus Fourr. II 169
„ supinus Fourr. II 167
Phyllosiphonaceae VII 138
Phyllospadix W. J. Hook I 120; VII 152
Phyllostachys Sieb. et Zucc. I 402
Physalis L. V/4 2579; VII 203
Alkekengi L. V/4 2580
angulata L. V/4 2579
edulis L. V/4 2579
Franchetii Mast. V/4 2579
lanceolata Michx. V/4 2579
longifolia Nutt. V/4 2579
minima L. V/4 2579
Peruviana L. V/4 2579
Peruviana Mill. V/4 2560
Philadelphica Lam. V/4 2579
pubescens L. V/4 2579
„ pumila Nutt. V/4 2579
Physalodes Bochm V/4 2560
Physanthyllis tetraphylla Boiss. IV/3 1353
Physaraceae VII 136
Physciaceae VII 144
Physocarpus (Cambess.) Maxim VII 180
Amurensis Maxim. IV/2 680
capitatus Pursh IV/2 680
opulifolia (L.) Maxim. IV/2 680
„ Torreyi Maxim. IV/2 680
Physocaulis nodosus (L.) Koch V/2 994
Physophora Lk. V/2 1080
Physospermum Cuss. V/2 1089; VII 194
actaeifolium Presl V/2 1081
angelicifolium Guss. V/2 1081
Cornubiense DC. V/2 1081
Cussoni Lag. V/2 1090

Physospermum verticillatum Vis. V/2 1081
Physostegia Virginiana (L.) Benth. V/4 2472
Physostigma venenosum Balf. IV/3 1624
Phytelephantoideae VII 157
Phyteuma L. VI/1 369; VII 208, 76 Fig. 1112 u. Fig. 1035
adulterinum Wallr. VI/1 387
Afligense Murr VI/1 387
angustatum Wender. VI/1 378
atropurpureum Hoppe VI/1 373
betonicifolium Vill. VI/1 374
betonicifolium Vill. var. sessilifolium A. DC. VI/1 375
canescens Waldst. et Kit. VI/1 318
Carestiae Biroli VI/1 384
Carestiae Brugn. VI/1 383
Charmelii Vill. VI/1 381
charmelioides Biroli VI/1 381
comosum L. VI/1 386
comosum Vill. VI/1 378
confusum Kern. VI/1 385
cordatum Rchb. VI/1 380
corniculatum Clairv. VI/1 381
corniculatum Gaud. VI/1 381
fistulosum Schur VI/1 378
globulariifolium Rchb. VI/1 385
globulariifolium Sternb. et Hoppe VI/1 386
Halleri All. VI/1 373; VI/2 1364
Halleri Pohl VI/1 373
hedraianthifolium R. Schulz VI/1 383
Hegetschweileri Brügg. VI/1 387
hemisphaericum Baumg. VI/1 385
hemisphaericum L. VI/1 382
hemisphaericum Roth VI/1 378
humile auct. Helv. VI/1 383
humile Roth VI/1 381
humile Schleich. VI/1 384
Huteri Murr VI/1 387
linearifolium Coll. VI/1 384
Michelii All. VI/1 377
Michelii All. var. scorzonerifolium Koch VI/1 376
Michelii Lam. et DC. VI/1 375
Michelii Lap. VI/1 382
Michelii Maly VI/1 377
Michelii Rchb. VI/1 374
Michelii Schmidt VI/1 378
Michelii Willd. VI/1 384
Murrianum Borb. VI/1 387
nigrum Maly VI/1 373
nigrum Schmidt VI/1 373
Obornyanum Hay. VI/1 388
orbiculare L. VI/1 378
orbiculare Lam. VI/1 381
ovata Lam. VI/1 381
Phyteuma ovatum Hoppe VI/1 373
pauciflorum L. z. T. VI/1 385, 386
Pedemontanum R. Schulz VI/1 385
persicifolium Hoppe VI/1 377
pilosum Hegetschw. VI/1 378
reniforme Dul. VI/1 381
scaposum R. Schulz VI/1 375
Scheuchzeri All. VI/1 381
Scheuchzeri All. var. scorzonerifolium Pers. VI/1 376
Scheuchzeri Benth. VI/1 381
Scheuchzeri Schmidt VI/1 378
scorzonerifolium Vill. VI/1 376
Sieberi Spr. VI/1 380; VII 208
spicatum L. VI/1 372; VI/2 1364
spicatum L. var. nigrum Rchb. VI/1 373
tenerum R. Schulz VI/1 379
urticifolium Clairv. VI/1 373
veronicaefolium A. DC. VI/1 375
„ Zahlbruckneri Vest VI/1 377
Phytocrena Wall. VII 187
Phytocrenaceae VII 187
Phytolacca Americana L. III 266
decandra L. III 266
„ dioeca L. III 266
Phytolaccaceae III 266; VII 172
Phytophthora infestans de Bary V/4 2603; VII 140
Phytosarcordina VII 136
Picea Dietr. I 84; VII 151
Canadensis Koehne I 84
Engelmanni Engelm. I 84
excelsa (Lam.) Lk. I 84; VII 1051, 1084, 1163
pungens Engelm. I 84
rubra Dietr. I 84
„ vulgaris Lk. I 84
Picotia scorpioides Roem. et Schult. V/3 2144
„ verna Roem. et Schult. V/3 2145
Picraena Lindl. V/1 79; VII 185
Picramnia pentandra Sw. V/1 80
Picrasma excelsa Planch. V/1 79; VII 185
Picris L. VI/2 1035; VII 212
crepoides Saut. VI/2 1039
echioides L. VI/2 1040
foetida Lam. VI/2 1173
hieracioides L. VI/2 1036
hieracioides L. subsp. auriculata (Schultz-Bip.) Hay. VI/2 1039
hieracioides L. subsp. eu-hieracioides Hay. VI/2 1038
hieracioides L. subsp. palaeacea (Vest) Hay. VI/2 1039
hieracioides L. subsp. sonchoides (Vest) Thellung VI/2 1039
Picris hieracioides L. subsp. spinulosa (Bert.) Thellung VI/2 1039
hispidissima Lecoq et Lamotte VI/2 1039
pauciflora Willd. VI/2 1035
Pyrenaica auct. VI/2 1039
rubra Lam. VI/2 1135
Sprengeriana (L.) Poir. VI/ 1035
stricta Jord. VI/2 1039
„ Tatrae Borb. VI/2 1039
Pieris Mariana Benth. et Hook. V/3 1651
Pilea muscosa Lindl. III 137
radicans Wedd. III 141
„ Wightii Wedd. III 141
Pilocarpus Vahl I 84
pauciflorus St. Hil. V 1 51
pennatifolius Lam. V/1 51
„ Selloanus Engl. V/1 51
Pilocereus V/2 693
Pilosella Hoppeana Sz. Sz. VI/2 1196
Pilostyles Guillem. VII 170
Pilularia Vaill. I 49; VII 149
globulifera L. I 49
„ minuta Dur. I 49
Pimelia Banks et Soland. V/2 702
Pimenta acris Wight V/2 777
„ officinalis Berg V/2 776
Pimpinella L. V/2 1196; VII 194
alpestris Schult. V/2 1206
Anisum L. V/2 1209
anisum cultum Alef. V/2 1209
Austriaca Mill. V/2 1201
Bulbocastanum Jess. V/2 1191
Carvi Jess. V/2 1182
Cretica Poir. V/2 1197
crispa Hornem. V/2 1202
Danaa Bieb. V/2 1081
dichotoma Spr. V/2 1136
dioeca L. V/2 1132
dioeca Pall. V/2 1132
dissecta Retz. V/2 1205
dumetorum Boenningh. V/2 1199
flexuosa Stok. V/2 1195
Genevensis Vill. V/2 1205
glauca L. V/2 1132
Gouani Jacks. V/2 1231
hispida Loisel. V/2 1197
intermedia V/2 1209
magna L. V/2 1199
maior (L.) Huds. V/2 1199
media Web. V/2 1199
minor Bubani V/2 1202
nigra Mill. V/2 1206
nodiflora Stok. V/2 1148
officinalis Gilib. IV/2 937
Orientalis Gouan V/2 1201
peregrina DC. V/2 1197
peregrina L. V/2 1197
pratensis Thuill. V/2 1205
pubescens Desmaz. V/2 1204
pumila Jacq. V/2 1132

Pimpinella rhodantha Boiss. V/2 1201
rotunda Dul. V/2 1202
rubra Hoppe et Schleich. V/2 1200
rugosa Kunze V/2 1200
Sanguisorba Gaertn. IV/2 939
saxifraga L. V/2 1202
segetum Spr. V/2 1154
seselinoides Marchesetti V/2 1231
Sisarum Jess. V/2 1222
subcrenata Dalla Torre V/2 1200
„ variifolia Salisb. V/2 1202
Pinaceae I 81; VII 150
Pinardia coronaria Lessing VI/2 592
Pinellia tuberifera Ten. II 131
Pinguicula L. VI/1 155; VI/1 255; VII 205 u. 24 Fig. 1042
alpina L. VI/1 158; VI/2 1363
Arveti Genty VI/1 162
flavescens Floerke VI/1 158
grandiflora Gaud. VI/1 161
grandiflora Lam. VI/1 162
grandiflora Lam. subsp. Reuteri (Genty) Schindler VI/1 162
Hellwegeri Murr VI/1 161
leptoceras Rchb. VI/1 161; VI/2 1363
Norica Beck VI/1 160
purpurea Willd. VI/1 158
„ vulgaris L. VI/1 160
Pinus L. I 96; VII 151
Austriaca I 106
Cembra L. I 103
digenea Wettst. I 107
excelsa Wall. I 97
Halepensis Mill. I 97
montana Mill. I 100
nigra Arnold I 106
nigricans Host I 106
Picea L. I 82
Pinea L. I 97
ponderosa Dougl. I 97
Pumilio I 103
Raetica Brügg. I 107
rigida Mill. I 97
silvestris L. I 97
Strobus L. I 97
„ uncinata I 103
Piper Betle L. III 209
Cubeba L. III 209
„ nigrum L. III 209
Piperaceae III 200; VII 165
Piperales III 209; VII 165
Piptanthus Nepalensis D. Don IV/3 1146
Piptatherum multiflorum Pal. I 207
„ paradoxum Koch I 207
Pipturus argenteus Wedd. III 137
Piriqueta Aubl. V/1 657
Pirola L. V/3 1571; VII 195 u. 20 Fig. 1024
Pirola chlorantha Sw. V/3 1580
convallariaeflora Genty V/3 1583
media Sw. V/3 1583
minor L. V/3 1577
rotundifolia (L.) Fernald V/3 1585
secunda L. V/3 1574
umbellata L. V/3 1593
uniflora L. V/3 1589
„ virens Schw. V/3 1580
Pirolaceae V/3 1568; VII 195
Pirus L. IV/2 694; VII 181
acerba DC. IV/2 745
alnifolia Franch. et Sav. IV/2 707
Amelanchier L. fil. IV/2 756
Americana DC. IV/2 707
amygdaliformis Vill. IV/2 694
apetala Münchh. IV/2 747
arbutifolia L. f. IV/2 706
Aria Ehrh. IV/2 713
aucupara Gaertn. IV/2 708
Chamaemespilus Pall. IV/2 721
communis L. IV/2 695
cuneifolia Vis. IV/2 697
Cydonia L. IV/2 689
dasyphylla Borkh. IV/2 747
decipiens Bechst. IV/2 716
dioeca Moench IV/2 747
edulis Willd. IV/2 715
elaeagrifolia Pall. IV/2 695
eriopleura Rchb. IV/2 697
fucsa Raf. IV/2 744
Graeca Loddiges IV/2 707
Japonica Thunb. IV/2 693
intermedia Bechst. IV/2 715
Malus L. IV/2 745
Malus silvestris L. IV/2 745
melanocarpa Willd. IV/2 706
meridionalis Guss. IV/2 707
microcarpa Wendl. IV/2 743
Nebrodensis Guss. IV/2 685
Niedzwetzkyana Hemsley IV/2 747
nivalis Jacq. IV/2 697
ovalis Willd. IV/2 755
Piraster L. IV/2 695
Pollweria L. IV/2 706
praecox Pall. IV/2 747
pulcherrima Aschers. et Graebn. IV/2 743
pumila Mill. IV/2 745
Ringo C. Koch IV/2 744
salicifolia L. IV/2 695
salvifolia DC. IV/2 697
Sieversii Ledeb. IV/2 747
Sorbus Gaertn. IV/2 711
Suecica Garcke IV/2 716
sylvestris S. F. Gray IV/2 745
„ torminalis Ehrh. IV/2 719
Pistacia L. V/1 229; VII 186
Atlantica Desf. V/1 232
Pistacia Lentiscus L. V/1 230
mutica Fisch. et Mey. V/1 232
Terebinthus L. V/1 232
„ vera L. V/1 231
Pistia Stratiotes II 131; VII 158
Pistoideae VII 158
Pisum L. IV/3 1610; VII 183
arvense L. IV/3 1613
elatum DC. IV/3 1613
ensifolium Krause IV/3 1577
granulatum Lloyd IV/3 1613
heterophyllum Krause IV/3 1599
hirsutum Krause IV/3 1602
Klinggraeffianum Krause IV/3 1585
Lathyrus Krause IV/3 1604
latifolium Krause IV/3 1597
luteum Krause IV/3 1569
maritimum L. IV/3 1585
montanum Krause IV/3 1580
nigrum Krause IV/3 1572
Ochrus L. IV/3 1565
odoratum Krause IV/3 1564
pachylobum Dierbach IV/3 1612
palustre Krause IV/3 1582
Pannonicum Krause IV/3 1579
rubrum Krause IV/3 1603
sativum L. IV/3 1610
tuberosum L. IV/3 1591
Tuffetii Lesson IV/3 1613
variegatum Presl IV/3 1613
„ vernum Krause IV/2 1574
Pithecolobium Avaremotemo Mart. IV/3 1123
Pithecoctenum Mart. VII 204
Pittosporaceae IV/2 654; VII 179
Pittosporum Chinense Don IV/2 654
„ Tobira (Thunb.) Ait. IV/2 654
Plagianthus Forst. VII 188
Plagiobotrys Fink et Mey. VII 200
calandrinoides (Phil.) Johnston VII 200
Planera acuminata Ldl. III 117
aquatica J. F. Gmelin VII 168
„ crenata Desf. III 117
Plantae cellulares VII 135
„ vasculares VII 147
Plantaginaceae VI/1 178; VII 205
Plantaginales VII 205
Plantago L. VI/1 178; VII 205 und Fig. 1045, 1076, 1156
albicans L. VI/1 180
alpina L. VI/1 191; VI/2 1363
altissima L. VI/1 185
arenaria Waldst. et Kit. VI/1 193
arenarium Mirb. VI/1 193
argentea Chaix VI/1 185
Asiatica L. VI/1 182
atrata Hoppe VI/1 186
Bellardii All. VI/1 180

Plantago capitata Hoppe et Hornsch. VI/1 185
capitata Ten. VI/1 184
carinata Schrad. VI/1 192
cinerascens Ser. VI/1 192
Coronopus L. VI/1 188
Cynops L. VI/1 193
dentata Roth VI/1 180
depressa Willd. VI/1 180
dubia L. VI/1 184
erectum Garsault VI/1 193
fuscescens Jord. VI/1 187
Genevensis Mirbel VI/1 193
glareosa Kern. VI/1 184
graminea Lam. VI/1 189
Indica L. VI/1 193
intermedia Gilib. VI/2 1363
Lagopus L. VI/1 180
lanata Host VI/1 184
lanceolata L. VI/1 183; VI/2 1363; VII 120 Fig. 1156
lanceolata L. var. altissima Koch VI/1 185
limosa Kit. VI/1 182
maior L. VI/1 181; VI/2 1363
maritima Koch VI/1 190
maritima L. VI/1 189
maxima Jacq. VI/1 180
media L. VI/1 182
montana Lam. VI/1 186
oblongifolia Schur VI/1 183
Patagonica Jacq. var. aristata A. Gray VI/1 180
pilosa Pourret VI/1 180
Psyllium L. VI/1 179, 180, 194
ramosa (Gilib.) Aschers. VI/1 193; VI/2 1363
sericea Waldst. et Kit. VI/1 185
serpentina All. VI/1 190
serpentina Koch VI/1 192
stricta Schousb. VI/1 180
suffruticosa Lam. VI/1 193
supina (Garsault) Schinz et Keller VI/1 193
tenuiflora Waldst. et Kit. VI/1 187
Uvillei Opiz VI/1 183
Victorialis Poiret VI/1 185
„ Wulfenii Bernh. VI/1 190
Plasmodiophora Brassicae Woron. IV/1 251
Plasmodiophoraceae VII 139
Plasmopara viticola Berl. et De Toni V/1 421
Platanaceae IV/2 657; VII 180
Platanthera Rich. II 372; VII 164
bifolia (L.) Rich. II 372; VII 3 Fig. 970 b
chlorantha (Custer) Rchb. II 373
Erdingeri Kern. II 364
hybrida Brügg. II 373
Platanthera montana (Schmidt) Rchb. f. II 373
solstitialis Boenningh. II 372
virescens K. Koch II 373
„ viridis Lindl. II 363
Platanus L. IV/2 657; VII 180
acerifolia Willd. IV/2 660
hybrida Brot. IV/2 659
insularis DC. IV/2 661
lobata Moench IV/2 659
Occidentalis L. IV/2 659
„ Orientalis L. IV/2 661
Platycapnos spicatus Bernh. IV/1 45
Platycarpa strobilaceae Sieb. et Zucc. VII 167
Platycentrum annulatum C. Koch V/1 667
Platycerium Desv. VII 149
Platycodon L. VII 209
Platyspermum Hoffm. V/2 1501
Koch V/2 1066
aureum Pomel V/2 1505
grandiflorum Mert. et Koch V/2 1069
muricatum Hoffm. V/2 1505
Orientale Eichw. V/2 1060
„ pulcherrimum Koch V/2 1060
Platystemon Benth. VII 176
Platystigma Benth. VII 177
Plectascales VII 140
Plectobasidiales VII 143
Plectranthus L'Hérit. V/4 2270
barbatus Andr. V/4 2271
Barrelieri Spr. V/4 2269
fruticosus L'Hérit. V/4 2270
glaucocalyx Maximovicz V/4 2271
Nankinensis Spr. V/4 2272
nudiflorum Willd. V/4 2271
„ scutellarioides Br. V/4 2271
Plectritis DC. VII 208
Pleonandrae VII 164
Pleospora gummipara Oudem. IV/3 1124
Pleroma DC. VII 192
Pleuricospora Gray VII 195
Pleurococcaceae VII 137
Pleurogyna Eschscholz V/3 1976; VII 198
„ Carinthiaca G. Don V/3 1977
Pleurogyne Carinthiaca Griseb. V/3 1977
Pleuropterus Benth. et Hook. VII 171
Pleurospermum Hoffm. V/2 1089; VII 194
Austriacum (L.) Hoffm. V/2 1090
cicutarium D. Dietr. V/2 1046
Golaka Rchb. V/2 1087
„ Uralense Hoffm. V/2 1090
Pleurothallis R. Br. VII 165
Plumbagidium auriculatum Spach V/3 1878
Plumbaginaceae V/3 1877; VII 197
Plumbaginales VII 197
Plumbago L. V/3 1878; VII 197
angustifolia Spach V/3 1878
auriculata Lam. V/3 1878
Capensis Thunb. V/3 1878; VII 197, Fig. 1237
coccinea DC. V/3 1879
Europaea L. V/3 1878
flaccida Moench V/3 1879
grandiflora Ten. V/3 1878
Larpentae Lindl. V/3 1879
pulchella DC. V/3 1879
rosea L. V/3 1879
scandens Lam. V/3 1879
„ Zeylanica L. V/3 1879
Pluchea Cass. VII 209
Plumieria V/3 2051
„ acutifolia Poir. V/3 2050
Plumieroideae V/3 2084; VII 198
Pneumonanthe asclepiadea Schmidt V/3 1998
frigida Schmidt V/3 2003
„ vulgaris Schmidt V/3 2000
Poa L. I 299; VII 155
alpina L. I 309
alpina L. var. Badensis Koch I 311
alpina L. pumila Rchb. I 311
altissima Moench I 321
angustifolia Poll. I 305
angustifolia Wahlenb. I 317
annua L. I 301
aquatica L. I 321
athroostachya v. Oettingen VII 155
Badensis Haenke I 311
Banatica Willd. I 353
brizoides Wohlleb. I 311
bulbosa L. I 308
caesia Sm. I 313
Cenisia All. I 314
Chaixii Vill. I 303
collina Host I 311
compressa L. I 303
concinna Gaud. I 307
costata Schum. I 307
decumbens Scop. I 275
distans L. I 323
disticha Wulf. I 266
distichophylla Gaud. I 314
divaricata Vill. I 309
dolosa Nym. I 312
dubia Leers I 304
dulcis Salisb. I 288
dura Scop. I 299
effusa Kit. I 317
elegans Lam. et DC. I 312
Eragrostis All. I 279
Eragrostis L. I 279, 280
fertilis Host I 317
Figerti Gerh. I 317

Poa filifolia Schur I 307
flexuosa Host I 314
flexuosa Sm. I 312
Gaudini Roem. et Schult. I 313
glabra Poll. I 305
glauca Schkuhr I 282
grandiflora Rich. I 284
Halleridis Roem. et Schult. I 315
hybrida Gaud. I 304
Jurana Genty I 304
Langeana Rchb. I 303
laxa Haenke I 312
Lithuanica Gorski I 322
marginata Schleich. I 312
maritima Huds. I 324
maritima Savi I 323
megastachya Koeler I 280
minor Gaud. I 313
Molinerii Lam. et DC. I 307
multiflora Forsk. I 280
nemoralis L. I 315
nitida Lam. I 286
nutans Gilib. I 315
oreophila Heldr. I 314
palustris L. I 317
pectinata Lam. I 283
Persica Trin. I 317
pilosa L. I 279
polynoda Parn. I 303
pratensis All. nec L. I 304
pratensis L. I 305
pulchella Bieb. I 354
pumila Host I 311
pyramidata Lam. I 284
remota Forselles I 322
reptans Michx. I 317
rubens Moench I 303
salina Poll. I 323
Sanionis Aschers et Graebn. I 317
scabra Ehrh. I 304
semineutra Trin. I 305
serotina Ehrh. I 317
silvatica Poll. I 352
silvatica Vill. I 303
spadicea Koel. I 346
stolonifera Bell. I 314
Sudetica Haenke I 303
supina Baumg. I 312
supina Panzer I 313
supina Schrad. I 302
tenella Pursh I 280
tremula Schur I 312
triangularis Gilib. I 301
triflora Gilib. I 317
trinervata Ehrh. I 352
trinervata Lam. et DC. I 303
trivialis L. I 304
verticillata Cav. I 279
violacea Bell. I 301
„ vivipara L. I 310
Podagraria Hill V/2 1212
Aegopodium Moench V/2 1212
Podagraria erratica Bubani V/2 1212
Podalirieae IV/3 1146; VII 182
Podanthum canescens Boiss. VI/1 368
Podocarpaceae VII 150
Podocarpus L'Hér. I 78, 79; VII 150
Podochaenium eminens Schultz-Bip. VI/1 528
„ paniculatum Benth. VI/1 528
Podocytisus Boiss. et Heldr. IV/3 1161
Podogonium IV/3 1127
Podolepis acuminata R. Br. VI/1 495
canescens Grah. VI/1 495
„ gracilis Grah. VI/1 495
Podoon Baill. V/1 218
Podopetalum Gaud. V/2 1299
„ nodiflorum Gaud. V/2 1299
Podophyllum peltatum L. IV/1 5
Podospermum DC. VI/2 1067; VII 212
calcitrapifolium DC. VI/2 1071
canum C. A. Meyer VI/2 1068
Jacquinianum Koch VI/2 1068
intermedium Gouan VI/2 1071
laciniatum (L.) DC. VI/2 1069
octangulare DC. VI/2 1068
„ resedifolium DC. VI/2 1071
Podostemonaceae IV/2 654; VII 179
Poga oleosa Pierre V/2 769
Pogostemon Cablin Benth. V/4 2273
comosus Miq. V/4 2273
Hayneanus Benth. V/4 2273
Patchouli Pelletier V/4 2273
„ suavis Ten. V/4 2273
Poinciana L. VII 181
„ regia (Dietr.) Bojer IV/3 1129
Poinsettia Grah. V/1 136; VII 186
Poivrea coccinea DC. V/2 773
Polanisia graveolens Raf. IV/1 490
Polemoniaceae V/3 2111; VII 199
Polemonium (Tourn.) L. V/3 2114; VII 200
caeruleum L. V/3 2114
dissectum Rchb. V/3 2114
elatum Salisb. V/3 2114
lacteum Lehm. V/3 2114
Limprichtii Lingelsh. V/3 2114
reptans L. V/3 2114
Sibiricum D. Don V/3 2114
valerianaefolia Gilib. V/3 2114
„ vulgare S. F. Gray V/3 2114
Polium montanum Mill. V/4 2525
Pollichia amplexicaulis Willd. V/4 2452
Galeobdolon Roth V/4 2441
montana Pers. V/4 2443
„ vulgaris Pers. V/4 2442
Pollinia Gryllus Spr. I 183
Polyanthemum Med. V/3 1885
Polyanthes tuberosa L. II 319; VII 163 Fig. 1196
Polycardia Juss. VII 187
Polycarpaea Lam. VII 173
Polycarpicae IV/1 12; VII 173
Polycarpon Loefling III 426; VII 173
tetraphyllum L. III 426; VII 74 Fig. 1109 a
Polycnemum L. III 211; VII 171
Schrank III 212
arvense L. III 212
Heuffelii Láng III 212
maius R. Br. III 212
minus Kit. III 212
triandrum Schrank III 212
verrucosum Láng III 213
„ vulgare Pall. III 212
Polygala (Tournef.) L. V/1 89; VII 185
alba Nutt. V/1 90
alpestris Rchb. V/1 104
alpina (DC.) Steud. V/1 112
amara Dumort. V/1 107
amara L. V/1 108
amara L. subsp. amarella Crtz. V/1 109
amara L. subsp. eu amara Aschers. et Graebn. V/1 109
amarella Rchb. V/1 108
arenaria Moritzi V/1 100
Badensis Schimp. et Spenn. V/1 105
Balatonica Borb. V/1 111
blepharoptera Borb. V/1 103
bracteolata L. V/1 89
butyracea Heck. V/1 90
calcarea F. W. Schultz V/1 107
Carniolica Kern. V/1 97
Chamaebuxus L. V/1 91
„ comosa Schkuhr V/1 98
Corsica Gremli V/1 99
Costaricensis Chodat V/1 90
Croatica Chodat V/1 108
cruciata L. V/1 90
depressa Wender. V/1 105
flavescens DC. V/1 90
Forojulensis Kern. V/1 97
glacialis Brügg. V/1 112
heterophylla F. W. Schultz V/1 107
hybrida Brügg. V/1 113
Lejeunei Michal. V/1 103
magna Georgi V/1 95
major Jacq. V/1 95
Mediterranea Dalla Torre et Sarnthein V/1 97
Michaleti Gren. V/1 103
microcarpa Gaud. V/1 104
multicaulis Kit. V/1 108
mutabilis Dum. V/1 105
myrtifolia L. V/1 89
Nicaeensis Risso V/1 96
nivea Mièger. V/1 112
paludosa Bönningh. V/1 105
paniculata L. V/1 90
Podolica (DC.) V/1 100

Polygala rosea Desf. V/1 90
rosea Gren. et Godr. V 97
Senega L. V/1 89
serpyllacea Weihe V/1 105
serpyllifolia J. A. C. Hose V/1 105
Sibirica L. V/1 90
Skřivanekii Podpěra V 1 113
tenuifolia Lk. V/1 90
Transsilvanica Schur V/1 100
Vilhelmi Podpěra V/1 113
vulgaris L. V/1 101
vulgaris L. var. comosa Coss. et Germ. V/1 98
Polygalaceae V/1 68; VII 185
Polygalineae VII 185
Polygalum Buchenau V/1 89
serpyllaceum Holzner et Naegele VI/1 105
Polygonaceae III 165; VII 170
Polygonales III 209; VII 170
Polygonatum All. II 269; VII 162 und 39/40 Fig. 1066, 1067
anceps Moench II 270
glaberrimum K. Koch II 270
latifolium Desf. II 270
majale All. II 274
multiflorum All. II 270; VII 39/40 Fig. 1066, 1067 a
officinale All. II 270
Polygonatum Jirasek II 270
uniflorum St. Hilaire II 270
verticillatum All. II 273; VII 162 u. 40 Fig. 1067 b
„ vulgare Desf. II 270
Polygonifolia litoralis O. Kuntze III 427
Polygonoideae VII 170
Polygonum L. III 188; VII 170 u. 18 Fig. 1018
affine Don III 190
alatum Dulac III 205
alpinum All. III 193; VII 171
amphibium L. III 197
amplexicaule Don III 190
angustifolium Roth III 204
arenarium Waldst. et Kit. III 190
aviculare L. III 191
Baldschuanicum Regel VII 170 Fig. 1211
Bellardii All. III 190
Bistorta L. III 194
Braunianum F. Schultz III 207
Braunii Bluff III 203
calcatum Lindmann VII 171
carneum C. Koch III 194
cilinode Michx. III 190
cognatum Meißner VII 171
condensatum F. Schultz III 207
convolvuloides Brügg. III 207
Convolvulus L. III 205
cuspidatum Sieb. III 189; VII 18 Fig. 1018
Polygonum divaricatum Vill. III 193
Douglasii Greene VII 171
dubium Stein III 203
dumetorum L. III 205
ellipticum Willd. III 194
equisetiforme Sibth. III 190
exannulatum Beck III 206
Fagopyrum L. III 207
geniculatum Poir. III 191
glandulosum Poir. III 202
Hervieri Beck III 206
heterocarpum Beck III 207
humifusum Jord. III 191
hybridum Chaub. III 206
Hydropiper L. III 202
intermedium Ehrh. III 204
lanigerum R. Br. III 190
lapathifolium L. III 198
laxiflorum Weihe III 203
laxum Rchb. III 206
maculatum Raf. III 200
Metschii Beck III 206
microcarpum Jord. III 190
minoriflorum F. Schultz III 207
minus Huds. III 204
mite Schrank III 203
Monspeliense Guss. III 190
nanum Bovy III 191
oleraceum Schur III 206
Orientale L. III 190
perfoliatum L. III 190
Persicaria L. III 200
plebejum R. Br. VII 171
polystachyum Wallr. VII 171
pulchellum Lois. VII 171
purpureum Gilib. III 197
pusillum Lam. III 204
Raji Babingt. III 193
Roberti Loisel. III 193
Sacchalinense F. Schmidt III 190
Sibiricum L. III 193
Sieboldii hort. III 189
Silesiacum Beck III 206
strictum All. III 204
subglandulosum Borb. III 206
Tataricum L. III 209
tinctorium Ait. III 190
Virginianum L. III 190
viviparum L. III 196
volubile Gilib. III 205
„ Wilmsii Beck III 206
Polypetalae III 6; VII 165
Polypodiaceae I 8; VII 148
Polypodium L. I 40; VII 149
calcareum Sm. I 16, 57
vulgare L. I 41; VII Fig. 1091
vulgare L. subsp. serratum Willd. I 41
Polypogon elongatus Humb., Bonpl. et Kth. I 222
„ Monspeliensis Desf. I 221
Polypompholyx Lehm. VII 205
Polyporaceae VII 142
Polyporales VII 142
Polystichum rigidum DC. I 19
Polytoca Brown I 178
Polytrichaceae VII 146
Pomaderris Labill. V/1 325
Pomatosace Maxim. V/3 1728
Pomoideae IV/2 663; VII 181
Pontederia cordata L. II 143
Pontederiaceae II 143; VII 158
Populus L. III 57; VII 167
alba L. III 59
Atheniensis Ludwig III 58
australis Ten. III 61
Bachofenii Wierzb. III 65
Bakeri III 58
balsamifera L. III 58
Bonplandiana H. B. et Kth. III 58
Canadensis Moench III 57
candicans Ait. III 58
canescens Sm. III 65
Comesiana Dode III 58
deltoides Marsh. III 57
Euphratica Oliv. III 58
fastigiata Desf. III 64
Graeca Griseb. III 61
hybrida Bieb. III 65
Illicitana Dode III 58
Italica Moench III 64
laurifolia Ledeb. III 58
Marilandica Poir. III 57
monilifera Ait. III 57
nigra L. III 62
Ontariensis Desf. III 58
pyramidalis Roz. III 64
Sieboldii Miq. III 58
Simoni Carr. III 58
Steiniana Bornm. III 65
suaveolens Fisch. III 58
subintegerrima Lge. III 58
Tacamahaca Mill. III 58
tremula L. III 60
trichocarpa Hook. III 58
tristis Fisch. III 58
„ Virginiana Fougeroux III 57
Porantheroideae V/1 118; VII 186
Porcellites radicata Cass. VI/2 1013
Porlieria hygrometrica Ruiz et Pav. V/1 40
Porphyranthus Engler VII 183
Porrum Ampeloprasum L. II 231
Ascalonicum Rchb. II 232
Cepa Rchb. II 232; VII 97 Fig. 1125
commune Rchb. II 231
Ophioscorodon Rchb. II 231
rotundum Rchb. II 216
scorodoprasum L. II 216
strictum Rchb. II 220
„ vineale Rchb. II 217
Portulaca L. III 269; VII 172
grandiflora Hook. III 268, 269; VII 172 Fig. 1213
officinarum Crtz. III 269

Portulaca oleracea L. III 269
„ parvifolia Haw. III 269
Portulacaceae III 268; VII 172
Portulacaria afra Jacq. III 268
Posidonia König I 120; VII 152
Potamogeton L. I 121; VII 152
acuminatum Wahlenb. I 127
acutifolius Lk. I 133
alpinus Balb. I 126
caespitosus Nolte I 135
cognatus Aschers. et Graebn. I 139
coloratus Vahl I 126
complanatum Willd. I 132
compressus L. I 132
crispus L. I 132; VII 122 Fig. 1159
decipiens Nolte I 139
densus L. I 138
fallax Aschers. et Graebn. I 139
filiformis Pers. I 138; VII 152
flexuosum Wredow I 127
fluitans Roth I 125
Gessnacensis Fisch. I 139
gramineus L. I 130
Heidenreichii A. et Gr. I 139
Hornemanni Koch I 126
lanceolatus Sm. I 139
Lithuanicus Gorski I 139
lucens L. I 128
marinum L. z. T. I 138
monogynus Gay I 136
mucronatus Schrad. I 134
natans L. I 123
nitens Web. I 131; VII 152
Noltei Fisch. I 139
oblongum Viv. I 124
obtusifolius Mert. et Koch I
Panormitanus Biv. I 135; VII 152
pectinatus L. I 137
perfoliatus L. I 127
plantagineum Du Croz I 126
polygonifolius Pourret I 124
praelongus Wulf. I 127
pusillus L. I 134
rufescens Schrad. I 126
rutilus Wolfgang I 135
Schreberi Fisch. I 139
Seemenii Aschers. et Graebn. I 139
semipellucidus Koch et Ziz I 126
serratum Huds. I 132
setaceum Schum. I 138
spathulatus Schrad. I 139
trichoides Cham. et Schlecht. I 136; VII 152
undulatus Wolfgang I 139
varians Morong I 139
Zizii Mert. et Koch I 129; VII 152
zosterifolium Schuhmacher I 132
Potamogetonaceae I 120; VII 152
Potentilla L. IV/2 809; VII 180
acaulis L. IV/2 877
adpressa Opiz IV/2 848
adscendens Waldst. et Kit. IV/2 840
aestiva Siegfried IV/2 881
affinis Host IV/2 870
alba L. IV/2 823
alba Moench IV/2 821
albipellis Borb. IV/2 840
alpestris Hall. f. IV/2 868
alpicola De la Soie IV/2 848
ambigua Gaud. IV/2 892
Amthoris Huter IV/2 892
Amurensis Maxim. IV/2 855
Anserina L. IV/2 889
arenaria Borkh. IV/2 878
argentata Jord. IV/2 839
argentea L. IV/2 837
Argentina Huds. IV/2 889
argyrophylla Wallich IV/2 813
Arthuriana Hofm. IV/2 842
atrisanguinea Zoddiges IV/2 813
aurea Gaud. IV/2 868
aurea L. IV/2 872
aurulenta Gremli IV/2 881
autumnalis Opiz IV/2 881
Baldensis Kern. IV/2 871
balzanensiformis Saut. IV/2 848
Bayeri Domin IV/2 848
Bellunensis Huter et Porta IV/2 892
Beniczkyi Friv. IV/2 831
Besseana Siegfried IV/2 891
bicolor Lindl. IV/2 813
bifurca L. IV/2 813
Bithynica Hornem. IV/2 870
Bohemica Blocki IV/2 842
Bouquoyana Knaf IV/2 865
Brauniana Hoppe IV/2 865
Brennia Huter IV/2 892
breviscapa Vest IV/2 829
Buseri Siegfried IV/2 848
canescens Bess. IV/2 840
cardinalis hort. IV/2 813
Carniolica A. Kern. IV/2 830
caulescens L. IV/2 821
caulescens Moench IV/2 823
Chodatiana Paiche IV/2 881
chrysantha Treviranus IV/2 863, 864, 892
cicutariifolia Willd. IV/2 855
cinerae Gaud. IV/2 879
cinerea Koch et auct. IV/2 878, 879
cinerea Rafin. IV/2 839
Clusiana Genersich IV/2 823
Clusiana Jacq. IV/2 820
collina Wibel IV/2 843/844
colorata Lehm. IV/2 813
Comarum Nestler IV/2 805
Potentilla commutata Blocki IV/2 842
confusa E. H. L. Krause IV/2 887
cordata Schrank IV/2 823
corymbosa Moench IV/2 848
Crantzii Beck IV/2 868
crassa Uechtritz IV/2 843
crassicaulis Blocki IV/2 842
Davurica Nestler IV/2 813
decipiens Jord. IV/2 845
decumbens Jord. IV/2 839
demissa Jord. IV/2 839
dichotoma Moench IV/2 858
diffusa Rchb. IV/2 859
diffusa Willd. IV/2 858
digitato-flabellata A. Br. et Bouché IV/2 859
dissecta Zimmeter IV/2 840
dubia Moench IV/2 873
dubia (Crtz.) Zimmeter IV/2 865
Engadinensis Brügg. IV/2 892
erecta (L.) Hampe IV/2 882
fallax Zimmeter IV/2 887
Fintelmanni Otto IV/2 813
Fontolii Colla IV/2 819
Fragaria Poiret IV/2 826
Fragariastrum Ehrh. IV/2 826
fragariifolia Gmelin IV/2 826
fragarioides Vill. IV/2 826
Friedrichseni Spaeth IV/2 813
frigida Vill. IV/2 866
fruticosa L. IV/2 816
Galiciana Schult. IV/2 884
Gallica Siegfried IV/2 861
Gaudini Gremli IV/2 879
Gelmiana Siegfried IV/2 880
geminiflora Schrank IV/2 858
geoides Bieb. IV/2 813
geranioides Thomas IV/2 892
Ginsiensis Waisb. IV/2 881
glabrata Willd. IV/2 813
glacialis Hall. f. IV/2 866
glandulifera Krasan VI/2 879, 880
glandulosa Boulay IV/2 871
Graja Beyer IV/2 892
grammopetala Moretti IV/2 819
grandiceps Zimmeter IV/2 838
grandiflora L. IV/2 861
grandiflora Scop. IV/2 879
Gremblichii Gandoger IV/2 891
grossa Dougl. IV/2 856
Gunneri Hartm. IV/2 826
haematosticta Goiran IV/2 880
Halleri Ser. IV/2 872
Halleriana Tratt. IV/2 865
Hausmanni Uechtr. IV/2 844
Heerii Brügg. IV/2 873, 892
Hegetschweileri Brügg. IV/2 892
Heidenreichii Zimmeter IV/2 861

Potentilla Hellwegeri Murr IV/2 871
Helvetica Schleich. IV/2 866
heptaphylla Lehm. IV/2 863
heptaphylla L. IV/2 873
heptaphylla L. subsp. australis (Krašan) Beck IV/2 875
heptaphylla Mill. IV/2 852
hirsuta Michx. IV/2 858
hirta Haenke IV/2 840
hirta L. IV/2 852
Hoelzii Blocki IV/2 842
humifusa Zimmeter IV/2 845
Hungarica Willd. IV/2 840
Huteri Siegfried IV/2 892
hybrida hort IV/2 813
hybrida Wallr. IV/2 891
Jaeggiana Siegfried IV/2 843
impolita Wahlenb. IV/2 839
incana Fl. Wetterau IV/2 878/879
incanescens Opiz IV/2 839
incisa Desf. IV/2 870
inclinata (Ser.) Mert. et Koch IV/2 840
incrassata Zimmeter IV/2 843
Indica Th. Wolf IV/2 907
intermedia L. IV/2 859
intermedia Roth IV/2 848
intermedia Vill. IV/2 863
intermedia Wahlenb. IV/2 840
intricata Gremli IV/2 881
Johanniana Goiran IV/2 844
Jurana Reuter IV/2 871
Kaeseri Siegfried IV/2 848
Kerneri Borb. IV/2 891
Koernickei Uechtr. IV/2 847
laeta Rchb. IV/2 853
lanata Zimmeter IV/2 888
Laresciae R. Keller IV/2 871
Leucopolitana Ph. J. Müller IV/2 847
leucotricha Zimmeter IV/2 851
limosa Zimmeter IV/2 855
Lindackeri Tausch IV/2 847, 848
longifolia Poev. IV/2 881
longifrons Borb. IV/2 880
maculata Pourr. IV/2 868
Matzialekii Opiz IV/2 892
Menziesii Paxt. IV/2 813
micrantha Ramond IV/2 829
microphylla Zimmeter IV/2 888
millegrana Dougl. IV/2 856
minima Haller f. IV/2 865
minutosa Zimmeter IV/2 839
mixta Nolte IV/2 887
Montenegrina Pantocsek IV/2 861
Morisonii DC. IV/2 858
multifida L. IV/2 834
Murithii Besse IV/2 848
neglecta Baumg. IV/2 839
nemoralis Necker IV/2 884
Nepalensis Hook. IV/2 813
Potentilla Nestleriana Tratt. IV/2 863, 865
Neumanniana Rchb. IV/2 881
Neumanniana Wimm. IV/2 881
nitida L. IV/2 817
nitida Scop. IV/2 823
nivea L. IV/2 836
Norwegica All. et Suter IV/2 866
Norwegica L. IV/2 856, 858
obscura Nestler IV/2 848
obtusifolia Schleich. IV/2 870
Oenipontana Murr IV/2 880
opaca Krocker IV/2 840
opaca L. IV/2 873
opaca Vill. IV/2 879
opaca Zimmeter IV/2 880
Opizii Domin IV/2 848
pallens Moench IV/2 848
palustris Scop. IV/2 805
parviflora Desf. et Clairv. IV/2 829
parviflora Gaud. IV/2 863, 865
patula Waldst. et Kit. IV/2 875
Pedemontana Reuter IV/2 861
Pennina Gremli IV/2 892
perincisa Zimmeter IV/2 839
petiolulata Gaud. IV/2 823
pilosa Vill. IV/2 852
pilosa Willd. IV/2 851
Podolica Blocki IV/2 842
polymorpha Spenn. IV/2 876
praecox F. Schultz IV/2 846
Prechtelsbaueri Poev. IV/2 881
procumbens Clairv. IV/2 893
procumbens Sibth. IV/2 884
prostrata Gremli IV/2 881
prostrata Haenke IV/2 854
prostrata Moench IV/2 826
pseudo-argentea Blocki IV/2 891
pseudochrysantha Zimmeter IV/2 864
pseudo-Leucopolitana Zimmeter IV/2 847
pseudorubens Siegfried IV/2 881
puberula Krašan IV/2 879
pubescens Poev. IV/2 883
pulchella Brügg. IV/2 892
Raetica Brügg. IV/2 892
recta L. IV/2 840, 848
recta Wahlenb. IV/2 883
reducta Rouy et Camus IV/2 884
Reineckei Sagarski IV/2 891
reptans L. IV/2 887
Rhenana Ph. J. Müll. IV/2 848
Riddensis Besse IV/2 892
Roemeri Friv. IV/2 831
rotundifolia Vill. IV/2 870
rubens All. IV/2 852
rubens Moench IV/2 831
rubens Vill. et Pourr. IV/2 870
Potentilla rubens Zimmeter IV 2 875
rubra Hall. f. IV/2 805
rupestris L. IV/2 831
rupicola Wender. IV/2 831
Russeliana Lindl. IV/2 813
Ruthenica Steud. IV/2 858, 859
Sabauda Vill. et DC. IV/2 870
Sadleri Rchb. IV/2 843
Salisburgensis Haenke IV/2 868
Schleicheri Zimmeter IV/2 892
Schroeteri Siegfried IV/2 892
Schwarzii Poev. IV/2 881
semiargentea Borb. IV/2 891
semipinnata Velen. IV/2 891
semiternata Hut. IV/2 892
serotina Zimmeter IV/2 881
serpentini Borb. IV/2 871
Sibbaldiana Lehm. IV/2 893
Sibbaldii Hall. f. IV/2 893
silvestris Necker IV/2 882
sordida Zimmeter IV/2 844, 845
sororia Wender. IV/2 821
speciosa Willd. IV/3 813
splendens Koch IV/2 891
spuria A. Kern. IV/2 891
stenantha Lehm. IV/2 929
stenoloba Ph. J. Müll. IV/2 881
sterilis (L.) Garcke IV/2 826
Stiriaca Hay. IV/2 892
stricticaulis Gremli IV/2 869
subacaulis L. IV/2 877
subacaulis Wahlenb. IV/2 878
subacaulis Wulf. IV/2 879
subarenaria Borb. IV/2 880/881
subcinerea Borb. IV/2 881
subnitens Arv.-Touv. IV/2 861
subnivalis Brügg. IV/2 892
sulphurea Lam. et DC. IV/2 848, 850
superlata Borb. IV/2 839
supina L. IV/2 854
Tabernaemontani Aschers. IV/2 880
tenuiloba Jord. IV/2 839
Terglovensis Hacq. IV/2 817
ternata Brügg. IV/2 892
tetrapetala Hall. f. IV/2 882
Thuringiaca Bernhardi IV/2 863, 865
thyrsiflora Zimmeter IV/2 846
Tirolensis Zimmeter IV/2 880
tomentosa Gilib. IV/2 837
Tommasiniana F. Schultz IV/2 879
Tormentilla Necker IV/2 882
tormentilloides Mayer IV/2 884
Trefferi Siegfried IV/2 892
trifoliata Gilib. IV/2 858
Vallesiaca Huet IV/2 892
varia Wender. IV/2 875, 876
Verlotii Jord. IV/2 871
verna L. IV/2 876
villosa Zimmeter IV/2 868

Potentilla Vindobonensis Zimmeter IV/2 880
viridis Fritsch IV/2 880
Visurgina Weihe IV/2 859
Vockei Ph. J. Müll. IV/2 847
Waisbeckeri Siegfried IV/2 892
Wibeliana Th. Wolf IV/2 844
Wiemanniana Guenther et Schummel IV/2 847
Wilczekii Besse IV/2 880
Wolffiana Siegfried IV/2 892
Wolfii Siegfried IV/2 892
„ Zimmeteri Borb. IV/2 875
Poterium L. IV/2 935; VII 181
dictyocarpum Spach IV/2 941
dodecandrum Benth. et Hook. IV/2 936
glaucescens Rchb. IV/2 941
muricatum Spach IV/2 941
officinale Benth. et Hook. IV/2 937
polygamum Waldst. et Kit. IV/2 941
Sanguisorba L. IV/2 939
„ spinosum L. IV/2 936
Pothoideae VII 157
Pothos L. VII 157
Pottiaceae VII 145
Pradosia lactescens Radlk. V/3 1897
Prangos cylindracea DC. V/2 1093
ferulacea (L.) Lindley V/2 1093
„ pabularia Lindl. V/2 944
Prasioideae V/4 2522; VII 203
Prasium bicolor Krause V/4 2404
coccineum Walt. V/4 2472
majus L. V/4 2522
„ Marrubium E. H. L. Krause V/4 2394
„ purpureum Walt. V/4 2472
Prenanthes L. V/2 1180; VII 212
chondrilloides Ard. VI/2 1075
hieracifolia Willd. VI/2 1178
muralis L. VI/2 1111
paniculata Moench VI/2 1178
purpurea L. VI/2 1180
tenuifolia L. VI/2 1181
„ viminea L. VI/2 1129
Preslia cervina (L.) Fres. V/4 2338
Pretrea J. Gay VII 205
Primula L. V/3 1733; VII 190
acaulis Hill V/3 1743
Admontensis Gusmus V/3 1777
Allionii Hausm. V/3 1779
Allionii Loisel. V/3 1733, 1780
alpigena Dalla Torre et Sarnth. V/3 1786
alpina Loisel. V/3 1765
alpina Salisb. V/3 1760
Anglica Pax V/3 1787
anisiaca Stapf. V/3 1785
Apennina Widm. V/3 1733, 1772
Arendsii Pax V/3 1740
Auricula Hill V/3 1754
Primula Auricula L. V/3 1760
Auricula L. subsp. Bauhini (Beck) Lüdi V/3 1762
Auricula L. subsp. ciliata (Moretti) Lüdi V/3 1762
Austriaca Wettst. V/3 1787
Balbisii Lehm. V/3 1762
Baldensis Goiran V/3 1773
Beesiana G. Forrest V/3 1739
Berninae Kern. V/3 1786
biflora Hut. V/3 1786
Bitekii Sünderm. V/3 1786
brevifrons Borb. V/3 1785
brevistyla DC. V/3 1786
Bulleyana G. Forrest V/3 1739
Cadinensis Porta V/3 1770
calycina Duby V/3 1772
calycina Rchb. V/3 1773, 1775
Candolleana Rchb. V/3 1778
capitata W. J. Hook. V/3 1738
Carniolica Jacq. V/3 1764
Carniolica Poll. V/3 1773
Carniolica Wulf. V/3 1775
Caruelii Porta V/3 1786
Caschmiriana Munro V/3 1738
ciliata Schrank V/3 1767
Clusiana E. Wein V/3 1775
Clusiana Tausch V/3 1776
Cockburniana Hemsl. V/3 1739
commutata Schott V/3 1771
confinis Schott V/3 1767
coronaria Salisb. V/3 1749
coronata Porta V/3 1786
cortusa Sandor V/3 1817
cortusoides L. V/3 1738
crenata Fuss V/3 1760
cupularis Pax V/3 1787
Daonensis Leyb. V/3 1770
decora Sims V/3 1767
denticulata Smith V/3 1738
deorum Vel. V/3 1733
digenea Kern. V/3 1785
discolor Leyb. V/3 1784
Dumoulini Stein V/3 1786
elatior (L.) Schreber V/3 1746
elatior (L.) Schreb. subsp. intricata (Godr. et Gren.) Pax V/3 1748
erosa Wall. V/3 1741
Escheri Brügg. V/3 1784
Facchinii Schott V/3 1786
Falkneriana Porta V/3 1785
fallax C. Richter V/3 1785
farinosa L. V/3 1754
Floerkeana Facch. V/3 1786
Floerkeana Salz. V/3 1785
Floerkeana Schrad. V/3 1786
floribunda Wall. V/3 1741
Forbesii Franch. V/3 1741
Forsteri Stein V/3 1786
Fratensis Gusmus V/3 1786
Freyeri Hladnik V/3 1764
frondosa Janka V/3 1738
Fumana Gusmus V/3 1786
Primula glaucescens Moretti V/3 1772
glaucescens Moretti subsp. calycina (Duby) Pax V/3 1773
glaucescens Moretti subsp. Langobarda (Porta) Widm. V/3 1773
glaucescens Rchb. V/3 1773, 1775
glutinosa Wulf. V/3 1780
Goebelii Kern. V/3 1784
grandiflora Lam. V/3 1743
graveolens Hegetschw. et Heer V/3 1765
Heerii Brügg. V/3 1786
Helenae Ar. V/3 1738
hirsuta All. V/3 1767
hirsuta Rchb. V/3 1771
hirsuta Vill. V/3 1765
hortensis Wettst. V/3 1770
Huteri Kern. V/3 1786
hybrida Schrank V/3 1743
Japonica A. Gray V/3 1739
Idriana Gusm. V/3 1784
Jelenkae Gusm. V/3 1784
Jellenkiana Freyer V/3 1764
imperialis Jungh. V/3 1734, 1741
incisa Lam. V/3 1778
inflata Rchb. V/3 1752
integrifolia L. V/3 1776, 1778
integrifolia Rchb. V/3 1775
integrifolia Scop. V/3 1764
integrifolia Tausch V/3 1773
intermedia Portenschlag V/3 1785
involucrata Wall. V/3 1738
Judicariensis Beyer V/3 1786
Juliae Kuszn. V/3 1737
Juribella Sünderm. V/3 1786
Kewensis Jenk. V/3 1741
Kitaibeliana Schott V/3 1733, 1780
Kolbiana Widmer V/3 1786
Kraettliana Brügg. V/3 1785
latifolia Lapeyr. V/3 1765
leucophylla Pax V/3 1749
levigata Duby V/3 1772
Lichiangensis G. Forrest V/3 1738
Littoniana G. Forrest V/3 1740
longiflora All. V/3 1758
lutea Vill. V/3 1760
Maggiassonica Porta V/3 1786
malacoides Franch. V/3 1741
marginata Curt. V/3 1733, 1766
Matthioli Richter V/3 1817
media Peterm. V/3 1785
minima L. V/3 1782
montana Reut. V/3 1749
multiceps Freyer V/3 1764
Muretiana Moritzi V/3 1786
nivalis Pall. V/3 1738
nivalis Turcz. V/3 1754
obconica Hance V/3 1740

Primula obovata Hut. V/3 1784
Obristii Stein V/3 1784
odorata Gilib. V/3 1749
Oenensis Thom. V/3 1770
officinalis Hill V/3 1749
officinalis var. inflata Ledeb. V/3 1753
Palinuri Petagna V/3 1733
pallida Schott V/3 1767
Pannonica Kern. V/3 1752
Parlatorii Car. V/3 1773
Parryi A. Gray V/3 1739
Pedemontana Thom. V/3 1733, 1772
permixta Gusmus V/3 1786
Plantae Brügg. V/3 1770
Polliniana Moretti V/3 1773
Pooliana Brügg. V/3 1770
Portenschlagii Beck V/3 1785
pubescens Jacq. V/3 1769
pubescens Loisel. V/3 1767
pulverulenta Duthie V/3 1739
pumila Kern. V/3 1786
purpurascens (Cam.) Beck V/3 1785
rosea Royle V/3 1738
Salisburgensis Floerke V/3 1786
Sauteri Schultz V/3 1782
Schottii Sünderm. V/3 1786
Scotica Hook. V/3 1757
sedifolia Salisb. V/3 1787
Sibirica Jacq. V/3 1738
Sibthorpii Hoffm. V/3 1745
Sieboldii E. Morren V/3 1738
Sikkimensis W. J. Hook. V/3 1738
silvestris Scop. V/3 1743
similis Stein V/3 1784
Simsii Sweet V/3 1771
Sinensis Lindl. V/3 1740
spectabilis Josch V/3 1775
spectabilis Mert. et Koch V/3 1776
spectabilis Tratt. V/3 1773
Steinii Obrist V/3 1786
Stelviana Vulp. V/3 1770
Sturii Schott V/3 1786
suaveolens β montana Rouy V/3 1752
„ Ternoviana Kern. V/3 1787
„ Tirolensis Schott V/3 1779
Tommasinii Godr. et Gren. V/3 1787
tristis Pax V/3 1787
uniflora Gmel. V/3 1743
Uralensis Fisch. V/3 1753
Valbonae Gusmus V/3 1786
variabilis Goupil V/3 1786
varians Gusmus V/3 1786
Veitchii Duthie V/3 1738
venusta Host. V/3 1784
Venzoi Hut. V/3 1786
veris L. V/3 1749
Primula veris L. susp. canescens (Opiz) Hay. V/3 1752
veris L. subsp. Columnae (Ten.) Lüdi V/3 1752
veris L. subsp. macrocalyx (Bunge) C. Koch V/3 1753
veris L. subsp. Velenovskyi Domin V/3 1753
vernalis Salisb. V/3 1743
verticillata Forsk. V/3 1741
villosa Curt. V/3 1767
villosa Jacq. V/3 1771
viscosa All. V/3 1765
viscosa Vill. V/3 1767
Vitaliana L. V/3 1787
vittata Bur. et Fr. V/3 1739
Vochinensis Gusm. V/3 1786
vulgaris Huds. V/3 1743
Wettsteinii Wiem. V/3 1785
„ Wulfeniana Schott V/3 1775
Primulaceae V/3 1715; VII 196
Primulales V/3 1713; VII 196
Principes VII 156
Pringlea Hook. f. IV/1 70; VII 177
Prionitis Adans. V/2 1176
falcata Delarbre V/2 1177
„ pastinacifolia Fritsch V/2 1180
Prionium serratum Drège II 145
Prismatocarpus L'Hérit. VI/1 366
hybridus L'Hérit. VI/1 367
„ Speculum L'Hérit. VI/1 366
Pritchardia filifera Linden II 130
Pritzelia coccinea Kl. V/1 668
Proboscidea Jussieui Steud. VI/1 176
Proserpinaca L. V/2 895; VII 192
Prosopanche de Bary VII 170
Prosopis L. IV/3 1126
Prostantheroideae VII 203
Protascineae VII 140
Protea L. VII 167 Fig. 1167
Proteaceae III 144; VII 169 u. Fig. 1167, 1210
Proteales III 144; VII 169
Protium Icicariba (DC.) L. March. V/1 84
Protobasidiomycetes VII 141
Protococcaceae VII 138
Protococcales VII 137
Protomastigales VII 136
Protomycetaceae VII 146
Prunella L. V/4 2377; VII 201
alba Pall. V/4 2378
bicolor Beck V/4 2384
grandiflora (L.) Jacq. V/4 2382
hastaefolia Brotero V/4 2377
hybrida Knaf V/4 2384
hyssopifolia L. V/4 2377
intermedia Lk. V/4 2384
laciniata L. V/4 2378; VII 200 Fig. 1242
laciniata Rchb. non L. V/4 2384
ochroleuca Hagenb. V/4 2378
pinnatifida Schleich. V/4 2384
reptans Dumort. V/4 2380
Prunella spuria Stapf V/4 2384
variabilis Beck V/4 2384
Prunoideae IV/2 667, 1053; VII 181
Prunophora (Neck.) Endlicher IV/2 1096
Prunus L. IV/2 1053; VII 181, 121 Fig. 1158
acida C. Koch IV/2 1075
Alleghanensis Porter IV/2 1097
Americana Marsh. IV/2 1097
Amygdalus L. IV/2 1086
angustifolia Marsh. IV/2 1097
Aproniana (Roem.) Schübler et Martens IV/2 1084
avium L. IV/2 1078
avium L. var. duracina L. IV/2 1080
avium L. var. Juliana L. IV/2 1080
avium L. var. silvestris (Kirschleger) Dierbach IV/2 1080
Brigantiaca Vill. IV/2 1096
canescens Boiss. IV/2 1069
Capollin DC. IV/2 1061
Caproniana Gaud. IV/2 1074, 1076
Capuli Cavanilles IV/2 1061
Caroliniana (Mill.) Ait. IV/2 1064
cartilaginea Lehm. IV/2 1061
cerasifera Ehrh. IV/2 1100
Cerasus L. IV/2 1074
Cerasus L. var. austera L. IV/2 1076
Cerasus L. var. avium L. IV/2 1076
Chamaecerasus Jacq. IV/2 1072
Chamaecerasus Wallr. IV/2 1074
Chicasa Michx. IV/2 1097
cocomilia Ten. IV/2 1101
communis Arcangeli IV/2 1086
communis Huds. IV/2 1106
dasycarpa Ehrh. IV/2 1112a
Davidiana (Carr.) Franch. IV/2 1085
depressa Pursh IV/2 1084
domestica L. IV/2 1106; VII Fig. 1158, 1225 B
eminens Beck IV/2 1084
fruticans Weihe IV/2 1112a
fruticosa Pall. IV/2 1072
hiemalis Michx. IV/2 1097
Japonica Thunb. IV/2 1084
incana Steven IV/2 1084
insititia L. IV/2 1106, 1108
Italica Borkh. IV/2 1109
lanceolata Willd. IV/2 1069
Laurocerasus L. IV/2 1061
Lusitanica L. IV/2 1063
Mahaleb L. IV/2 1070
maritima Wangenh. IV/2 1097
Maximowiczii Rupr. IV/2 1069
monticola C. Koch IV/2 1101
Mume Sieb. et Zucc. IV/2 1096

Prunus Myrobalana (L.) Loisel. IV/2 1100
nana Duroi IV/2 1064
nana (L.) Stok. IV/2 1085
nigra Ait. IV/2 1097
nigricans Ehrh. IV/2 1078
oeconomica Borkh. IV/2 1109
Orientalis (Mill.) Koehne IV/2 1085
Padus L. IV/2 1064
Paracerasus Koehne IV/2 1069
pendula (Sieb.) Maxim. IV/2 1069
Pensylvanica L. fil. IV/2 1069
Persica Sieb. et Zucc. IV/2 1091
Persico-Amygdala Rchb. IV/2 1096
Petzoldii C. Koch IV/2 1085
Pissardii Carrington IV/2 1101
prostrata Labill. IV/2 1084
Pseudocerasus Lindley IV/2 1069
Pseudocerasus Sargent IV/2 1069
pumila Fritsch IV/2 1072
pumila L. IV/2 1084
pygmaea Willd. IV/2 1097
pyramidalis DC. IV/2 1109
racemosa Lam. IV/2 1064
rubra (Mill.) Ait. IV/2 1064
salicifolia Kunth IV/2 1061
Sargentii Rehd. IV/2 1069
sativa Rouy et Cam. IV/2 1106
sempervirens Willd. IV/2 1064
serotina Ehrh. IV/2 1061
serrulata Lindley IV/2 1069
Sibiriaca hort. IV/2 1112a
Sibirica L. IV/2 1096
Sinensis Pers. IV/2 1084
spinosa L. IV/2 1101
subcordata Benth. IV/2 1097
subhirtella J. D. Hook. IV/2 1069
Susquehanae Willd. IV/2 1084
Syriaca Borkh. IV/2 1108
triflora Roxb. IV/2 1096
triloba Lindl. IV/2 1084
vinaria Bechstein IV/2 1109
„ Virginiana L. IV/2 1064
Przwalskia Maxim. VII 203
Psamma arenaria Roem. et Schult. I 237
litoralis P. B. I 237
„ pallida Presl I 237
Psammophila muralis Fourr. III 310
Psedera Neck. V/1 356; VII 187
quinquefolia Greene V/1 358
„ vitacea (Knerr) Greene V/1 357
Psephellus dealbatus Boiss. VI/2 937
Pseudodictamnus acutus Moench V/4 2399
Pseudofumaria intermedia Borkh. IV/1 41
Pseudofumaria maior Borkh. IV/1 38
Pseudolarix Kaempferi Gord. I 81; VII 151
Pseudomonas radicicola Moore IV/3 1117
„ Savastanoi V/3 1143
Pseudopanax crassifolius (Sol.) K. Koch V/2 914
Pseudopeziza VII 141
Pseudorlaya Pumila (L.) Grande V/2 1503
Pseudosolanoideae VI/1 5; VII 203
Pseudospermum S. F. Gray V/2 1080
Pseudotsuga Carr. VII 151
Pseva Rafin. V/3 1593
Psidiopsis Berg V/2 776
Psidium Araca Raddi V/2 776
Cattleyanum Sabine V/2 776
Guayava Raddi V/2 775
pumilum Vahl V/2 776
„ sapidissimum Jacq. V/2 776
Psilathera tenella Lk. I 266
Psilostemon Orientalis DC. V/3 2128
Psilotaceae I 64; VII 147
Psilotales VII 147
Psilotum Sw. VII 147
Psilurus aristatus Duv.-Jouve I 402
„ nardoides Trin. I 402
Psoralea aculeata L. IV/3 1385
Americana L. IV/3 1385
aphylla L. IV/3 1385
bituminosa L. IV/3 1384
cinerea Lindl. IV/3 1385
esculenta L. IV/3 1385
glandulosa L. IV/3 1385
Onobrychis Nutt. IV/3 1384
pinnata L. IV/3 1385
„ polystachya Poir. IV/3 1385
Psorospermum Spath VII 189
Psyllium ramosum Gilib. VI/1 193
Psyllophora dioica Schur II 53
pulicaris Schur II 57
„ vulgaris Heuff. II 57
Ptarmica alpina DC. VI/2 579
atrata DC. VI/2 553, 554
cartilaginea Ledeb. VI/2 565
Clavennae DC. VI/2 559
Clusiana Schur VI/2 555
Ircutiana DC. VI/2 565
lingulata DC. VI/2 550
macrophylla DC. VI/2 562
moschata DC. VI/2 555
nana DC. VI/2 558
oxyloba DC. VI/2 551
Valesiaca DC. VI/2 579
„ vulgaris DC. VI/2 563
Ptelea trifoliata L. V/1 52; VII 184
Pteridium Kuhn I 37; VII 149
„ aquilinum Kuhn I 37
Pteridophyllum Sieb. et Zucc. IV/1 18; VII 176
Pteridophyta I 3; VII 147
Pteridospermae VII 150
Pteris L. I 38; VII 149
Pteris aquilina L. I 37
„ Cretica L. I 38
Pterocactus K. Schum. V/2 688
Pterocarpus Draco L. IV/3 1496
erinaceus Poiret IV/3 1496
Indicus Willd. IV/3 1496
Marsupium IV/3 1496
„ santalinus L. f. IV/3 1496
Pterocarya fraxinifolia Spach III 7; VII 167 Fig. 1206
Pterocephalus Vill. VI/1 279; VII 208
Pterocyclus Klotzsch V/2 1089
Pteroneurum DC. IV/1 333
Pterophyllus Nelson VII 150
Pteropyrum Jaub et Spach III 165
Pteroselinum Rchb. V/2 1364, 1367
Alsaticum Rchb. V/2 1379
Chabraei Rchb. V/2 1375
glaucum Rchb. V/2 1377
intermedium Schur V/2 1385
„ montanum Rchb. V/2 1385
Pterospora Nutt. VII 195
Pterostemonoideae VII 170
Pterostyrax corymbosus Sieb. et Zucc. V/3 1901
hispidus Sieb. et Zucc. V/3 1901
Pterotheca Nemausensis Cass. VI/2 1134
Pterotropis virens Fourreau IV/1 125
Ptilotrichum macrocarpum Rouy IV/1 447
Ptychotis Koch V/2 1173; VII 194
ammoides Koch V/2 1175
aspera Pomel V/2 1176
Bunius Rchb. V/2 1173
Coptica DC. V/2 1167
heterophylla Koch V/2 1173
saxifraga (L.) Loret et Barrandon V/2 1173
„ trachysperma Boiss. V/2 1176
Puccinia VII 142
Pucciniaceae VII 142
Pucciniella Parl. VII 155
Pueraria hirsuta (Thunb.) C. K. Schneid. IV/3 1625
„ Thunbergiana Benth. IV/3 1625
Pulegium cervinum Mill. V/4 2338
„ vulgare Mill. V/4 2339
Pulicaria Gaertn. VI/1 487; VII 211
Arabica (L.) Cass. VI/1 488
bellidiflora Wallr. VI/1 447
dysenterica (L.) Gaertn. VI/1 487
Germanica Presl VI/1 478
hirta Presl VI/1 482
prostrata Aschers. VI/1 488
Pulicaria Aschers. et Graebn. VI/1 488
salicina Presl VI/1 479
uliginosa Stev. IV/1 488
vulgaris Gaertn. VI/1 488

Pulmonaria L. V/3 2209; VII 201
„ affinis Jord. V/3 2210, 2219
„ angustata Schrad. V/3 2211
„ angustifolia L. V/3 2211
„ angustifolia L. subsp. tuberosa Schrank V/3 2212
„ angustifolia Maly V/3 2219
„ azurea Bess. V/3 2211
„ bracteata Willd. V/3 2128
„ Clusii Baumg. V/3 2211
„ confusa Rouy V/3 2210
„ Conradi Opiz V/3 2215
„ Dacica Simonk. V/3 2210
„ digenea Kern. V/3 2220
„ elegans hort. V/3 2128
„ Filarszkyana Javorka V/3 2210
„ grandiflora DC. V/3 2210
„ Heinrichii Sabr. V/3 2220
„ hybrida Kern. V/3 2219
„ intermedia Pallas V/3 2220
„ Kerneri Wettst. V/3 2213
„ longifolia Bastard V/3 2210, 2213
„ maculata Blackw. V/3 2215
„ maculosa Hayne V/3 2213, 2215
„ maritima L. V/3 2128
„ media Host V/3 2211
„ mollis Wolff V/3 2216
„ mollissima Kern. V/3 2216
„ montana Lejeune V/3 2216
„ montana Wulf. V/3 2211
„ Norica A. Teyber V/3 2220
„ notha Kern. V/3 2219
„ oblongata Schrad. V/3 2220
„ obscura Dum. V/3 2213, 2215
„ officinalis L. V/3 2213
„ paniculata Ait. V/3 2128
„ picta Rouy V/3 2210
„ rubra Schott V/3 2210
„ saccharata Gren. et Godron V/3 2210
„ saccharata Kern. V/3 2210
„ saccharata Koch V/3 2215
„ saccharata Mill. V/3 2210
„ Sibirica L. V/3 2128
„ Stiriaca Kern. V/3 2219
„ suffruticosa L. V/3 2153
„ Transsilvanica Schur V/3 2210
„ Tridentina Evers V/3 2219
„ tuberosa Gremblich V/3 2216
„ Vallarsae Kern. V/3 2219
„ Virginica L. V/3 2128
„ Vosagica E. H. L. Krause V/3 2220
Pulsatilla alpina Schrank III 531
„ amoena Jord. III 535
„ Baldensis Delarb. III 524
„ Bogenhardiana Rchb. III 535
„ Bolzanensis Murr III 539
„ Breynii Ruprecht III 538
„ grandis Simonk. III 537
„ Hackelii A. Kern. III 537
„ Halleri Willd. III 533
Pulsatilla intermedia Hoppe et Hornschuch III 537
„ latifolia Rupr. III 534
„ nemorosa Schrank III 522
„ nigricans Baumg. III 537
„ nigricans Beck III 538
„ patens Mill. III 534
„ Petteri Beck III 539
„ pratensis Mill. III 538; VII 174 Fig. 1217
„ ranunculoides Schrank III 520
„ recta Gilib. III 535
„ reflexa Gilib. III 538
„ sulphurea Sweet III 530
„ vernalis Mill. III 530
„ vulgaris A. Kern. III 537
„ vulgaris Mill. III 535
Punica Granatum L. V/2 762
„ nana L. V/2 766
„ protopunica Balf. f. V/2 762
Punicaceae V/2 761; VII 191
Puschkinia scilloides Adams II 279
Pycnochytrium VII 139
Pycreus flavescens Rchb. II 11
„ Monti Rchb. II 11
„ Pannonicus Rchb. II 11
Pyracantha coccinea (L.) Roem. IV/2 688
Pyrema Sorbus Clairv. IV/2 711
Pyrenocarpeae VII 143
Pyrethrum Gaertn. VI/2 591
„ alpinum Schrank VI/2 603
„ Balsamita Willd. VI/2 599
„ cinerariifolium Trev. VI/2 596
„ Clusii Fisch. VI/2 615
„ corymbosum Willd. VI/2 614
„ defloratum hort. Bert. VI/2 584
„ foeniculaceum Choisy VI/2 596
„ frutescens Willd. VI/2 596
„ Halleri Willd. VI/2 607
„ Indicum Cass. VI/2 594
„ inodorum Moench VI/2 587
„ macrophyllum Willd. VI/2 616
„ multicaule Willd. VI/2 593
„ Myconis Moench VI/2 593
„ partheniifolium Willd. VI 2 618
„ Parthenium Sm. VI/2 617
„ roseum Bieb. VI/2 599
„ segetum Moench VI/2 601
„ Sinense Sabine VI/2 594, 595
„ Spilanthes Med. VI/1 528
„ subcorymbosum Schur VI/2 615
„ Tchihatchewii hort. VI/2 580
„ uliginosum Waldst. et Kit. VI/2 594
„ Willemotti Duch. VI/2 597
Pyrola L. V/3 1571; VII 195
Pyronemataceae VII 141
Pyrostegia ignea (Vell.) Presl VI/1 176
Pyrus IV/2 694; VII 181
Pyxidanthera barbulata Michx. V/3 1713

Q.

Quamoclit coccinea (L.) Moench V/3 2076
„ vulgaris Choisy V/3 2076
Quassia amara L. V/1 79
„ Simarubae Wright V/1 79
Queltia ampla Salisb. II 314
„ foetida Herb. II 314
„ incomparabilis Haw. II 314
Quercus L. III 105; VII 168 u. 47 Fig. 1079
„ aegylopifolia Pers. III 115
„ alba L. III 106, 107
„ Apennina Zucc. III 112
„ Badensis Beck III 117
„ ballota Desf. III 116
„ brevipes Heuff. III 117
„ Cerris Lam. III 114
„ coccinea Muenchh. III 106
„ crinita Lam. III 114
„ Devensis Simk. III 117
„ echinata Salisb. III 114
„ fructipendula Schrank III 108
„ Germanica Lasch III 108
„ grammuntia L. III 116
„ Hartwissiana Stev. III 114
„ Helvetica Thellung VII 168
„ Ilex L. III 116
„ illicifolia Salisb. III 116
„ intercedens Beck III 117
„ intermedia Boenn. III 117
„ Kerneri Simk. III 117
„ lanuginosa Thuill. III 112
„ macrocarpa Michx. III 106
„ macrolepis Kotschy III 107
„ palustris Muenchh. III 106
„ pedunculata Ehrh. III 108
„ pendulina Kit. III 117
„ pseudosuber Santi III 115
„ pubescens Willd. III 112; VII 168
„ Robur L. III 108; VII 168
„ rosacea Bechst. III 117
„ rubra L. III 106
„ Sauteri Dalla Torre et Sarnth. III 117
„ sempervirens Mill. III 116
„ sessiliflora Salisb. III 111; VII 168
„ sessilis Ehrh. III 111
„ Smilax L. III 116
„ Streimii Heuffel III 117
„ Suber III 106
„ tinctoria Michx. III 106
„ Tiszae Simk. et Fek. III 117
„ Vallonea Kotschy III 107
„ velutina Lam. III 106
Quiinaceae V/1 493; VII 189
Quillaja saponaria Molina IV/2 663
Quinaria Rafin. V/1 356; VII 187
„ hederacea Raf. V/1 358
„ quinquefolia Koehne V/1 357
„ radicantissima Koehne V/1 358

Quinaria tricuspidata Koehne V/1 357
„ Veitchi Koehne V/1 357
Quisqualis L. V/2 772; VII 192
„ Indica L. V/2 772

R.

Radicula Hill IV/1 307
„ amphibia Druce IV/1 310
„ ensifolia Moench IV/1 310
„ Islandica Druce IV/1 316
„ Nasturtium aquaticum Rendle et Britt. IV/1 319
„ officinalis Groves IV/1 319
„ palustris Moench IV/1 316
Radiola Hill V/1 2; VII 164
„ dichotoma Moench V/1 2
„ linoides Roth V/1 2
„ Millegrana Sm. V/1 2
„ multiflora Aschers. V/1 2
„ Radiola Karst. V/1 2
Radulaceae VII 142
Rafflesiaceae III 165; VII 170
Ramalina VII 144
Ramischia obtusata Freyn V/3 1576
„ secunda Garcke V/3 1574
„ secundiflora Opiz V/3 1574
Ramondia Heldreichii Benth. et Hook. VI/1 176
„ Myconi (L.) F. Schultz VI/1 176
„ Nataliae Panč. et Petrov. VI/1 176
„ Pyrenaica Rich. VI/1 176
„ Serbica Panč. VI/1 176
Ranales IV/1 12; VII 173 u. 13 Fig. 996 a
Ranalisma rostratum Stapf I 150
Randia Houst. VII 207
Ranunculaceae III 451; VII 174
Ranunculus L. III 540; VII 175
„ acer L. III 561
„ aconitifolius L. III 575
„ aconitoides DC. III 584
„ aduncus Gren. et Godr. III 564
„ alpestris L. III 570
„ ambiguus Jord. III 558
„ anemonoides Zahlbr. III 461/2
„ aquatilis L. III 581
„ aquatilis subsp. heleophilus (Arvet-Touvet) III 581
„ aquatilis L. subsp. heterophyllus (Web.) Neilr. III 581
„ arvensis L. III 554
„ Asiaticus L. III 541
„ aureus Schl. III 559
„ auricomus L. III 566
„ Baudotii Godr. III 579; VII 175
„ bellidiflorus J. Gessner III 542
„ Bertolonii Hausm. III 570
„ bilobus Bert. III 570
„ binatus Kit. III 566
„ Breyninus Crtz. III 559
Ranunculus bulbosus L. III 556
„ Carinthiacus Hoppe III 565
„ Cassubicus L. III 567
„ cervicornis Kitt. III 567
„ chaerophyllus L. III 541
„ Cobelliorum Murr III 584
„ Columnae All. III 570
„ confusus Godr. III 583
„ crenatus Bert. III 570
„ crenatus Waldst. et Kit. III 569
„ digeneus Kern. III 584
„ divaricatus Schrank III 582
„ echinatus Crtz. III 554
„ falcatus L. III 544
„ Ficaria L. III 542
„ flaccidus Pers. III 582
„ Flammula L. III 550
„ Flammula subsp. reptans (L.) Schinz et Keller III 551
„ fluitans Lam. III 577
„ fluviatilis Web. III 577
„ foeniculaceus Gilib. III 582
„ Frieseanus Jord. III 563
„ gelidus Hoffgg. III 584
„ geraniifolius Pourr. III 564
„ glacialis L. III 573; VII 175
„ gracilis Schleich. III 565
„ gramineus L. III 547
„ hederaceus L. III 577
„ hirsutus Curt. III 555
„ Hornschuchii Hoppe III 566
„ hortensis Pers. III 541
„ hybridus Biria III 546
„ Illyricus L. III 548
„ lacerus Bellardi III 584
„ lanuginosus L. III 560
„ lateriflorus DC. III 584
„ Lingua L. III 549
„ lomatocarpus Fisch. et Mey. III 541
„ longifolius Rossmann III 581
„ marinus Fries III 579
„ montanus Willd. III 564
„ muricatus L. III 541, 555
„ Murrii Hut. III 584
„ nemorivagus Jord. III 564
„ nemorosus DC. III 559
„ nivalis Crtz. III 564, 565
„ nodiflorus L. III 541
„ nodiflorus Waldst. et Kit. III 584
„ oreophilus Bieb. III 566
„ parnassifolius L. III 569
„ parviflorus L. III 541
„ paucistamineus Tausch III 582
„ Petiveri Koch III 583
„ peucedanifolius All. III 577
„ Philonotis Ehrh. III 555
„ platanifolius L. III 576
„ Poellianus Murr III 584
„ polyanthemus L. III 558
„ pseudo-Baudotii E. Krösche III 580
„ pseudothora Host III 546
Ranunculus pseudo-Villarsii Schur III 566
„ pthora Crtz. III 546
„ pygmaeus Wahlenb. III 553
„ Pyrenaeus L. III 568
„ reniformis Kit. III 566
„ repens L. III 557
„ rutaefolius L. III 461
„ Sardous Crtz. III 541, 555
„ Schottii Dalla Torre III 546
„ sceleratus L. III 552
„ secundus Mart. III 553
„ Seguierii Vill. III 570; VII 175
„ sericeus Willd. III 548
„ silvaticus auct. nec. Thuill. III 559
„ Steveni Andrz. III 563
„ Tappeineri Bamb. III 553
„ tenuifolius Schleich. III 565
„ testiculatus Crtz. III 545
„ Thora L. III 545
„ tomentosus Moench III 548
„ trachycarpus Fisch. et Mey. III 541
„ Traunfellneri Hoppe III 572
„ trichophyllus Chaix III 582
„ tripartitus Nolte III 583
„ velutinus Ten. III 541
„ Villarsii Koch III 566
„ vulgatus Jord. III 564
„ Wolfianus Chenevard III 584
Rapa Ludwig IV/1 229
„ Napus Mill. IV/1 252
Rapanea Aubl. VII 196
Rapateaceae II 142; VII 158
Raphanis Moench IV/1 305
Raphanistrum Ludwig IV/1 272
„ Landra Rchb. IV/1 279
„ maritimum S. F. Gray IV/1 278
„ microcarpum Nym. IV/1 275
„ Odessanum Bess. IV/1 278
„ Raphanistrum Karst. IV/1 276
„ rostratum Fisch. et Mey. IV/1 279
„ segetum Baumg. IV/1 276
„ silvestre Aschers. IV/1 276
Raphanus L. IV/1 272 u. 472 Fig. 885 a; VII 177
„ albus Crtz. IV/1 206
„ arvensis Crtz. IV/1 263
„ caudatus L. IV/1 275
„ Chinensis IV/1 280
„ eruca Crtz. IV/1 201
„ erucoides Crtz. IV/1 217
„ incanus Crtz. IV/1 226
„ iunceus Crtz. IV/1 240
„ lanceolatus Willd. IV/1 182
„ Landra Moretti IV/1 279
„ maritimus Sm. IV/1 278
„ microcarpus Willk. et Lange IV/1 275
„ Napus Crtz. IV/1 252
„ Odessanus Spr. IV/1 278
„ officinalis Crtz. IV/1 280

Raphanus oleifer hort. IV/1 280
Orientalis Crtz. IV/1 265
Radicula IV/1 281
Rapa Crtz. IV/1 257
Raphanistrum L. IV/1 274, 276, 476, Fig. 885 a
rostratus DC. IV/1 279
sativus L. IV/1 280
silvester Lam. IV/1 276
turgidus Pers. IV/1 231
„ vesicarius Crtz. IV/1 203
Raphiolepis Lindl. IV/2 664; VII 181
Rapistrum Crtz. IV/1 286; VII 177
Cakile Crtz. IV/1 183
diffusum Crtz. IV/1 288
glandulosum Bergeret IV/1 474
Hispanicum Crtz. IV/1 294
hispidum Godr. IV/1 294
intermedium Lamotte IV/1 294
Linnaeanum Boiss. et Reuter IV/1 294
Orientale Crtz. IV/1 294
perenne (L.) All. IV/1 287
perfoliatum Bergeret IV/1 186
„ rugosum (L.) All. IV/1 290
Ratibida columnaris Don. VI/1 504
„ sulcata Raf. VI/1 504
Rautanenia Schinzii Buch. I 150
Ravenala Madagascariensis Sonnerat II 320
Razou Mofskya oxycedri F. W Schultz III 145
Reaumuria L. V/1 544
Reboulia obtusata Asa Gray VII 155
Regelia Schauer V/2 789
Rehmannia angulata Hemsl. VI/2 1360
„ Chinesis Fisch. et Mey. VI/1 6
Reineckia carnea Kunth II 280
Reinwardtia Indica Dum. V/1 1
„ trigyna Planch. V/1 1
Remusatia Schott. VII 157
Reseda L. IV/1 483; VII 178
alba L. IV/1 485
gracilis Ten. IV/1 485
inodora Rchb. IV/1 485
lutea L. IV/1 485
Luteola L. IV/1 487
odorata L. IV/1 484
„ Phyteuma L. IV/1 486
Resedaceae IV/1 482; VII 178
Restionaceae II 142; VII 158
Retama monosperma Boiss. IV/3 1199
Reticulariaceae VII 136
Retinospora VII 101, 102 Fig. 1131
Rhacomitrium Brid. VII 145
Rhadidophora Hassk. VII 157
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. VI/2 1008
Rhagodia nutans L. VII 171
Rhamnaceae V/1 320; VII 187
Rhamnales V/1 320; VII 187
Rhamnus L. V/1 329; VII 187 u. 16 Fig. 1010
Rhamnus Alaternus L. V/1 330
alnifolia L'Hérit. V/1 331
alnifolia Pursh V/1 343
alpina L. V/1 340
alpina Scop. V/1 342
asplenifolia Simk. V/1 346
Canadensis hort. Nonn. V/1 346
Carniolica A. Kern. V/1 342
Carolinianus Walt. V/1 344
cathartica L. V/1 332
costata Maxim. V/1 331
croceus Nutt. V/1 344
Davurica Pall. V/1 331
Erythroxylon Pall. V/1 331
fallax Boiss. V/1 342
Frangula L. V/1 344; VII 187
franguloides Michx. V/1 331
hybrida L'Hérit. V/1 343
imeretina Booth V/1 331
lanceolata Pursh V/1 331
latifolia Kirchner V/1 346
Libanotica Boiss. V/1 331
Mulleyana Fritsch V/1 343
Paliurus L. V/1 326
Pallasii Fisch. et Mey. V/1 331
persicifolia Moris V/1 331
pumila Turr. V/1 337; VII 112 Fig. 1146
pumila Wulf. V/1 349
Purshianus DC. V/1 343
rupestris Scop. V/1 349
saxatilis Jacq. V/1 335
scandens Hill V/1 324
theezans L. V/1 330
utilis Decne. V/1 331
volubilis L. f. V/1 324
Wulfenii Hoppe V/1 349
„ Zizyphus L. V/1 322
Rhaphanus Gaud. IV/1 272
Rhaponticum Lam. VI/2 931; VII 212
heleniifolium Gren. et Godr. VI/2 932
Jacea Scop. VI/2 944
„ scariosum Lam. VI/2 932
Rhaptopetalaceae VII 188
Rheedea L. V/1 499, 501
Rheum L. VII 170
digynum Wahlenb. III 188
Emodi Wall. III 166
officinale Baill. III 166
palmatum L. III 166
Rhaponticum L. III 166
Ribes Gron. III 166
„ undulatum L. III 166
Rhexia L. V/2 794
„ Virginica L. V/2 795
Rhinanthoideae VII 204
Rhinanthus L. VI/1 102
Alectorolophus Poll. VI/1 104
alpinus Koch VI/1 109
angustifolius Gmel. VI/1 109
aristatus Čelak. VI/1 109
Crista galli L. VI/1 111
Rhinanthus Crista galli L. var. maior Döll. VI/1 108
glacialis Personnat VI 1 110
hirsutus Lam. VI/1 104
Italicus Chab. VI/1 107
maior Ehrh. VI/1 108
maior Ehrh. var. glandulosus Simk. VI 1 106
maior Ehrh. var. hirsutus Gren. et Godr. VI/1 104
„ minor Ehrh. VI/1 111
Rhipogonum Forst. VII 162
Rhipsalis Gaertn. V/2 697 VII 191
Rhizinaceae VII 141
Rhizobium leguminosarum Frank IV/3 1117
Rhizobolaceae V/1 493, 494; VII 189
Rhizobotrya alpina Tausch IV/1 146
Rhizophora L. V/2 769
conjugata L. V/2 769
Mangle L. V/2 769
„ mucronata Lam. V/2 769
Rhizophoraceae V/2 768; VII 191
Rhodanthe Manglesii Lindl. VI/1 495
Rhodiola rosea L. IV/2 526
Rhodobacteriaceae VII 136
Rhododendroideae VII 195
Rhododendron L. V/3 1627; VII 195
arboreum Sm. V/3 1632
Canadense Zabel V/3 1634
Caucasicum Pall. V/3 1633
Chamaecistus L. V/3 1644
chrysanthum Pall. V/3 1630
Dahuricum L. V/3 1633
ferrugineum L. V/3 1639
flavum Don V/3 1627, 1632, 1634
hirsutum L. V/3 1635
Japonicum C. Schneider non Gray V/3 1634
Indicum Sweet V/3 1632
intermedium Tausch V/3 1644
Kaempferi Planch. V/3 1634
Kotschyi Simk. V/3 1628
Lapponicum Wahlenb. V/3 1627
Lochae F. v. Muell. V/3 1627
luteum C. Schneider V 3 1634
maximum L. V/3 1632, 1633
molle Miq. V/3 1632, 1634
mucronulatum Turcz. V/3 1633
myrtifolium Schott et Kotschy V/3 1628
officinale Salisb. V/3 1630
polifolium Scop. V/3 1651
Ponticum L. V/3 1634
racemosum Franchet V/3 1633
Redowskianum Maxim. V/3 1646
rhombicum Miq. V/3 1634
Sinense Sw. V/3 1632
Smirnowi Trautv. V/3 1634
„ viscosum Torr. V/3 1634
Rhodomelaceae VII 139
Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Wight V/2 776

Rhodophyceae VII 139
Rhodophyta VII 139
Rhodora Canadensis L. V/3 1634
Rhodothamnus Rchb. V/3 1644; VII 195
Chamaecistus (L.) Rchb. V/3 1644
Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc. IV/2 665; VII 180
Rhodymeniales VII 139
Rhoeadales IV/1 489; VII 176
Rhoeo discolor Hance II 143
Rhoideae VII 186
Rhus L. V/1 218; VII 186
acuminata DC. V/1 225
aromatica Ait. V/1 220
Cacodendron Ehrh. V/1 81
Canadensis Mill. V/1 222
copallina L. V/1 225
Coriaria L. V/1 224
Cotinus L. V/1 226
glabra L. V/1 222
hirta Sudw. V/1 222
lucida L. V/1 226
Osbecki Steud. V/1 225
pentaphylla (L.) Desf. V/1 226
radicans L. V/1 221
semialata Murr. V/1 224
silvestris Sieb. et Zucc. V/1 225
succedanea L. V/1 225
tomentosa L. V/1 226
Toxicodendron L. V/1 220
trilobata Nutt. V/1 220
typhina L. V/1 222
venenata DC. V/1 222
vernicifera L. V/1 221
Vernix L. V/1 222
„ viridiflora Poir. V/1 222
Rhynchanthera DC. VII 192
Rhynchosia Lour. VII 183
Rhynchosinapis v. Hayek IV/1 268
Rhynchospora Vahl II 48; VII 156
alba Vahl II 48
„ fusca (L.) Roem. et Schult. II 49
Rhynchosporoideae VII 156
Rhynchostylis Tausch V/2 995
„ hirsuta Tausch V/2 1006
Rhytisma V/1 268; VII 141
Rhytispermum arvense Lk. V/3 2158
purpureo-caeruleum Lk. V/3 2154
Ribes L. IV/2 641; VII 179
alpinum L. IV/2 651; VII 180 Fig. 1225
aureum Pursh IV/2 642
bracteosum Dougl. IV/2 643
cereum Dougl. IV/2 643
Cynosbati L. IV/2 642
diacanthum Pall. IV/2 643
dioecum Moench IV/2 651
domesticum Jancz. IV/2 649
floridum L'Hérit. IV/2 643
glaciale Wallr. IV/2 643
Ribes glutinosum Benth. IV/2 643
Gordonianum Lemaire IV/2 643
Grossularia L. IV/2 645
hirtellum Michx. IV/2 642
irriguum Dougl. IV/2 642
leptanthum Gray IV/2 642
Lithuanicum Jancz. IV/2 648
multiflorum Kit. IV/2 643
nigrum L. IV/2 653
niveum Lindl. IV/2 642
olidum Moench IV/2 653
Orientale Desf. IV/2 643
oxyacanthoides L. IV/2 642
palmatum Desf. IV/2 642
petraeum Wulf. IV/2 650
prostratum L'Hérit. IV/2 643
rotundifolia Michx. IV/2 642
rubrum auct. IV/2 649
rubrum (L.) em. Jancz. IV/2 648
sanguineum Pursh IV/2 643
„ vulgare Lam. IV/2 649
Ricciaceae VII 144
Ricciocarpus Corda VII 144
Richardia Africana Kunth II 131; I/CXI Fig. 183
Ricinocarpoideae VII 186
Ricinodendron Muell.-Arg. V/1 118; VII 186
Ricinus communis L. V/1 120; VII 185
intermis Jacq. V/1 120
lividus Jacq. V/1 120
speciosus Burm. V/1 120
„ spectabilis Blume V/1 120
Ricotia Lunaria (L.) DC. IV/1 357
Ridolfia segetum (L.) Moris V/2 1161
Rinorea Aubl. V/1 586
Rivina L. III 267
Rivulariaceae VII 136
Rixea azurea Morren IV/3 1732
Robertia hiemalis Mérat III 472
Robertiella Robertianum Hanks IV/3 1712
Robertium lucidum Picard IV/3 1710
macrorrhizum Picard IV/3 1708
„ vulgare Picard IV/3 1712
Robertsonia hieraciifolia Lk. IV/2 621
nivalis Lk. IV/2 623
„ stellaris Lk. IV/2 624
Robinia L. IV/3 1390; VII 182
Caragana L. IV/3 1401
dubia Fouc. IV/3 1391
ferox Pall. IV/3 1401
glutinosa Sims IV/3 1391
grandiflora hort. IV/3 1391
halimodendron L. f. IV/3 1400
Hartwigii Koehne IV/3 1391
hispida L. IV/3 1391
Holdtii Beissner IV/3 1391
hybrida Audib. IV/3 1391
Robinia Neomexicana A. Gray IV/3 1391
panacocco Aubl. IV/3 1391
Pseudacacia L. IV/3 1392
rosea Loisel. IV/3 1391
Sinensis Pers. IV/3 1401
spinosa L. IV/3 1401
spinosissima Laxen IV/3 1041
„ viscosa Vent. IV/3 1391
Roccardia Manglesii Voss VI/1 495
Rochea coccinea DC. IV/2 514
falcata DC. IV/2 515
odoratissima DC. IV/2 514
„ versicolor DC. IV/2 514
Rochelia deflexa Roem. et Schult. V/3 2140
disperma (L.) Wettst. V/3 2128
Lappula Roem. et Schult. V/3 2139
„ stellulata Rchb. V/3 2128
Rodgersia aesculifolia Batalin IV/2 564
Japonica Regel IV/2 567
pinnata Franchet IV/2 567
podophylla A. Gray IV/2 567
„ tabularis Korn IV/2 567
Rodigia commutata Spr. VI/2 1134
Rodschiedia Fl. Wett. IV/1 363
Roella ciliata A. DC. VI/1 329
Roemeria hybrida DC. IV/1 19
„ Orientalis Boiss. IV/1 19
Roestelia cancellata Rebent. IV/2 703
Roettlera Vahl VI/1 177
Romanzoffia Unalaschkensis Cham. V/3 2119
Romneya Coulteri Harv. IV/1 19
„ trichocalyx Eastwood IV/1 19
Romulea Maratti VII 163
Rondeletia L. VI/1 197; VII 207
Rorella rotundifolia All. IV/2 502
Roridulaceae VII 180
Roripa Scop. IV/1 307; VII 177
amphibia (L.) Bess. IV/1 310
Austriaca (Crtz.) Bess. IV/1 305
armoracioides Tausch IV/1 318
Austriaca (Crtz.) Bess. IV/1 308
brachystyla Wallr. IV/1 318
erythrocaulis Borb. IV/1 319
Islandica (Oeder) Schinz et Thellung IV/1 315
Nasturtium aquaticum (L.) Hay. IV/1 319
prostrata (Bergeret) Schinz et Thellung IV/1 311
Pyrenaica (L.) Spach IV/1 314
rusticana Gren. et Godr. IV/1 305
silvestris (L.) Bess. IV/1 312, 476 Fig. 885 c
terrestris Čelak. IV/1 311
terrestris A. Welson IV/1 316

Rosa L. IV/2 976; VII 181 u. Fig. 1073, 1122, 1140
abietina Grenier IV/2 1029
acicularis Lindley IV/2 995
affinis Rau IV/2 1026
Afzeliana Fries IV/2 1035
agrestis Savi IV/2 1020
alba All. IV/2 999
alba L. IV/2 993
alpina L. IV/3 1048
anemoniflora Fortuna IV/2 992
arvensis Huds. IV/2 1000
atrovirens Viv. IV/2 999
Austriaca Crtz. IV/2 1004
Banksiae R. Brown IV/2 995
Bengalensis Pers. IV/2 995
berberifolia Pall. IV/2 995
bifera Pers. IV/2 993
blanda Ait. IV/2 995
bracteata Wendl. IV/2 996
Britzensis Koehne IV/2 994
calendarum Borkh. IV/2 993
canina L. IV/2 1031; VII 95 Fig. 1122
capnoides Kern. IV/2 1015
Carolina L. IV/2 995
caryophyllacea Bess. IV/2 1024
caryophyllacea Christ IV/2 1041
centifolia L. IV/2 992
Chavini Rapin IV/2 1044
Chinensis Edw. V/1 497
Chinensis Jacq. IV/2 995
cinnamomea L. IV/2 1046
coriifolia Fries IV/2 1035, 1038
Cremsensis Dégl. IV/2 1009
Damascena Mill. IV/2 993
dumetorum Thuill. IV/2 1031, 1033
eglanteria L. IV/2 1018
elliptica Tausch IV/2 1023
ferox Lawr. IV/2 994
ferruginea Dégl. IV/2 1006
foetida Herrmann IV/2 996
Francofurtana Borkh. IV/2 994
fraxinea Willd. IV/2 996
frutetorum Bess. IV/2 1038, 1039
Gallica L. IV/2 1002
gigantea Colb IV/2 995
glandulosa Bess. IV/2 1004
glauca Pourr. IV/2 1006
glauca Vill. IV/2 1035
glaucescens Wulf. IV/2 1007
graveolens Grenier IV/2 1023
Guntensteinensis Jacq. IV/2 1007
hispidula Desp. IV/2 1026
Ilseana Crépin IV/2 1006
Indica Lindley IV/2 995
Jundzilliana Bess. IV/2 1004
Jundzillii Bess. IV/2 1004
Kamtschatica Rédouté IV/2 994
levigata Michx. IV/2 996
livida hort. IV/2 1007
Rosa lucida Ehrh. IV/2 996
lutea Mill. IV/2 996
majalis Herrmann IV/2 1046
micrantha Sm. IV/2 1016
Mogesii Hemsley et Wilson IV/2 994
mollis Sm. IV/2 1010
mollissima Christ IV/2 1011
mollissima Fries IV/2 1010
mollissima Sm. IV/2 1013
montana Chaix IV/2 1044, 1045
moschata Herrm. IV/2 992
multiflora Thunb. IV/2 992
obtusifolia Desvaux IV/2 1026
omissa Déséglise IV/2 1011
oxyacantha Bieb. IV/2 995
palustris Marsh. IV/2 996
pendulina L. IV/2 1048
Persica Mich. IV/2 995
pimpinellifolia L. IV/2 1051
polyantha hort. IV/2 992
pomifera Herrmann IV/2 1008
pumila Jacq. IV/2 1004
punicea Mill. IV/2 996
Raetica Gremli IV/2 1041
recondita Puget IV/2 1009
repens Scop. IV/2 1000, 1001
resinosa Sternb. IV/2 1009
Reuteri Godet IV/2 1035
Rosomena hort. IV/2 995
rubicunda Hall. f. IV/2 1006
rubiginosa L. IV/2 1018
rubrifolia Ser. IV/2 1035
rubrifolia Vill. IV/2 1006
rugosa Thunb. IV/2 994
rupestris Crtz. IV/2 1048
sempervirens L. IV/2 999
sepium Thuill. IV/2 1020
sericea Lindley IV/2 996
serpens Wib. IV/2 1000
setigera Rich. IV/2 992
silvestris Herrmann IV/2 1000
simplicifolia Salisb. IV/2 995
spinosissima L. IV/2 1051
stylaris Gentil IV/2 1026
stylosa Desv. IV/2 1025
subcinerea Gentil IV/2 1026
Sweginzowii Koehne IV/2 994
systyla Bastard IV/2 1025
Thea hort. IV/2 995
tomentella Léman IV/2 1026, 1027
tomentosa Sm. IV/2 1011, 1013
trachyphylla Rau IV/2 1004, 1005
turbinata Ait. IV/2 994
umbelliflora Scheutz IV/2 1015
Uriensis Lagger et Puget IV/2 1042
villosa L. IV/2 1008
Virginiana Du Roi IV/2 995
Virginiana Koehne IV/2 995
Virginiana Mill. IV/2 996
viscida Puget IV/2 1016
Rosa Wichuriana Crépin IV/2 992
„ Willmothiae Hemsley IV/2 994
Rosaceae IV/2 662; VII 180, 13 Fig. 996 b
Rosales VII 179
Roscoea Smith II 321; VII 163
Rosmarinoideae V/4 2518; VII 203
Rosmarinus L. V/4 2518; VII 203
„ officinalis L. V/4 2518
Rosoideae IV/2 665; VII 180
Rossolis septentrionalis Scop. IV/2 502
Rotala L. V/2 741
Rottboellia incurvata L. f. I 381
Rottlera tinctoria Roxb. V/1 125
Roubieva multifida Moqu. III 260
Roxburghiaceae VII 159
Rubia L. VI/1 231; VII 207
cordifolia L. VI/1 231
peregrina L. VI/1 231
„ tinctorum L. VI/1 231
Rubiaceae VI/1 196; VII 207 u. 8 Fig. 983
Rubiales VII 207
Rubus L. IV/2 759; VII 180
aculeolatus Ph. J. Müll. IV/2 801
adornatus Ph. J. Müll. IV/2 797
affinis Weihe et Nees IV/2 779
agrestis Waldst. et Kit. IV/2 804
albiflorus Boulay et Lucand. IV/2 788
alecaefolius Poir. IV/2 762
Anglosaxonicus Gelert IV/2 795
apiculatus Weihe IV/2 795
Arcticus L. IV/2 767
argenteus Weihe et Nees IV/2 791
Armeniacus Focke IV/2 774
asperidens Sudre IV/2 796
Barbeyi Favrat et Gremli IV/2 788
Bavaricus Focke IV/2 796/797
Bellardii Weihe IV/2 802
bellidiflorus C. Koch IV/2 785
bifrons Vest IV/2 785/786
Bregutiensis Kern IV/2 791
caesius L. IV/2 802
Caflischii Focke IV/2 791 u. 795
carpinifolius Weihe IV/2 779
chaerophyllus Sagorski et W. Schultze IV/2 779
Chamaemorus L. IV/2 764
chlorostachys Ph. J. Müll. IV/2 801
chlorothyrsus Focke IV/2 789
Colemanni Blox IV/2 789
conspicuus Ph. J. Müll. IV/2 791
corylifolius Sm. IV/2 805
discolor Weihe IV/2 784

Rubus egregius Focke IV/2 789
festivus Ph. J. Müll. et Wirtgen IV/2 791
fissus Lindl. IV/2 777/778
flavescens Lef. et Müll. IV/2 789
foliosus Weihe IV/2 794
fruticosus L. IV/2 771/778, 781
fuscoater Weihe IV/2 797
fuscus Weihe IV/2 794
glandulosus auct. IV/2 798, 802
Godronii Lecoq IV/2 785
gratus Focke IV/2 788
Gremlii Focke IV/2 789
Guentheri Weihe et Nees IV/2 802
halophilus F. v. Muell. VII 171
hebecaulis Sudre IV/2 792
Helveticus Gremli IV/2 789
hemistemon Ph. J. Müll. IV/2 788
Hercynicus G. Braun IV/2 802
hirsutus Wirtgen IV/2 794
hirtus Waldst. et Kit. IV/2 798/802
hypomalacus Focke IV/2 779
hypomalacus Progel IV/2 779
Hystrix Weihe IV/2 797
idaeoides R. Ruthe IV/2 804
Idaeus L. IV/2 768
Idaeus L. subsp. maritimus Arrhenius IV/2 769
inopacatus Borb. et Waisbecker IV/2 789
insericatus Ph. J. Müll. IV/2 791
Kaltenbachii Metsch. IV/2 802
Koehleri Weihe IV/2 796, 797
laciniatus Willd. IV/2 774, 781
lasiaxon Borb. et Waisbecker IV/2 789
Loehri Wirtgen IV/2 795
macrocarpus Focke IV/2 774
macrophyllus Weihe et Nees IV/2 787, 789
macrostachys Ph. J. Müll. IV/2 791, 795
macrostemon Focke IV/2 787
melanoxylon Ph. J. Müll. et Wirtgen IV/2 792
Menkei Weihe et Nees IV/2 792
Mercierii Genevier IV/2 782
micans Godr. IV/2 792
Moluccanus L. IV/2 762
montanus Wirtgen IV/2 779
nemorosus Hayne IV/2 805
Nessensis W. Hall IV/2 777/778
nobilis Regel IV/2 762
obscurus Kaltenbach IV/2 791
obtruncatus Ph. J. Müll. IV/2 797
Rubus obtusangulus Gremli IV/2 781
odoratus L. IV/2 762
oreades Ph. J. Müll. IV/2 800
orthacanthus Wimm. IV/2 805
pallidus Weihe IV/2 794
parviflorus Nutt. IV/2 762
pilocarpus Gremli IV/2 797
plicatus Weihe et Nees IV/2 778
podophyllus Ph. J. Müll. IV/2 795
polyanthemos Lindeberg IV/2 779
polytrichus Franch. IV/2 762
procerus Ph. J. Müll. IV/2 785
progenerans Lidforss IV/2 804
pruinosus Arrhenius IV/2 804
pubescens Weihe IV/2 782
purpuratus Sudre IV/2 801
pyramidalis Kaltenbach IV/2 781, 791
Radula Weihe IV/2 793, 794
Reuteri Mercier IV/2 796
rhamnifolius Weihe IV/2 779 780
rhombifolius Weihe IV/2 781
rivularis Ph. J. Müll. IV/2 801
rosaceus Weihe IV/2 797
rudis Weihe et Nees IV/2 792, 794
rusticanus Mercier IV/2 784
saxatilis L. IV/2 766
scaber Weihe IV/2 800
Schleicheri Weihe IV/2 798, 800
Schlickumii Wirtgen IV/2 791
senticosus Koehler IV/2 779
serpens Weihe IV/2 800
Silesiacus Weihe IV/2 782
silvaticus Weihe et Nees IV/2 789
spinulifer Ph. J. Müll. et Lef. IV/2 796
spinulosus Ph. J. Müll. IV/2 798
Sprengelii Weihe IV/2 788
strigosus Michx. IV/2 769
suberectus Anders. IV/2 777
sulcatus Vest IV/2 778
tereticaulis Ph. J. Müll. IV/2 801
thyrsiflorus Weihe IV/2 800
thyrsoideus Wimm. IV/2 781, 782
tomentosus Borkhausen IV/2 782
triphyllus Bellardi IV/2 782
ulmifolius Schott IV/2 784, 786
vestitus Weihe et Nees IV/2 789
villicaulis Koehler IV/2 788
villosus Ait. IV/2 774
vulgaris Weihe et Nees IV/2 781
Rudbeckia L. VI/1 503; VII 211
amplexicaulis Vahl VI/1 504
amplexifolia Jacq. VI/1 504
bicolor Nutt. VI/1 504
chrysomela Michx. VI/1 504
columnaris Pursh VI/1 504
discolor Pursh VI/1 504
fulgida Ait. VI/1 504
fulgida Mechan VI/1 504
gracilis Nutt. VI/1 505
hirta L. VI/1 505
hispida Hoffm. VI/1 504
laciniata L. VI/1 506; VI/2 1367 Fig. 965
perfoliata Cav. VI/1 504
pinnata Vent. VI/1 505
purpurea L. VI/1 504
serotina Nutt. VI/1 505
serotina Sweet VI/1 504
speciosa Lk. VI/1 504
speciosa Wenderoth VI/1 504
strigosa Nutt. VI/1 505
Ruellia L. VI/1 178; VII 205
Rulac negundo Hitchcock V/1 293
Rumex L. III 166; VII 170
abortivus Ruhm. III 186
Acetosa L. III 180
Acetosella L. III 179
acutus L. III 186
acutus Schultz III 185
acutus Wahlenb. III 178
Allionii Lk. III 181
alpinus L. III 171
ambigens Hausskn. III 185
Anthoxanthus Murray III 168
aquaticus L. III 171
aquaticus Poll. III 178
Areschougii Beck III 187
arifolius L. III 181
aureus Mill. III 168
Austriacus Téyb. III 185
Bastelaeri Beck III 185
Baueri Aschers. III 186
Bethkei Abromeit III 187
biformis Menyh. III 174
Bihariensis Simonk. III 186
Brownii Campd. VII 170
Brueggeri Gürke III 187
bucephalophorus L. III 187
confertus Willd. VII 170
confinis Hausskn. III 186
confusus Simonk. III 186
conglomeratus Murray III 175
conspersus Hartm. III 185
crispus L. III 176
cristatus Wallr. III 186
dentatus L. VII 170
digeneus Beck III 186
digynus L. III 188
domesticus Hartm. III 185
dubius Retz. III 175
Dufftii Hausskn. III 187
dumulosus Hausskn. III 185

Rumex erubescens Simonk. III 187
fallacinus Hausskn. III 187
finitimus Hausskn. III 186
flexuosus Soland. VII 171
Garsensis Teyb. III 187
glomeratus Schreb. III 175
Haussknechtii Beck III 185
Heimerlii Beck III 187
heterophyllus Hansen III 187
heterophyllus Schultz III 185
Hispanicus Gmel. III 181
hybridus Hausskn. III 186
Hydrolapathum Huds. III 178
hymenosepalus Torr. III 167
infestus Salisb. III 179
intercedens Rech. III 186
intermedius DC. III 187
Knafii Čelak. III 187
latifolius Mey. III 171
limosus Thuill. III 169
longifolius DC. III 185
maritimus L. III 168
maximus Gmel. III 178
maximus Schreb. III 185
Mezei Hausskn. III 185
montanus Desf. III 181
Mureti Hausskn. III 187
Nemolapathum Ehrh. III 175, 176
nemorosus Schrad. III 176
Niesslii Wildt III 186
nivalis Hegetschw. III 182
obtusifolius L. III 173
odontocarpus Sándor III 174
Olympicus Boiss. III 177
paluster Sm. III 169
palustroides Simonk. III 187
Pannonicus Rech. III 187
Patientia L. III 177
platyphyllus Aresch. III 185
pratensis Mert. et Koch III 186
pulcher L. III 170
Raeticus Brügg. III 185
rubellus Moench III 170
rugosus Campd. III 182
Ruhmeri Hausskn. III 186
Sagorskii Hausskn. III 186
salicifolius Weinm. VII 171
Salisburgensis Fritsch et Rechinger III 186
sanguineus L. III 176
Scandicus Beck III 187
Schmidtii Hausskn. III 186
Schreberi Hausskn. III 186
Schulzei Hausskn. III 186
scutatus L. III 183
Steinii Aresch. III 187
Steinii Becker III 187
stenophylloides Simonk. III 187
stenophyllus Simonk. III 174
subhydrolapathum Schatz III 185
Rumex Thuringiacus III 185, 187
Ucranicus Fisch. III 170
undulatus Schrank III 175
vesicarius L. III 187
virgatus Haenke III 175
Warrenii Trimen III 187
Weberi Fischer-Benzon III 187
Wettsteinii Wildt III 187
Wippraensis K. Wein III 187
„ Wirtgeni Beck III 187
Rumia Hoffm. V/2 1131
„ leiogona C. A. Mey. V/2 1132
Ruppia L. I 140; VII 152
„ maritima L. I 140
Ruprechtia aquilegifolia Opiz III 588
Ruscus L. II 264; VII 162
aculeatus L. II 265
androgynus L. II 264
hypoglossum L. II 266
hypophyllum L. II 264
„ volubilis Thunb. II 261
Russelia Jacq. VII 204
Ruta L. V/1 68; VII 184
divaricata Ten. V/1 70
graveolens L. V/1 69
hortensis Mill. V/1 70
linifolia Maly V/1 73
„ Patavina L. V/1 73
Rutaceae V/1 44; VII 184
Ruthenicus Ritro Curt. VI/2 811
Rutoideae VII 184
Ruyschia thymiflora E. H. L. Krause V/4 2361
Ruyschiana fasciculata Clairv. V/4 2363
laciniata Mill. V/4 2365
spicata Mill. V/4 2363

S.

Sabadilla officinarum Brandt II 199
Sabia Colebr. VII 187
Sabiaceae V/1 309; VII 187
Sabina Spach. VII 151
„ officinalis L. I 92
Sabulina biflora Rchb. III 399
capillacea Rchb. III 406
fastigiata Rchb. III 393
lanceolata Rchb. III 392
mucronata Rchb. III 394
obtusa Rchb. III 400
polygonoides Rchb. III 416
Ponae Rchb. III 414
procera Rchb. III 408
setacea Rchb. III 394
sphagnoides Fröl. III 416
striata Rchb. III 395
tenuifolia Rchb. III 398
verna Rchb. III 400
„ viscosa Rchb. III 398
Saccharomyces V/1 400; V/3 1993; VII 140
Saccharomycetaceae VII 140
Saccharum officinarum L. I 186
Sacobatus vermiculatus Torr. VII 171
Sageretia Brogn. V/1 324; VII 187
Sagina L. III 380; VII 173
apetala L. III 383
breviflora Gilib. III 381
bryoides Fröl. III 382
ciliata Fries III 384, 389
filiformis Pourr. III 383
glabra (Willd.) Fenzl III 387
hybrida Kern. III 389
Linnaei Presl III 385; VII 172 Fig. 1214
maritima Don III 383
media Brügg. III 389
nodosa (L.) Fenzl III 387; VII 37 Fig. 1062
Normanniana Lagerh. III 389
patula Jord. III 384
procumbens L. III 381
quaternella Schloss. III 383
repens Burnat III 387
saginoides (L.) Dalla Torre III 385
saxatilis Wimm. III 385
„ subulata (Sw.) Presl III 386
Sagittaria L. I 155; VII 152
arifolia Sm. I 156
latifolia Willd. VII 152
Montevidensis Cham. et Schlecht. I 156
„ sagittifolia L. I 156
Saintpaulia ionantha Wendl. VI/1 177
Salacia L. V/1 256
Salicaceae III 12; VII 167
Salicales VII 167
Salicariaceae VII 191
Salicornia L. III 254; VII 171
acetaria Pall. III 254
annua Sm. III 254
fruticosa L. III 254
herbacea L. III 254
perennis Mill. III 254
prostrata Pall. III 256
„ Virginia L. III 254
Salisburya adiantifolia Sm. I 74; VII 150
Salix L. III 13; VII 167, Fig. 1149 u. 1205
Abromeitiana H. Gross III 55
acuminata Mill. III 34
acuminata Patze III 50
acutifolia Willd. III 56
adenophylla Bebb. III 57
alba L. III 21
albicans Schleich. III 38, 55
Algovica Bornmüller III 56
alopecuroides Tausch III 51
alpestris Wulf. III 49
alpigena Kern. III 53
alpina Scop. III 49
Amaniana Willd. III 43
ambigua Ehrh. III 54
amygdalifolia Gilib. III 21

Salix amygdalina L. III 21
Andreae Woloszczak III 52
angustifolia Fries III 53
angustifolia Wulf. III 33
annularis Forbes III 56
appendiculata Vahl III 41
appendiculata Vill. III 36
arbuscula L. III 49
arbusculoides Brügg. III 56
arbutifolia Willd. III 48; VII 167
argentea Sm. III 33
atrichocarpa Borb. III 55
attenuata Kern. III 54
aurea Salisb. III 21
auriculata Mill. III 21
aurita L. III 39
auritoides Kern. III 52
aurora Laestad III 54
Ausserdorferi Huter III 53
Austriaca Host III 52
Babylonica L. III 56
Badensis Döll III 54
Baltica Lackschew III 50
Bavarica Brügg. III 54
Beckiana Beck III 52
bicolor Ehrh. III 44
bicolor Fries III 40
bicolor hort. III 55
bifax Woloszczak III 55
bigemmis Hoffm. III 24
bigenera Huter III 55
blanda Anders III 51
Blyttiana Anderss. III 55
Borreri S. F. Gray III 44
Breunia Huter III 53
Burseri Favrat III 52
buxifolia Schleich. III 53
caerulescens Döll III 54
caesia Vill. III 47
calliantha Kern. III 51
Canthiana Kern. III 53
capnoides Kern. III 52
capraeformis Kern. III 53
caprea L. III 34
caprea Vill. III 34
capreola Kern. III 54
carinata Sm. III 49
chlorophana Anderss. III 55
chlorophylla Anderss. III 57
chrysocoma Dode III 51
cinerascens Willd. III 36
cinerea L. III 34
cineroides Pokorny III 54
combinata Huter III 56
compressa Ser. III 24
cordata Mühlenb. III 57
coruscans Jacq. III 49
coruscans Willd. III 45
Cotteti Lagg. III 53
crataegifolia Bertol. III 43
Cremsensis Kern. III 52
Curiensis J. Braun III 56
cuspitata Schultz III 50
Salix daphnoides Vill. III 24
dasyclados Wimm. III 50
Davosiana Brügg. III 56
decipiens Hoffm. III 20
dendroides Kern. III 54
depressa L. III 40
dichroa Döll III 52
digenea Kern. III 52
discolor Host III 52
discolor Schrad. III 55
divaricata Schleich. III 43
Doniana Sm. III 52
dubia Anderss. III 52
dubia Sut. III 48
dumetorum Sut. III 34
Ehrhartiana Sm. III 51
Eichenfeldii Gander III 53
elaeagnifolia Tausch III 51
elaeagnoides Schleich. III 53
Elaeagnos Scop. III 26
elegans Host III 46
elegantissima K. Koch III 56
Erdingeri Kern. III 52
erythroclados Simonk. III 51
eugenes Linton III 53
euryadenia Woloszczak III 53
excelsior Host III 51
fagifolia Waldst. et Kit. III 36
fallax Woloszcak III 52
felina Buser III 54
Fenzliana Kern. III 53
Figerti Camus III 52
Finmarchica Willd. III 54
fissa Hoffm. III 51
fissa Wahlenb. III 23
Forbyana Sm. III 51
fragilior Host III 20
fragilis L. III 20
Friburgensis Cottet III 53
Friesiana Anderss. III 53
Friesii Kern. III 50
fruticosa Doell III 53
fruticulosa Kern. III 55
fusca L. III 32
Gemmia Buser III 54
glabra Scop. III 45
glauca L. III 41
glaucescens Moench III 49
glaucovillosa Handel-Mazzetti III 53
gnaphaloides Schleich. III 53
Goepperti Anderss. III 55
grandifolia Seringe III 36
Gremliana Schwaiger III 52
hastata hort. III 57
hastata L. III 46
Heerii Brügg. III 55
Hegetschweileri Heer III 56
Heidenreichiana Zahn III 54
Heimerlii Braun III 54
Helvetica Vill. III 43
herbacea L. III 26
heterophylla Host III 39
hexandra Ehrh. III 51
Salix hippophaëfolia Thuill. III 51
holosericea Willd. III 53
Hostii Kern. III 53
Hueguenini Brügg. III 56
Huteri Kern. III 55
hybrida Vill. III 34
Jaccardi Buser III 53
Jacquiniana Willd. III 49
Japonica Thunb. III 56
incana Schrank III 26; VII 167 Fig. 1205
intercedens Beck III 52
intermedia Host III 52
inticensis Huter III 52
intricata Huter III 53
iodocarpa Gandog. III 29
Kanderiana Seringe III 52
Khekii Woloszczak III 55
Kitaibeliana Willd. III 31
Kochiana Hartig III 52
Kovatsii Kern. III 51
Kraettliana Brügg. III 55
Krašanii v. Hayek III 54
lagopina Ausserdorfer III 53
lanata Baer III 41
lanata Roth III 33
lanceolata Seringe III 52
lanceolata Sm. III 51
Landaueri Mayer III 55
Langeana Rouy III 54
Lapponum L. III 42
Laschiana Zahn III 54
lasiandra Benth. III 57
latifolia Forbes III 54
laurifolia Wesmael III 19
laurina Sm. III 54
laxiflora Kern. III 55
leucophylla Willd. III 42
ligustrina Host z. T. III 21
limnogena Kern. III 55
limosa Wahlenb. III 42
linearis Forb. III 26
livescens Döll III 55
livida Wahlenb. III 40
longifolia Host III 50
longifolia Lam. III 26
lucida Mühlenberg III 57
ludificans White III 55
Ludwigii Schkuhr III 36
lutescens Kern. III 54
macrophylla Kern. III 54
malifolia Sm. III 46
Margaretae v. Seemen III 51
Mariana Woloszczak III 52
maritima Hartig III 52
Mauckschii Hartig III 36
Medemii Boiss. III 57
Meyeriana Willd. III 50
Mielichhoferi Sauter III 55
molissima Ehrh. III 51
monandra Ard. III 23
montana Forb. III 51
multiformis Döll III 51
multinervis Döll III 54

Salix myrsinites L. III 48; VII 167
myrsinitoides Fries III 55
myrtilloides L. III 33
myrtilloides Willd. III 47
neglecta Cottet III 53
Neilreichii Kern. III 52
Neisseana Kern. III 53
nepetifolia Presl III 55
nigra Marsh. III 57
nigricans Sm. III 43
nitens Gilib. III 42
nitens Gren. et Godr. III 53
obtusifolia Willd. III 55
Oenipontana Kern. III 52
onusta Bess. III 54
onychiophylla Linton III 53
ovata Host III 43
ovata Seringe III 53
paludosa Hartmann III 54
paludosa Lk. III 39
palustris Host III 51
parietariaefolia Host III 43
patula Seringe III 52
Patzei Wimm. et Krause III 55
Paulinae Sündermann III 53
Paxii Woloszczak III 55
pendula C. Koch III 56
pendula Ser. III 20, 51
pentandra L. III 19
persicifolia Schleich. III 20
Petzoldi hort. III 51
phylicifolia L. III 44
phylicifolia Wulf. III 45
Pierotii Miq. III 57
plicata Fries III 54
Pokornyi Kern. III 50
Pomeranica Willd. III 25
Pontederae Bell. III 45
Pontederae Vill. III 46
Pontederana Koch III 52
Preussiana Abromeit III 54
prostrata Ehrh. III 47
prostrata Sm. III 32
proteïfolia Schleich. III 54
pruinosa Bess. III 56
pseudo-myrtoides Zahn III 55
puberula Döll III 54
pulchra Garcke III 25
pumila Salisb. III 26
punctata Wahlenb. III 55
purpurea L. III 23
Pustoriae Rouy III 55
pyrolaefolia Ledeb. III 57
radicans Sm. III 44
Raetica Brügg. III 56
Raetica Rouy III 55
ramosissima Camus III 55
recondita Woloszczak III 53
Reichardtii Kern. III 54
relicta Murr III 54
repens L. III 32
reticulata L. III 29
retusa L. III 30
retusoides Kern. III 54
Salix Reuteri Moritzi III 52
riparia Willd. III 26
Ritschelii Anderss. III 52
rosmarinifolia Gouan III 26
rosmarinifolia L. III 33
rostrata Thuill. III 33
rubens Schrank III 51
rubra Huds. III 51
rugosa Seringe III 39
rugulosa Anderss. III 54
Russeliana Koch III 51
salviifolia Koch III 52
sarmentosa Fries III 53
Schraderiana III 54
Schraderiana Willd. III 55
Schumanniana v. Seemen III 51
scrobigera Woloszczak III 54
semireticulata White III 53
semiretusa Beck III 54
semitriandra Lasch. III 51
sepulcralis Simonk. III 51
sericans Tausch III 53
Seringeana Gaud. III 52
serpyllifolia Scop. III 31
serta White III 56
Siegerti Anderss. III 52
Silesiaca Willd. III 36
simulathrix White III 53
Sitchensis Sanson III 57
Sommerfeltii Anderss. III 53
Sonderiana Junge III 54
sordida Kern. III 52
spadicea Vill. III 43
spathulata Willd. III 39
speciosa Host III 51
sphaerocephala Kern. III 52
spuria Schleich. III 55
Starkeana Willd. III 40
stenoclados Döll III 54
stipularis Bonj. III 38
stipularis Sm. III 50, 53
Stolbergensis Wallr. III 46
stylaris Seringe III 43
subalpina Forbes III 52
subaurita Anderss. III 55
subcaprea Anderss. III 54
subcinerea Anderss. III 54
subglabra Kern. III 55
subnivalis Brügg. III 53
subsericea Döll III 54
subtriandra Neilr. III 51
Sudetica Host III 42
syrtifolia Fern. III 57
Tauschiana Sieb. III 55
tetrandra Fries III 50
tetrapla Walker III 55
Thomasiana Rchb. III 53
thymelaeoides Schleich. III 55
tinctoria Sm. III 19
tomentosa Host III 41
Trefferi Huter III 56
Trevirani Spr. III 51
triandra L. III 21
Salix ulmifolia Thuill. III 34
vagans Anderss. III 40
Vaudensis Schleich. III 54
viminalis L. III 26
violacea Andrews III 56
virescens Vill. III 26
viridis Fries III 51
vitellina L. III 23
Vratislaviana Kern. III 53
Wagae Zalewski III 51
Wahlenbergii Anderss. III 55
Waldsteiniana Willd. III 50
Weigeliana Willd. III 44
Wichurae Pokorny III 51
Wimmeri Kern. III 52
Wimmeriana Gren. et Godr. III 52
Wulfeniana Willd. III 45
Zabelii Dieck III 47
„ Zedlitziana Kern. III 53
Salpichroa Miers VII 203
Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav. V/4 2554
Salpingantha hort. VI/1 178
Salsola L. III 258; VII 171
acicularis Salisb. III 258
arenaria Maerkl. III 250
carinata Spr. III 232
collina Pall. III 258
decumbens Lam. III 258
fruticosa Kit. III 249
hirsuta L. III 248
Kali L. III 258
lanata Poll. III 249
maritima Poir. III 257
prostrata L. III 249
rosacea Schkuhr III 259
salsa L. III 258
sativa Host III 257
scariosa Stok. III 258
scoparia L. III 251
Soda L. III 258
Soongorica Siev. III 251
„ tragus Rchb. III 259
Salvadoraceae V/3 1901; VII 187
Salvia L. V/4 2475; VII 203
acuminatissima Vent. V/4 2478
Aethiopis Brot. V/4 2477
Aethiopis L. V/4 2492
amabilis Kth. V/4 2478
ambigua Čelak. V/4 2506
amethystina Sm. V/4 2478
angustifolia Michx. V/4 2478
argentea L. V/4 2477
Atlantica Pers. V/4 2477
Austriaca Jacq. V/4 2493
azurea Lam. V/4 2478
betonicaefolia Lam. V/4 2496
betonicifolia Ettling V/4 2477, 2506
bicolor Desf. V/4 2477
bracteata Sims V/4 2489
Brasiliensis Spruce V/4 2478
caesia Scheele V/4 2478

Salvia candidissima Guss. V/4 2477
cardinalis Kth. V/4 2479
carduacea Benth. V/4 2479
chromatica Hoffgg. V/4 2480
clandestina L. V/4 2496
coccinea L. V/4 2479
colorans hort. V/4 2478
colorata Thore V/4 2488
crassifolia Cav. V/4 2477
Cremenecensis Bess. V/4 2477
Cretica L. V/4 2480
cyanea Benth. V/4 2478
elata Host V/4 2506
elegans Vahl V/4 2479
farmacea Benth. V/4 2478
filamentosa Tausch V/4 2479
fragifera Ettling V/4 2479
fulgens Cav. V/4 2479
Garganica Ten. V/4 2500
glaucescens Pohl V/4 2479
glutinosa L. V/4 2485
Grahami Benth. V/4 2479
grandiflora Ettling V/4 2483
grandiflora Nee V/4 2478
grandiflora Ten. V/4 2480
Greggii Gray V/4 2479
Gussonii Briss. V/4 2477
Hablitziana Schrad. V/4 2477
hastata Ettl. V/4 2477
Heerii Regel V/4 2479
hians Royle V/4 2477
hiemalis Brot. V/4 2496
Himalayaca hort. V/4 2477
Hispanica L. V/4 2478
Hispanorum Lag. V/4 2482
Horminium Sibth. et Sm. V/4 2487
horminoides Gren. et Godr. V/4 2496
Horminum L. V/4 2487
Illyrica Schultes V/4 2496
incarnata Cav. V/4 2479
interrupta Schousb. V/4 2477
involucrata Cav. V/4 2479
Kanitziana Simonk. V/4 2477
Kochiana Kunze V/4 2492
laevigata Kunth V/4 2479
lamiifolia Jacq. V/4 2478
lanata Moench V/4 2492
lanceifolia Poir. V/4 2478
lanceolata Brouss. V/4 2478
lavandulaefolia Hegetschw. V/4 2483
lavandulaefolia Vahl V/4 2482
Linnaei Rouy V/4 2495
macrantha Schlecht. V/4 2478
macrophylla Tausch V/4 2477
major Garsault V/4 2483
major Gmel. V/4 2480
Mexicana L. V/4 2478
Mexicana Walt. V/4 2478
microcaulis Poir. V/4 2479
minor Gmel. V/4 2483
Salvia multifida Sibth. et Sm. V/4 2496
nemorosa L. V/4 2501
nudicaulis C. Koch V/4 2500
nutans L. V/4 2477
oblongata Vahl V/4 2496
officinalis L. V/4 2480
oppositiflora Ruiz et Pav. V/4 2479
Palatina Fr. Zimmermann V/4 2506
pallidiflora Saint-Am. V/4 2496
patens Cav. V/4 2478
pendula Bess. V/4 2477
pendula Vahl V/4 2477
pinifolia Pall. V/4 2477
polymorpha Hoffmgg. V/4 2496
pomifera L. V/4 2479
porphyrantha Dec. V/4 2479
praecox Savi V/4 2496
pratensis L. V/4 2496
pratensis L. subsp. haematodes (L.) Briq. V/4 2499
pratensis L. subsp. Hierosolymitana (Boiss.) V/4 2500
pratensis L. subsp. vulgaris (Rchb.) Briq. V/4 2498
punicea Mart. et Gal. V/4 2479
Pyrenaica Vahl V/4 2477
reflexa Hornemann V/4 2477
ringens Sibth. et Sm. V/4 2477
Roemeriana hort. V/4 2479
Roemeriana Scheele V/4 2479
rosea Vahl V/4 2479
Rosmarinus Spenn. V/4 2518
Scabiosa Pers. V/4 2477
scabiosifolia Lam. V/4 2477
Schimperi hort. V/4 2271
Sclarea L. V/4 2489
Sibthorpii Kze. V/4 2496
silvestris L. V/4 2506
Simsiana Roem. et Schult. V/4 2489
Spielmanni Scop. V/4 2488
Spielmanniana Bieb. V/4 2496
splendens Sellow V/4 2478
sylvestris Jacq. V/4 2501
Taurica Hablitz V/4 2477
tenuior Desf. V/4 2483
tomentosa Mill. V/4 2483
trichostemmoides Pursh V/4 2478
trichostyla Bisch. V/4 2478
tricolor Lem. V/4 2479
truncata Willd. V/4 2488
Verbenaca L. V/4 2495
verbenacoides Brot. V/4 2496
verticillata L. V/4 2503
virgata Ait. V/4 2500
„ viridis L. V/4 2487, 2488
Salvinia Micheli I 47; VII 149
„ natans L. I 47
Salviniaceae I 47; VII 149
Salzwedelia sagittalis Fl. Wett. IV/3 1196
Samadera Indica Gaertn. V/1 79
Sambucus L. VI/1 235; VII 207
caerulea Raf. VI/1 235
Canadensis L. VI/1 235
Ebulus L. VI/1 236
humilis Lam. VI/1 236
nigra L. VI/1 237
pubens Michx. VI/1 235
pubescens Pers. VI/1 235
„ racemosa L. VI/1 240
Samolus L. V/3 1875; VII 197
aquaticus Lam. V/3 1875
beccabunga-facie Gilib. V/3 1875
bracteatus Stok. V/3 1875
caulescens Willd. V/3 1875
geniculatus Dul. V/3 1875
parviflorus Rafin. V/3 1875
Valerandi L. V/3 1875; VII 99 Fig. 1127
Sanchezia Ruiz. et Pav. VI/1 178
Sanguinaria Canadensis Cham. VII 176
Sanguisorba L. IV/2 935; VII 181
dictyocarpa Gremli IV/2 941
dodecandra Moretti IV/2 936
macrostachya Comolli et Jan IV/2 936
maior L. IV/2 937
minor Scop. IV/2 939
montana Jord. IV/2 938
muricata Gremli IV/2 941
officinalis L. IV/2 937
Poterium Web. IV/2 939
praecox Bess. IV/2 938
Sabauda Mill. IV/2 938
Sanguisorba Aschers. et Graebner IV/2 939
„ spinosa (L.) Bertol. IV/2 936
Sanicula L. V/2 957; VII 193
Bavarica Krause V/2 969
epipactis E. H. L. Krause V/2 959
Europaea L. V/2 957
officinalis Gouan V/2 957
officinarum Necker V/2 957
trilobata Gilib. V/2 957
„ vulgaris V/2 957
Saniculoideae V/2 950; VII 193
Sanseviera Thunb. II 280
Santalaceae III 150; VII 169
Santalales III 160; VII 169
Santalum album L. III 151
Santia plumosa Savi I 221
Santolina Chamaecyparissus (L.) VI/2 672; VII 210 Fig. 1263
pinnata Viv. VI/2 673
„ suaveolens Pursh VI/2 584
Sanvitalia procumbens Lam. VI/1 528; VI/2 1353 Fig. 956
Sapindaceae V/1 202, 306; VII 187
Sapindales V/1 202; VII 186

Sapindus Saponaria L. V/1 307
Sapium P. Br. V/1 119; VII 186
„ sebiferum Rox. V/1 120
Saponaria L. III 344; VII 173
alpestris Fenzl III 305
bellidifolia Sm. III 344
Boissieri Sünderm. III 348
dioeca Moench III 300
Elisabethae Fenzl III 304
fastigiata Lam. III 313
laeta Fritsch et Sünderm. III 348
lutea L. III 348
muralis Lam. III 310
nana Fritsch III 347
nervosa L. III 344
ocymoides L. III 345
officinalis L. III 344
Orientalis L. III 344
peregrina Fritsch et Sünderm. III 348
pulchella Fritsch et Sünderm. III 348
pumila (St. Lag.) Janchen III 347
Pumilio Borb. et Wohlf. III 347
repens Lam. III 345
Suendermanni Fritsch III 348
Vaccaria L. III 317
viscosa Dul. III 345
vulgaris Pall. III 344
„ Wiemanni Fritsch III 348
Sapotaceae V/3 1895; VII 197
Saprolegniaceae VII 140
Saracha viscosa Schrad. V/4 2554
Sarcocaulon (DC.) Sweet IV/3 1660
Sarcococcus prunifolia Lindl. V/1 203
„ saligna Müll.-Aarg. V/1 203
Sarcodes Torr. VII 195
Sarcogonum Don. VII 171
Sarcolobae IV/3 1497
Sarcolobus R. Br. V/3 2063
Sarcopoterium Spach VII 181
Sargentia Wats. VII 184
„ Greggii Wats. V/1 52
Sarothamnus Wimm. IV/3 1181; VII 182
obtusatus Gandoger IV/3 1182
purgans Godr. IV/3 1168
scoparius (L.) Wimm. IV/3 1182
„ vulgaris Wimm. IV/3 1182
Sarracenia L. IV/2 510
purpurea L. IV/2 510; VII 120 Fig. 1157
Sarraceniales IV/2 510; VII 178
Sassafras officinalis Nees ab Esenbeck IV/1 11; VII 176
Satureja L. em. Briq. V/4 2279; VII 201
Acinos (L.) Scheele V/4 2297, 2548 Fig. 3380 A
alpina (L.) Scheele V/4 2299
argentea (Kunth) Briq. V/4 2280
Satureja Calamintha (L.) Scheele V/4 2290
Calamintha (L.) Scheele subsp. Brauneana (Hoppe) V/4 2293
Clinopodium Car. V/4 2295
coccinea (Nutt.) Bert. V/4 2280
elliptica (Ruiz et Pav.) Briq. V/4 2280
Gilliesii (Grah.) Briq. V/4 2281
glabra (Nutall) Thellung V/4 2281
glandulosa Car. V/4 2292
Graeca L. V/4 2286
grandiflora (L.) Scheele V/4 2288
hortensis L. V/4 2282
hyssopifolia Bert. V/4 2285
Illyrica Host V/4 2285
intermedia J. Wagner V/4 2294
Juliana L. V/4 2280
Karstiana Just. V/4 2285
Kerneri Fritsch V/4 2287
Kunthii Briq. V/4 2281
menthaefolia Fritsch V/4 2294
mixta Dalla Torre et Sarnth. V/4 2301
montana L. V/4 2284
nepetoides Fritsch V/4 2293
rupestris Wulf. V/4 2287
subnuda Dörfl. V/4 2293
subspicata Vis. V/4 2285
thymifolia Scop. V/4 2287
variegata Host V/4 2285
viminea Burm. V/4 2282
vulgaris (L.) Fritsch V/4 2295
„ vulgaris Rouy V/4 2290
Satyriaceae VII 164
Satyrium Sw. VII 164
albidum L. II 368
alpinum Schmidt II 363
bifolium Wahlenb. II 372
conopeum Wahlenb. II 369
Epipogium L. II 383
hircinum L. II 360
hirsutum Gilib. II 390
Monorchis Pers. II 362
nigrum L. II 365
repens L. II 390
spirale Hoffm. II 385
„ viride L. II 363
Saulcya hierochuntica Michon VI/1 495
Sauromatum Schott VII 157
Saururaceae III 209; VII 165
Saururus Loureiri Decne. III 209
Saussurea DC. VI/2 835; VII 212
alpina (L.) DC. VI/2 839
alpina L. var. lapathifolia L. VI/2 837
discolor (Willd.) DC. VI/2 837
lapathifolia G. Beck VI/2 837
monocephala Cass. VI/2 836
pygmaea (Jacq.) Spr. VI/2 836; VII 213 Fig. 1267
Sauvagesia L. VII 189
Saxegothaea Lindb. I 79
Saxifraga L. VI/2 568; VII 179
adscendens L. IV/2 619
ajugaefolia L. IV/2 574
aizoides L. IV/2 596
Aizoon Jacq. IV/2 591
Aizoon Sut. IV/2 593
androsacea L. IV/2 605
annua Lap. IV/2 620
aphylla Sternb. IV/2 602
arachnoidea Sternb. IV/2 618
aretioides Sternb. IV/2 632
aspera L. IV/2 597
aspera L. subsp. bryoides (L.) Gaud. IV/2 598
aspera L. subsp. elongata Gaud. IV/2 597
autumnalis L. IV/2 596
Baumgartenii Schott IV/2 583
Bernardensis Vacc. IV/2 632
Besleri Sternb. IV/2 589, 590
biflora All. IV/2 577, 578
blepharophylla Kern. IV/2 581
bronchialis L. IV/2 599
bryoides L. IV/2 598
bulbifera Gunnerus IV/2 617
bulbifera L. IV/2 616
Burseriana L. IV/2 585
Burseriana Sut. IV/2 586
caerulea Pers. IV/2 579
caesia L. IV/2 583
caesia Scop. IV/2 584
caespitosa L. IV/2 606, 613
canaliculata Boiss. et Reut. IV/2 575
cernua L. IV/2 617
Churchilii Hut. IV/2 632
comosa Retz. IV/2 625
controversa Sternb. IV/2 619
Cotyledon L. IV/2 593; VII 103 Fig. 1134
Cotyledon Sut. IV/2 591
crassifolia L. IV/2 566
crustacea Hoppe IV/2 588
crustata Vest IV/2 588
cuneifolia L. IV/2 626
cuscutiformis Lodd. IV/2 575
Cymbalaria L. IV/2 574, 575; VII 31 Fig. 1054
decipiens Ehrh. IV/2 612
decipientioides Engler et Irmscher IV/2 632
depressa Sternb. IV/2 606
diapensioides auct. IV/2 587
diapensioides Bell. IV/2 587
elatior Maly IV/2 590
elatior Mert. et Koch IV/2 589
Engleri Hut. IV/2 632
exarata Vill. IV/2 609
Facchinii Koch IV/2 601
Fassana Handel-Mazzetti IV/2 606
Forojulensis Sünderm. IV/2 632

Saxifraga Forsteri Stein IV/2 632
Fortunei Hook. IV/2 575
Freibergii Ruppert IV/2 633
Gaudinii Brügg. IV/2 632
geïfolia St. Lag. IV/2 627
geranioides Host IV/2 619
geranioides L. IV/2 574
Geum L. IV/2 627
Girtanneri Brügg. IV/2 632
glabrata Čelak. IV/2 614
glauca Clairv. IV/2 587
granulata L. IV/2 615
granulata Poll. IV/2 616
granulatoides Engler et Irmscher IV/2 632
Hausmanni Kern. IV/2 632
Haussknechtii Engler et Irmscher IV/2 632
heucherifolia Griseb. et Schenk IV/2 629
hieraciifolia Waldst. et Kit. IV/2 622
Hirculus L. IV/2 621; VII 179 Fig. 1223
Hostii Tausch IV/2 589
Hostii Tausch subsp. Dolomitica Br.-Bl. IV/2 590
Huetiana Boiss. IV/2 574, 575
Huteri Ausserdorfer IV/2 632
hypnoides L. IV/2 614
hypnoides Scop. IV/2 619
Jaeggliana Brügg. IV/2 632
imbricata Lam. IV/2 582
imperfecta Br.-Bl. IV/2 632
inclinata Kern. IV/2 632
incrustata Vest IV/2 588
juniperifolia Adams IV/2 574
Kochii auct. IV/2 578
leucantha Thomas IV/2 610
lingulata Bell. IV/2 574
longifolia Host IV/2 588, 589
longifolia Lap. IV/2 574
lutea Gilib. IV/2 621
macropetala Kern. IV/2 578
maculata Schrank IV/2 591
marginata Sternb. IV/2 574
media Gouan IV/2 574
Montavoniensis Kern. IV/2 593
moschata Wulf. IV/2 606
moschata Wulf. subsp. basaltica Br.-Bl. IV/2 609
moschata Wulf. subsp. linifolia Br.-Bl. IV/2 607
moschata Wulf. subsp. pseudoexarata Br.-Bl. IV/2 609
moschata Wulf. subsp. Rhodanensis Br.-Bl. IV/2 608
moschata Wulf. var. Rhei (Schott) IV/2 609
multiflora Ehrh. IV/2 593
multinervis Dul. IV/2 605
Murithiana Tissière IV/2 580
muscoides All. IV/2 600
muscoides auct. IV/2 606
Saxifraga muscosa Sut. IV/2 606
mutata L. IV/2 595
nivalis L. IV/2 623
Norica Kern. IV/2 632
nutans Adams IV/2 621
oppositifolia L. IV/2 579
oppositifolia L. subsp. amphibia Sünderm. IV/2 580
oppositifolia L. subsp. arcto-alpina Br.-Bl. IV/2 579
Padellae Brügg. IV/2 632
pallens Fritsch IV/2 632
palmata Sm. IV/2 613
paradoxa Sternb. IV/2 630
patens Gaud. IV/2 632
pectinata Schott, Nym. et Kotschy IV/2 632
Pedemontana All. IV/2 611
Pensylvanica L. IV/2 574
petraea L. IV/2 619
petraea Roth IV/2 612
planifolia (Lap.) Sternb. IV/2 600
plantaginifolia Hook. IV/2 622
Ponae Sternb. IV/2 619
porophylla Bert. IV/2 574
pungens Clairv. IV/2 586
purpurea All. IV/2 582
pyramidalis Lap. IV/2 593
quinquefida Haw. IV/2 614
Raetica Kern. IV/2 589
reflexa St. Lag. IV/2 621
Regelii Kern. IV/2 632
retusa Gouan IV/2 582
Reyneri Hut. IV/2 632
rosacea Moench IV/2 612
rosea Lap. IV/2 577
rotundifolia L. IV/2 628
Rudolphiana Hornsch. IV/2 581
rupestris Willd. IV/2 619
sancta Griseb. IV/2 574
sarmentosa L. IV/2 575
sedoides L. IV/2 603
Seguierii Spr. IV/2 604
Sibthorpii Boiss. IV/2 574
Sotchensis Engler IV/2 632
spuria Kern. IV/2 632
squarrosa Sieber et Tausch IV/2 584
Steinmanni Tausch IV/2 614
stellaris L. IV/2 624
stenopetala Gaud. IV/2 602
tenella Wulf. IV/2 599
tenuis H. Smith IV/2 624
Tiroliensis Kern. IV/2 632
Tombeanensis Boiss. IV/2 587
trichodes Scop. IV/2 603
tridactylites L. IV/2 620
trifida Gilib. IV/2 620
trifurcata Schrad. IV/2 574, 575
umbrosa L. IV/2 627
Vandellii Sternb. IV/2 586
varians Sieber IV/2 606
Saxifraga veronicaefolia Pers. IV/2 616
Vierhapperi Handel-Mazzetti IV/2 632
vivipara Vest IV/2 616
Wettsteinii Brügg. IV/2 632
Wulfeniana Schott IV/2 583
Zimmeteri Kern. IV/2 632
Saxifragaceae IV/2 562; VII 179
Saxifragoideae VII 179
Scabiosa L. VI/1 303; VII 208
alpina L. VI/1 286
arvensis L. VI/1 292
atropurpurea L. VI/1 303
Bohemica Schmidt VI/1 293
canescens Waldst. et Kit. VI/1 307
Caucasica Bieb. VI/1 303
ciliata Endlicher VI/1 294
collina Hegetschw. VI/1 293
Columbaria L. VI/1 309
Columbaria L. subsp. Gramuntia (L.) Hayek VI/1 309
Columbaria L. var. lucida Coult. VI/1 308
Columbaria L. var. ochroleuca Coult. VI/1 310
Columbaria L. var. Pyrenaica Ambrosi VI/1 308
dipsacifolia Host VI/1 300
diversifolia Baumg. VI/1 293
graminifolia L. VI/1 304
Hladnikiana Host VI/1 307
integrifolia Sut. VI/1 299
Krašani Hayek VI/1 308
leucantha VI/1 286
leucophylla Borb. VI/1 308
lucida auct. VI/1 310
lucida Vill. VI/1 308
lucidula Beck VI/1 311
mediterranea Viv. VI/1 286
Norica Vest VI/1 308
ochroleuca L. VI/1 310
Pannonica Jacq. VI/1 301
polymorpha Schmidt VI/1 293
praemorsa Gilib. VI/1 288
psilophylla Beck VI/1 311
silenifolia Waldst. et Kit. VI/1 306
silvatica L. VI/1 300
silvatica L. var. longifolia Mert. et Koch VI/1 298
Styriaca Vest VI/1 310
suaveolens Desf. VI/1 307
Succisa L. VI/1 288
Transsilvanica L. VI/1 287
Trenta Hacquet VI/1 286
„ Vestina Facch. VI/1 305
Scabiosaceae VII 208
Scaevola Koenigii Vahl VI/2 1359
Scandiceae V/2 954; VII 193
Scandicium Damascena Bornm. V/2 1032
hispidula Bert. V/2 1032

Scandicium parviflora Retz. V/2 1032
pinnatifida Vent. V/2 1032
Russelliana Griseb. V/2 1032
stellatum (Solander) Thellung V/2 1032
Scandix L. V/2 1032; VII 193
affinis C. Koch V/2 1035
Anthriscus L. V/2 1030
apiculata DC. V/2 1036
aromatica Röhling V/2 1002
aurea Roth V/2 1003
australis Bert. V/2 1039
australis Bourgeau V/2 1034
australis L. V/2 1034
australis L. subsp. Balcanica Vierhapper V/2 1034
australis L. subsp. Gallica Vierhapper V/2 1035
australis L. subsp. Pontica Vierhapper V/2 1035
australis Willkomm et Lange V/2 1034
Balansae Reut. V/2 1036
brachycarpa Guss. V/2 1038
brevirostis Boiss. et Reut. V/2 1034
Bulbocastanum Moench V/2 1191
bulbosa Roth V/2 998
Cerefolium L. V/2 1027
Cretica Mill. V/2 1039
cornuta Gilib. V/2 1037
curvirostris Halacsy V/2 1034
curvirostris Murb. V/2 1036
falcata Bieb. V/2 1036
falcata Londes V/2 1035
fumarioides Waldst. et Kit. V/2 1026
Georgica C. Koch V/2 1036
glochidiata Labill. V/2 1503
grandiflora L. V/2 1035
hirsuta Bert. V/2 1035
hirsuta Scop. V/2 1006
hispida Gilib. V/2 1030
Iberica Bieb. V/2 1036
lasiocarpa Stapf V/2 1036
macrorrhyncha C. A. Mey. V/2 1039
macrorrhyncha Thellung V/2 1040
microcarpa Lange V/2 1034
nodosa L. V/2 994
nutans Moench V/2 996
odorata L. V/2 1041
Pecten Scop. V/2 1037
Pecten-Veneris L. V/2 1037
pectinifera Stok. V/2 1037
pectiniformis St. Lag. V/2 1037
Pisidica Boiss. V/2 1036
radiata Salisb. V/2 1034
rostrata Salisb. V/2 1037
stellata Solander V/2 1032
temula Web. V/2 996
tenuifolia Salisb. V/2 1027
Scandix Tymphaea Vierhapper V/2 1039
„ vulgaris S. F. Gray V/2 1037
Scaphespermum Edgew. V/2 1226
Schauera Nees VI/1 178; VII 212
Schedonorus asper Trin. I 356
Schellanderia Carinthiaca Francisci VI/1 386
Schellhammeria capitata Moench II 58
Schenodorus inermis Pal. I 359
pumilus Roem. et Schult. I 349
„ spadiceus Koch et Schult. I 346
Scheuchzeria L. I 147; VII 152
palustris L. I 147
„ paniculata Gilib. I 147
Scheuchzeriaceae VII 102
Schinopsis Balansae Engl. V/1 217
Lorentzii (Griseb.) Engl. V/1 217
Schinus molle L. V/1 217
Schinzia leguminosarum Frank IV/3 1117
Schismus Pal. VII 155
Schistostegaceae VII 145
Schiwereckia Korabensis O. E. Schulz VII 178
Podolica (Bess.) Andrz. IV/1 374
Schizaea Sm. VII 148
Schizaeaceae VII 148
Schizanthus Ruiz et Pav. VII 203
candidus Lindl. V/4 2555
Grahamii Gill. V/4 2555
Hookeri Gill. V/4 2555
pinnatus Ruiz et Pavon V/4 2555
„ retusus Hook. V/4 2555
Schizochlaenaceae V/1 426; VII 188
Schizocodon Sieb. et Zucc. V/3 1713; VII 195
Schizomycetes VII 135
Schizonotus A. Gr. VII 199
Schizopetaleae IV/1 357; VII 177
Schizopetalum Walkeri Hook. VI/1 357
Schizophyceae VII 136
Schizophyta VII 135
Schizostylis Back. et Harv. VII 163
Schizotheca hastata Fourr. III 243
laciniata Fourr. III 247
litoralis Fourr. III 240
oblongifolia Čelak. III 241
patula Fourr. III 242
rosea Fourr. III 246
„ Tatarica Čelak. III 241, 247
Schkuhria advena Thellung VI/2 1366; VII 211
Schleichera Willd. V/1 307
Schlosseria Vukot. V/2 1364
„ heterophylla Vukot. V/2 1377
Schmaltzia aromatica Small. V/1 220
trilobata Small. V/1 220
Schmidtia pappapharoides Steudel VII 155
subtilis Tratt. I 220
„ utriculosa Sternb. I 220
Schnizleinia Steud. V/2 1299
„ nodiflora Steud. V/2 1299
Schoberia maritima C. A. Mey. III 257
Schoenocaulon officinale (Schlecht.) A. Gray II 199
Schoenodorus poaeformis Roem. et Schult. I 301
Scheuchzeri Roem. et Schult. I 351
„ violaceus Lk. I 301
Schoenoplectus Americanus Volkart II 36
carinatus Pall. II 37
Kalmussii Palla II 31
lacustris Palla II 28
mucronatus Palla II 35
supinus Palla II 34
Tabernaemontanus Palla II 30
„ triqueter Palla II 35
Schoenus Vahl II 45; VII 156
aculeatus L. I 209
albus L. II 48
compressus L. II 43
ferrugineus L. II 46
fuscus L. II 49
iuncens Willd. II 34
minimus Forster II 162
monoicus Sm. II 50
nigricans L. II 45
„ rufus Huds. II 43
Schollera Oxycoccus Roth V/3 1686
Schrankia Med. IV/1 286
divaricata Moench IV/1 288
„ rugosa Med. IV/1 290
Schrebera Roxb. V/3 1903; VII 197
Schweinitzia Ell. VII 195
Schweykerta C. C. Gmel. V/3 1961
„ nymphoides Gmel. V/3 1961
Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc. I 81; VII 151
Scilla L. II 246; VII 159 u. 2 Fig. 968
amoena L. II 246
autumnalis L. II 248
azurea Goldb. II 246
Bertolonii Duby II 246
bifolia L. II 247
campanulata Ait. II 247
campestris Savi II 252
cernua Red. II 246
Hispanica Mill. II 247
hyacinthoides L. II 247
Italica L. II 246
maritima L. II 278
non scripta Hoffgg. et Lk. II 249
nutans Sm. II 249
Peruviana L. II 247

Scilla pratensis Waldst. et Kit. II 247
Sibirica Andrews II 246
silvatica Czetz II 247
silvestris Savi II 255
„ verna Huds. II 247
Sciophila convallarioides Wib. II 267
Scirpoideae VII 155
Scirpus L. I 27; VII 155
acicularis L. II 41
affinis L. II 33
alpinus Schleich. II 26
Americanus Pers. II 36
annuus All. II 22
atropurpureus II 39
Baeothryon Ehrh. II 40
caespitosus Dum. II 24
capitatus Schreb. II 39
caricinus Schrad. II 43
Caricis Retz. II 43
carinatus Sm. II 36
Carniolicus Neilr. II 42
compressus Pers. II 43
corymbosus Forsk. II 33
diphyllus Retz. II 22
Duvalii auct. nec Hoppe II 31
Duvalii Hoppe II 36
fluitans L. II 44
fluitans Spr. II 41
glaucus Sm. II 30
glomeratus Scop. II 35
gracilis Rchb. II 42
gramineus Neck. II 31
Halleri Vitm. II 34
Holoschoenus L. II 28
intermedius Čelak. II 37
Kalmussii Aschers., Abromeit et Graebn. II 31
Kuekenthalianus P. Junge II 37
lacustris L. II 28; VII 116 Fig. 1151
lateralis Retz. II 34
lateriflorus Gmel. II 34
latifolius Gilib. II 31
Lereschii Thom. II 39
maritimus L. II 33
Michelianus Gouan II 162
Michelianus L. II 12
mucronatus All. II 36
mucronatus L. II 35
mucronatus Poll. II 35
multicaulis Sm. II 40
nanus Spr. II 41
ovatus Roth II 39
palustris L. II 38
parvulus Roem. et Schult. II 41
pauciflorus Lightf. II 40
Pollichii Gren. et Godr. II 35
pungens L. II 36
pusillus Vahl II 41
radicans Schkuhr II 32; VII 34 Fig. 1057
reptans Thuill. II 38
Rossellinii Ces. II 37
Scirpus Rothii Hoppe II 36
rufus Schrad. II 43
Schmidtianus P. Junge II 37
setaceus L. II 44
silvaticus L. II 31
supinus L. II 34
Tabernaemontanus Gmel. II 30
triangularis Steud. II 36
trichophorum Aschers. et Graebn. II 23
trigonus Roth II 35
triqueter Roth II 36
triquetrus L. II 35
Scitamineae II 320; VII 163
Sclarea argentea Mill. V/4 2477
Aethiopis Mill. V/4 2492
distans Moench V/4 2493
glutinosa Mill. V/4 2485
pratensis Mill. V/4 2496
„ vulgaris Mill. V/4 2489
Scleranthoideae III 272
Scleranthus L. III 433; VII 173
alpestris Hay. III 435
annuus L. III 434
biennis Reut. III 434
campestris Schur III 434
intermedius Kittel III 436
perennis L. III 434
„ verticillatus Tausch III 434
Sclerocarya Hochst. V/1 217; VII 186
Sclerochloa Pal. VII 155
dura (L.) Pal. I 299
maritima Lindl. I 324
„ rigida Lk. I 354
Scleropoa Griseb. I 354
„ rigida (L.) Griseb. I 354
Scleropus crassipes Moqu. III 261
Sclerospermae VII 190
Sclerotinia Rhododendri Fisch. V/3 1631
Scolochloa arundinacea Mert. et Koch I 270
„ festucacea Lk. I 317
Scolopendrium Adanson I 34; VII 149
officinarum Sw. I 34
vulgare Sm. I 34; I/CXVI Fig. 199
Scolymus L. VI/2 1006; VII 212
Hispanicus L. VI/2 1006
„ maculatus L. VI/2 1006
Scopolia Jacq. V/4 2569; VII 205
Carniolica Jacq. V/4 2570
Hladnikiana Biatzovsky V/4 2571
Japonica Maxim. V/4 2570
lurida (Lk. et Otto) Dun. V/4 2570
Tangutica Maxim. V/4 2570
„ viridiflora Reichenb. V/4 2571
Scopolina Schult. V/4 2569; VII 203
„ atropoides Schult. V/4 2570
Scorodonia Botrys Ser. V/4 2532
Scorodonia heteromalla Moench V/4 2534
sylvestris Lk. V/4 2534
Scorodosma Bunge V/2 1354
Assa-foetida Karst. V/2 1356
„ foetida Bunge V/2 944, 1356
Scorpiurus muricatus L. IV/3 1463
pinnatus Mill. IV/3 1476
subvillosus L. IV/3 1463
sulcatus L. IV/3 1463
vermiculatus L. IV/3 1463
Scorpius spinosus Moench IV/3 1210
Scorzonera L. VI/2 1053; VII 212
alpina Hoppe VI/2 1056
angustifolia Scop. VI/2 1066
angustifolia Waldst. et Kit. VI/2 1067
aristata Ramond VI/2 1056
Austriaca Willd. VI/2 1065
Bohemica Schmidt VI/2 1063
calcitrapifolia Vahl VI/2 1071
calvescens VI/2 1068
caricifolia Pall. VI/2 1060
Dalmatica Host VI/2 1067
Fehriana VI/2 1061
glastifolia Willd. VI/2 1063
graminifolia Hoffm. VI/2 1063
graminifolia Ledeb. VI/2 1057
grandiflora Lapeyr. VI/2 1056
hirsuta Host VI/2 1067
Hispanica L. VI/2 1061
Hoppeana Sieb. VI/2 1056
humilis Jacq. VI/2 1065
humilis Jacq. var. Austriaca DC. VI/2 1065
humilis L. VI/2 1057
Jacquiniana Boiss. VI/2 1068
laciniata Jacq. VI/2 1068
laciniata L. VI/2 1069
latifolia Vis. VI/2 1066
lorea Griseb. VI/2 1068
octangularis Willd. VI/2 1069
parviflora Jacq. VI/2 1060
paucifida DC. VI/2 1069
petiolaris Lapeyr. VI/2 1069
purpurea L. VI/2 1054
purpurea L. subsp. rosea (Waldst. et Kit.) Herrm. VI/2 1055
resedifolia Vahl VI/2 1071
rosea Waldst. et Kit. VI/2 1055
sativa Gaertn. VI/2 1061
tuberosa Pall. VI/2 1053
„ villosa Scop. VI/2 1067
Scribaea divaricata Gaertn. III 307
Scrophularia L. VI/1 30; VI/2 1360; VII 204
alata Gilib. VI/1 32
aquatica L. VI/1 32
auriculata L. VI/1 32
auriculata Scopoli VI/1 34
Balbisii Hornem. VI/1 32
canina L. VI/1 35

Scrophularia chrysantha Jaub et Spach VI/1 32
Ehrhartii Steven VI/1 32
glandulosa Waldst. et Kit. VI/1 34
Hoppei Koch VI/1 35
laciniata Waldst. et Kit. VI/1 35
nodosa L. VI/1 33
peregrina L. VI/1 31
Scopolii Hoppe VI/1 34
umbrosa Dum. VI/1 32
variegata Rchb. VI/1 35
„ vernalis L. VI/1 31
Scrophulariaceae VI/1 5; VII 203
Scutellaria L. V/4 2508; VII 203
Adamsii Hamilton V/4 2509
albida L. V/4 2509
alpina L. V/4 2516
Altaica Fisch. V/4 2516
altissima Hamilton V/4 2509
altissima L. V/4 2514
Caroliniana Lam. V/4 2509
coccinea H. B. et Kth. V/4 2509
Columnae All. V/4 2509
Columnae Host V/4 2514
commutata Guss. V/4 2514
galericulata L. V/4 2510
grandiflora Adams V/4 2509
hastifolia L. V/4 2511
hyssopifolia L. V/4 2509
incarnata Vent. V/4 2509
integrifolia L. V/4 2509
lateriflora L. V/4 2509
lupulina L. V/4 2518
macrantha Fisch. V/4 2509
minor L. V/4 2513
Mociniana Benth. V/4 2509
Nicholsonii Taubert V/4 2518
Orientalis L. V/4 2508
pallida Bieb. V/4 2509
pallida Guss. V/4 2509
peregrina Waldst. et Kit. V/4 2514
Sibirica hort. V/4 2518
splendens Lk. V/4 2509
variegata Spr. V/4 2516
„ verna Bess. V/4 2518
Scutellarioideae VII 203
Scyballium Schott et Endl. VII 170
Scytonemataceae VII 136
Scytopetalaceae V/1 426; VII 188
Seaforthia elegans Hook. II 130
Sebastiania Spreng. VII 186
Secale L. I 388; VII 39 Fig. 1065
fragile Bieb. I 388
villosum L. I 396
„ villosum Huds. I 401
Secamone R. Br. V/3 2059
„ R. Br. V/3 2066
Sechium edule Jacq. VI/1 314
Securidaca L. V/1 87; VII 185
lutea Mill. IV/3 1461
Securigera Coronilla Lam. et DC. IV/3 1461
Securidaca (L.) Degen et Dörfl. IV/3 1461
Sedum L. IV/2 512; VII 179, 13 Fig. 995
acre L. IV/2 536
aestivum All. IV/2 531
Aizoon L. IV/2 518
album L. IV/2 534
alpestre Vill. IV/2 538
Anacampseros L. IV/2 520
annuum L. IV/2 531
anopetalum DC. IV/2 543
arboreum L. IV/2 518
Armenium Boiss. IV/2 529
atratum L. IV/2 530
Bithynicum Boiss. IV/2 529
Boloniense Loisel. IV/2 539
caeruleum Vahl IV/2 518
Cepaea L. IV/2 521
dasyphyllum L. IV/2 532
Donatianum Dalla Torre et Sarnth. IV/2 533
elegans Lejeune IV/2 542
Ewersii Ledeb. IV/2 518
Fabaria Koch IV/2 524
Füereri K. Wein IV/2 543
galioides Pourr. IV/2 521
glaucum Lam. IV/2 532
glaucum Waldst. et Kit. IV/2 528
Hispanicum L. IV/2 528
hybridum L. IV/2 519
Juranum Burnat IV/2 542
latifolium Bert. IV/2 523
maximum Hoffm. IV/2 523
micranthum Bast. IV/2 536
mite Gilib. IV/2 539
modestum Boiss. IV/2 529
montanum Perr. et Song. IV/2 542
ochroleucum Chaix IV/2 543
Oederi DC. IV/2 531
oppositifolium Sims IV/2 518, 526
Orientale Boiss. IV/2 529
paniculatum Lam. IV/2 521
populifolium Pall. IV/2 518
pruinatum Lk. IV/2 542
pulchellum Michx. IV/2 519
purpurascens Koch IV/2 524
reflexum L. IV/2 541
repens Schleicher IV/2 538
Rhodiola DC. IV/2 526
roseum (L.) Scop. IV/2 526
rubens Haenke IV/2 538
rubens L. IV/2 515
rufescens Ten. IV/2 519
rupestre L. IV/2 540
rupestre Oeder IV/2 531
rupestre Vill. IV/2 543
sarmentosum Bunge IV/2 519
saxatile Wiggers IV/2 531
Sedum Sempervivum Ledeb. IV/2 518
sexangulare auct. IV/2 539
Sieboldii Sw. IV/2 518; VII 178 Fig. 1222
spathulatum Waldst. et Kit. IV/2 521
spectabile Boreau IV/2 518
spurium Bieb. IV/2 526
Telephium L. IV/2 522
Telephium L. subsp. purpureum (Schultes) Schinz et Keller IV/2 524
Trevirense Rosbach IV/2 542
verticillatum Latourrette IV/2 521
villosum L. IV/2 529
vulgare Lk. IV/2 524
„ Wettsteinii Freyn IV/2 537
Seguiera perfoliata O. Kuntze V/3 1966
Seidlia silvatica Opiz II 31
Selaginella Pall. I 69; VII 147
apus Spring. I 69
denticulata Lk. I 69
Helvetica (L.) Lk. I 70; VII 148 Fig. 1175
selaginoides Lk. I 70
„ spinulosa A. Br. I 70
Selaginellaceae I 69; VII 147
Selago L. VI/1 5
„ paniculata Thunb. VI/2 1360
Selenicereus V/2 693
„ grandiflorus Mill. V/2 684
Selinon Adans. V/2 1139
„ Rafin. V/2 1309
Selinopsis Coss. et Dur. V/2 1181
Selinum L. V/2 1309; VII 194
acutangulum Gilib. V/2 1311
Alsaticum Crtz. V/2 1379
Anethum Crtz. V/2 1291
Angelica Roth V/2 1333
anisum E. H. L. Krause V/2 1209
Anthriscus E. H. L. Krause V/2 1030
apioides Arcang. V/2 1308
Archangelica Lk. V/2 1338
argenteum All. V/2 1381
argenteum Crtz. V/2 1383
aromaticum E. H. L. Krause V/2 1002
aureum E. H. L. Krause V/2 1003
Austriacum Hall. f. V/2 1385
Austriacum Jacq. V/2 1383
Balansae E. H. L. Krause V/2 1036
Bellardii Balb. V/2 1385
berula E. H. L. Krause V/2 1217
brevicaule E. H. L. Krause V/2 1101
Bulbocastanum E. H. L. Krause V/2 1191

Selinum bulbosum E. H. L. Krause V/2 998
bupleurum E. H. L. Krause V/2 1127
Carniolicum Hoppe V/2 1385
Carvi E. H. L. Krause V/2 1182
Carvifolia L. V/2 1311, 1375; VII 194 Fig. 1235
Caucalis E. H. L. Krause V/2 1062
cenolophioides Turcz. V/2 1305
cerefolium E. H. L. Krause V/2 1027
Cervaria L. V/3 1389
Chabraei Kth. V/2 1305
coloratum E. H. L. Krause V/2 1240
comoides E. H. L. Krause V/2 1269
conium E. H. L. Krause V/2 1082
Copticum E. H. L. Krause V/2 1167
coriandrum E. H. L. Krause V/2 1071
Creticum E. H. L. Krause V/2 1198
croceum E. H. L. Krause V/2 1098
cuminum E. H. L. Krause V/2 1138
Cynapium E. H. L. Krause V/2 1272
Dioscoridis E. H. L. Krause V/2 1077
elegans E. H. L. Krause V/2 1011
elegans Spr. V/2 1385
falcaria E. H. L. Krause V/2 1177
filicaule E. H. L. Krause V/2 1102
Fischeri E. H. L. Krause V/2 1326
fistulosum E. H. L. Krause V/2 1255
foeniculum E. H. L. Krause V/2 1284
Gmelini Bray V/2 1329
grandiflorum E. H. L. Krause V/2 1069
graveolens E. H. L. Krause V/2 1142
gummiferum Spr. V/2 1227
Hippomarathrum E. H. L. Krause V/2 1229
hispidum Clairv. V/2 1495
Hoffmannii E. H. L. Krause V/2 1132
janotta E. H. L. Krause V/2 1195
Ibericum E. H. L. Krause V/2 1036
Selinum Imperata Crtz. V/2 1396
imperatorioides Lk. V/2 1399
infestum E. H. L. Krause V/2 1056
inundatum E. H. L. Krause V/2 1152
juncoides E. H. L. Krause V/2 1101
Kochii E. H. L. Krause V/2 1008
Lachenalii E. H. L. Krause V/2 1262
leptophyllum E. H. L. Krause V/2 1140
libanotis E. H. L. Krause V/2 1243
lineare Schumacher V/2 1305
longifolium E. H. L. Krause V/2 1110
meum E. H. L. Krause V/2 1300
microcarpum E. H. L. Krause V/2 1053
Monnieri L. V/2 1304
montanum Schleich. V/2 1384
multicaule (Jacq.) E. H. L. Krause V/2 1238
Mutellina Prantl V/2 1318
myrrhis E. H. L. Krause V/2 1041, 1042
neglectum E. H. L. Krause V/2 1055
nitidum E. H. L. Krause V/2 1023
nodosum E. H. L. Krause V/2 1057
officinale Vest V/2 1372
Opopanax Crtz. V/2 1360
Oreoselinum Crtz. V/2 1386
Orientale Benth. et Hook. V/2 1309
Ostruthium Wallr. V/2 1396
palustre L. V/2 1393
palustre Suter V/2 1495
pastinaca Crtz. V/2 1405
pecten E. H. L. Krause V/2 1037
peregrinum Willd. V/2 1308
perfoliatum E. H. L. Krause V/2 1106
petroselinum E. H. L. Krause V/2 1155
phellandrium E. H. L. Krause V/2 1265
pimpinella E. H. L. Krause V/2 1202
pimpinelloides E. H. L. Krause V/2 1199
pimpinelloides rubrum E. H. L. Krause V/2 1201
pleurospermum E. H. L. Krause V/2 1090
Selinum podagraria E. H. L. Krause V/1 1212
Pollichii E. H. L. Krause V/2 1260
polymorphum Spr. V/2 1385
pratense Spr. V/2 1305
Pyrenaeum Gouan V/2 1347
Rablense Spr. V/2 1385
radians E. H. L. Krause V/2 1075
ranunculoides E. H. L. Krause V/2 1122
repens E. H. L. Krause V/2 1150
rotundifolium E. H. L. Krause V/2 1106
rotundifolium Seguieri All. V/2 1308
Seguieri All. V/2 1308
Seguieri Jacq. V/2 1318
Silaus Crtz. V/2 1296
silvestre Falk. V/2 1305
simplex Prantl V/2 1323
silvestre Crtz. V/2 1333
sisarum E. H. L. Krause V/2 1222
sium E. H. L. Krause V/2 1220
spinosum Krause V/2 992
sulcatum Bertol. V/2 1385
temulum E. H. L. Krause V/2 996
tenuissimum E. H. L. Krause V/2 1119
torilis E. H. L. Krause V/2 1051
Trinia E. H. L. Krause V/2 1133
turfosum Baumg. V/2 1305
Turgenia E. H. L. Krause V/2 1064
Venetum Spr. V/2 1381
venosum Prantl V/2 1305
verticillare Vest V/2 1401
verticillatum E. H. L. Krause V/2 1187
Villarsii E. H. L. Krause V/2 1012
virosum E. H. L. Krause V/2 1164
Visnaga E. H. L. Krause V/2 1170
Selliera radicans Cav. VI/1 394; VI/2 1359
Semecarpeae VII 186
Semecarpus Anacardium L. f. V/1 218
Semele androgyna (L.) Kunth II 264; VII 162
Sempervivum L. IV/2 543; VII 179
acuminatum Schott IV/2 548
Allionii Nym. IV/2 557
alpinum Griseb. et Schenk IV/2 548
angustifolium Kern. IV/2 560

Sempervivum arachnoideum L. IV/2 554
arboreum L. IV/2 544
arenarium Koch IV/2 558
Ausserdorferi Hut. IV/2 561
Baeticum Brügg. IV/2 560
Braunii Facch. IV/2 561
Braunii Funck IV/2 554
Braunii Maly IV/2 552
Caucasicum Rupr. IV/2 544
Comolli Rota IV/2 560
debile Schott IV/2 553
Delasoiei Schnittsp. IV/2 561
Doellianum Schnittsp. et Lehm. IV/2 555
Dolomiticum Facch. IV/2 551
Fauconnettii Reut. IV/2 560
fimbriatum Schott IV/2 561
flavipilum Hausm. IV/2 561
Funckii F. Braun IV/2 561
Funckii Maly IV/2 554
fuscum Schnittsp. et Lehm. IV/2 548
Gaudinii Christ IV/2 551
globiferum Jacq. IV/2 557
globiferum Rchb. IV/2 559
globiferum Wulf. IV/2 550
grandiflorum Haw. IV/2 551
Hausmanni Lehm. IV/2 561
Heerianum Brügg. IV/2 560
heterotrichum Schott IV/2 555
Heuffelii Schott IV/2 544
hirsutum Poll. IV/2 557
hirtum Just. IV/2 557
Huteri Hausm. IV/2 561
hybridum Brügg. IV/2 561
Kochii Facc. IV/2 558
Mettenianum Hausm. IV/2 561
montanum L. IV/2 553
montanum L. subsp. Stiriacum Wettst. IV/2 554
Noricum Hay. IV/2 561
Pernhofferi Hay. IV/2 561
Pittonii Schott IV/2 552
roseum Hut. IV/2 561
rupicolum Kern. IV/2 561
Schottii Baker IV/2 548
soboliferum Sims IV/2 559
stellatum Poll. IV/2 533
tabulaeforme Haw. IV/2 544
tectorum L. IV/2 547, 548
Theobaldii Brügg. IV/2 561
tomentosum Schnittsp. et Lehm. IV/2 555
urbicum Chr. Sm. IV/2 544
Widderi Schnittsp. et Lehm. IV/2 560
„ Wulfenii Hoppe IV/2 550
Senckenbergia ruderalis Gaertn., Mey. et Scherb. IV/1 83
Senebiera Coronopus Poir. IV/1 93
didyma Pers. IV/1 95
nilotica DC. IV/1 93
Senebiera pinnatifida DC. IV/1 95
„ Ruellii Bub. IV/1 93
Senecillis glauca Gaertn. VI/2 796
„ Sibirica Gaertn. VI/2 797
Senecio L. VI/2 726; VII 212
Aberdaricus R. E. Fries et Th. Fries VI/2 727
abrotanifolius L. VI/2 768
adonidifolius Lois. VI/2 729
alpester Fritsch VI/2 738
alpestris auct. VI/2 739
alpestris Gaud. VI/2 759
alpestris (Hoppe) Koch VI/2 738
alpinus (L.) Scop. VI/2 747
altissimus Mill. VI/2 755
Anteuphorbium DC. VI/2 727, 729
aquaticus Huds. VI/2 775
aquaticus Ten. VI/2 777
arachnoideus Scop. VI/2 752
articulatus Haw. VI/2 727
aurantiacus auct. Helv. VI/ 745
aurantiacus DC. var. glabratus Rchb. VI/2 745
aurantiacus (Hoppe) DC. VI/2 745
aurantiacus Rouy VI/2 746
barbaraefolius Krock. VI/2 777
brachychaetus DC. VI/2 739
brachyglossus F. v. Mueller VI/2 1366
Brassica R. E. Fries et Th. Fries VI/2 727
Cacaliaster Lam. VI/2 763
campestris DC. VI/2 743
capitatus (Wahlenb.) DC. VI/2 745
Carniolicus Willd. VI/2 767
carnosus Lam. VI/2 755
Cineraria DC. VI/2 728
Clivorum Max. VI/2 729
Clusiana Rchb. VI/2 738
cordatus Koch VI/2 747
cordifolius Clairv. VI/2 747
crispatus DC. VI/2 734
crispus Kit. VI/2 734
Croaticus Waldst. et Kit. VI/2 763
cruentus DC. VI/2 728
divergens F. Schultz VI/2 775
Doria L. VI/2 755
Doronicum Jacq. VI/2 723
Doronicum L. VI/2 751
elegans L. VI/2 729
erraticus Bert. VI/2 777
erucifolius L. VI/2 770
Eversii Hut. VI/2 794
fluviatilis Wallr. VI/2 757
Fuchsii Gmel. VI/2 759
fuscatus Hay. VI/2 745
Gallicus Chaix VI/2 729
Senecio Gaudini Gremli VI/2 739
Gerardi Godr. et Gren. VI/2 752
Germanicus Wallr. VI/2 760
Heimerlii Müllner VI/2 795
Helenitis Schinz et Thellung VI/2 739
Helwingii VI/2 795
hieracifolius L. VI/2 702
Jacobaea L. VI/2 773
Jacobaea L. var. aquaticus Neilr. VI/2 775
Jacobaea L. var. hydrophilus Beck VI/2 775
Jacquinianus Rchb. VI/2 760, 761
ilicifolius Thunb. VI/2 1367
inaequidens DC. VI/2 729
incanus L. VI/2 765
integrifolius (Lam.) Clairv. VI/2 742, 1367
intermedius Rabenhorst VI/2 795
Johnstonii Oliv. VI/2 727
Kaempferi DC. VI/2 796
Kaempferi (DC.) Sieb. et Zucc. VI/2 796
laciniatus Bert. VI/2 779
Laggeri Schultz-Bip. VI/2 795
lanatus Scop. VI/2 752
Liechtensteinensis Murr VI/2 795
lividus Nolte VI/2 793
lyratifolius Rchb. VI/2 794
lyratus L. VI/2 1366
mikanoides Otto VI/2 728
montanus Willd. VI/2 779
Nebrodensis DC. VI/2 779
nemorensis Jacq. VI/2 755
nemorensis L. VI/2 758
nemorensis L. var. Fuchsii Koch VI/2 759
oligocephalus Naeg. VI/2 795
ovatus Schult. VI/2 760
ovatus Willd. VI/2 760
Ovirensis (Koch) DC. VI/2 737
Palatinatus Fr. Zimmerm. VI/2 795
paludosus L. VI/2 753
palustris (L.) DC. VI/2 732
paradoxus Hoppe VI/2 780
pseudovernalis Zabel VI/2 795
pterophorus DC. VI/2 729
rapistroides DC. VI/2 781
Reisachii Gremblich VI/2 794
Richteri F. Schultz VI/2 775
rupester Waldst. et Kit. VI/2 779
Sadleri Lang VI/2 754
sagittatus O. Hoffm. VI/2 728
salicetorum Godr. VI/2 757
salicifolius Gmel. VI/2 759
Sarracenicus L. p.p. VI/2 757, 759

Senecio scandens Don VI/2 727
Scopolii Hoppe et Hornsch. VI/2 752
Senecillis Maxim. VI/2 796
Siegfriedii Brügg. VI/2 794
silvaticus L. VI/2 792
sinuatus Gilib. VI/2 781
sonchifolius Moench VI/2 728
sonchoides Vukot. VI/2 702
spathulaefolius (Gmel.) DC. VI/2 740
stenocephalus Maxim. VI/2 729
suaveolens Ell. VI/2 729
subalpinus Koch VI/2 749
subnebrodensis Simk. VI/2 795
umbrosus Waldst. et Kit. VI/2 756
uniflorus All. VI/2 764
uniflorus Shuttlew. VI/2 795
Veitchianus Hemsley VI/2 729
vernalis Ten. VI/2 779
vernalis Waldst. et Kit. VI/2 781, 1367
viscidulus Scheele VI/2 795
viscosus L. VI/2 790
Vukotinovici Schloss. VI/2 702
vulgaris L. VI/2 787
Weylii Vatke VI/2 795
Wiesbauerii Hal. Braun VI/2 795
Senecionineae VI/2 798
Sequoia Endl. VII 151
gigantea Loud. I 82
„ sempervirens Carr. I 82
Serapias L. II 358; VII 164
abortiva Scop. II 382
anthropophora Jundzill II 359
Garbariorum Murr II 359
hirsuta Lap. II 358
latifolia Mill. II 380
latifolia Willd. II 375
lingua L. II 358
longifolia Scop. II 381
longipetala Pollini II 358
microphylla Ehrh. II 377
palustris Mill. II 378
rubra L. II 380
„ spiralis Scop. II 385
Serapiastrum O. Kuntze VII 164
„ longipetalum Eaton II 358
Serjania L. V/1 307
Seriola Aetnensis L. VI/2 1008
Serissa Commerç. VII 207
Serpicula Numidica Durieu V/2 895
occidentalis Pursh I 160
„ verticillata L. f. I 159
Serrafalcus commutatus Bab. I 366
mollis Parl. I 365
patulus Parl. I 367
secalinus Bab. I 362
„ squarrosus Bab. nec L. I 368
Serratula L. VI/2 926; VII 212
alpina L. p. p. VI/2 839
Serratula arvensis L. VI/2 903
Austriaca Wiesb. VI/2 927
Behen DC. VI/2 936
blanda Bieb. VI/2 843
Carniolica Pers. VI/2 895
Crupina Vill. VI/2 930
cyanoides DC. VI/2 841
cyanoides Gaertn. VI/2 843
discolor Willd. VI/2 837
heleniifolia Schultz-Bip. VI/2 932
heterophylla Desf. VI/2 929
lycopifolia (Vill.) A. Kern. VI/2 929
macrocephala Bertol. VI/2 929
monticola Boreau VI/2 929
oleracea Poir. VI/2 898
pauciflora Poir. VI/2 894
Pollichii Koch VI/2 841
Rhaponticum DC. V/2 932
simplex DC. VI/2 843
tinctoria L. VI/2 926
„ Vulpii Fisch.-Ooster VI/2 929
Sesamum Indicum L. VI/1 176
Sesbania Aegyptiaca Pers. IV/3 1390
macrocarpa Mühlenb. IV/3 1390
platycarpa Pers. IV/3 1390
„ punicea Benth. IV/3 1390
Seseli L. V/2 1226; VII 194
Aegopodium Scop. V/2 1212
Amomum Scop. V/2 1162
annuum L. V/2 1240
apioides Arcang. V/2 1308
aristatum Ait. V/2 1318
articulatum Crtz. V/2 1229, 1231
Athamanta Cesati V/2 1278
athamanticum Arvet-Touvet V/2 1243
Austriacum (Beck) Wohlfarth V/2 1234
Austriacum Fiori V/2 1231
Beckii Seefried V/2 1235
bienne Crtz. V/2 1240
brevicaule Jord. V/2 1240
Bunius Vill. V/2 1173
Carum Scop. V/2 1182
carvifolium Vill. V/2 1243
coloratum Ehrh. V/2 1240
Cretense Jess. V/2 1278
decipiens Ledeb. V/2 1237
Devenyense Simonk. V/2 1235
dioecum Vill. V/2 1132
dubium Schkuhr V/2 1305
elatius L. V/2 1227
elatum auct. Ital. V/2 1231
elatum Güldenst. V/2 1237
elatum L. V/2 1227
elatum Thuill. V/2 1240
Falcaria Crtz. V/2 1177
ferulaefolium Poir. V/2 1318
flexuosum Orsini V/2 1227
Seseli glaucescens Jord. V/2 1238
glaucum All. V/2 1238
glaucum Jacq. V/2 1234, 1235
glaucum L. V/2 1229
glaucum Pallas V/2 1237
glaucum Sanguinetti V/2 1228
glaucum Visiani V/2 1228
Gouani Koch V/2 1231
Gouani Landoz V/2 1235
Gouani Mutel V/2 1227
gracile Waldst. et Kit. V/2 1227
graveolens Scop. V/2 1142
gummiferum (L.) Pallas V/2 1227
Hippomarathrum All. V/2 1240
Hippomarathrum Jacq. V/2 1229
inundatum Crtz. V/2 1152
levigatum Kern. V/2 1238
Libanotis (L.) Koch V/2 1243
libanotum St. Lager V/2 1243
Lobelianum Hornem. V/2 1227
Meum Scop. V/2 1300
montanum L. V/2 1238
montanum Pollini V/2 1234
multicaule Jacq. V/2 1239
Mutellina Steud. V/2 1318
osseum Crtz. V/2 1234, 1235
patens Güldenst. V/2 1227
peucedanifolium Mérat V/2 1240
pumilum L. V/2 1132
purpureum Gilib. V/2 1240
pusillum Brot. V/2 1175
Pyrenaicum L. V/2 1347
Reichenbachii Arcang. V/2 1247
saxifragum Cramer V/2 1240
saxifragum L. V/2 1173
segetum Crtz. V/2 1154
selinoides Jacq. V/2 1296
Sibiricum Eichw. V/2 1247
simplex Poir. V/2 1240
Sisarum Crtz. V/2 1222
teres Moench V/2 1227
Tommasinii Rchb. V/2 1228
tortuosum L. V/2 1227
tortuosum Pollich V/2 1240
varium Rchb. V/2 1234
varium Treviranus V/2 1237
venosum Hoffm. V/2 1305
verticillatum Crtz. V/2 1187
verticillatum Desf. V/2 1175
virescens Beck V/2 1298
„ vulgare Bub. V/2 1244
Seselinia Beck V/2 1226
Austriaca Beck V/2 1234
Austriaca Calestani V/2 1231
elata Beck V/2 1231
„ Gouani Calestani V/2 1231
Sesleria Scop. I 265; VII 155
argentea Savi I 270
autumnalis (Scop.) F. Schultz I 270

Sesleria caerulea Scop. I 268
calcaria Opiz I 268
disticha (Wulf.) Pers. I 266
dura Kth. I 299
elongata Host I 270
filifolia Hoppe I 267
microcephala DC. I 266
ovata (Hoppe) Kern. I 266
sphaerocephala (Wulf.) Ard. I 267
tenella Lk. I 266
tenuifolia Schrad. I 267
varia Wettst. I 268
„ variegata Clairv. I 283
Sesuvium L. VII 172
Setaria Pal. I 191; VII 153
ambigua Guss. I 192
decipiens C. Schimp. I 192
glauca (L.) Pal. I 191
Italica (L.) Pal. I 193
verticillata (L.) Pal. I 191
„ viridis (L.) Pal. I 192
Sewerzowia Turkestanica Regel et Schmalh. IV/3 1400
Shepherdia Nutt. V/2 728
argentea Nutt. V/2 729
„ Canadensis Nutt. V/2 730
Sherardia L. VI/1 197; VII 207
„ arvensis L. VI/1 197
Shorea robusta Gaertn. V/1 534
„ Wiesneri Schiffner V/1 534
Shortia galacifolia Torr. et Gray V/3 1713
„ uniflora Maxim. V/3 1713
Sibbaldia L. IV/2 892; VII 180
cuneata Hornem. IV/2 893
octopetala Mill. IV/2 893
„ procumbens L. IV/2 893
Sibiraea levigata (L.) Maxim. IV/2 681
Sibthorpia L. VII 204
Sicyos L. VI/1 327; VII 208
„ angulatus L. VI/1 327
Sida Abutilon L. V/1 456
brachyantha Dietr. V/1 456
hermaphroditica (L.) Rusby V/1 456
rhombifolia L. V/1 454, 456
spinosa L. V/1 456
tiliifolia Fisch. V/1 456
„ triloba Cavan. V/1 456
Sidalcea malvifebra A. Gray V/1 455
„ Neomexicana A. Gray V/1 455
Sideritis L. V/4 2402; VII 201
Alopecurus Scop. V/4 2432
alpina Vill. V/4 2406
hirsuta Gouan V/4 2410
hirta L. V/4 2403
hyssopifolia L. V/4 2405
linearifolia Lag. V/4 2403
lurida Gray V/4 2406
montana L. V/4 2403
pungens Benth. V/4 2403
Sideritis purpurea Talbot V/4 2403
remota D'Urville V/4 2403
Romana L. V/4 2403
scordioides Koch V/4 2405
scordioides L. V/4 2403
Sicula Ucria V/4 2403
stachyoides Willk. V/4 2403
Taurica Bieb. V/4 2403
„ tomentosa Pourret V/4 2403
Sideroxylon inerme L. V/3 1897
Siebera cherlerioides Schrad. III 391
Siegesbeckia Orientalis L. VI/1 533
Sieglingia Bernh. I 275; VII 154
„ decumbens (L.) Bernh. I 275
Sieversia Willd. IV/2 908; VII 181
montana (L.) R. Brown IV/2 909
Raetica (Brügg.) Nym. IV/2 913
reptans (L.) R. Brown IV/2 911
Sigillariaceae I 70
Silaum Mill. V/2 1295; VII 194
Silaus (L.) Schinz et Thellung V/2 1296
Silaus Bernh. V/2 1295
flavescens Bernh. V/2 1296
longifolius Ledeb. V/2 1326
pratensis Bess. V/2 1296
selinoides G. Beck V/2 1296
Silaus Karst. V/2 1296
tripartitus Lej. et Court. V/2 1296
Silene L. III 277; VII 173
acaulis L. III 294
alpestris Jacq. III 305
alpina (Lam.) Thomas III 280
Antelopum Freyn III 280
Armeria L. III 285
asterias Griseb. III 277
baccifera Roth III 307
Behen Wirzen III 279
bipartita Desf. III 278
Bosniaca (Beck) Handel-Mazzetti III 280
bupleuroides Ledeb. III 288
caespitosa Salisb. III 294
chlorantha (Willd.) Ehrh. III 289
coeli-rosa (L.) A. Br. III 277
colorata Poir. III 278
conica L. III 281
Cretica L. III 286
Cucubalus Wibel III 279
Dalmatica v. Hay. III 284
dichotoma Ehrh. III 282
dichotoma Gilib. III 302
discolor Retz. III 292
elata Otth III 289
Elisabethae Jan III 304
eranthema Wibel III 288
exscapa All. III 295
fruticulosa Rohrb. III 284
Silene Gallica L. III 283
glauca Salisb. III 285
glareosa Jord. III 280
glutinosa Zois III 306
Graeca Boiss. et Sprunner III 278
Hayekiana Handel-Mazzetti et Janchen III 284
Heufleri Hausm. III 306
hirsuta Lag. III 277
hispida Desf. III 278
Hornemanni Steud. III 292
inaperta L. III 278
inflata Sm. III 279
infracta Waldst. et Kit. III 292, 293
Insubrica Gaud. III 293
Italica (L.) Pers. III 293
Juvenalis Delile III 278
latifolia Hay. III 280
latifolia Poir. III 293
latifolia Rendle et Britt. III 279
linicola Gmel. III 288
longiflora Ehrh. III 288
maritima With. III 277, 281
membranacea Poir. III 282
multiflora (Ehrh.) Pers. III 291
noctiflora L. III 302
nocturna L. III 278
nutans L. III 292
Otites (L.) Wibel III 290
pallida Schur III 288
parviflora Moench III 286
patula Desf. III 293
pauciflora Ucria III 292
pendula L. III 277
petraea Waldst. et Kit. III 277
polygama Stok. III 284
pusilla Freyer III 306
quadrifida L. III 305
remotiflora Visiani III 278
Royeni Pers. III 302
rupestris L. III 287
saponariifolia Schott III 277
saxifraga L. III 284
saxifraga Maly III 284
Schafta Gmel. III 277
sedoides Jacq. III 278
staticifolia Sibth. et Sm. III 288
stricta Spr. III 288
subconica Friv. III 278
Tenoreana Colla III 278
trinervia Seb. et Mauri III 278
trinervis Soland. III 282
umbellata Gilib. III 285
Vallesia L. III 283
venosa Aschers. III 279
vespertina Retz. III 278
viridiflora L. III 292
viscosa Pers. III 302
vulgaris (Moench) Garcke III 279
Wolgensis Poir. III 277

Silene Zawadskyi Herbich III 277
Silenoideae III 272; VII 173
Siler Ludwig V/2 1464; VII 195
Mill. V/2 1467
aquilegifolium Gaertn. V/2 1465
aquilegiifolium Hegetschw. V/2 1485
Chironium Spach V/2 1360
Gallicum Crtz. V/2 1474, 1495
Garganicum (Ten.) Thellung V/2 1471
montanum Crtz. V/2 1458
Siculum (Spr.) Thellung V/2 1471
trilobum Crtz. V/2 1464
„ Zernyi v. Hay. V/2 1471
Silicoflagellatae VII 137
Siliquastrum orbiculatum Moench IV/3 1134
Silphium L. VI/1 495; VII 211
connatum L. VI/1 496
gummiferum Ell. VI/1 495
laciniatum L. VI/1 495
perfoliatum L. VI/1 496
scabrum Moench VI/1 496
spicatum Poir. VI/1 495
ternatum Retz. VI/1 495
„ trifoliatum L. VI/1 495
Silybum Adans. VI/2 916; VII 212
„ Marianum (L.) Gaertn. VI/2 917
Simaba Aubl. V/1 79; VII 184
Simaruba Aubl. VII 184
amara Aubl. V/1 79
amara Hayne V/1 79
medicinalis Engl. V/1 79
officinalis DC. V/1 79
„ officinalis Macf. V/1 79
Simarubaceae V/1 77; VII 184
Simbuleta Forsk. VI/1 30; VII 204
„ bellidifolia Wettst. VI/1 30
Simmondsia Californica Nutt. V/1 203; VII 186
„ Chinensis Lk. V/1 203
Sinapeae VII 177
Sinapis L. IV/1 204, 229; VII 177
alba L. IV/1 205, 206
Apula Ten. IV/1 218
arvensis L. IV/1 205, 263
bracteolata G. Don IV/1 237
Cheiranthus Koch IV/1 269
Chinensis L. IV/1 242
cuneifolia Roxb. IV/1 242
dissecta Lag. IV/1 206
Eruca Clairv. IV/1 201
Erucastrum Ruchinger IV/1 221
erucoides L. IV/1 217
geniculata Desf. IV/1 229
incana L. IV/1 226, 228
integrifolia Walp. IV/1 228
integrifolia West IV/1 242
iuncea L. IV/1 240
Sinapis lanceolata DC. IV/1 242
levigata Burm. IV/1 237
Mesopotamica Spr. IV/1 265
Monensis Bab. IV/1 271
muralis R. Br. IV/1 211
Napus Brot. IV/1 252
nasturtiifolia Poir. IV/1 221
nigra L. IV/1 236
Orientalis L. IV/1 265
pubescens L. IV/1 231
ramosa Roxb. IV/1 241
Rapa Brot. IV/1 257
Schkuhriana Rchb. IV/1 266
tenella Moench IV/1 242
tenuifolia R. Br. IV/1 214
Timoreana DC. IV/1 241
torulosa Pers. IV/1 237
tuberosa Poir. IV/1 261
turgida (Pers.) Del. IV/1 231
turgida Pers. IV/1 237
„ virgata Cav. IV/1 208
Sinapistrum arvense Spach IV/1 263
Sinistrophorum Schrank IV/1 186
Sinningia speciosa (Lodd.) Benth. et Hook. VI/1 176
Siparuna Aubl. VII 176
Siphonia Schreb. V/1 118; VII 185
Siphocampylos bicolor G. Don VI/1 392
„ microstoma Hook. VI/1 392
Siphonaceae VII 138
Siphonocladales VII 138
Siphonogamae VII 150
Sirosiphonaceae VII 136
Sisarum Mill. V/2 1216
„ palustre Bub. V/2 1220
Sison L. V/2 1162; VII 194
Amomum L. V/2 1162
Anisum Spr. V/2 1209
arvensis Brot. V/2 1154; VII 184
Canadensis L. V/2 1169
cernuus Salisb. V/2 1154
inundatus L. V/2 1152
nodiflorus Bert. V/2 1148
Podagraria Spr. V/2 1212
segetum L. V/2 1154
trifoliatus Michx. V/2 1169
„ verticillatus L. V/2 1187
Sisymbrium L. IV/1 151; VII 177
acutangulum DC. IV/1 173
Alliaria Scop. IV/1 149
alpinum Fourn. IV/1 461
altissimum L. IV/1 176
arenosum L. IV/1 421
Austriacum Jacq. IV/1 172, 173
Barbaraea Crtz. IV/1 301
brevicaule Wib. IV/1 209
bursifolium L. IV/1 155
Columnae Jacq. IV/1 179
coronopifolium Desf. IV/1 154
dentatum All. IV/1 157
Eckartsbergense Willd. IV/1 173
Sisymbrium elongatum Prantl IV/1 233
erucaefolium Gilib. IV/1 169
erucoides Desf. IV/1 217
erysimoides Desf. IV/1 155
flexuosum Dul. IV/1 179
hispidum Moench IV/1 174
incanum Prantl IV/1 226
Irio L. IV/1 169
Islandicum Oeder IV/1 316
Lippicense Wulf. IV/1 315
Loeselii L. IV/1 174
Monense L. IV/1 271
multifidum Gilib. IV/1 161
multifidum (Pursh) Mac Millan 173
multisiliquosum Hoffm. IV/1 173
murale L. IV/1 211
nasturtiifolium Gilib. IV/1 312
Nasturtium aquaticum L. IV/1 319
Nasturtium Thunb. IV/1 319
nigrum Prantl IV/1 236
officinale (L.) Scop. IV/1 164
Orientale L. IV/1 179
palustre Poll. IV/1 316
Pannonicum Jacq. IV/1 176
pinnatifidum (Lam.) DC. IV/1 157
polyceratum L. IV/1 154
polymorphum (Murray) Roth 154
pumilum Lam. IV/1 209
Pyrenaicum L. IV/1 314
Pyrenaicum (L.) Vill. IV/1 170
ramulosum Poir. IV/1 169
Rhedonense Degland IV/1 173
Richardsonii (Sweet) Thellung VII 177
runcinatum Lag. IV/1 154
Schimperi Boiss. IV/1 154
Sinapistrum Crtz. IV/1 176
silvestre L. IV/1 312
Sophia L. IV/1 160
strictissimum L. IV/1 165
supinum L. IV/1 163
tanacetifolium L. IV/1 159
Thalianum Gay IV/1 392
tenuifolium L. IV/1 214
villosum Moench IV/1 179
vimineum L. IV/1 209
vulgare Pers. IV/1 312
Waltheri Crtz. IV/1 169, 179
Wolgense Bieb. IV/1 167
„ Zanonii (Ball) J. Gay IV/1 153
Sisyrinchium angustifolium Mill. II 305
Bermudianum L. II 305
„ graminifolium Lindl. II 305
Sium L. V/2 1216; VII 194
Amomum Roth V/2 1162
angustifolium L. V/2 1217
annuum Roth V/2 1240

Sium Apium Roth V/2 1142
aromaticum Lam. V/2 1162
Berula Gouan V/2 1217
Bulbocastanum Spr. V/2 1191
Canadense Lam. V/2 1169
Carvi Bernh. V/2 1182
Cicuta Web. V/2 1164
Conium Vest V/2 1082
Cordiennii Loisel. V/2 1298
erectum Huds. V/2 1217
Falcaria L. V/2 1177
falcatum Dubois V/2 1177
Gasparrinii Nym. V/2 1298
graveolens Vest V/2 1142
HippomarathrumRothV/2 1229
incisum Pers. V/2 1217
inundatum Lam. V/2 1152
lancifolium Bieb. V/2 1223
lancifolium Schrank V/2 1219
latifolium L. V/2 1219
Ninsi L. V/2 912, 1224
nodiflorum L. V/2 1147
oppositifolium Kit. V/2 1155
peucedanoides Spr. V/2 1298
Podagraria Web. V/2 1212
„ repens Jacq. V/2 1150
„ saxifragum Roth V/2 1173
segetum Lam. V/2 1154
Silaus Roth V/2 1296
sisaroideum DC. V/2 1223
Sisarum L. V/2 1222
sulcatum Pers. V/2 1219
tortuosum Roth V/2 1227
verticillatum Lam. V/2 1187
virescens Spr. V/2 1298
„ Visnaga Stok. V/2 1170
Siumis Rafin. V/2 1139
Skimmia Fortunei Mast. V/1 53
Japonica Thunb. V/1 53
Laureola Sieb. et Zucc. V/1 53
„ oblata Moore V/1 53
Sloanea L. VII 188
Smegmanthe ocymoides Kittel III 345
Smegmathamnium luteum Rchb. III 348
Smilacina Desf. VII 162
„ bifolia Desf. II 267
Smilacoideae II 280; VII 162
Smilax aspera L. II 280
„ excelsa L. II 280
Smirnovia Bunge IV/3 1457; VII 182
Smithiantha multiflora (Mart. et Gal.) Fritsch VI/1 177
zebrina (Paxt.) O. Kuntze VI/1 177
Smyrnium L. V/2 1077; VII 194
Dioscoridis Spr. V/2 1077
Dodonaei Spr. V/2 1078
Kitaibelii auct. V/2 1077
laterale Thunb. V/2 1142
Libanotis Crtz. V/2 1093
maritimum Salisb. V/2 1079
Smyrnium Matthioli Presl V/2 1078
nodiflorum All. V/2 1299
Olus-atrum L. V/2 1079
perfoliatum L. V/2 1077
ramosum D'Urv. V/2 1078
rotundifolium Mill. V/2 1078
verticillatum Car. V/2 1081
„ vulgare S. F. Gray V/2 1079
Sobralia Ruiz et Pav. II 234; VII 165
Soja hispida Moench IV/3 1620
Japonica Savi IV/3 1620
„ max Piper IV/3 1620
Solanaceae V/4 2548; VII 25 Fig. 1049; VII 203
Solandra grandiflora Sw. V/4 2555; VII 203
„ hirsuta Don V/4 2556
Solanopsis V/4 2582
Solanum L. V/4 2582
alatum Moench V/4 2594
atropurpureum Schrank V/4 2585, 2588
aviculare Forst. V/4 2585, 2588
Burbankii Bitt. V/4 2585
capsicastrum Lk. V/4 2588
ciliatum Lam. V/4 2585
citrullifolium A. Br. V/4 2585, 2588
Commersonii Dun. V/4 2584
Dulcamara L. V/4 2589
esculentum Dun. V/4 2587
giganteum Jacq. V/4 2588
Guatemalense V/4 2587
Guineense Lam. V/4 2586
heterodoxum Dun. V/4 2585
hirtulum DC. V/4 2585
Humboldtii Willd. V/4 2585
jasminoides Paxton V/4 2587
Justischmidtii E. H. L. Krause V/4 2586
Justischmidtii Lutz V/4 2585
laciniatum Ait. V/4 2585
luteo-virescens Gmel. V/4 2593
luteum Mill. V/4 2594
Lycopersicum L. V/4 2607
marginatum L. V/4 2585
Melongena L. V/4 2587
Memphiticum Mart. V/4 2593
miniatum Bernh. V/4 2594
nigrum L. V/4 2592
nitidibaccatum Bitt. V/4 2586
nodiflorum Jacq. V/4 2586
Peruvianum Jacq. V/4 2587
Pseudocapsicum L. V/4 2586, 2588
puniceum Gmel. V/4 2594
pygmaeum Cav. V/4 2586
pyracanthum Lam. V/4 2586, 2588
Quitoënse Lam. V/4 2587
robustum Wendland V/4 2586, 2588
rostratum Dun. V/4 2586
Solanum rubrum Gilib. V/4 2594
sarachoides Sendtn. V/4 2586
sisymbrifolium Lam. V/4 2586
sodomaeum L. V/4 2586
triflorum Nutt. V/4 2586
tuberosum L. V 4 2595; VII 25 Fig. 1049
villosum Lam. V/4 2594
villosum Mill. V/4 2594
Wendlandi Hook. f. V/4 2587, 2588
Soldanella L. V/3 1820; VII 195
alpina L. V/3 1827
alpina F. W Schmidt V/3 1829
Armena Lipky V/3 1821
Aschersoniana Vierh. V/3 1832
Carpatica Vierh. V/3 1821, 1831
Clusii Curt. V/3 1829
Clusii Gaud. V/3 1824
Clusii F. W. Schmidt V/3 1827
Ganderi Hut. V/3 1832
Handel-Mazzettii Vierh. V/3 1832
Hungarica Simk. V/3 1829
hybrida Kern. V/3 1832
Jancheni Vierh. V/3 1832
Lungoviensis Vierh. V/3 1832
maior (Neilr.) Vierh. V/3 1829
mixta Vierh. V/3 1832
minima Hoppe V/3 1824, 1826
minima Hoppe subsp. Austriaca (Vierh.) Lüdi V/3 1827
montana Lecoq et Lam. V/3 1827
montana Willd. V/3 1829
montana Willd. subsp. Hungarica (Simk.) Lüdi V/3 1830
montana Willd. subsp. villosa (Darracq) Lüdi V/3 1831
Pindicola Hausskn. V/3 1821
pusilla Baumg. V/3 1824
Vierhapperi Janchen V/3 1832
villosa Darracq V/3 1829
Wettsteinii Vierh. V/3 1832
„ Wiemanniana Vierh. V/3 1832
Solidago L. VI/1 409; VII 209
bicolor L. VI/1 409
Cambrica Huds. VI/1 410
Canadensis L. VI/1 411; VII 64
Doronicum L. VI/2 751
gigantea Willd. VI/1 412
glabra Desf. VI/1 412
graminifolia (L.) Elliot VI/1 413
hispida Mühlenb. VI/2 1365
lanceolata L. VI/1 413
longifolia Schrad. VI/1 409
minuta L. IV/1 410
Missouriensis Hook. VI/1 409
Niederederi Eugen Khek VI/1 413
odora Ait. VI/1 409
sempervirens L. VI/1 409
serotina Ait. VI/1 412

Solidago uniflora All. VI/2 764
Virga aurea L. VI/1 409; VII 64
Virga aurea L. subsp. alpestris (Waldst. et Kit.) Gaud. VI/1 410
Soliva Ruiz. et Pav. VII 211
„ daucifolia Necker VII 211
Sollya Lindl. IV/2 655
Solmsiella Heegeri Borb. IV/1 365
Somerauera quadrifaria Hoppe III 391
Sonchus L. VI/2 1101; VII 212
alpinus L. VI/2 1099
arvensis L. VI/2 1105; VI/ 1367
asper (L.) Hill VI/2 1109; VI/2 1367
Canadensis With. VI/2 1099
ciliatus Lam. VI/2 1107
coeruleus Sm. VI/2 1099
cordifolius Desf. VI/2 1097
fallax Wallr. VI/2 1109
intermedius Brückn. VI/2 1106
levis Garsault VI/2 1107
macrophyllus Willd. VI/2 1097
maritimus Aschers. VI/2 1106
montanus Lam. VI/2 1099
oleraceus L. VI/2 1107
paluster L. VI/2 1102
Plumieri L. VI/2 1098
spinosus Lam. VI/2 1109
Tataricus L. VI/2 1130
„ uliginosus Bieb. VI/2 1106
Sonerila margaritacea Lindl. V/2 796
Sonneratia L. V/2 761
Sonneratiaceae V/2 698, 761; VII 191
Sophia Lobelii Rupr. IV/1 160
multifida Gilib. IV/1 160
Sophia Britton IV/1 160
„ vulgaris Fourn. IV/1 160
Sophora affinis Torrey et Gray IV/3 1145
flavescens Ait. IV/3 1145
„ Japonica L. IV/3 1144
Sophoreae IV/3 1144; VII 182
Sorbaria (Ser.) A. Br. IV/2 663, 681
Sorbus L. IV/2 705; VII 181
alnifolia C. Koch IV/2 707
ambigua Hedlund IV/2 721
Amelanchier Crtz. IV/2 756
Americana Marsch. IV/2 707
arbutifolia (L.) Heynhold IV/2 706
Aria (L.) Crtz. IV/2 713
aucuparia L. IV/2 708
auricularis (Knoop) C.K.Schneider IV/2 705, 706
Austriaca Hedlund IV/2 717
Bellojocensis Gandoger IV/2 715
Bollwylleriana Zab. IV/2 706
carpinifolia Hedlund IV/2 715
Sorbus Chamaemespilus (L.) Crtz. IV/2 721
Dacica Borb. IV/2 724
decurrens Hedlund IV/2 724
domestica L. IV/2 711
Fennica (L.) Fries IV/2 723
Hostii (Jacq.) C. Koch IV/2 725
hybrida C. Koch IV/2 723
intermedia Pers. IV/2 716
lanuginosa Kit. IV/2 724
latifolia (Lam.) Pers. IV/2 724
Lindleyana Maxim. IV/2 681.
melanocarpa (Willd.) Heynh. IV/2 706
Mougeotii Soyer-Willemet et Godr. IV/2 717
rupicola Syme IV/2 716
salicifolia Hedlund IV/2 716
satureifolia Dippel IV/2 724
semipinnata (Roth) Hedlund IV/2 723
sorbifolia (L.) A. Braun IV/2 681
Suecica (L.) Krok et Almquist IV/2 716
torminalis (L.) Crtz. IV/2 719
umbellata (Desf.) Fritsch IV/2 707
Sorghum Pers. I 184; VII 153
cernuum Host I 185
Halepense Pers. I 185
saccharatum Pers. I 185
„ vulgare Pers. I 185
Soria Adans. VII 178
„ Syriaca Desv. IV/1 463
Soyeria blattarioides Monn. VI/2 1141
hyoseridifolia Koch VI/2 1142
„ montana Monn. VI/2 1138
Spallanzania agrimonioides Pollini IV/2 929
Sparaxis tricolor Ker-Gawler II 306
Sparganiaceae I 115; VII 152
Sparganium L. I 116; VII 152
affine Schnitzlein I 118
diversifolium Graebn. I 119
Englerianum Aschers. et Graebn. I 120
minimum Fries I 119
natans auct. I 119
ramosum Huds. I 116
simplex Huds. I 117
Sparmannia Africana L. f. V/1 428
Spartianthus junceus Lk. IV/3 1213
Spartium L. IV/3 1213; VII 182
Americanum Meyer IV/3 1213
angulosum Gilib. IV/3 1182
complicatum L. IV/3 1148
decumbens Durande IV/3 1206
glabrum Mill. IV/3 1182
Spartium junceum L. IV/3 1213; VII 183 Fig. 1226 B
multiflorum Ait. IV/3 1168
pilosum Roth IV/3 1203
radiatum C. Koch IV/3 1193
sagittale Roth IV/3 1196
scoparium L. IV/3 1182
„ tinctorum Roth IV/3 1202
Spartocytisus nubigenus Webb IV/3 1168
„ sessilifolius Webb IV/3 1173
Spartothamnus sessilifolius Presl IV/3 1173
Spathelioideae VII 184
Spathicarpa Hook. VII 157
Spathiflorae II 139; VII 157
Spathiphyllum Schott I/CXI Fig. 183 b; VII 157
Spathularia stellaris Haw. IV/2 624
Specularia (Heister) A. DC. VI/1 366; VII 208
hybrida A. DC. VI/1 367
„ Speculum A. DC. VI/1 366
Spelta amylea Ser. I 393
„ vulgaris Ser. I 391
Spergula L. III 418; VII 173
arvensis L. III 418
decandra Gilib. III 418
droseroides Brot. IV/2 498
flaccida (Roxb.) Aschers. III 418
glabra Willd. III 387
Morisonii Boreau III 419
nodosa L. III 387
pentandra auct. III 419
pentandra L. III 420
ramosissima Homann III 388
saginoides Rchb. III 385
stricta Sw. III 399
subulata Sw. III 386
„ vernalis Willd. III 419
Spergularia Presl III 421; VII 173
arvensis Cambess. III 418
campestris (All.) Aschers. III 422
diandra (Guss.) Heldr. et Sart. III 422
echinosperma Čelak. III 422
fallax Lowe III 418
marginata Kittel III 424
marina Griseb. III 423
pentandra G. Don III 420
rubra (L.) Presl III 422
salina Presl III 423
segetalis Fenzl III 425
„ semidecandra Kittel III 425
Spermatophyta VII 150
Spermolepis Rafin. V/2 1139
Sphacelariales VII 138
Sphaeralcea Emoryi Torr. V/1 457
„ miniata Spach V/1 457
Sphaeriaceae VII 141
Sphaeriales VII 141
Sphaeropleaceae VII 138

Sphaerotheca Mors uvae Schw. IV/2 644
Sphagnaceae VII 145
Sphagnales VII 145
Sphagnum Ehrh. VII 145
Sphecopsis verticillata Briq. V/4 2503
Sphenoclea Gaertn. VII 209
Sphondylium Mill. V/2 1415
asperum Hoffm. V/2 1422
Austriacum Scop. V/2 1454
Branca Scop. V/2 1427
Branca-ursina Hoffm. V/2 1427, 1438
pubescens Hoffm. V/2 1423
„ villosum Hoffm. V/2 1421
Spielmannia Cuss. V/2 1131
Spiesia campestris O. Kuntze IV/3 1447
Gaudini O. Kuntze IV/3 1443
Lapponica O. Kuntze IV/3 1441
montana O. Kuntze IV/3 1439
„ pilosa O. Kuntze IV/3 1444
Spigelia Marylandica L. V/3 1952
splendens H. Wendland V/3 1952
Spilanthes Americana (Mutis) Hieronymus VI/2 1366
oleracea Jacq. VI/1 528
Spinacia L. III 233; VII 171
oleracea L. III 234
„ tetrandra Stev. III 233
Spinifex L. I 194; VII 153
Spiraea L. IV/2 673, 970; VII 180
alba Du Roi IV/2 675
Aruncus L. IV/2 671
callosa Thunb. IV/2 675
cana Waldst. et Kit. IV/2 674
chamaedryfolia L. IV/2 675, 677
confusa Regel et Koernike IV/2 675
crenata L. IV/2 674
crenifolia C. A. Mey. IV/2 674
decumbens Koch IV/2 677
denudata Presl IV/2 971, 973
Douglasii Hook. IV/2 675
Filipendula L. IV/2 974
flexuosa Rchb. IV/2 677
Hacqueti Fenzl IV/2 678
hypericifolia L. IV/2 674
Japonica L. IV/2 675
lancifolia Hoffmgg. IV/2 678
levigata L. IV/2 681
media Schmidt IV/2 675
oblongifolia Waldst. et Kit. IV/2 675
obovata Waldst. et Kit. IV/2 674
opulifolia L. IV/2 680
palmata L. IV/2 971
pinnata Moench IV/2 681
prunifolia Sieb. et Zucc. IV/2 673
salicifolia L. IV/2 678
Spiraea sorbifolia L. IV/2 681
Thunbergii Siebold IV/2 673
tomentosa L. IV/2 675
Ulmaria L. IV/2 971
ulmifolia Scop. IV/2 677
„ vaccinifolia hort. IV/2 674
Spiraeoideae IV/2 663; VII 180
Spiranthes Rich. II 384; VII 165
aestivalis Rich. II 385
autumnalis Rich. II 385
Romanzowiana Cham. II 385
„ spiralis K. Koch II 385
Spirillaceae VII 135
Spirodela Schleiden II 141
„ polyrrhiza Schleiden II 141
Splachnaceae VII 145
Spodiopogon Sibiricus Poir. VII 153
Spondias dulcis Forst. V/1 216
lutea L. V/1 216
mangifera Willd. V/1 216
„ purpurea L. V/1 216
Spondieae VII 186
Spondylium G. Don V/2 1415
„ conforme Moench V/2 1432
Sporolobus R. Br. I 238; VII 154
Sprekelia formosissima Herb. II 319
Sprengelia incarnata Sm. V/3 1713
Spumariaceae VII 136
Spyridium globulosum(Labill.)Benth. V/1 325
Stachyoideae VII 201
Stachys L. V/4 2407; VII 201
affinis Bunge V/4 2419
Alopecuros (L.) Benth. V/4 2432
alpinus L. V/4 2422
ambiguus Sm. V/4 2434
annuus L. V/4 2413
argentea Tausch V/4 2424
arvensis L. V/4 2415
barbigera Vis. V/4 2408
Betonica Benth. V/4 2428
Betonica Crtz. V/4 2413
betonicaefolia Pers. V/4 2408
bicolor Lutz V/4 2404
biennis Roth V/4 2424
bufonia Thuill. V/4 2410
Byzantina C. Koch V/4 2427
Canariensis Jacq. V/4 2420
canescens Mussin V/4 2420
cardinalis Kunze V/4 2408
ciliatus Dougl. V/4 2408
coccineus Jacq. V/4 2408
Danicus Schinz et Thell. V/4 2431
dasyanthes var. alpina Heldr. et Sart. V/4 2426
densiflorus Benth. V/4 2431
digeneus Salmon V/4 2434
excelsa hort. V/4 2427
foeniculum Pursh V/4 2368
fragilis Vis. V/4 2412
Germanicus L. V/4 2424
Stachys glandulifera Dalla Torre et Sarnth. V/4 2411
grandiflorus (Steven) Benth. V/4 2408
Heldreichii Boiss. V/4 2426
Heracleus All. V/4 2408
hirsuta Dalla Torre et Sarnth. V/4 2431
hybridus Brügg. V/4 2434
hyssopifolius Mich. V/4 2409
Janiana Cesati V/4 2427
intermedius auct. V/4 2434
Italica Benth. V/4 2427
Karstiana Hand.-Mazz. V/4 2411
labiosa Bert. V/4 2412
lanata Crtz. V/4 2424
lanatus Jacq. V/4 2427
maritimus L. V/4 2408
Medebachensis Feld et Koenen V/4 2434
micrantha C. Koch V/4 2413
mirabilis Rouy V/4 2434
nervosa Gateau V/4 2413
nitida Kern. V/4 2411
oblongifolia Reut. V/4 2412
Ocymastrum L. V/4 2408
Oenipontana Kern. V/4 2434
officinalis (L.) Trevisan V/4 2428
Olympica Poir. V/4 2427
paluster L. V/4 2416
Pannonica Lang V/4 2424
patula Griseb. V/4 2411
penicillata Heldr. et Sart. V/4 2427
phlomoides Willd. V/4 2408
polystachya Ten. V/4 2424
pubescens Ten. V/4 2408
Rainerti Heldr. V/4 2427
ramosissima Rochel V/4 2410
rectus L. V/4 2410
rectus L. subsp. hirtus (Ten.) Briq. V/4 2411
rectus L. subsp. rectus Briq. V/4 2411
rectus L. subsp. subcrenatus (Visiani) Briq. V/4 2412
Reuteri Schröter V/4 2412
rosea Hohenacker V/4 2434
salviaefolia Ten. V/4 2427
sanguineus Porta V/4 2412
segetum Hagen V/4 2418
serotina Fritsch V/4 2429
sideritidoides C. Koch V/4 2412
Sideritis Vill. V/4 2410
Sieboldii Miq. V/4 2419
silvaticus L. V/4 2420
silvestris Forsk. V/4 2410
speciosa hort. V/4 2408
spectabilis Choisy V/4 2427
stricta Dalla Torre et Sarnth. V/4 2429
sublanata Fleischm. V/4 2427
subpalustris Marsson V/4 2435

Stachys Thirkei C. Koch V/4 2427
tomentosa Gateau V/4 2424
Transsilvanica Schur V/4 2412
„ tuberifera Naud. V/4 2419
Stachytarpheta Jamaicensis (L.) Vahl V/3 2236
Stachyuraceae V/1 493; VII 190
Stackhousiaceae V/1 256; VII 187
Staehelina L. VI/2 923
„ alpina Schrank VI/2 839
Staflinus Rafin. V/2 1501
Stangeria T. Moore I 73; VII 150
Stanhopea Frost II 324; VII 165
Stanleya Nutt. VII 177
Stapelia L. VII 199
bufonia Jacq. V/3 2067
gigantea N. E. Br. V/3 2067
grandiflora Mass. V/3 2067
Hanburyana Rüst et Berger V/3 2067
„ variegata L. V/3 2065
Staphylea L. V/1 257; VII 187
Bolanderi Gray V/1 257
Bumalda Sieb. et Zucc. V/1 257
Colchica Stev. V/1 258
elegans Zabel V/1 258
Emodi Wall. V/1 257
pinnata L. V/1 258
trifolia L. V/1 258
„ trifoliata Payer V/1 258
Staphyleaceae V/1 256; VII 187
Staphylodendron Scop. VII 187
Statice L. V/3 1879, 1885; VII 197
ambifaria Focke V/3 1888
angustifolia Tausch V/3 1884
arborea Willd. V/3 1881
arenaria Pers. V/3 1894
Armeria L. V/3 1887; VII 19 Fig. 1020, 25 Fig. 1047
Bahusiensis Fries V/3 1883
Behen Dreyer V/3 1882
Bungei Claus V/3 1880
caespitosa Poiret V/3 1888
cephalotes Ait. V/3 1886
cephalotes Poiret V/3 1886
collina Griseb. V/3 1880
coriaria Hoffm. V/3 1880
Crouanii Lenorm. V/3 1883
dianthifolia Jaub. et Spach V/3 1879
elongata Hoffm. V/3 1889
Gmelini Koch V/3 1884
hirsuta Presl V/3 1881
humilis Salmon V/3 1883
incana Vahl V/3 1880
intermedia Czern. V/3 1880
latifolia Sm. V/3 1880
limonioides Bernh. V/3 1884
Limonium L. V/3 1882
maritima Mill. V/3 1888
Mauritanica Wallr. V/3 1886
montana Mill. V/3 1891
Statice Neumani Salmon V/3 1884
palliacea Cav. V/3 1886
plantaginea All. V/3 1894
Pseudo-Armeria Desf. V/3 1886
Pseudo-Armeria Murr. V/3 1886
Pseudolimonium Rchb. V/3 1882
purpurea Koch V/3 1893
rariflora Dreyer V/3 1883
sinuata L. V/3 1881
superba Regel V/3 1881
Tatarica L. V/3 1880
trigona Boiss. V/3 1880
„ venusta Fenzl V/3 1879
Stauntonia DC. VII 175
Staurogiton trisulcus Schur II 140
Steinmannia aurea Opiz III 168
Stellaria L. III 349; VII 172
adulterina Focke III 359
alpina Gray III 373
Alsine Bunge III 359
Alsine Reichardt III 357
anomala Rchb. III 362
apetala Ucria III 353
aquatica (L.) Scop. III 348
aquatica Pollich III 357
arvensis Hoffm. III 356
brachypetala Jess. III 364
bulbosa Wulf. III 354
caespitosa Hook. f. III 358
caespitosa Vest III 354
Carinthiaca Jess. III 372
cerastoides L. III 362
cerastoides Sm. III 364
ciliata Gilib. III 354
connata Dulac III 354
cordata Pierrat III 350
crassifolia Ehrh. III 359
decipiens Hausskn. III 359
dichotoma Georgi III 352
dichotoma Scop. III 354
dichotoma Web. III 359
Dilleniana Leers III 357
dubia Bast. III 362
Friesiana Ser. III 356
glauca With. III 358
glomerata Jess. III 363
graminea L. III 356
graminifolia Gmel. III 354
grandiflora Gilib. III 356
holostea L. III 354
humifusa Retz. III 359
laferiflora Fleischm. III 359
latifolia Gray III 367
longifolia Mühlenb. III 356; VII 172
Mantica DC. III 379
media (L.) Vill. III 352
montana Pierrat III 350
Mosquensis Bieb. III 356
nemoralis Salisb. III 350
nemorum L. III 350
Stellaria pallida Piré III 353
palustris Retz. III 358
repens Scop. III 376
rupestris Scop. III 392
semidecandra Lk. III 365
silvatica Jess. III 370
stricta C. Koch III 358
tetrandra S. F. Gray III 364
tomentosa Lk. III 376
trivialis Lk. III 366
uliginosa Murr. III 357
viscida Bieb. III 362
„ vulgata Lk. III 363
Stellaris corymbosa Moench II 252
Stellera Passerina L. V/2 726
Stemonaceae VII 159
Stemonitaceae VII 136
Stenactis Coss. VI/1 447; VII 209
alpinus Cass. VI/1 438
annua Nees VI/1 447
bellidiflora A. Br. VI/1 447
Philadelphica (L.) VI/1 447
„ speciosa Lindl. VI/1 447
Stenhammaria maritima Rchb. V/3 2128
„ Virginica Rchb. V/3 2128
Stenopetalum incisifolium Hook. IV/1 361
Stenophragma Čelak. IV/1 392; VII 178
pinnatifidum Prantl IV/1 157
„ Thalianum Čelak. IV/1 392
Stephanandra Sieb. et Zucc. IV/2 663; VII 180
Stephanotis floribunda A. Brong. V/3 2067
Sterculiaceae V/1 489; VII 188
Stereoxylon Ruiz et Pav. IV/2 566
Sternbergia Waldst. et Kit. II 319
Steudnera colocasiaefolia C. Koch II 131
Stevia ovata Lagasca VI/1 408
Stewartia monadelpha Sieb. et Zucc. V/1 498
pentagyna L'Hérit. V/1 498
„ Virginica Cav. V/1 498
Stictaceae VII 144
Stigmateae VII 152
Stigonemataceae VII 136
Stillingia L. VII 186
Stimpsonia Wright V/3 1728
Stipa L. I 202; VII 154
aristella L. I 205
calamagrostis Wahlenb. I 206
capillata L. I 205
formicarum Del. I 203
Grafiana Stev. I 204
intricata Godr. I 203
Joannis Čelak. I 204
pennata L. I 203; VII 153 Fig. 1181
tenacissima L. I 202
Tirsa Stev. I 204
tortilis Desf. I 203

Stipularia rubra Haw. III 422
Stoechas officinarum Moench V/4 2275
Stokesia cyanea L'Hérit. VI/1 408
Stramonium spinosum Lam. V/4 2613
Strangalis Dulac IV/1 226
Stranvaesia Lindl. IV/2 664
Strasburgeriaceae VII 189
Stratiotes L. I 162; VII 153
aloides L. I 162
Strobanthus Rafin. V/2 974
Streblanthus Rafin. V/2 974
Streblidia ferruginea Lk. II 46
Strelitzia reginae Ait. II 320
Streptocarpus Dunnii Hook. f. VI/1 177
polyanthus Hook. VI/1 177
Rexii Lindl. VI/1 177
Streptopus Michaux II 268; VII 162
amplexicaulis Baker II 268
amplexifolius (L.) Lam. et DC. II 268
Strobilanthes Bl. VI/1 178
Strophanthus gratus (Wallich et Hook.) Franchet V/3 2049
hispidus DC. V/3 2049
„ Kombe Oliver V/3 2049
Strophiostoma amoenum Ruprecht V/3 2160
Strophium filiforme Dulac III 416
Struthanthus Mart. III 145; VII 170
Struthiopteris Willd. VII 148
„ Germanica Willd. I 12
Strychnos colubrina L. V/3 1951
colubrina Wight V/3 1950
Gaultheriana Pierre V/3 1951
Ignatii Berg V/3 1951
lanata Hill V/3 1951
lucida R. Br. V/3 1950
Nux vomica L. V/3 1950
potatorum L. V/3 1951
Schomburgkii Klotzsch V/3 1951
„ toxifera Schomb. V/3 1951
Stuartina Muelleri Sonder VII 209
Sturmia Loeselii Rchb. II 393; VII 165
minima Hoppe I 220
paludosa Rchb. II 391
„ verna Pers. I 220
Stylidiaceae VI/1 394; VI/2 1359; VII 209
Stylidium adnatum R. Br. VI/2 1359
Stylocarpum Noulet IV/1 226
Stylophorum Nutt. VII 176
Styphelia lanceolata Sm. V/3 1713
Styphnolobium Japonicum Schott IV/3 1144
Styracaceae V/3 1900; VII 197
Styrandra bifolia Raf. II 267
Styrax Americanus Lam. V/3 1901
benzoides Craib V/3 1900
Benzoin Dryander V/3 1900
Styrax dasyanthus Perkins V/3 1901
ferruginea Pohl V/3 1901
Japonicus Sieb. et Zucc. V/3 1901
Obassia Sieb. et Zucc. V/3 1901
officinalis L. V/3 1900
reticulata Mart. V/3 1901
Tonkinense (Pierre) Craib V/3 1900
Suaeda Fork. III 257; VII 171
altissima Pall. III 257
filiformis Dum. III 258
Jacquinii Dum. III 258
„ maritima (L.) Dum. III 257
Subularia L. IV/1 70; VII 177
aquatica L. IV/1 70
Succisa Neck. VI/1 288; VII 208
australis Schott VI/1 289
inflexa Jundz. VI/1 289
praemorsa Aschers. VI/1 288
pratensis Moench VI/1 288
Transsilvanica Spr. VI/1 287
Succisella Beck VI/1 289; VII 208
inflexa (Kluk) Beck VI/1 289
Succowia Balearica (L.) Med. VII 177
Sumbulus Reinsch V/2 1354
Sutherlandia frutescens (L.) R. Br. IV/3 1457
Swainsonia galegifolia (Andr.) R. Br. IV/3 1456
Swartzia tomentosa DC. IV/3 1391
Swertia L. V/3 1973; VII 198
affinis Clarke V/3 1974
alata Royle V/3 1974
alpestris Schur V/3 1974
angustifolia Buch.-Ham. V/3 1974
Carinthiaca Wulfen V/3 1977
Chirata Buch.-Ham. V/3 1974
lutea Vest V/3 1988
perennis L. V/3 1974
„ punctata Baumg. V/3 1974
Swietenia Mahagoni L. V/1 85
Swintonia Griff VII 186
Symbegonia Warburg V/1 664
Sympetalae III 6; V/3 1565, 1567; VII 195
Symphonia globulifera L. V/1 502
Symphoricarpus L. VII 207
racemosus Michx. VI/1 234; VII 206 Fig. 1255
Symphyandra pendula Bieb. VI/1 329
„ Wanneri Roch. VI/1 329
Symphytum L. V/2 2220; VII 201
asperrimum Don V/3 2221
asperum Lepechin V/3 2221
brochum Bory V/3 2228
bulbosum Schimper V/3 2228
caeruleum Petitmengin V/3 2222
Caucasicum Bieb. V/3 2222
Symphytum Clusii Gmel. V/3 2228
cordatum Waldst. et Kit. V/3 2222
cordifolium Baumg. V/3 2222
filipendulum Bischoff V/3 2228
macrolepis Gay V/3 2228
officinale L. V/3 2223
orientale auct. V/3 2222
Orientale Bieb. V/3 2222
Orientale L. V/3 2222
Pannonicum Pal. V/3 2222
patens Sibth. V/3 2224
peregrinum auct. V/3 2221
peregrinum Botan. Mag. V/3 2222
punctatum Gaudin V/3 2228
racemosum Steven V/3 2222
Tauricum Willd. V/3 2222
tuberosum L. V/3 2226
uliginosum Kerner V/3 2225
Uplandicum Nyman V/3 2222
Vetteri Thellung V/3 2225
Wettsteinii Sennholz V/3 2229
Zeyheri Schimper V/3 2228
Symplocaceae V/3 1900; VII 197
Symplocos crataegioides Buch.-Ham. V/3 1900
paniculata Wall. V/3 1900
racemosa Roxb. V/3 1900
tinctoria L'Hérit. V/3 1900
Uruguensis Brand V/3 1900
Sympodium C. Koch V/2 1181
Synanthae VII 157
Synanthereae VI/1 394
Synchytriaceae VII 139
Synnotia Sweet VII 163
Synotoma comosum R. Schulz VI/1 386
Syntherisma glabrum Schrad. I 188
„ vulgare Schrad. I 187
Syringa L. V/3 1908; VII 197
Afghanica C. K. Schneider V/3 1911
Amurensis Rupr. V/3 1909
Emodi Wallich V/3 1910
Henryi C. K. Schneider V/3 1911
hyacinthiflora Rech. V/3 1911
Josikaea Jacq. V/3 1909
oblata Lindl. V/3 1911
Persica L. V/3 1911
villosa Vahl V/3 1910
vulgaris L. V/3 1912
Syspone sagittalis Griseb. IV/3 1196
Syzygium caryophyllaeum Gaertn. V/2 780
Ceylanicum (L.) DC. V/2 780
Jambolana (Lam.) DC. V/2 780

T.

Tabernaemontana Donnel Smithii Rosc. V/3 2049
Tacca pinnatifida Forst. II 320

Taccaceae II 320; VII 163
Taeniopetalum Vis. V/2 1364, 1367
„ Neumayeri Vis. V/2 1370
Taeniophyllum Bl. I/LI; VII 165
Tagetes erectus L. VI/1 535; VII 58 Fig. 1094 a bis d
glandulifera Schrank VI/1 535
lucidus Cav. VI/1 535
minutus L. VI/1 535
patulus L. VI/1 534
„ signatus Bartl. VI/1 535
Taiwania Hayata VII 151
Talinum patens Willd. III 268
Tamaricaceae V/1 544; VII 189
Tamaricineae V/1 493; VII 189
Tamarindus Indica L. IV/3 1130; VII 181
Tamariscus Scop. V/1 548
„ Germanicus Scop. V/1 548
Tamarix L. VII 189
Africana Poir. V/1 547
Chinensis Lour. V/1 548
Cretica Bunge V/1 544
elegans Spach V/1 547
Gallica L. V/1 546, 547
Germanica L. V/1 548
Hampeana Boiss. V/1 544
hispida Willd. V/1 546
juniperina Bunge V/1 547
Nilotica Ehrenb. V/1 547
Odessana Stev. V/1 548
parviflora DC. V/1 547
pentandra Pall. V/1 546, 547
tetrandra Pall. V/1 548
„ viridis hort. V/1 547
Tamnus Juss. VII 163
Tamonea magnifica Voss V/2 796
Tamus L. II 281
„ communis L. II 281; VII 163
Tanacetum VI/2 591, 592
alpinum Schultz-Bip. VI/2 603
annuum L. VI/2 600
argenteum Willd. VI/2 600
atratum Schultz-Bip. VI/2 607
Balsamita L. VI/2 599
corymbosum Schultz-Bip. VI/2 614
Leucanthemum Schultz-Bip. VI/2 609
Parthenium Schultz-Bip. VI/2 617
suaveolens Hooker VI/2 584
„ vulgare L. VI/2 619
Taphridium VII 140
Taphrina VII 140
cerasi (Fuckel) IV/2 1056
deformans (Berk.) IV/2 1056, 1095
Taraxacum J. G. Zinn VI/2 1078; VII 212
alpestre DC. VI/2 1093
alpinum Hegetschw. VI/2 1091
Taraxacum alpinum Britton et Brown nec (Hoppe) Hegetschw. VI/2 1086
collinum DC. VI/2 1082
corniculatum Guss. VI/2 1095
crispum Heuff. VI/2 1081
decurrentifolium Murr VI 1088
dissectum Ledeb. VI/2 1082
erectum Hoppe VI/2 1091
erythrospermum Bess. VI 1095
glabrum DC. VI/2 1091
glaucescens Bisch. VI/2 1093
glaucescens Rchb. VI/2 1095
Hoppeanum Handel-Mazzetti VI/2 1095
lanceolatum Poir. VI/2 1092
leptocephalum Rchb. VI/2 1081
levigatum (Willd.) DC. emend. VI/2 1094
levigatum (Willd.) DC. emend. subsp. aquilonare Handel-Mazzetti) VI/2 1095
levigatum (Willd.) DC. emend. subsp. levigatum (Willd.) VI/2 1095
levigatum (Willd.) DC. emend. subsp. Schroeterianum (Handel-Mazzetti) VI/2 1094
microcephalum Schur VI/2 1082
nigricans Gremli VI/2 1091
nigricans Rchb. VI/2 1093
officinale Roth VI/2 1088
officinale Web. VI/2 1083
officinale Web. subsp. alpinum (Hoppe) Chenevard VI/2 1091
officinale Web. subsp. ceratophorum (Ledeb.) Schinz et Thellung VI/2 1086
officinale Web. subsp. cucullatum (Dahlstedt) Thellung VI 2 1093
officinale Web. subsp. Handelii (Murr) VI/2 1086
officinale Web. subsp. nigricans (Kit.) VI/2 1093
officinale Web. subsp. officinale (Gaudin) Becherer VI/2 1088
officinale Web. subsp. paludosum Schinz et Keller VI/2 1092
officinale Web. subsp. palustre (Wither.) Becherer VI/2 1092
officinale Web. subsp. Reichenbachii (Huter) VI/2 1085
officinale Web. subsp. vulgare (Lam.) Schinz et Keller VI/2 1088
officinale Web. var. boreale Hjelt et Hult VI/2 1086
Taraxacum officinale Web. var. lividum Koch VI/2 1092
officinale Web. var. palustre Benth. VI/2 1092
Pacheri Schultz-Bip. subsp. Reichenbachii Huter VI/2 1085
palustre Lam. et DC. VI/2 1092
parvulum DC. VI/2 1082
procumbens Less. VI/2 1081
rhodocarpum Dahlstedt VI/2 1094
salsugineum Lamotte VI/2 1082
serotinum (Waldst. et Kit.) Poir. VI/2 1081
serotinum (Waldst. et Kit.) Poir. subsp. Bessarabicum (Hornem.) Handel-Mazzetti VI/2 1081
stramineum Beauv. VI/2 1093
Taraxacum Britt. et Brown VI/2 1088
tenuisectum Levier et Sommier „ VI/2 1082
Tarchonanthus camphoratus L. VI 495
Taubakki montana Kaempfer V/ 497
Taxaceae I 79; VII 150
Taxodiaceae VII 151
Taxodium Rich. VII 151
distichum Rich. I 82
Taxus L. I 79; VII 150
„ baccata L. I 79
Tayloria Hook. VII 145
Tecoma radicans L. VI/1 175
Tectona grandis L. V/3 2236
„ radicans (L.) DC. V/3 2237
Teesdalia R. Br. IV/1 72; VII 177
coronopifolia (Bergeret) Thellung IV/1 72
nudicaulis (L.) R. Br. IV/1 72
„ petraea Rchb. IV/1 360
Telekia Baumg. VI/1 492; VII 211
ovata C. Koch VI/1 492
speciosa (Schreb.) Baumg. VI/1 492
speciosissima (Ard.) Less. VI/1 493
Telephium L. III 426; VII 100, 173
alternifolium Moench III 426
Imperati L. III 426
„ repens L. III 426
Telfairia pedata Hook. f. VI/1 315
Telinaria Angelica Presl IV/3 1209
pilosa Presl IV/3 1203
„ radiata Presl IV/3 1193
Teliosma caerulea Alefeld IV/3 1233
Telis caerulea O. Kuntze IV/3 1233
Foenum Graecum O. Kuntze IV/3 1231
Monspeliaca O. Kuntze IV/3 1230

Tellima grandiflora (Pursh) R. Br. IV/2 567
Telmatophace gibba Schleiden II 141
„ polyrrhiza Godr. II 141
Teloxys aristata Moqu. III 260
Templetonia R. Br. IV/3 1147
Tenagocharis I 157
Tenorea rotundifolia Bubani V/2 1106
Tenoria Spr. V/2 1094
Baldensis Spr. V/2 1099
divaricata Bubani V/2 1099
falcata Bubani V/2 1126
fruticosa Spr. V/2 1103
iuncea Bubani V/2 1114
„ Pyrenaea Spr. V/2 1103
Tephroseris fuscata Jord. et Fourr. VI/2 745
„ palustris Fuss VI/2 732
Tephrosia Capensis Pers. IV/3 1386
heteranthera Griseb. IV/3 1386
„ Virginiana Pers. IV/3 1386
Terminalia L. V/2 771; VII 192
Bellerica Roxb. V/2 771
Catappa L. V/2 771
Chebula Retz. V/2 771
citrina Roxb. V/2 771
tomentosa Wight et Arn. V/2 771
Terminaliaceae V/2 771; VII 192
Ternstroemiaceae V/1 494; VII 189
Tessenia alpina Bubani VI/1 438
„ glabrata Bubani VI/1 442
Testudinaria Salisb. VII 163
„ elephantipes Salisb. II 281
Tetraclinis Masters VII 151
Tetracyclicae V/3 1567
Tetradiclis salsa Stev. V/1 41
Tetragonia expansa Murr. III 267
Tetragonolobus Scop. VII 182
biflorus purpureus Alefeld IV/3 1375
prostratus Moench IV/3 1373
purpureus Moench IV/3 1375
Scandalida Scop. IV/3 1373
„ siliquosus Roth IV/3 1373
Tetrahit grandiflorum Gilib. V/4 2467
Ladanum Moench V/4 2460
longiflorum Moench V/4 2462
nodosum Moench V/4 2465
„ purpurascens Gilib. V/4 2465
Tetralix septentrionalis E. May. V/3 1708
Trameles R. Br. V/1 663
Tetranema Benth. VII 204
Tetrapanax papyrifer (Hook.) K. Koch V/2 911, 914
Tetrasporaceae VII 137
Tetrastigma Planch. V/1 354
Tetroncium Magellanicum Willd. I 147
Teucrium L. V/4 2522; VII 203
arenarium Gmel. V/4 2530
atratum Pomel V/4 2536
Baeticum Boiss. V/4 2536
betonicaefolium Jacq. V/4 2524
Betonicum L'Hérit. V/4 2524
Botrys L. V/4 2532
Canadense L. V/4 2524
Castrense Verguin V/4 2524, 2537
Chamaedrys L. V/4 2527
Chamaepitys L. V/4 2539
commune Rouy V/4 2523
flavum L. V/4 2524
fruticans L. V/4 2524
Genevense Crantz V/4 2543
Hyrcanicum L. V/4 2524
Kotschyanum Poch V/4 2536
lancifolium (Moench) Boiss. V/4 2536
latifolium L. V/4 2524
Maderense Lam. V/4 2524
Marum L. V/4 2524
Massiliense L. V/4 2536
montanum L. V/4 2525
officinale Lam. V/4 2527
Orientale L. V/4 2524
palustre Lam. V/4 2530
Polium L. V/4 2523
pseudoscorodonia Desf. V/4 2536
pyramidale Crantz V/4 2545
reptans Crantz V/4 2541
salviaefolium Salisb. V/4 2534
salviastrum Schreb. V/4 2536
Scordium L. V/4 2530
Scordium L. subsp. palustre (Lam.) V/4 2531
Scordium L. subsp. scordioides (Schreb.) V/4 2531
Scorodonia L. V/4 2534
Sibiricum L. V/4 2367
Smyrneum Boiss. V/4 2536
Stellae Murr V/4 2537
„ sylvestre Lam. V/4 2534
Teutliopsis hastata Čelak. III 243
oblongifolia Čelak. III 241
patula Čelak. III 242
rosea Čelak. III 246
„ Tatarica Čelak. III 247
Thalassia Sol. I 159
Thalia dealbata Fraser II 321
Thalictroides Cimicifuga Royle III 479
Thalictrum L. III 587; VII 175
alpinum L. III 589
angustifolium L. III 593
angustissimum Crantz III 595
aquilegiifolium L. III 588
Bauhini Crantz III 593
exaltatum Gaud. III 596; VII 175
flavum L. III 595
Thalictrum foetidum L. III 590
galioides Nestler III 593
glaucum Desf. III 587
lucidum L. III 594
medium Jacq. III 596
minus L. III 591
montanum Wallr. III 591
nigricans Jacq. III 595
„ saxatile DC. III 592
Thapsia L. V/2 946, 1500
altissima Miller V/2 1401
Asclepium L. V/2 1500
decussata Lag. V/2 1500
foetida K. Wein V/2 1500
Garganica L. V/2 1500
Sylphium Viv. V/2 1500
„ Transtagana Brot. V/2 1500
Thea L. VII 189
Assamica Masters V/1 495
drupifera (Lourr.) Pierre V/1 498
Japonica Nois. V/1 497
Sassanqua (Thunb.) Nois. V/1 498
„ Sinensis L. V/1 495
Theaceae V/1 494; VII 189
Theineae V/1 493; VII 188
Thelaia chlorantha Alef. V/3 1580
„ rotundifolia Alef. V/3 1585
Thelesperma ficifolium Gray VI/1 531
„ trifidum Voss VI/1 531
Thellungia advena Stapf VII 154
Thelygonaceae VII 172
Thelygonum Cynocrambe L. VII 172
Thelypodieae VII 177
Thelypodium lasiophyllum (Hook. et Arn.) Greene VII 177
Theobroma angustifolium Moç. et Sess. V/1 492
bicolor Humb. et Bonpl. V/1 492
„ Cacao L. V/1 490
Theophrasta Jussieui Lindl. V/3 1714
Theophrastaceae V/3 1714; VII 196
Therebinthales VII 186
Thermopsis barbata Royle IV/3 1146
fabacea DC. IV/3 1146
lanceolata R. Br. IV/3 1146
„ montana Nutt. IV/3 1146
Thesium L. III 151; VII 169
alpinum L. III 157
Bavarum Schrank III 153
comosum Roth III 158
diffusum Simk. III 155
divaricatum Jan nec DC. III 155
Dollinerii Murbeck III 155
ebracteatum Hayne III 158
Gallicum Schultz III 156
Graecum Zucc. III 155
humifusum DC. III 156
humile Vahl III 155
hybridum Beck III 160

Thesium intermedium Schrader III 154
linifolium Schrank III 154
Linophyllum L. III 154
montanum Ehrh. III 153
pratense Ehrh. III 157
ramosum Hayne III 156
rostratum Mert. et Koch III 159
Thespesia Corr. VII 188
Thevetia L. VII 198
Thibaudia H. B. et Kth. VII 196
Thiobacteriaceae VII 135
Thladiantha dubia Bunge VI/1 315, 316
Thlaspi L. IV/1 116; VII 177
alliaceum L. IV/1 120
alpestre L. IV/1 122
alpestre Suter IV/1 130
alpestre Hudson IV/1 121
alpinum Crantz IV/1 129
amarum Crantz IV/1 107
Arabicum Bieb. IV/1 111
arvense L. IV/1 118
Arvernense Jordan IV/1 125
Baicalense DC. IV/1 119
brachypetalum Jordan IV/1 123
Bursa pastoris L. IV/1 364
Buxbaumii Fisch. IV/1 111
calaminare Lej. et Court. IV/1 125
campestre L. IV/1 79
cartilagineum J. Mayer IV/1 88
cepeaefolium Kocn IV/1 133
ceratocarpon (Pallas) Murr IV/1 117
corymbosum Rchb. IV/1 133
erraticum Jordan IV/1 122
Goesingense Hal. IV/1 131
graminifolium Poir. IV/1 91
Gremlianum Thellung IV/1 134
heterophyllum Cav. IV/1 87
heterophyllum DC. IV/1 80
improperum Jordan IV/1 122
incanum Gilib. IV/1 79
Jonopsidium Janka IV/1 102
Kerneri Huter IV/1 131
Lereschii Reuter IV/1 123
lutescens Gilib. IV/1 118
minimum Ard. IV/1 129
montanum Hudson IV/1 122
montanum L. IV/1 126
montanum Murith IV/1 125
montanum Pollich IV/1 124
Mureti Gremli IV/1 125
Nasturtium Bergeret IV/1 81
neglectum Crépin IV/1 122
nudicaule Lam. et DC. IV/1 72
peregrinum Scop. IV/1 112
perfoliatum L. IV/1 121
petraeum Moritzi IV/1 360
pinnatum Beck IV/1 360
praecox Lej. IV/1 125
praecox Schleicher IV/1 122
Thlaspi praecox Wulfen IV/1 128
procumbens Wallr. IV/1 361
rotundifolium (L.) Gaud. IV/1 132
ruderale All. IV/1 83
Salisii Dalla Torre IV/1 123
sativum Crantz IV/1 81
saxatile L. IV/1 112
silvestre Jordan IV/1 124
spathulatum Gaterau IV/1 126
strictum Dalla Torre et Sarnthein IV/1 119
sylvium Gaudin IV/1 130
umbellatum Crantz IV/1 106
virens Jordan IV/1 125
„ Virginicum Cav. IV/1 85
Thlaspidea arvensis Opiz IV/1 118
Thlaspidium alpestre Bubani IV/1 122
arvense Bubani IV/1 118
cordatum Bubani IV/1 121
levigatum Medikus IV/1 97
„ semperflorens Andrz. IV/1 102
Thlaspius St. Lager IV/1 116
Thomasia quercifolia Gay V/1 492
Thouinia Poit. V/1 307
Thrincia hirta Roth VI/2 1032, 1033
hispida auct. plur. VI/2 1033
„ hispida Roth VI/2 1033
Thuja L. I 82; VII 103 Fig. 1131 u. 151
Thuidium Bryol. eur. VII 147
Thujopsis Sieb. et Zucc. VII 151
Thunbergia alata Boj. VI/1 177
„ reticulata Hochst. VI/1 177
Thurniaceae VII 158
Thuya VII 151
Thymelaea Endl. V/2 725; VII 191
alpina All. V/2 713
annua Wickstr. V/2 726
arvensis Lam. V/2 726
candida Scop. V/2 713
Cneorum Scop. V/2 716
Mezereum Scop. V/2 708
Passerina (L.) Coss. et Germain V/2 726
Thymelaeaceae V/2 698; VII 191
Thymelaeineae VII 191
Thymus L. V/4 2306; VII 201
acicularis Waldst. et Kit. V/4 2326
Acinos L. V/4 2297
alpinus L. V/4 2299
angustifolius auct. mediterr. V/4 2325
Calamintha Scop. V/4 2290
canescens Dum. V/4 2297
Carpaticus Čelak. V/4 2326
Čelakovskyanus M. Schulze V/4 2327
Celticus H. Braun V/4 2327
citriodorus Pers. V/4 2327
collinus Bieb. V/4 2312, 2313
Thymus Cunila E. H. L. Krause V/4 2282
effusus auct. V/4 2325
erioclados Borbás V/4 2327
flagellaris Kerner V/4 2327
glaber Miller V/4 2324
glandulosus Requien V/4 2292
hirtus Russ. V/4 2286
Horminum E. H. L. Krause V/4 2472
longicaulis auct. V/4 2325
Marschallianus Willd. V/4 2312
Melissa E. H. L. Krause V/4 2302
montanus Crantz V/4 2299
Nepeta Sm. V/4 2292
Oenipontanus H. Braun V/4 2327
Origanum O. Kuntze V/4 2328
ovatus Mill. V/4 2323
ovatus Velen. V/4 2323
Reineggeri Opiz V/4 2327
saxicolus H. Braun V/4 2327
Serpyllum L. V/4 2308; VII 200 Fig. 1241
Serpyllum L. subsp. alpestris Briquet V/4 2321
Serpyllum L. subsp. alpestris (Tausch) Lyka V/4 2321
Serpyllum L. subsp. angustifolius (Pers.) Vollmann V/4 2318
Serpyllum L. subsp. auctus Lyka V/4 2313
Serpyllum L. subsp. brachyphyllus (Opiz) V/4 2313
Serpyllum L. subsp. Carniolicus (Borbás) Lyka V/4 2322
Serpyllum L. subsp. Chamaedrys (Fries) Vollmann V/4 2323
Serpyllum L. subsp. clivorum Lyka V/4 2319
Serpyllum L. subsp. Dalmaticus (Rchb.) Lyka V/4 2325
Serpyllum L. subsp. decipiens (H. Braun) Lyka V/4 2317
Serpyllum L. subsp. effusus (Host) V/4 2322
Serpyllum L. subsp. glabrescens (Willd.) Lyka V/4 2314
Serpyllum L. subsp. Hesperites Lyka V/4 2316
Serpyllum L. subsp. montanus (Waldst. et Kit.) Lyka V/4 2323
Serpyllum L. subsp. parviflorus (Opiz) Lyka V/4 2323
Serpyllum L. subsp. Pfaffianus Lyka V/4 2322
Serpyllum L. subsp. polytrichus (Kerner) Briquet V/4 2320
Serpyllum L. subsp. rigidus (Wimm. et Grab.) Lyka V/4 2315
Serpyllum L. subsp. Serpyllum (Briq.) V/4 2318

Thymus Serpyllum L. subsp. Sudeticus (Opiz) Lyka V/4 2326
Serpyllum L. subsp. Trachselianus (Opiz) Lyka V/4 2321
silvaticus Bernh. V/4 2295
„ vulgaris L. V/4 2307
Thyrsanthus palustris Schrank V/3 1855
Thyrsopteridaceae VII 148
Thysselinum Adanson V/2 1310
Hoffm. V/2 1363, 1367; VII 191
Moench V/2 1089
grandiflorum Moench V/2 1090
nigrum Moench V/2 1318
palustre Hoffm. V/2 1393
„ Plinii Sprengel V/2 1393, 1396
Tiarella cordifolia L. IV/2 567
Tibouchina granulosa (D. Don) Cogn. V/2 795
Tiglium officinale Klotzsch V/1 124
Tigridia pavonia Ker-Gawler II 305
Tilia L. V/1 430; VII 187, 188 Fig. 1231
alba Ait. V/1 434
Americana L. V/1 436
argentea Desf. V/1 434
Baroniana Diels V/1 436
Canadensis Michx. V/1 436
Carlruhensis Simk. V/1 452
Caucasica Rupr. V/1 434
cordata Mill. V/1 437
Corinthiaca Bosc. V/1 434
euchlora Koch V/1 434, 452
Europaea L. V/1 446
flaccida Host V/1 452
flavescens A. Br. V/1 452
floribunda A. Br. V/1 452
gigantea Host V/1 436
grandifolia Ehrh. V/1 446
Haynaldiana Simk. V/1 453
Hegyesensis Simk. V/1 453
heterophylla hort. V/1 434
heterophylla Vent. V/1 436
intermedia Boissier V/1 434
Juranyiana Simk. V/1 453
laxiflora hort. V/1 452
leptophylla Small V/1 434
macrophylla hort. V/1 436
Mandschurica Rupr. V/1 434
microphylla Vent. V/1 437
Mississippensis Bosc. V/1 436
Moltkei Späth V/1 436
Mongolica Maxim. V/1 433
nitida Ortm. V/1 449
obliqua Opiz V/1 448
officinarum Crantz V/1 446
orbicularis Carr. V/1 452
pallida Salisb. V/1 434
parvifolia Ehrh. V/1 437
platyphyllos Scop. V/1 446
praecox A. Br. V/1 452
pubescens Ait. V/1 434
pubescens Koch V/1 452
Tilia rotundifolia Vent. V/1 434
rubra DC. V/1 434
silvestris Desf. V/1 437
Spaethii L. Späth V/1 452
Steveniana Borbás V/1 434
tomentosa Moench V/1 434
ulmifolia Scop. V/1 437
velutina K. K. Mackenzie V/1 436
vestita A. Br. V/1 436
„ vulgaris Hayne V/1 452
Tiliaceae V/1 426; VII 188
Tilingia Regel V/2 1304
Tillaea L. VII 179
aquatica L. IV/2 515
muscosa L. IV/2 517
„ prostrata Schkuhr IV/2 515
Tillandsia usneoides L. II 143
Tilletia VII 142
Tilletiaceae VII 142
Tilopteridales VII 138
Tinantia fugax Scheidweiler II 143
Tirpitzia Sinensis Hallier V/1 1
Tissa Adans. III 421
„ campestris Pax III 422
Tithonia tagetiflora Desf. VI/1 528
Tithymalaceae V/1 113; VII 185
Tithymalus Scop. V/1 136; VII 185
amygdaloides Hill V/1 164
angulatus Klotzsch et Garcke V/1 156
Carniolicus Klotzsch et Garcke V/1 156
cinerascens Moench V/1 183
Cyparissias Scop. V/1 167
dulcis Scop. V/1 154; VII 186 Fig. 1230
Esula Moench V/1 170
exiguus Moench V/1 187
falcatus Klotzsch et Garcke V/1 184
fruticosus Gilib. V/1 150
lucidus Klotzsch et Garcke V/1 172
maculatus Moench V/1 143
palustris Hill V/1 150
pilosus Scop. V/1 156
segetalis Lam. V/1 183
Seguierii Scop. V/1 180
strictus Klotzsch et Garcke V/1 161
verrucosus Scop. V/1 157
virgatus Klotzsch et Garcke V/1 173
Tittelbachia fuchsioides Kl. V/1 668
Tmesipteris Bernh. VII 147
Toddalia aculeata Lam. V/1 53
Toddalioideae VII 184
Tofieldia Huds. II 189; VII 159
alpina Hoppe et Sternb. II 190
borealis Wahlenb. II 190
calyculata (L.) Wahlenb. II 189; VII 102 Fig. 1130
ossifraga Nem. II 191
Tofieldia palustris Huds. II 190
Tolmiea Menziesii (Hook.) Torr. et Gray IV/2 567
Tolpis barbata (L.) Gaertn. VI/2 1007
Toluifera balsamum L. IV/3 1144
Pereirae (Klotzsch) Baillon IV/3 1144
Tolypella VII 138
Tommasiana Bertol. V/2 1364, 1367; VII 195
altissima Thellung V/2 1401
„ verticillaris Bertol. V/2 1401
Toona Roem. V/1 85
Tordylium L. V/2 1457, 1460; VII 195
Anthriscus L. V/2 1051
Apulum L. V/2 1459, 1460
asperum Gilib. V/2 1051
concinnum Ten. V/2 1459
humile Desf. V/2 1460
humile Ten. V/2 1459
intermedium Pass. V/2 1463
latifolium L. V/2 1064
magnum Brot. V/2 1461
maximum L. V/2 1461
microspermum Ten. V/2 1459
nodiflorum All. V/2 1057
nodosum L. V/2 1057
officinale L. V/2 1459, 1461
peregrinum L. V/2 1354
siifolium Scop. V/2 1456
Syriacum L. V/2 1458, 1461
„ verecundum Salisb. V/2 1051
Torilis Adanson V/2 1048; VII 193
Africana Sprengel V/2 1056
aglochis Simonkai V/2 1056
Anthriscus Gaertn. V/2 1030
Anthriscus (L.) Gmelin V/2 1051
arvensis (Hudson) Link V 2 1054
bracteosa Bianca V/2 1059
chlorocarpa Sprengel V/2 1055
convexa Dulac V/2 1051
cordisepala Murbeck V/2 1050
Cretensis Clairv. V/2 1278
divaricata Moench V/2 1056
elata DC. V/2 1051
Friedrichsthalii Cesati V/2 1054
heterophylla Guss. V/2 1057
homoeophylla Calestani V/2 1050
infesta Clairv. V/2 1056
Japonica DC. V/2 1051
lanuginosa Clairv. V/2 1030
leptophylla (L.) Rchb. V/2 1050
Libanotis Clairv. V/2 1243
macrocarpa Gaertn. V/2 994
macrocarpa Zawadzki V/2 1058
microcarpa Besser V/2 1053
neglecta R. et Sch. V/2 1055
nodosa (L.) Gaertn. V/2 1057
Orientalis Calestani V/2 1060

Torilis Persica Boiss. et Buhse V/2 1051
praetermissa Hance V/2 1051
purpurea Guss. V/2 1057
rubella Moench V/2 1051
scabra DC. V/2 1056
scandicina Gmelin V/2 1030
stricta Wibel V/2 1051
Syriaca Boiss. et Blanche V/2 1055
trilobata Viv. V/2 1197
tuberculata Sprengel V/2 1197
tumida Moench V/2 994
„ Ucranica Sprengel V/2 1053
Tormentilla erecta L. IV/2 882
officinalis Curt. IV/2 882
„ reptans L. IV/2 884
Torminaria Clusii Roemer IV/2 719
„ torminalis Dippel IV/2 719
Torreya Arn. I 79; VII 150
Tortula Hedw. VII 145
Tournefortia heliotropioides Hooker V/3 2131
Tournesolia Scop. VII 185
Tovariaceae IV/1 490; VII 178
Townsendia Wilcoxiana Wood VI/1 449
Toxicodendron altissimum Miller V/1 81
Capense Thunb. V/1 120
pubescens Mill. V/1 220
„ vulgare Mill. V/1 221
Toxylon Raf. VII 168
Tozzettia pratensis Savi I 216
„ utriculata Savi I 216
Tozzia L. VI/1 71; VII 204
alpina L. VI/1 71
„ Carpatica Wol. VI/1 71
Trachelium caeruleum L. VI/1 329
Trachelospermum lucidum K. Schum. V/3 2051
Trachycarpus excelsa Wendl. II 130
Trachylobium Hayne IV/3 1130; VII 181
Trachymene Rudge V/2 956
Trachypleurum Rchb. V/2 1094
„ subovatum Calestani V/2 1098
Trachyspermum aromaticum Thelung V/2 1167
„ Copticum (L.) Link V/2 1167
Trachystemon Creticum (Willd.) Don V/3 2128
„ Orientalis (L.) Don V/3 2128
Tradescantia L. II 143; VII 158
Fluminensis Vell. II 143
Virginica L. II 143
zebrina Loud. II 143; VII 157 Fig. 1184
Tragacantha Bunge IV/3 1404
Tragia cannabina L. V/1 120
Tragium Sprengel V/2 1196
Anisum Link V/2 1209
hirtellum Hochst. V/2 1197
Tragium maius Lam. V/2 1199
peregrinum Sprengel V/2 1197
„ Tauricum Ledeb. V/2 1197
Tragopogon L. VI/2 1042; VII 212
aureus Boiss. VI/2 1043
brevirostris DC. VI/2 1043
campestris Besser VI/2 1047
Crantzii Dichtl VI/2 1052
crocifolius L. VI/2 1043
dubius Scop. VI/2 1046
dubius Vill. VI/2 1051
floccosus Tomm. VI/2 1045
floccosus Waldst. et Kit. VI/2 1043
glaber (L.) Benth. et Hook. VI/2 1043
heterospermus Schweigg. VI/2 1043
hybridus L. VI/2 1043
interjectus Waisb. VI/2 1052
latifolius Boiss. VI/2 1043
Lithuanicus Besser VI/2 1044
maior Jacq. VI/2 1046
micranthus Wimmer VI/2 1051
mirabilis Rouy VI/2 1052
Orientalis L. VI/2 1050
porrifolius L. VI/2 1042
porrifolius L. subsp. australis (Jord.) Br.-Bl. VI/2 1043
porrifolius L. subsp. sativus (Gater.) Br.-Bl. VI/2 1043
praecox Focke p.p. VI/2 1050
pratensis L. VI/2 1048, 1356
pratensis L. subsp. minor (Miller) Rouy VI/2 1051
Tommasinii Schultz-Bip. VI/2 1045
tortilis G. Meyer VI/2 1050
„ undulatus Rchb. VI/2 1050
Tragoselinum Angelica Lam. V/2 1212
dissectum Moench V/2 1205
hircinum Moench V/2 1205
magnum Moench V/2 1199
minus Lam. V/2 1202
pumilum Lam. V/2 1132
„ saxifragum Moench V/2 1202
Tragus Haller I 186
Berteroanus Schult. I 186
koelerioides Aschers. I 186
„ muricatus Moench I 186
Trapa L. V/2 882; VII 182
natans L. V/2 884
quadrispinosa Roxb. V/2 884
Verbanensis De Notaris V/2 888
Traunsteinera globosa Rchb. II 345
Treculia Africana Decaisne III 124; VII 168
Trema Loureiro VII 168
Tremandraceae V/1 86; VII 185
Tremellales VII 142
Trentepohliaceae VII 138
Tretorrhiza Cruciata Opiz V/3 2004
Trianea Bogotensis Karsten I 159
Tribula Hill V/2 1276
„ Turbith Hill V/2 1277
Tribulus L. V/1 41; VII 184
„ terrestris L. V/1 41
Tricerastes Presl V/1 663
Trichera agrestis Schrader VI/1 293
arvensis Schrader VI/1 292
Baldensis Borb. VI/1 294
Fleischmanni Nyman VI/1 297
Godeti Nyman VI/1 299
indivisa Schur VI/1 293
longifolia Roem. et Schult. VI/1 298
Pannonica Borb. VI/1 301
Pannonica Nyman VI/1 294
„ silvatica Schrad. VI/1 300
Trichlinium Rafin. V/2 950, 957
Trichocline argentea VI/2 992
Trichodium alpinum Schrad. I 227
caninum Schrad. I 226
„ rupestre Schrad. I 226
Trichomanes Sm. I 7; VII 148
Trichophorum Hartm. II 23; VII 155
alpinum (L.) Pers. II 23
atrichum Palla II 26
„ caespitosum (L.) Hartm. II 24
Trichosacme Zucc. V/3 2059
Trichosanthes Anguina L. VI/1 315
cucumerodes Maxim. VI/1 315
Japonica Regel VI/1 315
„ Kadam Miq. VI/1 315
Trichosporum Don. VI/1 177
Tricoccae V/1 117; VII 185
Tricyrtis hirta W. J. Hook. II 199
Tridactylites annua Haw. IV/2 620
„ petraea Haw. IV/2 617
Tridax trilobata (Cav.) Hemsl. VI/1 532
Trientalis L. V/3 1861; VII 197
alsinaeflora Gilib. V/3 1861
Americana Pursh V/3 1861
borealis Ref. V/3 1861
Europaea L. V/3 1861
„ latifolia Hook. V/3 1861
Trifoliastrum caeruleum Moench IV/3 1233
„ procumbens Beck IV/3 1234
Trifolieae IV/3 1228; VII 182
Trifolium L. IV/3 1275; VII 182
adulterinum Beyer IV/3 1351
agrarium L. IV/3 1290, 1293
agrarium Poiret IV/3 1292
albidum Ten. IV/3 1281
album Loisl. IV/3 1245
Alexandrinum Boiss. IV/3 1282
Alexandrinum L. IV/3 1281
alpestre L. IV/3 1344
alpestre Poll. IV/3 1342
alpicolum Hegetschw. IV/3 1334

Trifolium alpinum L. IV/3 1314
Americanum Lobel IV/3 1385
ampullescens Gilib. IV/3 1316
angulatum Ten. IV/3 1279
angulatum Waldst. et Kit. IV/3 1279
angustifolium L. IV/3 1281
anomalum Bory et Chaub. IV/3 1280
arcunervatum Griseb. IV/3 1327
aristatum Link IV/3 1280
Armenium auct. IV/3 1350
Armenium Willd. IV/3 1351
arvense L. IV/3 1322 und 1640 Fig. 1606
Arvernense Lamotte IV/3 1309, 1310
aureum Pollich IV/3 1293
aureum Thuill. IV/3 1292
badium Puccini IV/3 1293
badium Schreber IV/3 1295
Bertrandi Rouy IV/3 1351
Biasolettianum Schur IV/3 1310
Biasolettianum Steudel IV/3 1304
bicorne Forskal IV/3 1319
Blesense Dodart IV/3 1282
Bocconei Savi IV/3 1280
brachyanthum Rouy IV/3 1333
brachyodon Kerner IV/3 1323
brachystylos Knaf IV/3 1333
caerulescens Bieb. IV/3 1229
caeruleum Willd. IV/3 1233
caespitosum Eichw. IV/3 1300
caespitosum Reynier IV/3 1307
caespitosum Schur IV/3 1310
campestre Gmelin IV/3 1293
campestre Schreber IV/3 1290
canescens Willd. IV/3 1351
capilliforme Del. IV/3 1290
Carmelii Boiss. IV/3 1282
Carpaticum Porc. IV/3 1334
Cherleri L. IV/3 1281
ciliosum Thuill. IV/3 1280
clypeatum Lap. IV/3 1281
collinum Bast. IV/3 1280
commutatum Ledeb. IV/3 1281
congestum Link IV/3 1316
Constantinopolitanum Ser. IV/3 1282
controversum Jan IV/3 1289
Corsicum Req. IV/3 1280
Cupani Tin. IV/3 1280
Dalmaticum Portenschl. IV/3 1282
Dalmaticum Vis. IV/3 1327
decipiens Hornem. IV/3 1294
dentatum Waldst. et Kit. IV/3 1239
diffusum Baumg. IV/3 1333
diffusum Ehrh. IV/3 1280
dipsaceum Camus IV/3 1348
Trifolium dipsaceum Thuill. IV/3 1282
dubium Sibth. IV/3 1289
echinatum Bieb. IV/3 1282
elegans Savi IV/3 1299, 1300
elongatum Wild. IV/3 1351
exaltatum Sauter IV/3 1343
expansum Ten. IV/3 1342
expansum Wáldst. et Kit. IV/3 1333
filiforme L. IV/3 1288
fistulosum Gilib. IV/3 1299
flexuosum Jacq. IV/3 1342
formosum Curt. IV/3 1319
fragiferum L. IV/3 1316
frigidum Simonkai IV/3 1334
fuscum Desv. IV/3 1293
gemellum Lapeyr. IV/3 1280
gemellum Savi IV/3 1280
glabellum Presl IV/3 1281
glareosum Schleicher IV/3 1309, 1310
glomeratum L. IV/3 1279
gracile Thuill. IV/3 1323
heterophyllum Czetz et Tratt. IV/3 1334
heterophyllum Lej. IV/3 1332
hirtum All. IV/3 1281
hispidum Desf. IV/3 1281
Hohenackeri Jaub. et Spach IV/3 1351
hybridum L. IV/3 1299
hybridum Savi IV/3 1278
incarnatum L. IV/3 1328
isthmocarpum Brotero IV/3 1279
Juliani Battandier IV/3 1281
Kochianum Hayne IV/3 1239
Lagopus Pourret IV/3 1280
lappaceum L. IV/3 1280
leucanthum Bieb. IV/3 1282
leucotrichum Petrovič IV/3 1282
levigatum Desf. IV/3 1280
Ligusticum Balbis IV/3 1280
litigiosum Desv. IV/3 1294
longestipulatum Loisel. IV/3 1282
Lupinaster L. IV/3 1312
macrorrhizum Waldst. et Kit. IV/3 1241
maculatum Host IV/3 1327
majus Koch IV/3 1291
maritimum Hudson IV/3 1281
medium L. IV/3 1342
Melilotus caerulea L. IV/3 1233
Messanense L. IV/3 1239
Michelianum Gaudin IV/3 1299
Michelianum Savi IV/3 1278
micranthum Viviani IV/3 1290
microphyllum Ser. IV/3 1289
minus Koch IV/3 1291
Trifolium minus Relh. IV/3 1288/89
Molinerii Balb. IV/3 1329
montanum L. IV/3 1310
neglectum Fisch. et Mey. IV/3 1316
neglectum Noë IV/3 1304
nervosum Presl IV/3 1281
nidificum Griseb. IV/3 1283
nigrescens Schur IV/3 1302
nigrescens Viv. IV/3 1278
nivale Sieber IV/3 1334
Noëanum Rchb. IV/3 1329
Noricum Schleicher IV/3 1334
Noricum Wulfen IV/3 1341
nudiflorum Bocc. IV/3 1280
obscurum Guss. IV/3 1282
ochroleucum Hudson IV/3 1348
officinale Willd. IV/3 1241
Olympicum Hornem. IV/3 1351
ornithopodioides (L.) Sm. IV/3 1279
ovatifolium Bory et Chaub. IV/3 1280
oxypetasum Heldr. et Sart. IV/3 1281
pallescens DC. IV/3 1278
pallescens Schreber IV/3 1309
pallidum Savi IV/3 1280
pallidum Waldst. et Kit. IV/3 1280
Pannonicum L. IV/3 1350
Pannonicum Vill. IV/3 1334
Panormitanum Presl IV/3 1282
Parisiense DC. IV/3 1292
parviflorum Ehrh. IV/3 1297
patens Schreb. IV/3 1292
Pennsylvanicum Willd. IV/3 1333
permixtum Neumann IV/3 1351
perpusillum Simonkai IV/3 1279
Petitpierreanum Hayne IV/3 1243
phlebocalyx Fenzl IV/3 1281
phleoides Pourret IV/3 1280
physodes Steven IV/3 1280
Pomeranicum Dobbert IV/3 1334
pratense L. IV/3 1331
procumbens L. IV/3 1289/90
procumbens Lois. et Savi IV/3 1292
prostratum Biasoletti IV/3 1304
pseudoprocumbens Gmelin IV/3 1291
purpurascens Roth IV/3 1280
purpurascens Schur IV/3 1333
purpureum Gilib. IV/3 1331
purpureum Loisel. IV/3 1281

Trifolium radiosum Wahlenb. IV/3 1283
recurvum Waldst. et Kit. IV/3 1280
repens L. IV 3 1302
resupinatum L. IV/3 1319
Romanicum Brandza IV/3 1313
rubens L. IV/3 1346
rupestre Ten. IV/3 1310, 1312
sativum Crome IV/3 1333
Savianum Willd. IV/3 1292
saxatile All. IV/3 1327
scabrum L. IV/3 1326
scabrum Schreber IV/3 1326
Schwarzii K. Wein IV/3 1351
Sebastani Savi IV/3 1278
semiglabrum Brot. IV/3 1280
serrulatum Lagasc. IV/3 1297
spadiceum Dubois IV/3 1292
spadiceum L. IV/3 1294
spadiceum Vill. IV/3 1295
spicatum Perret IV/3 1328
spumosum L. IV/3 1280
squamosum Grufberg IV/3 1281
squarrosum L. IV/3 1282
stellatum L. IV/3 1280
stramineum Lojac. IV/3 1329
strepens Crantz IV/3 1293
striatum L. IV/3 1324
strictum Waldst. et Kit. IV/3 1280
suaveolens Willd. IV/3 1321
subterraneum L. IV/3 1282
suffocatum L. IV/3 1279
sulphureum Koch IV/3 1351
supinum Savi IV/3 1282
sylvaticum Gérard IV/3 1280
tenuiflorum Ten. IV/3 1326
Thalii Villars IV/3 1307
thymiflorum Vill. IV/3 1327
tomentosum Willk. IV/3 1316
Transsilvanicum Porc. IV/3 1342
turgidum Bieb. IV/3 1280
Vaillantii Poiret IV/3 1300
vesiculosum Savi IV/3 1280
villosum Presl IV/3 1280
vulgare Hayne IV/3 1245
„ xerocephalum Fenzl IV/3 1280
Triglochin L. I 148; VII 152
maritima L. I 149; VII 4 Fig. 973, 152
palustris L. I 148
procera I 147
Roegneri Koch I 149
„ salina Wallr. I 149
Trigonella L. IV/3 1228; VII 182
azurea C. A. Mey. IV/3 1229
Besseriana Ser. IV/3 1234
caerulea (L.) Ser. IV/3 1233
caerulescens (Bieb.) Halacsy IV/3 1229
calliceras Fisch. IV/3 1229
Trigonella capitata Boiss. IV/3 1234
Coelesyriaca Boiss. IV/3 1229
corniculata L. IV/3 1229
divaricata Clairv. IV/3 1230
Fischeriana Ser. IV/3 1229
Foenum Graecum L. IV/3 1231
hamosa L. IV/3 1229
hybrida Noul. IV/3 1251
laciniata L. IV/3 1229
Monspeliaca L. IV/3 1230
ornithopodioides Lam. et DC. IV/3 1279
orthoceras Kar. et Kir. IV/3 1229
procumbens Rchb. IV/3 1234
radiata Boiss. IV/3 1251
spicata Sibth. et Sm. IV/3 1229
spinosa L. IV/3 1229
„ uniflora Munby IV/3 1279
Trigoniceae V/1 86; VII 185
Trillium L. VII 162
„ grandiflorum Salisb. II 280
Trimorpha acris Vierhapper VI/1 437
alba Vierhapper VI/1 442
alpina Vierhapper VI/1 438
angulosa Vierhapper VI/1 438
Attica Vierhapper VI/1 440
„ neglecta Vierhapper VI/1 439
Trimorphaea vulgaris Cass. VI/1 437
Trimorphopetalum Bak. V/1 310
Trinia Hoffm. V/2 1131; VII 194
Carniolica Kerner V/2 1136
dioeca Hoffm. V/2 1132
elatior Gaudin V/2 1134
glauca (L.) Dumort. V/2 1132
Henningii Gaudin V/2 1134
hispida Hoffm. V/2 1132
Hoffmanni Bieb. V/2 1132
Hoffmanni Mert. et Koch V/2 1133
Jacquini (DC.) Beck V/2 1132
Jacquiniana Endl. V/2 1132
Kitaibelii Bieb. V/2 1136
longipes Borbás V/2 1137
pumila Rchb. V/2 1132
ramosissima Fisch. V/2 1136
„ vulgaris DC. V/2 1132
Triniella Calestani V/2 1131
„ Carniolica Calestani V/2 1136
Triodia decumbens Pal. I 275
Trionum diffusum Moench V/1 458
Tripentas helodes Ascherson V/1 509
Tripetaleia Sieb. et Zucc. VII 195
Triphasia Aurantiola Lour. V/1 54
Triplachne Link I 238; VII 154
Triplaris L. VII 171
Tripleurospermum inodorum Schulz-Bip. VI/2 587
„ maritimum Koch VI/2 589
Triplocentron Melitense Cass. VI/2 983
Triplochiton K. Schum. VII 188
Tripolium vulgare Nees VI/1 423
Tripsacum dactyloides L. I 178
Tripteris Less. VII 212
Triraphis Br. VII 155
„ mollis R. Br. VII 155
Trisetaria pratensis Baumg. I 259
Trisetum Pers. I 246; VII 154
alpinum Roem. et Schult. I 259
argenteum (Willd.) Roem. et Schult. I 249
Cavanillesii Trin. I 247
distichophyllum (Vill.) Pal. I 250
flavescens (L.) P. B. I 248
Gaudianum Boiss. I 247
praecox Dum. I 241
pratense Pers. I 248
spicatum (L.) Richter I 247
subspicatum Pal. I 247
tenue Roem. et Schult. I 251
„ Valesiacum Boiss. I 247
Tristania R. Br. V/2 780
Tristegineae VII 153
Triteleia uniflora Benth. II 278
Triticum L. I 391; VII 155
acutum DC. I 387
aestivum L. I 394
amyleum Ser. I 393
apiculatum Tscherning I 387
caninum L. I 382
Cereale Schrank I 394
compactum Host I 395
cristatum Schreb. I 387
cylindricum Ces. I 390
dicoccum Schrank I 393
durum Desf. I 395
elongatum Host I 388
farctum Viv. I 386
fragile Link I 388
glaucum Moench I 394
gracile Lam. et DC. I 371
intermedium Host I 385
iunceum L. I 386
Lachenalii Gmel. I 329
litoreum Schumach. I 385
lolioides Pers. I 329
monococcum L. I 393
ovatum Gren. et Godr. I 390
pinnatum Lam. et DC. I 370
Polonicum L. I 394
pubescens Bieb. I 393
pungens Pers. I 387
repens L. I 383
rigidum Schrad. I 385, 388
sativum Lam. I 394
Savignonii Nyman I 386
sepium Lam. I 382
Sibiricum Willd. I 388
silvaticum Moench I 371
silvaticum Salisb. I 401
Spelta Host I 393
Seplta L. I 391
speltoides Godr. I 391

Triticum strictum Deth I 402
tenellum L. I 329
triaristatum Gren. et Godr. I 390
triunciale Gren. et Godr. I 390
turgidum L. I 395
unilaterale DC. I 330
ventricosum Ces. I 390
villosum Bieb. I 396
„ vulgare Vill. I 394
Tritonia aurea Pappe II 298, 305
crocata Ker-Gawler II 305
crocosmiiflora Voss II 305; VII 164 Fig. 1198
„ Uvaria Ker-Gawler II 277
Tritordeum strictum Aschers. et Graebn. I 401
Triumfetta L. V/1 429
Triuridaceae I 164; VII 153
Trixago Apula Stev. VI/1 6
arvensis Hoffm. et Link V/4 2415
colorata Presl V/4 2415
„ cordifolia Moench V/4 2415
Trochiscanthes Koch V/2 1299; VII 194
nodiflorus (All.) Koch V/2 1299
Trochiscanthos St. Lager V/2 1299
Trochodendraceae IV/1 16; VII 174
Trollius L. III 459; VII 174
altissimus Crantz III 459
Asiaticus L. III 459
Europaeus L. III 459
globosus Lam. III 459
humilis Crantz III 460
montanus Salisb. III 459
rotundifolius Stokes III 459
„ viridiflorus Schur III 460
Tropaeolaceae IV/3 1726; VII 184
Tropaeolum aduncum Sm. IV/3 1731
albiflorum Lemaire IV/3 1732
azureum Miers IV/3 1732
brachyceras Hook. IV/3 1732
Chilense Bertero IV/3 1732
edule Bridges IV/3 1732
elatum Salisb. IV/3 1729
leptophyllum G. Don IV/3 1732
maius L. IV/3 1729
minus L. IV/3 1731
Moritzianum Klotzsch IV/3 1732
peltophorum Benth. IV/3 1731
pentaphyllum Lam. IV/3 1372
peregrinum L. IV/3 1731
polyphyllum Cav. IV/3 1729, 1731
pulchellum Salisb. IV/3 1731
repandifolium Stokes IV/3 1729
sessilifolium Poepp. et Endl. IV/3 1729
speciosum Poepp. IV/3 1731
Tropaeolum tricolor Sweet IV/3 1732
tuberosum Ruiz et Pav. IV/3 1729
„ violaeflorum Dietr. IV/3 1732
Tryphane recurva Rchb. III 402
Tsuga Canadensis Carr. I 81; VII 151 Fig. 1179 a
Tsusiophyllum Tanakae Maxim. V/3 1610
Tuberaceae VII 141
Tuberales VII 141
Tuberaria Spach V/1 558
„ guttata (L.) Fourr. V/1 559
Tubiflorae VI/1 175; VII 199
Tulasnales VII 142
Tulipa L. II 242; VII 159 Fig. 1153
australis Link II 243
Celsiana DC. II 243
Didieri Jord. II 245
Gesneriana II 243
maculata Roth II 244
maleolens Rchb. II 245
oculus solis Koch II 245
„ silvestris L. II 243
Tumboa Bainesii Hock. I 74; VII 151
Tunica Scop. III 315; VII 173
barbata Scop. III 321
Carthusianorum Scop. III 323
glumacea (Bory et Chaub.) Boiss. III 315
prolifera (L.) Scop. III 315
rigida Rchb. III 316
„ saxifraga (L.) Scop. III 316
Turbith Tausch V/2 1276
„ Matthioli Tausch V/2 1277
Turgenia Hoffm. V/2 1061; VII 193
„ latifolia Hoffm. V/2 1064
Turnera aphrodisiaca Lester F. Ward V/1 657
diffusa Willd. V/1 657
„ ulmifolia Willd. V/1 657
Turneraceae V/1 657; VII 190
Turritis L. IV/1 393; VII 178
alpina Braune IV/1 413
alpina (L.) Prantl IV/1 399
bellidifolia All. IV/1 414
caerulea All. IV/1 411
glabra L. IV/1 393
hirsuta L. IV/2 403
Loeselii R. Br. IV/1 174
maior Wallr. IV/1 398
minor Schleich. IV/1 406
patula Ehrh. IV/1 400
pauciflora Grimm IV/1 399
rupestris Hoppe IV/1 404
„ verna Lam. IV/1 415
Tussilago L. VI/2 675; VII 211
alba L. VI/2 693
alpina Jacq. VI/2 700
alpina L. non Scop. VI/2 698
Bohemica Hoppe VI/2 681
Farfara L. VI/2 675
Tussilago Farfara Tod. VI/2 677
hybrida L. VI/2 683
Japonica L. VI/2 796
nivea Vill. VI/2 686
paradoxa Retz. VI/2 686
Petasites L. VI/2 683
ramosa Hoppe VI/2 693
silvestris Scop. VI/2 697
spuria Retz. VI/2 691
suaveolens Desf. VI/2 680
„ tomentosa Ehrh. VI/2 691
Tylophora R. Br. V/3 2059
Typha L. I 111; VII 152
angustifolia L. I 114
Argoviensis Hausskn. I 115
Bavarica Graebn. I 115
glauca Godr. I 115
gracilis Jordan I 115
latifolia L. I 113; VII 134 Fig. 1173 B und C
minima Hoppe I 114
Shuttleworthii Koch et Sonder I 114
Typhaceae I 111; VII 152
Typhoides arundinacea Moench I 196

U.

Udora Canadensis Nutt. I 160
Lithuanica Bess. I 159
„ Pomeranica Rchb. I 159
Ugni Turcz. V/2 775
„ Molinae Turcz. V/2 775
Ulex IV/3 1190; VII 182
Armoricanus Mabille IV/3
compositus Moench IV/3 1190
Europaeus L. IV/3 1190
floridus Salisb. IV/3 1190
grandifolius Pourr. IV/3 1190
Hibernicus G. Don IV/3 1190
mitis hort. IV/3 1190
nanus Forster IV/3 1190
opistholepis Webb IV/3 1190
„ strictus Mackay IV/3 1190
Ullucus tuberosus Loz. III 267
Ulmaceae III 117; VII 168
Ulmaria Hill IV/2 970
Filipendula Kostel. IV/2 974
palustris Moench IV/2 971
pentapetala Gilib. IV/2 971
„ rubra Hill IV/2 971
Ulmoideae III 117
Ulmus L. III 117; VII 168
Americana L. III 118
campestris L. III 119
ciliata Ehrh. III 121
effusa Willd. III 121
elliptica C. Koch III 118
fulva Michx. III 118
glabra Mill. III 119
latifolia Moench III 120
montana With. III 120
pedunculata Fougeroux III 121

Ulmus pumila L. III 118
racemosa Borckh. III 121
racemosa Thomas III 118
scabra Mill. III 120
„ suberosa Ehrh. III 119
Ulota VII 145
Ulotrichaceae VII 138
Ulotrichales VII 138
Ulvaceae VII 138
Umbelliferae (Morison) B. Juss. V/2 926; VII 193 u. Fig. 988, 993, 994, 1160
Umbelliflorae V/2 910; VII 193
Umbellularia Californica Nutt. VII 176
Umbilicaria VII 144
Umbilicus pendulinus DC. IV/2 513
Uncinia Europaea Gay II 58
„ microglochin Spr. II 58
Unedo edulis Hoffm. et Link V/3 1665
Ungnadia speciosa Endl. V/1 308
Unifolium quadrifidum All. II 267
Uniola latifolia L. I 173, 372
Urachne parviflora Trin. I 207
„ virescens Trin. I 207
Uragoga Ipecacuanha Baill. VI/1 196
Urceola esculenta (Wall.) Benth. V/3 2049
Urechites suberecta Jacq. V/3 2050
Uredinales VII 142
Urena lobata L. V/1 454, 457
Ureneae V/1 457; VII 188
Urginea maritima Baker II 278
Urocystis V/3 1741; VII 142
Uromyces VII 142
„ pisi Pers. V/1 139
Urospermum picroides (L.) Desf. VI/2 1071
Ursinia Gaertn. VII 212
Urtica L. III 137; VII 169
Bollae (nicht Bolla) Kanitz III 141
cannabina L. III 137
dioeca L. III 139
Dodartii L. III 138
Kioviensis Rogowitsch III 141
maior Kanitz III 139
minor Moench III 141
oblongata Koch III 142
pilulifera L. III 137
radicans Bolla nec Sw. III 141
„ urens L. III 141
Urticaceae III 136; VII 169
Urticales III 144; VII 168
Usneaceae VII 144
Usteria secunda Med. II 249
Ustilaginaceae VII 142
Ustilaginales VII 142
Ustilago urceolorum Tulasne II 62
Utricularia L. VI/1 162; VII 205
Bremii Heer VI/1 167
brevicornis Čelak. VI/1 170
Utricularia Grafiana Koch VI/1 169
intermedia Godet VI/1 166
intermedia Hayne VI/1 169
minor L. VI/1 168
minor L. var. Bremii Legr. VI/1 167
mutata Leiner VI/1 166
neglecta Lehmann VI/1 166
ochroleuca Hartman VI/1 170
Pollichii F. W. Schultz VI/1 166
pulchella C. B. Lehmann VI/1 167
spectabilis Madauss VI/1 166
vulgaris L. VI/1 165
vulgaris L. var. neglecta Cosson et Germain VI/1 166
Uva ursi alpina Gray V/3 1661
buxifolia S. F. Gray V/3 1656
procumbens Moench V/3 1656
Uvularia amplexifolia L. II 268
„ grandiflora Sm. II 199
Uvaria L. VII 175

V.

Vaccaria Medikus III 317; VII 173
parviflora Moench III 317
pyramidata Medikus III 317
Vaccaria Huth III 317
„ vulgaris Host III 317
Vacciniaceae V/3 1609; VII 195
Vaccinium L. V/3 1667; VII 196
angulosum Dulac V/3 1674
ciliatum Gilib. V/3 1681
dumosum Andr. V/3 1621
Japonicum Miq. V/3 1686
intermedium Ruthe V/3 1685
macrocarpum Ait. V/3 1685
montanum Salisb. V/3 1674
Myrtillus L. V/3 1674
Oxycoccos L. V/3 1686
rubrum Dulac V/3 1669
rubrum Gilib. V/3 1681
uliginosum L. V/3 1681; VII 116 Fig. 1150
„ Vitis-Idaea L. V/3 1669
Vaccinoideae VII 196
Vahlodea atropurpurea I 171
Vaillantia L. VII 207
hispida L. VI/1 197
„ muralis L. VI/1 197
Valantia Cruciata L. VI/1 225
glabra L. VI/1 225
Pedemontana Bell. VI/1 226
„ saccharata Gaud. VI/1 227
Valeriana L. VI/1 267; VII 208
Phu L. VI/1 262
alliariaefolia Vahl VI/1 262
ambigua (Gren. et Godr.) Beck VI/1 277
angustifolia Cav. VI/1 278
Valeriana Celtica L. VI/1 268
dioeca L. VI/1 274
elongata L. VI/1 268
exaltata Mikan jun. VI/1 276
excelsa Poiret VI/1 276
Huteri Dalla Torre et Sarnth. VI/1 277
hybrida Kern. VI/1 277
montana L. VI/1 272; VII 207 Fig. 1258
officinalis L. VI/1 276
officinalis L. var. sambucifolia Neilr. VI/2 275
polygama auct. VI/1 274
procurrens Wallr. VI/1 275
repens Host VI/1 275
rubra L. VI/1 278
saliunca All. VI/1 271
sambucifolia Mikan VI/1 275
saxatilis L. VI/1 271
simplicifolia (Rchb.) Kabath VI/1 274
supina L. VI/1 270
tripteris L. VI/1 272
tuberosa L. VI/1 275
„ versifolia Brügger VI/1 277
Valerianaceae VI/1 261; VII 207
Valerianella L. VI/1 262; VII 208
Auricula DC. VI/1 265
carinata Loisel. VI/1 265
coronata (L.) DC. VI/1 263
dentata Pollich VI/1 264
dentata Witasek VI/1 265
discoidea (L.) Loisel. VI/1 263
echinata (L.) DC. VI/1 263
eriocarpa Desv. VI/1 263
incrassata Nyman VI/1 263
Locusta Betcke VI/1 266
Morisonii DC. VI/1 264
olitoria (L.) Moench VI/1 266
rimosa Bastard VI/1 265
„ vesicaria Moench VI/1 263
Vallisneria Michx. I 161; VII 153
alternifolia Roxb. I 161
„ spiralis L. I 161
Vallota purpurea Herb. II 319
Valoniaceae VII 138
Valoradia plumbaginoides Boiss. V/3 1879
Valsaceae VII 141
Vandellia L. VI/1 39; VII 204
„ Pyxidaria Maxim. VI/1 39
Vanilla planifolia Andrews II 324
Vargasia Caracasana DC. VI/1 523
Vateria Indica L. V/1 534
Vaucheriaceae VII 138
Vauquelinia corymbosa Corr. IV/2 663
Velarum officinale Rchb. IV/1 164
„ supinum Rchb. IV/1 163
Vella L. VII 177
Velleruca Pomel IV/1 199

Velloziaceae II 320; VII 163
Veltheimia Capensis DC. II 279
Venidium Less. VII 212
Ventenata Koeler I 251; VII 154
avenacea Koeler I 251
„ dubia F. Schultz I 251
Ventilago maderaspatana Gaertn. V/1 320
Vepris Commers. VII 184
Veratrum L. II ~~191~~ 241; VII 159
album L. II ~~193~~ 241
nigrum L. II 192; VII 160 Fig. 1187
Verbascum L. VI/1 7; VI/2 1360; VII 203 und Fig. 1041, 1147, 1244
adulterinum Koch VI/1 18
albiflorum Schrad. VI/1 12
Alopecurus Thuill. VI/1 12
angulosum Teyber VI/1 18
Austriacum Schrader VI/1 10
Badense Beck VI/1 18
Banaticum Schrad. VI/1 8
Bastardi R. S. VI/1 17
Beckeanum Beck VI/1 17
Blattaria L. VI/1 9
Braunianum Wirtg. VI/1 18
Breyninum Beck VI/1 17
Brockmuelleri Ruhm VI/1 18
Carinthiacum Fritsch VI/1 17
Chaixii Vill. VI/1 10
collinum Schrader VI/1 18
commutatum Kern. VI/1 17
crassifolium Lam. et DC. VI/1 14; VI/2 1360
cuspidatum Schrad. VI/1 15
Danubiale Simk. VI/1 17
denudatum Pfund VI/1 18
dimorphum Franch. VI/1 18
divaricatum Kit. VI/1 17
erubescens VI/1 8
Eurigale Franch. VI/1 18
Festii Hayek VI/1 17
flagriforme Pfund VI/1 17
floccosum Waldst. et Kit. VI/1 13
graciliflorum Del. VI/1 8
Grisebachianum Borb. VI/1 17
Hausmanni Čelak. VI/1 17
Hayekii Chenevard VI/1 17
heterophlomos Franch. VI/1 18
Humnickii Franch. VI/1 18
infidum Beck VI/1 18
insignitum Beck VI/1 17
intermedium Rupr. VI/1 17
Juratzkae Dichtl VI/1 17
Kerneri Fritsch VI/1 18
Killiasii Brügger VI/1 18
kysačense Kupčok VI/1 17
lanatum Schrader VI/1 12
Lychnitis L. VI/1 12
mixtum Ram. VI/1 18
Moenchii Schultz VI/1 13
Verbascum montanum Schrad. VI/1 14
Mosellianum Wirtg. VI/1 18
Muehlenbeckii Godr. VI/1 17
Murbeckii Hayek VI/1 17
Murbeckii Teyber VI/1 18
Neilreichii Reichardt VI/1 18
nigrum L. VI/1 11; VI/2 1360; VII 202, Fig. 1244
nothum Koch VI/1 18
Olympicum Boiss. VI/1 8
Orientale Bieb. VI/1 8
Orientale Neilreich VI/1 10
ovalifolium Donn. VI/1 8
pallidum Nees VI/1 16
Parisiense Thuill. VI/1 12
phlomoides L. VI/1 14
phoeniceum L. VI/1 8
pilosum Döll VI/1 17
praesigne Beck VI/1 18
Pseudoblattaria Schleich. VI/1 17
Pseudolychnitis Schur VI/1 17
pseudophlomoides Teyber VI/1 18
pulveratum Thuill. VI/1 18
pulverulentum Koch VI/1 18
pulverulentum Vill. VI/1 13
ramigerum Link VI/1 18
ramigerum Schrad. VI/1 18
Regelianum Wirtg. VI/1 18
Reisseckii Kern. VI/1 18
rubiginosum Waldst. et Kit. VI/1 17
rugulosum Willd. VI/1 14
Schiedeanum Koch VI/1 18
Schottianum R. S. VI/1 17
Schraderi Meyer VI/1 16
sinuatum L. VI/1 8
speciosum Schrader VI/1 13
spurium Koch VI/1 18
subnigrum Beck VI/1 17
Teyberianum Heimerl VI/1 17
thapsiforme Schrad. VI/1 15
thapsoides Willd. VI/1 18
Thapsus Koch VI/1 15
Thapsus L. VI/1 16; VI/2 1360
ustulatum Čelak. VI/1 17; VI/2 1360
versiflorum Schrader VI/1 17
virens Host VI/1 10
virgatum Spr. VI/1 8
„ Wirtgeni Franch. VI/1 18
Verbena L. V/3 2238; VII 201
Aubletia L. V/3 2239
Bonariensis L. V/3 2240
bracteosa Michx. V/3 2240
callicarpiaefolia Kth. V/3 2240
chamaedryfolia Juss. V/3 2239
erinoides Lam. V/3 2239
hybrida hort. V/3 2240
Lamberti Ker V/3 2240
litoralis Kunth V/3 2240
officinalis L. V/3 2240
Verbena phlogiflora Cham. V/3 2240
sulfurea Sweet V/3 2239
tenera Spr. V/3 2239
teucrioides Gill. et Hook. V/3 2240
urticifolia L. V/3 2240
„ venosa Gill. et Hook. V/3 2240
Verbenaceae V/3 2232; VII 201
Verbesina encelioides Benth. et Hook. VI/1 529
Vernonia anthelmintica (L.) Willd. VI/1 407
Baldwinii Torr. VI/1 408
cinerea Less. VI/1 408
gigantea Britton VI/1 408
Noveboracensis Willd. VI/1 407
Vernonieae VI/1 407; VII 209
Veronica L. VI/1 40; VII 23 Fig. 1041 und 204
acinifolia L. VI/1 50
agrestis L. VI/1 54; VI/2 1361
agrestis Oeder VI/1 53
alpina L. VI/1 48; VI/2 1361
amphibola Hausskn. VI/1 64
anagalliformis Boreau VI/1 62
Anagallis L. VI/1 62
Anagallis L. var. spathulata W. Sonder VI/1 63
anagalloides Guss. VI/1 61; VI/2 1362
aphylla L. VI/1 59
aquatica Bernh. VI/1 63
arvensis L. VI/1 51; VI/2 1361
Austriaca L. VI/1 57
Austriaca L. subsp. dentata (Schmidt) Watzl VI/1 57
Austriaca L. subsp. Jacquini (Baumg.) Maly VI/1 57
Barellierii Schott VI/1 46
Beccabunga L. VI/1 63
bellidioides L. VI/1 47
Bonarota (L.) Wettst. VI/1 43; VI/2 1361
Buxbaumii Ten. VI/1 53
buxifolia Benth. VI/1 40
campestris Schmalh. VI/1 49
canescens Bastard VI/2 1362
Chamaedrys L. VI/1 59; VI/2 1362
Churchillii Huter VI/1 64
cinerea Boiss. VI/1 40
cupressoides Hook. f. VI/1 40
Cymbalaria Bodard VI/1 55
cymbalariaefolia Vahl VI/1 55
depauperata Waldst. et Kit. VI/1 59
didyma Tenore VI/1 53
Dieffenbachii Benth. VI/1 40
Dillenii Crantz VI/1 49; VI/2 1361
filiformis DC. VI/1 53
filiformis Sm. VI/2 1361
frutescens Scop. VI/1 46

Veronica fruticans Jacq. VI/1 46; VI/2 1361
fruticulosa L. VI/1 46; VI/2 1361
gentianoides Vahl VI/1 40
glabra Schrad. VI/1 44
Gouani Morett. VI/1 40
Handelii Watzl VI/1 64
hederaefolia L. VI/1 56; VI/2 1361
hederaefolia L. subsp. hederaefolia (L.) Hayek VI/1 56
hederaefolia L. subsp. triloba (Opiz) Hayek VI/1 56
hospita M. et K. VI/1 53
hybrida L. VI/1 46
Jaccardi Gams VI/2 1362
Janchenii Watzl VI/1 64
latifolia Jacq. VI/1 58
latifolia L. VI/1 60; VII 202 Fig. 1247
longifolia L. VI/1 44; VI/2 1361
lutea (Scop.) Wettst. VI/1 42
macrosperma Schuster VI/1 64
maior Wettst. VI/1 64
Mannheimiensis Fr. Zimmermann VI/1 64
maritima L. VI/1 44
montana L. VI/1 60
Muelleriana Vest VI/1 59
multifida Scop. VI/ 57
nitens Host VI/1 46
officinalis L. VI/1 58
opaca Fr. VI/1 55
orchidea Crantz VI/1 46
Pacheri Prohaska VI/1 64
Parmularia Poit. et Turp. VI/1 61
peduncularis Steven VI/1 40
peregrina L. VI/1 51; VI/2 1361
Persica Poir. VI/1 53
polita Fries VI/1 53; VI/2 1361
Ponae Gouan VI/1 40
praecox All. VI/1 51
Prechtelsbaueri Schuster VI/1 64
prostrata L. VI/1 56; VI/2 1361
Romana L. VI/1 51
rotundifolia Schrank VI/1 48
salicifolia Forst. VI/1 40
saxatilis Scop. VI/1 46
scutellata L. VI/1 61
serpyllifolia L. VI/1 48; VI/2 1361
Sibirica L. VI/1 40
speciosa R. Cunn. VI/1 40
spicata L. VI/1 45
spuria L. VI/1 44
Sternbergiana Bernh. VI/1 46
succulenta All. VI/1 49
Teucrium L. VI/1 58; VI/2 1361
Veronica Traversii Hook. f. VI/1 40
Tridentina J. Murr VI/2 1362
Tournefortii Gmel. VI/1 53
triphyllos L. VI/1 52
urticaefolia Jacq. VI/1 60; VII 202 Fig. 1247
verna L. VI/1 49; VI/2 1361; VII 123 Fig. 1162
verna L. var. longistyla Cesati, Passerini et Gibelli VI/1 49
Virginiana L. VI/1 40
Vollmanni Schuster VI/1 64
Wiesbauriana Schuster VI/1 64
„ Wildtii Schuster VI/1 64
Verrucariaceae VII 143
Verticillatae VII 165
Vesicaria grandiflora Hook. IV/1 460
sinuata Poir. IV/1 460
utriculata Lam. et DC. IV/1 460
Viborgia hirsuta Moench IV/3 1177
purpurea Moench IV/3 1180
„ supina Moench IV/3 1175
Viburnum L. VI/1 241; VII 207
alnifolium Marsh. VI/1 241
Carlesii Hemsley VI/1 241
Lantana L. VI/1 242; VII 206 Fig. 1256
lantanoides Michx. VI/1 241
laurifolium Lam. VI/1 241
Lentago L. VI/1 241
lobatum Lam. VI/1 243
Opulus L. VI/1 243; VII 54 Fig. 1087 u. 206 Fig. 1256
prunifolium L. VI/1 242
rhytidifolium Hemsley VI/1 241
Tinus L. VI/1 241
tomentosum Thunb. VI/1 241
„ utile Hemsley VI/1 241
Vicia L. IV/3 1506; VII 183
albicans Lowe IV/3 1509
angulata Bont. IV/3 1508
angustifolia L. IV/3 1546, 1547
argentea Lapeyr. IV/3 1508
articulata Hornem. IV/3 1512
atropurpurea Desf. IV/3 1509
Benghalensis L. IV/3 1509
Bithynica L. IV/3 1509
Broteriana Ser. IV/3 1509
calcarata Desf. IV/3 1508
Candolleana Ten. IV/3 1531
Cassubica L. IV/3 1523
chlorantha Heuff. IV/3 1509
communis Rouy IV/3 1546
cordata auct. IV/3 1550
cordata Wulfen IV/3 1546
cordifolia Sprengel IV/3 1548
Cracca L. IV/3 1529
cuneata Gren. et Godr. IV/3 1548
dasycarpa Tenore IV/3 1537
desertorum Link IV/3 1521
disperma DC. IV/3 1508
Vicia dumetorum L. IV/3 1521
elegantissima Alef. IV/3 1538
Ervilia (L.) Willd. IV/3 1512
Faba L. IV/3 1556
Fagoni Lapeyr. IV/3 1509
Forsteri Jordan IV/3 1548
frutescens Gilib. IV/3 1523
galegifolia Andr. IV/3 1456
Galloprovincialis Poiret IV/3 1531
gemella Crantz IV/3 1517
Gerardi All. IV/3 1531
Gerardi Jacq. IV/3 1523
glabrescens Heimerl IV/3 1538
gracilis Loisel. IV/3 1518
grandiflora Scop. IV/3 1543
Guyoti Beauv. IV/3 1562
heterophylla Presl IV/3 1548
heterophylla Rchb. IV/3 1555
hirsuta (L.) S. F Gray IV/3 1515
hybrida L. IV/3 1509
imbricata Gilib. IV/3 1531
incana Gouan IV/3 1531
incana Lam. IV/3 1509
intermedia Viv. IV/3 1548
Kitaibeliana (Koch) IV/3 1544
lanata Vis. IV/3 1509
lathyroides L. IV/3 1541
latifolia Moench IV/3 1555
Leganyana Rapaics et Lengyel IV/3 1562
Lens Coss. et Germ. IV/3 1502
Lenticula Ces. IV/3 1502
lentoides Coss. et Germ. IV/3 1503
Linnaei Rouy IV/3 1509
lutea L. IV/3 1545
macrocarpa Bertol. IV/3 1550
Marchandi Gillot et Rouy IV/3 1562
Marschallii Arcang. IV/3 1503
melanocarpa Hussenot IV/3 1548
melanops Sibth. et Sm. IV/3 1509
militans Crantz IV/3 1523
minima (Riv.) Lam. IV/3 1541
monantha Retz. IV/3 1508
monanthos Desf. IV/3 1514
Morisiana Jord. IV/3 1550
multicaulis Wallr. IV/3 1547
multifida Wallr. IV/3 1514
multiflora Poll. IV/3 1523
Narbonensis L. IV/3 1553
Nissoliana Thuill. IV/3 1553
Noëana Reuter IV/3 1509
notata Gilib. IV/3 1549
ochroleuca Gilib. IV/3 1519
onobrychioides L. IV/3 1528
oroboides Wulfen IV/3 1540
Orobus DC. IV/3 1525; VII 183

Vicia oxyphylla Schur IV/3 1539
Pannonica Crantz IV/3 1552
parviflora Lapeyr. IV/3 1515
parviflora Loisel. IV/3 1508
peregrina L. IV/3 1551
pisiformis Besser IV/3 1585
pisiformis L. IV/3 1519
Plenigeri Form. IV/3 1537
plumosa Martr.-Don. IV/3 1535
polyphylla auct. IV/3 1533
polyphylla Koch IV/3 1537
polyphylla Waldst. et Kit. IV/3 1535
praecox Jacq. IV/3 1541
Pseudocracca Alef. IV/3 1538
pseudovillosa Schur IV/3 1538
purpurascens DC. IV/3 1553
Pyrenaica Pourr. IV/3 1509
rigida Herbich IV/3 1531
rotundifolia Gilib. IV/3 1538
sativa L. IV/3 1546
sativa L. subsp. obovata (Ser.) Gaudin IV/3 1549
Scepusiensis Kit. IV/3 1547
Scheuchzeri Brügger IV/3 1531
segetalis Thuill. IV/3 1548
sepium L. IV/3 1538
serratifolia Jacq. IV/3 1555
silvatica L. IV/3 1526
sordida Waldst. et Kit. IV/3 1544
stenophylla Schur IV/3 1547
stipulacea Pursh IV/3 1514
striata Bieb. IV/3 1553
Syriaca Retz. IV/3 1508
tenuifolia Roth IV/3 1533
tenuissima Schinz et Thellung IV/3 1518
tetragona hort. Paris. IV/3 1521
tetrasperma (L.) Moench IV/3 1517
trichocalyx Moris IV/3 1509
tricolor Seb. et Mauri IV/3 1509
triflora Rchb. IV/3 1509
trunculata Fisch. IV/3 1509
uncinata Rchb. IV/3 1553
unijuga Br. IV/3 1508
varia Host IV/3 1534/35
variegata Gilib. IV/3 1521
villosa Hegetschw. IV/3 1531
villosa Roth IV/3 1534
Zabelii Aschers. et Graebner IV/3 1562
Vicieae IV/3 1497; VII 183
Vicilla Cassubica Schur IV/3 1523
Orobus Schur IV/3 1525
„ silvatica Schur IV/3 1526
Vicioides hirsuta Moench IV/3 1553
sepium Moench IV/3 1538
„ silvatica Moench IV/3 1526
Victoria Amazonica Planchon III 438
cruciana d'Orbigny III 438
Victoria regia Lindley II 438; I/CI Fig. 156
Vigna Catjang Walp. IV/3 1623
Nilotica (Del.) Hooker f. IV/3 1623
Sinensis (L.) Endlicher IV/3 1623
Vignantha rigida Schur II 82
Vignea acuta Rchb. II 80
arenaria Rchb. II 62
bicolor Rchb. II 83
brizoides Rchb. II 64
caespitosa Rchb. II 79
canescens Rchb. II 75
capitata Rchb. II 55
chordorrhiza Rchb. II 60
curvula Schur II 70
Davalliana Rchb. II 54
dioica Rchb. II 53
divisa Rchb. II 61
Drejeri Fuss II 79
foetida Rchb. II 66
Gebhardi Rchb. II 75
Guestphalica Rchb. II 68
Heleonastes Rchb. II 73
intermedia Rchb. II 62
lagopina Rchb. II 74
leporina Rchb. II 71
loliacea Rchb. II 76
mucronata Rchb. II 102
paniculata Rchb. II 69
paradoxa Rchb. II 69
remota Rchb. II 77
saxatilis Rchb. II 82
Schreberi Rchb. II 64
stellulata Rchb. II 72
stenophylla Rchb. II 61
stricta Rchb. II 78
teretiuscula Rchb. II 70
„ vulpina Rchb. II 65
Vilfa vulgaris P. B. I 225
Villaresia Congonha Miers V/1 235
mucronata Ruiz et Pav. V/1 235
Villarsia Vent. V/3 1953; VII 198
„ nymphoides Vent. V/3 1961
Viminaria denudata Sm. IV/3 1147
Vinca L. V/3 2051; VII 198
acutiflora Bert. V/3 2051
difformis Pourr. V/3 2051
herbacea Waldst. et Kit. V/3 2052
maior L. V/3 2052
media Hoffg. et Link V/3 2051
„ minor L. V/3 2053
Vincetoxicum Moench V/3 2067; VII 199
laxum Godr. et Gren. V/3 2070
„ officinale Moench V/3 2068
Viola L. V/1 586; VII 190
abortiva Pospichal V/1 654
acaulis hort. V/1 593
adulterina Borb. V/1 654
alba Besser V/1 645
Viola Allionii Pio V/1 636
alpestris Jordan V/1 603/604
alpina Jacquin V/1 613
Altaica Ker-Gawler V/1 593
ambigua Waldst. et Kit. V/1 642
amoena Sym. V/1 607
apetala Schmidt V/1 635
Aquisgranensis Borbás V/1 615
arborescens Hill V/1 594
arenaria DC. V/1 636
arvensis Murray V/1 600
atrichocarpa V/1 655
Austriaca Kerner V/1 649
Babiogorensis Zapal. V/1 654
Badensis Wiesbaur V/1 654
Baltica W. Becker V/1 653
Basilensis W. Becker V/1 655
Battandieri W. Becker V/1 594
Beraudii Gremli V/1 649
Bernoulliana W. Becker V/1 656
Bessarabica Zapal. V/1 654
Bethkeana Borbas V/1 654
Bethkeana Krause V/1 654
Biederitzensis W. Becker V/1 653
biflora L. V/1 617
Billotii F. Schultz V/1 623
Bogenhardiana Gremli V/1 654
Borussica (Borb.) W. Becker V/1 653
Braunii Borb. V/1 653
Burnati Gremli V/1 654
calaminaria Lejeune V/1 607
calaminaria et zinci Lejeune V/1 607
calcarata L. V/1 609
calcarata L. var. Zoysii Ging. V/1 611
campestris Bieb. V/1 643
Canadensis L. V/1 594
canescens Jord. V/1 600
canina L. V/1 619
canina L. subsp. Schultzii (Billot) Kirschl. V/1 621
caninaeformis C. Richter V/1 635
Carinthiaca Borb. V/1 654
Carnuntia Gayer V/1 654
Carpatica Borbás V/1 616
Cenisia Brügger V/1 611
Cenisia L. V/1 612
cheiranthodora Huter V/1 643
Chenevardii W. Becker V/1 654
Christii Wolf V/1 616
chrysantha Hooker V/1 594
Cluniensis Murr et Pöll V/1 655
cochleata Coincy V/1 649
collina Besser V/1 640
collinaeformis Murr V/1 654
commutata Wiesb. V/1 653

Viola cornuta Desf. V/1 594
cornuta L. V/1 614
cucullata Aiton V/1 594
cyanea Čelak. V/1 648
declinata Gaudin V/1 608
digenea Rouy et Fouc. V/1 656
digitata Pursh V/1 594
Dioszegiana Borb. V/1 655
Domburgensis W. Becker V/1 655
dubia Wiesb. V/1 654
Dubyana Burnat V/1 608
Duffortii Fouillade V/1 656
elatior Fries V/1 623
elegans Spach V/1 607
epipsila Ledebour V/1 629
ericetorum Schrader V/1 620
flavida Schur V/1 604
foliosa Čelak. V/1 654
fragrans Wiesb. V/1 655
fraterna Hegetschw. V/1 638, 640, 643
Ganderi Hausm. V/1 643
Genevensis Chenevard V/1 653
Gerstlaueri L. Gross V/1 654
glabrata Salis-Marschlins V/1 644
Gloggnitzensis C. Richter V/1 639
Gotlandica W. Becker V/1 653
gracilescens DC. V/1 600
gracilis Battandier et Trabut V/1 594
gracilis Comolli V/1 608
grandiflora auct. V/1 604
grandiflora Haenke V/1 607
grandiflora Host V/1 613
grandiflora L. V/1 605, 607
Gremblichii Murr V/1 655
Hallieri Borb. V/1 655
Haynaldi Wiesbaur V/1 655
Hellwegeri Murr V/1 655
heterocarpa Borb. V/1 654
heterophylla Pöll V/1 655
hirta L. V/1 638
hirta L. subsp. brevifimbriata W Becker V/1 638
hirta L. subsp. longifimbriata W. Becker V/1 640
hirtaeformis Wiesbaur V/1 654
hispida Lam. V/1 605
Hornemanniana Roem. et Schult. V/1 623
hortensis auct. V/1 616
Hungarica Degen et Sabr. V/1 655
hybrida Val de Lièvre V/1 654
hybrida Wulfen V/1 626
Jaccardi W. Becker V/1 616
Jagellonica Zapal. V/1 649
insidiosa Rouy et Fouc. V/1 656
insignis C. Richter V/1 648
interjecta Borbás V/1 654
Viola intermedia Rchb. V/1 654
intersita Beck V/1 654
Iselensis W. Becker V/1 654
Julia Brügger V/1 611
Kalksburgensis Wiesbaur V/1 655
Kelleri W. Becker V/1 655
Kerneri Wiesbaur V/1 654
Kisis Krause V/1 653
Kitaibeliana Römer et Schultes V/1 600
Klingeana Kupffer V/1 653
Kuetzingii W. Becker V/1 621
Kupcokiana W. Becker V/1 655
Kupfferiana W. Becker V/1 653
lactea Fries V/1 625
lactea Rchb. V/1 622
lactea Sm. V/1 621
Lehbertiana Kupffer V/1 653
leptostolona Pöll V/1 655
longicornis Borb. V/1 653
Luganensis W. Becker V/1 655
Lusitanica Brot. V/1 621
lutea Hudson V/1 605
lutea Tratt. V/1 604
Macedonica Boiss. et Heldr. V/1 604
Maderensis Löwe V/1 648
Mantziana W. Becker V/1 615
Medelii W. Becker V/1 654
Megapolitana Krause V/1 653
Merkensteinensis Wiesb. V/1 655
Mielnicensis Zapal. V/1 653
minima Presl V/1 600
mirabiliformis Murr et Pöll V/1 655
mirabilis L. V/1 631
mixta Kerner V/1 654
Moedlingensis Wiesb. V/1 655
montana L. V/1 621, 623
Montfortensis Murr et Pöll V/1 655
multicaulis Jord. V/1 655
multifida Miller V/1 594
Munbyana hort. V/1 594
Murbeckii Dörfler V/1 654
Muretii F. O. Wolf V/1 655
Murrii Pöll V/1 655
Najadum Wein V/1 654
neglecta Schmidt V/1 654
Neilreichiana Borb. V/1 655
Nemausensis Jord. V/1 600
nemoralis Kütz. V/1 621
Neoburgensis Erdner V/1 655
nitens Host V/1 626
non scripta Fr. Zimmermann V/1 640
nummulariaefolia Suter et Schleicher V/1 636
obliqua Hill V/1 594
odorata L. V/1 649
Oenensis Borb. V/1 621
Oenipontana Murr V/1 655
Viola Olimpia Beggiato V/1 656
oreades Bieb. V/1 593
orophila Wiesb. V/1 654
Pacheri Wiesbaur V/1 654
pachyrhizoma F. O. Wolf V/1 594
palustris L. V/1 628
paradoxa Rouy et Fouc. V/1 654
pedata L. V/1 594
permixta Jordan V/1 655
perplexa Gremli V/1 654
persicifolia Roth V/1 622
persicifolia Schkuhr V/1 623
pinnata L. V/1 630
pluricaulis Borb. V/1 655
Poelliana Murr V/1 655
polychroma Kerner V/1 604
pratensis Mertens et Koch V/1 625
Prutensis Zapal. V/1 616
pseudomirabilis Coste V/1 654
pseudosaepincola W. Becker V/1 655
pumila Chaix V/1 625
Pyrenaica Ramond V/1 644
radians Beck V/1 654
Raetica Borb. V/1 655
recta Garcke V/1 622
Reichenbachiana Jordan V/1 634
Reverchoni Willk. V/1 649
Riddensis F. O. Wolf V/1 655
Riffelensis W. Becker V/1 616
Ritschliana W. Becker V/1 653
Riviniana Rchb. V/1 635
Rolandi-Bonaparte F. O. Wolf V/1 616
Ronnigeri W. Becker V/1 655
Rothomagensis Hausm. V/1 604, 606
rotundifolia Michx. V/1 594
Rouyana F. O. Wolf V/1 616
rupestris Schmidt V/1 636
Ruppii All. V/1 621
Ruppii Ledeb. V/1 621
Russica hort. V/1 648
Salvatoriana Becker et Thellung V/1 655
Sanensis Zapal. V/1 653
Sardagnae W. Becker VI/1 655
scaturiginosa Wallr. V/1 626
Scharlockii W. Becker V/1 654
Schmalhauseni Rouy et Fouc. V/1 654
Schmidtiana Römer et Schult. V/1 636
Schoenachii Murr et Pöll V/1 654
sciaphila auct. Siles. V/1 642
sciaphila Koch V/1 644
scotophila Rapin V/1 645
Sedunensis F. O. Wolf V/1 655
segetalis Jord. V/1 600

Viola Semseyana Borb. V/1 653
sepincola Beck V/1 655
sepincola Jordan V/1 647, 649
sepincola Jordan subsp. Adriatica (Freyn) W. Becker V/1 648
sepincola Jordan subsp. Pontica W. Becker V/1 648
sepincola Kerner V/1 649
Silesiaca Borb. V/1 653
silvatica Fries V/1 634
silvestris Lam. V/1 634
Skofitziana Wiesb. V/1 653
speciosa Schrad. V/1 593
spectabilis Richter V/1 655
spuria Čelak. V/1 654
stagnina Kit. V/1 622
Steveni Faucounet V/1 649
stipularis Peterm. V/1 653
stricta Dickson V/1 617
stricta Godron V/1 621
stricta Hornem. V/1 622
suaviflora Borb. V/1 655
suavis W. Becker V/1 647
subglabrata Pöll V/1 655
Sudetica Willd V/1 607
Szilyana Borb. V/1 655
Tatrae Borbás V/1 615
Tessinensis W. Becker V/1 655
Thomasiana Perrier et Songeon V/1 643
Tiroliensis Borb. V/1 655
Torslundensis W. Becker V/1 653
Tourbillonensis W. Becker V/1 655
transiens Pöll V/1 655
tricolor L. V/1 597
tricolor L. subsp. lutea Hooker V/1 605
tricolor L. subsp. subalpina Gaud. V/1 603
tricolor L. subsp. Zermattensis W. Becker V/1 604
Tridentina W. Becker V/1 640
tristicha Wiesb. V/1 654
Uechtritziana Borb. V/1 654
uliginosa Besser V/1 626
umbrosa Hoppe V/1 638
umbrosa Sauter V/1 644
Vadutzensis Murr et Pöll V/1 655
Valderia All. V/1 613
Vallesiaca Borb. V/1 655
variifrons Pöll V/1 655
Villaquensis Benz V/1 653
Villarsiana Römer et Schultes V/1 611
Vilnaensis W. Becker V/1 654
Vindobonensis Wiesb. V/1 655
virescens Jordan V/1 645
Voralbergensis W. Becker V/1 655
Weinharti W. Becker V/1 654
Viola Wiesbaurii Sabransky V/1 655
Wilczekiana Beauverd V/1 656
Williamsii Wittrock V/1 616
Wittrockiana Gams V/1 616
Wolfiana W. Becker V/1 649
Zoisii Wulfen V/1 611
„ Zoysii Schleicher V/1 611
Violaceae V/1 585; VII 190
Virgilia lutea Michx. IV/3 1145
Viscaceae III 145; VII 170
Viscago baccifera Vest III 307
chlorantha Moench III 289
multiflora Hornem. III 291
polygama Stokes III 290
Tatarica Hornem. III 290
„ unilateralis Moench III 290
Viscaria Roehling III 275; VII 193
alpina (L.) Don III 275
grandiflora Fisch. III 275
Suecica Sweet III 275
Viscaria Voss III 276
viscosa Aschers. III 276
„ vulgaris Roehling III 276
Viscum L. III 146; VII 170
album L. III 146
„ cruciatum Sieb. III 146
Visnaga Miller V/2 1170
„ vulgaris Bubani V/2 1171
Visnea Mocanera L. V/1 498
Vitaceae V/1 350; VII 187
Vitaliana primulaeflora Bertol. V/3 1788
„ primuloides Car. V/3 1788
Vitellaria Gaertn. VII 197
(Lucuma) mammosa (L.) Radlk. V/3 1896
Vitex Agnus Castus L. V/3 2237
altissima L. f. V/3 2237
divaricata L. V/3 2237
lignum-Vitae A. Cunn. V/3 2237
litoralis A. Cunn. V/3 2237
Negundo L. V/3 2237
„ pubescens Vahl V/3 2237
Vitis L. V/1 359; VII 187
aestivalis Michx. V/1 361
Amurensis Rupr. V/1 362
Antarctica Benth. V/1 362
arborea L. V/1 356
Arizonica Engelmann V/1 362
brevipedunculata Dippel V/1 355
Californica Benth. V/1 361
candicans Engelmann V/1 361
Caribaea DC. V/1 362
cinerea Engelmann V/1 361
citrulloides hort. V/1 355
Coignetiae Pulliat V/1 361
cordata C. Koch V/1 355
cordifolia Michx. V/1 362
Labrusca L. V/1 361
lanata Roxb. V/1 362
Lincecumii Buckley V/1 362
Vitis monticola Buckley V/1 362
odoratissima Donn. V/1 361
pterophora Baker V/1 354
riparia Michx. V/1 361
rotundifolia Michx. V/1 360
rubra Michx. V/1 362
rupestris Scheele V/1 361
Solonis Pulliat V/1 362
Taurina Bartram V/1 360
Thunbergii Sieb. et Zucc. V/1 361
Veitchi hort. V/1 357
vinifera L. V/1 363
vinifera L. subsp. sativa (DC.) V/1 365
vinifera L. subsp. silvestris (Gmel.) V/1 364
Voineriana Baltet V/1 354
„ vulpina L. V/1 361
Vitis Idaea punctata Moench V/3 1669
Idaea punctifolia Gray V/3 1669
Vittadinia Australis A. Rich. VI/1 449
scabra DC. VI/2 1365
triloba hort. VI/1 436
Viviania Cav. VII 184
Voandzeia Poissoni A. Clerc IV/3 1625
subterranea (L.) Thouars IV/3 1624
Vochysiaceae V/1 86; VII 185
Vogelia Medikus IV/1 371; VII 178
paniculata (L.) Hornemann IV/1 371
Voglera spinosa Fl. Wett. IV/3 1210
Volutella Forsk. VII 176
Volvocaceae VII 137
Volvocales VII 137
Vossianthus VII 188
Voyria Aubl. V/3 1954
Vroedea maritima Bub. V/3 1865
Vulneraria heterophylla Moench IV/3 1355
montana Scop. IV/3 1353
„ tetraphylla Guss. IV/3 1353
Vulpia Gmel. I 325; VII 155
bromoides Dum. I 326
ciliata (Danthoine) Link I 325
Danthonii Volkart I 325
Dertonensis (All.) Volkart I 326
incrassata (Lam.) Parl. I 327
Ligustica (All.) L. I 327
myurus (L.) Gmel. I 326
pseudomyurus Rchb. I 326
sciuroides Gmel. I 326

W.

Wahlenbergia Schrad. VI/1 388; VII 208
Capensis A. DC. VI/1 329, 388
hederacea (L.) Rchb. VI/1 388

Wahlenbergia Kitaibelii DC. VI/1 389
lobelioides A. DC. VI/1 329, 388
Waitzia corymbosa Wendl. VI/1 495
Walafrida paniculata Rolfe VI/2 1360
Waldsteinia Willd. IV/2 927; VII 181
geoides Willd. IV/2 928
ternata (Stephan) Fritsch IV/2 928
trifolia Rochel IV/2 928
„ triloba Hornung IV/2 928
Waldtschmidtia nymphoides Wiggers V/3 1961
Wallaceaceae VII 189
Wallrothia Spr. V/2 1189
„ montana Beck V/2 1190
Waltheria L. VII 188
Washingtonia Winslow I 82; VII 151
Watsonia aletroides Ker-Gawler II 306
Weberaceae VII 146
Weigelia rosea Lindl. VI/1 235; VII 207
Weingaertneria Bernh. I 242; VII 154
„ canescens Bernh. I 242
Wellingtonia Lindl. I 82; VII 151
Wellstedioideae VII 201
Welwitschia mirabilis Hook. I 74; VII 151
Wendia Hoffm. V/2 1416
Wendtia Ledeb. V/2 1416
„ Austriaca Schur V/2 1454
Werneria Humb., Bonpl. et Kth. VI/2 798
Westringia cephalantha F. v. Mueller V/4 2522
Dampieri R. Br. V/4 2522
„ rosmariniformis Sm. V/4 2522
Whitlavia gloxinoides hort. V/3 2121
„ grandiflora Harvey V/3 2121
Whitleya Sm. V/4 2569
Wibelia apargioides Roehl. VI/2 1077
chondrilloides Hoppe et Hornsch. VI/2 1161
„ foetida G. M. Sch. VI/2 1173
Wiborgia Roth VI/1 523; VII 211
Acmella Roth VI/1 524
parviflora Humb., Bonpl. et Kth. VI/1 524
Widdringtonia Endl. I 79; VII 171
Wiedemannia Orientalis Fischer et Meyer V/4 2440
Wierzbickia laricifolia Rchb. III 396
liniflora Fourr. III 396
„ striata Rchb. III 395
Wiesneria I 150
Wigandia Californica Hook. et Arn. V/3 2119
Caracasana Humb., Bonpl. et Kth. V/3 2122
Wiggersia lathyroides Gaertn., Mey., Scherb. IV/3 1541
Wiggersia lutea Gaertn., Mey., Scherb. IV/3 1545
minima Alef. IV/3 1541
sepium L. IV/3 1538
„ silvaticum Gaertn. IV/3 1526
Wikstroemia Endl. V/2 701; VII 191
Wilckia maritima Scop. IV/1 464
Wilia Juss. V/2 1032
Willemetia Necker VI/2 1076; VII 212
apargioides Cass. VI/2 1077
hieracioides Monn. VI/2 1077
stipitata (Jacq.) Cass. VI/2 1077
Willoughbya coriacea Wall. V/3 2049
Winterana Canella L. V/1 585
Winteranaceae V/1 585; VII 190
Wintereae VII 175
Wissadula Med. V/1 454
Wistaria Nutt. IV/3 1386; VII 182
frutescens (L.) DC. IV/3 1387
macrostachys Nutt. IV/3 1387
multijuga Van Houtte IV/3 1387
polystachya C. Koch IV/3 1386
Sinensis (Sims) DC. IV/3 1386
„ speciosa Nutt. IV/3 1387
Withania Panq. VII 203
Witsenia Thunb. VII 163
Wolffia Horkel II 142; VII 158
arrhiza Wimm. II 142; VII 158
„ Michelii Schleiden II 142
Woodfordia Salisb. V/2 744
Woodsia L. I 12; VII 148
glabella R. Br. I 14; VII 148
hyperborea R. Br. I 13
„ Ilvensis Bab. I 13
Woodwardia Sm. VII 149
Wormskieldia Thonn. et Schum. V/1 657
Woroniniaceae VII 139
Wuerthia Regel VII 163
Wulfenia Jacq. VI/1 64; VII 204
Amherstiana Benth. VI/1 64
Baldaccii Degen VI/1 64
Carinthiaca Jacq. VI/1 65
„ Orientalis Boiss. VI/1 64
Wydleria DC. V/2 1154
Wydleria Fischer et Trautv. V/2 1140
„ Portoricensis DC. V/2 1155
Wylia Hoffm. V/2 1032, 1036
australis Hoffm. V/2 1035
grandiflora Hoffm. V/2 1035
Hispanica Bubani V/2 1039
Iberica Hoffm. V/2 1036
Pecten-Veneris Bubani V/2 1037
radians Hoffm. V/2 1035

X.

Xanthium L. VI/1 498; VII 211
Americanum Walter VI/1 500
Xanthium Canadense A. Gray VI 1 500
Canadense Mill. VI/1 499
Chinense Miller VI/1 500
echinatum Mill. VI/1 499
echinatum Murray VI/1 500
Italicum Moretti VI/1 500
macrocarpum DC. VI/1 499
Occidentale Bert. VI/1 500
Orientale Cav. VI/1 500
Orientale L. VI/1 499
Pennsylvanicum Wallr. VI 1 500
riparium Lasch VI/1 500
spinosum L. VI/1 502
„ strumarium L. VI/1 499
Xanthoceras sorbifolium Bunge V/ 308
Xantholinum flavum Rchb. V/1 8
Xanthophthalmum segetum Schultz-Bip. VI/2 601
Xanthophyllum Roxb. V/1 87; VII 185
Xanthorrhiza Marsh. VII 174
„ apiifolia L'Hérit. III 453
Xanthorrhoea Sm. II 278
Xanthoselinum Schur V/2 1364, 1366
„ Alsaticum Schur V/2 1379
Xanthoxylum acanthopodium DC. V/1 47
alatum Roxb. V/1 47
Americanum Miller V/1 47
Bungei Planch. V/1 47
fraxineum Willd. V/1 47
planispinum Sieb. et Zucc. V/1 47
Xeranthemum L. VI/2 812; VII 212
annuum L. VI/2 814
annuum L. var. inapertum L. VI/2 815
annuum Scop. VI/2 813
cylindraceum Sibth. et Sm. VI/2 813; VII 212
erectum Presl VI/2 815
foetidum Moench VII 212
inapertum (L.) Willd. VI/2 815
inodorum Moench VI/2 814
radiatum Lam. VI/2 814
„ sesamoides Gay VI/2 813
Xeromalon Rafin. IV/2 755
Xerotium minimum Bluff et Fingerh. VI/1 454
montanum Bluff et Fingerh. VI/1 454
Ximenesia encelioides Cav. VI/1 529
Xiphium gramineum Schrank II 295
Pseudacorus Schrank II 293
Sibiricum Schrank II 296
„ spurium Parl. II 293
Xylariaceae VII 141
Xylocarpus obovatus A. Juss. V/1 85
Xylophylla V/1 117

Xylophylla latifolia hort. V/1 125
Xylopia Aethiopica A. Rich. IV/1 14
„ aromatica (A. DC.) IV/1 14
Xylosteum alpigenum Fisch. VI/1 253
„ caeruleum Dum. VI/1 254
„ dumetorum Dum. VI/1 252
„ nigrum Moench VI/1 253
„ pubescens Juss. VI/1 252
„ vulgare Borckhausen VI/1 252
Xyridaceae II 142; VII 158
Xyridion Sibiricum Klatt II 296
„ spurium Klatt II 294

Y.

Yucca L. II 279; VII 162
„ filamentosa L. II 279; VII 162 Fig. 1192

Z.

Zacyntha verrucosa Gaertn. VI/2 1008
Zamia L. I 73; VII 150
Zamioculcas L. VII 157
Zannichellia Mich. I 140; VII 152
„ digyna J. Gay I 141
„ maritima Nolte I 141
„ palustris L. I 141
Zanonia L. VI/1 316
Zantedeschia Aethiopica Spr. II 131; I/CXI Fig. 183; VII 157
Zantedeschia albomaculata Baill. II 131.
Zauschneria Californica Presl V/2 799
Zea L. I 178; VII 153
„ Mays L. I 178; VII 41 Fig. 1068
Zebrina pendula Schnizl. II 143; VII 157 Fig. 1184
Zelkowa Spach VII 168
„ carpinifolia Dippel III 117
„ Keaki Dippel III 117
Zeocrithon distichon Alef. I 397
„ maritimum Pal. I 400
„ murinum Pal. I 398
Zephyranthes Herb. II 319; VII 162
Zilla Forsk. VII 177
Zingiber cassamunar Rosc. II 321
„ officinale Rosc. II 321
Zingiberaceae II 320; VII 163
Zinnia Darwinii Haage et Schmidt VI/1 528
„ elegans Jacq. VI/1 527
„ Ghiesbreghtii B. Verlot VI/1 527
„ Haageana Regel VI/1 527
„ linearis Benth. VI/1 527
„ pauciflora L. VI/2 1366
Zizania aquatica L. I 196
Zizia Pyrenaica Roth IV/1 115
Zizyphora L. V/4 2281
„ capitata L. V/4 2281
Zizyphus Juss. V/1 322; VII 187
„ Jujuba Miller V/1 322
„ Lotus (L.) Willd. V/1 323
„ Paliurus Willd. V/1 326
„ sativa Gaertn. V/1 322
„ vulgaris Lam. V/1 322
Zoisieae I 186; VII 153
Zollikoferia Nees VI/2 1076
„ hieracioides Nees VI/2 1077
Zornia linearifolia Moench V/4 2363
„ partita Moench V/4 2365
„ peltata Moench V/4 2362
Zosimia absinthiifolia (Vent.) Link V/2 1456
„ Orientalis Hoffm. V/2 1457
„ radians Boiss. et Hohenacker V/2 1457
Zostera L. I 142; VII 152
„ marina L. I 142
„ nana Roth I 143
„ Noltii Hornem. I 143
„ pumila Le Gall I 143
„ uninervis Rchb. I 143
Zygnemataceae VII 137
Zygocactus truncatus Schum. V/2 695
Zygomycetes VII 140
Zygophyllaceae V/2 38; VII 184
Zygophyllum Fabago L. V/1 39
„ xanthoxylum Engler V/1 39

Fig. 1269. Aspidium Phegopteris (L.) Baumg. (= Phegopteris polypodioides Fée, = Dryopteris Phegopteris [L.] C. Christensen), Buchenfarn (Bd. I S. 15) mit Peucedanum Ostruthium (L.) Koch in den Alpen auf Urgestein. Phot.

5. Deutsche Pflanzennamen

Seite 381—469

Große Naturforscher

Eine Geschichte der Naturforschung in Lebensbeschreibungen. Von **Prof. Dr. Ph. LENARD**, Heidelberg. Mit 70 teils ganzseitigen Bildnissen. 2. Auflage. 1930. Geh. Mk. 10.—, Lwd. Mk. 12.—.

„Der berühmte Heidelberger Physiker und Nobelpreisträger hat hier eine neuartige Darstellung der Entwicklung der Naturwissenschaft gegeben. Er gibt nicht trockene Bilder vom Leben der einzelnen Forscher, sondern er fügt sich in ihre Seele ein, er stellt ihr Werk in der Auswirkung auf sie selbst und die Kultur und Gesittung dar. So wird sein Werk eine Ideengeschichte der Naturwissenschaft von Pythagoras und Euklid bis zu Hertz und Hasenöhrl. Das Buch wendet sich an einen weiten Kreis, daher sind nur die größten Bahnbrecher der naturwissenschaftlichen Erkenntnis behandelt." *(Deutsche Akad.-Ztg.)*

„Verehrung spricht aus den Worten, mit denen Lenard jene überragenden Persönlichkeiten darstellt. Die Auswahl muß als sehr geglückt bezeichnet werden." *(Die Umschau.)*

J. F. LEHMANNS VERLAG / MÜNCHEN 2 SW

5. Alphabetisches Verzeichnis der deutschen Pflanzennamen, insbesondere auch der volkstümlichen und mundartlichen Namen.

A.

Aacht VI/1 236
Aaden I 163
Aäze IV/3 1610
Aak I 163
Aal II 135
Aalbessim IV/2 649
Aal-Kirschen IV/2 1064
„ -Krud I 122
Aânten-Kruud II 139
„ -Quabbels II 139
Aântjeflirt II 139
Aapenbeeren IV/2 653
Aapeneers IV/2 739
Aâpentüet IV/2 739
Aârbäersblome I 157
Aarfke IV/3 1610
Aârn V/1 262
Aasblume VII 199
Abbiss V/3 1782; VI/1 288
„ -Pippau VI/2 1157
Abendmaie II 195
Aberraut, Gelber VI/2 765
Aberraute VI/2 634
Abheid IV/2 916
Abheu II 281; V/2 915, 916
Ablissrosi III 454
Abnehmkraut V/4 2410, 2413; VI/1 25
Abrahamsstrauch V/3 2237
Abrat VI/2 634
Abruden(thee) VI/2 634
Absche IV/2 708
Abschlag II 232
Absinth VI/2 651
Acajòubaum V/1 215
Achân V/1 262
Ache(le) III 108
Achelei'r IV/3 1222
Acher V/1 262
Ach'n III 108
Acker-Beere IV/2 802
-Bohne IV/3 1556
„ , Schwarze IV/3 1553
-Chästene V/2 1192
-Dill V/2 1293
-Distel VI/2 903
-Dockele IV/1 29
-Durchwachs V/2 1106
-Erbse IV/3 1610
-Flachs V/1 21
Acker-Fuchsschwanz I 217
-Gelbstern II 207
-Gipskraut III 310
-Glockenblume VI/1 342
-Goldschirm V/2 1106
-Hahnenfuss III 554
-Hohlzahn, Breitblätteriger V/4 2461
-Holler V/2 1213
-Honigklee IV/3 1243
-Hornkraut III 374
-Ivenkraut V/4 2539
-Klee, Gelber IV/3 1290
-Kleinling V/3 1873
-Klette V/2 1062
-Klettenkerbel V/2 1054
-Knorpelkraut III 212
-Kohl IV/1 276, 440, 441
-Läuse V/3 2086
-Löwenmaul VI/1 20
-Männli IV/2 931
-Mies II 155; III 191
-Minze V/4 2341
-Mennig IV/2 930
-Mund IV/2 931
-Nelke III 317
-Nuß V/2 1192
-Nüsschen IV/1 371
-Petersilie V/2 1154
-Rettich IV/1 275
-Rittersporn III 487
-Rolle IV/1 29
-Rösle III 600
-Röte VI/1 197; VI/2 1363
-Ruabe IV/1 258
-Salat VI/1 266
-Schachtelhalm I 57
-Schöterich IV/1 427
-Schwarzkümmel III 475
-Senf IV/1 263
-Spark III 418
-Strehl V/2 1037
-Täschelkraut IV/1 118
-Täschen IV/1 118
-Trespe I 364
-Wachsblume V/3 2190
-Weiza VI/1 74
-Wicke IV/3 1546
, Gelbe IV/3 1545
Ungarische IV/3 1552
Acker-Ziest V/4 2413
„ -Zweizahn VI/1 516
Adach VI/1 236
Adams-Apfel V/1 63, 65
„ -Bläa VI/2 683
Adam und Eva II 337
Adderkrud I 41
Addich VI/1 236
Adebars-Blome II 293
„ -Kaspern IV/2 653
Adebärssnavel IV/3 1712
Adelgras I 309; VI/1 191
Adelsbeer IV/2 708
Adenkelcher V/1 598
Aderbeer VI/1 236
Adere(n)-Kraut IV/3 1420
Ader-Krut VI/1 181
-Meneken IV/2 931
„ -Zünglan III 196
Adingelche V/1 598
Adlasbeer IV/2 719
Adler-Blueme III 401
-Farn I 37
„ -Kraut I 37
Adlsbeerbam IV/2 719
Adonisröschen III 596
Äbärs-Blome II 293
„ -Brod II 293
Äbärsnabel IV/3 1719
Äbleysswürza IV/2 882
Äbern V/4 2595
Äbsche IV/2 708
Äbuch II 281
Ächtern ud'n Gaorn VI/2 993
Äffe III 118
Ägarstawurza II 269
Ägartadistel VI/2 1105
Ägartanägela V/2 716
Ägel I 162
Ägerstätagä II 269
Ägerstekrut II 269
Ägertadistla VI/2 817
Ägetle V/2 716
Ägle I 396
Aegyptischer Färberstrauch V/2 747
„ Hafer I 254
Aegyptisches Ajowan V/2 1168
Ähnl und Ahnl V/3 2214
Ährenglöckchen VII 197
Ähren-Grannenhafer I 247

Ähren-Hafer I 262
-Hainsimse II 182
-Lilie VII 159
„ -Riet II 48
Aejresch IV/2 646
Älbete IV/2 899
Älz, Bitterer VI/2 652
Ämerne IV/2 1074
Änes V/2 1209
Äpelduhrn V/1 284
Äpfel-Blümli VI/2 581
„ -Chrut VI/2 581
Ärdje I 373
Ärdnuss V/2 1192
Ärschizen IV/2 711
Ärwis IV/3 1610
Ärze IV/3 1610
Äscha IV/3 1610
Äschenwurz V/1 74
Äscher V/1 275
Ätleesch I 116
Ätsch VI/2 652
Ätternessel III 141
Äuglbeer V/3 1675
Äwischen IV/2 708
Afarizen IV/2 652, 653
Af(e)lkraut IV/1 21; V/4 2537
Affagsichtli II 330
Affenbrotbaum VII 188
Affen-Knabenkraut II 342
Affenreashlein III 352
Affodill II 199
„ Weisser II 199
Affolter III 146
Afl-Bladl VI/2 676
-Blätter III 173
„ -Plotschen V/3 1844
Afolter IV/2 743
After-Kreuzkraut VI/2 701, 1367
-Kümmel V/2 1240
-Quendel V/2 748
„ „ , Portulak- V/2 749
Agave II 317
Agel-Chrut II 11
Agerdistel VI/2 1105
Ageste-Aug-Chrut II 269
Aggermonde IV/2 931
Agl II 230
Agla I 396
Aglarkraut IV/3 1222
Agna I 396
„ -Weissa I 394
Agramustel I 384
Agrass IV/2 646
Agres IV/2 646
Agrumen V/1 55
Agspalter III 61
Agspelter V/3 1926
Ahlbeere IV/2 653
„ , Amerikanische IV/2 643
Ahlboom VI/1 252
Ahlert IV/2 1064
Ahl-Kirsche IV/2 1064
-Weden IV/2 1064
Ahntenflott II 139
Ahôren V/1 262
Ahorn V/1 262; VI/1 237; VII 187
, Dreilappiger V/1 288
, Roter V/1 271
, Schneeballblätteriger V/1 290
, Sibirischer V/1 272
, Tatarischer V/1 272
„ -Gewächse V/1 262; VII 187
Ahorra V/1 262
Aiën I 163, 254
Ailenbläer V/2 916
Ailôf V/2 916
Ainen I 254
Ajowan, Aegyptisches V/2 1168
Aischlitzen IV/2 646
Aisdoder III 457
Aiter-Kraut V/4 2332
-Nessel III 141
-Plotzen VI/2 676
Akanthusgewächse VII 205
Akazie, Blaue IV/3 1385
, Echte IV/3 1123; VII 181
„ , Falsche IV/3 1390, 1392
Akelei III 480
Akenkrut V/2 814
Akram III 96
Akte-Beer VI/1 236
„ -Chrut VI/1 236
Ala Mäde II 16
Alant VI/1 473, 475
, Wiesen- VI/1 483
„ -Distel VI/2 885
Albabaum III 59
Alber III 59, 62, 63
Alerce-Zypresse VII 151
Albêrn IV/2 653
Aletschbeere IV/2 1064
Aletwürze VI/1 475
Alexandrinischer Lorbeer VII 162
Alfa I 202
Algarobas-Linse IV/3 1514
Alhandal VI/1 314
Alhôr(e)n VI/1 237
Alkanna, Falsche V/3 2205
„ -Wurzel V/3 2205
Alkermeswurzel V/3 2205
Allbëe, Swaarte IV/2 653
Allbeer IV/2 649
Allelujablümel V/3 1750
Allerheiligen-Blume VI/2 594
„ -Kraut VI/1 38
Allermannsharnisch II 219, 269, 302
Allerweltheil V/3 2005
„ -Chrut VI/1 34
Alleturementenwurzel IV/2 882
Almabaum III 63
Alm-Bux V/3 1635
-Döllerl II 365
-Glocken V/3 2008
-Glöckerl V/3 1827
-Kamille VI/2 555
-Knofel II 224
-Kranabet I 92
Alm-Kronen VI/1 378
-Nagerl III 330, 332
-Rausch V/3 1635
-Rose V/3 1635
-Rhabarber III 171
-Rugerl II 365
-Säuling V/3 1631
-Schnittla II 244
-Vanille II 365
-Veigl (gelba) V/1 617
„ -Wermuth VI/2 559
Aloë, Hundertjährige II 318
Aloë-Kaktus VII 191
Aloysie V/3 2235
Alpa-Chäs VI/2 818
„ -Polster III 294
Alpblaggä III 171
Alpeglöggli V/3 1827
Alpen-Aehrenriet II 49
-Akelei III 482
-Ampfer III 171
-Augentrost VI/1 96
-Augenwurz V/2 1278
-Aurikel V/3 1760
-Bärenklau V/2 1450
-Bärentraube V/3 1661
-Bärlapp I 69
-Beifuss, Schwarzer VI/2 642
-Benediktenkraut IV/2 909
-Berufskraut VI/1 438
-Betonie V/4 2431
-Blasenschote IV/3 1418
-Bocksdorn IV/3 1437
-Braunwurz VI/1 35
-Braye IV/1 461
-Bruchkraut III 431
-Distel V/2 981; VI/2 850
-Dorntraganth IV/3 1437
-Dost VI/1 403
-Ehrenpreis VI/1 48
-Fettkraut VI/1 158
-Fromental I 295
-Gänsekresse IV/1 415
-Gelbling IV/2 893
-Gelbstern II 210
-Glöckchen V/3 1820
-Glöckel V/3 1817
-Glockenblume VI/1 337
-Goldregen IV/3 1165
-Grasnelke V/3 1891
-Gretle VI/2 603
-Habichtskraut VI/2 1305
-Hahnenfuss III 571
-Heckenkirsche VI/1 253
-Heide V/3 1647
-Heiderich V/3 1701
-Helm VI/1 82; VI/2 1362; VII 204
-Helmkraut V/4 2516
-Hornkraut III 373
-Johannisbeere IV/2 651; VII 180 Fig. 1225
-Johanniskraut V/1 530
-Klappertopf VI/1 109

Alpen-Klee IV/3 1314
-Knorpellattich VI/2 1075
-Knöterich III 193
-Kratzdistel VI/2 901
-Kreuzblume V/1 112
-Kreuzdorn V/1 340
-Kreuzkraut VI/2 747
-Kugelschötchen IV/1 146
-Labkraut VI/1 218
-Laichkraut I 126
-Lattich VI/2 696
-Leberbalsam VI/1 70
-Lein V/1 15
-Leinblatt III 157
-Leinkraut VI/1 21
-Liebstock V/2 1319
-Lieschgras I 213
-Löwenzahn VI/2 1020
-Mannsschild V/3 1800
-Mannstreu V/2 981
-Masslieb(chen) VI/1 425; VI/2 603
-Mastkraut III 385
-Milchlattich VI/2 1099
-Mohn IV/1 26
-Mutterwurz V/2 1319
-Nelke III 332
-Odermennig IV/2 893
-Oxel IV/2 717
-Pechnelke III 275
-Pestwurz VI/2 686
-Petersbart IV/2 909
-Rachen VI/1 71
-Rebe III 509
„ -Rispengras I 309
Alpenrose V/3 1627
Alpen-Rotschwingel I 338
-Ruhrkraut VI/1 465
-Säuerling III 188
-Scharte VI/2 835, 932; VII 213 Fig. 1267
-Schaumkresse IV/1 350
-Schnittlauch II 224
-Schotenkresse IV/1 461
-Schuppenkopf VI/1 286
-Schwingel I 337; VII 155
-Sockenblume IV/1 9
-Steinquendel V/4 2299
-Sternblume VI/1 426
-Stiefmütterchen V/1 609
-Storchschnabel IV/3 1686
-Stragel IV/3 1415
-Strahlensame III 305
-Straussgras I 226
-Süssklee IV/3 1485
-Täschelkraut IV/1 129
-Träubchen IV/1 146
-Veilchen V/3 1736, 1836; VII 197
-Vergissmeinnicht V/3 2166
-Wachsblume V/3 2188
-Wegerich VI/1 191
-Weidenröschen V/2 848
-Wiesenraute III 589
Alpen-Windröschen III 531
-Wollgras II 23
-Zeitlose II 198
„ -Ziest V/4 2422
Alperosachäs V/3 1631
Alperösli, Kluser V/4 716
Alp-Häntscheli V/3 1760
-Nägeli V/3 1635
-Ranke V/4 2589
„ -Rolla III 459
Alraunpflanze V/4 2558
Alrune II 132
Alsch VI/2 652
Alsem VI/2 651
Alsenach V/2 1393
Alsike-Klee IV/3 1299
Alssnak V/2 1393
Alsyke IV/3 1299
Alte Eh V/1 467
Altere-Chrut III 194
Alter Thee V/1 467
Alte Weiber III 522; IV/1 345; V/1 127
Altmannä III 531
Alts Ross III 174
Altthee V/1 467
Altvatermark VI/2 705
Altweiber-Gras III 522
-Schmecke(te) V/4 2328, 2336, 2345, 2481
Amachtsblome III 455
Amarelle IV/2 1074, 1075
Amarillali IV/2 1097
Amaryllispflanzen VII 162
Ambatsch IV/3 1461
Amber IV/2 768
-Baum IV/2 655
„ -Kraut V/4 2524
Amblabaum V/1 120
Ambrosia VI/2 621
Ambrosie VI/1 496
Ambruud VI/2 634
Ameisblümel VI/1 456
Ameisekrüttel V/4 2309
Ameisenleiter IV/2 974
Ameisleitern IV/3 1538
Amerikaner V/4 2497
Amerikanische Spitzklette VI/1 500
„ Wasserpest I 160
Amerikanischer Lorbeer V/3 1620
„ Polei V/4 2281
Amerikanisches Afterkreuzkraut VI/2 702
Amethyst-Schwingel I 337
Ammei V/2 1170
, Aegyptisches V/2 1168
, Deutsches V/2 1177
„ , Zahnstocher- V/2 1170
Ammel-Beere IV/2 1074
„ -Korn I 393
Ammer(e) I 393; IV/2 1074
Ammerli IV/2 1074
Ampfer III 166, 180; VII 170, 171
-Knöterich III 198
Amritscherl V/2 732
Amseleblüeme II 307
Amstelkraut III 588
Ananas II 143; I/CLII Fig. 286 e
-Erdbeere IV/2 896
„ -Kirsche V/4 2579
Ananasgewächse VII 158
Andëaftche VI/2 998
Andëaftje VI/2 998
Andel I 324; VI/1 189
Andengras I 261
Anden-Tanne VII 150 Fig. 1178
Andivi VI/2 998
Andorn V/4 2393
, Adriatischer V/4 2397
, Falscher V/4 2390
, Schwarzer V/4 2399, 2400
, Sumpf- V/4 2416
Ungarischer V/4 2398
„ , Wohlriechender V/4 2424
Andorra, Gelbe IV/3 1217
„ , Rote IV/3 1221
Anejelken V/2 1333
Anejilchen V/2 1338
Aneis V/2 1209
Anenweite I 394
Angelica, Edle V/2 1338
„ , Zahme V/2 1338
Angelik V/2 1331
„ , Garten- V/2 1338
Angelike, Wald- V/2 1333
Wiesen- V/2 1333
„ , Wilde V/2 1333
Angelstragel IV/3 1406
Anger-Blümchen VI/1 414
-Röserl VI/1 414
-Trespe I 359
-Veilchen V/1 638
Angölkenwörtel V/2 1338
Angola-Erbse IV/3 1624
Angurie VI/1 313
Anis V/2 1042, 1209
,Wilder V/2 1042
-Kerbel V/2 1042
„ -Labkraut VI/1 227
Ankabluema VI/2 1083
Ankäblackä III 171, 173
Anke-Balle III 457, 459
-Blättel III 457
„ -Blüemli III 457, 542, 561
Ankehrkraut I 44
Anke-Maie III 457
(n)-Chrut VI/1 160
„ -Schlüsseli V/3 1750
Anmutblume VII 192
Annakrettich IV/1 47
Annamiarl V/3 2214
Annatogewächse VII 189
Annel I 324
Annenverz IV/2 646
Anonengewächse VII 175
Antensnepl II 132
Antifi VI/2 998
Antlassrosen III 454

Antonienilge II 235
Apeldäörn V/1 284
Apenierschen IV/2 739
Apenninen-Sonnenröschen V/1 563
Aperkues IV/2 1097
Aperna V/4 2595
Apfalter IV/2 743
Apfel, Medischer V/1 64
-Baum IV/2 743, 745
-Beere, Rotfrüchtige IV/2 706
„ „ , Schwarzfrüchtige IV/2 706
Apfelmoos VII 146
Apfel-Rose IV/2 1008
Apfelsine V/1 61
Aplonawurz III 495
Apollonia-Kraut III 495; V/4 2574
„ -Wurzn III 495
Apothekerbirnen IV/2 699
Appeldegose IV/2 1097
Appellone V/4 2580
Aprikose IV/2 1097
April-Bloume V/3 1746
„ -Blueme IV/1 345
Aprillatrübli II 256
Aprillenblume III 522
Aprillestern II 310
Apulischer Zirmet V/2 1459
Araf I 104
Arbeis IV/3 1610
Arbuse VI/1 313
Arche Noah's III 495
Aremonie IV/2 929
Arfte IV/3 1610
Argemönlichrut IV/2 931
Argemündli IV/2 931
Arikelken V/3 1760
Arle I 101; III 92
Arlsbeere IV/2 719
Armadel IV/1 389
Armedill IV/2 882
Armeschhanischwuzä II 219, 302
Arnika VI/1 483; VI/2 704
Aron(e) III 220, 571
Aronechrut II 132
Arongewächse II 131; VII 157
Aronskindchen II 132
Aron-Stab II 132; VII 157
„ -Wurz II 132
Arrusch II 29
Arschgucke III 536
Arschitz IV/2 708, 711
Arsch-Kitzl IV/2 977
„ -Kratzelche IV/2 977
Arschle V/2 1192
Arstguck'n III 536
Artefifi VI/2 1061
Artischocke VI/2 923, 924
, Erd- VI/1 514
, Gemüse- VI/2 924
, Japanische V/4 2419
, Jerusalem- VI/1 514
„ , Spanische VI/2 924
Arve I 104
Arwas IV/3 1610
Arzisse II 315
Arznei-Primel V/3 1749
Asch V/3 1926
Aschantinuss IV/3 1463
Aschekirsche IV/2 708
Aschen-Flockenblume VI/2 936
Aschgupn III 536
Aschiz'n IV/2 708
Asch-Lauch II 232
Aschpe III 61
Aschp'n V/3 1926
Asch-Weide III 34
„ -Wurz, Weisse V/1 74
Askalonische Zwiebel II 232
Aspalter V/3 1926
Aspars II 261
Aspe(rl) III 61; IV/2 739
Asphaltklee IV/3 1384
Aspolter III 61
Assai-Palme VII 157
Aster VI/1 448
, Allerheiligen- VI/2 594
, Allerseelen- VI/2 594
, Nadel- VI/1 448
, Röhren- VI/1 448
, Sommer- VI/1 448; VI/2 1355 Fig. 959
, Vergils VI/1 428
Vergissmeinnicht VI/1 434
Wilde VI/1 292
„ , Zungen- VI/1 448
Astmoos VII 147
Astränze, (Schwarzi) V/2 964, 1397
Atap-Palme VII 157
Atere-Chrut II 269
At(s)ch VI/1 236
Attach VI/1 236
Attich VI/1 236
Atzitsch II 315
Aublom III 441
Audorn V/2 732
Auen-Hederich IV/1 427
Auerkerblöme VI/2 601
Auferstehungspflanze VII 33
Aufwuche III 550
Augabüntelichrut IV/2 918
Augä-Schlüsseli V/3 1743
Augenblume III 522
Augentrost VI/1 83; VI/2 1362
, Alpen- VI/1 96
, Blauer V/3 2161; VI/1 88
, Hain- VI/1 89
, Illyrischer VI/1 98
, Kamm- VI/1 85
, Krainer VI/1 98
, Salzburger VI/1 97
, Südtiroler VI/1 96
Tatarischer VI/1 86
„ , Zwerg- VI/1 90
Augenwurz V/2 1276, 1386; VI/2 1198
, Alpen- V/2 1278
„ , Haynald's V/2 1282
Augerînken V/3 1969
Auge-Trost V/3 1869; VI/1 59
„ -Tröstla V/3 1869
Augstallkraut I 293
Augste(n)-Bluest VI/1 83
„ -Zieger VI/1 83
Augster VI/1 83
Augurke VI/1 321
Augusthäge V/3 1946
Augustrum V/3 1946
Auheuren V/1 262
Auluft II 32
Aumu(r)kenkraitl V/2 1291
Aupoppen III 441
Aurikel, Alpen- V/3 1760
Aurikeln, Englische V/3 1770
Gefülltblütige V/3 1770
„ , Luiker- V/3 1770
Aurin(iken) V/3 1969
Aurunkel III 557
Aurusk I 157
Austerluzigge III 163
Austernbaum V/2 769
Australheidengewächse VII 196
Australisches Bisamholz VI/1 449
„ Veilchen V/1 594
Auswärtsbleaml V/3 1750
Avemariaschlegel VI/2 974
Aweel IV/1 254, 257
Awiklgras I 309
Azalee, Niederliegende V/3 1647
Azerolen V/1 86

B.

Babbel V/1 474
Babbelrues III 455
Babeln VI/1 242
Babes VI/2 637
Båblrosn V/1 464
Babrarsch VI/2 1049
Bach-Balsam V/4 2335
-Bammele VI/1 63
-Baum VI/1 63
-Blätter VI/2 683
-Blume III 475; IV/2 915; VI/1 64; VI/2 676
-Bohn(a) VI/1 63
-Bum(b)el(e) III 457; VI/1 63
-Bun(gele) VI/1 63
-Bumel, Gelbe VI/1 37
-Bummala II 29
-Bungen-Ehrenpreis VI/1 63
-Burgel V/2 749
-Chrut III 577
-Käthra III 457
-Kappeln III 457
-Kratzdistel VI/2 890
-Latte VI/2 683
-Lôwas'n VI/2 676
-Minze V/4 2344
-Nägala III 300
-Nägeli IV/2 915
-Nelkenwurz IV/2 915
-Palsen V/4 2335
-Quellkraut III 271

Bach-Rösli IV/2 915
-Rohr V/2 1333
-Rolla III 459
-Rosen III 457
-Schartä VI/2 898
-Schlüsseli V/3 1746
„ -Sternmiere III 357
Bachtele II 313
Bach-Weidenröschen V/2 825
„ -Weizen I 345
Bacillenkraut V/2 1225
Backenklee IV/3 1376, 1378
Backpflaume IV/2 1110
Badan VII 179
Badängeli (hoamische) V/3 1746, 1750
Badenetli, Wältschi V/3 1760
Badenke V/3 1750
Badenneli V/3 1746
Baderli (grosses) VI/1 414; VI/2 610
Badkraut V/2 1350; V/4 2328
Badöneli V/3 1760
Badönig V/4 2428
Badönikli IV/3 1355; V/3 1746
Bäärlipalme V/1 236
Bäbergras I 293
Bäckengras I 66
Bäckerbusch III 11
Baeen I 254
Bäfeske III 61
Bäibote VI/2 637
Bämbelcher V/4 2580
Baen(e)t I 276; III 234
Bäratapä I 66, 294; IV/3 1355; V/2 1213
Bäratatza V/2 1428
Bäreletsche V/2 1428
Bären-Birn IV/2 757
-Fenchel V/2 1301, 1319
„ -Fuss V/2 1428
Bärenklau V/2 1416; VI/1 177; VII 205 Fig. 1252
Alpen- V/2 1450
Berg- V/2 1441
„ , Wiesen- V/2 1427
Bären-Klee IV/3 1355
-Knöpf V/4 2472
-Kraut V/3 1574; VI/2 768
-Lauch II 229
-Ohr VII 212
-Plumpe III 531
-Pratz'n IV/3 1355
-Schote IV/3 1402, 1420; VII 182
, Stengellose IV/3 1409
„ , Süsse IV/3 1420
-Tatzen III 531; V/2 1428; VI/1 456
Bäre(n)-Tope(n) VI/1 258
(n)-Toutschn V/2 1428
Bärentraube V/3 1656
„ , Alpen- V/3 1661
Bären-Wurz V/2 1319, 1416
Bäre-Pot V/2 1428
„ -Talpe V/2 1428
Bärkümmel V/2 1301
Bärlapp(e) I 64; V/2 1428
-Gewächse I 63; VII 147
„ -Mohn VII 176
Bärmueter-Chrut VI/2 617
Bärmutter-Krut V/2 1301
„ „ -Sträusse IV/2 671, 972
Bärn-Klawe V/2 1428
-Protschn V/2 1428
-Prouzn V/2 1428
-Pudel V/2 1301
-Tazal IV/3 1355
„ -Zotten V/2 1301
Bärsette IV/3 1488
Bärwurz V/2 1300
Bärwurz, Berg- V/2 1301
Bäse II 147
-Ginster IV/3 1182
„ -Ries(er) IV/3 1182; V/3 1690
Bäsink IV/2 899
Bäterlegras I 261
Bättlerruuda V/3 1746
Bättringli I 261
Bäuke III 96
Bäumchen-Weide III 49
Bäumli-Chrut V/1 126; V/2 1017
„ -Gras V/2 1017
Bäweeske III 61
Bäwerke III 61
Bäwille V/1 474
Bagenka V/3 1750
Baggode V/2 1006
Baia I 197
Baichblume III 276
Baier I 228
Bainkraut IV/2 937
Bairach III 161
Baizeschlegel VI/1 292
Bajonettstangen II 135
Bakenga V/3 1746
Bakterien VII 135
Baldärächrut, chlies VI/1 274
Balderjan VI/1 276
Baldreashle III 522
Baldrian VI/1 267, 276; VI/2 1364; VII 208
, Berg- VI/1 272; VII 207 Fig. 1258
, Felsen- VI/1 271
, Ostalpen- VI/1 268
„ -Gewächse VI/1 261; VII 207
Balgmais I 180
Balla-Blacka VI/1 181
-Chrut VI/1 181
„ -Tätsch VI/1 181
Ballerose III 454
Balme V/1 236
Balsam V/4 2275, 2276, 2345, 2354
-Apfel VII 208
-Baum VII 182
, Römischer VI/2 599
Wilder V/4 2309, 2346
Balsam-Blüemli IV/2 639; V/4 2275, 2276
Balsambaumgewächse VII 185
Balsamine V/1 310, 313; VII 187
Balsam-Kraut VI/2 599
-Pflaume VII 186
-Pappel III 58
„ -Trüffel VII 141
Balse(m) V/4 2335
Balsme V/4 2354
Balsternack(en) V/2 1406
Baltes VI/1 276
Bambertrittli VI/1 292
Bambus I 402; VII 155
„ -Palme VII 156
Bamlêfer V/2 916
Bammbusch VI/2 1084
Bampfjack(e)l IV/3 1650; VI/2 1049
Bamwinkel V/3 2054
Banane II 320
Bananen-Orchis II 383
Bananenpflanzen VII 163
Band II 94
-Blume, Sibirische VI/2 797
-(el)-Gras I 197
„ -Weide III 26
Bandöffelchen, (Gäle) IV/3 1367
Bange(le), (Gäli) V/2 1006, 1017, 1082, 1333, 1406, 1428
Bangenkraut V/2 1082
Bange-Rohr V/2 1333
Bannel III 139
Bantöffeli II 326
Banyan III 124
Banzen I 293
Bapîr-Rösli VI/1 456
Bapple(n) V/1 474
Barbados-Kirschen V/1 86
Barbara-Gras V/2 1042
-Kraut IV/1 299; VI/2 899
„ -Wurzel III 172; V/3 2194
Barbenkraut IV/1 299, 301
Bargflachs I 203
Barille IV/2 1097
Bark III 76
Barölleli IV/2 1097
Barschtkraut V/2 1082
Bart-Faden VII 203
-Gerste I 398
-Gras I 182, 184
-Haf'n VI/2 634
-Klee IV/3 1379
-Moos VII 145
„ -Nelke III 321
Bartsch V/2 1428
Bart-Weizen I 395
Barwinkel V/3 2054
Baschnein V/2 1509
Baselguem V/4 2268
Basidienpilze VII 141
Basilge V/4 2268
Basilgram V/4 2268
Basilicum-Grobseide V/3 2105

Basilie V/4 2268
„ , Wilde V/4 2297
Basilienkraut V/4 2268
Basilikum V/4 2268
Baslagun V/4 2268
Basler Nägeli IV/1 469
Basellgewächse VII 172
Basell-Kartoffel VII 172
Bassl III 214
Bastard-Hahnenfuss III 546
-Hexenkraut V/2 879
-Indigo IV/3 1385
-Klee IV/3 1299
-Luzerne IV/3 1264
-Milzfarn I 27
-Mohn IV/1 32
-Senf IV/1 226
„ -Taubnessel V/4 2455
Basterd-Espersette IV/2 939
Bast-Holz V/1 430
„ -Nägel V/2 1406
Batängeli IV/3 1355
Batate V/3 2076
Batenge(l) V/3 1746, 1750; V/4 2428, 2522, 2527
Batenke, Rote V/3 2214
Battenjen III 455
Batteralsem VI/2 652
Batterle V/1 250
Batunge, Braune V/4 2428
Batze(la) III 214; IV/1 364; VI/1 102
Bau V/4 2277
Bauchweh-Blüemle VI/1 458
-Kraut VI/2 570
„ -Wurz'n IV/2 882
Bauelblümli II 16
Bauern-Hirschwurz V/2 1372
-Köpfl VI/2 878
-Kresse IV/1 118
-Pflaume IV/2 1110
-Schminke V/3 2158
-Senf IV/1 102
„ -Tabak V/4 2624
Baukweit III 207
Baum der Reisenden II 320
Baumbart VII 144
Baum-Flechte VII 144
-Hasel III 71
-Heide V/3 1705
-Schlinge VII 199
-Tod V/2 916
-Tomate V/4 2559
-Tropfe(n) V/2 1213, 1333
-Veilchen V/1 651, 652
Baumwollbaum V/1 460; VII 188
Baumwolle V/1 460; VII 188
Baumwürgergewächse V/1 243; VII 186
Baune, Graute IV/3 1556
Baunen, Wille V/3 1957
Baunernkrütken V/4 2282
Baure-Holder V/3 1912
Bauzeli II 16
Bayerische Rübe IV/1 261
„ Sterndolde V/2 969
Bayerischer Enzian V/3 2021
Bayerisches Kraut IV/1 247
Bayer(n) I 384; V/3 2214
Bayölbaum V/2 777
Beasemkraut IV/3 1182
Becher-Blume IV/2 939
-Glocke VI/1 365, 389
„ -Holla IV/2 639
Becherkätzchengewächse VII 167
Becherlkraut V/4 2574
Becherpilze VII 141
Bechnagl III 276
Becke-Labe I 98
-Blüemli IV/1 396
„ (n)-Mädle IV/1 47
Bedauna III 455
Beddelstroh I 201
Bedecktsamige Blütenpflanzen VII 152
Bedläus I 191
Bedler am Weg V/4 2563
Bedlmandl VI/2 609
Beenet III 234
Beer IV/2 899
Beerenfrucht-Palmen VII 156
Beeren-Malve VII 188
Beeriblosa V/2 1333
Beerige IV/2 899
Beerwurz V/2 1372
Beese II 29, 147
Beeslock II 223
Begonien V/1 664
Beibes VI/2 637
Beibs VI/2 652
Beibst VI/2 637
Beiwes VI/2 637
Beieli-Chrut VI/1 274
Beietrost IV/2 971
Beifuss VI/2 626, 637
, Besen- VI/2 670
, Feld- VI/2 666
, Oesterreicher VI/2 652
„ -Sommerwurz VI/1 152
Beilwicke IV/3 1461
Beinbrech II 191; VI/2 787
Beindlholz V/3 1946
Beinerwell VI/1 475
Beinheil V/3 2220
Bein-Holz, (Rotes) V/2 1545; V/3 1946
„ -Kraut IV/2 971; V/4 2302
Beinlfutter V/3 2230
Bein-Nosset IV/2 971
Beinwell V/3 2220, 2223
Bein-Wida V/2 1545
„ -Wurz V/3 2220
Beissbeere V/4 2556
Beissbeer-Nachtschatten V/4 2588
Beiss-Gurke VII 208
„ -Kohl III 214, 215
Beisslbeer IV/1 7
Beiwida VI/1 252
Beiwiedli VI/1 252
Belbaum VII 184
Belle III 60
Belzebaum IV/2 1064
Belzebub IV/2 1064
Bembelbosch VI/2 1084
Bembernell V/2 1199
Bemmanissl V/1 258
Benätsch, Wilde VI/2 1162
Bend V/3 2086
Benedict-Worzel IV/2 918
Benedikt, Chalte VI/2 990
Benedikte IV/2 918
Benedikten-Kraut IV/2 913, 918; VI/2 990
„ -Wurz VI/2 990
Benediktusblumen IV/2 909
Bennedonne V/4 2566
Bente I 276
Ben-Nussbaum IV/1 491
Bennussgewächse VII 178
Benze II 29
Berberitze IV/1 6
Berfang V/3 2054
Berfink V/3 2054
Berg-Ahorn V/1 274
Bergamasker Geissklee IV/3 1171
„ Klappertopf VI/1 110
Bergamotte V/1 60
Berg-Ampfer III 180
-Baldrian VI/1 272; VII 207 Fig. 1258
-Bärenklau V/2 1441
-Bärwurz V/2 1301
-Bluoma V/3 1760
-Bone VI/2 747
-Breitkölbchen II 373
-Buchs V/3 1669
-Chölbli II 365
-Distel VI/2 856
-Ehrenpreis VI/1 60
-Engelwurz V/2 1342
-Eppich V/2 1386
-Erbse IV/3 1569, 1580
-Erle III 87
-Esche V/1 275
-Esparsette IV/3 1491
-Fadenkraut VI/1 454
-Farn I 17
-Fenchel V/2 1226, 1230
-Flachs III 151; VII 169
-Flockenblume VI/2 965
-Föhre I 100
-Gamander V/4 2525
-Glöckchen V/3 1829
-Gottesgnad IV/3 1682
-Günsel V/4 2545
-Haarstrang V/2 1386
-Hahnenfuss III 564
-Hauswurz IV/2 553
-Holla VI/1 240
-Hopfen V/4 2395
-Hundskamille VI/1 539
-Ilga II 237
-Johanniskraut V/1 524

Berg-Kälberkropf V/2 1006
-Kerbel V/2 1006
-Kicher IV/3 1599
-Königskerze VI/1 14
-Kornblume VI/2 965
-Kratzdistel VI/2 893
-Kreuzkraut VI/2 749
-Küchenschelle III 537
-Kümmel V/2 1467
-Lauch II 221, 224, 227
-Leinblatt III 153
-Liebstöckel V/2 1350
-Linse, Gelbe IV/3 1418
-Manderl V/3 1844
-Mandl(n) II 329; V/3 1574, 1681
„ -Männl(i) III 531; IV/3 1294
Bergmannsmütz IV/3 1294
Berg-Melisse V/4 2290, 2302
-Minze V/4 2279
„ , Illyrische V/4 2287
-Nägeli III 330; V/4 1635
-Palme VII 157
-Peltsche IV/3 1469
-Petersilie, (Kleine) V/2 1386, 1389
-Pippau VI/2 1138
-Poley V/4 2525
-Pudel V/2 1301
-Rebe III 511
-Reitgras I 235
-Rolla III 459
-Rose(n) V/2 719; V/3 1635
-Rosmarin V/4 2525
-Salbei V/4 2534
-Sandglöckchen VI/1 391
-Schaftdolde V/2 959
-Scharte VI/2 931
-Schierling V/2 1006
-Schlösseli V/3 1760
-Schöne VII 196
-Schwingel I 353
-Segge II 89
-Seidelbast V/2 713
-Siler V/2 1468
-Silge V/2 1386
-Sonnenröschen V/1 577
-Spika V/2 719
-Spitzkiel IV/3 1439
-Stachelbeere V/2 776
-Steinkraut IV/1 449
-Sternblume VI/1 428
-Süssholz IV/3 1314
-Täschelkraut IV/1 126
-Troddelblume V/3 1829
-Ulme III 120
-Veilchen V/3 1844
„ , Gelbes V/1 617
-Vergissmeinnicht V/3 2166
-Viönli V/1 617
-Wegerich VI/1 186
-Weidenröschen V/2 827
-Wicke, Gelbe IV/3 1569
Ungarische IV/3 1579
Bergwiesen-Gliedkraut V/4 2404
Bergwinkelkraut V/3 2054
-Wohlverleih VI/2 704
-Wurz V/2 1389
„ -Zweiblatt II 387
Berke III 76
Berle V/2 1217
Berlein V/2 1223
Bermudagras I 264
Bernbrazerl VI/1 456
Bernhardinerwurzel VI/2 990
Bernitzke V/3 1669
Berstengras II 80
Berstgras I 321
Bersteschilf I 321
Bertram VI/2 617
Deutscher VI/2 673
Dolden- VI/2 614
Römischer VI/2 673
„ , Wilder V/2 1393
Bertrammel VI/2 563
Bertram-Schafgarbe VI/2 563
Berufskrad V/4 2392
Berufskraut VI/1 435; VI/2 1365
Alpen- VI/1 438
„ , Felsen- VI/1 442
Berwinkel V/3 2054
Besareis, Weiss VI/1 252
Beschreikräutig VI/1 25
Beschreikraut V/4 2410, 2459
Besebom III 76
Beseli-Reps IV/1 368
Bese(m)-Rörli VI/1 252
Besen II 16
-Beifuss VI/2 670
-Ginster IV/3 1181; VII 183, Fig. 1226 B
-Heide V/3 1689
-Kraut III 251; IV/3 1182
-Pfriem IV/3 1182
-Radmelde III 251
„ -Rauke IV/1 160
Beseries IV/3 1182
Besewinde V/3 2086
Besing V/3 1675
„ -Strauch V/2 732
Besmenheide V/3 1708
Besmeries III 76
Bessenheide V/3 1690
Betannirosn III 455
Bete III 214
Betelpalme VII 157
Betelnusspalme II 130
Betonie V/4 2407, 2428
Betschle I 104
Bettbrunzekraut VI/2 1084
Bettbrunzer(li) III 522; IV/1 345
Bettelknopf VI/2 825
Bett(e)lläus VI/1 516; VI/2 825
Bettelmann III 273; IV/1 118
Bettelmänner V/3 2194, 2214
Bettenseecher IV/1 364
Bettfedern II 16
Bettler-Blueme VI/2 609
Bettler-Kersch'n IV/2 646
-Knopf VI/2 944
„ -Schlüsseli V/3 1746
Bett-Pisser VI/2 1084
-Säcker IV/1 345
-Schisser VI/2 1084
-Seicher(li) III 522; IV/1 364; V/3 2080; VI/2 1018
-Soacha IV/1 258
-Soichla IV/1 258
„ -Stroh VI/1 25
Beutel-Dieb IV/1 364
-Farn VII 148
-Galle VII 36 Fig. 1060
-Schneider IV/1 364
„ -Schnitter IV/1 364
Bewerke I 293
Bewigras I 293
Bewinadeln I 293
Biangga I 376
Bibahendl IV/1 38; IV/3 1574
Bibberken V/3 1675
Bibelken IV/2 725
Biberklee V/3 1957
Biberli I 104; V/1 258
Gäli IV/2 536
„ , Wiessi IV/2 534
Biberling V/2 1017
Bibernalle V/2 1199
Bibernell(e) IV/2 935, 937, 939; V/2 964, 1197
„ , Stein- V/2 1203
Biber-Nüssli V/1 258
„ -Stengel V/2 1017
Bibhennerlkraut VI/2 570
Bibinell IV/2 939
Bibot(e) VI/2 637
Bibs VI/2 637
Bick-Bäre V/3 1675
-Beere V/3 1675
„ -Nagel III 276
Biefes VI/2 637
Biefout VI/2 637
Biene II 333
Bienen-Freund, Borstiger V/3 2119
-Kugeldistel VI/2 808
„ -Ragwurz II 333
Bienensaug V/4 2438
Bienlichrut IV/2 671
Biensaug V/4 2302, 2468, 2469
, Roter V/4 2448
„ , Weisser V/4 2445
Bieskohl III 214
Biewelcher IV/1 364
Biewitz IV/1 252
Bifen I 254
Bifoot VI/2 637
Bigarade V/1 59
Bigenge III 455
Bignoniengewächse VII 204
Bigonnie III 455
Bijönje III 455
Bijünt I 276
Bilch III 76

Bildai Nagerlain III 300
Bilibluamä V/4 2537
Bilse IV/2 1106
„ -Chrut V/4 2574
Bilsem V/4 2574
Bilsenkraut V/4 2573, 2574
Bimassen II 147
Bimbaume VI/2 1084
Bimbernell, Grosser IV/2 937
Bimmele IV/2 649
Bimsel I 112
Bimssen II 29
Binätsch III 234
„ , Wildä III 220
Bindarohr I 112
Binde(n) V/3 2086
Bindsalat VI/2 1120
Binesug V/4 2448
Binewissen II 147
Bingelkraut V/1 126, 129, 190 Fig. 180
Bingen V/3 2086
Binkelweizen I 395
Binnheidi V/3 1690
Bins V/2 815
Binsä I 112
Binse II 27, 29, 147; VII 158 Fig. 1185
, Flatter- II 151
, Frosch- II 156
, Kröten- II 155
, Salz- II 159
„ , Sumpf- II 156
Binsen I 276; VII 158
-Gewächse II 144; VII 158
-Ginster IV/3 1213; VII 183 Fig. 1226 B
-Hasenohr V/2 1114
-Knorpellattich VI/2 1072
-Kopfgras I 267
-Pfriemen IV/3 1213
-Quecke I 386
-Schneide II 47; VII 156 Fig. 1183
Binsge II 29
Binswanger Kraut VI/1 524
Bintersacher I 112
Bipölperli V/3 2114
Birke III 75, 76; VII 167 u. Fig. 1059, 1101, 1178, 1208
Birkengewächse III 65; VII 166
Birkenstrauch IV/2 565
Birkwurz IV/2 882; V/2 1357
Birmet VI/2 652
Birnbäumchen V/3 1574
Birnbaum IV/2 694
Birne, Wilde IV/2 695
Birngrün V/3 1574
Birnmoose VII 146
Birschlain I 112
Birtzenbertz V/1 548
Birzstrauch VII 189
Bisam-Distel VI/2 841
„ , Sand- VI/2 841
-Hyazinthe II 256; V/1 Fig. 1934
Bisam-Klee IV/3 1233
-Kürbis VI/1 327
-Malve V/1 479
-Rösli VI/1 260
-Schafgarbe VI/2 555
„ -Storchschnabel IV/3 1724
Bisangli VI/2 1084
Bischofs-Haube V/3 1844
-Kappl V/3 1844
-Mütze IV/1 9; V/2 694; VII 175
Bisele I 112
„ -Krut VI/1 260
Bisem IV/3 1724; VI/1 292
„ -Blueme VI/1 309
Bismachutz VI/2 944
Bismarck-Veilchen VI/1 177
Bismet-Blueme VI/1 260; VI/2 944
Bissangi VI/2 1084
Bisserle IV/3 1328
Biswurmkraut IV/3 1712
Bitterblad V/3 1957
Bitterbauch VII 159
Bitter-Distel VI/2 990
„ -Gras III 200
Bitterholzgewächse V/1 77; VII 184
Bitter-Klee V/3 1957
-Kresse IV/1 348, 350
-Kraut VI/2 1035
„ -Sommerwurz VI/1 152
„ -Krout III 200
Bitterling III 201; V/3 1966
Bitterschopf VII 159 Fig. 1152
Bitter-Silche V/2 1156
Bittersüss V/4 2589
Bitter-Wörzli V/3 2008
-Wurz V/3 2008
„ -Zilche V/2 1156
Biwen I 254
Biwerke I 293
Biwernelle V/2 1199
Biwes VI/2 637
Blaae Aigskes V/3 2145
Blabling VI/1 74
Blackächnöpf VI/2 683
Blacke(tä) III 171; VI/2 683
Blackte III 171, 173
Blächblume VI/1 414
Bläh-Chrut IV/1 345
Blähdischen III 173
Bläschen II 326
Blätsche IV/1 245
Blätterschwämme VII 142
Blättleskraut VI/2 1000
Blätzgüetli IV/2 522
Bläueli IV/2 802
Blafendel V/4 2274
Blagge VI/2 676
Blasenbinse VII 152
Blasen-Dolde V/2 1080
-Esche V/1 308
-Farn I 9; VII 148 u. 149 Fig. 1176
-Fuchsschwanz I 218
Blasen-Kelchling VII 203
-Kirsche V/4 2579, 2580
-Kohl IV/1 247
-Kraut III 279
-Schötchen IV/1 460
-Schote IV/3 1458
-Segge II 118
-Spiere IV/2 680
-Stengel V/2 994
-Stragel IV/3 1433
-Strauch IV/3 1457/58; V/1 257, 258
Blastere IV/2 905
Blattblume VII 185
Blattfahne VII 157
Blatt-Kaktus V/2 696
Blattkeimer VII 165
„ , Verwachsenblumige VII 195
Blattkohl IV/1 245
Blattpetersilie V/2 1157
Blatt-Tange VII 138
Blattwurz VII 156
Blatzgrud VI/1 34
Blau-Beer(e) V/3 1674, 1675
-Blume VII 208
„ -Chrut VI/2 961
Blaudfätken IV/2 937
Blaudkopp IV/2 937
Blaudolde V/2 956
Blaue Knollblume VI/1 352
Lilie II 291
Ochsenzunge V/3 2193
Pantoffeln III 495
Schlüsselblume V/3 2213
„ Wämseli II 247
Blauer Himmelsschlüssel V/3 2162
„ Kuckuck V/4 2537
Blaues Mänderle VI/1 43
Blau-Glocka VI/1 352
Blauglockenbaum VII 204 Fig. 1249
Blaugras I 268, 306; II 81
Blaugummibaum V/2 781, 783
Blauholzbaum IV/3 1128
Blaukissen VII 178
Blau-Klocken V/3 2000
-Köpfl VI/1 391
-Kraut IV/1 247
-Kresse IV/1 411
-Maia(li) V/1 587; V/3 2054
-Mützen III 495; VI/2 961
-Regen IV/3 1385
-Spiere IV/2 681
-Veilchen V/1 647
-Wetterkühl VI/1 401
„ -Zulker VI/1 74
Bleichblume VI/1 414
Bleiches Torfveilchen V/1 622
Bleiwurz V/3 1878; VII 197 Fig. 1237
„ -Gewächse V/3 1877; VII 197
Blembern IV/2 771
Bletzkraut V/2 814
Blimmechen V/3 2161

Blind-Baum V/1 118
„ -Essl V/4 2438
„ -Haber I 253
Blitz-Nägele V/3 2014
„ -Pulver I 67
Blöderkraut IV/1 149
Blödewurz V/2 1386
Blofalke V/1 587
Blo Hans VI/1 288
Blomebuun IV/3 1629
Bloofaijun V/1 587
Blosakrettich III 279
Blotzablätter III 173
Bloutspeier III 298
Blovelka V/1 587
Bloyel II 291
Bloze III 495
Blözulker VI/1 74
Bluat-Bloama IV/1 29
„ -Ruata V/2 1545
Bluats-Knepfl IV/2 937
-Tröpferl IV/2 915
„ -Tröpfli III 600
Bludere V/3 1681
Bludertsche V/3 1681
Blümelein, (Blaues) V/3 2161
Blümischken II 299
Blüt-Chrut IV/3 1676
Blüten-Esche = Manna-Esche
Blütenpflanzen I 72; VII 150
„ , Zweisamenlappige III 5
Blüterich V/2 757
Bluetfinkabeeri V/3 1946
Bluet-Kraut V/2 757
„ -Nägele V/3 2214
Blüts-Tröpfli V/2 757; V/3 1869
Blüt-Tröpfli, Wildi IV/2 805
Blumenbinse I 147
Blumenbinsengewächse I 146; VII 152
Blumen-Bohne IV/3 1637
-Esche V/3 1922
-Kohl IV/1 248
-Rohr II 321; VII 164
Blumenrohrgewächse VII 164
Blut-Arle V/1 275
-Auge IV/2 805; VII 180, Fig. 1129
-Beer VI/1 244
-Blümel III 298
-Blume II 319; VII 162 u. 68 Fig. 1102
-Blumen II 365
-Buche III 97
„ -Eiche III 110
Blutfennich I 187
Blutgros V/1 527
Blutheil V/1 511
„ -Hirse I 187
Blutholzbaum IV/3 1128
Blut-Klee IV/3 1328
-Kopf IV/2 937
-Kopp IV/2 937
Blut-Kraut IV/1 21, 160; V/1 527; V/3 2214; VI/2 570
-Nägele III 300
-Nelken III 323, 328
-Nuss III 71
-Peterlein V/2 1082
-Röslein IV/3 16, 76
-Rose III 455
-Rute V/2 1545
„ -Schierling V/2 1082
Blutstellkraut VI/2 570, 572
Blut-Storchenschnabel IV/3 1676
Bluts-Trop(fe) IV/2 937
-Tröpfel II 365
„ -Tröpfli IV/2 937
Blutti Jumpfere II 196
Blut-Weiderich V/2 757
-Wurz IV/2 882; V/3 2199
„ -Wurzel IV/3 1676
Blutza III 173
Blutze III 495
Blutzgen VI/2 747
Boaholz, Weiss V/3 1946
Boan-Weidl VI/1 252
„ -Wurzen V/3 2223
Boasslbeer IV/1 7
Bobl III 455
Bochbatzer VI/2 1049
Bochele V/2 1428
Bocherle V/2 1017
Bochs V/1 204
Bochwürze V/2 1199
Bock-Beere IV/2 802
„ -Böschä I 266
Bocke-Chäsli II 292
Bockel-Baar I 163
„ -Haart I 163
Bocker III 531
Bockerln I 85
Bock-Kraut V/2 1406
„ -Laub V/2 1477
Bocksbart I 242; III 531; IV/2 671, 971, 974; VI/2 1042, 1049, 1356 Fig. 961
Kleiner I 330
„ , Sand- VI/2 1043
Bocks-Beer(e) IV/2 653; V/3 1946
-Beeri V/3 1946
„ -Bert III 298
Bocksdorn IV/3 1405; V/4 2562
Bocks-Futter III 146
„ -Geil II 360
Bockshorn-Baum IV/3 1132
„ -Klee IV/3 1228, 1231
Bocks-Knöterich VII 170
-Kraut, Wildes IV/3 1420
-Peterlein V/2 1197
„ -Weizen VII 170
Bockvatz VI/2 1049
Bodäneli V/3 1746, 1750
Boddele IV/2 976
Bodderblom III 457
Boden-Erbs IV/3 1629
-Glocken V/3 2007
Boden-Kohlrabi IV/1 252, 255
„ -Rübe IV/1 255
Bodenufrüebe III 214
Böckbuschel I 266
Böcke V/2 1017
Böginnen III 455
Böhna(ra) III 495
Böhnerne VI/2 747
Böhnle VI/2 747
Bökenboom III 96
Bölkwurtel IV/1 280
Bölle II 232
Böllenhahnenfuss III 554
Böni VI/2 747
Böpperli V/2 1071
Börsch IV/1 247
Böschenspalt II 78; VII 69 Fig. 1104
Bösi-Blueme VI/1 128
Bösnholz III 76
Bötteln IV/2 976
Bogen-Lilie VII 162
Bogga V/2 1017
Boggwurzä V/2 1199
Bohler, Violetter V/4 2309
Bohna, Wildi V/3 1957
Bohne, Französische IV/3 1554
„ Japanische IV/3 1620
Bohne, Wissi IV/3 1629
Bohnen-Baum IV/3 1161, 1162
Bohnenkraut V/4 2282
Bohnen, Wilde IV/2 522
Boiz I 394
Bokharaklee, Weisser IV/3 1245
Bokswürza II 337
Bokweeten III 207
Boläg V/4 2309
Bolaie V/4 2309
Bolderjan VI/1 276
Boldrion VI/1 276
Boleig V/4 2309
Bolerblumen V/4 2309
Bolich V/4 2339
Bolke III 96
Boll III 273
Bollä II 29, 224
Bolle II 232; IV/2 937
„ -Büdel II 326
Bollenblueme III 554
Bollerjahn VI/1 276
Bolleschmalä I 294
Bologneser-Fenchel V/2 1287
Bolschewistenbeifuss V/2 631
Bolzebläder VI/2 675
Bombardierpflanze III 137; VII 169
Bombeidel VI/2 1084
Bombeilen VI/2 1084
Bombernell(a) V/2 1199
Bombesch VI/2 1084
Bonat IV/3 1708
Bone-Chrut III 495
„ (n)-Veieli IV/1 443
Booke III 96
Bookweten, Willen III 205

Boon(d)erheide V/3 1708
Boonen, Wille V/3 1957
„ -Blad V/3 1957
Boradi V/3 2230
Borage(n) V/3 2230
Borätsch V/3 2230
Borassus-Palme VII 156
Bordonnerrosn III 455
Bore II 221
Boretsch V/3 2230
Borgelkraut V/3 2230
Born-Kass(en) IV/1 319
-Kersch IV/1 319, 348
-Kirschen IV/1 319
-Klawen V/2 1428
-Kresse IV/1 348
-Stein III 139
„ -Wurz VI/2 990
Borren VI/2 825
Borretsch V/3 2230
Borstendolde V/2 1048
„ , Wald- V/2 1052
Borsten-Hirse I 191
-Kraut V/2 1164
-Pippau VI/2 1171
-Schmiele I 246
„ -Schwingel I 339
Borstgras I 372; VII 82 Fig. 1116
Borthüh VI/2 634
Boschtkraut IV/1 29
Bosenknôpp VI/2 825
Botennarosn III 455
Bottel(ter) IV/2 976
Botter-Bladen III 173
Botterblumpotsch III 457
Botterlome III 542
Botterstock VI/2 1083
Botz'n IV/2 937
Boub'mläus VI/1 516
Bovist VII 143
Bowerli IV/3 1611
Bråakdistl V/2 988
Brabanter Myrte III 11
Brach-Distel V/2 987
-Rübe IV/1 261
„ -Schöterich IV/1 428
Brachsenkräuter I 49; VII 147
Brach-Sinau IV/2 946
Bräckbeen I 53
Brämkölbli I 112
Bränderli II 365
Brännli II 365
Brântele II 365
Bränterli, Langs II 340
Bränzchen II 365
Brästling IV/2 905
Bräzeliholz V/1 249
Bragel VI/2 747
Brain I 188
Brake VI/2 874
Bramedorn IV/2 771
Bram(en) IV/3 1182
Brams IV/3 1182
Brand V/3 2090
Brand-Bletter VI/2 676
-Chrut VI/1 401
Brandele V/4 2497
Brandenborger VI/2 601
Brand-Gras V/2 815
-Heide V/3 1690
-Ilge II 235
-Knabenkraut II 340
-Kräutig V/2 815
-Kraut V/4 2435, 2457, 2497
-Lappe VI/2 676
-Lattich VI/2 676
Brandlen V/4 2497
Brandpilze VII 142
Brandlottkeblätter VI/2 683
Brandrosa III 455
Branneckel III 139
Brannwiensblome IV/2 972
Brasilholz, Gelbes III 123
Brasilianische Jalape V/3 2076
Brasilianischer Quassiabaum V 1 79
Brasilienholz IV/3 1127
Brasilnussbaum VII 191
Brastelfeller III 20
Bratekräutche V/4 2334
Bratte VI/2 874
Brauerkraut V/3 1623
Braum IV/2 1106; IV/3 1182
Braun-Algen VII 138
Braunalle IV/2 937
Braunbeer IV/2 771
Braune V/4 2380
Brauneil V/4 2380
Braunelle IV/2 937, 939; V/4 2377; VII 200 Fig. 1242
Kleine V/4 2380
„ Weisse V/4 2378
Braunellen II 365
Braunemond V/4 2527
Braune Nella V/4 2380
Brauner Milzfarn I 26
Braun-Heil V/4 2377, 2380
-Kersch IV/1 319
-Klee IV/3 1295
-Kohl IV/1 245, 246
-Manderl V/4 2527
-Schnitzer V/3 1669
-Silge V/4 2268
„ -Silze V/4 2268
Braun's Schildfarn I 23; VII 149 Fig. 1177
Braun-Stock VI/2 944
Braun-Tange VII 138
Braunwurz VI/1 30; VI/2 1360
, Alpen- VI/1 35
Frühlings- VI/1 31
„ „ , Wasser- VI/1 32
Brausbüa(r) V/3 1669
Braut in Haaren III 474
Braut-Kranz V/3 1853
„ -Myrte V/2 790
Brechnussbaum V/3 1950
Brêden Sophie VI/2 599
Breet Skelp II 293
Breiapfel V 3 1896; VII 197
Breiapfelgewächse VII 197
Brein I 188
Gelber VI/1 215
„ Wilder III 225
Breinröserl V/3 1743
Breitfaden VII 176
Breitglocke VII 209
Breitkölbchen II 372; VII 3 Fig. 970b
Breit-Lauch II 231
Breitnarbe VII 176
Breit-Samen V/2 1066
„ -Wegerer VI/1 181
Bremm(e) IV/3 1182
Brendeler V/4 2497
Brennbeere IV/2 771
Brenndolde V/2 1304
„ , Sumpf- V/2 1305
Brenneetel, tam V/4 2438
Brennessel, Englische V/4 2302, 2369
Grosse III 139
, Kleine III 141
„ , Russische III 141
Brennettel III 139
Brenn-Gras V/3 2090
Brennhülse VII 183
Brennkernstaude V/2 709
Brenn-Kraut III 561 V/3 2090, 2158; V/4 2457
-Palme VII 157
-Rebe V/1 662
-Saat V/2 1304
-Stein III 139
-Winde, Ziegelrote V/1 662
„ -Winden V/1 661; VII 190
Breselkraut VI/2 617
Brëssel II 223
Brestel IV/2 904
Brestling IV/2 904
Breusch V/3 1690
Brillen-Baum V/1 263
-Linse IV/3 1515
-Schötchen IV/1 97
„ -Schote IV/1 96
Brimme(n) IV/3 1182
Bring ma's wieder III 196
Brink-Blome VI/1 414
-Gras I 301
„ -Klewer IV/3 1303, 1322
Brittlischmale I 379
Broatwegerl VI/1 181
Brockel-Erbis IV/3 1629
„ -Saot IV/1 252
Brocken-Blume III 531
„ -Myrte V/3 1603
Brodweten I 394
Brogge VI/2 874
Brokelerbse IV/3 1610
Brolle, Gääli VI/2 620
Brom IV/3 1182
Brombeere IV/2 759, 771
„ , Armenische IV/2 774
Bromerte IV/2 771
Bronsilke V/4 2268

Broochblume VI/2 676
Brookwied III 20
Brossenkraut VI/1 212
Brot-Klee IV/3 1234
„ -Kümmel V/2 1182
Bruch V/3 1690
-Eicheln I 156
-Hederich IV/1 263
-Kraut III 430; IV/2 522; V/2 957
-Veilchen, Großblumiges V/1 626
Brüdigamskrut IV/1 47
Brümmelken IV/2 771
Brümmesbääre IV/2 771
Brünäli V/4 2380
Brünichrut V/4 2380
Brüsch V/3 1690
„ -Blüemli V/3 1701
Bruin-Schlize V/3 1669
„ -Schnezen V/3 1669
Brûke IV/1 252, 255
Brumelter IV/2 771
Brumma VI/2 1084
Brummelbeere IV/2 771
Brundost V/4 2328
Brunellen II 365
Brunitschke IV/2 766
Brunnekressich, Blaue IV/1 345
Brunnen-Fürzli IV/2 646
-Kresse IV/1 319
-Moos VII 146
„ -Peterle V/2 1217
Brunneschlüssili V/3 2214
Brunnessel V/4 2457
Brun-Schnetzen V/3 1669
-Steert III 262
„ -Winkel V/3 2054
Brunzer VI/2 1084
Bruschnetzen V/3 1669
Brust-Chrut IV/2 931
-Dee VI/1 83
-Klewer IV/3 1310
-Kraut V/4 2395
-Lattich VI/2 675
„ -Wurz V/2 1331
Brutblatt VII 179
Brut im Grüana III 775
Brutkohl IV/1 246
Brymbura V/4 2595
Bseichkräutl I 44
Buabanägala III 300, 335
Buabarose V/1 464
Buabnkraut II 337
Buabn und Diandln II 292
Bubbelkes III 441
Bube-Batenke V/3 1746
„ (n)-Schenkel IV/1 7
Buberelle V/4 2580
Buchampfer IV/3 1650
Bucharaklee IV/3 1245
Buche III 95, 96
Buchecker III 96
Buchel III 96; V/2 1017, 1333
Buchenfarn I 15; VII 380 Fig. 1269
Buchen-Gewächse III 94; VII 167
„ -Spargel V/3 1597
Buchenwald-Melisse V/4 2288
Bucheschern V/1 275
Buchs V/1 204
„ , Wilde(r) V/1 91; V/3 1657
Buchsbaum V/1 204; VII 186
„ , Wilder V/3 1669
Buchs-Beeri V/3 1669
„ -Gewächse V/1 202; VII 186
Buchweizen III 207
Buckelbas I 163
Buckel-Fetthenne IV/2 532
„ -Wasserlinse II 141
Bucks-Bart I 372
„ -Beere IV/2 653
Buckseknopp VI/2 801
Buddeln IV/2 976
Buddhabaum V/3 1910
Budlgoass I 85
Budlkuh I 85
Buebarose III 454
Buebe-Bletter IV/1 7
-Chrut VI/1 212
„ (n)-Strähl VI/1 283
Buechli III 96
Buecholtere V/2 1017
Büchsen-Kraut VI/1 39; VI/2 1361
„ -Puffer(t) III 279, 301
Bücklingsgras I 293
Büffel-Beere VII 191
-Erbse IV/3 1624
„ -Rebe V/1 360
Büffonie III 385
Bülken IV/2 1106
Bülten II 16, 78
Bündelhülse VII 183
Bündtnerschlegel I 112
Büne VI/2 747
Büppli-Chrut III 173
Buërose III 454
Bürschling I 372
Bürsta I 112
Bürstelgras I 372
Bürsteli VI/2 817
„ -Gras I 294
Bürsteln VI/2 817
Bürstengras I 220
Bürstling I 372
Bürzelkohl III 269
Büschel-Enzian V/3 2040
„ -Erbse IV/3 1613
Büscheligras I 301
Büschel-Nelke III 320
„ -Rose IV/2 992
Büschelschön, Rainfarnblätteriges V/3 2119; VII 11 Fig. 989
Büseli II 16
Büssenholt VI/1 237
Bütschligras I 301
Buffalogras I 265
Buffbohne IV/3 1556
Bugeinis III 455
Buggele, (Heu-) V/2 1006, 1017, 1428; VI/2 1084
Buhlerkraut IV/3 1593
Bujenge III 455
Bukett-Wicke IV/3 1597
Bukkabengel V/2 1017
Buldermann V/4 2373
Buldrijan VI/1 276
Bullen-Beisser VI/2 846
-Krud V/1 134
„ -Päsel I 112
Buller-Blad VI/2 683
„ -Distel VI/2 899
Bullerjan VI/1 276
Bullgrafen V/3 1681
Bullklewer IV/3 1290
Bullmelk V/1 134
Bullnklau V/2 1428
Bull(n)-Krut IV/2 498
Bullsack II 326
Bulstern I 112
Bultbeeren V/3 1686
Bultengras II 78
Bultheide V/3 1708
Bumbelblume VI/2 1084
Bumbernell V/2 1199
Bumbeschlegeli V/1 250
Bummala IV/2 937
Bummel VI/1 64
-Beesen II 29
„ -Dor(n) IV/3 1222
Bumoissen II 147
Bumreben V/4 2373
Bumskeule I 112
„ , Kleine I 211, 217
Bundrebli V/4 2373
Bunge V/3 1875; VII 99 Fig. 1127
Bungelbeesen II 29
Bunn, Weisse IV/3 1629
Bunskool IV/1 243
Buntlippe VII 200
Bunt-Schwingel I 347
Buntwurz VII 157
Buoll III 273
Buppen V/4 2595
Buraschlüsseli V/3 1746
Burâtsch V/3 2230
Burenschinken IV/1 364
Burerolla III 459
Burgen-Ahorn V/1 288
Burgerschlüssel IV/1 38; V/3 1749
Burgetschlüsseli V/3 1749
Burgunder III 214
Burgunderrübe III 214, 215
Burgundisch Heu IV/3 1260
Buriti-Palme VII 156
Burkhartsstock III 219
Burrasch V/3 2230
Burree II 231
Burres V/3 2230
Burrosen V/1 464
Burser's Steinbrech IV/2 585
Burst I 268, 357, 372

Burzel III 269
„ -Dorn V/1 42
Burzenstengel VI/2 1049
Burzigageln II 299
Busaebla V/4 2282
Busch-Blume V/2 815
-Blüml III 529
-Klee IV/3 1650
-Kreuzkraut VI/2 758
-Lack IV/1 444
-Möhre V/2 1017
Nagerl III 321, 323
-Nelke III 327
-Rösl III 522
-Sauerrump IV/3 1650
-Sumpfkraut II 377
-Weide V/2 709
-Wicke IV/3 1521
-Windröschen III 522; VII 88 Fig. 1119
Busel II 16
Buseli IV/3 1322
Busemannsförke VI/1 517
Buseröri VI/1 456
Buskboom V/1 204
Bussboom V/1 204
Busserl, Gelbes III 557
Busserln, Rote und Weisse VI/1 414
Butändl V/3 1750
Butler V/3 1681
Butschell VI/2 747
Butschellaholz V/1 249
Buttbladen III 441
Butte IV/2 976
Butteltendôn IV/2 976
Butte(n)rösle IV/2 976
Butter-Baum V/1 502
-Birnen IV/2 698
-Blätter III 173, 542; VI/2 676
-Bleïtschen III 173
-Blume III 457, 459; VI/2 1083
-Brötla IV/1 47
-Essl V/4 2441
-Fässchen III 445
-Gras VI/1 160
-Kärne III 445
-Kogel III 459
-Lädn III 173
-Latten VI/2 676
-Nussgewächse VII 189
-Plätschen III 171
-Rosen III 457, 459
-Sämchen IV/1 368
-Schlägl V/1 474
-Schmirgl III 457
-Striezeln V/2 815
-Weckelkrut III 173
-Wecke(n) II 196; V/1 474; VI/1 160
„ -Wurz II 269; VI/1 372
Buttonirosn III 455
Butünje III 455
Butzachrut I 122
Butzlä VI/2 747
Buukkasten V/1 345
Buwardie VII 206 Fig. 1253
Buwäre IV/3 1611
Buwärli IV/3 1611
Buwerelle V/4 2580
Bux, Grüner V/3 1635
Buxbaum V/3 1635
Buzelküh I 85

C.

Caldesie I 153; VII 153
Calepine IV/1 189
Caliaturholz IV/3 1496
Calvillen IV/2 748
Camellie V/1 497
Cantabrische Winde V/3 2085
Cardy VI/2 924
Carfiol IV/1 249
Cassavestrauch V/1 119
Ceder I 81
, Japanische VII 151 Fig. 1179 B
Cedro V/1 65
„ -Limone V/1 65
Celaster VII 187
Centifolie IV/2 992
Chabis IV/1 243, 247
Chäfe IV/3 1611
Chäferworzel II 193
Chäragert V/3 1946
Chäsli II 292; IV/3 1650; V/1 474
Chäs und Brot IV/3 1650
Chätzli II 16
Chalberchen VI/1 372
Chalberchernechrut VI/2 1099
Chalber-Milch VI/2 1049
Chalmis II 135
Chamblüamli, Wildi II 340
Chammblüemli II 365
Chanderer-Chrieche IV/2 1106
Chanta II 337
„ -Blüemli II 337, 365
Chapizinerchappa III 481
Chappachläre I 31
Chapuziner-Nägeli III 321
Charbällä V/2 1017
Charfreitagsblume V/2 709
Charpentier's Mannsschild V/3 1797
Charstli VI/1 283
Chart(e) VI/1 281, 283
Châsblueme VI/2 610
Chaspappele(n) V/1 474
Chatzä-Schwanz I 53
„ -Seich VI/2 634
Chatzatöpli IV/3 1355; VI/1 456
Chatze-Beri IV/2 653
-Blueme (Grossi) VI/1 414; VI/2 609
-Chrut V/4 2369
„ -Münz V/4 2336
Chatzenäugli V/3 1754, 2161
Chatzewädele IV/3 1355
Chaussee-Pappel III 64
Chayote VI/1 314
Chellerschlösseli V/1 91
Chemmirose IV/2 547
Cher(n)gert V/3 1946
Chessali IV/1 345
Chessler V/3 2008
Chestene III 101, VII 27 Fig. 1050
Chestenen-Igel III 101
Chetten-Blueme VI/2 1083
Chettenestöck VI/2 1083
Chienbaum I 98
Chiengsche II 196
Chifel IV/3 1611
„ , Wild IV/3 1546
Chilaschopa V/4 2282
Chilbi-Nägeli IV/1 469
Chilcharosa III 454
Chilche-Blume III 454
-Hoope V/4 2357
„ -S(ch)ope V/4 2357
Chile-Erdbeere IV/2 896
Chile(n)-Mürli VI/1 27
Chile-Söpli V/4 2357
-Sope V/4 2357
„ -Suppe V/4 2282, 2357
Chilenische Grobseide V/3 2106
Chile-Tanne VII 150 Fig. 1178
Chililuzerne IV/3 1263
Chille III 172
Chillesöple V/4 2282
Chillgert V/3 1946
Chinagras III 136; VII 169
Chinde-we-Bluem III 455
Chindli-Chrut II 132
Chindliwehrose III 455
Chinesische Nelke III 319
„ Quitte V/3 1898
Chinesischer Bocksdorn V/4 2565
Chingerte V/1 345
Chinggerte, (Roti) V/2 1545
Chirchesörpfli V/4 2275
Chirchesürpfli V/4 2357
Chiswurze VI/2 1114
Chläb(ara) VI/1 228
Chläbeni V/3 1767
Chläberä VI/2 825
Chläblüs VI/1 228; VI/2 825
Chläffeli VI/1 102
Chlättera VI/1 228
Chlaffe(n) II 196; III 279; V/4 2457; VI/1 74, 102
Chleb-Chrut VI/2 825
„ -Nägeli III 276; V/3 1635
Chleckbeere V/3 1657
Chlee, Ewiger IV/3 1489
„ , Zehnjähriger IV/3 1489
Chlepfer III 279; V/3 2008
Chlepfibeeri V/3 1686
Chlepperli IV/3 1458
Chlêzapfe VI/1 132
Chlibere VI/1 228
Chlömpestock VI/2 993
Chlöpf-Bolle(n) III 554
Chlöpfere III 279

Chlöpfgelte IV/1 345
Chlopfere VI/2 1084
Chlotzhalmä I 294
Chlungeligras I 294
Chnoblech II 226
„ , Wilde IV/1 149
Chnöpfli-Chrut VI/2 787
„ -Gras I 261
Chnolech II 230
Chnollägras I 294
Chnopf-Gras I 261, 294, 383
„ -Halm I 294
Chnopfriesele I 294
Chnosp I 112
„ , Wilde II 29
Chnübrech VI/2 787
Chnüle(n) III 554
Chnule III 554
Chnuppel VI/2 1049
Choel IV/1 242, 247
Chölbli I 112; II 365; III 194
Chölm V/4 2307
Chörbli-(Chrut, Wälsches) V/2 1027, 1042
„ -Gras I 293
Chörbse VI/1 324
Cholbe IV/1 34
-Gras I 211
Cholera-Blume VI/2 944
„ -Distel VI/1 524
Chollaräba IV/1 243, 248
Chollgert V/1 345; V/2 1545; V/3 1946
Chol-Rab IV/1 243, 249
„ -Rose III 455; V/1 464
Chopfwehblueme IV/1 29
Chopfwehblüemli IV/3 1712
Chopfwehblüete IV/2 639
Chorähalm I 294
Chorn I 392, 396
-Blueme IV/1 29
„ , Wissi II 253
-Blüemli VI/1 366
-Blume III 273
„ -Distel VI/2 903
Chorngert(li) V/2 1545; V/3 1946
Chorn-Nägeli III 273
„ -Rose(n) IV/1 29
Choschgets V/4 2309
Chost IV/3 1611
Chostez, (chline) V/4 2309
grober V/4 2328
„ , (reiner) V/4 2309
Chotz-beri V/1 146
Chräb(älla) I 122; V/2 1017
Chräenauga II 269
Chräjemeije V/4 2497
Chrälleli V/1 249
Chrallegras I 261, 383
Chrapfechörnli V/2 1071
Chrazerli, Wilde VI/1 281
Chressa, Wilda IV/1 345
Chressech IV/1 81
Chressig IV/1 81, 345
Chretz-Blueme VI/1 292
„ -Chrut VI/1 292
Chrieli IV/2 1106
Chriesi IV/2 1078
„ -Äugli V/3 1754
Chrippe-Chindli II 132
Chrisnodle I 85
Christ-Beer IV/2 646
„ -Dorn V/1 236
Christi Kreuzblut un Blômen V/1 527
Krone VI/2 917
„ -Leida-Blüamli IV/2 627
Christin(ch)enkraut V/2 1006; VI/1 488
Christkindlhaar I 293
Christöfferli III 477
Christoffel-Chrut III 477
Christophskraut III 477
Christrose III 466
Christus-Auge V/1 598; VI/1 485; VI/2 1007
-Blut V/1 527
-Dorn IV/3 1128; V/1 136, 326
-Fuss II 337, 369
-Krone IV/2 882
-Palme V/1 121
-Rohr I 112
-Schweiss IV/2 537, 1018
„ -Tränengras I 181
Christ-Worzel II 193
„ -Wurz III 466
Chrizliberi V/3 1647
Chröas III 577
Chrömer V/3 2090
Chropfla II 310
Chropfnägeli III 300
Chrotabeeri VI/1 244
Chrotästudä V/2 1477
Chrotechrut VI/1 541
Chrottabeeri IV/2 708, 803
Chrottablüemli IV/2 635
Chrottäblatter III 173
Chrottästudä V/2 1468
Chrottafussl V/2 1164
Chrottawägali VI/1 252
Chrotte-Beeri V/1 345; V/2 1545; V/3 1946; V/4 2566, 2589; VI/1 252
-Blueme III 457; V/4 2566
-Bösche III 457
-Chrut II 229; III 457; VI/2 787
„ -Holz V/1 345
Chrotten-Äugli V/3 1754
„ -Chrös II 139
Chrotte-Pöschä VI/2 1083
Chrotte-Schmeckete V/4 2348
„ -Stude V/1 345
Chrücherli IV/3 1629
Chrützbeeri V/3 1670
Chrützli V/3 1754
Chrütz-Blüemli V/3 1754
-Brötli IV/3 1650
Chrütz-Nägeli III 321
Chrüzerli V/3 1754
Chruselbeeri IV/2 646
Chruserle IV/2 646
Chrut III 214
„ -Dorsche IV/1 245
Chrutgarteschlüsseli V/3 1760
Chrut-Nägeli IV/1 443
„ -Stock VI/2 993
Chrutzele IV/2 646
Chrysantheme VI/2 594
Chuchi-Beterli V/2 1156
-Schelle VI/1 352
„ -Schlösseli IV/3 1367
Chuckraut VI/2 899
Chueblagge VI/2 676
Chuebüpi II 196
Chuechi-Chrut V/3 2223
Chüechli-Kraut V/4 2481
Chüetsche II 196
Chüetschiseckel II 196
Chuelattich VI/2 676
Chümmi(gch) V/2 1182
Chüngäli II 16
Chüngelichrut V/2 1428
Chuengert V/3 1946
Chünig I 112
Chuentsche-Maie II 337
Chürbse VI/1 324
Chürli I 98
Chürpe VI/1 324
Chütz II 16
Chueweiza VI/1 74
Chutscheli III 72
Cinerarie, Grossblumige VI/2 728
Citronelle V/1 68; V/4 2302
Citronenmelisse V/4 2302
Clusius-Schlüsselblume V/3 1776
Convojerl II 274
Coquito-Honigpalme VII 157
Crabbaum VII 185
Creutznaegelin V/3 1758
Cuzco Mais I 180
Cypresse I 82
Cypressenkraut VI/2 672

D.

Daanesel V/4 2457
Daas I 84
Dabernatschen IV/2 651, 652
Dach-Kappes IV/2 522
-Lauch IV/2 543
„ -Pippau VI/2 1165
Dachtraufächrut V/2 1213
Dach-Trespe I 360
„ -Wurz(el) IV/2 543, 547
Dächlichrut IV/2 962
Dähle I 98
Dälerkretz'n V/1 130
Dänckeli V/1 598
Därrfleisch IV/2 972
Dagblôme V/3 2080
Dagussa I 265
Dahlie VI/1 529

Dahn-Distel V/4 2457
„ -Nessel V/4 2462
Daikrause III 441
Daitschen VI/2 993
Dallkrund(wurtel) V/2 1082
Damaschke IV/1 466
Damaste IV/1 466
Damaszenerrose IV/2 993
Damaszener Schwarzkümmel III 474
Damischkerl V/1 548
Dammarge VI/1 276
Danegrösslen I 84
Dangel V/4 2438, 2457
Danikl, Weissa V/2 957
Dank I 141
Dankeli V/1 598
Dannessle V/4 2438
Dannettel V/4 2438
Danoisen V/4 2457
Daoessl V/4 2457
Daofra I 100
Darmadill IV/2 882
Darmtang VII 138
Darmtille IV/2 882
Darrgras I 202
Datschblomm IV/1 29
Dattel-Bohne IV/3 1633
Dattelpalme II 130
Dattelpflaume V/3 1898
, Italienische V/3 1898
„ , Japanische V/3 1898
Daudenblome VI/2 801
Daudistel VI/2 1105
Daünettel V/4 2457
Dauerrang V/4 2394
Daufänger IV/2 962
Daun V/4 2457, 2465
Dauniäddeln V/4 2438
Daunnessel V/4 2462
Daust, Brauner V/4 2328
Dauwegrob IV/1 47
Dauwekirwel IV/1 47
Dax'n I 84
Deandl V/2 1548
Deckeltopfbäume V/2 766; VII 191
Defnerkraut VI/1 524
Dehngras III 191
Deichklette V/2 1058
Deimente V/4 2345, 2351
Deimiänche V/4 2309
Deiwels-Angesicht II 337
-Blume II 337
-Geisele V/2 814
„ -Kersche V/4 2566, 2592
Dêmut V/4 2307
Denggeli V/1 598
Denkelcher V/1 598
Denkraut I 376
Dermendill IV/2 882
Dessel VI/2 874
Destelbrutla VI/2 818
Deufelsbeer V/2 1545
Deuf'ls-Beer V/4 2566
Deuf'ls-Kerschen V/4 2566
Deuflskraut III 464
Deussl VI/2 874
Deutsche Boan IV/3 1556
Flagge IV/3 1456; VII 89 Fig. 1120
Lobelie VI/1 393
„ Schwertlilie II 291
Deutscher Galgant II 47
Ginster IV/3 1210
Jasmin IV/2 639; VII 180 1224
Klee IV/3 1331
Rhabarber III 171
Rispelstrauch V/1 548
„ Wollziest V/4 2424
Deutsches Ammei V/2 1177
„ Geissblatt VI/1 255
Deuweisranken III 511
Diämmerblume VI/2 601
Diärmterblome VI/2 601
Diäspel I 363
Dickblatt IV/2 514, 515
„ -Gewächse IV/2 511; VII 179
Dickdarm V/1 74
Dickenda(r)m V/1 74
Dickkolben VII 157
Dickköppe V/4 2457; VI/2 610
Dickkopf VI/1 292; VI/2 944
„ , Feiner I 306
Dickkoppsgras VI/2 787
Dickkopp(skrut) VI/2 787
Dick-Wurtl III 214
„ -Wurz III 214
Dieb IV/1 345
Diebespfeife V/2 884
Dielebosche IV/3 1719
Dielposs IV/3 1719
Dierkülen I 112
Di(e)rli(-Baum) V/2 1548
Diessel VI/2 846, 874
(Blaue) V/2 979
„ , Rechte VI/2 917
Diestel VI/2 874
Dîgala V/2 1062
Dihmichen V/4 2307
Dill IV/1 263; V/2 1290
Acker- V/2 1293
Garten- V/2 1293
Sowa- V/2 1293
„ , Tauber V/2 1406
Dilledapp IV/2 882
Dilledum IV/2 882
Dill(en) V/4 2574
Dillfenchel V/2 1291
Dilln, Weisse IV/1 276
Dillschei(b)m V/2 1291
Dimchen V/4 2309
Dimerkraut IV/2 547
Dinara-Veilchen V/1 611
Dingel II 382
Dinkel I 391, 392
Dinkelcher V/1 598
Dintebeer V/2 1545
Dintel I 393
Dippdapp V/1 74
Diptam V/1 74
Diptamdosten V/4 2333
Dirlitze V/2 1548
Dirndl V/2 1548
Dirnl-Beere V/2 1548
Dischle VI/2 846
Distel VI/2 845, 1167
, Alpen- VI/2 850; V/2 981
Gelbe VI/2 898
Hügel- VI/2 849
Rauhe VI/2 808
, Strand- V/2 979
Weg- VI/2 858
„ , Zahme VI/2 1162
Dittelkolb I 112
Ditti-Blackä III 173
-Chrut II 132
„ -Placke VI/2 683
Ditzeweck II 196
Djerspel I 363
Do(a)deln V/2 1549
Doan V/4 2457
Dobbengras I 200
Dockaletschen III 173
Döbel I 376
Döörn V/1 236
Döppekraut IV/1 243
Dôfrât VI/1 102
Dogga III 220
„ -Blätter III 173
Dohlrübe VI/1 316
Dohr Nettel V/4 2400
Doktor-Bliemli VI/2 676
„ -Ilie II 235
Dolabana II 242
Dolanotsch V/3 1760
Dolden-Bertram VI/2 614
-Erbse IV/3 1614
-Gewächse V/2 926; VII 193 u. Fig. 988, 993, 994, 1160
-Habichtskraut VI/2 1337
-Spurre III 377
„ -Wucherblume VI/2 614
Dolder VI/1 237
Dolomiten-Fingerkraut IV/2 817
-Glockenblume VI/1 346
-Nelke III 338
-Rapunzel VI/1 380
„ -Schafgarbe VI/2 551
Domärdälla IV/2 882
Domhärenkneipe VI/1 292
Dommeldor IV/3 1222
Donadistel V/2 988
Donardistel V/2 974, 987; VII 193
Donatblätter IV/3 1708
Donderbluome V/3 1635
Donêtl V/4 2438
Donkraut I 376
Donner V/3 1635
-Bart IV/2 522
-Blüeh V/3 1635

Donner-Blume II 237; IV/1 345; VI/1 59, 292
-Bonn(e) IV/2 522
-Käse VI/2 818
-Kerze VI/1 16
-Kräutchen VI/1 83
-Kraut IV/2 522; V/1 163; V/2 814
-Lauk IV/2 522
-Nägele III 298
-Nägeli III 323
-Nelke III 329
-Rosen II 237
„ -Staude V/3 1635
Doodenblome III 301
Dooënblome III 301
Doof-Kletter VI/1 120
„ -Nettel V/4 2438
Doofrik VI/1 102
Doofrit VI/1 102
Doorn V/2 732
Doort V/4 2394
Doow(e)kruud VI/1 102
Doppel-Beri VI/1 252
-Dreizack I 149
-Drilling VII 158
-Kappe VII 176
-Malve VII 188
-Rauke IV/1 208
-Same IV/1 208
„ -Sporn IV/1 20
Doppen I 319
Doppheide V/3 1708
Doran VI/2 563
Dorant V/3 2000; VI/1 20; VI/2 563
Bitterer VI/2 559
„ Weisser V/4 2394
Dorer(salat) VI/1 266
Dore(salat) VI/2 1084
Dornbusch, Brennender IV/2 726
Dornen V/2 979
Dorn-Farn I 21
-Gras I 209
-Melde III 248
-Myrte II 265
-Rosen VI/2 817
„ -Schlea IV/2 1102
Dor(n)schlegel VI/2 974
Dornwurzel-Palme VII 156
Dorotheenstöckel VI/1 414
Dorsche IV/1 245, 252
Dort I 362
Dorwettel V/4 2438
Dos I 84
Dost V/4 2327, 2328
Gële V/1 527
„ , Weisser VI/2 563
Dosten, brune(r) V/4 2328; VI/1 401
Dotebüdele IV/2 915
Dotschen IV/1 252, 255
Dott I 363
Dotter IV/1 368
-Blume III 457; VII 58 Fig. 1094 e
Dotter-Nessel III 141
Douglas Tanne I 81
Dowenwocken I 53
Dowe Rattle VI/1 102
Dowklaub VI/1 102
Dowradel VI/1 102
Drachäschnörrli VI/1 19
Drachenapfel VII 186
Drachenkopf V/4 2360
, Nordischer V/4 2363
„ , Pontischer V/4 2365
Drachen-Kraut IV/3 1200
-Maul V/4 2472
-Mul VI/1 25
-Mund VI/1 343
-Wurz II 136; VII 77 Fig. 1113
„ -Wurzel, Weisse VI/2 885
Dräckret III 205
Dräckröwen VI/2 787
Dräj-Erbis IV/3 1629
Dragon VI/2 635
Dragoner V/3 2194
Draguner V/4 2497
„ , Blaue VI/1 292
Draht-Blume V/3 1887
„ -Schmiele I 245
Draspe I 363
Drauskrût VI/2 620
Drebbs I 363
Dreck-Kraut IV/2 889
-Reik III 205
„ -Säck IV/2 711, 739
Dreeblatt V/3 1957
Dreh-Blütler V/3 1901; VII 197
-Frucht VII 30 Fig. 1052
-Kraut V/2 1457
„ -Moose VII 145
Drehwurz(en) II 384; V/3 2086
Dreiblatt V/3 1957
Dreidorn IV/1 6
Dreifaltigkeits-Blümel V/1 598
„ -Blume V/1 597
Dreifaltigkeit(sli) V/1 598
Dreifaltigkeitsveigerl V/1 598
Dreifüsse II 326
Dreifuss V/2 1212
Dreischwanzgewächse VII 153
Dreizack I 148; VII 152
Dremocksbläder II 16
Dresch-Lein V/1 21
Drespe I 363
Dress(en) I 363
Drieschklee IV/3 1290
Drieschule IV/2 646
Dril-Distel VI/2 899
Drill IV/1 276
Drillingsblume III 266; VII 51 Fig. 1083, 172
Droad IV/1 29
Dröegbad V/1 69
Dröppelkes V/3 1670
Droschel IV/2 646
Drosselbeeren IV/2 708
Drossen I 363
Druden-Füsse I 66
Druden-Kraut I 66
„ -Milch V/1 134
Drückda(h)l I 324; III 264
Drü(ll) IV/1 276
Drüsenglocke VI/1 36; VII 209 Fig. 1260
Drüsen-Klappertopf VI/1 106
Druesnägeli V/3 1635
Drummond's Flammenblume V/3 2113
Drumrumkraut V/3 2086
Drunkelbeere V/3 1603
Drunkelpfeifen I 53
Druschel(e) IV/2 646
Druusenkruud VI/2 620
Druzelhirsch I 193
Dubbele nakenäsken II 310
„ Schneelökskes II 310
Dûbenbeer IV/2 772
Dubweizen VI/1 74
Duddel II 29
Dudelkolben I 112
Dudelsacksblume IV/2 915
Duderkeule I 112
Dudischle VI/2 1105
Dudissel VI/2 1105
Dückergras I 189
Düfels-Neigarn V/3 2080
Düll-Hunnskrut V/3 1969
-Kruud V/1 134; V/3 1272
„ -Wortel V/2 1164
Düln IV/1 263, 276, 368
Dünen-Distel, Blaue V/2 979
-Edelweiss VI/1 457
-Rose IV/2 1051
„ -Stikel V/2 979
Dünn-Sammer I 112
„ -Schwanz I 381
Dürr-Heinzel IV/1 47
Dürr-Wurz VI/1 485, 486
Dütsches Korn I 398
Dütteli-Chrut V/4 2580
Dützekaden II 196
Düvels-Blom VI/2 1083
„ -Köpp V/2 884
Düwels-Appel V/4 2613
-Beeren V/1 345
-Bitt III 552
-Bleme IV/2 522
-Blome VI/2 705
-Drât VI/1 228
-Ki(a)schen IV/2 708
-Krut VI/2 563
-Lus III 554
-Naotgarn III 205
-Neigarn V/3 2090
-Ooge III 600
-Tweern V/3 2090
„ -Wiänt III 205
Dufe I 100
Duft I 363
Duftblüte VII 197
Duftstrauch VII 184, 209

Dufttrichter VII 197
Duhr I 376
Duivelskralle II 337
Dukaten-Blume III 557
„ -Röschen III 557; VI/2 1198
Dulen I 112
Dull-Beeren V/4 2592
Billerkruth V/4 2574
-Krout V/4 2592
-(Krut) V/2 1164; V/4 2574
„ -Wottel V/2 1164
Dum-Palme VII 156
Dummel I 376
Dumm(els)beer V/3 1681
Dummerjan VI/1 487
Dunderkugel VI/2 808
-Male IV/1 345
-Wurzle VI/2 818
Dunengras II 16
Dunerknöpf IV/2 547
Dunk V/2 1082
Dunkel I 392
Dunkelbi(e)r V/3 1603
Dunner-Distel VI/2 821
-Kul I 112
„ -Nettel III 139
Durchholz VI/1 255
Durchröhrle VI/1 252
Durcht I 363, 376
Durchwachs IV/2 522; V/3 1966
„ , Acker- V/2 1106
Durd I 363
Durianbaum V/1 489
Durieu's Weidenröschen V/2 830
Durmetill IV/2 882
Durnbusch V/2 732
Durra I 185
Durst I 363, 376
Durstberi V/3 1603
Duschen IV/1 252
Dusend-Blad VI/2 569
Dusend-Schinkske VI/1 414
-Schönke VI/1 414
„ -Tacken VI/2 570
Dust V/2 757
Duste V/4 2328
Duube-Chröpfli IV/2 802
Duunbeere V/3 1681
Duvelsabbess IV/2 882
Duwenkutschen III 495
Dûwenwagen III 495
Duwock I 53
Dwelk I 363

E.

Eabirn V/4 2595
Ėbaam V/2 916
Ebenauskraut III 529
Ebenholz, Afrikanisches IV/3 1496
„ -Gewächse V/3 1897; VII 197
Eber-Distel VI/2 818
Eberesche IV/2 705, 708, 711
Ebereschen-Spierstaude IV/2 681
Eberraute VI/2 634
Eberreis VI/2 634
Eberreis, Weißes VI/2 644
Eberwurz VI/2 816, 821
„ , Stengel- VI/2 821
Ebhöö V/2 916
Ebischbeere IV/2 708
Ebreiss VI/2 634
Ebsche IV/2 708
Echlar IV/3 1222
Echsenschwanzgewächse VII 165
Echter Jasmin V/3 1907
Speik VI/1 269
„ Staudenmajoran V/4 2333
Eck III 108
„ -Bohne IV/3 1632
Eckenboom III 108
Ecker III 96
„ -Erbse IV/3 1614
Eddernessel III 141
Edel-Disteln V/2 976
-Gamander V/4 2527
-Herzwurz VI/1 475
-Kastanie III 101; VII 27 Fig. 1050
Edelmann-Bettelmann VI/2 609
Edelmannsblume VI/2 609
Edel-Nuß III 7; VII 36 Fig. 1061
„ -Pflaume IV/2 1109
Edelraute VI/2 626, 647, 765
„ „ Schwarze VI/2 645
Edel-Rose IV/2 995
Edeltanne I 82
Edelweiss VI/1 458, 461; VI/2 1365
„ -Baum IV/2 757
Edle Angelica V/2 1338
Eenber II 275
Eerdnâet V/4 2595
Eerdtuffeln V/4 2595
Efa V/2 915
Efeu V/2 914, 915
, Giftiger V/1 220
-Geranium IV/3 1664
-Gewächse V/2 910; VII 193
„ -Sommerwurz VI/1 154
Effe III 118
Effeltenholt V/1 284
Eg VI/2 817
Egel-Chrut V/3 1853
-Gras II 155
-Hüren I 162
-Kraut I 151; III 550
„ -Tier IV/2 1018
Eggenkraut VI/2 768
Eglantier IV/2 1018
Egli-Chrut I 122; II 11
Ehmeli IV/2 1074
Ehren V/1 262
Ehrenpreis VI/1 40, 58; VI/2 1361; VII Fig. 1041, 1162, 1247
Alpen- VI/1 48
Bachbungen- VI/1 63
Berg- VI/1 60
Felsen- VI/1 46
Heide- VI/1 49
Persischer VI/1 53
Ehrenpreis, Schlamm- VI/1 61
Sumpf- VI/1 61
„ , Wasser- VI/1 63
Ehrn V/1 262
Ei, Goldenes II 327
Eibe I 79; VII 150
Eibelbeer VI/1 244
Eiben-Gewächse I 79; VII 150
„ -Kersch I 80
Eibisch V/1 463, 467
„ Stunden- V/1 458
Eiche III 105, 108; VII 47 Fig. 1079 u. 168
Eichen-Farn I 16
-Mistel III 149
„ -Rose VII 47 Fig. 1079
Eidechsenwurz VII 157
Eidernäsdel III 141
Eier-Blättche VI/2 1083
-Blesch VI/2 1083
-Blöme VI/2 1083
-Blom III 459
-Blueme III 522; V/3 1750
-Bluma III 457
-Blum(e) IV/3 1367; V/2 866
-Bohne IV/3 1633
-Brest VI/2 787
„ -Busch VI/2 1083
Eierdorer(salat) VI/1 266
Eier-Dötter III 459
-Flatsche VI/2 1083
„ -Frucht V/4 2587
Eierfruchtbaumgewächse VII 175
Eier-Glockl IV/3 1367
„ -Kuchen IV/3 1367
Eierle III 92
Eier on Spek V/3 2203
Eier-Pflanze V/4 2587
-Pflaume IV/2 1109
-Platzla IV/3 1367
-Pleisch VI/2 1083
-Quatsch III 459
-Risch II 29
-Rötz, Wilde VI/1 212
„ -Schäleli VI/1 331
Eiglbeer V/3 1675
Eilauf V/2 916
Eilauw V/2 916
Eilbëe IV/2 653
Eimkruud I 163
Einbeere II 275
Einblatt VII 179
Einblattkeimer VII 152
Ein-Hack(l) VI/2 901
-Knolle II 362
Einsamähre VII 203
Einsamlappige Blütenpflanzen VII 152
Einkorn I 393
Eipilze VII 140
Einsiedlerrolla III 459
Einzelmähne VII 172
Eis-Blume III 466
-Dotter VI/1 266

Eiseb V/4 2357
Eisen-Bart V/3 2240
-Brech I 44
-Gras IV/3 1222
-Hart V/3 2194
-Hindrik V/3 2241
„ -Holz IV/2 657; VII 180, 197
Eisenholzbaum V/1 500; V/2 780
Eisenhut III 492; VI/1 66; VII 174 Fig. 1216
Eisen-Hütl III 495
Eisenkraut IV/3 1222; V/3 2238, 2240; V/4 2357; VI/2 944
„ -Gewächse V/3 2232; VII 201
Eisenkrottch VI/1 101
Eisenrindenbäume V/2 783
Eisenspäther II 80
Eiserpeter II 62
Eisewig V/4 2357
Eisglöckl V/3 1827
Eisich V/4 2357
Eisick V/3 2241
Eiskraut III 267
Eisop V/4 2357
Eisse(n)chrut VI/1 34
Eissewurz VI/1 34
Eissnach V/2 1393
Eiszapfen-Rettich IV/1 282
Eitableda VI/2 676
Eitazoia VI/2 676
Eiterdistel VI/2 1105
Elbääre IV/2 649, 653
Elber IV/2 899
Elb-Weide III 26
Eldensblum V/2 709
Elefantenapfelbaum VII 179
Elefantenfarn VII 148
Elefantenfuß VII 209
Elemibaum VII 185
Elexen IV/2 1064
Elfenbein-Distel V/2 976; VI/2 923
Elfenbein-Palme VII 157
Elfenbusch IV/2 1064
Elfer VI/1 242
Eliaswagen III 495
Ellend V/2 974, 987
Eller III 92
Ellernboom III 92
Ellhoern, Spaensche V/3 1912
Ellhorn V/1 262; VI/1 237
Ellstab IV/3 1196
Elma III 118
Elsbeerbaum IV/2 719
Elsbirli IV/2 714
Elscherte IV/2 719
Else III 92; IV/2 1064
Elsebeere IV/2 1064
Elsebeeri IV/2 719
Els(em) VI/2 652
Elthören VI/1 237
Elxen IV/2 1064
Elzbeere IV/2 719, 1064
Embeerekreitche IV/1 484
Ember IV/2 768
Emd-Chirbel V/2 1428
„ -Stengel V/2 1428
Emmer I 393
Enbärenstruk I 90
Endivie, Sommer- VI/2 1120
„ , Winter- VI/2 998
Enekenbehrenstruk I 90
Eng(e)lalieb(e)r V/3 1913
Engelar II 315
Engel-Brustwurz V/2 1338
Engeli II 329
Engelkes II 337
Engelliebele V/1 598
Engeln II 53
Engels-Füssle IV/3 1367
„ -Köpf V/1 263
Engelsüss I 41; VII 57 Fig. 1091
Engel-Tier(rose) IV/2 1018
-Tyras IV/2 1018
-Wurz I 41; V/2 1331, 1338
, Berg- V/2 1342
„ „ , Garten- V/2 1342
Englieblin V/1 598
Englische Erbse IV/3 1375
Englischer Ginster IV/3 1209
Senf IV/1 205
„ Spinat III 177
Englisches Raygras I 379
Engliske Deuren IV/3 1190
Engschbeerle IV/2 708
Enl und Anl IV/1 38
Enten-Floss II 139
-Flott II 139
-Gras I 319
-Grün II 139
-Grütze II 139
„ -Linse II 142; VII 158
Enza V/3 1988
Enzian V/3 1979
, Feld- V/3 2029
, Frühlings- V/3 2014
, Getüpfelter V/3 1994
, Karawanken- V/3 2003
, Schnee- V/3 2025
, Schwarzer V/2 1389
, Steirischer V/3 2003
, Südalpen- V/3 2013
, Weisser V/2 1477
„ -Gewächse V/3 1953
Enzio(ne) V/3 1988
Epellern V/1 284
Eperle V/1 284
Epf V/2 1142
Epfa V/2 915
Epha V/2 915
Eppch V/2 915
Eppeeri-Chruut IV/2 826
Epperi IV/2 899
Epphae V/2 915
Eppich V/2 1140, 1142
, Berg- V/2 1386
, Frosch- V/2 1220
, Pferde- V/2 1079
Wasser- V/2 1220
Eppich, Wilder V/2 1393
Erbel IV/2 899
Erbse IV/3 1610
Graue IV/3 1613
Schwarze IV/3 1554
Strand- IV/3 1586; VII 183
„ , Wilde IV/3 1595, 1613
Erbsel IV/1 7
Erbsen-Blüte IV/3 1458
-Kicher IV/3 1585
-Seele IV/1 7
-Strauch IV/3 1400
„ -Wicke IV/3 1519
Erd-Äpfel, Wilde V/3 1844
„ -Äppelkes V/1 474
Erdapfel V/4 2595; VI/1 514
Erd-Artischoke VI/1 514
Erdbeerbaum V/3 1664, 1665
Erdbeer-Fingerkraut IV/2 826
-Gewürzbaum IV/1 14
-Klee IV/3 1316
-Spinat III 231
„ -Wolfsmilch V/1 152
Erdbeere IV/2 895, 899; VII 84 Fig. 1117
Erdbirne IV/3 1591, 1625; V/4 2595; VI/1 514
Erd-Brod V/3 1836
-Buchla V/2 1428
-Efeu V/4 2373
-Eichel IV/2 974; IV/3 1463, 1591; V/2 1191
Erdelen III 92
Erd-Erbse IV/3 1624
-Galle VI/1 38
-Gerste III 542
-Glöckchen VI/1 245; VII 22 Fig. 1034
-Holer V/2 1213
-Holla V/2 1333
-Kastanie V/2 998, 1191
„ , Französische V/2 1195
-Keste V/4 2595
-Kiefer V/4 2539
-Knollen V/2 1189
-Kohlrabi IV/1 252, 255
-Krischele IV/2 766
„ -Kugeln V/3 1844
Erdle III 92
Erd-Mandel IV/3 1463; VII 60, Fig. 1096
-Mäuse IV/3 1591
„ -Möhre IV/3 1420
Erdnuss IV/3 1463, 1591; V/2 998, 1191, 1192; VII 60 Fig. 1096
Erdnüsse VII 142
Erdpin V/4 2539
Erd-Primel V/3 1743
-Pumsa V/4 2595
-Rauch IV/1 45, 47
-Rübe IV/1 255
-Scheibe V/3 1836
-Schierling V/2 1082
-Schocken V/4 2595

Erd-Schucken V/4 2595
-Stern VII 143
-Toffeln V/4 2595
-Weiza VI/1 74
„ -Wicke IV/3 1591
Erika V/3 1690
Erkel IV/3 1591
Erle III 85, 92; VII 50 Fig. 1080
Erlitze V/2 1551
Ermentill IV/2 882
Erper IV/2 899
Erppir(e) V/4 2595
Erschawisch IV/3 1591
Erschen IV/3 1610
Erve IV/3 1512
Erzblume IV/1 425; V/1 607
Erzengelwurz V/2 1338
Escadronkraut VI/2 635
Esch, taag V/3 1926
Eschbeze IV/3 1488
Esche V/3 1919, 1926; VII 54 Fig. 1088 u. 198
Grün- V/3 1922
, Manna- V/3 1922; VII 198 Fig. 1238
, Rot- V/3 1922
Wachs- V/3 1920
Weiss- V/3 1922
„ , Wilde IV/2 708
Eschen-Ahorn V/1 293
Escheritzen IV/2 711
Eschlauch II 232
Eschpaling IV/2 739
Eschper IV/3 1488
Eschütz'n IV/2 711
Esel-Kerbel V/2 996
„ -Peterlein V/2 1017
Esels-Distel VI/2 919
-Fenchel V/2 1286
-Kerbel V/2 1030
-Latche VI/2 676
-Milch V/1 134
-Möhre V/2 1508
-Ohren IV/3 1565
-Peterlein V/2 1030
„ -Wolfsmilch V/1 170
Esepe V/4 2275, 2357
Eske(nboom) V/3 1926
Esp V/1 285
Esparsette IV/3 1487, 1488, 1492
„ , Spanische IV/3 1485
Esparsetten-Stragel IV/3 1430
„ -Wicke IV/3 1528
Espazek IV/3 1488
Espe III 61
Esper IV/3 1488
„ , Wilder IV/2 939
Esperl IV/2 739
Espesett IV/3 1488
Esrog V/1 64
Esselgrün V/3 2090
Esserbse IV/3 1610
Essig-Baum V/1 222
-Bearl IV/1 7
Essig-Flaschl IV/1 7
-Rose IV/2 1002
„ -Scharl IV/1 7
Essikrüegle III 441
Essle III 139
Wildi V/4 2438
„ , Zahme V/4 2438
Essnägeli(bluost) V/3 1912
Estragon VI/2 635
Etagenblume VII 203
Ethrog V/1 65
Eukalyptus, Riesen- V/2 785
Eukalyptus-Weide III 57
Eva II 337; V/2 915
Ewâ V/2 915
Ewek V/2 915
Ewich V/2 915
Ewerette VI/2 634
Ewerez VI/2 634
Ewiger Klee IV/3 1257
Ewigkeitsblume VI/1 469
Eyä I 79
Eynbeerenbom I 90

F.

Fabesplätschen III 171
Facchini's Steinbrech IV/2 601
Fachs I 294, 309, 373
Fackel-Blume IV/1 29
„ -Träger V/1 662
Fadenblatt VII 152
Faden-Hirse I 188
„ -Klee IV/3 1288
Fadenkraut VI/1 450
Acker- VI/1 453
„ , Berg- VI/1 454
Faden-Linse IV/3 1517
„ -Röhre VII 192
Fadernalke III 338
Fächer II 327
„ -Gerste I 398
Fäderä-Chrut II 16
Fädere-Gras I 228
Faegwurzel III 543
Fähnli I 271
Fähnrich V/4 2282
Fänisch I 109
Färbakraut V/1 527
Färbara III 481
Färber-Distel VI/2 986
-Ginster IV/3 1200
-Hülse IV/3 1146
-Kamille VI/1 537
-Kraut IV/1 487
-Ochsenzunge V/3 2205
-Röte VI/1 231
-Saflor VI/2 986
-Scharte VI/2 926
-Strauch, Ägyptischer V/2 747
-Waid IV/1 193
-Wanzenblume VI/1 529
„ -Wau IV/1 487
Fäsa I 391
Fäsaräbe IV/1 258
Fäsocher IV/2 1091
Fässli-Chrut IV/1 7
„ -Struch IV/1 7
Fahlenföt VI/2 675
Fahnenblume VII 157
Fahnen-Hafer I 254
„ -Wicke, Gelbe IV/3 1444
Fahnl III 298
Fahnltrager I 271
Faignwua(r)zl VI/1 34
Fâks I 203
Falche I 373
Falderen V/3 1647
Falk I 330
Falkrikan II 372
Fallkraut VI/2 705
Falsche Alkanna V/3 2205
Hirschwurz V/2 1495
Möhre V/2 1495
„ Lupinenseide V/3 2101
Falscher Andorn V/4 2390
Jasmin IV/2 639; V/3 1951; VII 180 Fig. 1224
Safran VI/2 986
Staudenmajoran V/4 2327, 2330
„ Venuskamm V/2 1032
Falten-Lilie II 213
-Ohr V/2 1173
„ -Schwaden I 320
Falterich II 274
„ , Kleiner II 267
Faltigau II 274
Falzblume VI/1 449; VII 209
Fanderli V/4 2277
Farb-Blu(e)me III 481; IV/3 1200
„ -Chrut IV/3 1200, 1467
Farchen I 98
Fâreek III 111
Farne I 5; VII 148
Farn-Eibe VII 150
Farnkraut I 8
Farnmoos VII 145
Farnpalmen I 73; VII 55 Fig. 1090 u. 150
Farzwurzen IV/1 280
Fasanbeer(e) V/2 732
Faschingwöferl V/3 1750
Faselbohne IV/3 1624
Fasel(e) IV/3 1629
Faselich IV/3 1629
Faserschirm V/2 1131
„ , Ungarischer V/2 1136
Fasiöhl IV/3 1629
Fasola IV/3 1629
Fassaner Steinbrech IV/2 606
Fassbollä II 29
Fasten-Bliemle III 528
-Blümel V/3 1750
-Blume III 528
„ -Veigel V/3 1750
Fastheide V/3 1708
Fatsch I 309
Faulbaum IV/2 708, 1064; V/I 343, 345; VII 187

Faulbaum, Felsen- V/1 349
Faulbeer IV/2 708
Faule Grete V/2 1177, 1272
Gretl VI/2 993
Ma(g)d V/3 1869
„ (s) Liesl V/3 1869
Fauli Gredl V/3 1869
Faulischbeer IV/2 708
Faulkirschen V/1 344
Fax I 373
Feärkenfäute V/2 1213
Fedderbusk IV/2 671
Feder-Blüah V/2 814
-Blume IV/2 972
-Büschel II 16
-Busch V/1 546
-Gras I 203; VII 153 Fig. 1181
„ -Häusche V/3 1887
Federich VI/1 181
Federkohl IV/1 246
Federmistelgewächse VII 169
Federn II 16
Feder-Nelke III 338
-Röschen III 335, 338
-Schwingel I 325
„ -Spiere VII 180
Fegfür-Blueme VI/2 609
Fehsi I 92
Feich I 189
Feichte I 84, 98
Feigbohne IV/3 1148
Feige, Indische V/2 689
Feigel, Blauer IV/1 469
„ , Gelber IV/1 443
Feigenbaum I/LII Fig. 150; III 124, 125; VII 169 Fig. 1209
Feigenkaktus V/2 688; VII 191 Fig. 1232
„ , Kleiner V/2 690
Feigwurz III 542
Feijohle IV/1 443
Feiksbaune IV/3 1629
Fein-Seide V/3 2096
„ , Thüringer V/3 2098
Feissti II 196
Feixdistel VI/2 846
Felber III 15
Felberich V/3 1850
„ , Hain- V/3 1854
Felbrian II 274
Feld-Ahorn V/1 284
-Bacillen V/2 1177
-Basilie V/4 2297
-Beifuss VI/2 666
-Blumen VI/1 366
-Bohne IV/3 1556
-Bulla V/4 2309
-Chelle V/4 2308
-Cypresse V/4 2539
-Dissele VI/2 903
-Distel VI/2 903
„ -Enzian V/3 2029
Felder-Erbsen IV/3 1610
Feld-Gamander V/4 2532
Feld-Georgine VI/1 309
-Gliedkraut V/4 2404
-Glock'n VI/1 352
-Gündel V/4 2308
-Kamillen VI/1 541
-Kölle V/4 2308
-Kömmel V/4 2308
-Kresse IV/1 79
-Krop VI/1 266
-Kümmel V/2 1182
-Lattche VI/2 676
-Lilie II 237
-Magn IV/1 29
-Mannstreu V/2 987
-Massero V/4 2309
-Miezlan IV/3 1322
-Nagele III 328
-Nogerl III 328
-Poleich V/4 2309
-Rösel V/2 721
-Rose IV/2 1000
-Salat VI/1 262, 266
-Senf IV/1 263
-Spinat III 270
-Sternmiere III 359
-Sträußl V/1 101
-Thymian V/4 2308
-Ulme III 119
-Veigerl V/1 598
„ -Wanzen I 293
Fellerstaud'n III 15
Fellriss(wurzel) V/1 478
Fellwurz VI/1 34
Felsa-Mergler IV/2 534
„ -Nägala III 335
Felsekreitche IV/2 522
Felsen-Baldrian VI/1 271
-Bauernsenf IV/1 104
-Berufskraut VI/1 442
-Birne IV/2 755, 756
„ , Kanadische IV/2 756
-Blümchen IV/1 373, 377; VII 178
-Ehrenpreis VI/1 46
-Flockenblume VI/2 942
-Gliedkraut V/4 2405
-Hasenohr V/2 1121
-Heideröschen V/1 580
-Johannisbeere IV/2 650
-Kaktus V/2 693
-Kirsche IV/2 1070
-Kreuzdorn V/1 835
-Kreuzkraut VI/2 779
-Kugelschötchen IV/1 143
-Leimkraut III 287
-Miere III 392
-Nelke III 315
-Peltsche IV/3 1472
-Pippau VI/2 1144
-Segge II 56
-Seidelbast V/2 721
-Steinkraut IV/1 452
-Steinkresse IV/1 112
-Storchschnabel IV/3 1708
Felsen-Straussgras I 227
-Wachtelweizen VI/1 81
-Wermut,GroßköpfigerVI/2656
„ -Wolfsmilch V/1 181
Felsestruuss IV/2 593
Femmel III 133
Femmerten V/3 1681
Fenchel I 193; V/3 1284; VII 193 Fig. 1234
Bologneser- V/2 1287
Esels- V/2 1286
, Garten- V/2 1286; VII 193 Fig. 1234
Gewürz- V/2 1287
Pfeffer- V/2 1286
Wilder V/2 1287
, Zwiebel- V/2 1287
„ -Hirsch I 193
Fenchelholzbaum IV/1 11
Fenchel-Kraut IV/1 47
Fenekretn IV/3 1231
Fennbeere V/3 1686
Fenneblöme VI/1 414
Fennekel V/2 1284
Fennich I 191, 193
Grüner I 192
„ , Welscher I 193
Fennichl V/2 1284
Fennkol V/2 1284
Fensch I 189
Fensterblatt I/XCVII Fig. 149b; II 131; VII 157
Fentjeblöme VI/1 414
Ferkelkraut VI/2 1008, 1355 Fig. 960; VII 212, Fig. 1266
„ , Sand- VI/2 1015
Ferkeskiesch IV/2 725
Ferlach I 37
Fernambukholz IV/3 1127
Ferrsche IV/2 109
Fese I 391
Fetnisjen VI/1 266
Fett-Bohne IV/3 1620
„ -Gras I 148
Fetthenne IV/2 517, 536
„ , Grosse IV/2 522
Fettkes VI/1 266
Fettkraut IV/2 517; VI/1 155, 160; VI/2 1303; VII 24 Fig. 1042, 178 Fig. 1222
„ , Alpen- VI/1 158
Fettkutje VI/1 524
Fettlook VI/2 787
Fett-Miere III 403
-Steert VI/2 787
„ -Wu(r)zl IV/2 522
Fetzalan III 298
Fetzentorf II 16
Feuer-Äuglan V/3 1754
-Auge III 596
-Blume VI/2 705
-Bohne IV/3 1637
-Busch IV/2 693
-Dorn IV/2 684

Feuer-Fahne VI/2 773
-Glucke IV/2 915
-Kraut III 466; V/2 814
-Lilie II 237
-Mohn IV/1 29; I/XLIX Fig. 51; VII 176
Feverkrut V/3 1957
Fichte I 84; VII 151 u. Fig. 1051, 1084, 1163
Fichtenspargel V/3 1597; VII 105 Fig. 1136
Fidelrum VI/1 252
Fiderst III 575
Fiderstängel III 575
Fidertsche III 575
Fieberbaum V/2 781, 783
Fieberheilbaum V/2 785
Fieber-Klee V/3 1957
-Kraut V/1 527; V/4 2510; VI/2 617
Fieder-Zwenke I 370
Fiefadern-Blatt VI/1 181
„ -Krut VI/1 181
Fijäuleken V/1 586
Fijeelken IV/1 442
Fijjelswäcken IV/3 1515
Filderkraut IV/1 247
Fildron-Faldron II 274
Filette III 319
Filigrăzie IV/3 1231
Fillum fallum II 274
Filz-Katzl II 16
-Kloben V/3 1686
-Klobern V/3 1681
-Koppe I 101
-Kraut V/3 2089, 2100; V/4 2435
„ -Rose IV/2 1013
Fimmel III 133
Fimmstaart IV/1 47
Fimsteert IV/1 47
Fîne Grêt IV/3 1231
Fingerfruchtgewächse VII 175
Finger-Glöckerln VI/1 66
„ -Gras I 180
Fingerhoodsblome VI/1 352
-Hot VI/1 352
-Huat VI/1 352
-Huat, Blaua V/3 1998
-Huet V/3 2008
-Hüet, Gäle VI/1 68
„ -Hütla VI/1 69
Fingerhut VI/1 66; VI/2 1362; VII 91 Fig. 1121
, Blauer V/3 2008; VI/1 352
„ , Gelber VI/1 69
Fingerkraut IV/2 809; VI/1 68
, Rotes IV/2 817, 882, 887
„ , Weißes IV/2 823
Finger-Piepen VI/1 66
-Schuh V/3 2008
-Segge II 100
„ -Zahnwurz IV/1 329
Finkel V/2 1284
Finken-Distel VI/2 821, 899
Finken-Kraut II 376
„ -Same IV/1 371
Fîn Margret IV/3 1231
Fiôlke V/1 586
Fioringras I 223
Firnisbaum VII 186
Firobedblüemli V/3 1869
Fisch-Äugele V/3 2161
„ -Äugli V/3 1754
Fischerkip III 495
Fischer's Hohlrippe V/2 1326
Fisch-Grätendistel VI/2 923
-Krut III 577
„ -Minze V/4 2354
Fischschwanz-Palme VII 157
Fisehl IV/3 1629
Fisel(e) I 112; IV/3 1629
Fisole IV/3 1629
Fitschipfeil I 271
Flachs V/1 3, 20
Türkischer I 203
, Wilder I 203
-Lilie II 277
-Nelke III 288
-Saat V/3 2117
-Salat III 269, 270; VII 172
„ -Seide V/3 2102
Flåder(baum) V/1 275
Fläckachrut III 478
Flärgras I 384
Fläschblume II 337; VI/2 944
Fläschebutzer VI/1 283
Flättergras I 228
Flaienkrout VI/2 638
Flakeblätter III 173
Flammeblum IV/1 29
Flammenblume V/3 2113; VII 199
Flander(li) V/4 2274, 2277
Flas, Wille VI/1 25
Flåschblume III 276, 298
Flaschen-Kürbis VI/1 314
„ -Segge II 118
Flaske VI/1 324
Flaskenappel VI/1 324
Flasshaor V/3 2090
Flassiërn V/3 2089
Flasslock I 122
Flassminerâlen IV/1 466
Flatter-Binse II 151
-Gras I 208
-Schmiele I 245
„ -Ulme III 121
Flauderespe III 61
Flaum-Eiche III 112
„ -Hafer I 256
Flechtbinse II 27
Flechten VII 143
Flechtenkraut IV/2 536
Flechtenpilze VII 143
Flechtgras I 383; V/3 2090
Fleckachrut IV/2 918
Fleckblumenkraut VI/1 528
Flecken-Distel VI/2 932
-Kraut IV/3 1388
Flecken-Schierling V/2 1082
Fledder VI/1 237
Fledderbeernbusch VI/1 237
Fledder-Boom VI/1 237
„ -Busk VI/1 237
Fledermüs II 291, 293
Fleesblom III 298
Flegenkrût VI/2 638
Fle(i)sch VI/1 324
Fleisch-Beere IV/2 651
-Blüemli V/3 1754
-Bluem VI/2 944
-Blume III 276, 298, 300; IV/1 345
-Glöckchen IV/2 915
-Hacker III 276
-Kräutchen V/4 2282
„ -Nägeli III 298, 321
Fleisch und Blut V/3 2214
Fleissiges Lieschen V/1 314
Flette III 319
Flettchen III 329
Fleutpiepensklep I 321
Fleutpîpenbom IV/2 708
Flidder-Eschen III 61
„ -Gras I 293
Flider V/3 1912
Flieder V/3 1908, 1912; VI/1 237
Indischer V/1 85
, Persischer V/1 85
Spanischer V/3 1912
„ , Wilder IV/2 971
Fliega-Dreck VI/1 242
„ -Kot VI/1 242
Fliegenkraut VI/2 637
-Orchis II 329
„ -Ständel II 329
Fl(i)er VI/1 237
Flieren IV/1 466
Fliider V/3 1912
Flimmerle I 293
Flinsala I 293
Flinserl I 293
Flirebôm VI/1 237
Flirra V/3 1912
Flitschen I 179
Flittala I 293
Flitter III 61
„ -Barke III 61
Flittere IV/1 353
Flittereske III 61
Flitterich I 293
Flitterpoppel III 61
Flittersche II 310
Flockenblume VI/2 934; VII 212
, Aschen- VI/2 936
, Berg- VI/2 965
, Felsen- VI/2 942
, Perücken- VI/2 958
, Stern- VI/2 978
„ , Walliser VI/2 972
Flöh-Chrut III 201
„ -Kraut I 18; V/4 2339; VI/1 517
Flötzbirn V/4 2595

Floghafer I 253
Flohbadl VI/2 599
Floh-Blumä I 293
-Blume V/4 2428
-Gras I 291, 293
-Knöterich III 200
-Kraut VI/1 486, 487
-Krout III 200
„ -Segge II 57
Floischhockarroashe III 298
Florentiner Habichtskraut VI/2 1229
Flôtenhuolt IV/2 708
Flottgras I 219
Fluagras I 384
Fluderesch III 61
Flüderste II 310
Flüen-Blüemli V/3 1760
„ -Blueme V/3 1760
Flüge-Blüemli II 329
„ -Fänger VI/1 160
Flügelerbse VII 182
Flügelfruchtbaum VII 183
Flügelfruchtgewächse VII 189
Flügel-Ginster IV/3 1195, 1196
-Johanniskraut V/1 520
-Kaktus V/2 696
„ -Lattich VII 212
Flügelnussbaum III 7; VII 167 Fig. 1206
Flügelstielgewächse VII 167
Flügen II 329
Flueh-Buchs V/3 1669
-Chrut V/2 1278
-Gras I 266
„ -Nägeli III 330
Flümli II 16
Flue-Nägeli V/2 716
Fluerösli V/2 716
Flugerschli II 310
Flughabern I 253
Fluh-Bire IV/2 756
-Birle IV/2 682
„ -Salat VI/2 1114
Flunkerbart I 203
Fluss-Ampfer III 178
-Ceder, Kalifornische I 82
-Kreuzkraut VI/2 757
„ -Rebendolde V/2 1270
Fluttermai III 61
Foaste Mandln IV/2 498
Fodaweiss VI/1 458
Föhre I 96, 97
Föllmagen V/1 127
Fölzmaunl II 16
Föse III 481
Foibisplätschen III 171
Foksschwants V/4 2497
Folk V/1 586
Follä-Schaub I 67
„ -Schübel I 67
Folle IV/1 34
Folscher Howern I 261
Forchen I 98
Formosa-Zeder VII 151
Forre I 98
Forrigel I 98
Forsythie V/3 1903
Fossbeeren IV/2 803
Fotzabäsa III 531
Fotzelnägeli III 298, 300
Fotzenkraut III 221
Fotz-Mäuler VI/1 19, 292
„ -Maul V/4 2497
Fraeblume II 337
Främde VI/2 652
Fränkische Wucherkirsche IV/2 1076
Franellen IV/2 937
Frankfurter Rose IV/2 994
Fransen-Binse II 22
-Kante V/3 1976
-Schwertel VII 163
„ -Träger V/1 120
Franzenkraut IV/3 1719
Französische Erdkastanie V/2 1195
„ Königskerze VI/1 10
Französischer Milchlattich VI/2 1098
Französisches Raygras I 260
Franzos III 481
Franzosa IV/3 1574
Franzosechruut V/1 127
Franzose-Kapp III 495
Franzosen III 298; V/3 2214; VI/1 133
-Kraut VI/1 523, 524
-Pippau VI/2 1167
-Schmale I 261
-Salat VI/2 1084
„ -Stengel VI/1 445
Frattpulver I 67
Fratzelnkraut IV/1 21
Fratzenknabenkraut VII 166 Fig. 1202, 1203
Fratzenorchis II 359
Fraua-Distla VI/2 817
„ -Dorn IV/2 1018
Frauä-Rösli IV/2 1018
Fraua-Haar I 26
-Kerza VI/1 16
-Laub IV/2 1018
-Rosa II 315
-Schüali IV/3 1367
-Schühla IV/3 1574
„ -Seckali IV/2 915
Fraue-Draeer II 337
„ -Mänteli IV/2 962
Frauen-Aeugl V/3 1754
Fraue(n)-Beeri IV/2 719
Frauen-Blatt(l) VI/2 599
-Brod IV/3 1331
-Distel VI/2 917
-Dosten V/4 2328
-Drahten II 337
-Farn VII 66 Fig. 1100 u. 149
-Haar I 38; III 151; IV/2 922
-Häubl IV/2 962
-Herz IV/1 20
-Hoar I 203
-Käppeln IV/3 1355
Fraue(n)-Kraut V/1 527
Frauen-Krieg IV/3 1222; V/3 2194
-Mantel IV/2 943, 962
-Minze(n) VI/2 599
-Pliester V/1 527
-Raute VI/2 555
-Rosen IV/2 922
-Salve VI/2 599
-Schmecke VI/2 599
-Schuacherl IV/3 1367
-Schüchl V/1 91
-Schüeli IV/1 38
-Schuh II 326
-Speik V/3 1780; VI/1 382
-Spiegel VI/1 366
-Tränen II 372
-Treu VI/1 82
„ -Viole IV/1 466
Fraue-Schlüssel V/3 1746
-Schücherl V/1 598
„ -Schüeli V/3 1750
Frau Harfenbart I 203
Fraun-Flachs VI/1 25
„ -Haar I 293
Fraun-Schiägl II 326
Frauwendkrut IV/2 972
Freesie VII 165 Fig. 1199
Freielen IV/1 29
Freisam(kraut) V/1 597, 598, 605
Frele IV/1 29
Frengelwurz II 193
Fresche-Blume III 457
-Kiedl V/3 1957
„ -Kohl V/3 1957
Fress-Blumen VI/2 1049
-Erbsli IV/3 1610
„ -Goscherl VI/1 19
Frieblout V/2 709
Friedhofnägeli III 338
Friedlos V/3 1850
Frier un Brut IV/2 522
Friesischer Klee IV/3 1316
Friesli III 338
Friesnägeli III 335
Frikrut IV/1 47
Frobulig V/4 2309
Fröschäblümli IV/2 635
-Bluem III 441
-Blüemli III 457
-Blume III 577
-Chrös II 139
-Müli VI/1 19
„ -Mul VI/1 25
Fröschen-Äugeler V/3 2161
Frösche(n)-Gückele V/3 2161; VI/1 59
Frösche-Schnörrli VI/1 19
„ -Veilchen V/1 619
Fröschpolich V/4 2339
Froiimsblume II 337
Fromental I 260
„ , Alpen- I 295
Fronällästängel V/3 2194
Froschacha IV/2 635

Froschächrut IV/2 635
Frosch-Äugel V/3 2161
-Binse II 156
„ -Biss I 163
Froschbissgewächse I 158
Frosch-Blêtl III 194
-Blume III 457
-Eppich V/2 1220
-Gescherl VI/1 25
-Göscherl V/3 2194
-Göschlein IV/2 635
„ -Kraut I 151
Froschlaich-Alge VII 139
Frosch-Löffel I 151, 153; VII 152
Froschlöffelgewächse I 150; VII 152
Frosch-Mäuler VI/1 25
Frowelig V/4 2309
Früehblueme V/3 1760
Früh-Kartoffel V/4 2600
-Klee IV/3 1328
„ -Linde V/1 446
Frühlings-Adonisröschen III 597
-Ahorn V/1 290
-Barbenkraut IV/1 304
-Braunwurz VI/1 31
-Ehrenpreis VI/1 49
-Enzian V/3 2014
-Fingerkraut IV/2 876
-Heide V/3 1701
-Hungerblümchen IV/1 389
-Kreuzkraut VI/2 781
-Küchenschelle III 530
-Labkraut VI/1 225
-Miere III 400
-Safran II 299
-Schlüsselblume V/3 1749
-Segge II 64, 90
-Walderbse IV/3 1574
„ -Wicke IV/3 1574
Frühmesserln V/4 2554
Früligzitlose II 299
Frûenschoiken II 326
Frume IV/2 1106
Fuchs-Beeri V/3 1670
„ -Blüah III 495
Fuchsenkraut V/3 1852
Fuchsie V/2 801; VII 31 Fig 1953
Fuchs-Rebe V/1 360, 361
-Schmäli I 198
„ -Schwaf III 262
Fuchsschwanz I 216; III 173, 254, 262; IV/3 1328; V/2 814; V/3 1915, 2194; V/4 2432; VI/1 74, 372; VII 171
, Grüner III 264
, Wilder III 265
-Gewächse III 254; VII 171
„ -Klee IV/3 1344
Fuchs-Wedel I 217; V/2 757
-Wurz'n III 495
„ -Zagel I 53; III 264
Fuë V/1 236
Füdläheu I 301
Füer-Blaume IV/1 29
Füer-Blom IV/1 29
-Eeke III 111
-Fünkskes III 600
„ -Ooge III 600
Füernwörtl III 466
Fülifüess VI/2 675
Fülk'n IV/2 1064; V/1 344
Fünffaden VII 204
Fünffinger-Klee IV/3 1379
„ -Wurze I 18
Fünfling VII 207
Fünfwundenblattl V/2 957
Fü(n)fwunde(n)-Blüemli VI/1 37
Fünfwundenblume V/3 1750
Für-Blüemli V/3 1754
-Blueme IV/1 29
-Dissel VI/2 874
„ -Dorn V/2 732
Füre I 98
Für-Nägeli III 323
„ -Rose III 455
Fürtabantl I 197
Fürwitzchen III 338
Fuespeerkraut V/4 2410
Fueterreif II 299
Fuhre I 98
Fuhrmannsblume VI/1 469
Fûlbaum IV/2 719
Ful-Beri V/1 344
„ -Boom V/1 344
Fule Grêt IV/1 47
Fulekischt, Weiße VI/1 244
Ful'Elschen V/3 1869
Fulenzchen V/3 1869
Fulesch V/3 1926
Fulholt V/1 344
Ful-Liese V/3 1869
Fura I 179
Furchen I 98
Furchengeisselträger VII 137
Fu(r)digl III 554, 600
Fu(r)dluaga III 554
Furschpa V/4 2410
Fussangel V/2 884
Fussblatt VII 175
Fussgsparrkraut V/4 2410
Fusterblackä VI/2 686
Fustros III 454
Futter-Biwernell IV/2 937
-Esparsette IV/3 1492
-Gras I 211
-Klewer IV/3 1331
-Platterbse IV/3 1603
-Wicke IV/3 1546, 1549
Fuul-Beeren IV/2 1064; V/3 1603; V/4 2592
-Boom IV/2 1064

G.

Gabelfarne VII 148
Gabelmoos VII 145
Gaberlstupp I 66
Gachelkraut VI/2 569
Gachheil V/3 1869
Gadhahn VI/2 634
Gäälkensaot IV/1 368
Gäbäli I 66
Gäbüse VI/2 647
Gähheil V/3 1869
Gäldseckeli IV/1 345
Gäle Veilcher IV/1 442
Gälhäd IV/3 1196
Gälnase II 235
Gäls Schlüsselblüemli V/3 1750
Gälveieli IV/1 443
Gäl-Vilk'n IV/1 442
Gämschgras I 309
Gängelkraut VI/1 524
Gängsbluem VI/2 609
Gänsäägela V/3 2161
Gänsblomme VI/2 609
Gänschen, Fette IV/2 536
Gänse-Ägelchen VI/1 59
-Blümchen VI/1 414
-Blume VI/2 609
-Distel VI/2 1101, 1105
, Acker- VI/2 1105
„ , Sumpf- VI/2 1102
-Fuss III 217, 219; VII 74 Fig. 1109b und 171
„ , Weisser III 225
-Grau IV/2 889
-Kresse IV/1 395
-Loutschen IV/2 962
-Maie(n) VI/2 609
-Pappel V/1 485
„ -Plâtschel IV/2 962
Gänserich IV/2 889
Gänse-Rolla III 459
-Sterbe IV/1 430
-Wiss IV/2 889
„ -Zunge VI/2 569
Gäns-Füass IV/2 962
-Kragen II 313
-Kritche V/3 1869
-Pappel V/1 474
-Pratzerl IV/2 962
-Totscherl IV/2 962
„ -Tritt V/2 1213
Gärisch, Schwarze V/2 964
Gärtnergras I 192
Gäse V/2 1213
Gässabart IV/2 974
Gätzeli V/3 1844
Gätziöpfel V/3 1844
Gagelstrauch III 10, 11; VII 167
Gaisbaum V/3 1926
Gaise-Blume VI/2 609
„ -Mous V/2 1213
Gais-Fuss V/3 2158
„ -Glöggli II 310
Gaisla-Gräs I 294
Gaispalme V/1 236
Gaiss-Brüüsch V/3 1690
Gaissläuberne Hecka V/1 285
Gaiss-Zöggali II 16
Gakkgommer VI/1 321
Galander V/2 1071

Galeili II 274
Galeise IV/3 1200
Galer Schar IV/3 1200
Galgant, Deutscher II 47
Galgennägel V/2 1508
Galizenpfandl III 561
Galläseckeli I 291
Gallbleaml VI/1 352
Gallenkraut VI/1 38
Gallert-Becherlinge VII 141
-Flechte VII 144
-Pilze VII 142
-Spaltalgen VII 136
„ -Tang VII 138
Galliseli III 561
Gallkraut V/3 1969
Galmei-Veilchen V/1 607
Galt-Chrut VI/1 463
„ -Kraut VI/2 944
Gamander V/4 2522
Berg- V/4 2525
Feld- V/4 2532
Gelber V/4 2524
Kleiner V/4 2532
Salbei- V/4 2534
, Wilder V/4 2534
„ -Ehrenpreis VI/1 59
Gamander-Sommerwurz VI/1 141
Gamperlau II 329
Gamanderlein V/4 2522, 2527
Gams-Bart II 160
-Beere IV/2 757
-Bleaml IV/2 595; V/3 1760, 1782
-Burst II 160
-Gras II 160
-Hadach V/3 1647
-Krass V/3 1647
-Kraut V/2 1319
-Kresse IV/1 132, 358
-Wurz IV/3 596; VI/2 1147
, Gelbe III 546
„ „ , Rote V/3 1891
Ganiterbaumgewächse VII 188
Gansara VI/2 609
Gansbleaml V/3 1746
Ga(n)sblume VI/2 609
Gansbratzen IV/2 889
Ganserer II 139
Gansgogara VI/2 609
Ga(n)skraut IV/2 889
Ganslan III 530
Ga(n)sringala, Grosse VI/2 609
Gantenköppe VI/2 974
Garabanze IV/3 1499
Garbakraut VI/2 569
Garbe(-Chrut) V/2 1183; VI/2 569
Gardaun VI/2 634
Garfwinde III 418
Garganische Purgierdolde V/2 1500
Garnwinde III 418
Garoffel IV/2 918
Garschine III 575
Garsten I 396
Garten-Angelik V/2 1338
-Aurikeln V/3 1770
-Balsamine V/1 313
-Bohne IV/3 1626, 1629
-Brestling IV/2 896
-Dill V/2 1293
-Engelwurz V/2 1342
-Fenchel V/2 1286; VII 193 Fig. 1234
-Hahn VI/2 634
-Hühnchen VI/2 634
-Kerbel V/2 994, 1027, 1029
-Kohl IV/1 242
-Koriander V/2 1071
-Kresse IV/1 81
-Melde III 239
-Milchstern II 254
-Mohn IV/1 33
-Nelke III 319
-Petersilie V/2 1155
-Rapunzel V/2 1223
-Raute V/1 69
-Resede IV/1 484
-Rettich IV/1 280
-Rittersporn III 488
-Salat VI/2 1118
-Salbei V/4 2480
-Scharlach V/4 2487
-Schneeball VI/1 244
-Schwarzwurzel VI/2 1061
-Spargel II 261
-Stiefmütterchen V/1 616
-Strohblume VI/1 469
-Thymian V/4 2307
-Wolfsmilch V/1 186
„ -Zypresse VI/2 644
Garthagel VI/2 634
Garthold VI/2 634
Ga(r)thopf VI/2 634
Ga(r)thua(n) VI/2 634
Gartwurz VI/2 634
Gâseblaume VI/1 414
Gasklee IV/3 1467
Gasparrinie V/2 1298
Gaspeldorn IV/3 1190
Gassblume VI/1 414
Gassen I 395
Gassmattdistel VI/2 1105
Gaste I 396
Gastengras I 398
Gathau IV/2 908
„ , Weisser IV/2 922
Gatscha V/2 1333
Gauch-Blume IV/1 345
„ -Haber I 253
Gauchheil V/3 1868, 1869
„ , Acker- V/3 1869
Gaugla IV/1 288
Gauklerblume VI/1 36, 37; VI/2 1360; VII 74 Fig. 1109f
Gaulkemich V/2 1428
Gause-Blömkes III 542
-Blume VI/1 414
-Patchen VI/1 244
Gause-Poten V/2 1333
„ -Trappe IV/2 889
Geale Davessl V/4 2441
Gebärmutterwurzel V/2 1350
Gebirgs-Blasenfarn I 10
-Hahnenfuss III 573
-Hexenkraut V/2 874
-Rose IV/2 1048
-Weide III 36
„ -Wundklee IV/3 1353
Gebüse VI/2 648
Gedenkemein V/3 2142; VII 200
, Garten- V/3 2145
, Wildes V/3 2144
Geermäder II 193
Geeske V/2 1213
Gees-Kool V/2 1213
„ -Kraut III 352
Geesschank VI/1 244
Geestenkrut V/2 1213
Gefässkryptogamen I 3
Gefiederte Prunkwinde V/3 2076
Gegummer VI/1 321
Gehånnswedel VI/1 212
Gehans-Blom VI/2 609
„ -Drauwe, Schwarze IV/2 653
Gehonsblume VI/2 609
Gehonstich-Blume VI/2 609
„ -Kraut IV/2 522
Geil IV/3 1182
Geilhemp III 133
Geilwurz V/2 1142; VII 164
Geisbart II 160
Geise-Hecke V/2 1545; V/3 1946
-Holz V/2 1545; V/3 1946
-Leiter IV/2 974
„ (n)-Milch V/1 134
Geisen-Schinken V/1 250
Geise-Surampfer IV/1 7
Geis-Haar II 16
-Hasla V/2 1545
-Kraut, (Grosses) VI/2 758
„ -Majoran V/4 2309
Geiss II 369
-Bart IV/2 671; VI/2 634
-Beeri V/3 1946; VI/1 252
„ -Blackä III 173
Geissblatt VI/1 249, 258
, Deutsches VI/1 255
„ Wohlriechendes VI/1 258
Geissblattgewächse VI/1 233; VI/2 1363; VII 207 Fig. 1257
Geiss-Bluemä II 310
-Blüemli II 292; III 522
„ , Gäli III 542
-Chäs VI/1 244
„ -Chlee IV/3 1303
Geisseblüemli VI/1 414
„ , Grosses VI/1 425
Geiss(e)blume, (Grossi) VI/2 609
Geisse-Brot VI/1 252
-Chrut V/2 1213
-Fierzel VI/2 609

Geisse-Giseli VI/1 414
Geisse-Laub IV/1 7
Geisselkaktus V/2 697
Geisselträger VII 136
Geissemaie(n) VI/2 609
Geisse(n)-Baum V/3 1946
Geisse-Rüble IV/1 276
-Schärlig V/2 1213
„ -Tritt V/2 1213
Geiss-Fuss V/2 1212
-Glöckli III 522
-Hasle VI/1 252
-Klee IV/3 1388
, Bergamasker V/3 1171
Oesterreicher V/3 1173
Regensburger V/1 78
Roter IV/3 1180
, Schwarzer IV/3 1169
„ , Weisser V/3 1175
-Krut III 146
-Laube III 588
-Leitere II 269; IV/2 972, 974; V/2 814; V/3 1998; VI/1 252
-Meie III 522
-Nägeli III 522
-Raute IV/3 138, 1642 Fig. 1607
-Schenk VI/1 244
-Tannli I 88
-Tödi I 44
-Uter II 337
„ -Zötteli I 291
Geistbart IV/2 971
Gelbauge VII 176
Gelb-Birke III 75
-Dolde V/2 1077
„ „ , Gespenst- V/2 1079
Gelbe Betonie V/4 2432
Gilgen II 237
Leimsaat V/3 2117
Meien III 561
Schafgarbe VI/2 576
„ Taubnessel V/4 2441
Gelber Enzian V/3 1988
Fingerhut VI/1 69
Gamander V/4 2524
Günsel V/4 2539
Hornstrauch V/2 1548
Jasmin V/3 1951
Klee IV/3 1290, 1355
Plent'n I 179
Speik IV/2 909
„ Wau IV/1 484
Gelbes Bergveilchen V/1 617
Eisenkraut IV/1 164
Mänderle VI/1 42
Mausöhrchen V/3 2173
„ Stiefmütterchen V/1 605
Gelb-Holz IV/3 1145; V/1 47; VII 168, 184
Gelbhornbaum VII 187
Gelb-Klee IV/3 1255, 1290
„ -Kraut IV/1 487
Gelbling IV/2 892
Gelb-Rübe V/2 1508, 1516
Gelb-Stern II 205; VII 159
Gelbsucht-Röserl VI/2 801
Gelbsuchts-Bleameln V/3 1750
Gelb-Wurzel, Kanadische III 453; VII 174
Geld VI/1 102
Geldersche Bloom VI/2 601
Geldsäckelschelm IV/1 345
Geldsecklichrut IV/1 364
Gelen Schelp II 293
Geljehemp III 133
Gelika V/2 1333
Gël(l)-violat IV/1 443
Gelsen IV/2 1064
Gelspeik V/3 1782
Gelster IV/3 1182
Gelstern, Blaue III 495
„ , Gelbe III 503
Gelteblueme IV/1 345
Geltichrutblüemli VI/2 1198
Gel Wewinn III 561
Gel(w)-Sucht-Chrut IV/1 21
Gelzeboum IV/2 1064
Gemsblüh, Blaue VI/1 426
Gemschfachs I 273
Gemsen-Schwingel I 336
Gemshorngewächse VI/2 1363; VII 107 Fig. 1141 und 205
Gemskress(e) III 571, 572; IV/1 357, 358
Gemswurz VI/2 710, 1354 Fig. 958 und 1367
Gelbe VI/2 712
Giessbach- VI/2 715
, Gletscher- VI/2 722
-Kreuzkraut VI/2 751
Gemüse-Artischocke VI/2 924
-Fenchel V/2 1287
-Lauch II 226
„ , Schwarzes V/2 1079
Gensbleamla VI/1 414
Gense-Kraut III 352
„ -Kreitchen V/3 1869
Ge(n)s-Gras V/2 1213
„ -Kraut V/2 1213
Gensringala VI/1 414
Ge(n)sschä(r)tele V/2 1213
Ge(n)sstöck VI/1 541
Genter-Gladiolen II 302
Georgine VI/1 529
Georgirosen III 457
Geranium IV/3 1660
Gerbere II 193
Gerberstrauchgewächse VII 186
Gerber-Sumach V/1 224
Gerlein V/2 1223
Germer II ~~192~~ 241.
, Schwarzer II 192; VII 160 Fig. 1187
„ , Weisser II ~~193~~ 241
Germere II 193, 196
Germsel IV/1 458
Gernegross VII 200
Geröll-Klee IV/3 1309
Geröll-Stiefmütterchen V/1 612
Gerrewurzel VI/2 569
Gerschtl V/2 1213
Gerstä, Wildi I 363
Gerste I 396
Breite I 397
Mehrzeilige I 398
Sechszeilige I 398
Vierzeilige I 398
„ , Zweizeilige I 397
Gerstenwalch I 363
Gertel VI/2 634
Gêsche V/2 1213
Geschmackblätter V/4 2481
Geschwulstkraut IV/1 21; IV/2 522
Geseetche V/1 598
Gesichter, (brete) V/1 598
Gesneriagewächse VI/1 176; VII 205
Gespenst-Gelbdolde V/2 1079
Gessel(e) V/2 1213
Gesundheitstee III 588
Getreide I 388
-Miere III 424
Geweihbaum IV/3 1129
Geweihfarne VII 149
Gewetsche IV/2 1106
Gewitter-Blümel, Weisses III 374
-Blume V/3 1869; VI/1 59
-Glöckl VI/1 352
Gewürz-Baum IV/1 14
-Birnen IV/2 699
-Fenchel V/2 1287
„ -Kerbel V/2 1027
Gewürznelkenbaum V/2 777
Gewürzstrauchgewächse VII 175
Gfählschmäleli I 309
Gfrerbeer VI/1 242
G'hånsblume VI/2 609
G'hansdrauwe IV/2 648
G'heid V/3 1690
G'hoiderer V/3 1690
Giäste I 396
Gibinix VI/1 83
Gicht-Apfel V/3 1844
-Bäumchen IV/2 653
-Beere IV/2 653
-Beri VI/1 244
-Bêrnstrûk IV/2 653
-Bläer III 550
-Holt IV/2 653; V/1 345
-Kraut V/3 1593; VI/1 38
-Kruud III 552
-Rose III 455
-Ruab'n VI/1 316
„ -Stock V/2 1350
Gickel-Hähnchen IV/3 1574
„ -Hoenskämmchen III 298
Gierlein V/2 1223
Giersch V/2 1213
„ , Rauher V/2 1406
Gierschn V/2 1213
Gierske V/2 1213
Giessbach-Gemswurz VI/2 715

Gift-Bäumli V/2 709
-Beere II 275; IV/2 1064; V/4 2560, 2592
-Beeri V/2 709; V/4 2580; VI/1 244, 252
-Blome IV/1 21; V/4 2592
-Bluem III 495
-Blume II 196
„ -Chrut III 495; V/2 1164
Giftfirnisbaum V/1 216
Gift-Hahnenfuss III 545, 552
-Heil III 494
-Jasmin V/3 1951
-Lattich VI/2 1122
-Roashen II 269
-Salat VI/2 1122
-Schwanz III 478
-Sumach V/1 220, 222
-Wicke IV/3 1473
-Woitrich V/2 1164
„ -Würze V/2 1338
Gigenapf IV/1 345
Gigerigkibleaml III 298
Gigeri-Hahner V/3 2214
Giggerahahner IV/1 38
Giggerigibleaml III 300
Gikerl III 495
Gilb-Fennich I 191
-Fuchsschwanz I 219
-Gras VII 155
-Kraut IV/1 21, 23; IV/3 1200
-Weiderich V/3 1850
Gold- V/3 1859
„ „ , Wald- V/3 1854
Gilg II 234
Gilgen II 211
Gilgenstern II 211
Gillwurz(n) II 193; III 470
Gilster IV/3 1182
Gimber VI/2 599
Gimp(e)lbeer(e) IV/2 708; V/3 1946
Gimpelbeere, Rote VI/1 244
Gimps IV/3 1182
Gingellikraut VI/1 532
Ginggelore III 536
Ginschtere IV/3 1182
Ginster IV/3 1198, 1200
, Deutscher V/3 1203
, Englischer IV/3 1190; VII 182
, Färber- V/3 1200
, Flügel- V/3 1196
, Heide- V/3 1203
Sand- V/3 1203
Seiden- V/3 1295
Spanischer V/3 1213
Stützkelch- VII 182
, Zwillings- V/3 1178
„ -Sommerwurz VI/1 148
Gippe V/3 1635
Gips-Kraut III 309; VII 173 Fig. 1215
„ -Chrü(e)sken IV/1 484
Giretmannsblume IV/3 1719
Girgelen V/2 1223
Girsch V/2 1213
Girst I 396
Gisegaiseli VI/1 414
Gister IV/3 1182
Gitterkrautgewächse VII 152
Gitterrost IV/2 703
Gitzibärtli II 16
Gitzibeer IV/1 7
Gixengaxen II 257
Gizer V/1 130
Gläjele II 274
Gläsli, Wildi II 337, 340
Glantsche III 466
Glanzerli III 561
Glanzbüschel VII 203
Glanz-Glas I 196
-Krätzkraut VI/1 308
-Kraut II 293
-Labkraut VI/1 213
-Mispel VII 181
-Peterlein V/2 1272
-Schopf VII 209
„ -Strauch VII 191
Glas-Beeren VI/1 244
-Kirsche IV/2 1076
-Kraut III 142, 143, 144
-Schmalz III 142, 254
-Weide III 20
„ -Weizen I 395
Glatthafer I 260
Gleckerlain II 307
Gleichfaden VII 176
Gleichzipfel VII 209
Gleis III 554
Gleisse V/2 1272
Gleissklee IV/3 1167
Glesser VI/2 610
Gletscher-Gemswurz VI/2 722
-Habichtskraut VI/2 1206
-Hahnenfuss III 573; VII 174
-Linse IV/3 1416
-Moos V/3 1800
-Nelke III 333
-Petersbart IV/2 911
-Raute VI/2 650
„ -Schafgarbe VI/2 558
Glieder-Äuglein VI/1 212
Gliederblattkaktus V/2 695
Glieder-Gras VI/1 212
-Kaktus V/2 693
„ -Krettich VI/1 212
Glied-Kraut V/4 2402
, Bergwiesen-V/4 2404
„ „ , Felsen- V/4 2405
Glinseli, Wissi III 575
Glinzä III 542
Glinze(r)li III 561
Glisserli II 253; III 542
Glitzerli III 542, 561
Glocka VI/1 352
Glockaroashen II 310
Glockawenda V/3 2080
Glocken II 310; III 481
Glocken, Wilde VI/1 361
Glockenblume III 481; VI/1 330; VII 22 Fig. 1035
Acker- VI/1 342
, Ähren- VI/1 337
Alpen- VI/1 337
Dolomiten- VI/1 346
Karst- VI/1 354
Marien- VI/1 331
Nessel- VI/1 343
Rapunzel- VI/1 362
Rasen- VI/1 348
Scheuchzer's VI/1 357
Sibirische L. VI/1 434; VII 208 Fig. 1259
Strauss- VI/1 338
, Wiesen- VI/1 361; VI/2 1359 Fig. 963
Glockenblumengewächse VI/1 328; VI/2 Fig. 963 und S. 1364; VII 22 Fig. 1035 u. 208
Glocken-Heide V/3 1700, 1708
-Modl III 481
„ -Rose III 481
Glockenwindengewächse VII 203
Glocken-Wurz VI/1 475
Glöckchen, Berg- V/3 1829
Glöckel V/3 1816
Alpen- V/3 1817
„ , Weisse III 374
Glöckerl II 307; VI/1 352
Glöckl, (Blaue) III 481, 536, VI/1 352
Glöggli II 313; III 481; V/3 2014
„ -Stock V/3 2114
Glogga(blueme) V/3 2007; VI/1 68
Gloggä-Blüemli V/3 2014; VI/1 352
Gloggara II 310
Glogge(-Blueme) V/3 2080
Glogitzer V/3 1681
Glootwuttel V/3 2224
Glotz-Blumme III 457, 459
„ -Bock V/1 598
Glotzer V/1 598
Gloxinie VI/1 176; VII 205
Glozbeeri V/3 1686
Gluckastock III 481
Gluck'n, Grosse VI/1 360
Glücks-Kraut I 92
-Männlein II 219
„ -Nüsschen V/1 258
Gluf'nstock V/2 1350
Glugge II 196
Glure V/4 2457
Glyzine IV/3 1385
Gnadenkraut VI/1 38; VI/2 1360; VII 204
Gnuwwluch II 230
Goarteel V/3 1869
Goas-Krapfeln, Weisse VI/2 686
-Peitsche V/2 814
„ -Ruabn V/3 1844
Goass-Bart VI/2 637
Goas-Schnappa V/2 814
Gochheel V/4 2380; VI/1 183

Gockeler III 298, 522, 543; IV/1 29; IV/3 1574
Gockeleskern V/1 250
Gocker-Kamm V/4 2497
-Lenze III 466, 536
„ -Schwanz V/4 2497
Goden IV/1 487
Godesfengerchen VI/1 372
Göaesekrut VI/1 414
Göckela VI/1 414
Gögerli IV/3 1574
Gökeler V/4 2497
Gökerleskraut V/4 2282
Gölk V/2 1338
Gölling, (Gähl) VI/2 801
Göneichen I 41
Görbala II 193
Görischgras III 557
Görtl VI/2 634
Gösch V/2 1213
Gösefoot IV/2 615
Götterbaum V/1 80
„ , Chinesischer V/1 81
Götterblume V/3 1732
Götterduft VII 184
Götzenbaum III 124; VII 185
Göumlich I 41
Gogaligo IV/1 29
Gogelscheden IV/1 345
Goggahe(n)la V/3 2214
Gogglhahna IV/3 1574
Goierke V/4 2374
Gokel und Henne III 455
Gold-Äpfel II 236, 238; V/4 2607
-Bart I 183
-Baum V/2 1539; VII 195
-Becher V/3 1903
-Beutel II 327
-Blöme VI/2 801
-Blôm VI/2 1083
-Bluemä VI/2 1147
-Blüemli III 457, 542, 561
-Blume II 236; VI/2 592, 601
-Bölla II 236
-Chrut V/3 1852
-Distel VI/2 821
„ -Emmerchen III 561
Golden Knoopkes III 459
„ Knôpke III 561
Gold-Essel, Rote V/4 2448
-Fingerkraut IV/2 872
-Gilbweiderich V/3 1859
-Göllekreitchen V/3 1969
-Gras I 198
-Haar VI/1 421; VI/2 1365; VII 209
-Häupl II 296
-Hafer I 248
-Hahnenfuss III 566
-Hansel V/1 101
-Ilgä II 237
-Klee IV/3 1293
-Klewer IV/3 1367
-Knöpe III 557
Golden-Knöpfchen VI/1 524
-Köpfl IV/3 1290
-Kolben VI/2 796; VII 212
-Kraut IV/1 21; IV/3 1200; V/3 1859; VI/2 787
Goldlack IV/1 442
Gold-Lärche, Chilenische I 81
-Melisse V/4 2302, 2506
-Nessel V/4 2441
-Orange V/2 1539
-Pfandl II 236
-Pflaume VII 181
-Pippau VI/2 1147
-Primel V/3 1787
„ -Rägen VI/1 215
Goldregen IV/3 1161, 1162; V/3 1859
Gold-Ribisel IV/2 642
-Ritzli VI/2 1147
-Röschen IV/2 665; VII 180
-Röserl V/3 1891
-Rolla III 459
-Rose II 297; VI/2 801
„ -Ruabn II 236, 238
Goldrute VI/1 409; VI/2 1365
„ „ , Kanadische VI/1 411
Gold-Schirm, Acker- V/2 1106
-Schmäli I 198
-Schwanzgras VII 155
-Schwingel I 346
-Spitze I 297
-Stengel VI/2 620
-Stern VII 159
-Strite V/3 1852
-Traube IV/2 642
-Weide V/3 1903
-Wurz(el) II 236; III 481; VI/2 1006; VII 174
„ -Zwifl II 236
Golichter VI/2 1084
Gommer(n) I 394; VI/1 321
Gondling V/4 2373
Gondlkraut V/4 2373
Gonnermoan V/4 2373
Gonnröm V/4 2373
Goosch V/2 1213
Gooseblöme IV/2 889
Gopper IV/1 47
Gopritz V/2 1319
Gordam VI/2 634
Gorkatila V/2 1291
Gorthääl VI/2 634
Gorthard VI/2 634
Gorthe(e)l VI/1 183; VI/2 634
Gos-Fleder VI/1 244
-Flerer VI/1 244
„ -Flirra VI/1 244
Gossel III 15
Gottainherrnsch-Pölsterlain I 294
Gottes-Auge V/1 667
-Gab IV/3 1712
„ -Gnad, Blaue IV/3 1688
Gottesgnadechrut VI/2 917
Gottesgnadenkraut IV/3 1668, 1682, 1712; VI/1 38; VI/2 1360 Fig. 964; I/LXXIX Fig. 107
Gottesgnâdenkrût V/3 1969
Gottes-Hand II 337
„ -Hemdchen V/3 2086
Gotteshilfskraut V/4 2395
Gottesurteilbohne IV/3 1624
Gotthard VI/2 634
Gottheil V/4 2380
Gotthold VI/2 634
Gottvergess(en) V/4 2395, 2400
Gottvergessene Beere IV/2 651
Gouan's Bergfenchel V/2 1231
Goud im Pfoadl V/3 2161
Grababloma III 441
Grabeblueme III 457
Grab-Immergrün V/3 2054
„ -Nägeli III 335, 338
Grabsernägeli V/3 2014
Gracharitze IV/3 1546
Grachel(beere) IV/2 646
Grachelitzen IV/3 1546
Grachetze IV/3 1546
Gräne I 84
Gränke V/3 1651
Gräns I 189
Gränsel IV/2 889; VI/2 569
Gränsing IV/2 889; VI/2 569
Gräntze V/3 1623
Gräser, Echte I 165, 178; VII 153
Gräsfrässer VI/1 181
Gräsing IV/2 849
Gräsp I 84
Grambeer(en) V/3 1603, 1675
Gramille VI/2 581
, Dicki VI/1 536
„ , Falschi VI/1 536
Grammbäre V/3 1686
Gramme I 384
Granatapfelbaum V/2 762
„ -Gewächse V/2 761; VII 191
Granatenbaum VII 185
Granawötholz I 89
Grandl(beer) V/3 1669
Gråne I 84
Grånhax'n V/2 1213
Graning I 253
Granken V/3 1652, 1669
Grannen-Hafer I 246
-Hirse I 190, 207
-Klappertopf VI/1 109
-Labkraut VI/1 210
„ -Schwarzwurzel VI/2 1056
Granten V/3 1652, 1657, 1669
Grantiger Jager IV/2 909
Gras-Bäume II 278
-Bandel I 197
-Blümli VI/1 414
-Blume II 211; III 319, 338
-Erbse IV/3 1604
-Filette V/3 1887
-Gilge V/3 1853
, Stinkad's V/4 2592

Gras-Häre I 319
Grasl IV/3 1257
Gras-Laichkraut I 126
-Latzbeer V/3 1669
-Lilie II 201
-Linde V/1 446
„ -Litzbeer V/3 1669
Graslklî IV/3 1257
Gras-Look II 223
-Nägeli II 337; III 298, 335; VI/2 944
Grasnelke V/3 1885, 1887; VII 19 Fig. 1020
, Alpen- V/3 1891
Gras-Schwertel VII 163
Grasseissen IV/3 1712
Gras-Sternmiere III 356
„ -Veilchen III 522
Gras-Weiden IV/3 1182
Grat-Linse IV/3 1416; VII 183 Fig. 1227
„ -Röschen IV/2 1051
Grau-Erle III 89
-Kresse IV/1 458
-Weide III 26, 34; VII 167 Fig. 1205
„ -Wish II 78
Grazede VI/1 38
Greaschrot IV/3 1183
Greatli im Strus III 475
Grefle V/3 1669
Greibsch I 53
Greisenhaupt V/2 693
Greiserich I 189
Greising I 189, 217
Greiskraut VI/2 787
„ , Topf- VI/2 728
Greizen I 189
Grense I 189
Grensing VI/2 569
Grensink IV/2 889
Greschle IV/2 646
Gretla om Wache VI/2 993
Gretli im Hegli III 475
Gretl im Busch III 474
in der Heck III 474
Huk III 475
„ „ „ Stauden III 474
Griashirsch V/3 2156
Grick III 208
Griechisch-Heu IV/3 1231
Gries-Beer V/2 732
-Blümel IV/1 345
„ -Kraut V/4 2469
Grifette V/4 2497
Grif(f)le V/3 1669, 2014
Grillenkraut VI/1 212
„ -Gras VI/2 570
Grind V/3 2090
Grindelwurz III 173
Grind-Holz V/1 345
-Kopp VI/1 292
-Kraut VI/1 309
-Magen IV/1 29
Grinkens V/3 1969
Grinschel IV/2 646
Grinzegränze IV/2 889
Grischeln IV/2 646
Gritzel V/2 1223
Groägge I 383
Groaschpa V/1 236
Grobseide, Chilenische V/3 2106
„ , Nordamerikanische V/3 2104
Groburach V/2 1477
Gröentje, Wilde V/2 1272
Gröfli V/3 2014
G'röhr I 112
Grönte V/2 1156
Gröschel(gras) VI/1 102
Groetmoeders Mütz III 495
Groffeln III 319
Groffensnal V/3 1912
Groffwisk II 78
Gromper V/4 2595
Groschenblatt VI/2 698
Grossbohne IV/3 1556
Grosser Heinrich VI/1 475
„ Speik V/4 2276
Grossmütterli VI/1 59
Grossmutterhaar I 339
Grossom I 211
Grosswedendünk V/2 1006
Grosworzel I 383
Groten I 164
Grotvatersblêder V/2 916
Grotza I 84
Groulkraut V/4 2308
Grube IV/1 255
Grücken III 208
Grüfle V/3 1669
Grünährengewächse VII 165
Grün-Algen VII 137
Grüne Knoten IV/2 1106
Grüne Minze V/4 2351
Grünerle III 87
Grüner Milzfarn I 27
Grüne Rossminze V/4 2351
Grün-Esche V/3 1922
-Holz IV/3 1922
-Kern I 392
-Kohl IV/1 245, 246
„ -Kraut III 270
Grüttblom III 577; IV/1 345, 364; VI/1 274; VI/2 570
Grütte I 188
Grützblume IV/1 107, 396; VI/2 570
Grumbeer V/4 2595
Grumbern V/4 2595
Grumbir V/4 2595
Grummetblümel VI/1 83
Grumper V/4 2595
Grund-Birne V/4 2595; VI/1 514
Grundfeste VI/2 1162
Grundheelenbloar VI/1 34
Gründheil V/1 511; V/2 1386; V/3 1869; V/4 2537; VI/1 401
„ , Rotes V/3 1869
Grund-Kresser IV/1 319
Grund-Nessel I 159
-Nettel III 577
-Räbe IV/1 258
„ -Rebe V/4 2373
Grûnschau(b) IV/3 1231
Gruper(li) IV/3 1629
Grusch IV/3 1183
Gruschel IV/2 646
Gryfeln V/3 1669
Gschlätterblackä VI/2 683
Gseilaz V/2 709
Gspetzlechrut V/2 1017
Gstechate Dörn VI/2 874
Guayava, Chinesische V/2 776
Guayule VI/1 533
Guckernagerl V/3 2014
Guckigauch VI/2 1049
Guckucksblume IV/2 1200
Gückuf III 522; IV/1 345
Gu(d)nkirschen V/4 2589
Gu(d)nstinkala IV/2 639
Güdelbeeri V/3 1603
Gügali V/2 1333
Gügarügü IV/1 38
Güggäugele VI/2 1049
Güggel-Blueme IV/1 38
-Chambe II 302
-Hose V/3 2214
„ -Maie(n) IV/1 29, 38
Gügger-Beri VI/1 244
Güggili V/3 2214
Güldengünsel V/4 2541
Güleli II 337
Güli II 337
Gülke VI/2 801
Güllak(e) IV/1 442
Güller V/4 2497
Güllwurz III 466
Günsel V/4 2537
, Berg- V/4 2545
Gelber V/4 2539
, Heide- V/4 2543
„ , Pyramiden- V/4 2545
Günzel V/4 2537
Gürgütsch IV/2 708
Gürmsch IV/2 708
Gürtele VI/2 634
Gürtelgeranium IV/3 1663
Gürtelklaue VII 205
Gürtelstorchschnabel IV/3 1663
Gürtler VI/2 634
Gütterli IV/2 646
Gufenöli V/1 586
Guga V/2 1333
Guga-Bleamli II 257
„ -Chrut V/2 1333
Gugakas IV/3 1650
Gugarutz I 179
Gugatzblüml II 336
Gugazer V/4 2537
Gugelgaich VI/2 1049
Gugelgau VI/2 1049
Gugelkraut V/4 2541
Guger II 336

Guggablüml II 336
Guggasli II 299
Guggauch(e) VI/2 1049, 1084
Gugge V/3 1681
Guggelore III 536
Guggerbeeri IV/1 7
Guggerbluem(e) III 457; IV/1 38, 345; VI/1 201
Gugger-Blume III 298
„ , Gelwe III 520
-Brod IV/3 1650
-Chäs IV/1 345; V/3 1827
-Chindli II 132
-Chrut III 180; IV/1 7; IV/3 1650
-Haber II 183
-Hirs II 183
-Klee IV/3 1650
-Laub IV/1 7
-Maie III 457
-Schmirba III 457
„ -Schuh II 326; V/3 2008
Gugghudel II 369
Guggisur III 180
Guggizer IV/3 1650
Guggl IV/1 34
Gugglhansa VI/2 620
Guggochblüemli III 522
Guggochesblueme III 298
Guggol III 273
Guggu II 257
Guggublueme III 522
Guggucher III 522
Guggucherli III 522
„ , Roti III 529
Guggu-Handschuh V/3 2008
Guggumerechrut V/3 2230
Guggu-Nägeli III 298
Gu(go)meanblerer V/3 2230
Gugotzakraut III 180
Gugubleameln II 336
Guguche VI/2 1084
Gukummer VI/1 321
Guldamån V/4 2337
Gulderlinge IV/2 748
Guli IV/1 38
Gulipa II 242; IV/1 29
Gulle IV/1 29
Gullerwadel V/2 757; V/4 2416
Gumeli V/3 1844
Gumermå V/4 2373
Gumirum V/4 2373
Gummer I 393
Gummibaum I/LII Fig. 150; III 124; V/2 782; VII 169 Fig. 1209
Gummi-Pastinak V/2 1360
„ -Wurz V/2 1359
Gundelkraut V/4 2373
Gundelrebe V/4 2372, 2373
Gundelrieme V/4 2373
Gunderer V/4 2373
Gunderlunze V/4 2373
Gundermann V/4 2373
Gundräbli V/4 2373
Gundram V/4 2373
Gungl II 195
Gunkerscht'n V/4 2580
Gunnelreif V/4 2373
Gunnerle V/4 2308
Gunnröbe V/4 2373
Gunsel V/4 2537
Guntare III 214
Gunzel V/4 2537
Guomol III 146
Guretsch IV/2 708
Gurgetschbeeri IV/2 708
Gurke VI/1 319; VII 35 Fig. 1059
Gurken-Baum IV/3 1645
-Dill V/2 1291
„ -Kraut V/2 1291; V/3 2230
Guter Heinrich III 219; VII 74 Fig. 1109 b
Gutschli II 337
Gutterebeere IV/2 646
Guttibaumgewächse VII 189
Gutzegagel II 336
Gwannepotsch VI/1 292
Gweischwurz IV/3 1222
Gwind II 281

H.

Haad V/3 1690
Haakäsen IV/2 725
Haanapel IV/2 725
Haaneschikelcher IV/3 1367
Haar V/1 20
-Beeri IV/2 768
-Birke III 76
-Blume VII 208
„ -Dolde V/2 1175
Haarellen IV/2 646
Haarepier V/3 1675
Haar-Farn VII 148
-Gerste I 400
-Gras II 23, 64
-Gurke VI/1 327
im A.... III 531
-Latsch II 326
-Milzfarn I 26
-Moose VII 146
-Nixe VII 173
-Pfriemengras I 205
„ -Same VII 205
Haarstrang IV/2 974; V/2 1295, 1364
Berg- V/2 1386
, Riesen- V/2 1401
„ Sumpf- V/2 1393
Haarstrinzen V/2 1397
Haar-Weibchen VII 208
-Wutzel IV/2 977
„ -zageln VI/2 634
Haasechöhl VI/2 1105
Haber-Beer IV/2 772
-Blume III 536
-Distel VI/2 903
-Distla VI/2 903
-Gaisa VI/2 903
Haber-Gras I 363
-Gucken V/2 1508
-Kriese IV/2 1106
-Malch VI/2 1049
-Margste VI/2 1049
-Mark(ele) VI 2 1049
-Mauch VI/2 1049
„ , Wilder II 269
„ -Mulche VI/2 1049
Habern I 254
Haberschlehe IV/2 1106
Habichtskraut VI/2 1182, 1367
Alpen- VI/2 1305
Dolden- VI/2 1337; VII 212
Florentiner VI/2 1229
Gletscher- VI/2 1203
Hasenohr- VI/2 1244
Mauer- VI/2 1273
Natternkopfartiges VI 2 1227
Öhrchen- VI 2 1203
Orangerotes VI/2 1211
Savoyer VI/2 1340
Trugdoldiges VI/2 1221
Wald- VI/2 1279
Wiesen- VI/2 1216
„ , Zottiges VI/2 1252
Habmichlieb V/3 1782
Habrat VI/2 634
Hâbutje IV/2 976
Hackbart II 54
Hackeln IV/3 1222
Hackenschar III 219
Hackmesser V/1 263
Hâd(a)ch V/3 1690
Hadd(er)ik IV/1 276
Hadenuss-Stude III 71
Haderlump III 180
Hadernläus VI/1 516
Had'l I 254
Hâdorn IV/2 725
Hääg V/4 2563
Häälroff V/4 2373
Häale V/3 2214
Häbök III 66
Häcktskraut I 163
Häd V/3 1690
Hädderich IV/1 246
Hädelisch III 208
Hädelkorn III 208
Häderich IV/1 263, 276
Häenk I 113
Hägela IV/2 725
Häglidorn IV/2 976
Hähdorn IV/3 1222
Hähnakrax'n VI/1 258
Hähncher IV/1 38
Hâëk IV/1 246
Hälerei V/4 2373
Hälestock VI/2 1083
Hälichrut III 219
Hällbeere V/3 1675
Hälmerchen VI/2 581
Hälmrichen VI/2 581
Hälwurzel V/3 2223

Hämmelschwanz III 72
Händscheli V/3 1746
Hänenswark III 352
Häneputtchen IV/2 976
Hänge-Birke III 78
Hännep III 130
Hänsch III 208
Häntscheblueme V/3 2214
Häntscheli V/3 1760
Härekorre III 208
Härekrut V/2 866
Härk IV/1 263
Härsch V/2 1213
Härtlinge IV/2 1093
Häschbele IV/2 739
Häsk V/2 1213
Hätschele VI/1 266
Häubel IV/2 905
Häupel VI/2 1119
Häupelkraut IV/1 243
Häuptelsalat VI/2 1119
Häwerlüs VI/1 517
Hafer I 252, 254
-Blume, Gelbe II 211
-Gras I 261
„ „ , Gelbes I 248
Haferl V/3 2086
Hafernessel III 141
Haffdorn V/2 732
Hafta VI/1 228
Haftdolde V/2 1052, 1061
„ , Möhren- V/2 1062
Haftemasch VI/1 228
Hagaloia IV/3 1222
Hag-Beri VI/1 252
Hageböcke III 66
Hagebuche III 66
Hagebutte IV/2 976
Hagedorn IV/2 725
Hagel-Dorn IV/2 1102
-Nägele III 298
Hagenäpfle IV/2 977
Hagenuss III 71
Hagewiepkes IV/2 725
Hag-Öpfeli IV/2 725
-Rösli IV/2 976; VII 95 Fig. 1122
„ -Rüebli VI/1 316
Hâhiefe IV/2 976
Hahndorn, Gemeiner IV/2 727
Hahne-Dorn IV/2 725, 976
-Kehlche IV/1 38
-Kep IV/2 939
-Knöchelcher IV/1 38
„ -Köpp V/4 2450
Hahnenblume IV/3 1712
Hahnenfüssle VI/1 255
Hahnenfuss III 540, 561; VII 175
, Acker- III 554
Alpen- III 571
Berg- III 564
, Gebirgs- III 575
-Gewächse III 452; VII 175
, Gift- III 545, 552
Hahnenfuss, Gletscher- III 573; VII 175
, Knollen- III 556
, Wald- III 559
-Gewächse III 452; VII 175
„ -Hasenohr V/2 1122
Hahnen-Kamm III 546; IV/3 1485, 1487, 1488
-Kamp(el) III 546; V/4 2497
-Kassen IV/1 368
-Kopf V/4 2457
„ , Italienischer IV/3 1485
-Plampe IV/3 1314
„ -Sporn V/4 2270
Hahner(l) IV/1 38
Hâhnkamm III 262
Haidamesser II 302
Haidarösla V/2 716
Haideblume IV/3 1196
Haideflättchen III 329
Haid'n III 208
Hain-Ampfer III 176
-Augentrost VI/1 89
-Buche III 66
-Felberich V/3 1854
-Hasenohr V/2 1108
-Hiffe IV/2 976
-Klette VI/2 829
-Kraut VII 173
-Kreuzkraut VI/2 758
-Rispengras I 315
-Salat VI/2 1002
-Salbei V/4 2501
-Simse II 173
„ , Grosse II 177
-Sommerwurz VI/1 147
-Veilchen V/1 635
-Wachtelweizen VI/1 76
„ -Wicke IV/3 1519
Haken-Dorn IV/3 1124
-Kiefer I 103
„ -Lilie VII 162
Hakennarbengewächse VII 167
Halbe Kuh III 174
Halber Gaul III 174
Halbes Ross III 174
Halbgriffel VII 205
Halb-Palmen VII 157
-Pferd III 174
-Ross III 174
„ -Zypresse VII 151
Haldenmändle IV/2 931
Halem I 236
Halfa I 202
Halftere VI/1 242
„ , Roti V/2 1545
Haligensigl II 269
Halligblume V/3 1882
Hallimasch IV/2 754; VI/1 422; VII 142
Halmägras I 261
Halm-Ruabe IV/1 258
-Rübe IV/1 261
-Schmalä I 261
Hals-Chralle V/1 249
Halsen V/1 236
Halskraut VII 208
Halsrose V/1 464
Halswehkraut V/4 2380
Hambörger Mützen III 495
Hâmbuche III 66
Hambutte IV/2 976
Hammele III 194
Hammel-Kraut IV/3 1591
-Schwanz II 360; III 194, 239
„ „ , Grosser VI/1 16
Hammel(s)möhre V/2 1406
Hammerich I 393
Hammerl I 363, 376
Hammerstrauch VII 203
Hammerwurz II 193, 196
Hamp III 130
Hampf, Wilde(r) V/1 126; VI/1 445
Hampfelisur III 180
Hampfets III 561
Hampfis III 561
Hampletschen III 171
Hân II 33
Hanakemp III 546
Hanala V/2 1333
Hânbooke III 66
Handifftche VI/2 998
Handkraut II 337, 365
Handlwurz II 337
Handorn IV/2 725
Handschäbluemä V/3 1760
Handscheblüemli V/3 2214
Handschechrut V/3 2214
Handschuh III 481
„ -Blüemli V/3 1746
Hânebolten I 115; II 33
Hanech'ln I 84
Hanekam VI/1 102, 120
Hanekloaeten II 196
Haneklöt V/1 249
Hânekopp VI/1 120
Hânenfoot III 254; IV/2 805
Hânenpötzen IV/2 976
Hanetabbe VI/1 458
Hanf III 130
Gelber V/1 663
, Wilder V/4 2457
„ -Nessel V/4 2457
Hânfoot III 418
Hanf-Palme VII 156
-Rose V/1 454
„ -Stockrose V/1 465
Hanftod VI/1 133
Hanf-Weide III 26
Hangemonde IV/2 931
Hangessl V/4 2441
Hanjelik'n V/2 1338
Haning-Kraut VI/1 316
„ -Wurz VI/1 316
Hânklêsschen IV/2 725
Hanl III 455
Hannakamb III 262
Hannotterblôm IV/1 345

Hanns-Blumen VI/2 705
„ -Kiesche IV/2 648
Hans, (Langa) V/3 2194
Hansischliaf I 398
Hansistriiweli IV/2 648
Hansl am Weg III 191; VI/2 993
Hans und Grete II 337
Hans un Tâlke II 337
Hantje un Hentje III 455
Hantscheli V/3 1760
Haoldoor IV/3 1222
Haonblam III 298
Haorthieken IV/3 1222
Haothiekel IV/3 1222
Happelbort, Grosser IV/2 971
Happelsalat VI/2 1119
Harasch IV/1 276
Hareindraher I 191
Harfenfichte I 88
Hårkraud V/3 2090
Harmchen VI/2 581
Hårn III 208
Harnettele III 141
Harngras I 31
Harnischwurz II 269
Harn-Kraut IV/3 1222, 1420; V/3 1593; VII 173
-Samen IV/1 345
„ -Strauch III 151
Harnwindkraut IV/3 1420; VI/2 768
Harråck IV/1 276
Harrbom VI/1 244
Harrik IV/1 263
Harrschle III 298
Harstrank V/2 1364
Hart-Äpfel V/4 2595
-Bäm V/1 284
„ -Boom V/2 1545
Hartelbâm V/2 1545
Hartenau V/1 526
Hartern V/2 1545
Hartgras I 298
Hartheu V/1 502; VII 189
, Tüpfel- V/1 526
„ -Weidenröschen V/2 829
Harthiekeln IV/3 1209
Hartholz V/1 284
Hartjebâm V/2 1545
Hartkopp IV/2 937; VI/2 944, 974
Hartmann VI/2 993
Hartriegel V/3 1946
Roter V/2 1545
„ , Schwedischer V/2 1554
Hartrüetle V/2 1545
Hartsteinpflaume VII 186
Hartüätle V/3 1946
Hartweizen I 395
Harunggele III 557
Harwstkruud VI/1 524
Harz-Birke III 78
-Breste(n) VI/1 215
-Klee IV/3 1384
-Nägeli III 276; V/3 1635
-Preste VI/2 787
Hasämänteli IV/2 962
Hasätopä V/2 1213
Hasakraut V/2 1017
Hasapfeffer III 161
Hase-Blätter III 161
-Brot IV/1 7
-Büseli III 72
„ -Chlee IV/2 949
Haseg(n)garn V/3 2090
Hasekehl IV/1 149
Haselätsch VI/1 292
Hasel-Blaume III 529
-Blümel V/3 1844
-Eiche III 108
-Erle III 85
-Gumeli V/3 1844
-Münich III 529
„ -Musch III 161
Haselnuss III 71; VII Fig. 1105, 1107, 1118
Haselöffel VI/1 292
Hasel-Rübe V/3 1844
-Wörzli V/3 1844
„ -Würze V/3 1844
Haselwurz III 160
Hasemattdistel VI/2 1105
Hase-Meilche VI/1 19
-Müli IV/3 1489
„ -Mul VI/1 19
Hasen-Aug IV/2 917
-Barm IV/3 1203
-Brahm IV/3 1182
„ -Brödle I 293
Hase(n)brod I 293; IV/3 1650; V/3 2223
Hasenbrot I 292; II 29, 183; VI/2 1049
Håsenehdl V/3 2199
Hasenfuss-Segge II 71
Hasen-Gêdt IV/3 1182
-Geil IV/3 1182
-Glöckchen II 249
-Klee IV/3 1156, 1255, 1290, 1322, 1640 Fig. 1606, 1645, 1650
, Roter IV/3 1346
„ , Ungarischer IV/3 1350
-Kohl V/1 474
-Kool IV/3 1650
-Kopf, Blauer VI/1 391
„ , Roter V/3 1887
-Kräutich IV/3 1182
-Kraut VI/2 1165
-Krottch IV/3 1182
-Kümmel V/2 992
-Lattich VI/2 1000, 1180
-Mäuler, Einfache VI/1 25
-Maie III 457
„ -Moos IV/3 1650
Hase(n)mülele VI/1 19, 25
Hasen-Mus VI/2 1000
-Öhrl III 161; VI/2 1273
„ -Öhrli V/3 1844; VI/1 372
Hasenohr I 156; V/2 1094; V/4 2302
Hasenohr, Binsen- V/2 1114
Felsen- V/2 1121
Hahnenfuss- V/2 1122
Hain- V/2 1108
„ , Salztrift- V/2 1118
Hasen-Ohra III 279; VI/1 181
-Ohre V/4 2497
-Ohren V/4 2424; VI/1 292; VI/2 1198
Hasenohr-Habichtskraut VI/2 1244
Hasen-Pappel III 161; V/1 474, 485
-Pfitl II 183
„ -Pfoten IV/3 1367
Hasenpfotenbaum VII 188
Hasen-Poten IV/3 1322
-Schertele V/2 1213
„ -Schmiele II 183
Hâsensteert IV/3 1322
Hâsentâlke II 337
Hase-Orn VI/2 1273
-Pietche IV/3 1367
-Pot IV/3 1367
-Rüetle V/2 1545
-Scharte VI/2 1105
-Tätsch VI/1 292
-Tatze VI/2 676
„ -Worze III 161
Hasle III 71
Hassel III 71
Hassel-Blaume III 522
„ -Voaltcher III 529
Hatsch III 208
Hattdiessel VI/2 874
Hattelhirsch I 188
Hattl I 254
Hatt'n III 511
Haubma IV/2 962
Hauer-Läus I 191
„ -Lais VI/1 517
Hauf III 133
Hauhechel IV/3 1215, 1222; VII 182
„ , Gelbe IV/3 1217
Hauläuse VI/1 517
Hauler(t) VI/1 237
Haumbodden IV/2 976
Haus-Ampfer IV/2 547
„ -A(n)brenner V/3 2014
Hauswurz IV/2 543, 547
, Echte IV/2 547
„ , Falsche IV/2 595
Hauswurzel IV/2 522
Haut-Baum V/1 345
Hautfarne I 7; VII 148
Hau(w)-Chrut IV/2 522
Hauwe I 254
Havel-Militz I 195
Hawäi V/2 916
Haweîke IV/2 725
Haweresch IV/2 708
Hâwermünnenkrut IV/2 931
Hâwiweke IV/2 725
Hawodele IV/2 976
Heanadarm V/3 1869
Heankbeer IV/2 768

Hechelkamm V/2 1037
Hechle IV/3 1222
Hechtkrut I 122
Hechtlock I 122
Heckebeere IV/2 772
Heckelabe I 98
Hecke(n)beere IV/2 646
Hecken-Ditzchen II 132
-Kälberkopf V/2 996
-Kerbel V/2 1052, 1085
-Kirsche VI/1 249; VII 207 Fig. 1257
„ , Alpen- VI/1 253
-Knöterich III 205
-Körfel V/2 1052
„ -Püppchen II 132
Heckenrose IV/2 976
„ , Gemeine IV/2 1031
-Same IV/3 1190
-Taubnessel V/4 2448
„ -Veilchen V/1 649
Hedderk IV/1 276
Heddernettel III 141
Hedere, Weisser IV/1 276
Hederich IV/1 263, 276; V/4 2374
„ , Saurer IV/1 299
Hedorn V/3 1690
Heedelbeere V/3 1675
Heedorn IV/3 1222
Heenk II 33
Heerabluama III 454
Heerächäppli V/1 249
Heeraschlösseli V/3 1750
Heerezeicheli V/3 1750
Heerske V/2 1213
Hefepilze V/1 400; VII 140
Hegerli II 310
Heggemoos V/2 1213
Heibeer(i) V/3 1675
Heidbeën, Roë V/3 1686
Heiddorn IV/3 1209
Heide III 208
Heidebart VII 196
Heidecker IV/2 882
Heide-Ehrenpreis VI/1 49
-Erbse IV/3 1580
-Gewächse VII 195
-Ginster IV/3 1203
-Günsel V/4 2543
-Johanniskraut V/1 523
-Köpfli IV/2 937
„ -Kraut V/3 1689
Heidekrautgewächse V/3 1609; VII 195
Heide-Küchenschelle III 534
Heidelbeere(n) V/3 1603, 1667, 1674
Heidelbeeri V/3 1675
Heide-Leimkraut III 288
Heideln VI/1 83
Heidel-Weide III 33
Heide-Myrte III 11
Heide(n)brest VI/2 787
Heiden-Korn III 207, 208
-Rettich IV/1 276
Heiden-Rub IV/1 276
Heiderich IV/1 276
„ , Alpen- V/3 1701
Heideröschen V/1 579; V/2 716; VII 189
„ , Felsen- V/1 580
Heide-Segge II 90
-Veilchen V/1 619
-Wicke IV/3 1525
„ -Zindelkraut V/3 1965
Heidklöckskes V/3 1708
Heidnisch Korn III 208
„ Wundkraut IV/3 1364
Heidsiern V/3 2089
Heidstäkers IV/3 1209
Heil aller Schäden V/2 957
alle(r) Welt IV/2 918; V/3 1869
„ aller Wunden III 478
Heilands-Bleamla IV/2 627
-Brot IV/2 915
-Distel VI/2 917
-Rösli IV/2 1018
„ -Schmecke IV/2 1018
Heil aus'm Grunde IV/2 882
Heil-Blättli IV/2 522
-Bölle II 250
-Chrut VI/2 676
„ -Distel VI/2 990
Heile-Bêre V/3 1675
Heilebartsblaume II 293
Heiligen-Kraut VI/2 672
„ -Wurz V/2 1333
Heiliger Geist V/2 1338
Heiliggeistwurz V/2 1338
„ , Wilde V/2 1333
Heiligkraut V/3 2240
Heilig'ngeistbleaml V/1 101
Heil-Knecke V/2 957
-Kraut V/2 1416, 1427
-Narsch IV/2 918
-Rauf V/4 2373
-Reif V/4 2373
„ -Schade(n)krut IV/2 522
Heilundwundbeere III 478
Heil-Wunderkrût VI/1 409
-Wurz V/1 467; V/2 1244
-Ziest V/4 2428
„ -Zwiebel II 250
Heimele-Chrut III 219
Heinggene V/3 1974
Heinischwummchrut VI/2 759
Heinsele III 219
Heinsl III 495
Heinwurz III 466
Heinzelmännerchen IV/2 725
Heinzewunsen II 16
Heipperi V/3 1675
Heirischwummchrut VI/2 1180
Heisop V/4 2357
Heissbrünsti VI/2 787
Hekadorn IV/2 1102
Hekapeka IV/2 977
Heksenspaer VI/1 517
Helbe I 254
Helenakraut VI/1 475
Helfkraut V/4 2395
Heliotrop V/3 1884, 2130
„ , Vanille- V/3 2131
Hellem I 236
Heller-Kraut IV/1 118, 364
„ -Niettel III 141
Helm I 236, 401
-Bohne IV/3 1624
„ -Chrut III 503
Helmkraut V/4 2508
, Alpen- V/4 2516
„ , Sumpf- V/4 2510
Helmorchis II 343
Helplutsa IV/2 882
Hêlrief V/4 2373
Helsabeer IV/2 1064
Hemad II 193, 196
Hemat-Docken III 173
„ -Wurzen II 193
Hembe-Klänger III 522
-Knäbche VI/2 563, 620
„ -Pater III 522
Hemde-Knäpp VI/2 563
„ -Knöpp VI/2 620
Hemderknöpfle VI/2 620
„ , Gelbe VI/2 787
Hemd-Glunggi III 522
Hemdknopf III 301
Hemlock-Tanne I 81; VII 151 Fig. 1179 A
Hemmer II 193
Hemmlstitz V/3 2156
Hemmock V/2 998
Hemp III 130
Hempblom VI/1. 132
Hempfele III 561
Hemsknöpe III 445
Henabir V/4 2589
Henafett IV/2 522
Hendl IV/1 38
Hendrek, îren V/3 2241
„ , Iserene V/3 2241
Hen(e)rich, Guter V/3 2194
Henerpicka III 276
Hengschtkraut V/4 2589
Henl III 455
Henn I 157
Henna IV/1 38
-Äug(e)li V/3 1754, 2161
„ -Äugli, Roti V/3 1869
He(nn)adarm VI/1 56
Hennääugli IV/1 345
Hennätöpli V/2 1213
Hennah-Strauch V/2 747; VII 191
Henna-Lus III 219
-Oga VI/1 360
„ -Tod V/4 2592
Henne II 196
Hennebêe IV/2 768
Hennegift II 196
Hennen-Äugli VI/1 59
-Darm III 352
-Tatze IV/3 1367

Hennie II 33
Hennup III 130
Hep(e)timat V/3 1913
Hepperi IV/2 899
Heragräs I 197
Heraklesstaude V/2 1416
Herbestroase II 195
Herbst-Bleaml II 195
-Bloma II 195
-Blümel VI/1 83
-Bluest VI/1 83
-Briegger VI/1 83
-Drehwurz II 385
-Feuerröschen III 600
-Flieder V/3 2113
-Kopfgras I 270
-Kornblume VII 209
-Löwenzahn VI/2 1018
-Nelke III 344
-Pfaffenröhrlein VI/2 1081
-Rose(n) V/1 464
-Rübe IV/1 261
„ -Sternblume VI/1 431
Herbstzeitlose II 195; VII 43 Fig. 1074
Herchesbeere IV/2 646
Herdgras I 296
Herdöpfel V/4 2595
Hêrek IV/1 276
Hergelberge IV/2 646
Hergotskolb'n I 112
Hergottächlee IV/3 1650
Hergottärosä III 466
Hergottafleisch III 298; IV/3 1331
Hergottaschüehli V/1 91
Hergotteschüele, Liebe IV/1 38
Hergotteschweiss IV/2 1018
Hergottsbart II 16; IV/2 537
Hergotts-Blüemli IV/2 627
-Brot IV/3 1331
„ -Fiessli IV/3 1355
Hergotts Fleisch und Bluat II 337
Hergotts-Kraut IV/2 536
-Mäntelchen IV/2 962
-Nägelchen IV/2 931
-Nagel VI/2 773
„ -Rösli IV/2 1018
Hergott(s)-Schüchelchen II 326; IV/3 1367
Hergotts-Schühchen IV/2 915
-Schühle IV/3 1574, 1587
„ -Schühli IV/3 1355, 1367
Hergotts Strömpf und Schua V/1 91
Herings-Geranium IV/3 1664
Herkules-Heilwurz V/2 1360
Herkules-Staude V/2 1416
Herlitzchen V/2 1548
Herlitze V/2 1548
Hermannl(n) VI/2 581
Herm(eis)el VI/2 581
Hermichen VI/2 581
Hernietel III 141
Herogottsschühli IV/3 1182
He(r)ppir(e) V/4 2595
Herragertä V/2 1545
Herrehäntscheli IV/2 534
Heere(n)knopf VI/1 292
Herrert IV/1 263
Herreschüeli IV/3 1367
Herrestifeli IV/3 1467
Herrgottlkraut V/4 2309
Herrgotts-Bart II 183
-Bettstroh VI/1 215
-Blümli V/1 598; VI/2 961
-Blume V/3 2161
-Blut V/1 526, 527
-Hölzel VI/2 634
-Krönli VI/2 961
-Krone VI/2 821
-Nägele VI/2 821
-Rue(h)kraut IV/2 537
-Tröpfchen III 323
„ -Wundenkraut V/1 527
Herrimgarten V/2 1350
Herrmuss I 53
Herr'n Hirtenholz VI/1 242
Herrnrose II 315
Herschriet II 183
Herse I 188
Hertenau V/1 526
Herzblatt IV/2 636, 637
Herzblume VII 176
Herzelkraut IV/1 364
Herzerl IV/1 364
Herzgespan(n) IV/1 118; V/4 2389, 2392
Herz-Glocken IV/2 915
-Heil V/4 2392
-Jesuveiele V/1 598
-Kelch VII 162
-Kraut V/4 2302
-Kreitche IV/1 364
-Lilie VII 159, 160 Fig. 1188
-Marillen V/2 1406
-Same VII 187
„ -Trösterli IV/2 882
Hesegrütte I 188
Hespel IV/2 739
Hessel III 71
Hessische Luzerneseide V/3 2106
Hetschepetsche IV/2 977
Hett'n Bur'n Schinken stâlen IV/1 364
Hetzgi-Maia V/4 2497
Heu-Beere VI/1 242
-Beri V/3 1675
-Bire(n) IV/2 756
-Birle II 361
-Blueme IV/3 1331
-Blume IV/3 1196; VI/2 609, 944
-Chläber VI/1 212
-Dieb VI/1 181
-Fresser VI/1 181
-Gabeln IV/3 1719
-Gluggere II 196
-Hächla IV/3 1222
-Hälm I 294
Heuliger VI/1 242
Heumauzenstock VI/1 242
Heu-Nägeli III 298, 300; VI/2 944
-Schelm VI/1 83, 181
-Schläferle III 536
-Schlaufa III 536
„ -Schmalä I 294, 309
Heusenkraut V/2 804; VII 192
„ , Sumpf- V/2 804
Heustächer VI/2 817
Hexa-Chrut V/2 815
„ -Kraut V/1 526; VI/1 25, 33
Hexe-Be(e)se III 146; VI/1 445
-Chrut III 478
„ -Kraut V/1 134
Hexen-Besen III 531; IV/2 1056; VII Fig. 1092, 1101
-Blum III 522
„ -Dorn V/1 332
Hexeneier VII 143
Hexen-Hasel IV/2 656
Hexenkraut I 66, 163; IV/1 487; V/1 526; V/2 873; VI/1 524
„ „ , Gebirgs- V/2 874
Hexen-Krut III 146
-Kruud IV/2 522
Hexe(n)-Milch IV/1 21; V/1 134
Hexen(n)est III 146
Hexen-Strang III 511
„ -Zwirn III 511
Hexesid V/3 2089
Hexgimaia V/4 2497
Hiadl IV/2 962
Hiba VII 151
Hiärk IV/1 263, 276
Hickorynussbaum VII 167
Hiddernettel III 141
Hiefe IV/2 976
„ -Heck IV/2 976
Hiele III 511
Hiemerknöppche VI/2 563, 620
Hiensch III 208
Hiewelcheskraut V/4 2309
Hiffe IV/2 976
Hiingscht V/4 2589
Hillgenkummveilchen II 274
Hillrusk I 53
Himalaya-Edelweiss VI/2 835
Himbeere IV/2 768
Himbeer-Erdbeere IV/2 896
Himkes IV/2 768
Himmel-Blueme VI/2 609
-Brand VI/1 16, 410
-Bresl IV/2 537
„ -Dill V/2 1372
Himmelfahrtsblümle VI/1 456
Himmelhopfen, Gemeiner IV/3 1290
„ , Kleiner IV/3 1288
Himmelmutter-Brot IV/1 364
„ -Pantoffeln IV/3 1367
Himmelsbaum VII 185
Himmels-Bläuäli V/1 619
-Bläueli V/3 2014
-Bleaml V/3 2014

Himmels-Blom V/3 2162
-Blüemä II 315
„ -Blüemli V/3 2014
Himmel(s)brod IV/3 1331, 1650; V/3 2223; VI/2 1049
Himmels-Brot IV/2 915; VI/1 182
Himmel-Schlüssel(e) II 336; V/3 1746, 2014
Himmels-Gerste I 398
-Herold V/3 2133, 2134
-Kerze VI/1 16
-Leiter(le) IV/1 345; V/3 2114
-Röschen III 277
-Schlissel, Râte V/3 2214
-Schlösseli IV/3 1367
-Schlüssala IV/1 345
-Schlüssel V/3 1749
, Blauer V/3 2162
, (Blaue, Rote) V/3 2214
„ , Roter III 328
-Schlüssele V/3 2162
-Schlüsseli V/1 91
-Schlüsserl IV/3 1367
-Stege II 302
-Sterndl III 528
-Stern(e) II 315; III 528
-Sternli II 211; V/3 2014, 2054
-Tau I 319
-Veigerl V/3 2014
„ -Zehe IV/3 1367
Himmelvaterbart IV/2 536; V/4 2327
Himmer(t)e IV/2 768
Himmeschlissl II 257
Himpele IV/2 768
Himpelbeer IV/2 768
Hindläufte VI/2 993
Hindlbeer IV/2 768
Hinfuss V/2 1212
Hinkels-Darm IV/2 536
-Fuss IV/2 536
„ -Millich II 253
Hinlauf V/2 1212
Hinnerk, Stinken VI/2 787
„ , Stolten VI/2 787
Hinnerquännel V/4 2309
Hinnerquanl V/4 2309
Hinrik, Lustgen VI/2 787
Hinschkraut V/4 2589
Hintlain I 67
Hiobs-Tränengras I 181
Hippelskräutchen V/4 2309
Hippokratesgewächse VII 187
Hipri IV/3 1310
Hirkelness V/2 1192
Hirsch I 188
-Beere IV/2 682
-Brot V/3 1844
„ -Brunst V/4 2485
Hirschegras I 189
Hirschen-Kraut V/1 163
„ -Sprung I 67
Hirschesprüng V/2 1477
Hirschfeldie IV/1 226
Hirschgeweihfarn VII 149
Hirsch-Gras I 373; VII 155
-Haar I 373
-Heide IV/3 1182
-Heil V/2 1389
„ -Bergfenchel V/2 1244
-Hörnla IV/3 1688
-Holder VI/1 240
-Horn IV/1 93
-Klee IV/3 1243
„ -Kohl V/3 2213
Hirschkolben-Sumach V/1 222
Hirsch-Krandl V/2 884
-Kraut V/2 1389
-Mangold V/3 2213
-Möhre V/2 1406
-Peterlein V/2 1386, 1389
-Sprung III 426
-Stapfete V/2 1213
-Thee VI/2 758
„ -Tritt V/2 1213
Hirschtrüffel VII 140
Hirsch-Wurz V/2 1244, 1389
Bauern- V/2 1372
Echte V/2 1389
Falsche V/2 1495
, Schwarze V/2 1386, 1389
„ -Blüh III 588
-Wurzel V/2 1477, 1489
-Zehen I 18
-Zunge I/CXVI Fig. 199; I 34 III 194; V/3 2214; VII 149
Hirse I 186, 188
Hirsen-Klee IV/3 1255
„ -Segge II 95
Hirseswurtz V/2 1392
Hirtblackä VI/2 683
Hirten-Klee IV/3 1290
-Nadel IV/3 1716, 1719; V/2 1037
Hirtentäschchen IV/1 364
Hirtentäschel IV/1 363
Hirzeklee IV/3 1303
Hirzwurz V/1 74
Hissel III 71
Hitternessel V/4 2438
Hittnettel III 141
Hizopf V/4 2357
Hladnikië V/2 1180
Hoabeer V/3 1675
Hoaderer V/3 1690, 1701
Hoadern V/3 1701
Hoadn V/3 1690
Hoahna IV/3 1367
Hoalbleda VI/2 676
Hoalpletzl IV/2 635
Hoch-Boppelen III 173
-Fart V/3 2090
-Klee IV/3 1257
-Leuchte V/1 478
„ -Muet VI/1 428
Hochzeitmaie V/4 2518
Hoddasaeler III 511
Hodelerbse IV/3 1610
Höalblattl V/2 957
Höaraug'wurzn II 269
Höckerkelch VII 191
Höckerlattich VII 212
Höckerli IV/3 1629
Höhnerdod V/4 2592
Höll-Blueme VI/2 609
Hölperle V/3 1670
Höls V/1 236
Höltjebâren IV/2 695
Höme I 41
Hönermirken VI/1 352
Hönerswarm III 352
Hörbesgregg'n VI/1 83
Hörpfel V/4 2595
Hösele IV/1 38
Höseli V/3 2008
Höske III 441
Hofartscheisser VI/2 801
Hofbläder VI/2 675
Hofenöli V/1 586
Hoffart, Stinkende VI/2 801
Hoffrook VI/2 634
Hoffru VI/2 634
Hofreik III 205
Hofstattgras I 295
Hogermännli II 310
Hoggemanne I 122
Hoggerbs IV/3 1629
Hohachel IV/3 1222
Hohklee IV/3 1260
Hohl-Dotter IV/1 186
-Narbe VII 165
-Quacke V/4 2420
-Rippe V/2 1326
„ -Samen V/2 1074
Hohlüchte V/2 814
Hohl-Wurz IV/1 34, 38
Hohlzahn V/4 2457
Hohzunge, Grüne II 363
Hohnäppelchen IV/2 725
Hoi(ken)wekenblad VI/2 675
Hoilablätter VI/2 676
Hoinerpeelch V/4 2309
Holbeer IV/2 768
Holder(e) VI/1 237
Holder, Baure- V/3 1912
, Blauer V/3 1912
Spanischer IV/2 639; V/3 1912
„ , Wilder VI/1 240
Holderkraut VI/1 236
Holder(stock) VI/1 237, 240
Holdert VI/1 237
Holftere, Weisse VI/1 244
Holländer V/4 2497
Holländischer Klee IV/3 1302
Holländisch Gras I 197
Holler V/3 1912
, Blauer V/3 1912
Falscher IV/2 971
Türkischer V/3 1912
, Wilder IV/2 971, 974; V/2 709; VI/1 236
-Gras V/2 1213

Holler(t), (Roter) VI/1 237, 240
Hollpiepen I 53
Hollrusch I 53
Holschenboom III 92
Holschkenblume II 326
Holtje IV/2 696, 745
Holtmark III 557
Holtschoe III 495
Holunder V/3 1912; VI/1 235, 237
, Chinesischer V/1 85
, Persischer V/1 85
, Trauben- VI/1 240
, Zwerg- VI/1 236
-Knabenkraut II 356
„ -Schwertlilie II 290
Hôlwend III 205
Holwie V/3 1946
Holz-Äpfel V/3 1844
-Birne IV/2 695, 696
-Blüemle III 522
-Blüemli III 529
-Glucken V/3 2008
-Klee IV/3 1650
-Mockel IV/2 695
-Nägeli V/2 964
-Pilz VII 141
-Schüali II 326
-Schueh III 495
-Schuh II 326
„ -Wickä IV/3 1467
Homäel I 238
Hombuden IV/2 976
Hombuëzen IV/2 976
Honafed II 293
Honasichel II 293
Hondshoda II 196
Hondskîscht VI/1 244
Honerknöpkes III 352
Honerswarm, Roe V/3 1869
Honif III 130
Honig-Blom V/4 2438
-Blümle V/4 2438
-Blüte IV/2 972
-Blume V/4 2302, 2469
-Brod I 293
-Duft VII 186
„ -Gras I 238, 239
Honigklee IV/3 1236
Ungarischer IV/3 1245
„ , Weisser IV/3 1245
Honig-Palme VII 157
-Schmale I 238
„ -Sugerle V/4 2450
Honigstrauchgewächse VII 187
Honnig-Blom VI/1 255
„ -Blum V/3 2223
Honskraut(l) V/1 526
Hoof-Kebladen VI/2 675
-Kebllad VI/2 683
„ -Laddik VI/2 675
Hoonarf III 352
Hoorstrenza V/2 1397
Hoorstrenzä, Wildi V/2 964
Hopfen III 130; VII 80 Fig. 1114
Hopfenbuche III 68; VII 168 Fig. 1207
Hopfenklee IV/3 1255
Hopfen-Luzerne IV/3 1255
-Seide V/3 2100
-Strauch VII 184
„ -Zwirn V/3 2100
Hoppen II 16, 78; III 130
Horkenschnabel IV/3 1712
Horloi III 418
Horlsche V/2 1548
Hornbaum III 66
Hornnarbe VII 197
Hornesselblume VI/2 944
Hornklee IV/3 1364, 1367
, Französischer IV/3 1230
„ , Sumpf- IV/3 1372
Horn-Köpfchen III 544, 545
-Kraut III 360—376, 449, 450, 451; VII 173, 174
Hornkrautgewächse III 449; VII 174
Horn-Melde VII 171
-Mohn IV/1 23
-Nuß V/2 884
-Pilze VII 142
„ -Same VII 171
Hornsenblumen II 310, 313
Hornstrauch V/2 1540; VII 195
, Gelber V/2 1548
, Roter V/2 1545
„ -Gewächse V/2 1538; VII 195
Hornungsglöckle II 310
Hornveilchen V/1 614
Hornzahn VII 145
Horst-Segge II 103; VII 112 Fig. 1147
Hortensie IV/2 564
Hosa-Brut IV/2 1200
-Brutlan V/1 474
„ -Krettich IV/3 1182, 1200
Hoschget V/4 2309
Hoselätz II 326
Hoselätzli III 481
Hoselotterer V/3 2214
Hosen, Blaue V/3 2008
-Beisser VI/1 516
-Knopf VI/1 309; VI/2 944
„ -Zottele IV/1 38
Hoseschiesser V/3 2214
Hos'nkraut IV/3 1182
Hostez V/4 2309
Host's Steinbrech IV/2 589
Hotten III 511
Howald III 554
Howeel IV/1 257
Huafbleïda VI/2 675
Huafblöika VI/2 675
Huaflpotschen VI/1 404
Huafplätschen VI/2 683
Huafplotschen VI/2 683
Huafpotz'n VI/2 675
Huatplotschen VI/1 404; VI/2 683
Hubefädern VI/2 1084
Hub-uf-de-Mê V/3 1913
Huckauf V/3 1913
Huckufdemad V/3 1913
Hudelgras I 363
Huderich V/4 2374
Huder(k) V/4 2374
Hüahlaskraut V/4 2282
Hübele IV/2 768
Hübi III 279
Hübsche V/1 467
Hüchelterdööre IV/3 1222
Hüehnerbluemä V/3 1635
Hüehner-Maie V/3 1635
Hüehnerpolei VI/1 56
Hüehnersefe VI/1 56
Hüenersattel III 352
Hüenersepp III 352
Hüffe IV/2 976
Hüffkesblad VI/2 675
Hügel-Distel VI/2 849
-Erdbeere IV/2 904
-Veilchen V/1 640
„ -Vergissmeinnicht V/3 2171
Hühnasarb III 352; V/3 1869
Hühnaschwarm III 352
Hühner VI/1 292
, Fette V/2 815
-Äugl III 328
-Aug(en) V/1 345; V/3 1869
-Augenwurz('n) II 269; IV/2 536
-Beere VI/1 244
-Biss III 307
-Blind V/3 1746
-Bluest V/3 1635
-Bolle V/4 2309
-Darm, Roter V/3 1869
-Drosli V/3 1635
-Geschmielige III 352
-Grap IV/2 536
-Hirse I 189
-Kohl V/4 2307
-Kraut V/4 2309
-Leiterle IV/2 937
-Mais I 181
-Quendeli V/4 2309
-Schädlich III 352
-Scherben III 352
-Schnabel IV/2 536
-Sedel V/4 2309
-Tod III 478; V/2 709
-Totsch V/2 1213
und Hahnen IV/1 38
-Wurz IV/3 1676
„ -Zehe IV/2 536
Hülfter(e) V/2 1545; VI/1 242
Hüllen II 78
Hülse(n) V/1 236
Hülsenfrüchte IV/3 1113; VII 181
Hülskrabbe V/1 236
Hündele VI/1 237
Hünertraube IV/2 534
Hüngeli II 189
Huenschel V/1 236
Hünschkraut V/4 2589

Hüppelblume VI/2 1084
Huerenelke III 323
Hueshenzautle III 161
Huetbläggtä VI/2 675
Hütchen V/1 249
Hüttentütt IV/1 368
Huf-Blâer VI/2 675
-Blätschen VI/2 675
-Blotschen VI/2 675
„ -Eisen IV/3 1472
Hufeisenklee IV/3 1481/82
Hufele VI/2 675
Huflattich VI/2 675
Hûhackele IV/3 1222
Hûheckele IV/3 1222
Huhicke IV/2 976
Hujauf II 16
Huidblödschen VI/2 676
Huiwa IV/2 768
Hûlandr VI/1 237
Hulba IV/2 768
Hulftere V/2 1545
Hulla VI/1 237
„ , Stinketa IV/2 639
Hullaner II 16
Hulperli V/3 1670
Hulseheck V/1 236
Hulseholz V/1 236
Hûlungr VI/1 237
Humbel IV/2 768
Hûmbodden IV/2 976
Hummalä V/4 2537
Hummel II 331; V/4 2438
-Beer IV/2 768
-Chlee IV/3 1331
-Chrut V/3 1682
Hummele-Chrut V/4 2448
Hummel-Gras V/4 2450; VI/1 79
-Niettel V/4 2438
-Ragwurz II 330
„ -Sauger V/4 2450
Hummelsensköppe V/4 2450
Hummel-Sauch V/4 2438
-Sugele V/4 2438
„ -Suggä IV/3 1355
Humplgras VI/1 79
Hunblock V/2 1164
Hunde-Beere III 478
-Blume VI/2 1083
„ -Rebbe VI/1 183
Hunderribbe VI/2 570
Hunds-Bäumes V/1 345
-Bam V/2 1545
-Baum V/1 121
-Beer(e) IV/2 772; V/2 1545; V/3 1946; V/4 2592; VI/1 252, 316
Rote V/4 2589
„ (Schwarze) V/1 332; VI/1 253
-Beeri V/2 803; VI/1 252
-Beer(staude) V/1 332, 345
-Beerstrauch V/2 1545
-Bi(er) IV/2 771
Hunds-Blöka III 219
„ -Blume II 196; VI/1 541
Hundsböme-Holz VI/1 252
Hunds-Büa(r) VI/1 240
-Dille VI/1 541
-Flette III 323
„ -Fudle II 196
Hundsgiftgewächse V/3 2048; VII 198
Hunds-Gras I 294
-Gurke V/1 474
-Haar I 373
„ -Hode II 196; IV/2 766
Hundskamille VI/1 535, 541
Acker- VI/1 541
Berg- VI/1 539
„ „ , Karpaten- VI/1 540
Hunds-Kerbel V/2 1030
„ -Knofel II 196
Hundskohlgewächse VII 172
Hunds-Kolben V/2 698
Hundskolben-Gewächse VII 193
Hunds-Kraut V/3 2194
-Kümmerli V/1 474
-Lattich VI/2 1032
-Milch V/1 134, 163
-Petersilie V/2 1272
-Pratzerln VI/1 456
-Quecke I 382
-Rauke IV/1 219
-Rose IV/2 976, 1031
-Rute V/2 698
-Schiss III 225
-Tod, Venetianischer V/3 2050
-Veilchen V/1 619
Grosses V/1 634
„ , Weisses III 522
-Wurz II 334; VII 164
-Zahn I 264
-Zunga V/3 2224
-Zung(e) III 219; V/3 2147, 2149, 2214; VI/2 1083
, Blaue V/3 2203
„ „ , Wald- V/3 2148
Hundtischdoarnach V/1 332
Huneklötn V/1 249
Hungblueme IV/3 1331; V/3 2223
Hunger IV/1 389; VI/2 961
-Bloume VI/2 961
-Blümchen IV/1 372
„ , Immergrünes IV/1 377
-Blume III 561; IV/1 389
-Chrut IV/3 1682; V/3 2158
-Knoppen IV/1 389
-Krolle V/3 1887
-Kruud IV/1 389
„ -Tod VI/2 1162
Hung-Gräs II 189
„ -Gras I 294
Hungsschmale I 379
Hungsüger IV/3 1331
Hunnblom VI/1 414
Hunne-Block V/2 1164
-Blome VI/2 609, 1018
Hunne-Dissele VI/2 846
„ -Distl VI/2 874
Hunnef III 130
Hunne-Krout V/4 2537
Hunnel VI/1 237
Hunnerschâlch III 352
Hunnetunge(n) VI/2 1198; V/3 2199; VI/1 183
Hunsääsch IV/2 739
Huntischknowl II 229
Huotplotschen VI/2 825
Huoverflöhe VI/1 517
Huppendinges V/3 1913
Huppenholt IV/2 708
Huppufdemad V/3 1913
Huppuff V/3 1913
Huppuppsbloemer V/4 2537
Hu(r)digl III 554
Hureditzsche IV/1 29
Huren-Gras I 44
„ -Kinder II 132
Hûrepupe II 196
Hurlebusk V/1 236
Husarbe III 352
Husaren, blaue V/4 2497
Husarenknopf VI/1 528
Huschal VI/1 83
Huschelbusch V/1 236
Husholder VI/1 237
Hûslâk IV/2 522
Huslôf IV/2 547
Huslôk IV/2 547
Hustenkraut VI/2 676
Huswurz, Wildi IV/2 591
Hutschakraut VI/2 787
Hutscheballa VI/1 181
Hutscherling V/2 1164
Hutten, Blauer IV/3 1485
Huweken VI/2 675
Huwerdorn IV/3 1222
Huwerroaslen III 273
Hyazinthe II 279; VII 162
Hyazinthenaloë VII 159
Hyllmann I 254
Hyssop V/4 2282

I.

Iba I 79
Ibere(ch) V/2 1428
Iberî(g) V/2 1428
Ibisch V/1 467
Ibschä IV/3 1222
Ibsch(g)e V/1 467
Ibste IV/3 1222; V/1 467
Igel-Kaktus V/2 694
-Klee IV/3 1488
-Köppe IV/2 918
-Kolben I 115, 116; VII 152
-Kopf VII 212
-Kraut IV/2 918
„ -Polster V/3 1879
Igelsame V/3 2138; VII 200
Igel-Schlauch I 154
-Segge II 67

Igel-Weizen I 395
Igl VI/2 825
Ihlenblom IV/2 637
Ihren V/1 262
Ijel II 235
Ijsmet V/4 2357
Ile I 115
Ilen-Kruud III 550
Ilentläer III 550
Igla, Gäli II 293, 313
Ilge II 235, 291, 293, 313, 315
„ Blaui II 291
Ilgen, Gelbe II 293
I liab di von Herzen VI/2 609
Iling II 235
Ille II 235
Illyrische Bergminze V/4 2287
„ Nelke III 326
Ilme III 118
Imbeli II 329
-Chlee IV/3 1367
-Chrut IV/2 671, 971; V/3 2223
Imbere IV/2 768
Imli IV/2 1074
Imme-Blümli V/3 2114
„ -Chrut IV/2 691; V/4 2302
Immelekraut V/4 2309
Immenblatt V/4 2468, 2469
Immen-Blume V/4 2438
„ -Kraut IV/2 971; V/4 2302
Immer-Grea V/3 1585
Immergrün III 146; V/3 1669; V/3 2051, 2053; VII 198
Immer-Heil V/3 1853
-Nicht VI/1 21
„ -Schön VI/1 469
Immortelle VI/1 469
Impele IV/2 768
Impenkraut IV/2 971
Imper IV/2 768
Imperialgerste I 397
Indigo IV/3 1383
, Deutscher IV/1 193
„ , Falscher IV/3 1385
Indische Feige V/2 689
Lotosblume III 438
Rose IV/2 995
„ Wucherblume VI/2 594
Indischer Pfeffer V/4 2556
Ingelbluoma VI/2 801
Ingelseit I 41
Inge(n)rebe V/4 2373
Ingwer VII 164
Ingwergewächse VII 163
Inka-Lilie VII 163
Inkarnat-Klee IV/3 1328
Insekteblüemli II 329
Insekten-Blume, Dalmatische VI/2 596
-Orchis II 328; VII 164
Iper III 118
Ippels V/4 2595
Irba IV/2 899
Irbsele IV/1 7
Irl III 92
Irrlichtpflanze VII 159
Isä-Blüemli VI/1 54
„ -Chrut V/2 964; VI/1 54
Isäschlegel VI/1 54
Isahuat III 495
Ischbele V/4 2357
Ische V/3 1926
Is-Chrut IV/2 534
Isegras I 373, 383
Iseholz V/2 1545
Ise(n)baum V/2 1545
Ise(n)Chrut V/3 2158
Iserblomme VI/2 974
Iserhark V/3 2241
Iserhart V/2 757; V/3 2158
Isich V/4 2357
Isländischer Mohn IV/1 26
Isländisches Moos VII 144
Isli IV/2 522
Isop V/4 2357
Ispe V/1 467
Issl V/4 2357
Isump(f) V/4 2357
Italienische Dattelpflaume V/3 1898
Ochsenzunge V/3 2201
Pappel III 64
„ Petersilie V/2 1158
Italienischer Fenchel V/2 1287
Italienisches Raygras I 378
„ Rohr I 270
Itsch VI/2 652
Itscherle VI/1 266
Itternessel III 141
Ive VI/2 555

J.

Jachandelbaum I 89
Jachelbeerstrauch I 89
Jachrut III 225
Jadde III 418
Jäbuse VI/2 648
Jäger-Blume V/2 815
-Distel VI/2 817
„ -Kraut I 67; III 460; VII 174
Jänzelä, Breite V/3 1988
„ , Grossi V/3 1988
Järften IV/3 1610
Jäuse V/3 1988
Jager-Beer V/3 1670
„ -Brot VI/2 818
Jageteufel V/1 526
Jakobee VI/2 728
Jakobibeer IV/2 646
Jakobli II 341
Jakobs-Bart I 203
-Kraut VI/2 773
-Kreuzkraut VI/2 773
-Lauch II 233
-Leiter V/3 2114
-Lilie II 319
„ -Schnee V/2 1069
Jalape, Brasilianische V/3 2076
Jambir V/1 64
Jambuse, Aprikosen- V/2 779
„ , Wasser- V/2 780
Jan Hinnerk, stinken VI/2 787
Jannsbeere IV/2 648
Jannskrud, (Sunt-) IV/2 522
Jansdruwe IV/2 648
Japanische Artischocke V/4 2419
Bohne IV/3 1620
Dattelpflaume V/3 1898
Knollenkartoffel V/4 2419
Minze V/4 2342
Mispel IV/2 664
Pfefferminze V/4 2342
„ Rose IV/2 564
Japanknollen V/4 2419
Jappup VI/1 19
Jaripfl V/4 2595
Jark III 418
Jarscht I 396
Jasmin, Deutscher IV/2 639; VII 180 Fig. 1224
Echter V/3 1907; VII 198 Fig. 1239
Falscher IV/2 639; VII 180 Fig. 1224
Gelber V/3 1951
Gift- V/3 1951
, Wilder IV/2 639
„ -Wurzel, Gelbe V/3 1951
Jauchenblume III 464
Javabohne IV/3 1628
Jazingga, Wilda V/3 1957
Jechelbeeren I 89
Jedde III 418
Jeepkerdorn IV/2 976
Jeepkes IV/2 725, 976
Jeern III 418
Jehannesworzel VI/2 705
Jeist IV/3 1182
Jelängerjelieber IV/3 1729; V/1 598; V/4 2539, 2589; VI/1 258
Jele III 511
Jelster IV/3 1182
Jenstener V/3 1988
Jenzele V/3 1988
Jenzene V/3 1988
Jericho-Rose IV/1 69 Fig. 750b, c; VII 178
Jerusalem-Artischoke VI/1 514
Jessel V/2 1213
Jesuit, Hängender II 329
Jesuiten-Mütze V/2 884
„ -Nuss V/2 884
Jesus-Blü(a)mli IV/2 627; V/1 598
-Blueme II 315
Christwurz I 37
-Knäbli V/1 598
-Kraut IV/2 1018
„ -Leidensbleamla IV/2 627
Jesusli V/1 598
Jesu-Veiele V/1 598
-Wundenkraut IV/3 1364; V/1 527

Jettinger-Rübe IV/1 261
Jicht-Beern IV/2 653
„ -Krut III 550
Jilke V/2 1338
Jîp IV/2 725
Jippä V/3 1635
Jirglblume V/3 1746
Jlâk V/2 916
Jlôf V/2 916
Jloh V/2 916
Joachimsbart I 203
Jochalgen VII 137
Jochblattgewächse V/1 38; VII 184
Jochbrändli II 365
Jochhel VI/1 183
Jochkamille VI/2 555
Jochkranebitt I 92
Jochmind I 92
Jochpilze VII 140
Jodagräs I 197
Jöbke IV/2 725, 976
Jödüvel V/1 526
Jöers V/2 1213
Jölk IV/1 21
Jörge(n)-Nägele V/3 2014
Jörs V/2 1213
Joggelä VI/1 374
Joggerä VI/1 374
Joggobee VI/2 728
Johannes-Brötchen IV/2 1200
-Hand II 337
-Haupt II 132
-Kraut III 478
„ -Rose VI/2 712
Johannis-Apfel IV/2 747
Johannisbeere IV/2 641
Alpen- IV/2 651, VII 180 Fig. 1225
Rote IV/2 648
„ , Schwarze IV/2 653
Johann-Blume VI/2 609, 705
-Blut V/1 526, 527
„ -Brod IV/3 1331
Johannisbrotbaum IV/3 1132, 1134
Johannis-Brutlan VI/2 818
-Chrut V/1 526
-Gürtel VI/2 637
„ -Kräutl III 151
Johanniskraut IV/2 918; V/1 502; VII 189
Alpen- V/1 530
Berg- V/1 524
Heide- V/1 523
„ , Sumpf- V/1 509
Johanniskrautgewächse V/1 498; VII 189
Johannis-Lauch II 233
-Pootjen II 337
-Schweiss V/1 527
-Wedel IV/2 971
„ -Wurz I 18
Joierke V/4 2374
Jôle IV/3 1688
Josebroser VI/1 292
Josefi-Blüah II 247
„ -Blümel III 528
Josefs-Kraut V/4 2357
„ -Lilie II 235
Josephikraut V/4 2282
Josephle V/4 2282
Josephs-Blume II 310
„ -Zacher I 181
Juckbohne VII 183
Judasbaum IV/3 1133, 1134
Judasbaumblattgewächse II 174
Judasch-Schluta V/4 2580
Judas-Ohr IV/3 1134
„ -Silberling IV/1 353, 355
Jude-Beeri V/4 2580
-Chindli II 132
-Chirse V/2 1548
-Chlee IV/2 939
-Chriesi V/4 2580
-Düti V/4 2580
-Gesecht V/1 598
„ -Kirsch IV/2 708
Juden-Bart IV/2 575; VI/1 27; VII 142
-Dorn V/1 322
-Federn II 16
„ -Kersch'n V/4 2566
Jude(n)-Kest V/1 301
Juden-Kiässe V/4 2566
Judenkirsche III 478; IV/2 1064, 1100; V/1 250; V/2 1548; V/4 2579, 2580, 2588; VI/1 252
Juden-Kne(e)fchen VI/1 292, 391
-Nütte V/1 258
-Mutter V/4 2309
-Myrte V/3 2053
-Stauan V/4 2563
-Traube IV/2 534
„ -Wörtel V/2 1406
Jude-Schwanz I 197
-Titti V/4 2580
-Veialatt V/1 598
-Veiele V/1 598, 619; V/3 2054
Jud'nfelba V/4 2563
Judnkersch'n V/4 2563
Jud'nzwifl II 229
Jüfferke IV/2 627
Jüling II 291
Jülk IV/1 21
Jül'n III 511
Jümpferli II 326
Jünkerle III 335
Jürskool V/2 1213
Jüürs V/2 1213
Jufenönli, Wilde V/3 2014
Juffer IV/1 29
Juggenechnöpf VI/1 374
Juk in't Ledder VI/1 516
Julcke V/4 2374
Jûln II 291
Jumpfere(n)kraut V/1 527
Jumpfereschüeli II 326
Jumpfer in't Grön III 475
Jumpfernflachs VI/1 25
Jungfer IV/1 29
Jungferegsichtli V/3 2230
Jungfernäbelchen IV/2 627
Jungfern-Blume VI/2 609
-Böberl V/4 2563
-Demut V/4 2307
-Gesichtchen VI/1 529
-Haar I 293; V/3 2090
„ -Mantel IV/2 962
Jungfernrebe V/1 356, 357
Jungfern-Schüherl IV/3 1367
„ -Zucht V/4 2307, 2309
Jungferschühli IV/3 1367
Jungfrau-Bettstrê V/4 2328
Jungfrauen-Manderl V/3 2162
Jungfrau im Grün III 474
Junggeselle, Alter VI/2 874
Junggesellen-Knopf III 301
Junker I 179
Jupa-Junker III 201
Jupiters-Lichtnelke III 296
Juppa V/3 1635
Jura-Kronwicke IV/3 1469
Jurrekraut III 465
Jute, Langkapsel- V/1 428
„ , Rundkapsel- V/1 428
Jvenbläder V/2 916
Jviönli IV/1 442

K.

Kabbus IV/1 243
Kabislewat IV/1 254
Kachel VI/2 569
Kach'lkraut VI/2 569
Kadeluse III 536
Kadenkelche V/1 598
Käenk III 441
Käferfüll V/2 1027
Kälber-Kern V/2 998, 1006, 1017
Kälberkraut III 478; IV/3 1591
Kälberkropf V/2 995, 998, 1017
Kälber-Schere V/2 1017
„ -Stöck II 16
Käm(el) V/2 1182
Kämme VI/1 281
Känguruhdorn IV/3 1124
Käntchen III 441
Käppchen V/1 249
Käppela III 457, 459, 561
Kärmscwottel II 135
Kärntner Kuhtritt VI/1 65
Tauernblümchen V/3 1977
„ Spierstrauch IV/2 676
Käs-Blümchen III 522
„ -Blume IV/1 345
Käschenkrät V/1 474
Käsdorn VI/2 818
Käse-Babbel V/1 474
-Blume VI/2 610
-Krät V/1 474
-Näpfchen V/1 474
„ -Pappel V/1 474, 485
Käslaebla V/1 474

Käsle V/1 474
Käslein VI/2 818
Käspern IV/2 1078
Kässe IV/1 81
Kästeller VI/2 610
Kästene V/1 301
Kätterlesalat VI/1 266
Kätzchen IV/3 1322
Kaffee VI/1 196; VII 206 Fig. 1254
, Schwäbischer IV/3 1158
-Baum VI/1 196
-Blümchen IV/3 1365, 1690
-Erbse IV/3 1375
-Gerste I 398
-Stragel IV/3 1405
-Traganth IV/3 1405
-Worza VI/2 993
„ -Würza, Wildi VI/2 993
Kaffichanta II 337
Kahndelblume III 441
Kaiblbuschn II 196
Kajeputbaum V/2 787
Kai(n)st(e)r IV/3 1182
Kaiser-Blume VI/2 961, 1198
„ -Gras I 197
Kaiserkrone II 207 239
Kaiserli V/3 1754
Kaiser-Tee III 588; IV/2 922, 931
„ -Wurz V/2 1397
Kaiskes V/1 474
Kaitschken(holler) VI/1 237
Kakaobaum V/1 490
Kakelbeere IV/2 653
Kaki-Pflaume V/3 1898
Kakteengewächse V/2 679; VII 190
Kaktus, Felsen- V/2 693
, Flügel- V/2 696
, Geissel VII 191
, Glieder- V/2 965
, Igel- V/2 694
, Kamm- V/2 692
, Kugel- V/2 695
, Riesensäulen- V/2 691
, Ruten- V/2 697
, Säulen- VII 190
, Schlangen- V/2 692
, Trompeten- V/2 693
Warzen- VII 191
„ , Zitzen- VII 191
Kalabarbohne IV/3 1624
Kalabassenbaum VI/1 176
Kalanner V/2 1071
Kalbsauge VI/2 610
Kalbszunga III 194
Kalebasse VI/1 314
Kalenderli V/4 2527
Kalessen III 495
Kalfamergras I 386
Kaliander V/2 1071
Kalinkebaum VI/1 244
Kali-Salzkraut III 254
Kalk-Kreuzblume V/1 107
Kalk-Rotalgen VII 139
Kalms II 134
Kalmus II 134
Kalwerkropp V/2 1006, 1017
Kamalabaum VII 185
Kamellen(blome) VI/2 581
Kamell, Römsche VI/2 617
Kamille VI/2 580, 581
, Echte VI/2 581
, Falsche VI/2 617
„ , Färber- VI/1 537
Kamillen, Spanische VI/2 617
„ , Taube VI/1 541
Kamille, Römische VI/1 536
, Strand- VI/2 589
„ , Wilde VI/1 541
Kamin-Feger II 257
„ -Kehra IV/2 937
Kammerblumen VI/2 581
Kamm-Farn I 20
-Gras I 296
-Kaktus V/2 692
-Minze V/4 2272, 2273
-Quecke I 387
-Schmiele I 281
-Segge II 62
„ -Seslerie I 266
Kamperfoelie VI/1 258
Kampferfolium VI/1 258
Kampfer-Wermut VI/2 657
Kamtschatka-Rose IV/2 994
Kanadische Goldrute VI/1 411
Pappel III 57
„ Rispendolde V/2 1169
Kanadisches Berufskraut VI/1 445
Kanaribaum VII 185
Kanarien-Blom VI/2 787
-Glocke VII 208
„ -Gras I 197
Kandelaber-Kaktus V/2 691
Kandelblüh IV/2 639
Kaneelbaumgewächse VII 190
Kaneel-Blom V/3 1913
„ -Roes V/3 1913
Kannelgras I 53
Kannelke III 441
Kannen-Kraut I 53
-Pflanzen IV/2 510; I/CVII Fig. 174; VII 179
Kannevaskes I 113
Kanonenbaum VII 169
Kanonenputzer I 12
Kanonierpflanze VII 169
Kanstraube IV/2 648
Kantaluppen VI/1 320
Kanten-Lauch II 220
Kantüffel V/4 2595
Kanzeltriweli IV/3 648
Kap-Bleiwurz VII 197 Fig. 1237
-Buchsbaum VII 198
„ -Körbchen VII 212
Kapezinerstrick VI/2 899
Kapittelkraut V/1 163
Kapokbaum V/1 489
Kappastöck III 503
Kapper V/2 1291
Kapper-Kraut V/2 1291
Kapperngewächse IV/1 490; VII 176
Kappernstrauch IV/1 490
Kappes IV/1 243
Kappiskraut IV/1 247
Kaps IV/1 243
Kapuzen-Nacktdrüse II 368; VII 164
Kapuziner-Bohne IV/3 1637
-Chäppli III 495
-Glöggli IV/2 915
-Hüetli III 481
-Kressen IV/3 1726; VII 184
„ -Kresse, Spanische IV/3 1729
Kapuzinerle IV/2 915
Kapuzinerli II 329
Kapuzinerlüs I 293
Kapuziner-Rösli II 315
-Rose IV/2 996
-Schella IV/2 915
-Schueh II 326
„ -Zotteli IV/2 915
Karawanken-Enzian V/3 2003
Karbe V/2 1183
Kardätschendistel VI/1 283
Kardamon VII 164
Karde VI/1 281, 283
„ , Weber- VI/1 283
Kardel VI/1 281, 283
Kardendistel VII 208
Kardengewächse VI/1 279; VII 208
Kårdiffel V/4 2595
Kardone VI/2 924
Karfiol IV/1 243
Karkenslätel V/3 1746, 1749
Karls-Szepter VI/1 125; VII Fig. 1147, 1248
Karmeswurtel II 134
Karmille VI/2 581
Karmsen II 134
Karnill VI/2 581
Karnitsch II 53
Karobenbaum IV/3 1132
Karotte V/2 1516, 1518
Karpaten-Enzian V/3 2043
-Hundskamille VI/1 540
-Katzenpfötchen VI/1 457
„ -Spierstrauch IV/2 675
Karrenkraut III 279
Karst-Enzian V/3 2016
-Flockenblume VI/2 940
-Glockenblume VI/1 354
-Kresse IV/1 314
-Saturei V/4 2284
-Schneckenklee IV/3 1266
„ -Steinbrech IV/2 619
Kârte, Wille VI/1 281
Karthäuser-Nelke III 323
Kartoffel V/4 2595; VII 25 Fig. 1049
, Süsse V/3 2076
-Bovist VII 143
-Rose IV/2 994
„ -Seide V/3 2101
Kartommelche IV/2 1097
Karwel V/2 1027

Karwendel V/4 2308
Kasbiten IV/2 649
Kasblôm V/3 1913
Kasblüeml II 292
Kaschinitz II 136
Kaschubaum V/1 215
Kasnapfel V/1 474
Kasommelche IV/2 1097
Kaspische Weide III 56
Kaspobln V/1 474
Kassbeeren IV/2 1078
Kassbeten IV/2 649
Kasse IV/1 319
Kassen IV/1 81
Kassia-Akazie IV/3 1125
Kassuben-Wicke IV/3 1523
Kastandel V/1 301
Kastangel V/1 301
Kastanie, Australische VII 182
Echte III 101; VII 27 Fig. 1050
Kastlerblume IV/3 1183
Kasuarinengewächse VII 165
Katalonischer Jasmin V/3 1907
Kateinl IV/2 922
Kâterbât II 155
Katerweizen VI/1 74
Katharinenpflaume IV/2 1108
Kathrinabluome III 300
Kathrinchen II 337
Kathstrauch VII 187
Katschenkraut II 337
Katschenpearlain VI/1 252
Katt I 112
Katte VI/1 181
Katten-Blum VI/1 414
-Käs(e) V/1 474
-Kees VI/2 1049
-Klauen V/1 250
-Krallen V/1 474
„ -Pootjen VI/1 456
Katt(en)steert I 53; V/2 757; VI/1 16
Kattenstiärt VI/2 637
Katt(en)swans I 228; V/2 757; VI/1 16
Kattenswanz V/2 814
Kattig I 90
Katzadaepli VI/1 458
Katzanaegla V/3 2161
Katza(n)äugla V/3 1869
Katze-Beera VI/1 242
„ -Bier IV/2 653
Kâtze-Chlee IV/3 1355
Katze-Dööbeli V/3 2214
-Kirwel IV/1 47
„ -Knöble II 227
Katzen-Äugel(chen) V/3 2161
-Äugl III 328
-Äuglein VI/1 59
-Äugli II 330
-Blume III 522; VI/1 274
-Blutkraut V/3 2240
-Brankerl VI/1 456
Katzen-Bratzerl IV/3 1355
-Däpplein VI/1 456
-Daubbe VI/1 378
-Döbele VI/1 456
„ -Dreck VI/1 242
Katze(n)geil VI/1 276
Katzen-Gras I 294
-Kerbel IV/1 47
-Klee IV/3 1322
-Kraller VI/1 456
-Kraut V/4 2354, 2369, 2524; VI/1 276
„ , Wildes V/4 2374
-Minze V/4 2367, 2369, 2374
-Münz V/4 2369
-Nept V/4 2369
-Peterlein V/2 1082
„ -Peterli V/2 1272
Katzenpfötchen VI/1 455, 456
Katzen-Pfötl VI/1 456
-Pötchen VI/1 456
-Rebe V/1 362
-Schwaf I 192; V/4 2497
„ „ , Rota III 262
Katzenschwanz(l) III 262; V/4 2390; VI/1 79; VI/2 570
Katzen-Schwoaf I 53
-Steert I 112
-Träubeln IV/2 534
-Träublein, Weisses IV/2 534
-Traube II 256
„ -Trauben IV/2 536
Katze(n)wadel VI/1 276
Katzen-Wedel V/2 757
-Wurzel VI/1 276
-Za(h)l I 53; VI/1 74
„ -Zohl VI/2 570
Katze-Pfaut IV/3 1322
-Schwanz VI/1 181
-Stege(n) VI/1 183
-Stühlche VI/1 183
-Tabbe VI/1 242
-Veigele V/1 619
„ -Wadel VI/1 181
Katzl II 16
Katz'n-Pfute IV/2 889
„ -Schwaf I 211
Kaukasische Linde V/1 434
Kaumûle V/2 1428
Kaupen II 16
Kaurn I 388
Kaurôse III 454
Kautschukbaum VII 185
Keanförra I 98
Kearoch I 66
Keddik IV/1 263, 276
Keduize II 196
Keesbloom III 374
Keesegrund IV/3 1233
Keeskes V/1 474
Keesraute VI/2 645
Kefen IV/3 1611
Keferfüll V/2 998
Kegel III 441
Kehlgerten VI/1 252
Kehnholt I 98
Kehschoaten IV/3 1182
Keil(e)ke VI/1 237
Keilhacke V/3 1746, 1750
Keilkebeën VI/1 237
Keilmelde VII 171
Keis(e)ken VI/1 237
Keïstrupfen V/2 1428
Keitsche VI/1 237
Keiwedutzen II 196
Kelch IV/1 247
Kelch-Mannsschild V/3 1810
Kelke(nbusch) VI/1 237
Kellerhals V/2 703, 708
Kelmesblume V/1 605, 607
Kel'nwurzel V/3 1844
Kelterle II 195
Kem(mîch) V/2 1182
Kenblaume III 441
Kenke III 441
Ke(n)la V/4 2308
Kenster III 146
Kentucky-Blaugras I 306
Kependorn IV/2 977
Kepflain I 294
Kerbel V/2 998, 1015, 1017
„ , Spanischer V/2 1042
Kerbelkraut V/2 1015
Kerbelkrut V/2 1027
Kerbelrübe V/2 998
„ , Sibirische V/2 1000
Kerbs VI/1 324
Kerguelenkohl IV/1 70; VII 177
Kermesbeere III 266; VII 172
Kerndolde V/2 1087
„ , Krainer V/2 1087
Kernkeule VII 141
Kernobstgewächse IV/2 663; VII 181
Kerr'n III 279
Kers IV/1 81
Kerschen IV/1 319
Kerwes VI/1 324
Kerze V/4 2537
Kerzen-Baum VI/1 176
-Blume II 337
-Nussbaum V/1 120
„ -Wurz V/3 1998
Kescheze V/1 301
Keschlode II 196
Keschte V/1 301
Kescht'n III 101
Kesper IV/2 1078
Kesseli V/3 1754
Kesslers V/3 2008
Kest(ene), Wildi V/1 301
Kettemestock VI/2 1083
Ketten-Bleisch VI/2 1083
-Blume VI/2 1083
„ -Staude VI/2 1083
Kettich I 113
Kettikul I 113
Ketüffel V/4 2595

Keulenbaum VII 162
Keulen-Enzian V/3 2011
Keulenschmiele VII 154
Keulenschwämme VII 142
Keuschstrauch V/3 2237
Khannasblume VI/2 705
Khannesbrat II 183
Kianzl(kraut) VI/2 825
Kianzlwurz VI/2 825
Kicher IV/3 1562, 1629
, Deutsche IV/3 1604
, Echte IV/3 1499
, Kleine IV/3 1603
, Römische IV/3 1499
, Rote IV/3 1603
Wilde IV/3 1422
„ , Ziegelrote IV/3 1604
Kichererbse IV/3 1498, 1499
Kicherl IV/3 1604
Kicherling IV/3 1604
Kichern-Stragel IV/3 1422
Kicherwicke IV/3 1541
Kickeriki III 298
Kid V/4 2518
Kiddik IV/1 263, 276
Kiddkohl IV/1 276
Kiefel IV/3 1611
Kiefer I 96, 97
Kiehdetz II 196
Kiek dür'n Tun V/4 2373
Kielbohne IV/3 1632
Kienbaum I 98
Kienla V/4 2308
„ , Grosse V/4 2328
Kienporst V/3 1623
Kienschroten IV/3 1182
Kieselalgen VII 137
Kies-Schwingel I 329
„ -Weidenröschen V/2 821
Kiewitsei II 240
Kiist(e)r IV/3 1182
Kiewitsei II 240
Kikelskamm V/4 2497
Kikerlihahn V/4 2497
Kilbe I 391; IV/1 34
Kimfa I 98
Kimm V/2 1182
Kindbeer IV/2 768
Kinderblätter VI/2 825
Kinderschüalich II 326
Kindschesbeere IV/2 757
Kinnala V/4 2308
Kinnerperlen III 455
Kinsp(e)r IV/3 1182
Kipe IV/2 976
Kipeltendorn IV/2 977
Kîperte IV/2 977
Kirchasuppa V/4 2357
Kirchen-Blume III 454
-Rose III 454
-Schlüssl V/3 1749
„ -Ysop V/4 2357
Kirchesörpfel V/4 2357
Kirchisem V/4 2282
Kirfechblum VI/2 801
Kirkeschlötel V/3 1746
„ , blaue V/3 2214
Kirmesgästchen VI/2 825
Kirmsen VI/2 825
Kirsche IV/2 1078
Kirschen IV/1 319
Kirschlorbeer IV/2 1061
Kirschpflaume IV/2 1100
Kirwel V/2 1027
Kisseke VI/1 237
Kistelä III 101
Kitzhuhn IV/2 536
Kiwietsblome V/3 2000
Kiwîtblöme IV/1 345
Kiwittsblom IV/1 345; V/4 2537
Klabbere VI/2 825
Klaberblume III 276
Klaber(gras) VI/1 228
Kladde-busk VI/2 825
Kläbeblume III 276
Kläber VI/1 212
Klâeterbusk III 71
Klâeternâete III 71
Kläternöte V/1 258
Kläwer(le) VI/1 228
Klaffa VI/1 102
„ (Rote, Unechte) VI/1 74
Klaffer IV/1 118
„ (Roter) VI/1 102, 120
Klâffergröschel VI/1 102
Klaff(t) VI/1 102
Klang-Lein V/1 22
Klanner V/2 1071
Klâp(er) VI/1 102, 120
Klapf, Rother VI/1 74
Klapper IV/1 118; VI/1 102
„ -Blueme IV/1 29
Klapperche, Rot IV/1 29
Klappergewächse VII 187
Klapper-Hans VI/1 102
Hülse VII 182
-Poppel III 61
„ -Pot VI/1 102
Klapperstrauch VII 187
Klappertopf VI/1 102
Alpen- VI/1 109
Bergamasker VI/1 110
Drüsen- VI/1 106
„ , Grannen- VI/1 109
Klapp-Rause IV/1 29
-Ros(en) III 455; IV/1 29; V/1 464
Klâprump VI/1 102
Klarre-Busk VI/2 825
Klarinettenrohr I 270
Klatsch-Mohn IV/1 29
-Nelke III 279
„ -Rose(n) III 455; IV/1 29
Klauban VI/1 228
Klauenschote IV/3 1477
Klausterklocken V/3 2080
Klawe VI/1 228
Klawer IV/3 1328
Klebakazie IV/3 1391
Klebal VI/1 228
Klebbaum VII 186
Klebbknöpf VI/1 228
Klebern VI/1 228
Klebgras I 191; VI/1 228
Klebi V/3 1767
Klebkraut V/4 2485; VI/1 228; VII 75 Fig. 1111
Klebling VI/1 228
Klebnelke III 275
Klebra VI/1 228
Klebri VI/1 228
Klebsamengewächse VII 179
Kleb-Schwertel VII 164 Fig. 1197
Klee IV/3 1275
, Blassgelber IV/3 1349
, Blauer IV/3 1257
Brauner IV/3 1294
, Deutscher IV/3 1331
, Dreissigjähriger IV/3 1257
, Kleinblütiger IV/3 1297
, Mittlerer IV/2 1341
, Norischer IV/3 1341
, Persischer IV/3 1319
, Rintheimer VI/1 524
Russischer IV/3 1355
Schweden- IV/3 1299
, Seidener IV/3 1294
, Spitzer IV/3 1257
, Türkischer IV/3 1257
„ -Baum IV/3 1162
Kleefarn I 48; VII 149
Klee-Fresser VI/1 132
„ -Ginster IV/3 1167; VII 182
Kleenlauk II 223
Klee-Puppe VI/1 132
-Schaumkraut IV/1 336
-Seide V/3 2096
-Strauch VII 184
-Teufel VI/1 132; VI/2 1036
-Ulme VII 184
„ -Würger VI/1 132
Klefertjes VI/1 228
Kleiba VI/1 228
Kleidstrauch VII 184
Kleiheide VI/1 101
Klei(n)kaspes V/4 2309
Klei(n)knospes V/4 2309
Kleinling V/3 1873
Klemmklie IV/3 1290
Klepfer III 279
Klepfeta III 279, 301
Klepp(er) IV/1 364; VI/2 825
Klepperbeere IV/2 905
Klepperle I 293
Klepperli IV/1 34
Klepp'n I 100; VI/2 825
Klescha IV/2 905
Klescherl III 279
„ -Staudn IV/3 1458
Kleschn III 279
Kleschstaude IV/3 1458
Kletschen IV/3 1458

Klettbolla VI/1 228
Klette VI/1 228; VI/2 825
„ , Hain- VI/2 829
Kletten-Gras I 186
Klettenkerbel V/2 1048, 1058
„ , Acker- V/2 1054
Kletten-Klee IV/3 1281
-Kraut V/3 2138
Wald- V/3 2140
„ „ , Weinberg- V/3 2139
Kletter-Hur V/3 2090
-Palme VII 156
-Rose, Weisse IV/2 1000
„ -Trompete VI/1 175; VII 204
Klette-Vergissmeinnicht V/3 2138
Klew(a)s V/1 280
Klîbe VI/2 825
Klib(er) VI/1 228
Kliberen VI/1 212
Kliddä VI/2 825
Kliebusk VI/2 825
Klief VI/1 228, 516
Kliester VI/2 825
Kliewe(n) VI/1 228, 516; VI/2 825
Klîme VI/1 228; VI/2 825
Klimmup III 205; V/2 916; VI/1 228
Klim-up V/3 2080
Klingel-Beer IV/2 757
-Möhre V/2 1223, 1406
-Rüblein V/2 1223
„ -Wicke IV/3 1515
Klingender Hans VI/1 102
Klinkerblom VI/1 102
Klint III 273
Klinz'l VI/2 825
Klitscheblume IV/1 29
Kliven VI/2 825
Klockblöm VI/1 25
Klockenblaumen VI/1 352
Klockenblome III 536
Klockje(s) III 481; VI/1 352
Klöckskes VI/1 352
Klöpfkraut III 279
Klöpper I 112
Klöter-Jakob VI/1 102
Kloffan, Rute VI/1 74
Kloff(t) VI/1 102
Klokenblome III 481
Klommbock VI/1 255
Klon V/1 280
Klônebôm V/1 280
Kloobküel I 112
Klopp VI/1 102
Klosterbeere IV/2 646
Klosterysop V/4 2357
Klotzblume III 459
Klotzerbse IV/3 1610, 1614
Klotzerveilchen V/1 598
Klüggesamen VI/2 620
Klüsen VI/2 825
Klütern VI/2 825
Klumpe III 214
Klunderbeere V/3 1669
Klunkergras I 293
Kluster-Beere V/3 1669
-Biere IV/2 757
-Biern IV/2 646
„ -Negelk III 321
Knabastock IV/2 522
Knabenkräuter II 321, 335, 337; VII 164 u. Fig. 970, 1200, 1201, 1202
Knabewade V/3 2158
Knack-Baum V/1 285
-Beere IV/2 904
-Blaas III 279
-Blume III 344
„ -Busch IV/2 680; VII 180
Knack(el)beeren IV/2 905
Knackererbse IV/3 1614
Knack-Holler V/1 285
-Mandeln IV/3 1209
-Weide III 20
„ -Wurzel V/4 2416
Knäppelkraut IV/2 937
Knätschkraut III 279
Knäuel III 433
-Binse II 150
-Glockenblume VI/1 340
-Gras I 294
-Hornkraut III 363
„ -Kerbel V/2 1058
Knäul III 418
Knall-Blume III 279, 300
-Potsch III 279
Knap-Blaume VI/1 292
„ -Hoste VI/1 292
Knappheide IV/3 1190
Knarragras III 279
Knatschblume III 300
Knauf VI/2 974
Knaul III 433
-Blume V/3 2117
„ -Gras I 294; VII 155
Knaupel VI/2 1049
Knebel III 380; VII 173
Knecht, Alter V/3 2194; VI/2 874
Knechte, Faule VI/2 920
Kneef(chen) VI/1 292, 391
Kneifelerbse IV/3 1610
Kneppersblome I 157
Knespelschmehle II 178
Knewelauch II 230
Knickelbeeren IV/2 905
Knick-Fuchsschwanz I 219
„ -Holz I 100
Kniebos III 418
Knieholz I 100
Knirk I 90
Knirrkohl III 279
Knister I 90
Knoblächt, Wilda II 229
Knoblauch II 230
„ , Wilder II 226, 253
Knoblauchhederich IV/1 149
Knoblauch-Kraut IV/1 149
„ -Rauke IV/1 149
Knôblich II 230
Knockablume III 279, 300
Knockblume VI/1 352
Knöbli II 230
Knöepkensâd, Geele IV/1 368
Knöllchen-Knöterich III 96
„ -Steinbrech IV/2 615
Knöterich III 188; VII 171 u. Fig. 1018, 1211
„ -Gewächse III 165; VII 170
Knofl, Wilder II 226, 229
Knollblume, Blaue VI/1 352
Knolle III 214
Knollen-Baselle VII 172
-Dolde V/2 993
-Glatthafer I 261
-Hahnenfuss III 554
-Kartoffel, Japanische V/4 2419
-Kerbel V/2 998
-Kümmel V/2 1191
-Läusekraut VI/1 114
-Perle I 261
-Rüsterstaude IV/2 974
-Sellerie V/2 1144
-Sternmiere III 354
„ -Ziest V/4 2419
Knollwurz IV/3 1591
Knolpä V/4 2334
Knoop VI/2 974
Knop IV/1 276
Knopf VI/2 944
-Blume VI/1 292; VI/2 944
-Gras I 294
-Kraut VI/1 523, 524
„ -Rosen III 454
Knopstrih VI/2 961
Knorpel-Beere IV/2 904
-Blume III 428
-Kraut III 211; IV/2 536
-Lattich VI/2 1072
Alpen- VI/2 1075
„ , Binsen- VI/2 1072
„ -Möhre V/2 1170
Knoten-Blume II 309
-Dolde V/2 994
„ -Fuss II 268
Knoww IV/1 276
Knubbegaste I 396
Knuflook II 230
Koblrösla II 257
Kobols-Distel V/2 988
Koch-Löffel IV/1 364
„ -Salat VI/2 1120
Köchara IV/3 1610
Köchebolig, Grober V/4 2380
Köëk IV/1 263
Köhlerkräutich VI/1 58
Kök IV/1 276
Kölbe I 392; IV/1 34
Kölbel II 365
Kölbelen II 256
Kölble IV/2 937
Kölle V/4 2279, 2282
Kölln V/4 2282
Kölme V/4 2279

Kölmlan II 365
Kölsch II 16
Köm (en) V/2 1182
Könel V/4 2282
Königin der Halligen V/3 1884
Königin der Nacht V/2 693
Königs-Bisam V/4 2268
„ -Blume V/2 722
Königsfarn I 42
Königskerze VI/1 7, 16; VI/2 1360; VII 203 Fig. 1041, 1147 1244
„ , Berg- VI/1 14
Königs-Kraut V/4 2268
-Lein V/1 21
-Palme VII 157
-Salbei V/4 2480
„ -Stiefeli V/3 2214
Köpernik V/2 1319
Köpken V/2 998
Köppen III 273
Köppernickel V/2 1301
Körbel V/2 1027
Körbelkraut V/2 1042
Körblekraut III 577
Körblikraut, Wälsches V/2 1042
Körbs VI/1 324
Körf(f)el V/2 1017, 1027
Körk IV/1 263, 276
Körlesbeer V/2 1548
Köscht'n III 101
Koflwermuth VI/2 559
Kohdissel VI/2 846, 903
Kohheid V/3 1690
Kohl IV/1 229, 242
, Brüsseler IV/1 247
„ , Wilder IV/1 245
Kohldistel VI/2 898
Kohl-Eiche III 111
-Gänsedistel VI/2 1107
-Mändl II 337
-Reps IV/1 254
-Röschen II 304
-Rösl, Gelbes II 189
-Rose III 455
-Rübe IV/1 255
„ -Saat IV/1 254
Kohnschrot'n IV/3 1182
Kohntjen III 441
Kohteken V/3 1675
Kokagewächse VII 184
Kokapflanze V/1 37; VII 185 Fig. 1229
Kokeschbleamen II 245
Kokeschücher II 245
Kokliko IV/1 29
Kokospalme VII 157
Kolben I 112
Kolbenfaden VII 157
Kolbenhirse I 193
Kolbenschimmel VII 140
Kolbenträgergewächse VII 170
Kolben-Weizen I 395
Kolerakraut V/4 2328
Koliander V/2 1071
Kolk I 122
Kolldissel VI/2 846
Kolle(n) V/4 2282
Kollerdistel V/2 988; VI/2 869
Kollermann V/4 2373
Kollrabi IV/1 243, 248
Kolmas II 135
Kolmwaz I 395
Koloquinte VI/1 314
Koloquinten-Kürbis VI/1 314
Kolrâwe IV/1 243
Kolrôse IV/1 29
Komellen VI/2 581
Kommer VI/1 321
Kommerzienwuddel II 135
Kompasspflanze VI/1 495
Kompst IV/1 243
Konkl II 195
Konkla VI/1 215
Konradskraut V/1 511, 526
Konstantinopel II 236
Kooblöme IV/3 1331
Koodood I 53
Kooflesch II 16
Kookäem III 475
Kookämel III 475
Kool IV/1 242
Kootecken V/3 1681
Kopf-Binse II 45
-Eibe VII 150
-Gamander V/4 2523
-Ginster IV/3 1175
-Gras I 265
„ , Blaues I 268
-Klee VII 182
-Kohl IV/1 247
-Kohlrabi IV/1 248
-Kreuzkraut VI/2 745
-Orchis VII 164
-Salat VI/2 1119
-Segge II 55
-Strauch VII 207
-Strenze V/2 959
„ -Sumpfgras I 210
Kopfweh-Bloama IV/3 1712
-Blüemli II 365
-Kraut V/3 1869
-Nägela III 300
„ -Stenker IV/3 1712
Kopple III 459
Koppwied III 22
Kopritz V/2 1319
Korakan I 265
Koralleblume V/3 2224
Korallen-Baum IV/3 1626
-Beere VII 207
-Blümchen III 600
-Blume II 257
-Kirsche V/4 2588
„ -Strauch IV/2 743
Korallenwurz II 394
Korbblütler VI/1 394; VII 21 Fig. 1031 und 209
Korbe V/2 1183
Korb-Marante VII 164
Korb-Weide III 23, 26
Koriander V/2 1071
„ , Garten- V/2 1071
Kork-Baum V/1 53
-Eiche III 106
-Strauch VII 184
„ -Ulme III 119
Kormutter VI/2 961
Korn I 388, 396
„ -Beisser V/3 2158; VI/2 961
Kornblume VI/2 961
„ „ Berg- VI/2 965
Kornelkirsche V/2 1548
Korn-Fresser VI/2 961
„ -Göckala VI/1 541
Kornillen V/2 1548
Korn-Minze V/4 2341
-Nägala VI/2 903
-Nägele III 273
„ -Nägeli VI/2 961
Kornrade III 273
Korn-Rosen III 273
-Salat VI/1 266
-Scheckl VI/2 961
-Schmiele I 217
-Tabak VI/1 101
-Wut V/4 2459
Korrebeere IV/2 757
Koscht I 53
Koschtets, (Kleiner) V/4 2309
„ , Grosser V/4 2328
Kosen I 67
Kostenz V/4 2328
Kothe I 67
Kotitten VI/1 255
Kotschlenketa VI/1 242
Kotzapfütla VI/1 456
Kounala V/4 2308
Krabbestrunk III 254
Krachelbeere IV/2 646
Krachele III 279
Kracherlitzen IV/3 1529
Krackenbeer IV/2 708
Krackjene IV/2 708
Kräglein IV/2 962
Krähenbeere V/3 1603; VII 43 Fig. 1072
Krähenbeergewächse V/3 1602; VII 195
Krähen-Fuss IV/1 92
„ -Schnabel VI/1 292
Kränselte IV/2 646
Kränzelkraut V/3 1853
Kränzlekraut IV/2 537
Krätz am Arsch IV/2 977
Krätzen V/1 134
„ -Bleaml IV/2 635; V/1 134
Krätzen'bloama III 466
Krätzen-Gras V/1 134
-Kraut IV/1 21; IV/2 635; V/1 134
-Strauch IV/3 1193

Krätzkraut VI/1 303, 309
Glanz- VI/1 308
„ , Krainer VI/1 307
Krätz'nbleam'l III 466
Kräuselbeer IV/2 645
Kräutel durch den Zaun V/4 2373
Kräzbeere IV/2 802
Kraft-Bleaml V/3 1760
-Rosen VI/2 705
-Wurz VI/2 683, 705, 818
„ -Zwiebel VII 162
Kragefode IV/2 805
Kragenblume VI/1 489
Kraggedistel V/2 988
Kraharbasen IV/3 1538
Krahbeer V/3 1603
Krahfuss II 337; III 557; V/2 1213
Krahnfuas I 66
Krahnfüsserl IV/3 1367
Krahnhax'n I 66
Kraienfaut III 561
Kraienfoet III 557
Krainer Augentrost VI/1 98
Bocksbart VI/2 1045
Kerndolde V/2 1087
Krätzkraut VI/1 307
Kratzdistel VI/2 895
-Lilie II 237
Schlüsselblume V/3 1764
Sterndolde V/2 971
„ Tollkraut V/4 2570
Krainfuss I 188
Krainogen V/3 1675
Kraitskraitek VI/2 787
Krakerlizen IV/3 1529, 1546
Kråkklöver IV/2 805
Kralla IV/2 977
Krallebömke V/2 709
Krallen V/1 474
-Bläer V/1 474
-Blöme V/1 474
„ -Krud V/1 474
Krambeere V/3 1669
Krammetskiesch IV/2 708
Krampf-Chrut I 66
-Kraut IV/2 891
-Krut IV/2 972
„ -Worzel III 441
Kram(s)beeren V/3 1686
Kramtsbeerbaum IV/2 708
Kranawit I 89
Kranckeln V/3 1681
Kranenfoet III 557
Kránhaxen IV/3 1719
Kranichbeere IV/2 764
Kranichschnabel IV/3 1668
Kranklbeer V/3 1669
Krankraut I 66
Krannbeere V/3 1685
Kransvogelbeen IV/2 708
Kranzelkraut V/4 2308
Kranzenkraut V/4 2518
Kranzkraut V/3 1853
Kranzlan V/3 1853
Kranz-Lichtnelke III 297; VII 71, Fig. 1106
„ -Rusen V/3 1887
Krapp VI/1 231
Krappenägeli V/3 2014
Krappeveigele V/3 2014
Krass V/3 1701
Kratzärschle IV/2 977
Kratz-Bärscht VI/1 281
-Beere IV/2 802
„ -Bier IV/2 771
Kratzdistel VI/2 866, 1367; VII 213 Fig. 1265
Alpen- VI/2 901
Bach- VI/2 890
Berg- VI/2 893
Englische VI/2 887
Krainer VI/2 895
Sumpf- VI/2 878
Ungarische VI/2 881
„ „ , Woll- VI/2 869
Kratzebêre V/2 1549
Kratzenkugel VI/2 825
Kratz-Kopf VI/1 283
„ -Kraut V/4 2613
Kraudruab'n IV/1 252
Kraunwidlstaude I 90
Kraup düorn Tun VI/1 228
Kraus-Balsam V/4 2346
„ -Distel V/2 987
Krauseminze V/4 2345, 2350, 2351, 2352
Krauskohl IV/1 246
Kraut IV/1 243
„ -Blätsche IV/1 245
Krautgarten-Läuse VI/1 517
Kraut-Lewat IV/1 254
-Petersilie V/2 1157
-Rübe IV/1 255
-Schmeckata V/4 2328
-Weide III 27
„ -Wurz IV/3 1196
Kraweiden IV/3 1182
Krean IV/1 305
„ , Bilder III 173
Krebs-Äugla V/3 2161
-Blume V/3 2132
-Distel VI/2 920
„ -Kaktus V/2 692
Krebsschere I 162
Krebs-Weide III 23
-Wurz VI/2 710, 1354 Fig. 958 und 1367
Kreeke IV/2 1106
Krëenfaut III 561
Kreien-Been IV/2 708
-Beeren V/3 1603
„ -Foot III 191; IV/2 805
Kreike IV/2 1106
Kreimken V/3 1686
Kreindoor IV/3 1222
Kreinföt V/2 1213
Kreinkropp V/4 2416
Kreinôgen V/3 1670
Kreiser V/2 916
Kreisessl V/4 2441
Kreismännchen VII 208
Kreitzkreitchen VI/2 787
Krêkel(te) IV/2 1106
Kremmelkirsche IV/2 1070
Krempfer V/2 1509
Kremplkraut IV/3 1712
Kren IV/1 305
Krentebeer V/3 1669
Krente(nstrûk) IV/2 649
Kreosotstrauch V/1 40
Kreschelheck IV/2 646
Kresse IV/1 74, 81
Österreicher IV/1 308
Pyrenäen IV/1 314
„ , Türkische IV/1 78
Kretengrosch VI/1 541
Kretischer Diptam V/4 2333
Kreuz-Beer V/3 1670
-Beeren I 92
-Bleaml V/3 1754
„ -Bloama II 315
Kreuzblütler IV/1 5; VII 176
Kreuzblume V/1 89, 101; VI/2 961
Bittere V/1 108
Buchsblätterige V/1 91
„ „ , Grosse V/1 95
Kreuzblumengewächse V/1 86; VII 185
Kreuzdorn V/1 329; VII 187 und Fig. 1010, 1146
, Felsen- V/1 335
, Zwerg- V/1 337
„ -Gewächse V/1, 320; VII 187
Kreuz-Enzian V/3 2004
Kreuzerlan III 542; V/3 1853
Kreuz-Gras VII 155
„ -Kräutchen VI/2 787
Kreuzkraut IV/1 164; VI/2 726, 1367
Alpen- VI/2 747
, Busch- VI/2 758
Felsen- VI/2 779
, Fluss- VI/2 757
Frühlings- VI/2 781
Hain- VI/2 758
, Jakobs- VI/2 773
, Läger- VI/2 739
, Moor- VI/2 732
, Orientalisches VI/2 781
, Schatten- VI/2 756
, Steppen- VI/2 743
Sumpf- VI/2 753
Wald- VI/2 792
„ , Wasser- VI/2 775
Kreuz-Krottch V/1 527
-Kümmel V/2 1138
„ , Schwarzer III 475
-Labkraut VI/1 225
-Nessel VI/1 32
-Raute V/1 69
-Salbei V/4 2483

Kreuz-Spiere VII 180
„ -Tännel V/1 538
Kreuzwehkraut V/3 1844
Kreuz-Wurz V/3 2006
, (Blaue) V/3 1998
„ , Weisse V/3 2068
„ -Wurzel VI/2 787
Kriacherl IV/2 1106
Kriebelrettich IV/1 276
Krieche IV/2 1106, 1108
Kriech-Klee IV/3 1302
„ -Weide III 32
Krieschel IV/2 646
Krinsing VI/2 569
Krinten (Wille) IV/2 757
„ -Busch IV/2 651
Krischpel VI/2 1114
Krischtofkraut III 477
Kriss-Beer IV/2 646
„ -Betten IV/2 646
Kristajne III 101
Kristanje V/1 301
Krist-Beer IV/2 646
„ -Blome III 466
Kristleidenblume V/3 1844
Kristofaleskraut III 477
Kritzelkrut VI/2 787
Kroache II 275
Kroapfûta I 66
Kroatischer Wachtelweizen VI/1 77
Krobes III 557
Krodde IV/1 263
Krodlkraut V/4 2308
Krodnbleaml VI/2 1083
Krökesli II 292
Krönchen-Feldsalat VI/1 263
Krönschel IV/2 646
Krönzel IV/2 646
Kröpel V/2 1428
Kröss, Wilde IV/1 348
Krös(s)kes V/3 1670, 1686
Kröten-Binse II 155
-Bleaml V/1 134
-Gras V/1 134; VI/2 787
„ -Kraut V/1 134; V/4 2413
Krokk IV/3 1529
Krokkeln V/2 1333
Krokössli II 292
Krolldiessel VI/2 874
Krometkhop IV/2 937
Kronäugel V/3 1603
Kronen-Kraut III 308
-Lattich VI/2 1076
-Wucherblume VI/2 592
Kronewett I 89
Kron-Fuass V/2 1213
„ -Haxen III 522
Kronlkraut V/4 2308
Kronsbeere V/3 1669, 1681
Kronschel IV/2 646
Krontatschen, Gelbe III 557
Kronwicke IV/3 1465
„ , Bunte IV/3 1473
Krook IV/1 263
Kroppenholz, Wöste IV/2 1105
Kropp-Kruth VI/2 620
-Schlaat VI/2 1119
„ -Weide III 22
Kroschel IV/2 646
Krosseln V/3 1670
Krotenkreidl III 225
Krotenwampen V/4 2472
Krotnkraut IV/2 635; V/4 2336
Krottebalsam V/4 2336
Krotten V/2 1508
-Ăugli V/3 2161
-Blume VI/2 1083
„ -Dill VI/2 587
Krotte(n)peterle V/2 1272
Krottenpeterling V/2 1082
Krottesurampfer III 173
Krôzbiäre IV/2 771
Kruckelmöhre V/2 1406
Krückfoot III 254
Krügl II 257
Krüllke VI/2 961
Krüsebeerle IV/2 646
Krützblömke VI/2 787
Krützelmöhre V/2 1406
Krütz-Kämel V/4 2613
„ -Krüttsche VI/2 787
Krüütken röhr mi nich an V/1 314
Krüzert VI/2 787
Krüzesch V/3 1926
Krugglocke VII 208
Kruizdorn IV/3 1190
Kruizebôhm VI/2 787
Krullilje II 236
Krumm-Beere V/4 2595
-Büchse VII 147
-Fahne VII 183
„ -Hals V/3 2202, 2203
Krummholz I 100
Krummröhre VII 209
Krumm-Segge II 70
Krumpir V/4 2595
Krunkeln III 459, 557
Krup-dörn-Tun V/4 2373
Krupheide V/3 1690
Krusabel V/1 284
Kruschke IV/2 695
Kruse III 141
Kruse Hehe V/3 1690
Krusemäntelchen IV/2 962
Kruspel IV/2 646
Krut bin Tun V/4 2373
Kruupboonen IV/3 1629
Kruup düo'n Taun V/2 1213
Kruz-Krut VI/2 787
-Wort VI/2 787
„ -Wurtel VI/2 787
Kryptogamen I 2
Kuchlmichl IV/2 639
Kuckezer VI/2 1049
Kuckuck III 336; IV/3 1574; VI/2 684, 1049
„ -Blume IV/1 345
Kuckucks-Blom, Blaue V/4 2537
Kuckucks-Blome III 298
-Blume II 326, 336; III 457, 522; V/3 2214; VI/2 684
-Brod III 180; IV/3 1650
-Klee IV/3 1645, 1650
-Knabenkraut II 346
-Kraut III 298; IV/3 1650
-Kunst IV/3 1650
-Lichtnelke III 298
-Mous IV/3 1650
-Schuh II 326
-Seife III 432
-Speichel VII 136
-Spie III 298
-Weck II 196
Kuckukschichelchen IV/3 1574
Kuckukschuh IV/3 1574
Kud(e)lkraut V/4 2308
Kûdik IV/1 263
Küachla V/1 474
Küamaul V/3 2199
Küchen-Polich V/4 2307
schelle III 535, 536
-Zwiebel II 232; VII 97 Fig. 1125
Küchlikrut V/3 2230
Kückerikük II 337
Küel I 112
Küelen I 85
Küelk IV/1 276
Küh-Butter VI/1 133
„ -Ditzen II 196
Kühe I 85
Küh-Fuss V/4 2497
-Hörner VI/1 378
„ -Hunger III 522; VI/2 758
Kühla II 196
Kühlesroada II 196
Küh-Melle VI/2 581
-Schlotte II 196
-Schmelchen I 309
-Schnouze VI/2 758
-Schwänz V/2 814
„ -Strichel II 369
Kühtritt VI/1 64
„ , Kärntner VI/1 65
Küh-Wampe VI/1 79
Küken-Blome I 157
„ -Kömel V/4 2309
Külweite I 392
Kümm V/4 2308
Kümmel V/2 1181
Ägyptischer V/2 1138
Brot- V/2 1182
Feld- V/2 1182
Hafer- V/2 1138
Italienischer V/2 1138
Knollen- V/2 1191
Kreuz- V/2 1138
Linsen- V/2 1138
Mohren- V/2 1138
Mutter- V/2 1138
Pfaffen- V/2 1138
Pfeffer- V/2 1138

Kümmel, Polnischer V/2 1138
, Römischer V/2 1138
Rohr- V/2 1138
Spanischer V/2 1138
Speise- V/2 1182
Spiess- V/2 1138
Stachel- V/2 1138
Stern- V/2 1187
Türkischer V/2 1138
Wanzen- V/2 1138
Weisser V/2 1138
„ , Wiesen- V/2 1182
Kümmerlinge VI/1 321
Küngeli II 341
Kürbis VI/1 323, 324
Apfel- VI/1 326
Apfelsinen- VI/1 326
Birnen- VI/1 326
Bisam- VI/1 327
Eier- VI/1 326
Flaschen- VI/1 314
Moschus- VI/1 327
Riesen- VI/1 326
Schild- VI/1 326
Schiromon- VI/1 326
Schwamm- VI/1 314
Taler- VI/1 315
Türkenbund- VI/1 326
Turban- VI/1 326
Warzen- VI/1 326
, Zitrull- VI/1 326
„ -Gewächse VI/1 311; VII 208
Kürbs(e) VI/1 324
Kürwes VI/1 324
Küsten-Engelwurz V/2 1342
Kütte(ne) IV/2 689
Kufdemad V/3 1913
Kugelamarant VII 172
Kugelblume VI/1 172; VI/2 1303; VII 22 Fig. 1037
Kugelblumengewächse VI/1 171; VII 205
Kugel-Bohne IV/3 1633
Kugeldistel VI/2 807
, Bienen- VI/2 808
, Ruthenische VI/2 811
„ Ungarische VI/2 810
Kugelfaden VII 175
Kugel-Fichte I 88
-Ginster IV/3 1193
-Gras I 267
-Kaktus V/2 695
-Knabenkraut II 345
-Malve VII 188
-Rapunzel VI/1 378
-Sacher II 29
-Schmerchel III 459
„ -Schötchen IV/1 142
Kuh-Blume III 457; VI/1 79; VI/2 1083
-Bohne IV/3 1623
-Brändli II 365
-Dille(n) VI/2 592, 624
-Drecknagerl III 332
Kuh-Euter II 196; VI/2 1049
-Euterchen II 337
-Fuss II 337; III 219
Kuhhornbaum V/2 773; VII 192
Kuhhornklee IV/3 1231
„ , Kleiner IV/3 1230
Kuh-Kraut III 317
-Latsch V/2 1428
„ -Latte III 173
Kuhlemuh II 196
Kuh-Muss I 53
-Peterlein V/2 1017
-Petersilie V/2 1017
-Raute VI/2 768
-Schelle III 534; IV/2 915; VII 174 Fig. 1217
-Schraten IV/3 1182
-Schwauze V/2 814
-Speik VI/2 559
-Tutten VI/1 128
-Weizen VI/1 79
„ -Za'l VI/2 758
Kukuk, Blauer V/4 2380
Kukuksblom V/3 1746; VI/2 1084
Kukuksei II 240
Kukukser II 336
Kukuks-Schall V/3 1746
-Schlössel V/3 1746
„ -Skelp I 116
Kukumer VI/1 321
„ -Kraut V/2 1291
Kukurantschen V/3 2008
Kukurutz I 179
Kulksbeeren VI/1 244
Kull(e)rdistel V/2 988; VI/2 869, 898
Kullerum IV/1 252
Kulma I 217
Kumälle VI/2 591
Kumkumer VI/1 321
Kummer I 393
„ -Blume(n) IV/1 389; VI/2 581
Kummerlich VI/1 321
Kummer(n) VI/1 321
Kummerradl V/4 2373
Kumölln VI/2 581
Kumskool IV/1 243
Kumst IV/1 243
Kum-weder VI/1 128
Kundebohne IV/3 1623
Kundelkraut V/4 2308
Kunele V/4 2308
Kunigundenkraut VI/1 401
Kunkelnägala VI/1 215
„ , Weisse VI/1 212
Kunkelreb V/4 2373
Kuotschenmilch IV/1 21
Kurn I 388, 396
Kurnrat'n III 273
Kurottenwuttel V/2 1508
Kur(rli)-Beri V/2 1548
Kurtuffeln V/4 2595
Kurzbüchse VII 147
Kurzdachklaue VII 205
Kurzfähnchen VII 182
Kurzschopf VII 209
Kuscheln I 101
Kußblume VII 162
Kutsch III 495
Kutschenblume III 495
Kutsch un Peer III 495
Kutt, Bloa V/3 2014
„ , Fedde VI/2 787
Kuttelkraut V/4 2282, 2307, 2308
Kutzblueme VI/1 309
Kweltmaie II 195
Kwîekel IV/2 708
Kwöäken I 383

L.

Laasch II 29
Lâberblât III 219
Labestock V/2 1350
Labkraut VI/1 207, 212; VI/2 1363
Alpen- VI/1 218
Anis- VI/1 227
Echtes VI/1 215
Frühlings- VI/1 225
Glanz- VI/1 213
Grannen- VI/1 210
Kletter-, siehe Klebkraut
Kreuz- VI/1 225
Moor- VI/1 221
Purpur- VI/1 216
Sumpf- VI/1 221
Unechtes VI/1 229
, Wald- VI/1 209
„ -Sommerwurz VI/1 141
Lablabbohne IV/3 1624
Lach II 231
Lachenknoblauch V/4 2530
Lack I 122
„ -Holz I 100
Lackmuskraut V/1 120
Lack-Senf IV/1 268
„ -Sumach V/1 221
Laddch VI/2 676
Laddek VI/2 825
Laddeken VI/2 676
Laddich VI/1 236
Laddikenbläe VI/2 683
Ladstöck(l) V/2 1350
Läfchesblätter V/2 916
Lägenblatt VI/1 181
Läger-Chrut VI/2 747
„ -Kreuzkraut VI/2 739
Lägken I 100
Lählen III 511
Lämeli III 72
Lämerwéd VI/1 266
Lämmerchen III 72
Lämmersalat VI/2 1004
Lämmer-Schmiele I 217
-Schwänze II 53; III 72
-Schwanz II 16; III 197
-Zagel III 219, 264
„ -Zunga III 194, 200; VI/1 181
Lämmlezinke(n) VI/1 266
Lämmli VI/1 266

Lämmli-Zunge VI/2 569
Lämperrippen VI/2 974
Längelieber V/3 1913
Läön V/1 280
Läpel-Blom I 151
„ -Deef IV/1 364
Läpelkes IV/1 364
Läpel-Krud IV/1 364
Läpels I 151
Lärche I 95; VII 151 u. Fig. 1171
Läte I 376
Lätschblätter III 441
Lättichblätter III 173; VI/2 683, 825
Läuse I 293
-Baum V/1 120
„ -Blume VI/1 292
Läusekraut VI/1 112; VI/2 1362; VII Fig. 1147, 1248, 1250
, Erd- VI/1 126
, Knollen- VI/1 114
Schopf- VI/1 122
Sumpf- VI/1 120
„ , Wald- VI/1 121
Läuskraut V/2 1333
Läusschlode II 196
Läutschgras I 383
Lafendl V/4 2277
Lagerstaude I 100
Lahnlauch II 219
Laichkraut I 121; VII 122
-Gewächse I 120; VII 122 Fig. 1159 u. 152
Lais II 135, 293
Laiwe (Frauen) Beddestrau VI/1 215
„ „ Fingerkes IV/3 1367
Lakritzen IV/3 1454
Lakte VI/2 676, 683
Lamberta IV/1 469
Lambertrittli VI/1 292
Lambertsnuss III 71
Lammkraut VI/2 1004
Lampâschenblatt VI/2 825
Lampe VI/2 1084
Lampion V/4 2580
„ -Pflanze V/4 2579
Lanawurz'n II 219
Land-Dreck I 383
-Farbgras I 197
„ -Gersten I 397
Landkartenflechte VII 144
Landschnecht VI/2 878, 903
Landschnît VI/1 215
Lang-Bohne IV/3 1623
-Eschel V/3 1926
Langfadengewächse VII 192
Lang-Mies I 66
„ -Stengeln II 315
Lanzchnächt VI/2 846
Lappenbeere VII 171
Lappenblume VII 176
Lappen-Farn I 38
-Kohl IV/1 243
„ -Kreuz IV/1 447
Lappländer Spitzkiel IV/3 1441
Lappländer Weide III 42
Larch I 95
Larchendanne I 95
Laserkraut V/2 1472
„ -Sommerwurz VI/1 144
Laterne VI/2 1084
„ -Blum V/4 2580
Laternenpflanze V/4 2579
Latinablätter III 173
Latke VI/2 676
Latsche I 100; V/2 1428
Lattche(n) VI/2 683
Lattech VI/2 676
Lattenblattl VI/2 676
Lattich VI/1 404; VI/2 676, 1113, 1118
Gift- VI/2 1122
, Ruten- VI/2 1129
Wald- VI/2 1127
, Weiden- VI/2 1125
„ -Salat VI/2 1118
Latuke VI/2 1118
Laub-Chrut V/2 1350
-Ritsche III 495
-Spikel V/2 1350
„ -Stöcke V/2 1350
Lauch II 213, 231; VII 159 Fig. 1069, 1125, 1189
, Berg- II 221
, Sommer- II 231
, Winter- II 231
-Gamander V/4 2530
-Kraut IV/1 149
„ -Scheibenschötchen IV/1 147
Lauchschön VII 159
Laufdistel V/2 987
Laugeblueme V/3 1750
Laugenblume VI/2 622
Laurin V/3 1969
Laus VI/1 228
-Bleaml V/2 709; V/3 1844
-Blume II 307; VI/1 288
-Büschel II 307
-Kraut I 65; II 193, 196; III 465; VI/1 120
„ -Wurz(n) II 193; V/3 1844
Lauwertel V/3 2224
Lavander V/4 2274, 2277
Lavendel V/4 2274
, Echter V/4 2277
, Welscher V/4 2275
-Gras I 198
„ -Heide V/3 1651
Lavender V/4 2277
Lavkoje IV/1 443
Laxirkrut V/1 163
Lebensbaum I 82, 92; VII 151
Leb(ens)kraut IV/2 522
Lebensstock V/2 1350
Leben und Sterben IV/2 522
Leberbalsam VI/1 70, 408; VI/2 1365; VII 209
Alpen- VI/1 70
Mexikanischer VI/1 408
Leber-Beer VI/1 244
-Blattel III 528
„ -Blaume III 528
Leberblümchen III 528
„ , Siebenbürgische III 518
Leber-Chrut III 528
-Klette IV/2 935
„ -Kraut V/2 815
Lebermoose VII 144
Lebngöscherl VI/1 19, 25
Leckern I 100
Leckerstaude I 100
Leder-Blume V/1 52
-Birne IV/2 697
-Orchis II 388
-Schuh, Der lieben Frau III 495
-Strauch VII 184
-Tange VII 139
„ -Wide III 22; VI/1 242
Ledharle I 377
Leefkraut IV/1 47
Leelhecken III 511
Leerbam I 95
Lees I 321
Leesch II 29, 135, 293
Leest I 116, 321
Leethardel I 377
Leetskelp I 321
Leewken III 173
Lefestik V/2 1350
Lêfk'nklew'r IV/3 1290
Legföhre I 100
Lehlheck VI/1 255
Lehmblüamli VI/2 676
Lehnheck III 511
Leible V/1 474
Leibstöckle V/2 1350
Leichenblum II 196
Leienfledde III 335
Leifrabettstrê V/4 2328
Leïfstack V/2 1350
Leighèrl I 377
Leim-Baum V/1 280
Leimkraut III 277
, Aufgeblasenes III 279
, Nickendes III 292
„ -Krätzkraut VI/1 306
Leimkrautpflanzen VII 173
Leim-Rude III 276
Lein V/1 3, 20
, Gelber V/1 8
, Klebriger V/1 10
-Baum V/1 280, 285
„ -Blatt III 151, 152
Leindotter IV/1 368
Leingewächse V/1 1; VII 184
Leining III 418
Leinkraut VI/1 20, 25
Acker- VI/1 23
Alpen- VI/1 21
„ , Italienisches VI/1 25
Lein-Nelke III 288
Leinsaat V/3 2117

Leinsaat, Gelbe V/3 2117
Lein-Seide V/3 2102
Lein-Spindel III 276
Leisk I 116
Leiskreitchen III 352
Leist I 196
Leisten-Pilze VII 142
Leitärlichrut II 269
Leitbündelpflanzen I 2; VII 147
Leitbündelkryptogamen I 2; VII 147
Leiter-Baum IV/2 974
-Blume IV/2 974
„ -Gras I 379
Leiterlekrut IV/2 889
Leiterlichlee IV/3 1489
Leiterli(chrut) IV/2 937; V/2 1017; VI/2 570
Leiterli-Gras IV/2 937
„ -Farn I 35
Leiwefruggenbettestrauh V/1 527
Leiwehärsbedstroh V/4 2275
Lelum III 511
Lembled VI/2 676
Lemerschwenz V/3 1913
Lemkentunge VI/1 266
Lemoni-Kräutel VI/2 634
„ -Kraut V/4 2369
Lendiblätter III 173
Lên(e) V/1 280, 285
Len(g) V/1 430
Lenna III 511
Lenne V/1 280
Lepelholt V/1 249
Lepelkrut III 163
Leppstock V/2 1350
Lerchen-Blume VI/1 56
Lerchensporn IV/1 34, 38
„ , Gelber IV/1 47
Lergat I 95
Leuchel II 80
Leuchterbaum V/2 769
Leuchterblume VII 199
Leueläff VI/1 19
Leuerache VI/1 19
Leueräcbeli VI/1 19, 25
Leueschnörrli VI/1 19, 25
Leueschnorra VI/1 19
Leuezahn VI/1 19
Levestock V/2 1350, 1352
Levkoje IV/1 468; VII 178 Fig. 1221
Lewat IV/1 252, 254
Lêwe(r)stock V/2 1350
Lewkenkrut IV/1 47
Liabfraubröserl IV/2 537
Liabfraunschuachal IV/3 1574
Liachtbluma II 195
„ -Kraut IV/1 21
Liäbahergottsblüml IV/1 345
Liäwerkrut VI/2 1273
Lian III 511
Libanon-Ceder I 81
Licht-Blom VI/2 1084
-Blume II 194; VII 159
Lichterblume VI/2 1084
Lichtnelke III 295; VII 71, Fig. 1106
Lichtnussbaum V/1 120
Licht-Stöckel V/2 1350
Lidrüske I 53
Liebäugel V/3 2199
Liebe-Frau-Linsat I 293
-Hergottsblüemle III 543
-Herrgottsschüehele IV/3 1367; V/1 598
-Herrgottsschüehli IV/3 1482, 1538
Lieber-Herrgottsbrot IV/1 364
-Herrgottsgras I 291
-Herrgottsknödle IV/2 537
-Herrgottsschüe(h)le IV/2 537; IV/3 1182
Liebesapfel V/4 2607
Liebesgras I 279, 280
Liebes-Stückel V/2 1350
Liebfrauen-Bettstroh V/4 2309
-Handschuh VI/1 66
-Harl I 203
-Kelch V/3 2086
-Mantel IV/2 962
-Pantöffele II 326
„ -Schucherl II 326
Liebfraunhaar I 293
Liebgsichtli V/1 598
Lieberöhre V/2 1350
Lieb-Rohr V/2 1350
-Stengel V/2 1350
-Stock V/2 1314
„ „ , Alpen- V/2 1319
Liebstöckel V/2 1349
Berg- V/2 1350
„ , Welsches V/2 1468
Liebswürza II 337
Liechtli VI/2 1084
Liele III 511
Lieln III 511
Lieloch III 511
Liemli I 67
Lie(n) V/1 280
Lierach III 511; V/2 916
Liern III 511
Liesch II 52
Lieschgras I 211
Lievstock V/2 1350
Liguster V/3 1944, 1946
Lila V/3 1913
Lilach V/3 1913
Lilak V/3 1913
Lilg II 234
Lilie II 234, 291, 293
Krainer- II 238
Weisse II 234
„ , Wilde II 293
Liliendolde VII 162
Lilienflachs VII 159
Liliengewächse II 184; VII 159
Liliengrün VII 126 Fig. 1166
Liljenkonvalljen II 274
Lilien-Simse II 189; VII 101 Fig. 1130
„ -Wicke IV/3 1579
Lilla V/2 916
Lillauf V/2 916
Lillgen I 319
Lilljen II 274
Liloof V/2 916
Lilumfallum II 274
Limabohne IV/3 1628
Limette V/1 68
„ , Saure V/1 68
Limone V/1 66
Limonelle V/1 68
Lindbast II 16
Linde V/1 430; VII 188 Fig. 1231
Früh- V/1 446
Gras- V/4 446
„ Kaukasische V/1 434
Linde, Schwarz- V/1 436
Sommer- V/1 446
Spät- V/1 437
Wald- V/1 437
„ , Winter- V/1 437
Lindengewächse V/1 426; VII 188
Lingeboom V/1 430
Lin(gen) V/1 430
Linn V/1 430
Linnjetal VI/1 258
Linse IV/3 1501, 1502
Polnische IV/3 1514
„ , Spanische IV/3 1514
Linsebaum IV/3 1458
Linsen-Bohne IV/3 1627
„ -Wicke IV/3 1512, 1517
Linstöckl V/2 1350
Lippenblütler V/4 2255; VII 200
Lirsch'n III 511
Lisär IV/3 1257
Lisärohr V/2 1333
Lischä IV/3 1222
Lischägräser II 52
Lische I 211
Lischôgrosch II 52
Lisebetli VI/1 59
Liseblueme III 561
Lisettchen IV/1 484
Listedorn IV/3 1222
Litje III 141
Littgängche VI/1 212
Lituc-Kekers IV/3 1502
Liwerängl V/3 1913
Loaberl V/1 474
Loantscha III 466
Lobelie VI/1 392
„ , Deutsche VI/1 393
Lobeliengewächse VI/1 391; VII 209
Lobstecken V/2 1350
Lobstock V/2 1350
Loch-Kitzle IV/2 977
„ -Schlund VI.1 30; VI/2 1360
Loddik III 173
Lodiksblatt VI/2 825

Lodkenblätter III 173
Löcherkraut V/1 527
Löcherschwämme VII 142
Löchertrüffel VII 141
Löcken I 100
Lödding VI/2 676
Löffali IV/1 364
Löffel-Chrut III 163
Löffelischelm IV/1 364
Löffelkraut IV/1 134, 136; VII 176 Fig. 1219
Löffel-Kresse IV/1 136
Löhne V/1 280
Löhrer I 95
Löckerröserl V/3 1635
Löll I 379
Löm(e)k(e) VI/1 64
Lönn V/1 430
Löpp III 441
Lörkenblatt VI/2 683
Loetschesbläder VI/2 676
Lött III 441
Löuw-Nessle III 139
Löwen-Fuss I 66
„ -Göscherl V/3 2194
Löwenmäulchen VI/1 19
Löwenmaul VI/1 18, 19, 25, 343; VII 203
Acker- VI/1 20
, Grosses VI/1 19
Löwen-Rachen VI/1 19, 25
-Schwanz V/4 2392
-Trapp VII 175
-Zänge VI/1 37
Löwenzahn VI/2 1017, 1078, 1083
Alpen- VI/2 1020
Herbst- VI/2 1018
Kapuzen- VI/2 1093
Pyrenäen- VI/2 1021
Safran- VI/2 1023
Staub- VI/2 1024
Sudeten- VI/2 1093
„ , Sumpf- VI/2 1092
Loggebletter VI/2 676
Lohdüber IV/2 711
Loisblom VI/2 1084
Loiterlgras IV/2 889
Lolch I 375
„ , Taumel- I 376
Lombardische Pappel III 64
Longa-Blimla VI/2 676
„ -Kraut IV/2 931
Look I 50; II 231
Loosbaum VII 200
Lorbeer IV/1 11; VII 176
, Alexandrinischer VII 162
, Amerikanischer V/3 1620
, Blätter- V/3 1884
, Stein- VI/1 241
-Baum, Alexandrinischer V/1 500
-Gewächse IV/1 10; VII 176
-Kirsche IV/2 1061
-Krüglein VII 196
Lorbeer-Rose V/3 1620; VII 195
-Schlinge VI/1 241
-Seidelbast V/2 706
-Weide III 19
Lorchel VII 141
Lorkenblume VI/2 691
Lortänne I 95
Lothjehn VI/2 676
Lotosblume, Indische III 438
Lotusbirne V/3 1898
Lotuspflaume V/3 1898
Lotwurz V/3 2177
„ , Sand- V/3 2180
Louisiana-Moos II 142
Luaga III 600
Lubbe(r)stick(en) V/2 1350
Luchten VI/2 1084
Lübstock V/2 1350
Lüchgras I 379
Luege, (Feld-) V/4 2457, 2459
Lueger, (stechender) V/4 2457
Lühstock V/2 1338
Lüling II 235
„ , Blauer II 291
Lüln III 511
Lünich VI/1 64
Lünick VI/1 64
Lüs III 180
Lüsäbündeli I 291
Lüsarä III 180
Lüs-Beeri V/1 250
Lüsch III 180
Lüse VI/2 825
-Hälz V/2 709
„ -Krud V/2 709
Lütt III 441
Luft II 32
Lûge V/4 2450
Lugenblatt VI/1 181
Luixenstickl V/2 1350
Lulch I 376
Lulich I 331
Lungechrut II 132
Lunge(n)-Chrut IV/2 628
Lungen-Enzian V/3 2000
Lungenflechte VII 144
Lungenkraut V/3 2209, 2214; V/4 2328; VI/2 676
Lungen-Wôrt IV/3 1310
Lung'nkress IV/1 136
Lungwurz V/3 2209
Luoken III 173
Luorkenbläer VI/2 676
Lupine IV/3 1148; VII 75 Fig. 1110
, Ägyptische IV/3 1153
, Ausdauernde IV/3 1154
Blaue IV/3 1158
Gelbe IV/3 1156
Sizilianische IV/3 1153
„ , Weisse IV/3 1153
Lupinenklee IV/3 1312
Lupinenseide V/3 2109
„ , Falsche V/3 2101
Lupritsche III 495
Luppbeere V/3 1670
Luppertsche III 495
Lusampfara III 180
Lus-Beere IV/2 725
Lûs-Blôm VI/2 1084
Lus-Bluema VI/2 1084
„ -Chölbli II 365
Lûsedissele VI/2 846
Lusemelde III 219
Lusing IV/3 1257
Luskrut III 465
Lusmellen III 225, 239
Lusteken V/2 1350
Lust-Stecken V/2 1350
„ -Stock V/2 1350
Lusworza II 193
Luuk II 16
Luzerne IV/3 1257, 1260
Blaue IV/3 1260
Deutsche IV/3 1259
Gelbe IV/3 1259
Pannonische IV/3 1265
Schwedische IV/3 1259
, von Buenos Aires IV/3 1263
-Seide, Hessische V/3 2106
Luzien-Holz IV/2 1070
-Rohr IV/2 1070

M.

Maadkerze VI/1 338
Maäpopl VI/2 1084
Maarrose III 441
Macerone V/2 1077
Machandel I 89
Machholder I 89
Macona-Baum V/1 502
Madämele IV/1 29
Madäneli V/3 1746, 1750
Madagaskarbohne IV/3 1625
Madam(e) IV/1 29
Madaun V/2 1319
Maddelenchesblümchen VI/1 414
Maddeseblümchen VI/1 414
Madekräudig IV/3 1243
Madelger V/3 2004
Madennli V/3 1746
Madune IV/2 651
Mächhehl VI/2 758
Mädchenauge(n) V/1 598; VI/1 529
Mäddl I 228
Mädelbaum I 98
Mädepalm V/3 1669, 2053
Mäder-Krieg IV/3 1222
„ -Krottch VI/2 617
Mädesüss IV/2 971
Mädlesbagenka V/3 1750
Mägde-Blumenkraut VI/2 617
„ -Heil VI/2 758
Mägetli II 247
Mägi IV/1 33
Mählgä III 225
Mählsössche VI/1 414
Mähnen-Gerste I 396
-Pippau VI/2 1147

Mährrettich IV/1 305
Mähsk VI/1 201
Mäkrut IV/2 971
Mâelfässer IV/2 725
Mänderle, Blaues VI/1 43
„ , Gelbes VI/1 42
Männertreu II 365; V/3 2145; VI/1 59
Männlein IV/2 1093
Mänteli IV/2 962
Mäpelahoorn V/1 284
Mäpel(er) V/1 284
Märchen-Äpfel V/3 1686
„ -Birnen V/3 1686
Märtenblöme II 307
Märwelin IV/2 1056
Märzableamle III 522, 528, 536
März-Becher VI/2 676
-Blüemle V/3 1760
-Blümcher V/3 1760
„ -Blümli VI/1 414
Märzen V/3 1746
-Becher II 313
-Bleaml VI/2 676
-Blimmerchen III 528
-Bluem III 536
-Blümli II 307, 310
-Gocher II 310
-Kaibln III 466
„ -Nudeln III 72
März-Kegel VI/2 676
-Nägelcher V/2 709
-Stern II 313
-Veilchen V/1 649, 652
„ -Wurz IV/2 917
Mäsch III 133
Maeselder V/1 284
Mäsöt IV/2 971
Mäuchli IV/3 1610
Mäultascherl VI/1 25
Mäuschen IV/3 1591
Mäuse-Bohne IV/3 1553
-Dorn II 264
-Gerste I 398
-Klee IV/3 1322, 1640 Fig. 1606
-Küttel III 352
„ -Myrte III 11
Mäuserl III 352
Mäuserling IV/2 646
Mäuse-Schierling V/2 1082
„ -Schwänzchen II 256; III 540
Mäuseschwanz-Federschwingel I 326
Mäuse-Wicke IV/3 1477, 1553
Mäusle V/4 2595
Magaro V/4 2309
Magdalenenkraut, (Gäl) VI/2 620
Mag(e)n IV/1 33
Magen-Distel VI/2 990
„ -Kraut II 132
Mâgerk VI/2 638
Magerkraut V/3 2223
Maginka V/3 1746
Magistranz V/2 1397
Magnolie IV/1 13; VII 175 Fig. 1218 a bis e
Magnoliengewächse VII 175
Magsame IV/1 34
Magthüsli IV/1 34
Mahagoni-Bäume V/2 783
-Baum, Roter V/2 786
„ „ , Wald- V/2 786
Mahderknopf VI/2 944
Maia V/3 1913
-Rappa IV/1 469
-Rösli II 315
-Schupf VI/2 676
-Seckal IV/2 915
„ -Trübli II 256
Mai-Baum III 76; IV/2 1064
Maiblaumenbôm V/1 258
Mai-Bleaml VI/2 1084
-Blemle, Falsche II 267, 269
-Blom II 274; IV/1 345; V/3 1912; VI/1 414
-Blüa(h) V/3 1913
-Bluem V/3 1912
„ -Blümel V/3 1750
Maiblume II 274; VI/1 201; VI/2 1084; VII 102 Fig. 1132
Chinesische II 269
Kleine V/3 1585
„ , Wilde II 267, 269
Maibuschn VI/2 1084
Maichhehl VI/2 758
Maidele V/2 1508, 1509
Maidist(e)l VI/2 1084, 1105
Maie III 76
Maie-Blueme VI/2 1084
-Blüemli II 315
-Bluest V/3 1912
„ -Nägeli IV/1 443
Maien-Blüemli III 529
-Blume II 326
-Kraut I 44
„ -Röslein IV/2 1046
Maiera(n) V/4 2334
Maieri(e)sli, Wildes II 381; V/3 1585
Maierisli II 274, 372
„ Wildi II 267
Maierieslistrauch IV/2 565
Maierösli V/3 1912
Maieruun V/4 2334
Maiezäpfe V/4 2537
Mai-Glöckchen II 274; V/3 1585; VII 102 Fig. 1132
„ -Glogga VI/1 68
Maijenblom VI/1 414
Mai-Kräutchen I 44
„ -Kraut VI/1 201
Maila IV/1 345
Maililljen II 274
Mai-Palm V/3 2053
„ -Pantöffelchen II 326
Mairâl V/4 2334
Mairan V/4 2334
Wilder V/4 2416
Mai-Rettich IV/1 281
Mairiesli, Blaui II 257
Mairösla II 274
Mairösli V/2 716
Mairose IV/2 1046
Mairübe IV/1 262
Mairum V/4 2334
Mais I 178; VII 41 Fig. 1068
Maisäckchen II 326
Maische V/3 2161
Mai-Schellchen II 274
„ -Schuh II 326
Maistarla V/2 964
Maisteckel VI/2 1084
Majoran V/4 2332, 2334
„ , Wilder V/4 2328
Makenga V/3 1746
Makimmi(g) V/2 1183
Makron V/4 2334
Maksuskelchen VI/1 414
Malabarspinat III 267; VII 172
Malayapfel V/2 779
Malde(n) III 225, 239
Malepfife III 15
Maliescher VI/1 414
Malina IV/2 768
Malinabeer IV/2 768
Mallewkes VI/1 414
Malljeblom VI/2 801
Malteser-Flockenblume VI/2 983
-Melonen VI/1 320
„ -Schwamm V/2 698
Malt'n III 239
Maludenwurz V/2 1328, 1329
Malune VI/1 324
Malve V/1 474; VII 17 Fig. 1015 a
Bisam- V/1 479
Kleine V/1 485
Moschus- V/1 479
Strand- V/1 454
„ , Wilde V/1 481
Malvengewächse V/1 453; VII 188
Mamabaum V/1 660
Mamelisten-Dörn V/2 732
Mamja V/1 660
Mammuthbaum I 82; VII 151
Mamoeiro V/1 660
Mân IV/1 33
Mânblaume IV/1 33
Mandarine V/1 59
„ , Falsche V/1 64
Mandel IV/2 1087
-Baum IV/2 1086
„ , Indischer V/2 771
-Bloom IV/2 615
„ -Weide III 21
Mandergrimm V/3 2194
Mandl VI/1 536
„ -Baum I 98
Mangel-Chrut III 214
„ -Wottel III 214
Mangle-Baum V/2 769

Mangl baumgewächse V/2 768; VII 191
Mango-Baum V/1 215; VII 186
„ -Gurke V/4 2587
Mangold III 214, 215
Mangrovebaum V/2 769
Maniel III 214
Manihot V/1 119
Manizellenbaum VII 186
Manling III 214
Manna I 293; IV/3 1650
, Preußische I 319
-Esche V/3 1922; VII 198 Fig. 1238
-Gras I 319
-Schwaden I 319
„ -Tamariske V/1 547
Mannesschüeli IV/1 38
Manns-Blut V/1 511
-Chraft V/1 527
„ -Kraft IV/2 918; V/1 526
Mannslev IV/1 47
Mannsschild V/3 1789; VII 196
Alpen- V/3 1800
Charpentier's V/3 1797
, Schweizer- V/3 1795
Tiroler V/3 1801
„ , Zwerg- V/3 1802
Mannstreu II 365; V/2 974; VI/2 869; VII 64 Fig. 1098 A
Alpen- V/2 981
Feld- V/2 987
„ , Seestrand- V/2 979
Manntjeblöme III 301
Manselblueme III 481
Mantel I 98
Mantelkam I 98
Manzele II 313
Maradendele V/3 1746
Mâradistel VI/2 1105
Maran V/4 2334
Maranta's Pelzfarn I 39
Maraun V/4 2334
Marbel II 173, 177, 183; VII 158 u. Fig. 1071, 1086
Mardaune V/3 1670
Mardun V/2 1319
Mareiali IV/2 1097
Mareieli, (Grossi) VI/2 609
Mareie(n)-Bluem VI/2 609
Marentaken III 146
Margarethenbeere V/3 1675
Margaretlein VI/1 215
Margen-Blatt VI/2 599
-Blaume VI/1 414
„ -Gras I 201
Margerite, Grosse VI/2 609
Margram V/4 2334
Margrêten IV/2 646
Margrit(t)li VI/1 414; VI/2 609
Margron V/4 2334
Mar-Grünggeli VI/1 414
-Grüntschi VI/2 609
-Gruntschi VI/1 414
Maria Bettstroh V/1 527
-Hilfsblüemli V/3 1701
-Mäntela IV/2 962
„ -Nägeli V/1 598
Mariebettstroh V/2 814
Marienbettstroh V/4 2309
Marien-Blatt VI/2 599
-Balsam VI/2 599
-Blömken VI/1 414
„ -Blome VI/1 414
Marie(n)-Chrut III 571
Marien-Distel VI/2 916, 917
-Flachs I 203
-Glockenblume VI/1 331
-Gras I 200, 201
-Kolben I 112
-Kraut V/4 2523
-Nesselkraut V/4 2395
-Palm V/3 1569
-Rose IV/2 1018; VI/2 801
-Schäuscken III 495
-Schükelchen II 326
-Stängel V/1 598
Tränengras I 181
„ -Wurzel VI/2 599
Mariggeli V/3 1754
Marikenbettstroh V/4 2309
Marille IV/2 1097
Marillen, (wilde) V/2 1406
Mariske(l) V/1 548
Marjen VI/1 414
Mark III 557; IV/1 305
Markelblom VI/1 414
Markkohl IV/1 248
Marl I 228
Marleewkes VI/1 414
Marobel V/4 2395
Marräk IV/1 305
Marreik IV/1 305
Marressig IV/1 305
Marretsch IV/1 305
Marubelkraut V/4 2395
Marünggeli III 481; VI/1 372
Maruun V/4 2334
Maryland-Tabak V/4 2624
Ma(r)zîs(e)l VI/1 414
Masarun V/4 2334
Maschele III 133
Maschen IV/2 1108
Maschlaber I 65
Maschlemche VI/1 414
Maschlimche VI/1 414
Maschlimmercher VI/1 414
Maselleres V/1 284
Masera, wilde V/4 2328
Maserholder V/1 284
Masero V/4 2334
„ , Wilda V/4 2309
Maserun, wilda V/4 2328
Maseruu V/4 2334
Maskl III 133
Massholder V/1 284
„ , Französischer V/1 288
Massiggeli V/3 1754
Masslieb(chen) VI/1 414; VI/2 590
Massliebchen, Grosses VI/2 609
Massliebchen-Ehrenpreis VI/1 47
Mas(t) IV/1 34
Mastel III 133
Mastichkraut V/4 2524
Mastix-Strauch V/1 230
Mast-Klüpfel IV/1 34
-Kraut III 380—388; VII Fig. 1062, 1214
Matängeli V/3 1750
Matänneli V/3 1750
Mate V/1 235
Matengala V/3 1746
Matenkele V/3 1750
Matönje III 455
Matram VI/2 617
Matronalfeigel IV/1 466
Matronen-Blume IV/1 466
„ -Kraut VI/2 617
Mattatätsch VI/1 181
Matt-Distel VI/2 1105, 1162
Mattedänli V/3 1750
Mattedenni:i V/3 1746
Matte-Nägeli III 298, 300
Matte(n)-Distel VI/2 898
Matten-Kerbel V/2 1002
Matte(n)kümmi(ch) V/2 1183
Matten-Lieschgras I 215
„ -Rusk II 29
Mattetänneli V/3 1750
Mattkümmi V/2 1183
Matt'l I 228
Mattschartä VI/2 898
Matzeliefchen VI/1 414
Matzgogarl III 273
Matzisli II 315
Matzliebche VI/1 414
Mauchele IV/2 546
Mauchkraut V/3 2194
Maueli II 16
Mauer-Ehrenpreis VI/1 55
-Habichtskraut VI/2 1273
-Hungerblümchen IV/1 386
-Kräutchen IV/2 536
-Lattich VI/2 1110
„ -Nudel IV/2 534
Mauerpfeffer, Scharfer IV/2 536
„ , Weisser IV/2 534
Mauer-Pippau VI/2 1165
-Raute I 31; III 428
-Senf IV/1 208
„ -Tatzeln IV/2 536
Maukel II 16
Maukenkraut I 18; IV/2 891
Maulaff(erl) VI/1 19, 25
Maulauferl V/11 19
Maulbeerbaum, Schwarzer III 129
„ , Weisser III 127, 128
Maulbeergewächse III 123; VII 168
Maulobbe VI/1 19
Maulsperr VI/1 19
Maulwurfskraut V/1 146
Maunl II 16

Mau(n)za(r)l IV/3 1322
Maunzerl II 16
Maurbeere V/3 1681
Mauren V/2 1508
Maurerpinsel VI/2 885, 974
Mausch III 133
Mausdissele VI/2 903
Mauseguddeln III 352
Maus-Haber I 253
-Holz V/4 2589; VI/1 252
-Leiterl VI/2 570
-Öhrchen V/3 2159; VI/1 266; VI/2 1203
„ , Gelbes V/3 2173
-Öhrle VI/1 456
-Öhrlein VI/2 1198
„ , Blaue V/3 2170
-Ohr VI/1 266; VI/2 1198
-Potsch V/3 2161
„ -Wicke IV/3 1553
Mauter VI/2 617
Mayeron V/4 2334
Medaschke IV/1 466
Meddel I 228, 238
Medischer Apfel V/1 64
Medusenhaupt-Haargras I 400
Meeglöckl II 274
Meelwiefken IV/2 725
Meer-Distel V/2 884
-Fenchel V/2 1225
-Gras I 197; VII 152
-Gries V/3 2156
-Hirsch V/3 2156
-Hirsen V/3 2156
-Kette VII 138
„ -Köhl V/3 2085
Meerkohl IV/1 295, 296
„ -Winde V/3 2083
Meer-Narzisse II 319
-Nelke V/3 1888
-Nixkraut I 144
-Rettich IV/1 305
-Saite VII 138
-Salat VII 138
-Schwingel I 324
„ -Senf IV/1 182; VII Fig. 1109 d
Meerstrand-Binse II 165
-Milchkraut V/3 1865
-Steinkraut IV/1 447
„ -Sternblume VI/1 423
Meer-Träubchen I 75; VII 151 und 104 Fig. 1135
-Trübeli IV/2 649
„ , Schwarzi IV/2 653
„ -Wermut VI/2 659
Meerzwiebel II 246, 278
„ „ , Falsche II 250
Mehlbala III 225
Mehlbeerbaum IV/2 713
Mehlbeere IV/2 705; V/3 1681
„ , Schwedische IV/2 716
Mehlbeeri IV/2 711, 714, 721, 725; V/3 1681
Mehl-Birne, Südliche IV/2 707
Mehl-Bläda VI/2 676
-Blätter II 219
-Blümli V/3 1754
-Blüemli V/3 1760
-Bomm III 59
-Fässli IV/2 725
-Granten V/3 1657
-Halm I 238
-Kiesch IV/2 725
-Kübeli IV/2 725
„ -Primel V/3 1754
Mehlsamengewächse VII 158
Mehl-Schlüsselblume V/3 1754
Mehltaupilze VII 140
Mehlwurzel I 66
Mei-Bläder III 542
„ -Bleaml II 274
Meier VI/1 198
Meieran III 352
„ , Wilder V/4 2328
Meier-Chrut VI/1 201
Meierum III 352
Meiketsche IV/2 646
Meirich VII 173
Meischgl IV/2 646
Meisklee IV/3 1322
Meister-Chrut V/3 2068
„ -Lösli III 300
Meisterwurz V/2 961, 964, 1397
„ „ , Wilde V/2 1333
Meitli badentli V/3 1750
Meitliruete VI/1 242
Meitschihaar I 330
Mekka-Sennes IV/3 1131
Mekl V/2 814
Melanzanapfel V/4 2587
Melbäumli VI/1 242
Melchdistel VI/2 1084
Melcher VI/2 1049, 1084
Melchsechterl V/3 1844
Melde III 225, 237, 239; VII 171
Meldengewächse III 210; VII 171
Melekatömmelche IV/2 1091
Melilotengras I 198
Melis V/4 2369
Melisse V/4 2302, 2369
, Englische V/4 2302, 2369
, Syrische V/4 2302, 2440
„ , Türkische V/4 2302, 2361
Melissenblatt V/4 2469
Melkeblömke V/1 134
Melkekraut VI/2 1105
Melker VI/1 255
Melksöchtä II 327
Melle III 225, 237, 242
Mellenkruud III 239
Mellmus III 239
Melone VI/1 320
, Malteser- VI/1 320
Netz- VI/1 320
Wasser- VI/1 313
„ , Zucker- VI/1 320
Melonenbaum V/1 660; VII 190
Melosa VI/1 532
Melsöt IV/2 971
Meluttenkraut IV/3 1243
Menderle, Blaues VI/1 43
Mengelt III 214
Menisten-Jüfferke IV/2 627
Menkastengel III 173
Menschengesichter V/1 598
Merch IV/1 305
Merdel I 228
Mergendistel VI/2 917
Merk V/2 1216
Merkelblom VI/1 414
Merkfruchtbaum VII 186
Merlekirsch IV/2 708
Merôn, Wilder V/4 2309
Merrel I 305
Merrettich IV/1 305
„ -Baum IV/1 491
Merum V/4 2334
Merzachöbel II 313
Merzä-Blüemli II 247
-Gloggä II 313
„ -Glöggli III 522
Merzbluem V/3 1743
Merze-Blome VI/2 1084
-Blüemli II 307, 310; V/3 1750
-Bluoma II 313
-Chindli II 132
-Glöggli II 307, 310
„ -Glogge III 536
Merze(n)-Blüemli VI/2 676
Merze-Rösli II 313
-Schelle II 313
-Stock VI/2 1084
„ -Völleli II 307
Merznbecherl III 536
Mes-Melle III 225
Mespel(te) IV/2 739
Messblume VI/2 609
Mess(e)lder V/1 284
Messeller V/1 284
Messmâl III 225
Metra(m) VI/2 617
Meusch VI/1 201
Mexikanischer Leberbalsam VI/1 408
Meyechrut V/2 1213
Mêzehammele III 72
Miälkwuartel VI/2 1105
Miärsöt IV/2 971
Michels-Wurz II 195
„ -Zwippeln II 195
Middel I 228
Mielitz I 321
Miere III 352, 389—402
Mierengewächse III 272; VII 172
Mierenstern-Tännel V/1 536
Mierreik IV/1 305
Mies, Blaues IV/2 579
Miesekidl III 352
Miesnagerl III 294
Miesveigl III 294
Miezchen II 16
„ -Klee IV/3 1322
Miezethee IV/3 1322

Migetze IV/2 646
Mihre, Rode V/3 1869
Milachblacka VI/2 1084
Mil'bloama V/1 134
Milch-Blouma VI/2 610
-Blüamli III 522
-Blüemli VI/1 414; VI/2 1198
-Blueme II 253; VI/2 1018
-Blume VI/2 1049, 1105
-Busch VI/2 1084
-Chrut V/1 134; VI/2 1105
-Dieb VI/1 83
„ -Distel VI/2 917, 1099, 1105
Milchen VI/2 1000
Milch-Heckle V/1 285
„ -Heiler VI/2 1049
Milchichrutt VI/2 1018
Milchingstöck VI/2 1084
Milch-Kraidl V/1 134
-Kraut IV/1 21; V/1 163, 617; V/2 749; V/3 1865; VI/1 133; VI/2 1099
Meerstrand- V/3 1865
„ , Unserer lieben Frauen V/3 2213
-Lattich VI/2 1096
Alpen- VI/2 1099
„ „ , Französischer VI/2 1098
Milchli(n)g VI/2 1049, 1084; VII 142
Milchmies I 67
Milchner VI/2 1049
Milch-Raber VI/1 83
„ -Schelm VI/1 83
Milchstern II 250, 253; V/1 514 Fig. 1943; VII 162
, Gelber II 211
-Stöck VI/2 1105
-Tötteln VI/1 83
„ -Wurzel VI/1 372
Mil(e)chstöck VI/2 1084
Milentz I 196
Milijontouznkrut V/3 1969
Milikraut, Gelbes IV/1 21
Milikübel V/3 1844
Militz I 196
Milm III 239
Milnkool III 239
Milz-Farn I 25
„ -Kraut IV/2 633; VII 179
Mimali III 15
Mimose IV/3 1123, 1126; VII 181
Mimosengewächse VII 181
Mina-Prunkwinde V/3 2076
Minksch II 80
Minutenkraut I 37
Minzali III 15
Minze V/4 2335
Gelbe VI/1 486
Grüne V/4 2351
Japanische V/4 2342
Römische V/4 2351
Türkische VI/2 599
Weisse V/4 2348
Wilde V/4 2348
Mirabelle IV/2 1108
Mirben V/4 2595
Mirch V/1 305
Mirschemei I 67
Mischgelt III 146
Mispel IV/2 739
Italienische IV/2 730
Japanische IV/2 664
„ , Welsche IV/2 730
Misple III 146; IV/2 739
Misslämmli VI/2 620
Mist-Blackä III 173
„ -Chrut III 220
Mistel III 146; VII 170
„ -Gewächse III 145; VII 170
Misti-Chrut III 198
„ -Feich I 189
Mist-Pilze VII 143
Mitscherlich V/2 1082
Mitscherling V/2 1082
Mittagsblume I/CIV Fig. 165; III 267; VI/1 292; VII 38 Fig. 1063
Mittelmeer-Trespe I 362
Moadistel VI/2 1105
Moagreatitzpearleni IV/2 646
Modakrettich VI/1 463
Moda(r)gottesdeffilin VI/1 25
Modekrud IV/3 1243
Modelge(e)r V/3 2004, 2006
Modergods Bettstrauh IV/2 537
Moder-Kraud VI/2 581
„ -Marlêfke VI/1 414
Möerk II 16
Möhre V/2 1501, 1516; VII 126
Falsche V/2 1495
Futter- V/2 1517
, Pferde- V/2 1517
Riesen- V/2 1517, 1518
Weisse V/2 1517
„ , Wilde V/2 1514
Möhren-Haftdolde V/2 1062
Möhrli II 365
Möhrrettich IV/1 305
Möhsch VI/1 201
Möischen VI/1 201
Mölken II 16
Möllele IV/2 1097
Mönatlin VI/1 414
Mönchs-Kappen II 196
-Kraut V/3 2205
Braunes V/3 2206
„ , Gelbes V/3 2208
-Pfeffer V/3 2237
„ -Rhabarber III 171
Mönelli VI/1 536
Mönetli VI/1 414
Mönkekapp III 495
Möörkers II 16
Möösch VI/1 201
Möschen VI/1 201
Mohbluma IV/1 353
Môheitl II 196; IV/1 34
Mohn IV/1 25—36; VII 18 Fig. 1016
Mohn-Gewächse IV/1 16; VII 176
Mohnling VII 176
Mohrächümmi V/2 1508
Mohren, Weisse V/2 1406
„ , Wilde V/2 1406
Mohren-Erbse IV/3 1554
-Hirse I 184
-Köpfli II 365
-Kraut V/4 2492
-Kümmel V/2 1278
„ -Salbei V/4 2492
Mohrewurzel V/2 1508
Mo(h)rewurzle VI/1 316
Mohr-Rübe V/2 1501
„ -Wurtel V/2 1406
Moibeer IV/2 768
Moiltn III 239
Moister V/2 964
Mojleefkes VI/1 414
Mokesauerampel IV/2 635
Molber IV/2 768
Molchschwanz VII 165
Molda III 225
Molderbrôd IV/2 725
Molgerskraud V/4 2574
Molkeblume IV/1 345
Molken II 16; III 225
„ -Kraut III 239
Mollge III 239
Moltebeere IV/2 764
Molten III 239
Mombeere V/3 1675
Monadli VI/1 414
Monale VI/1 414
Monarde V/4 2506
„ , Scharlach- V/4 2507
Monardenkraut V/4 2506
Monats-Bleaml VI/1 414
-Rettich IV/1 281
-Röserl VI/1 414
-Rose IV/2 993
„ -Veilchen V/1 652
Mond-Bohne IV/3 1628
-Raute I 44
„ -Same, Kanadischer IV/1 16
Mondsamengewächse VII 175
Mondscheinkraut V/4 2592
Mondscheinl III 557; VI/1 414
Mondschie IV/1 353
Mondviole IV/1 353; VII 213 Fig. 1268
Monet-Blüemli VI/1 414
Monetsblume VI/2 609
Mont Cenis-Rispengras I 314
Monte Baldo-Segge II 59
Montpellier-Nelke III 337
Moorächöpf V/2 1508
Moor-Beën V/3 1686
-Beere V/3 1681
-Binse II 42
-Birke III 76
-Eckel IV/2 882
-Glocke VI/1 388; VI/2 1364
-Gras II 16
-Heide V/3 1708

Moor-Klee, Brauner IV/3 1294
-König VI/1 125
-Kreuzkraut VI/2 732
„ -Labkraut VI/1 221
Moorluuk II 16
Moor-Pûüskes II 16
-Rosmarin V/3 1623
-Schildkraut V/4 2513
-Steinbrech IV/2 621
-Tarant V/3 1974
-Veilchen, Sibirisches V/1 629
-Weide III 33
-Wötteln V/2 1406
-Wollgras II 21
„ -Wutteln V/2 1508
Moos-Auge V/3 1589
-Beere II 275; V/3 1685, 1686, Sumpf- V/3 1686; VII 116 Fig. 1150
-Bleaml III 294, 457
-Blüemli V/3 1754
-Blümchen III 382; IV/2 517
-Blümel V/3 1754
-Bohna V/3 1957
-Bole II 16
-Büschel III 457
-Buseli II 16
-Butten III 457
-Esch IV/2 708
-Fakken V/3 1681
-Farn I 69; VII 147, 148 Fig. 1175
-Feder(n) I 271; II 16
-Flam II 16
-Glöckchen VII 207 u. 22 Fig. 1034
-Guckerchen V/3 1670
-Jucke V/3 1670
-Katzl II 16
-Klee V/3 1957
-Kolben I 112
-Kraut V/2 815
-Miere III 416
-Nabelmiere III 416
-Pflanze(n) V/3 1957; VII 144
-Roasa III 441
-Rohr I 112, 271
-Rolla III 459
-Schwimmfarn VII 149
-Steinbrech IV/2 600, 614
-Veilchen V/1 628
„ -Zingga V/3 1957
Mora V/2 1508
Moräblüema VI/2 1083
Morchel VII 141
Morchlebluoscht VI/1 128
Môrdissele VI/2 874
Morelle IV/2 1076
Moren IV/2 772
Morgen-Blatt VI/2 599
„ -Blume VI/1 414
Morgenländische Sternmöhre V/2 1060
Morgen-Röschen III 285
Morgenstern-Flockenblume VI/2 981
Morkrut V/2 1414
Mormonen-Tulpen II 278
Morra, geale V/2 1406
Morrnrod un Abenrod VI/2 801
Mos-Anken VI/1 160
Moscharvashen III 457
Moschbeer IV/2 708; V/3 1686
Moschkaitereashle VI/2 581
Moschtbluema III 457
Moschus-Chrut VI/1 260
-Erdbeere IV/2 902
„ -Kraut VI/1 37, 266; VII 207
Moschuskrautgewächse VI/1 259; VII 207
Moschus-Kürbis VI/1 327
-Malve V/1 479
-Reiherschnabel IV/3 1724
-Rose IV/2 992
-Schafgarbe VI/2 555
-Schnabelkraut IV/3 1724
„ -Steinbrech IV/2 606
Moserân V/4 2334
Moses-Tränengas I 181
Moskowiterdorn VI/1 502
Mos(t) IV/1 34
Mostbeer(e) IV/2 708; V/3 1675
Mostert IV/1 204
Mostjocke V/3 1670
Motreff VI/2 617
Motten-Blume VII 165
-Klee IV/3 1243
-König V/4 2270
-Kraut V/3 1623; V/4 2469; VI/1 9
Mounkela III 15
Muatergotteszacher I 293
Muaterkraut VI/2 617
Muattergöttesle V/3 2161
Muattergottesaugen VI/1 366
Muattergotteschrut V/3 1969
Mucka II 329
Muckablust VI/1 242
Mucke(n)dreck VI/1 242
Muckerl V/4 2416
Muckert VI/2 638
Muckröem IV/2 972
Mudelweissa I 394
Mückenkraut VI/1 486
Mücken-Nacktdrüse II 309
Müdla IV/2 922
Müggerik VI/2 638
Mühlebürstli VI/1 274
Mühlenblume V/3 1913
Mühlerädli V/3 1754
Mühlradl III 522
Mülchstern II 253
Mülle III 225
Müller VI/1 414
-Blüemli V/3 1754; VI/1 414
„ -Blueme, Grossi VI/2 610
Müllerkes IV/2 725
Müller-Knopf VI/1 292
-Mädeln V/3 1760
Müller-Rädli V/3 2054
Mümmel(ken) III 441
Münz, Chatze- V/4 2336
Münza, Gäli VI/1 487
Münze V/4 2335
Müre IV/2 772
Mürkalan VI/1 321
Mürsemau I 67
Mues-Dischle VI/2 1105
„ -Distel VI/2 1105
Müse I 217; II 16
Müsegehöl III 352
Mueterchrut VI/2 617
Muetergottes-Mäntele IV/2 962
„ -Schüe(h)li IV/3 1482
Muetergottes-Schüüli IV/3 1196
Mueter-Reashlain VI/2 581
„ -Schlüssili V/3 2214
Mütschela V/1 249
Mütschelesholz V/1 249
Muetterblüemli VI/2 617
Muettergottes-Gnadä IV/3 1712
-Haar I 293
-Pantöffli V/1 91
-Schüeli IV/3 1355
-Stifeli IV/3 1367
„ -Thränä II 337
Müüsli, (Wildi) V/4 2481, 2497
-Blatt V/4 2481
„ -Chrut V/4 2481
Mufitsch I 189
Muggerk VI/2 638
Muggert VI/2 638
Mugokiefer I 103
Mulchörbli I 293
Mulda III 225, 242
Mulfü(h)lichrut V/3 1853; V/4 2537
Mulkerskraud V/4 2574
Multbeere IV/2 764
Multn III 225
Mulufer(le) VI/1 19
Mummel III 444; VII 174
Mundfäulkraut V/4 2380
Mundfäulzepfen V/4 2380
Mungobohne IV/3 1627
Munibeere V/3 1681
Munneli II 16
Munnihode II 196
Munniseckel II 196
Muon IV/1 33
Murächrut I 31
Mur(ä)glöggli VI/1 349
Muren IV/2 772
Murkätzle IV/2 536
Murken V/2 1508; VI/1 321
„ -Kräutl V/2 1291
Murrper IV/2 772
Murtrübel IV/2 536
Murze-Mau I 67
Muscadine V/1 362
Muschelblümchen III 476
Muschelpflanze VII 158
Muschelpilze VII 141

Mûsedärme III 352
Muse-Klawer IV/3 1255, 1288
-Öhrkes V/3 2161
-Ohr V/3 2161
„ -Steert I 217
Mûsflider VI/1 237
Musjucken V/3 1670
Muskateller-Birnen IV/2 699
-Erdbeere IV/2 902
-Kraut V/4 2489
„ -Salbei V/4 2489
Muskat-Geranium IV/3 1665
Muskatnussbaum IV/1 15; I/CLV Fig. 296
Muskatnussgewächse IV/1 15; VII 175
Mustert IV/1 204
Mustertsâd IV/1 204
Muttakraut VI/2 581
Mutteli V/2 1319
Mutter-Beeren III 478
Mutter-Blume IV/1 466
Muttergottes-Bettstroh V/2 814
-Brot IV/1 364
-Schikelcher IV/3 1367
-Dorn IV/2 1018
-Haar V/2 814
-Hand II 337
-Herzle IV/1 364
-Kleid III 298
-Rose IV/2 1018
-Rute V/2 814
-Stroh VI/1 215
„ -Trinkglas V/3 2080
Mutteri V/2 1319
Mutter-Kamille VI/2 617
Mutterkorn I 389
Mutterkraut V/2 1319; V/4 2302, 2354, 2395; VI/2 617, 620
Muttern V/2 1319
Mutternale IV/1 466
Mutter(n)e V/2 1319
Mutter-Scharlach V/4 2489
-Veigela IV/1 466
-Wurz V/2 1314, 1345
Alpen- V/2 1319
(Sumpf-) V/2 1345
„ „ , Zwerg- V/2 1323
Muttlepalme V/1 236
Muur V/2 1508
Muusklewer IV/3 1322
Mûyen IV/1 33
Muzala II 16
Myrrhen-Kerbel V/2 1041
„ -Kraut V/2 1077
Myrte V/2 789; VII 192
Braut- V/2 790
Echte V/2 790
Juden- V/2 791
„ , Nelkenpfeffer- V/2 776
Myrten-Gewächse V/2 773; VII 192
-Krüglein V/3 1621
-Weide III 48

N.

Naakääsken II 307
Nabelkraut V/3 1593
Nabelmiere III 410—417
Nabelnuss V/3 2142
Nâbelwurzel IV/2 882
Nachlaufwurze II 337
Nachrut V/4 2332
Nachtepullche VI/1 56
Nachtepurlche VI/1 56
Nacht-Feigl IV/1 466
-Fräulein VI/1 258
-Gunkeln II 195
„ -Häfele IV/2 915
Nachtkerze V/2 857; VII 192 Fig. 1233
Nachtkerzengewächse V/2 797; VII 192
Nacht-Nebel IV/2 802
-Nelke III 299
„ , Klebrige III 302
-Schadd II 276
„ -Schatta VI/1 33
Nachtschatten IV/1 466; V/1 127; V/2 866; V/4 2582; VI/1 258
, Falscher VI/1 524
Gelber V/4 2594
, Roter V/4 2563
Schwarzer V/4 2592
„ , Weisser II 372
Nachtschattengewächse V/4 2548; VII 203 u. 25 Fig. 1049
Nacht-Schatterl V/1 598
-Schlüsselblume V/2 866
-Schöppli V/1 598
-Vi(g)ölken IV/1 466
-Vijôle V/1 598
„ -Viole IV/1 464, 466
Nackarsch II 196
Nacktdrüse II 367; VII 3 Fig. 970 c
Weisse II 368
„ , Wohlriechende II 370
Nackte Hure II 196
Nacktenhiemdken III 522
Nackte Wiewken III 522
Nacktfarn I 40
Nacktsamige Gewächse I 72; VII 150
Nadanzung III 194
Nadel-Aster VI/1 448
„ -Binse II 41
Nadelhölzer I 76/81; VII 150
Nadel-Johanniskraut V/1 513
„ -Kerbel V/2 1032, 1037
Nadelschirm VII 151
Naderbeer VI/1 236
Nadö VI/1 236
Näbeldörn V/1 284
Nägala V/3 1912
Nägalaswurzl IV/2 918
Nägebluem IV/1 443
Nägelcher V/3 1912
Nägelchesblume V/3 1912
Nägelchrut IV/3 1682
Nägele IV/1 443
Nägeli III 319, 321
, Wildi III 298
„ -Bluost V/3 1912
Nägelke III 319
Nägenknee III 418
Näkesche II 196
Nälchen III 319
Nälchesblume V/3 1912
Näschple IV/2 739
Näsekniperbôm V/1 263
Nästerligras I 261
Nätsch I 373; II 80
Nagas-Baum V/1 500
Nagel-Chrut IV/1 21; IV/2 918; VI/2 821
„ -Holz V/3 1946
Nagel(ke)bom V/3 1912
Nagelkes V/3 1912
Nagelkraut III 426; IV/2 939; VI/2 1198; VII 74 Fig. 1109 a
Nagerl III 319
„ , Blaue V/3 2014
Nagldearnoch IV/1 6
Nainibleaml V/3 1869
Nakede Jumfer II 196
Nakenäsken II 307, 310
„ , Dubbele II 310
Nâkend Wiefke II 307
Nakete Kathl II 196
Nallekösse VI/1 309
Napenkerbel V/2 998
Napfkraut V/3 2205
Napf-Pilze VII 141
Napplabeer V/3 1670
Naraspflanze VI/1 315
Narboner Lein V/1 14
Narrakolba I 115
Narren IV/2 1056
-Bödl V/4 2563
„ -Holz III 511
Narre(n)kapp VI/1 352
Narren-Kappen III 481
„ -Taschen IV/2 1056
Narungkl III 557
Narzisse II 312
Gelbe II 313
„ , Weisse II 315
Nasäspiegel V/1 263
Naseblüater III 300
Naseblüeter II 365
Nasen V/1 262
-Baum V/1 263
-Bliata IV/1 29
-Blome II 136
-Färber II 237
-Knieper VI/1 262
-Stiefel V/1 262
„ -Zwicker V/1 262
Nashissen II 315
Natter-Beer VI/1 236
-Bloama V/3 2194
-Chrut V/3 1853

Natter-Holz V/4 2589
„ -Kraut V/3 2194
Natternblüml II 269
Natternkopf V/3 2192
Roter V/3 2196
„ , Violetter V/3 2192
Natternzüngel V/1 101
Natternzungl V/3 2194
Natterzunge I 43; VII 148
Natterzungengewächse I 43; VII 148
Neapolitaner Erdscheibe V/3 1848
Nebelbeer(e) IV/2 802; V/3 1681
Nebelrosen V/3 1635
Neddel III 139
Nëëchela III 319
Neegelcher, Wil(d)e V/2 709
Neelandsblä(d)er VI/2 675, 676
Negenknee I 53
Neid-Klee IV/3 1234
-Kraut II 269; IV/3 1234; VI/1 463
Nelke III 318; VII 173
, Dolomiten- III 338
Gletscher- III 333
Illyrische III 326
Sand- III 341
, Stein- III 330; VII 119, Fig. 1155
„ , Triestiner III 329
Nelken-Basilie V/4 2268
Nelkengewächse III 271; VII 172
Nelkenhafer I 240
Nelkenpfeffer-Myrte V/2 776
Nelkenwurz IV/2 913, 918
, Echte IV/2 917
, Russische IV/2 920
„ -Steinbrech IV/2 627
Neptungras VII 152
Nervachrut III 191
Nerwelkraut III 173
Nes(ch)p(e)l IV/2 739
Nesple IV/2 739
Nessel III 137, 139
, Harte V/4 2400, 2457
, Tote V/4 2450
-Blatt VII 185
-Brut V/3 2090
-Gewächse III 136; VII 169
-Glockenblume VI/1 343
-Gloggeblueme VI/1 343
-König V/4 2444
-Röschen IV/2 665
„ -Seide V/3 2100
Nessle III 139
, Gele (Breun-) V/4 2441
Wildi V/4 2457
„ , (Zami) V/4 2438, 2448
Nest-Pilze VII 143
Nestwurz II 388
Nettel III 141
, Dauwe V/4 2438
„ , Dowe V/4 2438
Netz-Blatt II 390
Netzblättler VII 165
Netz-Melonen VI/1 320
„ -Weide III 29
Neuneck IV/2 962
Neunerle V/3 1869
Neunhäuterwurz II 219
Neinkraft VI/2 698
Neunkraftblatt VI/2 683
Neunlappenkraut IV/2 962
Neuseeländer Flachs II 277
„ Spinat III 267
Niágelken V/3 1912
Nidelbeeri IV/2 768
Nieksch II 80
Niela III 511
Nierekrut III 161
Nierenampfer VII 170
Nierenbaum V/1 215; VII 186
Nierensamengewächse VII 189
Niessworz II 193
Nieswurz III 463; VII 9 Fig. 987 a bis c
Niëtel III 139
Niettel V/4 2438
Nilche II 315
Nilge II 235, 315
Nimmerstill I 293
Ninsidolde, Chinesische V/2 1224
Ninsi-Zuckerwurz V/2 1224
Nipa-Palme V/2 769; VII 157
Nirsch'n III 511
Nischpel IV/2 739
Nissegras I 222
Nissel-Salat VI/1 266
Nissolie IV/3 1604
Nistel IV/2 739
Nistl(e) III 146
Nixkraut I 144; VII 152
„ -Gewächse I 144; VII 152
Nizza-Kreuzblume V/1 96
„ -Wolfsmilch V/1 180
Nodern-Bladl III 194
„ -Kraut VI/2 1198
Nörwelt IV/2 1056
Nösterli I 261
Nogen III 531
Noinkraftblatt VI/2 676
Noinzela VI/1 83
Nokorsch II 196
Nonen II 32
Nonnenfarzen IV/2 646
Nonnenfürzli IV/2 646
Nordamerikanische Grobseide V/3 2104
Nordamerikanisches Pfaffenröhrlein VI/2 1086
Nordische Birke III 82
Nordischer Drachenkopf V/4 2363
Mannsschild V/3 1814
„ Milzfarn I 29
Nordisches Erdglöckchen VI/1 245
„ Labkraut VI/1 223
Nordische Sternmiere III 556
Norfolk-Tame VII 50 Fig. 1081
Norischer Klee IV/3 1341
Norisches Fettkraut VI/1 160
Norwegisches Ruhrkraut VI/1 464
Nosnblouder III 298
Nosnbräse II 237
Nudeln V/4 2595
Nudla III 194
Nünhömlera II 219
Nüni-Blüemli V/3 1869
Nünichrut II 219
Nüsschen VI/1 266
Nüssle VI/1 266
Nüssli-Chrut VI/1 266
Nüsslisalat VI/1 266
Nunebirn IV/2 711
Nunen II 32
Nunnästreu I 115
Nunnenkrut IV/1 47
Nuss III 7
Konstantinopler IV/3 1463
Spanische IV/3 1463
Welsche III 7

O.

Oablatt IV/2 637
Oananie V/1 502
Oanber II 275
Oan-Hagelwurzn VI/2 817
-Hag'n VI/2 817
„ -Hak'n VI/2 901
Oar-Guka III 536
„ -Kräutle VI/1 212
Oarne V/1 262
Oaterpatz'n IV/2 646
Ober-Kinn II 383
Oberkohlrabi IV/1 243, 248
Oberrübe IV/1 248
Oblatter VI/1 372
Ochsäzungä I 34
Ochseblätterpotsch VI/1 292
Ochse-Brot VI/1 410
„ -Kälble II 196
Ochsen II 196
-Aug(e) VI/1 490; VI/2 610, 705; VII 210 Fig. 1261
„ -Beutel II 326
Ochse(n)-Gukel VI/2 1049
Ochsen-Köpf(e) II 330; V/2 884
-Kraut IV/3 1222
-Maul V/3 2194
„ -Pinsel II 196
Ochsenzunge III 173, 194; V/2 1438; V/3 2197, 2199, 2203
Blaue V/3 2193
, Färber- V/3 2205
Italienische V/3 2201
Kleine V/3 2203
„ , Rote V/3 2205
Ochse-Potsch VI/1 292
„ -Zung V/3 2194; VI/2 1273
Oderbladl III 194
Odermännel IV/2 931
Odermennig IV/2 930, 931
Odinskopf VI/1 475

Ögschen, Geele III 520
Öhmdfresser VI/1 83
Öhmli IV/2 1074
Öhrchen-Habichskraut VI/2 1203
Ölbaum V/3 1934; VII 197
„ -Gewächse V/3 1901; VII 197
Ölbohne IV/3 1620
Ölfenblume V/2 876
Öllig II 232
Ölmadie VI/1 532
Ölnich V/2 1311
Öl-Palme VII 157
Öl-Raps IV/1 254
-Reps IV/1 254
-Rettich, Chinesischer IV/1 280
-Rübe IV/1 259
„ -Same IV/1 254
Ölsenich V/2 1393
Öls(e)nitz V/2 1393
Ölsnich, Wiesen- V/2 1311
Ölweide V/2 730; VII 191
„ , Silber- V/2 730
Ölweiden-Gewächse V/2 727; VII 191
Ömpele IV/2 768
Öpfel-Blüemli VI/2 581
„ -Granium IV/3 1665
Örbsele IV/1 7
Örkenschnabel IV/3 1712
Öschen (Blaag) III 529; V/1 649
Ösenich V/2 1311, 1393
Österreicher Bergfenchel V/2 1234
Enzian V/3 2041
Geissklee IV/3 1173
Haarstrang V/2 1383
Hundskamille VI/1 539
Lein V/1 19
Rauke IV/1 170
Rippensamen V/2 1090
„ -Schwarzwurzel VI/2 1065
Österreichische Bärenklau V/2 1454
Gemswurz VI/2 712
„ Königskerze VI/1 10
Österreichischer Beifuss VI/2 642
„ Ehrenpreis VI/1 57
Öwerschnapp IV/3 1712
Ofenkearoch I 66
Ogenprökel V/4 2380
Ohmkraut IV/2 946
Ohnblatt V/3 1596, 1597; VII 105 Fig. 1136
Ohneglücke V/2 1333
Ohnejilke V/2 1338
Ohnhorn II 359
Ohnknoten VII 188
Ohraglüngga IV/2 977
Ohre V/1 262
Ohrlöffel-Leimkraut III 290
Ohr-Schlüsselblume V/3 1760
Ohr-Weide III 39
Öje II 232
Okrapflanze V/1 458
Oktöberli IV/2 518; VII 178 Fig. 1222
Olat VI/1 475
Oldocke II 193
Oleander V/3 2056
Olive V/3 1935
Oltwurz VI/1 475
Omspunnen V/3 2086
Onegilken V/2 1338
Onkelchen III 557
Ontario-Pappel III 58
Oöschen, (Witt) III 522
Oogen-Blär IV/1 21
-Blöme III 522
Opuntisches Kraut V/2 688
Orakelblumen VI/2 609
Orange, Bittere V/1 59; VII 46 Fig. 1078 und 58 Fig. 1093
, Süsse V/1 61
von Quito V/4 2587
Orangenblume VII 184
Orant VI/1 20, 29
Orfe I 104
Orgelkaktus V/2 691
Orikel V/3 1760
Orinken V/3 1969
Orkraut V/4 2332
Orleansbaum V/1 584
Orn V/1 262
Orne V/3 1922
Ortlesbeere IV/2 719
Osagedorn III 136
Osebrügge VI/1 292
Osnklait II 196
Ossenblaume VI/2 1083
Osterblom III 522, 536
„ , Blag III 529
Osterblome V/3 1746
„ , Gel(e) III 520, 542
Oster-Blume II 313; III 457, 522, 529, 536; V/3 1746, 1760, 2214
-Flämmken IV/3 1367
-Hase V/2 1017
Osterik V/2 1345
Osterlakzie III 163
Osterlaxin IV/3 1708
Oster-Lilie II 313
Osterlung III 163
Osterluzei III 162, 163; VII 130 Fig. 1170
Osterluzeigewächse III 160; VII 170
Oster-Maie III 457
-Schälchen II 310
-Veigerl V/1 649
Ostheimer Weichsel IV/2 1076
Ostrenza V/2 1397
Ostruz V/2 1397
Oswaldstaude V/3 1635
Ottara-Beeri IV/2 803
„ -Viali V/1 619
Otter-Chrut V/3 1852
-Gras V/2 815
-Gros III 194
-Kopf VI/2 898
„ -Männchen IV/2 931
Otterwin V/4 2336
Otter-Wurz III 194
-Zünglan III 196
-Zung III 194
Oxelbirne IV/2 716

P.

Paapaken III 441
Paapehötiche V/1 249
Paberstaud'n VI/1 242
Pachblümel III 276
Padaun V/2 1319
Paddeflören IV/1 466
Paddenblume V/3 1887
Padergras I 141
Padönachli V/3 1760
Padschurke IV/2 1064
Pääskappel IV/2 1091
Pädde I 384
„ -Krut V/1 129
Pädewinde V/3 2086
Pängstblum V/3 1913
Pänseli II 16
Päper-Blome V/2 709
-Boom V/2 709; VI/2 634
„ -Busk V/2 709
Päperläppä V/2 998
Päper-Wurzel IV/1 306
Päppernäll V/2 1199
Pärdeblöme VI/2 1083
Päre-Bohne IV/3 1556
-Kamille VI/2 610
-Minte V/4 2336
„ -Saat VI/2 620
Päske IV/2 1091
Pätsches Kraut VI/1 524
Päzal II 53
Paffekinder II 132
Pâgeminte V/4 2416
Paier I 228
Palasabaum IV/3 1626
Palche VI/1 56
Paleplee VI/2 683
Palm, Wilde V/3 1946, 2053
Palmen III 15; VII 156
„ , Wilder V/3 1669
Palmetto-Palme VII 156
Palmholt VI/1 244
Palmietschilf II 145
Palmkatzen III 15
Palmkohl IV/1 246
Palmlilie VII 161 Fig. 1191
Palmnudeln III 15
Palm-Weide III 33
Palsternak V/2 1406
Paluschke IV/3 1610
Pameldutschen I 112
Pampasgras I 372; VII 155
Pamperradl VI/2 1084
Pampes VI/2 1084
Panaxkraut V/2 1360
Pandore V/1 236
Pankrazerln II 315
Pankraziusblumen II 315
Pannkoken V/1 474

Pannkoken-Kraut II 223
Pannkooksblume V/3 1750
Pannkucheblätter VI/2 599
Pannonischer Klee IV/3 1350
Pannonische Salbei V/4 2493
Pansternacken V/2 1406
Pantlkraut I 197
Pantöffelchen II 326
Pantöffeli IV/3 1355, 1367
Pantöffelken III 495
Pantöffli V/1 91
Pantoffelblume VI/1 5, 6; VI/2 1360; VII 202 Fig. 1245
Pantoffel(che)n IV/3 1367
Pantottern V/4 2595
Panzerfrucht-Palmen VII 156
Papagei-Tulpen II 243
Papaya, Affen- V/1 661
, Berg- V/1 661
-Baum V/1 660
„ -Gewächse VII 190
Pâpeln V/1 474
Papen-Hötken V/1 249
„ -Jungen II 132
Pâpenmütz(e) III 495; V/1 249
Papenpiten II 132
Paperasch VI/2 1049
Papier-Birke III 75
-Blume II 131; VII 212
-Holz III 61
-Knöpfchen, Geflügeltes VI/1 494
-Maulbeerbaum III 136
„ -Röschen VI/2 563
Papmklêtn V/1 249
Papoischla II 274
Pappel III 57, 62; V/1 464, 474; VI/2 1084
Pappelächrut V/1 474
Pappel-Seide V/3 2109
„ -Stock VI/2 1084
Pappenblader III 441
Pappete VI/1 228
Paprika V/4 2556
Paprutsch I 37
Papyrusstaude II 10
Paradeisäpfel V/4 2607
Paradeiser V/4 2607
Paradies-Apfel IV/2 747; V/1 65; V/4 2607
„ -Baum V/1 85
Paradies-Blumen IV/1 466
Parakresse VI/1 528
Paranussbaum V/2 766; VII 191
Pareieli IV/2 1097
Pariserli II 257
Parisöler VI/2 683
Parisol IV/2 962
Parloisslen II 292
Parma-Veilchen V/1 649
Partening III 455
Parzenkraut V/2 1164
Paschurke IV/2 1064
Passionsblume V/1 658; VII 190
Passionsblumengewächse VII 190
Pasteke VI/1 313
Pastel IV/1 193
Pastenei V/2 1406
Pasternaat V/2 1406
Pasternak V/2 1404
Pastinada V/2 1406
Pastinak V/2 1404
„ , Gummi- V/2 1360
Pastinake V/2 1406
Pastinak-Hladnikië V/2 1180
Pastinat V/2 1406
Pastoren-Birne IV/2 700
„ -Blom V/3 1913
P(a)tätschen V/4 2595
Patakappel IV/2 915
Pataken V/4 2595
Pataters V/4 2595
Patenigl V/3 1760
Paterkapel V/1 249
Paterniesl II 299
Paternoster-Baum V/1 85, 258
„ -Erbse IV/3 1498
Pâterskappe III 495
Patonirose III 455
Pauke IV/2 1056
Pauke(n)schlegel VI/1 292; VI/2 944
Pauvere IV/3 1611
Peare II 275
Pearzl I 84
Pechnelke III 275, 276
Pecken I 116
Pedaun V/2 1319
Peddenblä(tt)er VI/2 683
Pedenzel I 384
Peed I 384
Peer-Blom VI/2 1083
-Dissel VI/2 874
-Kamell VI/2 610
-Knöpe VI/2 620
-Ohren II 136
„ un Wagen III 495
Peerzilic V/2 1156
Pegonis III 455
Pegunje III 455
Peien I 384
Peier, Gestreifter I 197
Peierich I 384
Pein I 238
Peint-Saublume VI/2 1018
Peips VI/2 637
Peiterzilje V/2 1156
Peitschenaffodill VII 159
Peitschenkaktus V/2 692
Pellemiälke V/1 134
Pelterchen III 543
Peltsche IV/3 1465, 1473
Peluschke IV/3 1610
Pelzfarn I 39
Pemmernüssl V/1 258
Penegalen I 179
Pengsblom IV/3 1182
Penn'blam VI/1 102
Pennigkrout IV/1 118
Pennkrut IV/1 118
Peperkrut IV/2 536
Peperlein V/2 998
Peplkrut V/4 2580
Perdsros III 454
Perl VI/1 56
-Blümchen II 256
-Gras I 288; VII 154 Fig. 1182
-Hyazinte II 256; V/1 392 Fig. 1934
Perlisken II 299
Perl-Knöpf IV/2 498
-Körbchen VI/1 494
-Mais I 181
Perlschnur-Labkraut VI/1 221
Perl-Zwiebel II 231; VII 160 Fig. 1188
Permente V/4 2420
Perminte V/4 2420
Persch IV/2 1091
Persischer Ehrenpreis VI/1 53
„ Klee IV/3 1319
Perücken-Flockenblume VI/2 958
Perückenstrauch V/1 226
Perwinkelken V/3 2054
Pêseke IV/2 1091
Pestilenzkraut VI/2 572
Pestnachen V/2 1406
Pestnägel V/2 1406, 1508
Pestwurz VI/2 680
Alpen- VI/2 686
Karpaten- VI/2 690
„ , Vanillen- VI/2 680
Peterbart III 531
Peterchen V/2 1155
Petergstamm, (Blauer) V/3 1780
Peter-Guggasli II 292
Peterle V/2 1156
Peterlein V/2 1155, 1160
Bocks- V/2 1197, 1203
Frosch- V/2 1220
Stein- V/2 1203
„ , Weiher- V/2 1220
Peterli V/2 1156
Hunds- V/2 1272
, Wilde V/2 1017, 1272
„ -Gras V/2 1006
Peterling V/2 1155, 1156
Petersbart IV/2 908, 909, 922
Peter-Schlissl II 257
„ -Schlüssel V/3 1746, 1749
Petershiljen V/2 1156
Petersil, Welscher V/2 1406
Petersilie V/2 1154
„ , Acker- V/2 1154
Petersilie, Garten- V/2 1155
Hunn- V/2 1272
Italienische V/2 1158
Spanische V/2 1158
Sumpf- V/2 1393
Welsche V/2 1406
„ , Wilde V/2 1386
Petersiljen, Wildi V/2 1272
Petersilienkohl IV/1 246

Petersillig V/2 1156
Peterssöll V/2 1156
Peter-Stab VI/1 292
„ -Stamm V/3 1760
Peters-Wurz V/3 2006
Peterzelle V/2 1156
Peterzellich V/2 1156
Peterzilge V/2 1156
Peterzölge V/2 1156
Peterzöpfl V/1 101
Petoniken III 455
Petrusstab VI/1 410
Peutscha I 112
Pëzle II 53
Pfabesplätschen III 171
Pfâdloutschen VI/2 683
Pfändla III 561
Pfärebunn IV/3 1629
Pfaffa-Rosa III 454
„ -Schüali II 326
Pfaffe-Bürgeli II 341
-Busch VI/2 1084
-Chappe III 481
„ -Hödili V/1 249
Pfaffelblume IV/1 29
Pfaffe-Nägeli III 321
Pfaffen-Hosen V/3 2008
-Hütchen V/1 249; V/3 2086
-Käppchen V/1 249
-Kappel II 257
-Kraut V/4 2302
-Kuttel V/3 2008
-Poppali II 132
-Röhrl(ein) VI/2 1078, 1084
-Rösel V/1 249
-Schläppla V/1 249
-Schlappen II 326
„ -Schnalla V/1 598
Pfaffeseckel VI/2 899
Pfaf'nrosen IV/1 29
Pfahlrohr I 270
Pfanne-Bausch VI/1 292
-Flicker I 293
-Putzer I 53
„ -Stiel VI/1 292
Pfannkuchenkraut VI/2 599
Pfâre-Kümmel V/2 1082
„ -Minze V/4 2336
Pfarle III 495
Pfârreiter III 495
Pfarrerkappl II 257
Pfatscher V/3 2008
Pfauen-Buschen V/3 2194
-Flechte VII 144
-Gerste I 398
„ -Lilie II 305; VII 163
Pfearscha IV/2 1091
Pfeffer VII 165
Pfeffer, Indischer V/4 2556
Roter V/4 2556
Schoten- V/4 2556
Schwarzer III 209
Spanischer V/4 2556
Türkischer V/4 2556
Pfeffer, Weisser III 209
-Baum, Peruanischer V/1 217
-Blatt VI/2 599
-Busch VII 195
-Fenchel V/2 1286
-Geranium IV/3 1665
-Gewächse VII 165
-Körner V/2 709
-Kraut IV/1 89; IV/2 536; V/4 2279, 2282
Pfefferminza, Wilde V/4 2336
Pfefferminzbaum V/2 785
Pfefferminze V/4 2354
„ , Japanische V/4 2342
Pfefferpflanze III 201
Pfeffer-Stauden V/2 709
-Strauch V/4 2485
-Stüdeli V/4 2282
„ -Wurz III 101; V/2 1203
Pfeifen V/2 1333
-Blume II 315; VII 130 Fig. 1170
-Kraut V/2 1017
-Strauch III 162; IV/2 639; VI/1 242; VII 180, Fig. 1224
Pfeilkraut I 155; VII 152
Pfeilwurzgewächse VII 164
Pfeistblueme IV/3 1196; V/3 1913
Pfeng VI/1 102
Pfe(n)gger VI/2 1084
Pfenich I 193
Pfennigkraut IV/1 118; V/2 952; V/3 1852
Pferde-Augen VI/1 309
-Blumen VI/1 309
-Bohne IV/3 1556, 1557
-Dill V/2 1230
-Fenchel V/2 1230
-Fuss VI/2 675
-Gras I 261
-Huf IV/3 1482
-Isenkraut IV/3 1482
-Kamille VI/2 610
-Kopf VI/2 610
-Kümmel V/2 1017, 1428
-Latsche II 326
-Minze V/4 2506
„ -Nuss III 7
Pferderettichbaum IV/1 491
Pferde-Schwanz V/3 2194
Pferdezahnmais I 181
Pferdezunge V/3 2128
Pferdlein III 495
Pferds-Blume VI/1 373; VI/2 944
-Kraut VI/1 410
„ -Kümmel V/2 1428
Pferminz V/4 2336
Pfersi(n)g IV/2 1091
Pfifäholz V/1 345
Pfifastengel V/2 1017
Pfife-Gras I 276
Pfife-Holz III 15
„ -Stude III 15
Pfiffe(n)-Rörli-Holz VI/1 252
Pfingschte IV/3 1196
Pfingst-Bluem V/3 1913
-Blume II 132, 326; III 454
„ „ , Gelbe III 561
Pfingste-Glesli V/3 1913
„ -Pfluttri VI/1 316
Pfingst-Haar I 203
-Locken III 454
-Nägeli III 335, 338; IV/1 443, 466
-Nelke III 335, 338
-Pappel III 454
-Rose III 454; IV/2 1046; VII 38 Fig. 1064
-Schupe IV/3 1196
-Veiali IV/1 466
-Veigel IV/1 443
„ -Veilchen V/1 594
Pfirsich IV/2 1091
Pfisternägeli III 554; V/2 1037, 1062
Pflacke VI/2 683
Pflak, Blauer VI/1 366
„ , Weisser V/3 2086
Pflanzenschwefel I 67
Pflanzschmäla I 261
Pflaume IV/2 1106
„ , Kaki- V/3 1898
Pflegel I 112
„ -Halmä I 294
Pfluderbeeri V/3 1681
Pflüderst II 310
Pflugschâr VI/2 898
Pflugwurz V/1 478
Pflume IV/2 1106
Pfötsche I 84
Pfoffahosa V/3 1746
Pforschen IV/1 255
Pfram IV/2 1106
Pfriemen IV/3 1182
-Gras I 202; VII 153 Fig. 1181 u. 154
-Kresse IV/1 70
„ -Strauch IV/3 1213
Pfrubeere IV/2 771
Pfundchlee IV/3 1321
Pfungen VI/1 64
Pfurm I 37
Philldron-Chaldron II 274
Phlox, Stauden- V/3 2113
Piädeschiäwe V/4 2374
Piärdekneipe VI/2 620
Piärdissel VI/2 846
Piärredissel VI/2 903
Pianke I 376
Pickades-Gras VI/1 228
Picka-Hahn-Hahn III 276
Pickaling VI/1 228
Pickbier V/3 1675
Pickender Hansl III 276
Picker VI/1 228; VI/2 825
Picknälken III 276
Picknagerl III 276
Piemonteser Steinbrech IV/2 611
Piepenschulp I 196

Pietsche IV/2 1091
Piggeholt V/1 249
Pijünt I 276
Pilgerblume V/1 101
Pillenfarn I 49
Pilsternak V/2 1406
Pilzblumengewächse VII 170
Pilze, Echte VII 139
Pilztiere VII 136
Pimeissen II 147
Pimeröll V/2 1199
Pimpelnuss V/1 258
Pimpelsnoot V/1 258
Pimperlipimp V/2 998
Pimpernell, Falsche IV/2 937
„ , Rote IV/2 937, 939
Pimpernuss V/1 257, 258; VII 187
„ -Gewächse V/1 256; VII 187
Pimpinalle V/2 1199
Pimpinelle IV/2 937
Pimpsen II 147
Pimsteert IV/1 47
Pinal V/2 1199
Pingelklocken VI/1 342
Pings-Blaume IV/3 1182
-Blome II 336
„ -Brûd II 336
Pingschtblume II 315
Pingst-Bessen IV/3 1182
„ -Blöme V/3 1887
Pingster-Blome II 315; V/3 1887
Pingstwuttel V/1 69
Pinie I 96
Pinkelnellstude III 344
Pinkstblôme IV/1 345
Pinkster-Blöme IV/1 345
-Blôme V/3 1913
„ -Bloume V/3 1913
Pinksternack V/2 1406
Pinnholt V/1 249
Pinselschimmel VII 140
Pinselstrauch VII 196
Pinzken II 147
Pioon I 276
Pipenstal I 53
Piperik II 147
Pippau VI/2 1134
Berg- VI/2 1138
Gold- VI/2 1147
Stinkender VI/2 1173
Sumpf- VI/2 1157
Wiesen- VI/2 1162
„ , Zwerg- VI/2 1146
Pippel III 62
Pippenholz I 80
Pirre II 231
Pirschling I 372
Pisats Grasch I 197
Pissangli VI/2 1084
Piss-Blom VI/2 1084
-Blume V/3 1887
-Pott V/3 2080, 2086
„ -Ranken V/4 2589
Pistazie V/1 229, 232
Pitonirose III 455
Pitterselg V/2 1156
Piwissen II 147
Piwonia VI/2 599
Plamphose III 481
Plapper-Blume IV/1 29
„ -Krut III 542
Plaschdere IV/2 905
Platane IV/2 657; VII 180
Morgenländer IV/2 661
„ , Nordamerikanische IV/2 659
Platanen-Gewächse IV/2 657; VII 180
Plate VI/2 676
Platenigen V/3 1782
Platening V/3 1760
Platterbse IV/3 1562; VII 183 u. 184 Fig. 1228
Gelbe IV/3 1587
„ , Rote IV/3 1603
Plattgras I 219
Platzegras I 321
Plausterkopf VI/1 102
Plemper V/3 1964
Plent III 208
Plent'n I 179
„ , Gelber I 179
Pletsch'n III 171
Plockholt V/1 249
Plogstiert IV/3 1222
Plossabaum IV/3 1626
Plotsch(e)n III 171; VI/2 676
Plotzklee IV/3 1303
Pluder-Hosa V/3 2214
„ -Hose V/3 1750
Pluggenholt V/1 249
Plumerweire V/3 1750
Plump-Hose(n) V/3 2214
Plunke IV/2 743
Pluzer VI/1 324
Pobala II 16
Pockeln II 78
Pock-Holz V/1 39
Pockpearlain V/1 345
Pockpearlainschtaude V/1 332
Podagrakraut V/2 1212
Pögen, Groten II 62
Pöpel VI/2 1084
Pöperl-Salat V/2 998; VI/1 266
Pöppel V/1 474
Pöppelbe III 62
Pöppelkees V/1 474
Pöppelken III 441
Poggen-Dâler I 164
-Distel VI/2 878
-Dreck II 139
-Geld I 164
-Minte V/4 2335
„ -Rüttels II 139
Pogg'nklöt V/1 249
Poguntare III 214
Pohlsch IV/1 118
„ Grott IV/1 389
Polei V/4 2339
Polei, Amerikanischer V/4 2281
-Gamander V/4 2523
„ -Minze V/4 2339
Poley V/4 2339
Pollack IV/2 522
Pollackshafer V/2 1240
Pollerjahn VI/1 276
Polnischer Weizen I 394
Polpes III 457
Polster-Blume III 457
-Kraut III 457
-Miere III 391
-Nagerln III 294
„ -Segge II 104
Polterblume III 457
Polwaz I 395
Pomaquinte VI/1 314
Pomberlump VI/1 292
Pomeranzen-Habichtskraut VI/2 1211
Pommaterchrut III 193
Poolrücke II 29
Popeknaep VI/2 825
Pôpel V/1 464
Poperagrothworza II 132
Poppali II 132
Poppel III 62, 441
„ -Blome III 441
Poppeln V/1 474
Poppengeld V/2 955
Popperorsch VI/2 1049
Porg V/3 2230
Pori II 231
Porisch V/3 2230
Porjierkraut V/1 146
Porree II 231
Porst V/2 1428; V/3 1623; VII 195
, Sumpf- V/3 1623
„ -Hirz V/1 548
Portland-Rose IV/2 993
Portulak III 269; VII 172 Fig. 1213
, Gelber III 269
„ -Gewächse III 268; VII 172
Porzellan-Blümchen V/3 1589
„ -Blume V/3 2067
Porzelkraut VII 172
Porzen II 78
Poss III 11
Possem III 11
Post III 11
Potschare III 279
Potscheblume III 323
Potschen VI/1 66
Potscherbenbaum IV/2 1064
Pottlack IV/2 522
Pracher VI/2 825
Pracherläuse V/3 2149; VI/1 517
Pracht-Ähre VII 182
-Kerze VII 172
Nelke III 342
„ -Scharte VII 209
Prärie-Rose IV/2 992
Pralles VI/2 747
Prangerrosen III 454

Prassel IV/2 905
Prei II 231
Preibusch I 53
Preis(s)elbeere V/3 1669
Preisslitz V/3 1669
Preisterkragen VI/2 610
Preseloak II 223
Presilgenkraut V/4 2268
Prickelnöse V/4 2380
Prieslauch II 223
Priesterläuse VI/1 517
Prig V/3 1690
Primel IV/2 522; VII 196
, Arznei- V/3 1749
„ , Mehl- V/3 1754
Primelweer V/3 1750
Priminzen V/4 2354
Prinzessin der Nacht V/2 693
Prisch V/3 1690
Prisi V/3 1690
Prö(b)stling IV/2 905
Prominzen V/4 2351, 2354
Prophetenblume V/3 2128
Proteusartige Gewächse VII 169 u. Fig. 1167, 1210
Protzenblümchen III 457
Prowenkel V/3 1669
Prunker(-boone) IV/3 1637
Prunktraube VII 182
Prunkwinde, Gefiederte V/3 2076
Pruum IV/2 1106
Puddelbeeri V/3 1681
Pudertäpli I 66
Pudlhund VI/2 846, 920
Püeschen I 112
Püllirotznas III 262
Pülsflöh VI/1 517
Pümpelken III 445
Pûesken II 16
Püsseke VI/1 237
Püsskatzen III 15
Puffara III 279
Puffbohne IV/3 1556
Pujenge III 455
Pullen III 445
Pulsk I 112
Pulverholz V/1 344, 345
Pumb'l V/3 1670
Pumerellen IV/2 937
Pummeldutschen I 112
Pumpekaile I 112
Pumpel-Mus V/1 63
Pumpelnuss V/1 258
Pumpelruse III 454
Pumper-Höslain II 196
Pumperlischka VI/2 1084
Pumpernickel V/1 258
Pumpernüssli V/1 258
Pump-Hosen II 326
-Kuile I 112
„ -Rose III 454
Pumsa V/4 2595
Puol V/4 2416
Puosenstrunk III 11
Puppe(n) III 441; VI/1 132
Purg V/3 2230
Purgel V/4 2415
Purgier-Dolde V/2 1500
-Gurke VI/1 314
-Kraut VI/1 38
-Kreuzdorn V/1 332
„ -Lein V/1 6
Purhafer I 253
Purl VI/1 56
Purpalizn IV/1 29
Purperlitzen IV/1 29
Purpur-Glöckchen IV/2 567
-Labkraut VI/1 216
-Schwarzwurzel VI/2 1054
-Storchschnabel IV/3 1690
-Weide III 23
„ -Witwenblume VI/1 296
Puschen II 16
Puschnägelchen III 321
Pustblume VI/2 1084
Pusteblaume VI/2 1084
Puszten-Veilchen V/1 642
Puteljenblaume III 455
Putschnägeli V/3 2113
Putterich VI/1 56
Puttgnaden V/3 1681
Pyramiden-Eiche III 110
-Glockenblume VI/1 345
-Günsel V/4 2545
„ -Pappel III 64
Pyrenäen-Bärenklau V/2 1448
-Engelwurz V/2 1347
-Hahnenfuss III 568
-Löwenzahn VI/2 1021
-Mohn IV/1 26
-Steinschnückel IV/1 115
-Stiefmütterchen V/1 614

Q.

Quacken V/1 236
Quade VI/2 974
Quadeblöme VI/2 601
Quadraterbse IV/3 1614
Quätsche IV/2 1106
Quanelt V/4 2308
Quânl V/4 2308
Quarkblume, III 522; IV/1 345
Quassiabaum, Brasilianischer V/1 79
„ , Jamaika- V/1 79
Quassiaholz, Unechtes VII 185
Quatschen IV/2 1106
Quecke I 382, 383; VII 155
„ , Grot II 62
Queckenwurzel, Rote II 62
Queckolter I 89
Queckschte IV/2 1106
Queke I 238 488
Quelder I 324
Quellen-Kräut'l IV/1 136
„ -Milzfarn I 28
Queller I 324; III 254; VI/1 189
Quell-Gras I 288
Quell-Kraut III 269, 270
Moose VII 146
„ -Ried II 42
Quendel III 254; V/4 2308; VII 200 Fig. 1241
-Kreuzblume V/1 105
-Seide V/3 2094
„ -Sommerwurz VI/1 149
Quennel III 254
Quetsch I 383
Quetsche(n) IV/2 708, 1106
Quetsch-Gurke VI/1 315; VII 208
Quetzern IV/2 708
Quicke I 383
Quieke IV/2 708
Quietjes, Gule IV/3 1587
Quirl-Borste V/4 2295
„ -Tännel V/1 536
Quitsch I 383
„ -Beer IV/2 708
Quitsche(n)boom IV/2 708
Quitt IV/1 276
Quitte IV/2 689
Chinesische V/3 1898
„ , Japanische IV/3 693
Quitzere IV/2 708

R.

Raafarp VI/2 620
Raaform VI/2 620
Raal III 273
Rabennagerl V/3 2014
Rabunsch VI/1 266
Rachenblütler VI/1 5; VII 203
Rachenlilie VII 163
Radbaumgewächse VII 174
Radbleaml VI/2 610
Raddefife VI/2 1061
Raddik IV/1 280
Rade III 273
„ , Weisse III 301
Radella IV/3 1478
Radendistel V/2 987
Rad Hendrek III 173
Radieschen IV/1 281
Radlbleaml V/3 1746
Rad-Melde III 248; VII 171 Fig. 1212
-Rose VII 195
„ -Staud'n VI/1 292
Räbe IV/1 257
Räbet, Gel(b) VI/2 620
Rächäbögli V/3 1946
Rädchenblüte V/2 1299
Rägätropfä IV/2 963
Rählk VI/2 569
Rämmchen IV/3 1196
Rämme IV/3 1196
Rämsch II 229
Räps IV/1 263
Räsk II 29, 147
Raesle II 257
Räspä I 84
Rätech IV/1 280

Rätkälchenbrot V/1 250
Rätschaballa VI/1 181
Räucherlen III 531
Räucherli III 511
Räuchling III 531
Räuckholter I 89
Räuw, Hilg VI/1 316
Rafatscholla IV/1 263
Rafausle V/3 1635
Rafert, weisser VI/2 563
Ragen III 273
Ragwurz II 328; VII 164
Rahle IV/1 72
Rahm-Blätscherl VI/2 700
-Blotschel VI/1 405
-Gras VI/1 524
-Heide IV/3 1196
„ -Plötscherl VI/2 700
Rainefât VI/2 620
Rainfarn VI/2 619
Rainfauth VI/2 620
Rainfling VI/2 620
Rainfurth VI/2 620
Rainichfarn VI/2 620
Rain-Kohl VI/2 1000
-Nagerl III 328
„ -Weide V/3 1944, 1946
Rajen I 379
Rak III 273
Raketenblume VII 159
Ramabeere IV/2 771
Ramhäd V/3 1690
Ramie III 136; VII 169
Ramisch II 229
Ramme III 214
Rampe IV/1 208, 219
Ramschfedere V/2 1017
Ramsele IV/3 1182, 1196, 1200
Ramsen II 229
Ramser IV/3 1182, 1196
Ramtillkraut VI/1 532
Rånasln III 214
Rande III 214
Randech III 214
Ranerlwurz III 495
Rangerse III 214
Rangoonbohne IV/3 1628
Ranke V/3 2080
Ranken-Kicher IV/3 1587
-Klauwer IV/3 1288
„ -Klewer, Geele IV/3 1367
Ranklbeer V/3 1669
Ranne III 214, 215
Ranunkelstrauch (Kerria) VII 180
Raola IV/3 1196
Raolken III 273
Rapontika V/2 866, 868
Rappa I 179
Rappeschnäbel IV/3 1682
Raps IV/1 252, 254
-Dotter IV/1 287
„ -Saat IV/1 252
Rapünzel VI/1 266
Rapünzli VI/1 362
Rapunzel, VI/1 266, 369; VI/2 1364; VII 208 u. 76 Fig. 1112
Ähren- VI/1 372
Gelbe V/2 866
„ , Kugel- VI/1 378
Rapunzele VI/1 362
Rapunzel-Glockenblume VI/1 362
„ -Wau IV/1 486
Rasen-Binse II 24
-Glockenblume VI/1 348
„ -Schmiele I 243
Rasl IV/3 1257
Rasrübe VI/1 316
Rassel VI/1 102
Rasselblume, Blaue VI/2 1007
Rasselklee IV/3 1255
Rasslaub V/1 236
Ratten-Schwanz V/3 2194
Rattenschwanzkaktus V/2 692
Rattenschweif II 16
Rau(ch)beern IV/2 646
Rauchfangkehrableaml III 536
Rau(ch)fangkehral IV/2 937
Rauchfangkehrer V/3 2014; VI/1 373
Rauchholz III 511
Rauchling IV/2 646
Rauh-Birke III 78
Rauhblattgewächse V/3 2122; VII 200
Rauh-Buche III 66
-Dolde VII 193
-Gras I 206
-Haber I 253
„ -Karde VI/1 283
Rauhling VII 200
Rauh-Schopf VII 162
Rauke IV/1 151, 199
Raukensenf IV/1 151
Raunsche III 214
Raupbeeren IV/2 646
Rausch II 64; V/3 1635, 1647, 1657
-Beere V/2 709; V/3 1603, 1681
-Granten V/3 1657
-Gras I 376
„ -Kräutel V/3 1635
Raut, (Grüner) VI/2 648
Rautbern IV/2 899
Raute V/1 68; VI/2 765
Rautengewächse V/1 44; VII 184
Raut(en)saot IV/1 368
Rautkählbai VI/1 240
Ravenna-Seidengras I 186
Ravert VI/2 620
Rawinschen VI/1 266
Raygras, Englisches I 379
Französisches I 260
Italienisches I 378
„ , Wohlriechendes I 198
Rebe V/1 359; VII 187
Rebendolde V/2 1249
Rebengewächse V/1 350; VII 187
Rebe(n)-Kresse(n) VI/1 266
„ -Salat VI/1 266
Rebinsel VI/1 266
Rebunde VI/1 266
Rechäzah II 24
Reche(n)-Bögli VI/1 242
Rechenblume VII 197
Reckholder(la) I 89; V/2 716
Rêdlse VI/2 569
Reegras I 379
Reelergen VI/2 569
Reën IV/3 1546, 1582
-Klewer IV/3 1288
„ „ , Grote IV/3 1367
Reetgras II 52
Reeth I 271
Refelblume VI/2 620
Rêfert VI/2 620
Regeblume V/3 2080
Regegloggä V/3 2080
Regen-Blom V/3 1869
-Dächle IV/2 962
„ -Rösli V/3 1754
Rege(n)-Rose VI/1 292
Regensburger Geissklee IV/3 1178 u. 1639 Fig. 1605
Rehfarä VI/2 620
Rehfarn VI/2 620
Reh-Gras II 183; IV/3 1182
-Heide IV/3 1182
„ -Klewer IV/3 1290
Reh-Krut VI/2 620
Reibisch I 53
Reichi Haubna II 327
Reichling IV/2 646
Reid II 52
Reidlinger IV/2 646
Reifelkraut VI/2 620
Reifenhüet II 299
Reiff IV/3 1515
Reifler VI/2 620
Reif-Weide III 24
Reiherbusch VII 192
Reiherschnabel IV/3 1716
Reik III 205
Reineclaude IV/2 1106, 1109
Reinefarbe VI/2 620
Reinefâne VI/2 620
Reinefâre VI/2 620
Reinefart VI/2 620
Reine Kloden IV/2 1106
Reinel III 554
Reinersköppe VI/2 620
Reinfarn VI/2 620
Reiningsköppe VI/2 620
Reinklau IV/2 1106
Reinmännlein VI/1 212
Reis I 194, 195
„ , Wilder I 195
Reischten I 101
Reis-Gerste I 398
Reismüllerl II 257
Reispapierbaum V/2 911
Reisskraut III 191
Reiter-Beere VI/1 244
„ -Kapp III 495
Reitgras I 229

Reith I 271
Reizpflanze VII 183
Rek IV/1 280
Relek VI/2 569
Releppe VI/2 569
Rêlitz VI/2 569
Rêls VI/2 569
Remiglotte IV/2 1106
Rempe IV/1 208, 219
Remsen II 229
Renegnoden IV/2 1106
Renetten IV/2 749, 750
Renfaht VI/2 620
Renna III 511
Renntierflechte VII 144
Reps IV/1 252, 254
„ -Kohl IV/1 252
Resede IV/1 483; VII 178
Resedem IV/1 484
Resedengewächse IV/1 482; VII 178
Resettche IV/1 484
Resettekreitche IV/1 484
Resettl IV/1 484
Residat IV/1 484
Rettich III 200; IV/1 272, 274, 276 280
Reuelk VI/2 569
Revierkraut VI/2 620
Rewinsala VI/1 266
Rewinsel VI/1 266
Rezinse II 315
Rhabarber III 166
Deutscher IV/2 547
, Wilder III 171; IV/2 547
„ -Worzel III 171
Rheinfallkraut VI/2 620
Rheintaler Mais I 180
Riadara III 200
Riadocher III 200
Ribbeckeblätter VI/1 183
Ribibliemli VI/2 698
Ribiol III 573
Ribis(e)l IV/2 649
Riblehard V/3 1701
Riche VI/1 228
Richhüh IV/2 1018
Rickelchen V/3 1760
Riebel I 53
Riebs IV/2 649
Riech-Dorn IV/2 1018
„ -Gras I 198
Riechseli I 301
Ried-Fähndli II 16
-Gläsli V/3 1957
-Glöggli V/3 2014
-Gräser II 5, 52
-Kegel II 78
-Nelke V/3 1891, 1893
-Rohr I 271
„ -Schlüsseli V/3 1754
Rief IV/3 1515
Riemen-Blatt VII 162
-Blume III 149
Riemen-Zunge II 360; VII 166 Fig. 1204
Riemerei VI/2 581
Rienfâren VI/2 620
Riesche III 118
Riesen-Eucalyptus V/2 785
-Haarstrang V/2 1401
-Hülse VII 181
-Klee IV/3 1245
-Kürbis VI/1 326
-Nuss III 7
-Säulenkaktus V/2 691
-Schachtelhalm I 56
-Schwingel I 345
-Süßgras I 321
„ -Zyklamen V/3 1732
Riesheide V/3 1690
Riessele I 261, 294, 301
Riet II 52
, Acker- III 200
-Ängli V/3 1754
-Chnopf VI/1 288; VI/2 944
-Doldä V/2 964
„ -Gras II 51; VII 156
Rietgräser VII 155
Riet-Ilgä II 293
-Nägeli V/3 1754
-Rolla III 459
„ -Schärlig V/2 1333
Rifeli V/3 1669
Riffelbeere V/3 1669
Riffli V/3 1669
Rigge VI/1 228
Riggen IV/3 1529
Rigirolla III 459
Riisheide V/3 1708
Rikelar V/3 1760
Rikelen V/3 1760
Rils VI/2 569
Rimperlimping V/2 998
Rinden-Pilze VII 142
Rinder-Blume VI/2 1147
-Gräsch II 80
-Schneide VII 153
„ -Zungä I 34
Rinds-Aug(e) VI/1 428, 490
„ -Heide V/3 1690
Ringala, Gäle VI/2 773
Ringali VI/2 801
Ringel-Blaume VI/2 1083
„ -Blümel V/3 1743
Ringelblume VI/2 799, 801, 1083
„ , Acker- VI/2 804
Ringel(e) V/3 2090
Ringelken VI/2 801
Ringelklee IV/3 1255
Ring(e)lotten IV/2 1106
Ringel-Röschen VI/2 801
-Röserl VI/2 801
„ -Rösken VI/1 414
Ringheiss V/3 1690
Ring-Moose VII 146
Rinkheide V/3 1690
Rinkheiser V/3 1690
Rintheimer Klee VI/1 524
Rippenfarn I 35
„ -Samen V/2 1089
Ripplichrut IV/2 889; VI/1 183; VI/2 570
Rips IV/1 259
Risch II 147
Risebom III 76
Riske II 147
Rispelstrauch V/1 548
Rispen-Dolde, Kanadische V/2 1169
-Farn(e) I 42; VII 148
-Fettkraut IV/2 521
-Gras I 299; VII 155
-Hirse I 189
-Lieschgras I 213
„ -Segge II 69
Rispitzbeerl IV/1 7
Rissbeten V/3 1681
Ristgras I 239
Ritscher(le) VI/1 266
Ritschgrasl I 309
Ritterspörli III 495
Ritter-Sporn III 485
„ -Stern VII 162
Ritz VI/1 191
Rîwe IV/3 1529
Rîwels IV/2 649
Rizise II 313
Roander-Masarun V/4 2309
Roa(n)fl VI/2 620
Roapr IV/2 899
Robertskraut IV/3 1712
Robinie IV/3 1390, 1392
Rocka-Spor(n) VI/2 1049
„ -Stümpfel II 196
Rockenbolle II 231
Rockerl III 557
Roddek IV/1 280
Rod(e)l(kraut) VI/1 102, 120
Rôdendil VI/1 541
Roden Hinnerk III 180
Rööslimarie V/4 2518
Röckli IV/2 962
Rödschink III 200
Röge mi nich an V/1 314
Roê Hinrik III 173
Röhlk I 149
Röhr I 149
Röhrchenkraut VII 212
Röhren-Algen VII 138
-Aster VI/1 448
-Blütler VII 199
-Kassie IV/3 1131
-Schwämme VII 142
„ -Zwiebel II 233
Röhrlichrut VI/2 1083
Röhrlkraut VI/2 1083
Rölk VI/2 569
Römerei VI/2 581
Römische Kamille VI/1 536
„ Minze V/4 2351
Römischer Salat VI/2 1120
Salbei V/4 2489

Römischer Sauerampfer III 183
„ Wermut VI/2 644
Roën Hinrik III 180
Rösch II 147
Röselstaude, Schmeckende IV/2 1018
Röserl VI/1 414
, Wilde VI/1 83
„ -Bleaml VI/1 83
Rösli VI/1 292
Rössl III 495
Rötegewächse VI/1 196; VII 8 Fig. 983 und 207
Röteli IV/2 899
Röttesteert I 217; VI/1 189
Röwe, Span'sche VI/1 316
Rogganägeli III 273
Roggen I 388; VII 39 Fig. 1065
-Blom VI/2 961
-Gerste I 399
-Gras I 217
-Rosen III 273
„ -Trespe I 362
Roghalm I 294
Rohmbluoma VI/2 1147
Rohr I 270
, Schmeckata II 135
-Glanzgras I 196
„ -Heide IV/3 1200
Rohrkolben I 111; VII 134 Fig. 117 B, C
Rohrkolbenhirse VII 154
Rohrkolbengewächse I 111; VII 152
Rohr-Schwingel I 344
-Schwingelschilf I 317
„ -Wicke IV/3 1582
Roidocka III 200
Rôk III 200
Rolandsdistel V/2 987
Rolegg'n VI/2 569
Rolepper VI/2 569
Rolla III 457, 459
Rolle-Blueme III 457, 459, 561
Rolle(n)-Chle IV/3 1355
Roll-Erbsen IV/3 1614
„ -Farn I 36
Roll'n IV/1 288
Romeie(n) VI/1 191
Romer VI/2 581
Romeyen I 309
Rommel III 214
Rone(rs) III 214
Ronzna II 229
Rooden Hinnerk III 173
Rooder Ritter III 180
Rood-Schink III 173
-Stengel IV/2 972
„ -Strunk III 173
Rosamarie V/4 2518
Rosche-Knepf VI/1 292
„ -Krean III 173
Rose IV/2 976; VII 181 u. Fig. 1073, 1122, 1140
Gelbe IV/2 996
Hundertblätterige IV/2 992
Rose, Immergrüne IV/2 999
von Jericho IV/1 69 Fig. 750 b, c; VI/1 258, 965, 495
„ , Weisse IV/2 994
Rosemarie V/4 2518
Rosemmerei V/4 2518
Rosemrein V/4 2518
Rosen-Apfel IV/2 748; V/2 779
-Geranium IV/3 1665
-Gewächse IV/2 662; VII 180
-Klee IV/3 1328
-Kleid VII 204
„ -Kohl IV/1 247
Rosenkranz-Alge VII 136
-Blum V/1 250
„ -Pappel III 57
Rosen-Lorbeer V/3 2056
-Pappel V/1 478
„ -Wurz IV/2 526
Rosinen-Baum V/3 1913
„ -Gras II 47
Rosmarein V/4 2518
Rosmarichlee IV/3 1257
Rosmarič V/4 2518
Rosmarin V/4 2518
, Berg- V/4 2525
, Moor- V/3 1623
, Wilder V/3 1623, 1652; V/4 2525
-Heide V/3 1651
-Seidelbast V/2 716
„ -Weide VII 179
Rosmerei V/4 2518
Rosölichrut IV/2 498
Ross-Äugli V/3 1754
-Arbeis IV/3 1529
-Blackä III 173; VI/2 676
-Blüemli II 337
-Bluem VI/2 1083
-Boalssen V/4 2336
-Bohne IV/3 1637
-Boppele IV/2 802
-Chnoblauch II 226, 253
-Chümmi V/2 1017, 1428
-Eisen IV/3 1482, 1485
„ -Erbs IV/3 1637
Rossfarn I 36
Ross-Fenchel V/2 1240, 1295, 1311, 1372
-Fenigl I 211
-Gras I 261, 294
-Grundbirne VI/1 514
-Guckle VI/1 288
-Halm I 294
-Hu(a)ba VI/2 675
-Huebe VI/2 683
„ „ -Blüemli VI/2 675
Rosskastanie V/1 298, 301; VII 187
Rosskastaniengewächse VI/1 296; VII 187
Ross-Kemmich V/2 1406, 1428
-Kümmel V/2 1006, 1295, 1393, 1464, 1468
-Milch V/1 134
Ross-Minze V/4 2348
-Minze, Grüne V/4 2351
-Mucka V/3 2014
-Mucken II 247
„ -Veigerl V/3 2014, 2054
„ -Nägeli III 298, 300; V/3 2014
Rossoli IV/2 498
Ross-Pappel V/1 474
-Rippe VI/1 183
-Schmeckete V/4 2336, 2420
-Schradl V/1 236
-Schüegel VI/2 675
-Seckel II 196
-Sesel V/2 1240
-Speik V/3 1780, 1782
-Stengel VI/1 82
-Veigele V/1 619
„ -Zähne V/3 1743
Rost-Birnen IV/2 700
„ -Kopp VI/2 944
Rost-Pilze VII 142
„ -Segge II 107
Rota IV/3 1364
Rotalber I 79
Rotalgen VII 139
Rotang-Palme VII 156
Rot-Brischtche IV/3 1712
-Buche III 96; VII 36 Fig. 1060
„ -Buggele III 264
Rotdorn IV/2 737
Roteere IV/2 899
Roteib I 79
Rot-Eiche III 105
Roter Heinrich III 219
Rot-Erle III 91
Rote Rübe III 215
Rot-Esche V/3 1922
Rotes Straussgras I 225
Rotfärberwurzel V/3 2205
Rotheilche(spotsch) IV/3 1676
Rothmännchesholz V/2 1545
Rotholz VII 184
„ , Ostindisches IV/3 1127
Rotklee IV/3 1331
Rotkopf IV/3 1328
Rotkraut IV/1 247
Rotlaufkraut IV/3 1712
Rotorînkrud V/3 1969
Rot-Rüster III 119
-Schwingel I 340
„ , Alpen- I 338
„ -Rüetle V/2 1545
Rottange VII 139
Rottanne I 84
Rot-Ulme III 117
Rotz-Beer I 80
-Glocken III 481; IV/2 915; VI/1 342
„ -Nas III 262
R(o)ukdu(o)rn IV/2 1018
Rousseletten IV/2 700
Routlafekraut VI/1 401
Ru(a)be IV/1 257, 258
Ruasseli II 365

Rucha-Brug V/3 1690
Rûchblötter V/4 2481
Ruch-Distel VI/2 878, 903
-Gras I 198
„ -Mûl V/2 1428
Rucke IV/1 200
Ruckerl VI/1 414
Rud VI/1 102
Ruë V/1 69
Rüabstickl V/2 1350
Rübe IV/1 257; VII 74 Fig. 1109 c
, Gelbe V/2 1501, 1508, 1516; VII 126
„ , Rote III 214
Rüben-Distel VI/2 932
-Kerbel V/2 998
-Kohl IV/1 248, 257
-Reps IV/1 259
„ -Rettich IV/1 281
Rübestöckel V/2 1350
Rübrawurzel V/2 866
Rübsaat IV/1 257
Rübsamen IV/1 257
Rübsen IV/1 257, 259
Rübsprengel IV/1 259
Rückelbusch VI/2 634
Rüderk III 173; V/4 2374
Rüelk III 205
Rüenblaume VI/1 541
Rüerk III 200
Rügelichümi V/2 1071
Rühentunge VI/1 183
Rühr mich nicht an V/1 314
Rüls VI/2 569
Rüps IV/1 259
Rûerk III 198
Rüsch II 29
Rüske II 29, 147
Ruess-erle-Nägeli V/3 1635
Rüster III 117, 118
Rüsterstaude IV/2 970, 971
Rüster-Titten V/1 163
Ruetebom III 76
Rütschke II 29
Rütz VI/1 191
Rufkraut V/4 2410
Rugaiblüh III 531
Rugala III 459
Rugei III 531
Rugen I 53
Rugerl III 531
Ruggepiepen V/2 1333
Rûheckele VI/2 917
Ruhhackel(n) IV/3 1222; VI/2 917
Ruhmesblume VII 182
Ruhmkrone VII 159
Ruhpiepe V/2 1428
Ruhpipen V/2 1333
Ruhr-Birne IV/2 719
Ruhrkraut VI/1 462; VI/2 1365
Alpen- VI/1 465
, Sumpf- VI/1 468
Wald- VI/1 463
Weisses VI/1 83
Ruhrkraut, Zwerg- VI/1 466
Ruhrrindenbaum VII 184
Ruhrwurz IV/2 882, 909; VI/1 487
„ -Kraut VI/1 486
Ru(i)k III 200
Ruke IV/1 200
Rukes IV/1 484
Rukubaum V/1 584
Rulk VI/2 569
Rumbüntjen VI/1 266
Rummelaske IV/1 280
Rummele III 214
Rummels III 214
Rummenasse IV/1 280
Runggle III 214
Runke IV/1 200
Runkeln III 459
Runkelrübe III 214; VII 74 Fig. 1109 c
Runks III 214
Runzel-Erle III 85
Rupfsalat VI/2 1120
Ruppeldings IV/2 1056
Ruppelwaar IV/2 1056
Ruprechtsfarn I 16
Ruprechtskraut IV/3 1712
Rusche III 118
Rus-Chölbli II 365
Ruscht III 118
Rusemrein V/4 2518
Rusken II 29, 147
Russ II 147
Russelen IV/2 646
Russesken IV/3 1328
Russische Bodenbirne VI/1 514
Russischer Klee IV/3 1355
Russisches Veilchen V/1 648
Russkopp VI/1 292
Russmari V/4 2518
Rust'n III 118
Rutabaga IV/1 255
Rute, Wille IV/1 47
Rûte(n) V/1 69
Ruten-Kaktus V/2 697
-Kraut, Gemeines V/2 1355
-Lattich VI/2 1129
-Palme VII 156
-Pilze VII 143
-Senf IV/1 240
-Weiderich V/2 756
„ -Wolfsmilch V/1 173
Ruter Hünnerschalich IV/1 47
„ to Peer III 495
Ruthkopp IV/2 937
Rutkatlabeem V/1 250
Ruttch III 198
Ruttig III 198
Rutt'n VI/2 634
Ruttrich III 198
Rutwistlich IV/3 1489
Ruughâber I 253
Ruuksigge II 135
Ruutpeer IV/2 899
Ruwas IV/2 909

S.

Saacher II 52
Saarbellen III 60, 63
Saat-Erbse IV/3 1614
Saat-Erve IV/3 1512
-Gras I 239
-Hafer I 254
-Miere III 425
-Minze V/4 2355
-Mohn IV/1 31
-Platterbse IV/3 1604
-Rose(n) V/1 464
-Rübe IV/1 261
-Wicke IV/3 1546, 1549
„ -Wolfsmilch V/1 183
Saatwucherblume VI/2 601
Sabels II 135
Sachblueme IV/1 345
Sacher(e) I 112; II 31; IV/1 345
Sack-Kleiba III 554
Sacklippe VII 165
Sackuhr VI/1 292
Sådarei V/4 2282
Sadebaum I 92
„ , Wilder I 67
Säbel II 293
Säckelblume VII 187
Säckelekrut IV/1 364
Sägekraut I 163
Sägendissel VI/2 898
Saele III 15
Sälf, (Welde) V/4 2481, 2496
Sällerli V/2 1142
Sälvli, (Wildi) V/4 2481, 2496
Sälwäle III 15
Sälwen V/4 2481
Sänsen II 29
Säu-Chrut II 196; V/2 1213, 1428
„ -Distel VI/2 1036
Säuerling III 188
Säu-Gras III 192
Säukestene V/1 301
Säu-Kraut IV/2 889
-Krud IV/2 889
-Krüdich VI/2 878
„ -Lapp'n V/2 1428
Säulen-Fichte I 88
„ -Kaktus V/2 691
Säu-Melde III 225
„ -Sack II 326
Säuscheck VI/1 292
Säu-Serb III 352
-Wasen III 191
„ -Wurzel VI/1 342
Safaudschen Kol IV/1 242
Safferträgeli II 315
Saflor VI/2 985, 986
„ , Färber- VI/2 986
Safran II 297, 299; VII 125 Fig. 1165
Bauern- VI/2 986
Falscher VI/2 986
Wiesen- II 196

Safran, Wilder VI/2 986
„ -Löwenzahn VI/2 1023
Safranmarron VII 164
Saftäpfel V/3 1631
Saftkirsche VII 172
Sagenkraut V/3 2240
Sago-Palme VII 156
Sagopalme, Falsche I 73; VII 156 u. 55 Fig. 1090
Saher II 52
Sahle III 15
Saibärscht III 321
Saierling III 180
Saiohre IV/2 547
Sala III 15
Salat VI/2 1118
-Baum IV/3 1134
„ -Blätter VI/1 372
Salbei V/4 2475
Berg- V/4 2534
Echte V/4 2480
Edler V/4 2480
Garten- V/4 2480
Klebrige V/4 2485
Mohren- V/4 2492
Muskateller- V/4 2489
Wald- V/4 2534
Wiesen- V/4 2496
, Wilde V/4 2496
-Gamander V/4 2534
-Sommerwurz VI/1 146
-Weide III 39
Salbîne(blatt) V/4 2481, 2497
Salch(en) III 15
Salde I 140
Salep-Orchis II 338
Salfi V/4 2481
Salme VII 171
Salomons-Gras I 238
Salomonssiegel II 269; VII 39/40 Fig. 1066, 1067
Salot-Rapünzli VI/1 372
Salpeterstrauch VII 184
Salvablätter VI/2 599
Salver(er) V/4 2481
Salvet V/4 2481
Salvle V/4 2481
Sal-Weide III 34
Salz-Binse II 159
-Blume III 403
-Kraut III 254; V/3 2194
-Kresse, Kleine IV/1 361
-Melde III 235, 254; VII 171
-Miere III 403
-Pfaffenröhrlein VI/2 1082
-Potsch V/3 2194
-Punge V/3 1875
-Schuppenmiere (nicht -Melde) III 423
-Schwaden I 323, 324
-Strauch IV/3 1400
„ -Wermut VI/2 659
Samenpflanzen I 72; VII 150, 152
Samet-Blüemli II 330
Samet-Mannle II 330
„ -Weible II 329
Samkraut I 122
Samlod V/2 1386
Sammet-Badenetli V/3 1760
-Blüamli V/1 598
-Blume V/3 2158; VI/1 534
-Chindli II 329
Sammete Hühnli VI/1 309
Sammet-Engeli II 329
-Gras I 237
-Pappel V/1 467
-Potsch(veilche) V/1 598
-Rose V/1 464
-Schlegel I 112
-Schlüttli II 329
„ -Schmale I 238
Sammt-Riesla, Gelbes III 557
„ -Rose IV/2 1002
Samt-Blacka VI/2 676
„ -Witwenblume VI/1 296
Sand-Beer(e) V/2 732; V/3 1665
-Blakte VI/2 693
-Blüamli VI/2 676
„ -Bocksbart VI/2 1043
Sandbüchsenbaum VI/2 118; VII 186
Sanddorn V/2 731, 732
Sandel V/2 814
Sandelholz, Rotes IV/3 1496
„ -Gewächse III 150; VII 169
Sand-Esparsette IV/3 1490
-Flachs I 203
-Ginster IV/3 1203
-Glöckchen VI/1 390
-Gras I 401
-Hafer I 253, 401
-Hauswurz IV/2 558
-Hornkraut III 365
-Klewer I 384
-Knöterich III 196
-Kraut III 405—410
-Lieschgras I 214
-Lotwurz V/3 2180
-Luzerne IV/3 1264
-Mohn IV/1 33
-Nelke III 341; V/3 1887
-Randmelde III 250
-Röschen V/1 558; VII 189
-Schaumkresse IV/1 421
-Schwertlilie II 287
-Segge II 62
-Sommerwurz VI/1 138
-Stragel IV/3 1427
-Strohblume VI/1 471
-Veilchen V/1 636
-Wegerich VI/1 193
„ -Wicke IV/3 1534
Sangel V/2 957
Sanig(e)l IV/2 628; V/1 130; V/2 1350
Sanikel IV/2 974; V/2 957, 964
Gelber V/3 1743
„ , Schwarzer V/2 964
Saninkel V/2 957
Sankt Antonikraut V/4 2380
Cäcilienkraut V/1 511
Johanns Pfersing IV/2 1097
Iwansbart I 203
Kathrinamaja V/4 2537
Lorenzkraut V/3 2068
Petersschlüssel I 44
Prokopsbart I 213
Walpurgiskraut I 44
„ Warbilangras V/2 1042
Sânsen II 147
Santihansberi IV/2 648
Santhannisbeeri, Wildi IV/2 651
Santihanser VI/2 609
Santihanstriwelli IV/2 648
Sant Johanns-Maie(n) VI/2 609
Sant Johanns-Stern VI/2 609
Sapfel V/2 804
Saphei, (Krusen) V/4 2481
Sapotillbaum V/3 1896
Sarä III 63
Sarbache III 63
Sarbaum III 63
Sardellen IV/3 1478
Sarepta-Senf IV/1 240
Sarniggel, Wildä VI/1 405
Sassafras IV/1 11
„ , Australischer VII 176
Sataran V/4 2282
Satelsbaum I 92
Satrei V/4 2282
Satteri V/4 2282
Saturei, Griechische V/4 2286
Sau-Ampfer III 180
-Blätter III 220
„ -Bleaml VI/1 414; VI/2 1083
Saubohne IV/3 1556
Sau-Borst I 372
-Brot V/3 1836, 1838, 1844
-Dätsch VI/2 1083
-Distel IV/2 1162; VI/2 817, 898, 1105
Sauerachdorn IV/1 6
Saueramosch III 180
Sauerampfer III 180; VII 170, 171
, Großer III 180
„ , Kleiner III 178
Sauerbaum VII 196
Sauerdorn IV/1 6; VII 175
„ -Gewächse IV/1 5; VII 175
Sauer-Gräser II 5, 53; VII 155
-Hanf III 180
-Hefl III 180
„ -Kirsche IV/2 1074
Sauerklee IV/3 1650; VII 183 u. 24 Fig. 1044
, Steifer IV/3 1654
„ -Gewächse IV/3 1644; VII 183
Sauerkraut III 180
Sauerlebirla IV/2 719
Sauerlond III 180
Sauerlump III 180
Sauer-Schotenbaum IV/3 1144
-Senf III 180

Sauer-Wein III 180
Saufenchel V/2 1372
Saugblümli V/4 2276
Sau-Gelte IV/1 345
-Gras I 301, 379; VI/1 524
-Gruse III 191
-Kraut I 67; III 192; V/2 1350; V/4 2592
-Laus I 291, 293
-Mark VI/2 1105
„ -Melke VI/2 1084
Saumfarn I 38
Saumnarbe V/3 1976
Saunickel V/2 957
Saunigel I 115
Sau-Ohr(en) VI/1 181
-Pappel V/1 474
-Peterstamm III 347; V/3 1782
-Plotsch'n III 171
-Pompfer III 180
-Popl VI/2 1084
-Rach IV/1 7
-Ranzen III 180
-Ringel IV/2 889
-Schnerfling V/3 2086
-Speik V/3 1782
-Stock VI/2 1083
-Stompfer III 180
-Tod V/4 2592
-Windeln V/3 2086
-Wühln IV/2 889
„ -Zunge III 173
Savôi IV/1 242
Savoyerkohl IV/1 247
Scabiose VI/1 292
Scarletpelargonie IV/3 1666
Schaar VI/2 926
Schab'ab VI/2 569, 768
Schabaöpfel IV/2 689
Schabbel IV/3 1629
Schab(e)nkraut IV/3 1243; V/3 1624; VI/1 9
Schabzigerklee IV/3 1233
Schachblume II 239, 240
Schachtelhalme I 51; I/XCIX Fig. 154; VII 147
Schachtelhalm-Gewächse VII 147
Schachtkohl III 377
Schäärlech V/2 1428
Schäfchen II 16
Schäfe IV/3 1611
Schälkraut IV/1 21
Schälläli VI/1 102
Schärä V/1 263
Schärfling V/3 2136
Schaerke I 162
Schärlicher V/2 1428
Schärlig, Berg- V/2 1477
„ , Geiss- V/2 1477
Schärli(n)g V/2 1428
Schärlitze V/2 1017
Schärnikel V/2 957
Schärpranken II 369
Schärta V/2 1428
Schärwuttel V/3 2223
Schät(t)ele V/2 1017, 1428
Schätzligras I 305
Schäubeschä V/3 1926
Schafäugli V/3 1754
Schaf-Chrut IV/3 1196
Schafgarbe VI/2 549, 569
, Bisam- VI/2 555
„ , Zwerg- VI/2 558
Schaf-Kerbel V/2 1052
-Lälleli III 194
-Linse IV/3 1458
-Mäulchen VI/1 266
-Maul VI/1 266
-Mön IV/1 389
-Mutter IV/1 389
-Rapunzel VII 209
-Rippe VI/2 570
-Sack II 326
Schafs-Blattla III 194
Schaf-Schwingel I 330
„ -Seckel II 196
Schafszähn IV/3 1355
Schaft-Dolde V/2 959
„ -Halm I 53
Schaf-Zieger VI/1 83
-Zunga VI/1 181
-Zunge III 194; V/4 2497; VI/2 569, 932
Schallpiepen V/2 1428
Schalotte II 232
Schamblume IV/3 1626
Schanikel IV/1 330
Schannelke VI/2 961
Schaoprippken VI/2 570
Schâpeblome IV/3 1303
Schapinsel VI/1 266
Schappeleskraut V/2 916
Schâpschinken IV/1 364
Schâpsribbe VI/2 570
Scharbockskraut III 542; IV/1 136
Scharfkraut V/3 2136
Schar(kraut) VI/2 898
Scharlach V/4 2489
-Dorn IV/2 727
-Erdbeere IV/2 896
-Monarde V/4 2507
-Pelargonium IV/3 1664
-Quitte IV/2 693
-Salbei V/4 2487
-Sumach V/1 223
„ -Verbene V/3 2240
Scharlaklie IV/3 1328
Scharleye V/4 2489
Scharmenpiepen V/2 1082
Scharnenpiepen V/2 1082
Scharniggl, Gelber V/3 1750, 1760
„ , Wilder II 269; IV/2 591
Scharnikel IV/1 330; V/2 957
, Gelber V/3 1743
„ -Wurz IV/1 330
Scharn-Piepen V/2 1017
„ -Tüder V/2 1017
Scharpenpiepen V/2 1017, 1082
Schârpflug VI/2 898
Schartä VI/2 898
Scharte VI/2 926
„ , Alpen- VI/2 932
Schartenkraut IV/3 1679
Schartiblackä VI/2 898
Schasmolan III 225
Schattenblume II 267
Schattenröhre VII 205
Schattierhose V/3 1564
Schaudermann III 531
Schaum-Blüte IV/2 567
-Kraut IV/1 333
-Kresse IV/1 419; VII 177, Fig. 1220
Schawa VI/2 768
Schbitzäfädrich VI/1 183
Schdoznärwozel VI/2 1061
Schdraenzel V/2 1213
Schea(r)ruab'n IV/1 252
Scheer V/2 1017
Scheerenslieper II 293
Scheererbse IV/3 1553
Scheibelkraut III 161
Scheibenflechte VII 144
Scheiben-Klee IV/3 1267
Scheiben-Schötchen IV/1 146
Scheiberich V/2 1140
Scheiblkraut V/3 1844
Scheidenblattblütler VII 157
Scheidenfaden VII 184
Scheidenblütgras I 220; VII 154
Scheiden-Wollgras II 18
Schein-Agave VII 163
-Anemone VII 174
-Eichelgewächse VII 167
-Eller VII 195, 196 Fig. 1236
-Erdbeere IV/2 907; VII 180
-Geissbart VII 177
-Gräser II 5; VII 155
-Hasel VII 180
-Kerrie VII 180
-Knöterich (Muehlenbeckia) I/LXXVII Fig. 103
-Malve VII 188
-Mango VII 185
-Quitte VII 181
-Spiere VII 180
-Veilchen VII 177
„ -Zypresse VII 151
Scheissamin IV/2 639
Scheiss-Beere(n) IV/2 653; V/1 332, 345
-Blattl VI/1 405
-Gras V/4 2592
-Häfala IV/2 915
-Kerschen V/1 332
-Kraut V/1 127
-Malgen III 225
-Plotsch'n III 171
„ -Wurz IV/2 882
Schelfara I 179
Schelfen IV/3 1611
Schellbeere IV/2 764

Schelle VI/1 360
Schelleblume V/4 2374; VI/1 342
Schellen V/2 884
Schellkraut IV/1 21; VII 96 Fig. 1124
Schellkrut VI/1 102
Schelmasekali IV/1 364
Schelme(n)-Chrut VI/1 133
Schelm-Kraut IV/2 635
-Rosen III 466
-Wurz IV/2 635; V/3 1998; VI/1 316
Schelp I 116
Schemmer II 196
Schemschen II 147
Schende-Graben VI/1 352
„ -Gräber VI/1 352
Schepperl I 293
Scherer II 52
Scherf V/3 2090
Scherlick V/2 1017
Schertele V/2 1213
Schessmal V/1 127
Scheuchzer's Glockenblume VI/1 357
„ Wollgras II 19
Scheumpfersblume VI/2 609
Schibicke VI/1 237
Schiebaräbe IV/1 258
Schiebchen VI/1 237
Schiefblattgewächse V/1 663; VII 190
Schiefbüchse VII 147
Schiefteller VII 205
Schierlich V/2 1006
Schierling V/2 1017, 1081
Flecken- V/2 1082
„ , Stinkender V/2 1082
Schierlings-Silge V/2 1328; VII 194
-Tanne I 81; VII 151 Fig. 1179 A
Schiessbeere IV/2 1064
Schiessmie IV/2 639
Schietbeere V/2 1545
Schiffermützchen V/3 2086
Schiggore VI/2 993
Schild-Ampfer III 183
Schildblatt VII 179
„ -Sumpfrose V/3 1961
Schild-Brötli IV/3 1650
„ -Farn I 15; VII 149 Fig. 1177
Schild-Geranium IV/3 1664
-Kraut IV/1 457; V/4 2510
„ , Moor- V/4 2513
„ -Kresse IV/1 456
Schildkrötenpflanze VII 163
Schild-Kürbis VI/1 326
„ -Träger V/4 2508
Schilf I 112, 270; II 135
-Gras II 31
-Lilie II 293
Rohr I 270; I/LXXXIII Fig. 120
Schillergras I 283
Schilling(e) IV/1 118, 353
Schillingsbrod I 164
Schillkraut IV/1 21; VII 209
Schimmel-Kraut VI/1 450
Schimmelpilze VII 140
Schimmel-Weide III 24
Schindelchore I 397
Schinder-Blüh V/3 1635
-Chrut VI/1 405
„ -Latschen V/3 1635
Schindholder VI/1 236
Schinefoot IV/1 21
Schinken IV/1 364
-Krût IV/1 364
-Steel IV/1 364
„ -Wurz V/2 866
Schinn-Bläer IV/1 21
-Krut IV/1 21
„ -Watt IV/1 21
Schirmakazie IV/3 1123
Schirmbaum VII 169
Schirmfarne VII 148
Schirmmoose VII 145
Schirmtanne, Japanische I 81
Schiromon-Kürbis VI/1 326
Schischken I 85
Schismil IV/2 639
Schiss-Gelte IV/1 345
-Kraut VI/1 405
-Mader VI/2 787
-Malter III 225, 242
„ -Martele III 225
Schissmell III 225
Schissmi IV/2 639
Schiwwicke VI/1 237
Schlabbegras I 319
Schlängeleskoten VI/1 242
Schlaf-Blume III 530, 535
-Moose VII 147
„ -Sack III 536
Schlag-Kraut V/4 2539
Schlagwasserkraut V/4 2273
Schlaîa IV/2 1101
Schlak V/3 2086
Schlamm-Chrut I 151
-Ehrenpreis VI/1 61
-Kraut VI/1 38; VI/2 1361; VII 204
„ -Segge II 92
Schlanga-Kopf V/3 2194
„ -Wenda V/3 2080
Schlange-Chrut II 269, 276; V/3 1852
„ -Krut II 337
Schlangen-Äuglein V/3 2136
-Beer(en) V/2 709; VI/1 244
-Beeri II 276
-Blume IV/2 882
-Fichte I 88
-Föhre I 100
-Gras I 66; VI/2 1061
-Gurke VI/1 319
-Kaktus V/2 692
-Knöterich III 194
-Lauch II 216
Schlangen-Moos I 66
-Nussbaum VII 187
-Rettich IV/1 275
-Seid V/3 2089
-Wegerich VI/1 190
-Wurz II 134
„ -Zunge VI/1 183
Schlatterl I 293
Schlauche III 194
Schlauch-Enzian V/3 2023
Schlauch-Gewächse VII 178
-Lianen VII 189
„ -Pilze VII 140
Schlauchpflanze IV/2 510; I/CVII Fig. 175 a bis c; VII 120 Fig. 1157
Schlauchträgergewächse VII 179
Schlawwerhaube III 495
Schlebgras III 577
Schlechberi IV/2 1101
Schleckerbs IV/3 1610
„ -Hahn I 294
Schlehdorn IV/2 1101
Schlegel I 112
Schlehe IV/2 1101
Schlehenstrauch IV/2 1101
Schleichgras I 383
Schleier-Blume III 314
-Gras I 240
-Kraut III 314
„ -Moose VII 146
Schleifenblume IV/1 102
Schleifgras II 53
Schleik-Gras II 80
Schleimfarne I 48; VII 149
Schleimpilze VII 136
Schlempekraut VI/2 993
Schlernhex(e) V/3 1891
Schlesische Weide III 36
Schleudersamengras VII 154
Schliachtla II 31
Schliaferl VI/1 366
Schliafhansel I 398
Schliche IV/2 1101
Schliecheberi IV/2 1102
Schliess-Lein V/1 21
Schliestruch VI/1 237
Schlije IV/2 1101
Schlinge IV/2 1102; VI/1 242
„ , Lorbeer- VI/1 241
Schlingeheck IV/2 1102
Schlingenstrauch IV/2 1102
Schlinne IV/2 1102
Schlipfblüamli VI/2 676
Schlirp-Gras I 228, 383
„ -Klee IV/3 1303
Schlisselbliemli, (Blaues) V/3 1827
Schlitz-Nägeli III 298
-Storchenschnabel IV/3 1681
„ -Wegerich VI/1 188
Schloatfegerla IV/2 915
Schlodfegerskappen III 495
Schlössel-Blüamli V/1 91
-Blüemli IV/3 1367

Schlöss(e)li V/1 263; V/3 1746
Schlotachriesi V/4 2580
Schlot-Feger(l) II 183; IV/2 937
„ -Fegerlein, Blaues II 257
Schlotter-Bupp(e) V/4 2580
Schlotter-Hose II 236, 326; III 298, 481; IV/2 915; V/3 2214; VI/1 352
Schluabläckli III 194
Schluchä III 194
Schluchten II 32
Schluckbeeri VI/1 244
Schluckere III 194
Schluckwehrohr V/2 1350
Schlüsselblume IV/3 1367; V/3 1733, 1749
Blaue III 528; V/3 2213
Frühlings- V/3 1749
Klebrige V/3 1765, 1780
Mehl- V/3 1754
Weisse V/3 1746
„ , Zwerg- V/3 1782
Schlüsselblumen V/3 2014; VII 196
Schlüsselblumengewächse V/3 1715; VII 196
Schlüsseli V/3 1746
Schlüssel-Kraut IV/3 1712
-Speik V/3 1788
„ -Wurz IV/3 1196
Schluhigras I 309
Schlumpschuh II 326
Schlupfsame VI/2 930
Schlutte II 232; V/4 2579, 2580
Schmackedunge I 112
Schmacke(n)blett V/4 2481
Schmälcha I 243
Schmäler I 243
Schmälern I 330
Schmär-Blume III 457
„ -Halm I 294
Schmakedutschke I 112
Schmale I 261, 276, 379
Schmâlkabeer IV/2 708
Schmal-Strahl VI/1 447; VI/2 1365; VII 209
„ -Wand IV/1 392
Schmalz-Beeri IV/2 725; V/3 1670
-Birnen IV/2 700
-Bläckli VI/1 160
-Blätschen III 171
-Blätter III 219
-Blättle VI/1 160
-Blagga III 173
-Blattl III 542
-Bluema VI/2 1083
-Bluma, Weissi IV/2 637
-Blume III 457, 459
„ , Weisse III 522
-Bohne IV/3 1632
-Distlä VI/2 787
-Knollen III 457
-Kraut VI/1 266
-Öpfäli IV/2 725
-Pfann'l III 457
Schmalz-Plötschlan III 542
-Pullen III 459
-Same VII 192
-Schlüsseli V/3 1750
-Weichla VI/1 292
„ -Wurz'n VI/1 133
Schmantlatn VI/2 676
Schmarblömmchen III 542
Schmarotzerblumengewächse VII 170
Schmeckata V/4 2328, 2336
Schmeckbirä IV/2 689
Schmecker V/4 2277, 2354; VI/2 634
Schmecket V/4 2282, 2481
Schmeckholler V/3 1912
Schmeel I 276
Schmeer-Blom IV/2 639
-Kraut VI/1 160
„ -Wurzel, Falsche V/3 1597
Schmeile I 243
Schmelchen I 228, 243
Schmele, Weisse I 198
Schmelme I 243
Schmelzleskrout III 219
Schmërlaebla V/1 474
Schmerwurz II 281; IV/2 522; VII 163
Schmetten-Blume VI/2 1049
„ -Wurz(el) VI/2 1049, 1099
Schmetterling V/1 263
Schmetterlingsblütler IV/3 1135; VII 182
Schmetzkraut IV/2 937
Schmiele I 243
Schmielenhafer I 240, 251
Schmietskraut IV/2 974
Schmilme I 243
Schminkbohne IV/3 1629
Schminke V/3 2158
Schmirchala, Frühe III 542
Schmirker III 457
Schmir(k)l III 457
Schmitzen I 377
Schmöche I 243
Schmöckerli IV/1 484; V/4 2282
Schmöckgranium IV/3 1665
Schmölm I 243
Schmolme I 243
Schmotzeheiner III 219
Schmotzehoele III 219
Schmuck-Blume III 460
-Kroitche V/1 598
„ -Lilie, Blaue VII 160 Fig. 1190
Schmurbla III 457
Schmurken III 457
Schmutz-Beere VI/1 242
-Blettli VI/1 160
„ -Chrut II 253
Schnabel V/2 1037
-Binse II 48
„ -Blüemli V/3 1701
Schnabele auf — Schnabele zu VI/1 19
Schnabelfrucht VII 208
Schnabel-Kräuter IV/3 1656
Schnabel-Kraut, Blaues IV/3 1688
-Mais I 180
-Röhre V/2 1037
-Schötchen IV/1 463
„ -Segge II 118
Schnâblkraut IV/3 1712
Schnade I 254
Schnäggä-Blätter VI/2 676
„ -Chrut V/2 1213
Schnaekäthara III 522
Schnakenpal(se)m V/4 2336
Schnallenstöck IV/1 29
Schnalzal III 279, 300
Schnalzer III 300
Schnâlzglöckal III 279
Schnalz-Kachla III 457
„ -Kraut III 279; VII 208
Schnapper VI/1 19
Schnê-Bälleli VI/2 617
Schnebbeblomen V/2 709
Schneckablätter VI/2 825
Schnecken-Gras VI/1 160
„ -Klee IV/3 1248
Schneckenkölbchen VII 158
Schneckenroller VII 148
Schnedlach II 223
Schnedropf'n II 310
Schnee-Ampfer III 180
„ -Bälleli VI/2 563
Schneebärgerbluema VI/2 705
Schneeball VI/1 241; VII 206
Fig. 1256
, Garten- VI/1 244; VII 54
Fig. 1087
, Wolliger VI/1 242; VII 206
Fig. 1256
„ -Spierstrauch IV/2 680
Schneeballen VI/2 563
Schnee-Beere VI/1 234; VII 206
Fig. 1255
-Birne IV/2 697
-Bloeme III 466
-Blümel II 299; III 522; VI/1 83
-Chrut II 299
-Enzian V/3 2025
-Feigerl II 307, 310
-Fingerkraut IV/2 836
-Flockenbaum VII 197
„ -Frauenmantel IV/2 948
Schneeglöckchen II 307, 310
„ , Gelbes II 211
Schneeglöck(er)l V/3 1827
Schneegläggli II 307, 310
„ , Blaue V/3 1827
Schneegukerchen II 307
Schnee-Hainsimse II 179
-Heide V/3 1701
-Kaderl III 466, 528
-Kannerl III 466
-Katerl II 307
-Nagelen V/3 1827
-Rösl V/3 1635
-Rose(n) III 465, 531

Schnee-Steinbrech IV/2 623
-Stolz VII 159
„ -Tulpa II 310
Schneide II 47
„ -Beutel IV/1 364
Schneider VI/2 961
-Bleaml V/3 2214
„ -Hosenknopf IV/2 937
Schneiderkas IV/3 1650
Schneiderlein V/1 101
Schneidgras II 47
Schnellbloma III 279
Schneller III 279; IV/2 646; V/3 2008
Schnelln V/3 2008
Schnerer IV/2 522
Schnidabandla I 197
Schnidgras II 53
Schniedgras I 196
Schniefalka II 310
Schnieling II 223
Schnifchen III 552
Schnitt I 321
Schnittbülten II 78
Schnitt'l II 223
Schnittlächt, Wilda II 224, 227
Schnittlauch II 223
„ , Wilder V/3 1891
Schnittling II 223
Schnitt-Petersilie V/2 1157
-Salat VI/2 1120
-Sellerie, Krause V/2 1144
„ -Zwiebel II 233
Schnödesenf IV/1 276
Schnöller III 279
Schnöte II 80
Schnoorbeë IV/2 803
Schnotzbeere V/3 1681
Schnuder-Beere I 80; V/3 1681
„ -Blüemli II 253
Schnürchlee IV/3 1303
Schnüren I 383
Schnuergras I 383
Schnürle I 197
Schnupftabaksblume VI/2 705
Schnurbaum IV/3 1144
Schnurra VI/1 19
Schnurrnuss I 85
Schòblôm III 495
Schocken V/4 2595
Schoder II 16
Schöckelbeere V/3 1669
Schöllkraut (richtig ist Schellkraut) IV/1 21; VII 96 Fig. 1124
Schönblatt VII 189
Schön-Faden V/2 788
-Gesicht V/1 598
-Haube VII 192
-Häutchen VII 162
-Hülse VII 182
-Kranz VII 209
-Malve VII 188
„ Margret IV/3 1231
Schönmundpilze VII 143
Schöpfli-Chle IV/3 1355
Schörflaaken III 173
Schöterich IV/1 426
Schötzeniere VI/2 1061
Schofhäehla IV/3 1222
Schohmakerspiggholt V/1 249
Schoiken III 495
Schokolade-Blüemli II 365
Schokoladen-Blume VI/1 182
„ -Erbse IV/3 1614
Scholermon III 495
Scholtgras I 243
Schoosterknief II 191
Schopf-Kreuzblume V/1 98
-Läusekraut VI/1 122
-Lavendel V/4 2275
-Lilie VII 162
„ -Rapunzel VI/1 386
Schoppen II 78
„ -Krud V/2 1142
Schoprebben VI/2 570
Schopsklie IV/3 1303
Schopsküütelkes IV/2 937
Schorblätter VI/2 898
Schorkopf VI/2 898
Schorkrettich VI/2 898
Schornagelwurz IV/1 330
Schorsnêrwurtel VI/2 1061
Schorzonere VI/2 1061
Schosschrut V/2 814; VI/1 410
Schossemiau IV/2 639
Schosskrut V/2 814
Schosstock V/4 2518
Schossteinfeger I 112
Schosswurz I 66, 363
Schoten IV/3 1611
-Baum IV/3 1128
„ -Dotter, Lackartiger IV/1 427
Schotenfrucht-Lebermoose VII 144
Schotenklee IV/3 1364
„ , Hoher IV/3 1372
Schoten-Pfeffer V/4 2556
Schotth I 242
Schottische Nelke III 336
Schowo VI/2 569
Schpennåt III 234
Schradl(laub) V/1 236
Schränze V/2 1213
Schrattel-Baum V/1 236
„ -Kraut VI/1 25
Schraubelbäume VII 152
Schraubelpalmen VII 152
Schraubenbohne IV/3 1126
Schreck-Horn III 455
„ -Rose III 455
Schrei-Kräutig V/4 2459
„ -Kraut I 197
Schriep VI/1 189
Schrietwurz IV/2 909
Schriftfarn I 26; VII 132 Fig. 1172
Schriftflechten VII 143
Schrippengras I 294
Schrofenblüemlen V/3 1760
Schrofmadänge V/3 1760
Schtaobarsch VI/1 517
Schtazänehri VI/2 1061
Schtinkarroashen IV/3 1712
Schuasalberli, Wiessi IV/2 534
Schuckelblume II 326
Schucken V/4 2595
Schüfelichrut IV/1 364
Schügelchesblume IV/3 1367
Schüldkraut IV/1 21
Schülersäkel IV/1 118, 364
Schuenegeliholz V/1 249
Schüsselichrut IV/2 962
Schüsselkelchgewächse VII 188
Schüsse(n)beeri VI/1 244
Schüsse(r)lkraut V/4 2574
Schüttelpflaume IV/2 1108
Schuhmachernägala V/3 2014
Schuhputzer IV/2 522
Schulblume II 195
Schumacherlin V/3 2014
Schumakers V/1 249
Schumelä II 29
Schuppen-Faden VII 200
-Kopf VI/1 286
-Miere III 421
„ -Riet II 50
Schuppenwurz VI/1 128
Schuppen-Zeder VII 151
Schurjan V/4 2530
Schurken I 85
Schussaleskraut IV/3 1688
Schusserbaum IV/3 1129
Schussmin IV/2 639
Schuster-Nägeli V/3 2054
-Nagerl V/3 2014
„ -Veigerl V/3 2014
Schuster-Wurz VI/1 373
Schutthederich IV/1 428
Schuylkilltraube V/1 361
Schwabe VI/1 372
Schwabenkorn I 391
Schwaberolla III 459
Schwab'nwurz II 193
Schwaden I 219, 318, 319; VII 155
„ -Segge II 95
Schwändel I 122; III 577
Schwänzel I 376
Schwänzlein I 228
Schwalben-Beer VI/1 242
Schwalbenschwanz VI/2 885
Schwalbenwurz(kraut) V/3 2067, 2068; VI/2 712
Schwalbenzunge III 205
Schwålmbeer VI/1 242
Schwamm-Kürbis VI/1 314
Schwamm-Tange VII 138
Schwanenblume I 157; VII 153
Schwanenblumengewächse I 157; VII 153
Schwanzblume VII 157
Schwanzklee IV/3 1328
Schwanzln I 376
Schwartele II 293
Schwarten V/3 2068

Schwartrose III 455
Schwarzäugelbeer V/3 1675
Schwarz-Anna-Kraut III 478
Schwarzbeer(e) IV/2 772; V/3 1675; V/4 2566
Schwarzdorn IV/2 1101, 1102
Schwarz-Eiche III 112
Schwarzer Enzian V/2 1389
„ Kreuzkümmel III 475
Schwarzerlä V/1 345
Schwarz-Erle III 91
Schwarzer Plent'n III 208
Schwarzföhre I 106
Schwarz' Gräs I 217
Schwarz-Hasle IV/2 1064; V/1 345
-Kümmel III 474, 475; V/4 2613
„ -Linde V/1 436
Schwarzling II 365
Schwarz-Pappel III 62
-Plent I 179
„ -Weide III 43
Schwarzwurzel V/3 223; VI/2 1053, 1061
Schwattbaum V/1 344
Schwebelholz V/1 345
Schweden-Klee IV/3 1299
Schwedische Rübe IV/1 255
Schwefelbakterien VII 136
Schwefelkopf VII 142
Schwefelsame VII 212
Schwefelwurz V/2 1372
Schweine-Ahr II 136
-Kraut II 136
„ -Rübe V/4 2416
Schweinlagros III 192
Schweinsbrot V/3 1844
Schweinseide V/3 2104
Schweinspirchen IV/2 725
Schweinsrippen IV/2 891
Schweinzerl III 557
Schweissbleaml II 365
Schweizel I 338
Schweizerl VI/1 414
Schweizer-Mannsschild V/3 1795
„ -Moosfarn I 70
Schwelcha VI/1 242
Schwelch-Beri VI/1 242
Schwelg VI/1 244
Schwellkraut V/2 1006
Schwemmgras I 219
Schwengel I 122
Schwengs-Kraut V/1 127
„ -Wurzel VI/1 316
Schwert-Blume II 293
-Bohne IV/3 1625, 1632
„ -Ilge II 293
Schwertl II 302
Schwertlilie, Blaue II 296
„ , Gelbe II 293
Schwertliliengewächse II 283; VII 163
Schwertling II 302
Schwertzuckererbse IV/3 1615
Schwiblacka III 173
Schwi-Bone III 495
Schwickenblüh I 266
Schwickgras I 373
Schwiderbeeri VI/1 244
Schwieneblome II 337
Schwienkohl VI/2 1105
Schwigerli V/1 597
Schwilche VI/1 242
Schwilke VI/1 242
Schwillgakaunscht VI/1 242
Schwillgene VI/1 242
Schwimeie VI/2 1083
Schwimmfarne I 47; VII 149
Schwindel I 376
-Beer V/3 1681
-Blüh V/3 1760
-Haber I 376
-Hafer I 253
-Korn I 376; V/2 1071
-Weissa I 376
„ -Wurz VI/2 718
Schwinegelsknop I 115
Schwi(n)-Esch IV/2 708
Schwinewörzel II 193
Schwingel I 327; VII 155
„ -Schilf I 317
Schwinggertlekrut V/2 814
Schwinkrüdig IV/2 889
Schwinskrut V/2 814
Schwinstränzel IV/2 889
Schwinzichblimla VI/2 676
Schwischarta VI/2 898
Schwizer-Dega IV/3 1611
-Hose III 298
„ -Maidle IV/1 29
Schwobetörn V/1 236
Schwögerli V/1 597
Schwölkeblom V/1 598
Schwulstkrut VI/2 787
Schwummala II 29
Schwummchrut, Heidnisch VI/1 409; VI/2 759
Schwummele II 29
Schwundkraut V/3 1891
Schwybluemä VI/2 1083
Schwyzerhose II 302; III 481
Sebenbaum I 92
Sechsecker I 398
Seckelblumen II 326
Sedella IV/3 1478
See-Bazillen V/2 1225
Seebärengewächse V/2 894; VII 192
See-Binse II 28; VII 116 Fig. 1151
-Blume V/2 757
-Bock V/3 1686
-Distel I 162
„ -Dorn V/2 732
Seefen V/3 1690
Seefenchel V/2 1225
Seefkesâd VI/2 620
See-Gräs I 197
Seegras I 141, 197; II 64, 78; V/3 1887
See-Gütterli III 445
-Halden I 122
„ -Kanne V/3 1961; VII 198
Seelos' Milzfarn I 29
Seemannstreu V/2 979
See-Nuss V/2 884
-Pferd I 157
-Röhrli I 271
„ -Rohr II 29
Seerose III 440; VII 62 Fig. 1097 und 110 Fig. 1144
„ , Weisse III 441
Seesalden I 122
Seeschote, Wilde IV/3 1585
Seesseldüwel II 200
See-Tanne V/2 906
Seeweed I 141
Sefi (Wilder) V/1 548
Seft'nbaum I 92
Segelbaum I 92
Segge II 51; VII 156
Berg- II 89
Blasen- II 118
Felsen- II 56
Finger- II 100
Flaschen- II 118
Floh- II 57
Frühlings- II 90
Hasenfuss- II 71
Heide- II 90
Hirsen- II 95
, Horst- II 103; VII 109 Fig. 1143
Igel- II 67
Kamm- II 62
Kopf- II 55
Krumm- II 70; VII 51 Fig. 1082
Monte Baldo- II 59
Polster- II 104; VII 112 Fig. 1147
Rispen- II 69
Sand- II 62
Schlamm- II 92
Schnabel- II 118
Sumpf- II 120
Torf- II 54
Ufer- II 121
Vogelfuss- II 100
Wald- II 110
„ , Zittergras- II 64
Seguier's Steinbrech IV/2 604
Sehle III 15
Sehnsblätter I 151
Seich-Blume VI/2 1084
-Distel V/2 988
-Glöckl VI/1 352
-Kräutel I 31, 66
„ -Kraut IV/3 1222; VI/2 1084
Seide V/3 2089
, Flachs- V/3 2102
, Klee- V/3 2096

Seide, Quendel- V/3 2094
Weiden- V/3 2109
Weisse V/3 2099
„ , Zaun- V/3 2101
Sei(de)lbam V/2 708
Seidelbast V/2 703, 708; VII 8, Fig. 982
, Lorbeer- V/2 706
„ -Gewächse V/2 698; VII 191
Seiden-Bleaml III 298, 300
-Blume V/2 814
-Ginster IV/3 1205
-Pflanzen V/3 2058, 2065; VII 199
-Winde V/3 2089
„ -Wollbaum VII 188
Seiderêsle VI/1 414
Seifenbaum IV/3 1129
„ -Gewächse V/1 306; VII 187
Seifenkraut III 344
Gelbes III 348
„ , Rotes III 345
Seifenkrottch III 344
Seïgnbam V/3 1690
Seihgras I 66
Seipfichrut III 344
Seisenhart V/4 2416
Seissen IV/3 1712
Seissenhatt V/4 2415
Seiss'lblom IV/3 1719
Sekadell IV/3 1478
Sekeli-Dieb IV/1 364
„ -Schelm IV/1 364
Sekretärli IV/1 345
Selb V/4 2481
Selbstklee IV/3 1303
Selfi V/4 2481
Sellerie V/2 1140
, Knollen- V/2 1144
Roter V/2 866
„ , Stengel- V/2 1144
Selve V/4 2481
Selw(e) V/4 2480, 2496
Selwerblatt IV/2 889
Selwerli V/4 2496
Semde II 29
Semmel-Blume V/3 1887
-Milch IV/2 615
„ -Wurzel V/4 2416
Semp IV/1 204
Sempelfi IV/2 547
Sempf IV/1 204
„ , Gäle IV/1 263
Semsen II 147
Sendach V/3 1690
Sende II 147
Send(e)l V/3 1690, 1701
Senden V/3 1701
Senef IV/1 204
Senerer II 139; V/3 1701
Senf IV/1 200
, Acker- IV/1 263
Französischer IV/1 236
, Holländischer IV/1 236
Senf, Schwarzer IV/1 236
Weisser IV/1 205, 276
„ , Wilder IV/1 263
Senfkohl IV/1 236
Sengenessle V/4 2438
Sengerbleaml III 561
Sengessel III 139
Sengesselblust V/4 2438
Seng(l)nessel III 139
Sennal II 139
Sennechrut VI/2 747
Sennerrosen V/3 1635
Sennes, Ägyptische IV/3 1131
Sensendüwel I 200
Sepbeer V/3 1675
Sephi, (Wilde) V/3 1690
Sermetze II 147
Serpe I 101
Serpentin-Hauswurz IV/2 552
Serradella IV/3 1475, 1478
Sesam VI/1 176; VII 205
Sesamgewächse VII 205
Sesel V/2 1226
Settche IV/1 484
Setzölsame IV/1 254
Seutzla V/2 709
Seviebaum I 92; VII 151
Sewersâd VI/2 620
Seychellen-Nuss VII 156
Shauerkraut III 180
Shbuerze Karschen II 275
Shengruna V/3 2054
Sherredella IV/3 1478
Shiradella IV/3 1478
Shirupsblome IV/2 639
Shisse II 313, 315
Shlangerlain I 379
Shmauwach II 53
Shuweejen V/4 2481
Siass VI/2 1049
Sibbaldie IV/2 893
Sibirischer Storchschnabel IV/3 1694
Sichel-Dolde V/2 1177
-Klee IV/3 1257, 1259
-Kohl I 163
-Kraut V/2 1177
-Luzerne IV/3 1259
-Möhre V/2 1176
-Mutz V/2 1177
-Salat VII 212
„ -Wätz III 557
Sickel I 163
Sidahuat III 531
Side V/3 2089
-Beeri IV/2 768
„ -Gras I 401; II 16
Sidelbast V/2 708
Siden V/3 2089
Sîe V/3 2089
Sieben-Baum I 92
Siebenfingerkraut VII 180 u. 100 Fig. 1129
Siebengezeug IV/3 1234
Siebenjahrblume VI/1 469
Siebenklê IV/3 1234
Siebenrippe VI/1 183
Siebensibzcher-Chlee IV/3 1234
Sieben-Stern V/3 1861
„ -Stundenkraut IV/3 1233
Siebnzeuch IV/3 1234
Siebtscher IV/3 1234
Siegenkümmel V/2 1393
Siegwurz II 219
, Saat- II 303
, Sumpf- II 303; VII 81 Fig. 1115
Siekbeeren VI/1 237
Sieme II 147
Siën V/3 2089
Sienächrut I 67
Siere(e)n V/3 1913, 2089
Sierg II 135
Siessstirzel VI/2 1049
Sigerer V/3 2053
Sigge II 52, 135, 293
Siglanten V/2 709
Siglanz V/2 709
Sigmars-Kraut V/1 478
„ -Wurz V/1 478
Sigminz V/4 2395
Silau V/2 1295
Silb V/4 2481
Silber-Ahorn V/1 271
-Akazie IV/3 1125
-Baum IV/2 713; V/2 787
-Blatt IV/1 350; VII 213 Fig. 1268
„ , Wolliges V/4 2492
-Blümchen VI/2 563
-Chrut IV/2 889, 949
-Distel VI/2 817, 917
-Fingerkraut IV/2 837
-Glätti IV/2 949
-Glocke VII 197
-Grannenhafer I 249
-Gras I 240, 242; VII 154
-Hülse IV/3 1160
-Klee IV/2 817; IV/3 1160
-Knöpfchen VI/2 564
-Linde, Ungarische V/1 434
-Mänteli IV/2 949
-Mantel IV/2 949
-Mies IV/2 591
-Münze IV/1 353
-Ölweide V/2 730
-Pappel III 59
-Raute IV/2 817; VI/2 647
-Regen IV/3 1392
-Storchenschnabel IV/3 1675
-Tischlä VI/2 817
-Wegerich VI/1 185
-Weide III 22
„ -Wurz IV/2 922; VI/2 817
Silge V/2 1310; VII 194 Fig. 1235
Silie V/2 1310
Silk V/2 1156
Silphium-Pflanze V/2 1357
Simesse II 147

Simse II 27, 28, 147; VII 158
Simsenlilie VII 159 u. 101 Fig. 1130
Simte II 147
Sinäugl IV/2 963
Si(n)gri V/3 2053
Singrün V/3 2053
Sin(n)au IV/2 943, 963
Sinnpflanze, Keusche IV/3 1126
Sipel II 232
Sip-sap-sîpken IV/2 708
Sirene V/3 1913
Sirgelbam I 92
Sirmontan V/2 1468
Sitt in d' Hose VI/1 516
Siurbaum V/1 87
Skalotte II 232
Skarnitzelblume II 132
Skorpions-Kraut IV/3 1466; V/3 2132
„ -Peltsche IV/3 1466
Skurzenäre VI/2 1061
Slabber-Babb I 112
„ -Gras I 319
Slätelblôm V/3 1749
Slamp I 141
Slangen-Krut II 310; V/3 2214
„ -Rank V/3 2080
Slêne(rte) IV/2 1101
Sliën IV/2 1101
Slingenrause V/3 2086
Slöttelblaume V/3 1746
Slubbegras I 319
Slüenken IV/2 1101
Slu(n)ker VI/1 54
Smâllow II 223
Sma(r)tkarn III 198, 201
Smartkoorn III 198
Smeerwuttel V/3 2223
Smele I 243
Smieter I 158
Smölkes IV/2 725
Smoltblome III 542
Smook(rause) IV/1 29
Smyrnerkraut V/2 1079
Snaken-Bläder I 41
-Blom III 300
„ -Krund II 269
Snarn I 396
Sneeklocke II 307
Sneerklewer IV/3 1255
Sneerkrut III 205; V/3 2086
Sniegras II 53
Snitt-Gras II 53
„ -Lok II 223
Snôrbêe IV/2 772
Snotken V/2 1428
Sockenblume IV/1 9
Sodkraut VI/2 821
Sodomsapfel V/4 2586
Sögenkohl VI/2 1105
Sögestikel VI/2 1105
Sötbeeten IV/2 972
Sötmei IV/2 971
Sötneddel V/4 2438
Söu-Chrut III 214
Soga II 52
Soha-Gras I 383
Sohn vor dem Vater VI/2 676
Soja-Bohne IV/3 1620
Soite I 92
Solanotsch V/3 1760
Soldate-Blüemli V/3 2014
„ -Knöpfe VI/2 825
Soldaten IV/1 345
, Blaui V/4 2497
-Knabenkraut II 343
-Petersil V/4 2374
-Riesla III 557
„ -Wuttel V/3 2223
Soldatesurampfer VI/2 1049
Solterbeeren IV/2 653
Soltje VI/1 423
Somagras I 211
Sommer-Aster VI/1 448; VI/2 1355 Fig. 959; VII 209
-Drehwurz II 385
-Efeu VI/1 408; VI/2 728
-Eiche III 108
-Endivie VI/2 1120
-Feigel IV/1 469
-Feuerröschen III 600
-Klee IV/3 1355
-Lauch II 231
-Linde V/1 446
-Ölrübe IV/1 260
„ -Rebe V/1 361
Sommerrübenreps IV/1 260
Sommerrübsen IV/1 260
Sommer-Saat IV/1 260
-Säckelchen VI/2 676
-Sprenkeln III 328
-Thierchen II 310
-Thürlein VI/2 676
„ -Türchen II 310
Sommerwurz VI/1 132; VI/2 1362; VII 21 Fig. 1028
, Grosse VI/1 143
, Kleine VI/1 153
, Gewächse VI/1 132; VII 205
„ -Zwiebel II 232
Sonderumen I 100
Sonnä-Bluemä VI/2 705
„ -Wirbel VI/2 1049
Sonnawendschöberl II 365
Sonne-Blom VI/2 801
-Dächle VI/2 683
„ -Epheu VI/2 408, 728
Sonnen-Auge VI/1 528
Sonnenblume II 252; VI/1 507, 510
„ , Kleine VI/1 506
Sonnenfeind VII 202 Fig. 1246
Sonnenfreund VII 177
Sonnenglanz VI/1 510
Sonnenhut VI/1 503
Sonnenröschen V/1 561
, Apenninen- V/1 563
, Berg- V/1 577
Italienisches V/1 575
Sonnenrose(n) VI/1 507; VI/2 818, 821
Sonnenschildkraut V/4 2530
Sonnentau IV/2 498, 502, 504, 505
„ -Pflanzen IV/2 497; VII 179
Sonnenwedel VI/2 993
Sonnenwende V/3 2130, 2132
Sonnenwendflockenblume VI/2 980
Sonnenwirbel VI/1 490; VI/2 974
Sonnen-Wolfsmilch V/1 163
Sonnwend-Blume VI/2 801
-Gürtel VI/2 637
-Kraut V/1 526
-Rose VI/2 1049
„ -Schöberl I 293
Sool-Weide III 33
Sophie, (Smallen) V/4 2481
Sophienkraut IV/1 160
Souchrut VI/2 1105
Sowa-Dill V/2 1293
Späckwürza II 281
Spärlingsbaam IV/2 711
Spät-Linde V/1 437
Spaierli IV/2 714
Spajes II 261
Spalt-Algen VII 136
Spaltastfarne VII 148
Spaltblatt-Bärlappe VII 147
Spalt-Blume VII 203
-Gras I 306; II 80
-Griffel VII 163
-Kölbchen VII 175
-Pilze VII 135
„ -Pflanzen VII 135
Spanierhose IV/3 1564
Spaniolhosä IV/3 1564
Spanisch-Bluest IV/3 1564
Spanisch Gras I 197
Spanische Artischocke VI/2 924
Eier V/4 2587
Nuss IV/3 1463; VII 60 Fig. 1096
Schwarzwurzel VI/2 1061
„ Wicke IV/3 1564
Spanischer Flieder V/3 1912
Ginster IV/3 1213
Lauch II 231
Pfeffer V/4 2556
„ , Wilder V/2 709
Pfriemen IV/3 1213
Spinat III 239
„ Steinbrech IV/1 627
Sparakel VI/2 1049
Spargel II 260, 261; VII 161 Fig. 1192
-Bohne IV/3 1375, 1632
-Erbse IV/3 1373, 1375
-Klee IV/3 1373
-Kohl IV/1 248
„ -Spitzen V/4 2419
Sparjes II 261
Spark III 418
Sparre III 377
Sparrenschilf I 321
Sparrfaden V/4 2385

Sparz II 261
Spatelfadengewächse VII 167
Spatel-Kreuzkraut VI/2 740
Spatzenzunge V/2 726
Spatz'n-Klepp'n VI/1 281
„ -Klett'n VI/1 281
Spazierstock-Palme VII 157
Spechtblume III 323
Spechtwurz VII 184
Speck-Beeri V/3 1670
-Blümchen IV/2 915
-Blume III 522; IV/1 345; VI/2 1049
-Bohne IV/3 1632
-Deef IV/1 364
-Rübe IV/1 255
-Wottel V/3 2223
Speerblume VII 163
Speerdistel VI/2 808
Speerenstich V/3 2006
Speers III 418
Spêglblom III 561
Speierling IV/2 711
Speik V/3 1780, 1782; VI/2 559, 561
Blauer V/3 1780
Echter VI/1 269
, Gelber V/3 1760, 1782; VI/1 269; VI/2 765
Grosser V/4 2276
Kleiner V/4 2277
Roter VI/1 269
Weisser VI/2 559, 561
, Wilder V/3 1760
Speis II 261
Speise-Kümmel V/2 1182
Speise-Rettich IV/1 280
Spêkem V/4 2274
Spelldistel V/2 988
Spellen IV/2 1106
Spelz I 391
Spelzblütler II 130; VII 153
Spengelbüchse I 53
Spenling IV/2 1106
Sperbe IV/2 711
Sperbenkraut IV/2 937
Sperberbaum, Wilder IV/2 719
Sperchel III 418
Spergel II 261; III 418
Sperlingskraut V/2 726; V/3 1869
Sperrfink V/3 2054
Sperrjen IV/2 1106
Sperrkraut V/3 2114
-Gewächse V/3 2111; VII 199
Sperr-Mäuler IV/1 47
„ -Öpfeli IV/2 711
Sperwel IV/2 711
Spetzlichrut V/2 1017
Speunat III 234
Spickaal II 135
Spickel VI/1 372
Spick-Rohr V/2 1333
Spiegel V/1 263
-Blome III 542
-Blueme III 298
Spiek(e) V/4 2274
Spier-Baum IV/2 719
Spierstaude IV/2 673, 970; VII 180
Spier-Strauch IV/2 673
Spiessa-Chrut V/1 146
Spiess-Dorn IV/1 6
„ -Gras I 383
Spiesslichrat IV/2 522
Spiesstanne VII 151
Spiggefaut VI/2 787
Spigg-Guga V/2 1333
Spihk V/4 2274
Spiirli IV/2 711
Spik- Deutscher V/4 2276
Spikanard V/4 2276
Spikbeeri VI/1 244
Spilgen IV/2 1106
Spillablume II 195
Spillbom V/1 249
Spillchen IV/2 1106
Spilljes III 418
Spilling IV/2 1106, 1108
Spillmugge III 475
Spinat III 233, 234
Englischer III 177
Neuseeländer III 267
„ , Wilder III 220; VI/2 1162
Spindelbaum V/1 246, 249
Spindel-Blume II 195
Spindle V/1 249
Spindling I 53
Spinez III 234
Spinnblume II 195; III 475
Spinnen-Distel VI/2 990
„ -Ragwurz II 331
Spinnenständel II 330
Spinnklee IV/3 1303
Spinnlich I 53
Spinnweben-Bisamdistel VI/2 843
-Hauswurz IV/2 553
„ -Steinbrech IV/1 618
Spinnwinde V/3 2080
Spiralhülse VII 181
Spirigingisli VI/1 83
Spisehölzli V/1 236
Spitschmalä I 383
Spittlagen II 16
Spitz-Ahorn V/1 280
-Beeri IV/1 7
-Blacka III 173
-Blakte V/2 1213
-Bläer III 550
-Blume VII 196
-Buam III 273
-Disteln VI/2 903
„ -Gras I 192, 301, 373
Spitzkeimer VII 152
Spitz-Kiel IV/3 1447
„ -Klee IV/3 1310
Spitzklette VI/1 498
Spitz-Kraut IV/1 247; V/4 2416
„ -Krönchen VII 199
Spitzli-Chrut V/2 1017
Spitz-Nuss V/2 884
Spitz-Orchis II 334
-Ried II 24
-Wedara VI/1 183
-Wegerich VI/1 183; VII Fig. 1076, 1156
Splinibeere V/1 345
Spockelter IV/2 977
Spöhk V/4 2274
Spöelkrud IV/2 498
Spörgel III 418
Spörjes III 418
Spöttlich VI/1 83
Sponellen IV/2 645
Sporakel VI/2 1049
Spornblume VI/1 277
Spornbüchse VII 205
Sporndrüse VII 192
Spornfahne VII 183
Spornlos II 359; VII 166 Fig. 1202, 1203
Sporn-Veilchen V/1 609
Spottrohr I 112
Spräkelboom V/1 344
Spräössel V/1 344
Sprättgras I 301
Spräzern V/1 344
Spreisselbeere V/3 1669
Spreiz-Klee IV/3 1292
Sprengberi II 275; VI/1 252, 253
Sprengel IV/1 259
Spreublume IV/1 345; VI/2 812; VII 212
Spriäkeln V/1 344
Sprickel(n) V/1 344
Spricker(n) V/1 344
Spriklilgen VI/1 255
Spring-Korn V/1 146
Springkraut V/1 310, 314; VII 187
„ -Gewächse V/1 309; VII 187
Spring-Lein V/1 22
-Mispel VII 181
-Schaumkraut IV/1 339
-Wolfsmilch V/1 146
„ -Wurz V/1 74
Sprinzen I 101
Spritzgurke VI/1 313
Spröck-Weide III 20
Sprötzen(boom) V/1 344
Sproochwichel III 20
Sprookwied III 20
Sprossenkohl IV/1 247
Sprosserln IV/1 247
Sprütze(-Chrut) V/2 1333
Sprützenholt V/2 1428
Sprütze-Rohr V/2 1333
Sprutmaus IV/1 242
Spuhlwurz I 383
Spunellen IV/2 645
Spunsker IV/2 645
Spurre III 377
Stabalgen VII 137
Stabiose VI/1 292
Stabwurz VI/2 626, 634
Wilde VI/2 666

Stachelbart VII 209
Stachelbecher VII 181
Stachelbeere IV/2 645
Stachel-Dolde V/2 992
-Hutschen IV/2 645
Stachelkopfgras VII 153
Stachel-Litzen IV/2 645
-Mohn IV/1 19; VII 176
-Nessel V/4 2457
-Nuss V/2 884
-Panax VII 193
-Pilze VII 142
-Punzchen IV/2 645
-Seerose VII 174
-Träubchen VII 197
„ -Wurzel V/3 2194
Stachle IV/2 645
Stachys V/4 2419
Stacklaub V/2 1350
Stådlzausert V/1 127
Stadtschlösseli IV/3 1367
Stächbollä VI/2 821
Stächer VI/2 817
Stäckappel V/4 2613
Stäifelböhne IV/3 1629
Stäkheide IV/3 1209
Stäkkührn V/4 2613
Ständer-Pilze VII 141
Stängelichlee IV/3 1260
Stärnblämcher II 247
Stärneli V/3 2014
Stäubling VII 141
Stäwelknecht VI/1 517
Staffelböhni VI/2 747
Stafiosen, Wilde VI/1 292
Stah up un gah davon VI/1 58
Stalkerz VI/1 16
Stallkraut IV/3 1222
Stamme(n)-Nägeli IV/1 442, 469
Stanbuachn III 66
Stangen V/2 1017
Stangen-Blom V/1 464
„ -Bohne IV/3 1626
Stange(n)-ros V/1 464
Stangert V/2 1017
Stangranten V/3 1657
Stânhâdach V/3 1603
Stanhansel V/3 2194
Stanitzlbleaml II 136
Starkwurz III 466
Stârogge IV/2 536
Starrekrund VI/1 423
Staubbrand VII 142
Staub-Löwenzahn VI/2 1024
Staub-Pilze VII 143
Staudachrut III 214
Staudelbeer V/3 1675
Stauden-Bloaml III 529
-Lein V/1 17
-Majoran, Echter V/4 2333
„ , Falscher V/4 2327, 2330
-Phlox V/3 2113
Stauparsch VI/1 517
Stâ up un gâ weg V/3 1853
Stechabeerle IV/2 645
Stechapfel V/4 2612
Stech-Blatt V/2 1328
-Blümlein IV/2 637
-Distel VI/2 878, 903
-Dorn IV/3 1123; V/1 326
-Eiche III 112
-Epfel VI/1 281
-Ginster IV/3 1190
-Holder V/1 236
-Krallen V/2 884
-Laub V/1 236
Stechle V/1 236
Stech-Nägala, Blaue V/3 2194
„ -Nägeli III 321
Stechpalme V/1 234, 236
Stechpalmengewächse V/1 233; VII 186
Stechsalat VI/2 1120
Steck(e)beere IV/2 645
Steckebunne IV/3 1629
Steckenkraut V/2 1093, 1354, 1355
Steck-Laub V/2 1350
„ -Rübe IV/1 255
Steen-Beere V/3 1657
-Hart V/3 2158
-Klewer IV/3 1322, 1367
-Klinkalan IV/2 536
-Krischbel VI/2 1114
-Krut IV/2 536
„ -Paeper IV/2 536
Steenzelkerlan IV/2 536
Steern II 252
Steerntje III 352
Stei-Birli IV/2 756
-Bliemli V/3 2054
-Blüomli III 529
-Chlee IV/3 1482
-Chrüchere IV/2 922
„ -Chümi IV/2 591
Steif-Gras I 354
„ -Halm I 278
Stei-Glöggli V/3 2014; VI/1 349
-Gloggä V/3 2007
-Gras I 266
-Ilga II 237
-Nägeli III 323, 330, 335; V/3 2014
Stein-Beere IV/2 766; V/3 1670
-Benedix IV/2 909
-Binse II 30
„ -Blume V/3 1760
Steinbrech IV/2 568, 591, 613; VII 31 Fig. 1054
, Blaugrüner IV/2 583
, Burser's IV/2 585
Fassaner IV/2 606
, Fettblatt- IV/2 593
Fetthennen- IV/2 596
Fettkraut- IV/2 603
Furchen- IV/2 669
, Karst- IV/2 619
, Knöllchen- IV/2 615
, Krusten- IV/2 588
Steinbrech, Mannsschild- IV/2 605
Moor- IV/2 621
Moschus- IV/2 606
Nelkenwurz- IV/2 627
Piemonteser IV/2 611
Rauher IV/2 598
Roter IV/2 579
Schatten- IV/2 627
Schnee- IV/2 623
Seguier's IV/2 604
Spanischer IV/2 627
Spinnweben- IV/2 618
Tombeaner IV/2 587
Trauben- IV/2 591
, Zwiebel- IV/2 616
Steinbrecher IV/1 327
Steinbrech-Felsennelke III 316
„ -Gewächse IV/2 562; VII 179
Stein-Buche III 66
-Eiche III 111, 116
-Esche V/3 1926
-Espe V/1 285
„ -Fingerkraut IV/2 831
Steinfrucht-Fächerpalmen VII 156
„ -Fiederpalmen VII 156
Stein-Günsl VI/2 759
-Hirse V/3 2153, 2156
„ -Klawer IV/3 1367
Steinklee IV/3 1236, 1243, 1255, 1303, 1310, 1367
Blauer IV/3 1233
Hoher IV/3 1241
Orientalischer IV/3 1247
, Weißer IV/3 1245
-Klette VI/1 498
-Kraut III 294, 403; IV/1 350, 360, 445, 458; IV/2 615
-Kresse IV/1 110
-Laxe I 41
-Leifer V/2 916
-Leiter V/2 814
-Linde V/3 1917
-Lorbeer VI/1 241
-Mårks IV/2 536
-Minze V/4 2369
-Mispel IV/2 682
-Moos, Blaues IV/2 579
„ -Nelke III 323, 328, 330
Steinnuss-Palme VII 157
Steinobst IV/2 1053; VII 181
„ -Gewächse IV/2 667
Steinpilz VII 143
Stein-Plagente V/3 1760
-Polei V/4 2297
-Quendel V/4 2297
„ , Alpen- V/4 2299
-Ramseln IV/3 1203
-Raute VI/2 559
-Röschen III 328; V/2 719
„ -Röse(r)l II 365; V/2 716, 719
Stei(n)-Rogge IV/2 534, 591
Stei(n)-Rolle IV/2 536
Stein-Rose V/3 1635
Steinsame V/3 2153

Steinsame, Acker- V/3 2158
Steinschmückel IV/1 114
Stein-Storchenschnabel IV/3 1679
-Täschel IV/1 110
-Träubchen IV/2 766
-Veilchen V/1 636
-Weichsel IV/2 1070
-Weizen IV/2 536
-Wicke IV/3 1420, 1482
-Wurzä V/2 1278
„ -Wurzel IV/3 1222
Stei-Reesli V/3 1635
-Rosä V/3 1635
-Rügeli IV/2 536
-Rutä VI/2 648
-Schlüsseli V/3 1760
-Trüben I 266
-Trübli II 256
„ -Weizen IV/2 534
Stekelheide IV/3 1209
Steker(krut) V/4 2613
Stek-Köörn VI/2 917
-Krût VI/2 917
„ -Kürn VI/2 917
Stelzenbaum V/2 769
Stelzen-Palme VII 157
Stênblom VI/1 288, 456
Stendelwurz II 358
Stengel, (Grosse) V/2 1428
-Eberwurz VI/2 821
-Gäse V/2 1213
-Klee IV/3 1257
-Sellerie, Walnuss- V/2 1144
Stenkarna III 221
Stenker(ne) III 220; V/4 2420
Stephanskraut V/2 876
Steppen-Fenchel V/2 1240
-Hafer I 257
-Kreuzkraut VI/2 743
-Lilie VII 159
-Raute VII 184
-Spitzkiel IV/3 1444
„ -Wolfsmilch V/1 177
Sterbegras II 80
Sterna II 315
-Blüemli IV/2 637
Sternächrut VI/2 1049
Stern-Anis IV/1 14; VII 175 Fig. 1218f, g
Sternapfelbaum V/3 1896
Sternblaume II 315
Sternblume II 252; V/2 964; VI/1 361, 416; VI/2 1365 u. 1357 Fig. 962
Alpen- VI/1 426
Berg- VI/1 428
Gelbe II 211
„ , Herbst- VI/1 431
Sterndolde V/2 961
, Kleine V/2 972
„ , Grosse V/2 964
Sterne-Blüemli V/2 2014
„ -Bluem III 542
Stern-Flockenblume VI/2 978
Stern-Gras VII 155
-Kraut VII 172
„ -Kümmel V/2 1187
Stern-Lein VII 197
Sternli III 522, 542; IV/2 637
Sternmiere III 349; VII 171, 172
Stern-Möhre V/2 1060
Stern-Moose VII 146
Sternnuss-Palme VII 157
Sternschild VII 161 Fig. 1194
Sterzebacher II 313
Steyrerklee IV/3 1331
Stiäk-Heide IV/3 1190
„ -Raiwe IV/1 252
Stiafmirtal, Gelbes V/1 617
Stich-Kraut VI/2 705
„ -Kürn VI/2 917
Stichling VI/1 327
Stichsamen VI/2 917
Stick-Beeren IV/2 645
„ -Blume VI/1 288
Stickel VI/2 846, 874
Stickelebohne IV/3 1629
Stickelrosa V/1 464
Stickwort V/2 884
Stiefeli V/3 2014
Stiefeln VI/1 120
Stiefmütterchen V/1 586, 597
, Alpen- V/1 609
Erz- V/1 605
Gelbes V/1 605
„ , Geröll- V/1 612
Stieguf(li) II 269, 302; IV/3 1564
Stiel-Eiche III 108
Stielfadengewächse VII 179
Stielfruchtbaum VII 150
Stielfruchtgewächse VII 150
Stielsamenkraut VI/2 1067
Stiel-Tännel V/1 540
Stieräseckel II 196
Stier(en)äugli V/3 1754, 2014
Stiergräschen IV/3 1712
Stierk V/2 1183
Stierkraut II 372; IV/2 522, 536; VI/1 133, 160
„ , Weisses IV/2 534
Stierl V/3 1844
Stierlichrut IV/2 891
Stier-Wurz V/2 1199
Stig-Bluama V/1 464
„ -Winde V/3 2080
Stinkad's Gras V/4 2592
Stinkata Hulla IV/2 1064
Stink-Beere IV/2 1064
„ -Bôm IV/2 1064; V/1 344
Stinkbrand VII 142
Stinke-Balsam V/4 2336
„ -Bêre V/1 344
Stinkende Hoffart VI/2 534, 801
Stinkende Hundskamille VI/1 544
Stinkender Hainsalat VI/2 1002
Stinkende Waldnessel V/4 2420
„ Taubnessel V/4 2450
Stinker V/1 344; V/4 2497; VI/2 620
Stinkerich V/1 130; VI/2 758
Stinkerkrut IV/3 1712
Stinkesch IV/2 708
Stinkfulen IV/2 708
Stinkholer IV/2 1064
Stinkholz I 92; IV/2 708
Stinkholz-Gewächse VII 169
Stink-Kraut III 464; V/2 1082; VI/1 445
-Kresse IV/1 81
-Krut VI/2 634
-Potsch VI/1 541
-Rose(n) IV/1 29
-Salat VI/2 1122
-Sierg II 293
-Strauch IV/3 1146
-Strûk IV/2 653
-Wacholder I 92
„ -Wide IV/2 1064; V/1 344
Stirzerln V/3 2086
Stoaköpfla VI/1 288
Stoanagl III 323, 330
Stoan-Federn I 203
Stoan-Mies, Weisses IV/2 583
-Öpfl IV/2 591
-Rösl V/3 1635
„ -Schmälern, Blaue I 268
Stockchrut V/2 1350
Stockererbsen IV/3 1610
Stock-Farn I 37
-Gras I 294
-Heide V/3 1690
-Malve VII 188
-Pfatzer VI/2 1049
-Reps IV/1 254
„ -Rösle V/3 1635
Stockrose V/1 463, 464
, Chinesische V/1 464
„ , Schwarze V/1 464
Stockviole IV/1 443
Stockwinn V/3 2080
Stöfl, Blauer V/3 2199
Stögglas I 363
Stögglitz I 363
Störkeblöme II 293; IV/1 345
Störzeneri VI/2 1061
Stöwkrund VI/2 787
Stoffaleskraut III 477
Stoffel I 309
Stogele II 326
Stohrgras II 31
Stoh up und gah weg V/3 1969
Stoh up und goh hen VI/2 705
Stoklitz I 363
Stollgras I 243
Stolt Hinn'rk III 219
Stolzer Heinrich III 219; IV/2 972; V/2 757, 866; V/3 2194
Stoolruschen II 29
Stopelklii IV/3 1303
Stoppars IV/3 1322
Stoppel-Klai IV/3 1290
-Raiwe IV/1 258
-Rübe IV/1 261

Stoppsloch IV/3 1322
Storaxbaum V/3 1900; VII 197
, Amerikanischer IV/2 656
„ , Orientalischer IV/2 656
Storchablüemli IV/1 345
Storchälseli II 310
Storchblume I 157
Stroche-Kraut II 336
Storchen-Nest V/2 1508
, -Schnäbeli IV/1 345
Stor(ch)eschnäbeli IV/3 1712
Storchschnabel IV/3 1668
, Kleiner IV/3 1703
„ , Stinkender IV/3 1712
Storchsenden II 29
Storken-Kraut II 293
„ -Schnabel IV/3 1712
Storzonerlein VI/2 1061
Stoze(nere) IV/1 245; VI/2 1061
Stradell IV/3 1478
Strähl IV/3 1719; VI/2 817, 821
Strähnenrindenbäume V/2 783, 785
Strämpsen VI/2 961
Stränze V/2 961, 964, 1397
, Grosse V/2 964
„ , Schwarze V/2 964
Sträusseln, Blaue V/3 2114
Strafarn I 37
Stragel IV/3 1402; VII 182 u. Fig. 1142, 1227
, Boden- IV/3 1411
, Dänischer IV/3 1428
, Österreichischer IV/3 1425
, Purpur- IV/3 1429
„ , Tiroler IV/3 1432
Strahle VI/1 281
Strahlen-Pilze VII 135
Strahlensame III 304—307; VII 173
Strahlenzweizahn VI/1 518
Straifling V/3 2086
Strand-Ampfer III 168
„ -Bacille V/2 1225
Stranddistel V/2 979
Strand-Erbse IV/3 1585; VII 183
-Flechtbinse II 33
-Flieder V/3 1882; VII 197
-Gerste I 400
-Hafer I 236, 237, 401
-Heliotrop V/3 1882
-Kamille VI/2 589
-Klee IV/3 1239
„ -Knöterich III 193
Strandling VI/1 194
Strand-Malve V/1 454
-Mastkraut III 383
„ -Melde III 240
Strandnelke V/3 1879, 1882, 1885; VII 19 Fig. 1020
Strandnelkengewächse V/3 1877; VII 197
Strand-Roggen I 401
-Salde I 140
-Salzmelde III 254
-Salzschwaden I 324
Strand-Schwingel I 330
-Tausendgüldenkraut V/3 1971
-Vanille II 376
-Veilchen VI/1 24
-Wegerich VI/1 189
-Weizen I 386
-Winde V/3 2083
„ -Wurzelkraut VI/2 691
Strangamoos I 66
Strassburger IV/1 469
Strauch-Birke III 82; VII 168 Fig. 1208
-Erbse, Indische IV/3 1625
-Fingerkraut IV/2 816
-Kohl IV/1 245
-Margarite VI/2 596
-Pappel V/1 471
„ , Thüringer V/1 472
-Peltschen IV/3 1467
-Scharte VII 212
-Weichsel IV/2 1075
„ -Wicke IV/3 1467
Straussfarn I 12
Strauss-Gilbweiderich V/3 1855
„ -Glockenblume VI/1 338
Straussgras I 222, 225
Straussn V/2 814
Straussweidenkraut V/3 1855
Strau(w)-Blüemli VI/1 456
Strecksâd IV/1 252
Streffelbeere V/3 1669
Streich-Blume VI/2 592
„ -Kraut IV/1 487; V/1 663
Streifenblättler VII 152
Streifenfarn I 25; VII 149
Streifengras I 321
Streiflichgras I 197
Strenze V/2 961, 964
„ , Gelbgrüne V/2 959
Strenz(e)l V/2 1213
Strepbleamen II 245
Streu-Rohr V/2 1333
-Salat VI/2 1120
-Stude III 588
„ -Teufel VI/1 120
Streuepest VI/1 411
Strich-Kraut V/1 663
Strickbeeren V/3 1603
Striemen-Dolde V/2 1046
„ -Samen V/2 1046
Strigelen V/2 1062
Strite V/3 2054
Striten, Gelbe V/3 1852
Stroapfele V/3 2086
Strömpf ond Schüali IV/3 1587
Strohblume V/3 1887; VI/1 469
Garten- VI/1 469
Italienische VI/1 472
„ , Sand- VI/1 471
Strossburgerli IV/1 469
Stroussnägelken III 323
Strublhahn III 531
Strümp V/2 884
Strümpfe V/3 2086
Strüzern VI/1 252
Strukberten IV/2 646
Strumpfe III 557; V/3 2086
Strupfablötsch'n III 171
Strupfä-Blackä III 194
Strupfe III 557; V/3 2086
Strupfenblätter III 173
Strussbohne IV/3 1637
Struukbonne IV/3 1629
Stubbörsch VI/1 517
Stuben-Efeu VI/1 408; VI/2 728
-Huckerle V/4 2334
Stuchablätter I 179
Stude-Chrut III 214
Studentariesla VI/1 414
Studenten II 315
„ -Blom V/3 1913
Studentenröschen IV/2 637
Studentenrösli IV/2 637
Studentenwurz V/1 478
Studentestruch IV/2 639
Stübergras I 294
Stückwuoteln V/2 1508
Stüdler IV/3 1257
Stüpferä VI/2 899
Stüpfi VI/2 817, 901
Stützkelch-Ginster VII 182
Stufer III 72; VI/2 787
Stumpfhosen-Chratzerli VI/1 283
Stunden-Blume V/1 458
„ -Eibisch V/1 458
Stupfate Nuss V/2 884
Stupfleklee IV/3 1331
Stupp I 67
Sturchschnäbel IV/3 1712
Sturlbeer V/3 1681
Sturmhut III 492; VII 174 Fig. 1216
Sturtzeneri VI/2 1061
Sturuchemmi V/2 1017
Stuufsteert VI/1 517
Stuupzu IV/3 1322
Styraxgewächse VII 197
Sublatt IV/1 7
Sublüema, Wildi VI/2 1198
Suchelten VI/1 255
Suchtkraut IV/3 1388
Suckerei VI/2 993
Sucketten VI/1 255
Suddek VI/1 423
Sudeten-Blasenfarn I 11
-Löwenzahn VI/2 1093
-Läusekraut VI/1 122; VII 204 Fig. 1249
Süassling VI/2 1049
Süblacketä III 171
Süchelte VI/1 255
Südbuche VII 168
Südsee-Myrte VII 192
Süecke-Gras II 16
Süerken III 180
Süern III 180
Süertjes III 180
Süessbengel VI/2 1049
Süess-Gras I 198

Süess-Krut VI/2 1049
-Mark VI/2 1049
„ -Räbe IV/1 258
Sügelken V/4 2438; VI/1 258
Sügels V/4 2438; VI/1 258
Süger, Fremda IV/3 1299
„ , Magärä IV/3 1310
Süger(li) IV/3 1331
Sülbern Läpel IV/1 304
Sült(j)e III 254; VI/1 423
Sülver-Krut IV/2 889
„ -Rägen VI/1 212
Sündenkraut VI/1 181
Süppli IV/3 1650
Sürelkes III 180
Sür(en) III 180
Sürkel IV/2 743
Sürken IV/2 743
Sürling III 180
Suermaasch III 180
Süschärlig V/2 1428
Süssdolde V/2 1041
Süss-Erbse IV/3 1615
Süsser Fenchel V/2 1287
Süssgräser I 165; VII 5 Fig. 975 und 153
Süssgras I 318; VI/2 1061; VII 155
„ , Riesen- I 321
Süssholz I 41; IV/3 1453, 1454; V/4 2589
Chinesisches IV/3 1455
Deutsches IV/3 1454
Russisches IV/3 1454
, Spanisches IV/3 1454
„ , Wildes IV/3 1420
Süss-Kirsche IV/2 1078
-Klee IV/3 1484
-Krettich V/2 1042
-Mangrove IV/3 1461
„ -Schnee VII 163
Suessschmale I 238
Süsswurz(el) V/2 1222; VI/2 1061
Süügerle V/4 2438
Sugara V/4 2438
Sugarli V/4 2438, 2441
Sugblom V/4 2438
Suge IV/3 1355
„ -Dissel VI/2 1105
Sugels VI/1 255
Sugerke(s) V/4 2438; VI/1 258
Sugesseli V/4 2438
Sugete V/4 2438
Sugetittkes VI/1 255
Sug(l)er(le) V/4 2438
Sugmaie V/4 2438
Sugneddel V/4 2438
Sugrank VI/1 255
Suinigl V/2 957
Sumach V/1 218
„ -Gewächse V/1 213; VII 186
Summahans V/3 2194
Summasprekeln II 337
Summerpitz VI/2 676
Summertêlechen VI/2 676
Sumpf-Abbiss VI/1 289
-Andorn V/4 2416
-Bärlapp I 66
-Binse II 37, 157
-Bitterklee V/3 1957
-Blumenbinse I 147
-Blutauge IV/2 805
-Brenndolde V/2 1305
-Brustwurz V/2 1345
-Cypresse I 82
-Dotterblume III 459; VII 58 Fig. 1094 e
-Dreizack I 148
-Ehrenpreis VI/1 61
-Farn I 17
-Gänsedistel VI/2 1102
-Gras I 209; II 53
-Haarstrang V/2 1393
-Helmkraut V/4 2510
-Herzblatt IV/2 637
-Heusenkraut V/2 804
-Hornklee IV/3 1372
-Johanniskraut V/1 509
-Kicher IV/3 1582
-Klee, Gehörnter IV/3 1372
-Knabenkraut II 349
-Kratzdistel VI/2 878
-Kresse IV/1 307, 308
-Kreuzkraut VI/2 753
-Krug VII 178
-Labkraut VI/1 221
-Läusekraut VI/1 120
-Löwenzahn VI/2 1092
-Marante VII 164
-Moos VII 145
-Moosbeere V/3 1686
-Petersilie V/2 1393
-Pippau VI/2 1153
-Porst V/3 1623
-Quendel V/2 749
-Rispengras I 317
-Rodel VI/1 120
-Rose V/3 1961; VII 198
-Ruhrkraut VI/1 468
-Schachtelhalm I 58
-Schirm V/2 1147, 1152
-Schnabelgewächse VII 186
-Schraube I 161
-Segge II 120
-Silge V/2 1393
-Sternmiere III 358
-Storchschnabel IV/3 1692
-Straussgras I 225
-Teichfaden I 141
-Veilchen V/1 628
-Vergissmeinnicht V/3 2161
-Wasserfeder V/3 1832
-Wasserlöffelchen V/2 804
-Weichorchis II 391
-Weidenröschen V/2 839
-Wicke IV/3 1582
-Wolfsmilch V/1 150
Sumpfwurz II 374
, Braune II 376
, Grüne II 375
, Weisse II 377
-Zeder VII 151
-Ziest V/4 2416
-Zypresse VII 151
Sunawend-Bleaml VI/2 609
-Kraut III 478
Sûnewentblüer VI/2 609
Sunnabluomä VI/2 1049
Sunnawend-Blumen VI/2 609
„ -Rosen VI/2 609
Sunneblume VI/2 1083
Sunnen-Fürzele IV/2 646
Sunne(n)wirbel(e) VI/1 266; VI/2 1083
Sunnhanf IV/3 1147
Sunnrosen VI/2 609, 818
Suntab IV/2 498
Suppen-Kerbel V/2 1027
-Kräutchen V/4 2282
-Kraut II 223; V/4 2374
Sûr II 53
Sur-Ammerle IV/2 1074
-Ampala III 180
„ -Ampfer III 180
Sûrappel IV/2 743
Sur-Beeri IV/1 7
„ -Chrut III 180
Sure(dampf) III 180
Surhampflete III 180
Surigogger III 180
Surisenf III 180
Sur-Laub IV/1 7
-Mous IV/3 1650
-Ogenblome III 577
Susannl VI/1 59
Susch(w)arta VI/2 898
Sutzler IV/3 1331
Suugtidjen VI/1 120
Suur-Been V/3 1681
-Brod IV/3 1650
„ -Gras II 53
Svinkrut III 191
Swaartgras I 217
Swâden I 319
Swälkeblom V/1 598
Swâengras I 319
Swalkeblöm V/1 619
Swarthawer I 253
Swetsche IV/2 1106
Swiene-Gras I 373; II 155; III 191
„ -Krund V/4 2574
Swiinsbössel II 155
Swinepost III 11
Swinskrüdich VI/2 878
Swörtel II 293
Swojegras I 319
Sykomore III 124; V/1 85
Syringe V/3 1908
Syringsbaum V/3 1915
Syrische Melisse V/4 2302, 2440

T.

Tabak V/4 2616
, Bauern- V/4 2624
, Maryland- V/4 2624
Veilchen- V/4 2624
Virginischer V/4 2622
„ , Wilder III 173; VI/2 712
Tabaks-Bläar VI/2 683
-Blatt VI/2 676
-Blaume VI/2 961
-Blume VI/2 705
„ -Tod VI/1 136
Täbich I 376
Tälle I 98
Tänichrut IV/3 1682
Tänkrallen III 455
Tännel V/1 535; VII 189
, Kreuz- V/1 538
, Wasserpfeffer- V/1 541
-Gewächse V/1 535; VII 189
„ -Kraut VI/1 28
Tännling I 82
Täschelkraut IV/1 116
Täteln V/2 1549
Tätsch VI/1 181
Tätschele IV/1 29
Tätscherli III 279
Täubling VII 142
Tafel-Senf IV/1 205
Tågesch V/3 1926
Tagessle V/4 2438
Tag-Lilie II 204; VII 42 Fig. 1070 und 119 Fig. 1154
-Nelke, Rote III 300
„ , Weisse III 301
-Schläferle III 536
Tag und Nacht VI/1 76
Tag- und Nachtblüemli II 253; V/1 598
Tag- und Nachtblume V/2 866
Nachterli V/1 598
„ „ Nachtveigerl V/1 597
Taler VI/1 102
„ -Kürbis VI/1 315; VII 208
Talgbaum, Chinesischer V/1 120
, Ostafrikanischer V/1 501
„ Westafrikanischer V/1 502
Talstern V/2 961, 964
Tamarinde IV/3 1130
Tamariske V/1 548; VII 189
, Deutsche V/1 548
„ , Manna- V/1 547
Tamariskengewächse V/1 544; VII 189
Tamgras I 217
Tamisch I 376
Tammarg VI/1 276
Tammsleë IV/2 1106
Tampicawurzel V/3 2076
Tangeln I 82
Tangelkraut I 65
Tanggras VII 152
Tank I 141
Tannchua I 85
Tanne I 82, 84; VII 150
Tannen-Bärlapp I 65
-Chnebel VI/2 974
-Klee IV/3 1355
„ -Porst V/3 1623
Tannenwedel V/2 905; VII 106 Fig. 1139
„ -Gewächse V/2 905; VII 192
Tann-Moos V/3 1701
Tappwuttel V/2 1508
Tappurdeln V/2 1508
Tarant V/3 1973
, Blauer V/3 2000
„ , Moor- V/3 1974
Tarateierl VI/1 414
Tarpentill IV/2 882
Tartarischer Buchweizen III 208
Tartuffel V/4 2595
Taschekraut IV/1 364
Taschen IV/2 1056
-Deif IV/1 364
„ -Dieb IV/1 118
Tataren-Lattich VI/2 1130
„ -Meerkohl IV/1 298
Tatarische Melde III 247
Tatarischer Augentrost VI/1 86
Tâterbeere VI/1 258
Taterkorn III 208
Tatsche(n) I 85; IV/1 29
Tatzentürken I 181
Tauara V/4 2457
Tau-Becherl IV/2 962
-Beere V/3 1675
-Beeren, Amerikanische IV/2 774
Taubekreppche IV/1 47
Tauben III 495
-Augen VI/1 309
-Erbse IV/3 1625
-Füssl IV/3 1367
-Fuss, Grosser IV/3 1679
„ , Kleiner IV/3 1681
-Kerbel IV/1 47
-Kröpf, (Blaue) VI/1 372, 378
-Kröpfe(r)l IV/1 47; IV/3 1355, 1367
-Kropf III 279, 307; VI/1 342
-Schnäbel IV/3 1367; V/4 2374
-Spick IV/2 536
„ -Steinbrech IV/2 591
Tauberl im Nest III 495
„ im Schlag III 495
Taubhafer I 361
Taublatt, Portugiesisches IV/2 498
Taubletter IV/2 949, 962
Taubnessel V/4 2438
, Gefleckte V/4 2448
Gelbe V/4 2441
Kleine rote V/4 2450
, Stinkende V/4 2450
„ , Weisse V/4 2445
Tauchflott II 140
Tauern-Blümchen, Kärntner V/3 1977
Tauern-Rösel V/3 1891
Taufern I 100
Tau-Kräutel IV/2 963
„ -Mantel IV/2 962
Taumel-Kerbel V/2 996
Taumelloch I 376
Tau'mwoiz VI/1 79
Tau(n)essle V/4 2438, 2448
Taunnessel V/4 2462
Tauschentkräft V/3 1969
Tauschüsseli IV/2 963
Tausendblättche VI/2 570
Tausendblatt V/2 896
Tausendgüldenkraut V/3 1968
, Echtes V/3 1969
, Strand- V/3 1971; VII 199 Fig. 1240
Tausendknötl III 191
Tausendkorn VII 173
Tausendlöcherlkraut V/1 527
Tausendschön VI/1 414, 415
Tautropfe(n) V/2 1213
Taxenboom I 79
Tee, Grosser V/4 2328
-Blom VI/2 581
-Blü(a)mla VI/2 676
-Blüemli III 542
-Blueme V/3 1750
-Kraut V/3 2214
-Schlüsselblume V/3 1750
„ -Strauch V/1 495
Teevadenteli V/3 1750
Teich-Binse II 28; VII 116 Fig. 1151 und 156
-Faden I 140
-Külben I 112
-Linse II 141
-Rose III 444; VII 174
„ , Gelbe III 445
-Schachtelhalm I 59
-Schaumkraut IV/1 344
-Schilf I 271
-Schlögl I 112
„ -Zapfen I 112
Teklitz I 363
Telegraphenpflanze IV/3 1462
Telekia VI/1 492
Tell VI/2 1114
Tellen I 98
Teller-Blume VI/2 610
-Nägeli II 315
„ -Rübe III 215
Teltower Rübe IV/1 261
Tennengras III 191
Terke VI/1 324
Terling V/2 1548
Terpentinkräutl IV/2 882
Tetschk II 136
Tetschle I 85
Teufelchen II 337
Teufels-Abbiss IV/2 918; VI/1 288
-Anbiss V/3 1782
-Apfel VI/1 314
-Aug(e)n III 596; V/4 2574

Teufels-Bart III 531
-Beer(e) II 276; III 478; V/3 1946; VI/1 252
-Blume VI/2 974, 1083
-Brot II 196
-Dill V/2 1291
-Fleisch IV/3 1303
-Füsschen II 337
-Gückle V/4 2566
-Haar V/3 2090
-Hosenband I 69
-Kirsche(n) V/3 1946; V/4 2566; VI/1 252
-Klaue II 337
-Köpfe V/2 884
-Kralle II 337; VI/1 378, 386
-Kraut V/1 134; VI/1 524
„ , Wildes VI/1 25
-Nadelkissen V/2 694
-Peitschen III 294
-Peterlein V/2 1082
-Pratzen V/2 690
-Rädle VI/1 252
-Reben III 511
-Überstrich IV/2 637
-Wägele VI/1 252
-Wurz II 196; III 495, 503
-Zwirn III 511; V/3 2089, 2090, 2094, 2100; V/4 2562, 2563
Teuferl II 183
Thädel VI/2 993
Thautröpfl III 328
Thee-Köpke V/3 2080
-(Krout) VI/2 570
„ -Krütt VI/2 620
Theerblume III 276
Theeveigerl V/1 598
Thêflider VI/1 237
Theriakwurz V/2 1197
„ , Weisse deutsche V/2 1203
Theriakwurzel V/2 1338
Thränä II 337
Thüringer Fingerkraut IV/2 863
Thymian V/4 2306; VII 200 Fig. 1241
Thymijäönken V/4 2307
Tjark III 418
Tiarli-Bomm V/2 1548
Tidlöaeseke II 313
Tidlötje II 310
Tiekbaum V/3 2236; VII 200
Tiekebäune IV/3 1556
Tieligösken II 313
Tierloose II 313
Tigerlilie II 305
Tiglscheim V/2 1291
Tilauf V/2 916
Tilöschen II 313
Timmelgras I 211
Timothe I 211
Timothegras, Weisses I 238
Timotheusgras I 211
Timothygrosch I 211
Timpenstuten V/2 884
Tinte-Blueme III 481
-Blümli II 257; V/3 2014
-Fässli V/3 2014
-Glogge III 481
Tintenbeere IV/2 1070; V/3 1946; V/4 2566; VI/1 237, 253
Tintenpilz VII 143
Tirkisch Boiz I 178
Tirmatill IV/2 882
Tiroler Labkraut VI/1 220
Mannsschild V/3 1801
Stragel IV/3 1432
„ Windröschen III 524
Tisdälie IV/1 72
Tistle VI/1 281
Titschi-Tätschi VI/1 181
Tittenstuten V/2 884
Tobacksblom VI/2 961
Tobgerste I 376
Tobich I 376
Tochkraut I 376
Todeköpfli II 330
Todtennägele III 335, 338
Töberich I 363
Töchterlisalat VI/1 266
Töni III 459
Törgarosa VI/1 258
Törischgras III 557
Törmlatille IV/2 882
Töwerich I 376
Toiflaugen III 561, 600
Toll-Beere V/4 2566
„ -Docke III 476
Tollebohne II 242
Tollhafer I 376
Tollkerbel V/2 1082
Tollkerschen V/1 130
Tollkirsche V/4 2565, 2566
„ , Kleine II 276
Tollkörbel V/2 1017
Tollkörfel V/2 1082
Tollkorn I 376
Tollkraut I 376; V/2 1082, 1164; V/4 2566, 2569
„ , Krainer V/4 2570
Tollpaun II 242
„ -Rübe V/2 1164
Tomate V/4 2607
Tombeaner Steinbrech IV/2 587
Tondrtistl VI/2 846
Tônessel V/4 2438
Tonilje II 267
Tonka-Bohne IV/3 1497
„ -Gras I 198
Tonkraut I 376
Topf-Greiskraut VI/2 728
„ -Nußbaum VII 191
Topinambur VI/1 514
Toppheide V/3 1708
Toquilo-Palme VII 157
Torf-Beere IV/2 764
-Glanzkraut II 393
-Gränke V/3 1654
-Moose VII 145
Torf-Rosmarin V/3 1652
-Segge II 54
-Spatenblätter I 122
-Veilchen, Bleiches V/1 622
„ -Wollgras II 20
Torkschen Weten I 178
Tormentill IV/2 882, 886
Tort I 363
Toteblümli V/3 2014, 2054
Toten-Blätter V/3 2054
-Blume IV/1 29; IV/2 547; VI/2 799, 801
Tote Nessel V/4 2450
Toten-Kräutel V/1 69
-Kraut V/3 2054
-Myrte V/3 1657
-Strauch VI/1 495
-Traube V/2 1545
„ -Wurzel VI/1 316
Toteveieli V/3 2054
Tournesolpflanze V/1 120
Traben V/2 884
Traber V/2 884
Trad I 388
„ -Schmelen I 228
Trämpsen VI/2 961
Tränen-Eibe VII 150
-Gras I 181
„ -Weide III 56
Träps I 363
Träubchen II 256
Träuble IV/2 649
„ , Schwarze IV/2 653
Träubleschecka, Wilde IV/2 651
Trafausle V/3 1635
Traganth IV/3 1402; VII 182 u. Fig. 1142, 1227
Trapp VII 175
Traspe V/I 363
Trauben-Eiche III 111
-Farn I 44
-Ginster IV/3 1206
-Hafer I 263; VII 154
-Holunder VI/1 240
-Kerrie VII 180
-Kirsche IV/2 1064
-Kohl IV/1 248, 249
-Rapunzel VI/1 368
-Spiere VII 180
-Steinbrech IV/2 591
-Stock V/1 359
„ -Trespe I 365
Traublume II 337
Trauer-Buche III 98
-Fichte I 88
-Iris II 284
-Kiefer I 100
-Klee IV/1 314
-Segge II 85
-Viole IV/1 464
„ -Weide III 56
Trefzge I 363
Treibschnür III 191
Treipekreitchen V/4 2307

Tremisse VI/2 961
Tremse VI/2 961
Trenna III 511
Treps I 363
Trespe I 355, 362
Taube I 361
Tribïol III 573
Trichterlilie II 200
Trichterling VII 142
Trichter-Melisse V/4 2440; VII 203
Trichterschwertel VII 163
Tridig I 398
Triebkraut IV/2 937
Triems VI/2 961
Triestiner Nelke III 329
Trieurwicke IV/3 1547
Bunte IV/3 1552
„ Gelbe IV/3 1545
Triglav-Enzian V/3 2020
„ -Pippau VI/2 1142
Tripmadam IV/2 540
Troad I 388
-Bleaml III 273
-Nagl III 273
-Veigl VI/2 961
Troddelblume V/3 1820
Troldara III 459
Trolla III 536
Trollblume III 459
Troll-Halm I 211
Trommelschlegel I 112; II 132; VI/2 885, 974
Trompeten-Baum VI/1 175; VII Fig. 1243, 1251
-Blume VII 204
-Kaktus V/2 693
„ -Zunge VII 203
Troosnägeli V/3 1635
Tropensporn VII 165
Tropf(en)wurz I 41; V/2 1255
Trüb IV/2 648
Trübli II 256
Trüeb-Chrut III 530; IV/2 909
„ -Würze IV/2 909
Trüffel VII 141
, Falsche VII 143
„ , Weisse VII 141
Trü(l) IV/1 263
Trümmel I 376
Trug-Myrte VII 196
Trulldistel VI/2 899
Trummaschlegel VI/2 944
Trummechnebel VI/2 898, 932, 944, 974
Trummelsschliagala IV/2 937
Trummenstöcke VI/1 183; VI/2 974
Trummeschlegel(i) II 257; VI/2 898
Trumm'lstoch'r III 445
Trummstock VI/1 309
Trumpeschue II 326
Trunkelbeere V/3 1681
Trunkenes I 376
Trunkenkorn I 363
Truosa I 101
Tschemera II 193
Tscherninkl VI/1 74
Tschetschkan IV/3 1546
Tschitschen I 179
Tschobob VI/2 768
Tschotschken IV/3 1502
Tschuppnägeli III 321
Tschurtschen I 85, 179
Tuba-Chnöpfli V/3 1746
„ -Chnopf II 310; V/1 619
Tubädeckel V/1 619
Tubakröhrli(stude) V/2 732; VI/1 252
Tubasblad VI/2 825
Tube-Chnöpf II 247; IV/2 802
-Cholbe II 257
-Chröpfli II 257
-Chropf III 279; IV/2 802
„ -Kropf IV/1 47
Tuberose II 319; VII 163 Fig. 1196
Tubespeck III 279
Tuchkarde VI/1 283
Tübli III 495
Tüetjebeere V/3 1670
Tüfels-Abbiss IV/2 882, 909, 918
-Aug II 329; III 273
-Beeri II 269; IV/2 803; VI/1 253
-Blueme VI/2 1083
-Chnoblauch II 229
-Chrut III 464; V/1 134; V/2 1213; VI/1 128, 133
-Gsichtli V/3 1827
-Milch IV/1 21
„ -Seckeli IV/1 364
Tüfern I 100
Tüffeln V/4 2595
Tüften V/4 2595
Tüpfelfarn I 40; VII 57 Fig. 1091
Tüpfelfarne I 8; VII 148
Tüpfel-Hartheu V/1 526
„ -Stern V/3 1857
Türggä I 178
Türggächorn I 178
Türgga-Fähnli I 179
Türgge-Holz VI/1 242
Türk(e)n I 178; V/3 1844; VI/1 324
Türken-Bohne IV/3 1637
Türkenbund II 236; VII 159 u. Fig. 1085, 1137, 1190
„ -Kürbis VI/1 326
Türken-Mütze V/2 694
„ -Tschurtschen I 179
Türkische Hasel III 71
Kirsche IV/2 1100
Kresse IV/1 78
Melisse V/4 2302, 2361
Weichsel IV/2 1070
„ Wicke IV/3 1564
Türkischer Flachs I 203
Hafer I 254
Türkischer Klee IV/3 1257
Pfeffer V/4 2556
Waz I 178
„ Weizen I 178
Türkisch Gras I 197
Tütebeeren V/3 1670
Tüttebeere V/3 1686
Tûfelsberi V/4 2566
Tuffeln V/4 2595
Tuften V/4 2595
Tulipa IV/1 29
Tulpe II 242; VII 118 Fig. 1153
Tulpenbaum IV/1 13
Tunderrosen V/3 1635
Tuni VII 185
Tunkel I 392
Tunrank VI/1 228
Tûnriche VI/1 228
Tunrîd(er) VI/1 228
Tûnrigge VI/1 228
Tupelogewächse V/2 796; VII 192
Turant VI/2 563
Turbä, Wildä I 363
Turban-Kapsel IV/2 567
-Kürbis VI/1 326
Turbatill IV/2 882
Turd I 376, 383
Turlipana II 242
Turlips IV/1 258
Turmentill IV/2 882
Turmkraut IV/1 393
Turn I 363
Turnetzla-Bomm V/2 1548
Turnips IV/1 258, 261
Turteltübelekrut IV/1 47
Tuschala III 279
Tusighübsch III 262
Tuskarora-Reis I 196; VII 154
Tute, Sau- V/2 1338
„ , Stinkende V/2 1338
Tutele V/2 1333
Tuten V/2 1428
Tuten-Malve VII 188
Tutschk II 136
Tuttelkolbe I 112
Twalch I 363, 376
Twalm I 376
Twelchweizen I 363
Twieback V/1 474
Twill-Andel I 324
Twölfgrotenblume VI/2 601
Tzougras VI/2 1099

U.

Uderump V/4 2377
Ueberich V/2 1428
Ueling, Blaue II 291
Uelle II 235, 313
Uellnblume II 293
Uelm III 118
Ümmergröen V/2 916
Uerbsele IV/1 7
Ueser Hergotts Strömpf ond Schüali IV/3 1367

Ufer-Ehrenpreis VI/1 62
-Reitgras I 234
„ -Segge II 121
Ufertsbluest V/3 1913
Ufer-Winde V/3 2080
Uffarts-Blüemli III 542
Uhrla V/1 262
Uhrradl IV/3 1719
Ukrut I 122
Ulenkwurz VI/1 475
Ulme III 117, 118; VII 168
Ulmengewächse III 117; VII 168
Umläufer VI/1 258
Ummet I 53
Umpele IV/2 768
Umurkn VI/1 321
Umwindling V/3 2086
Umwind'n III 205
Ungarische Grobseide V/3 2104
Kratzdistel VI/2 881
Kugeldistel VI/2 810
Rauke IV/1 176
Silberlinde V/1 434
„ Trespe I 359
Ungarischer Andorn V/4 2398
„ Pippau VI/2 1140
Ungarn-Scharte VI/2 929
Ungerisch Huarakraut IV/3 1196
Unpfennigkraut V/3 1969
Unruhe I 66; V/2 988
Unschulds-Blümchen V/3 2143
„ -Blumen II 235
Unsegenkraut VI/1 410
Unserer lieben Frau Bettstroh VI/1 215
Gras V/1 527
Morkro V/1 527
Nagei V/1 527
„ „ „ Schouala IV/3 1367
Unser Frauen schwarzer Rauch VI/2 553
„ Hergotts-Bartal IV/2 671
U(n)ser-Hergotts-Bireli IV/2 756
Unserhergottsrose III 454
Unserhergottskolbe I 112
Unser lieben Frauen Schühlein IV/3 1236
Unserm Hergott seine Aug'n V/3 2161
„ „ sein Bart IV/2 937
Unsinn I 376
Unter-Artischoke VI/1 514
„ -Kohlrabi IV/1 255
Unvertredn III 191
Unvertritt III 191
Uomol III 146
Upas-Strauch V/3 1951
Uranken II 372
Urle V/1 262, 275
Ur-Moose VII 145
Ur-Schlauchpilze VII 140
Usambara-Veilchen VI/1 177
Usterblummen III 536
Utermanlek IV/2 931

V.

Vadenteli V/3 1746
Vâgelblom IV/1 345
Vagelfoot I 189
Vâgel-Kraud III 192
„ -Krut VI/2 787
Vail IV/1 442
Vajohle IV/1 442
Valander V/4 2274
Vandelli's Steinbrech IV/2 586
Vanille-Heliotrop V/3 2131
Vanillen-Pestwurz VI/2 680
Vanilliblüml II 365
Vaschreikräutl VI/1 352
Vater-Schlüssili V/3 2214
„ und Mueter II 292
Vaterunserli IV/2 627; V/3 2014
Veiel V/1 586
Veigela, Wilde gäle IV/3 1367
Veigele V/3 2014
Veigerl V/1 586
Veigl, Blâbi V/1 587
Veilchen V/1 586; VII 190
Anger- V/1 638
Australisches V/1 594
Dinara- V/1 611
Hain- V/1 635
Hecken- V/1 649
Hügel- V/1 640
Hunds- V/1 619
, März- V/1 649
, Parma- V/1 649
, Puszten- V/1 642
, Russisches V/1 648
Sand- V/1 636
, Sporn- V/1 609
Stein- V/1 636
, Sumpf- V/1 628
Wald- V/1 634
Weisses V/1 645
Wiesen- V/1 638
Wilde V/1 619
Wohlriechendes V/1 649
Wunder- V/1 631
, Zwerg- V/1 625
-Gewächse V/1 585; VII 190
„ -Tabak V/4 2624
Veilote V/1 586
Veits-Blätter VI/2 846
-Distel VI/2 846
„ -Nägele III 335
Venus-Distel VI/2 917
-Fliegenfalle IV/2 498
-Kamm V/2 1037
„ Falscher V/2 1032
-Kicher IV/3 1499
-Nabel IV/2 513
-Nägelchen III 495
„ -Schuh II 326
Verbene, Scharlach- V/3 2240
Verdrussblum V/4 2537
Vereinsnüsschen VII 200
Vergils Aster VI/1 428
Vergissmeinnicht V/3 2159, 2161
Acker- V/3 2170
Alpen- V/3 2166
Berg- V/3 2166
Grosses V/3 2145
Hügel- V/3 2171
Portugiesisches V/3 2145
Sumpf- V/3 2161
Wald- V/3 2166
Weisses V/3 2143
Welsches V/3 2145
(Wildes) VI/1 59
„ -Aster VI/1 434
Vermainkraut V/4 2410
Verneinkraut VII 169
Verschreikraut VI/1 21
Vesen I 391
Vexier-Kescht V/1 301
„ -Nelke III 297
Vielfrüchtler VII 173
Vielgut V/2 1386, 1389
Vierecker I 396
Vierzahn-Moose VII 146
Vietsbohne IV/3 1629
Vigeletten IV/1 469
Vijehlchen, (Wittes) III 522, 528
Vijeli V/1 586
Vijölken V/1 586
Vijoileken, dulle V/1 619
Vijôle V/1 586
Vijôl(e) maternaol(e) IV/1 466
Viöle V/1 586
Viön(d)li IV/1 442, 469; V/1 586
Violetten IV/1 469
Violke IV/1 442
Vipernwurzel VI/2 1061
Virgilie IV/3 1145
Virginia-Zigarrenbaum VI/1 175
Virginischer Tabak V/4 2622
Vital's Goldprimel V/3 1788
Viul V/1 586
Viule matriale IV/1 466
Vizebohne IV/3 1629
Vlinkern I 293
Vögelbeer V/1 345
Vögeleroggen IV/2 536
Vögelichrut VI/2 787
Vögerlsalat VI/1 266
Vogelbeerbaum IV/2 708
Vogelbeer(i) IV/2 803; V/3 1946 VI/1 242
Vogelbir VI/1 242
Vogel-Brod I 293
-Chrut III 146, 192; VI/1 54
-Distel VI/2 787, 1162
-Erbse IV/3 1506
„ -Erbsli 1538
Vogeleskraut III 352
Vogel-Fueter VI/1 181
Vogelfuss IV/3 1475
„ -Segge II 100
Vogel-Gerste I 217
-Heu IV/3 1515, 1529, 1538
-Hirse I 193

Vogel-Kirsch IV/2 708, 1078
-Kläb III 146
-Klaue IV/3 1475, 1477
-Knöterich III 191
-Kopf V/2 725
-Meier III 352
-Miere III 352
-Nest V/2 1278, 1386, 1508
„ , Gelbes V/3 1597
-Nestwurz II 388
-Sâd I 197
„ -Same VI/1 181
Vogelschrut III 352
Vogeltod V/2 1082
Vogelwicke IV/3 1515, 1529, 1538
, Gelbe IV/3 1587
„ , Weisse IV/3 1515
Vogelzok IV/3 1529
Vogelzunge III 205
Vogesengrün V/1 236
Vogl-Gras III 352
-Scharn III 352
„ -Würstl VI/1 181
Voralpen-Klee IV/3 1344
-Kreuzkraut VI/2 737
-Pippau VI/2 1151
-Spindelbaum V/1 254
-Wachtelweizen VI/1 78
„ -Weidenröschen V/2 837
Vorspakraut V/4 2410
Vorwitzcher V/3 1743
Vorwitz(er)chen III 338, 528
Vosperkraut V/4 2410
Vossschwanz I 228
Vossteert I 228; V/2 814
Vossstiät III 262
Voss-Swans, Ro(t)er V/2 757
„ -Tummel I 112
Vuagl-Betzla VI/1 181
„ -Blätzala VI/1 181
Vujehle IV/1 442
Vullekischt, Weiss VI/1 242

W.

Waaterwing V/4 2589
Wabel V/3 1675
Wacha I 211
Wachelduren I 89
Wacherich VI/1 181
Wachhandel I 89
Wachlblat VI/1 181
Wachlich VI/1 181
Wacholder I 89; VII 151 u. 152 Fig. 1180
Wacholdergewächse VII 151
Wachsblume V/3 2067, 2186
Wachs-Esche V/3 1920
-Gurke VI/1 315
„ -Palme VII 156
Wachteldörner I 89
Wachtelweizen VI/1 72, 79
, Acker- VI/1 74
, Bart- VI/1 75
, Böhmischer VI/1 79
Wadn III 15
Wääe III 15
Wäänträämblär VI/1 181
Waechlind V/1 430
Wägali, Breita VI/1 181
Wägnschmerblume III 276
Wägste IV/2 1106
Wägstrüssli VI/2 993
Wähoppen, Willen VI/1 255
Währmüggen VI/2 652
Waelaob IV/2 1018
Wael-Chrut V/2 1213
Wälschä Chlee IV/3 1328
Wälsch-Gras I 197, 261
Wälschi Öpfelblüemli VI/1 536
Wälschkirsche V/2 1548
Wältschi Bohne IV/3 1637
Wändelbeere IV/2 653
Wärmden, (Wilder) VI/2 620, 652
Wäerwind VI/1 255
Wärzechrut IV/2 534
Wäschpeli II 333
Wätzblumen III 557
Wäwinn V/3 2086
Wageleuchte VI/2 993
Wagen-Bleamln VI/2 610
-Rad VI/2 610
„ -Scheibling VI/2 610
Wâgenthransbläder VI/1 181
Wagerich VI/1 181
Wagetrounsaut VI/1 181
Wahmöh VI/2 652
Waid IV/1 192
Wainschalala IV/1 7
Waize I 394
Wake II 29
Wakenblume I 157
Walbite V/3 1675
Walch I 390
Wald-Ahorn V/1 274
-Alpenlattich VI/2 697
-Bart IV/2 671
-Bingelkraut V/1 129
-Blern VI/1 404
-Bluemli III 529
-Cypress I 67
„ -Einsamkraut V/3 1854
Walderbse, Dunkle IV/3 1572
Frühlings- IV/3 1574
Gelbe IV/3 1519
„ , Italienische IV/3 1576
Wald-Erdbeere IV/2 899
-Erdepfl V/3 1844
-Farn I 33; VII 66 Fig. 11co
-Feigel II 372
-Gilbweiderich V/3 1854
-Glock'n VI/1 360
-Glöckchen V/3 1580
-Glöckli III 522
-Haar I 245; II 64
-Haargerste I 401
-Habichtskraut VI/2 1279
-Hahnenfuss III 559
-Haselrausch V/3 1585
Wald-Herre II 229
-Heu II 64
-Hornkraut III 370
-Hundszunge V/3 2148
-Hyazinthe II 372
-Kicher IV/3 1595
-Klee IV/3 1344, 1650
-Klette V/2 957
-Knecke V/2 957
-Knofel II 229
-Korallenwurz II 394
-Labkraut VI/1 209
-Läusekraut VI/1 121
-Lattich VI/2 1127
-Lilie II 372
-Linde V/1 437
-Lorbeer V/2 706
-Männli VI/1 201
-Mandl V/3 1574
-Mangold V/3 1593
-Manna V/1 129
-Mannl(a) VI/1 201
„ -Margritli VI/1 425
Waldmeister VI/1 198; VI/2 1363; VII 207
, Echter VI/1 201
„ , Falscher IV/1 149
Wald-Melisse V/4 2469
-Mirtn V/1 91
-Nägeli III 300
-Nelke, Rote III 300
-Nessel V/4 2420
-Ochsenzung V/3 2212
-Orchis, Einblatt- II 392
-Placke VI/1 404
-Platterbse IV/3 1593
-Quendel V/4 2290
-Rebe III 507, 511
-Röhra V/2 1333
-Röserl V/2 716
-Rösli V/2 814
-Ruhrkraut VI/1 463
-Salbei V/4 2534
-Sanikel V/2 957
-Schachtelhalm I 54
-Schaumkraut IV/1 343
-Schmiele I 245
-Schwaden I 321
-Schwingel I 352
„ -Segge II 110
Waldsnäiglöckchen II 310
Wald-Springkraut V/1 314
Waldsteinie IV/2 927
Wald-Sternmiere III 350
-Storchenschnabel IV/3 1685
-Strick III 511
-Trespe I 356
-Uschla V/4 2374
-Veigerl III 529; V/3 1844
-Veigl V/2 709
-Veilchen V/1 634; V/3 1589
-Vögelein II 379
„ , Rotes II 380
-Wachtelweizen VI/1 80

Wald-Weidenröschen V/2 814
-Wicke IV/3 1526
-Winde V/3 2083
-Winne VI/1 255
-Wurz V/3 1597
-Ziest V/4 2420
-Zweiblatt II 386
„ -Zwenke I 371
Walkerdistel VI/1 283
Walldistl V/2 988
Walliser Flockenblume VI/2 972
Kammschmiele I 283
Schwingel I 333
„ Spreublume VI/2 815
Wallnussholz, Ostindisches IV/3 1123
Wallrüske II 29
Wallwurz V/3 2220, 2223
Walnussartige Gewächse VII 167
Walnussbaum III 6, 7; VII 36 Fig. 1061
Walperkern IV/1 38
Walperkörner IV/1 38
Wals Boon IV/3 1556
Walserli II 365
Walwürze V/3 2223
Wammesknüppel I 112
Wamschknopp VI/2 974
Wandelklee IV/3 1462
Wandflechte VII 144
Wandkraut VII 169
Wandläusekraut V/2 1071
Wandleistengewächse VII 188
Wangerooger Busch V/4 2563
Wann V/3 2086
Wanneboppele VI/2 944
Wanneflicker I 293
Wannepappere VI/2 944
Wanzen-Beere IV/2 653
-Chrut III 478
-Dill V/2 1071
-Gras I 238, 293
-Knabenkraut II 339
-Kraut III 479; IV/3 1712; V/3 1623; V/4 2302, 2469; VII 174
-Same III 251; VII 98 Fig. 1126
Warmke VI/2 652
Warz I 394
Warzakraut IV/2 522
Warzebast V/2 709
Warzen-Grôs IV/2 536
-Kaktus V/2 695
-Kraut IV/1 21; IV/2 536; V/1 134; V/3 2132
-Kürbis VI/1 326
-Pilze VII 142
-Spindelbaum V/1 252
„ -Wolfsmilch V/1 157
Waseblümli VI/1 414
Wâssa-ålbarn III 60
Wasse I 394
Wasserährengewächse VII 179
Wasser-Alm III 60; V/1 285
-Aloë I 102
Wasser-Altn V/1 285
-Ampfer III 171
-Andorn V/4 2384
-Badengel V/4 2530
-Balsam V/4 2344
-Bathenig V/4 2530
-Baum III 60
„ -Bergwurz IV/2 909
Wasserblättler VII 152
Wasserbläuling VII 200
Wasserblattgewächse V/3 2119; VII 200
Wasser-Blume I 151; III 457
-Braunwurz VI/1 32
-Chrös I 122
-Darm III 348
-Dickblatt IV/2 515
-Dost VI/1 401
-Ehrenpreis VI/1 63
-Eppich V/2 1217, 1220
-Falle IV/2 506
-Farne I 47
-Feder V/3 1832
-Fenchel V/2 1265
-Fichte VII 151
-Gamander V/4 2530
-Gläsli V/3 1957
-Glintzerli III 577
-Hafer I 196
-Hahnenfuss III 581, 582
„ -Hanf VI/1 401
Wasserhelmgewächse VI/1 155; VII 205
Wasser-Holler VI/1 244
-Hyazinthe II 143
-Ilge II 293
-Jüling II 293
-Kamillen VI/2 563
-Kerbel V/2 1006
-Kest V/2 884
-Kicher IV/3 1582
-Klette V/2 884
-Knöterich III 197
-Kohlrabe V/2 1167
-Kraut III 576; IV/1 345
-Kresse IV/1 310
-Kressig IV/1 319
„ -Kreuzkraut VI/2 775
Wasserlais VI/1 517
Wasser-Liesch I 157; VII 153
-Lilie, Weisse III 441
-Linsen II 137, 140
-Löffel I 151
„ -Löffelchen V/2 804
Wassermelone VI/1 313
Wasser-Merk V/2 1217
„ , Giftiger V/2 1164
-Münz, Wildi VI/1 487
„ -Nabel V/2 951
Wassernetz VII 138
Wassernuss V/2 882, 884
„ -Gewächse V/2 882; VII 192
Wasser-Pest I 160; VII 153
-Peterle, Grosser V/2 1220
Wasser-Peterli V/2 1006
Wasserpfeffer-Knöterich III 201
„ -Tännel V/1 541
Wasser-Pferd I 157
-Pfiffe(n) V/2 1333
-Pfriemenkresse IV/1 70
-Pfunde VI/1 64
-Portulak V/2 749
-Quirl VII 153
-Räbe IV/1 258
„ -Raute V/2 1255
Wasserrebengewächse VII 187
Wasserreis I 196; VII 154
Wasser-Riemen I 141
Wasserrose III 440
Wasserrosengewächse III 438; VII 173
Wasser-Rübe IV/1 255, 261, 262
-Rutschken IV/2 719
-Säge I 162
-Schafferl V/3 1844
-Schartä VI/2 898
-Schierling V/2 1163
-Schlammkraut VI/1 38
-Schlauch VI/1 162; VII 205 u. 24 Fig. 1042
-Schwaden I 321
„ -Sichel I 163
Wasserstern V/1 190; VII 186
„ -Gewächse V/1 190; VII 186
Wasser-Strauch IV/2 564
-Träger IV/2 963
-Trüffeln V/2 884
-Viole I 157
-Wegerich I 151
„ -Zinken III 449
Wate I 394
Wâter-Blom III 577
„ -Jeern II 155
Water-Lilige II 293
Wateroddik I 151
Water-Ogenbläme III 577
Wâter-Rose III 441
Watteblueme IV/3 1355
Wau IV/1 483, 485, 487; VII 178
Waude IV/1 487
Waugewächse IV/1 48; VII 178
Waugln II 16
Waukraut IV/1 487
Waxlaub V/1 236
Weber-Distel VI/1 283
-Dosten V/4 2295
„ -Karde VI/1 283
Wêbreit VI/1 181
Wechalter I 89
Wechselkölbchen VII 172
Weckbrösele VI/2 801
Wedara, Breita VI/1 181
Wedeldung V/2 998
Wedel, (Roter) V/2 757
Weden III 15
Wëderi VI/1 181
Wederich V/2 757
Wedewinde V/3 2086

Weene III 15
Wêerkômen, (dat verborgene) VI/1 128
Wêgalat, Brâta VI/1 181
Wegbrett III 191
Wegbriädenblader VI/1 181
Wegdistel VI/2 858
Wegerech VI/1 181
Wegerich III 191; VI/1 178, 181; VI/2 1363; VII Fig. 1045, 1076, 1156
Alpen- VI/1 191
Berg- VI/1 186
Sand- VI/1 193
, Schlangen- VI/1 190
Silber- VI/1 185
Spitz- VI/1 183
Strand- VI/1 189
-Gewächse VI/1 178; VII 205
„ -Sandnelke V/3 1894
Wegerste VI/1 181
Wegeträe III 191
Wegetrânenblaume VI/1 181
Wegetrëe VI/1 181
Weg-Gras III 191
-Halter I 89
-Krattler III 191
-Lueger(e) VI/2 993
„ -Manna(kraut) VI/2 993
Wegrad, Brada VI/1 181
Wegram VI/1 181
Weg-Rauke IV/1 164
-Saukraut III 192
-Senf IV/1 164
-Spreite III 191
-Tretter III 191; VI/2 993
„ -Trit VI/2 993; VII 205
Wegwarte VI/2 992, 993, 1036
Weg-Weis VI/2 993
„ -Wiiser VI/2 993
Wehle V/3 1675
Weibelen-Krut III 457
Weiber, Alte V/3 2214
-Kappen III 481
-Krieg IV/3 1222
-Trusch V/3 2194
„ -Zorn IV/3 1200, 1222
Weibische V/4 2357
Weiblicher Waldfarn I 33
Weichorchis II 391
Weichsel IV/2 1070, 1074
„ -Rohr IV/2 1070
Weidblüemli IV/3 1682
Weiddieb VI/1 83
Weide III 13; VII 167
, Asch- III 34
, Bäumchen- III 49
, Blau- III 41
, Bruch- III 20
Gebirgs- III 36
, Grau- III 26; VII 167 Fig. 1205
Korb- III 26
Kraut- III 27
Weide, Kriech- III 32
Lorbeer- III 19
, Mandel- III 21
, Moor- III 33
Myrten- III 48; VII 167
, Netz- III 29
Ohr- III 39
, Purpur- III 23
, Reif- III 24
Sal- III 34
Schwarz- III 43
Silber- III 22
Trauer- III 48
„ , Wilde V/3 1946
Weiden-Alant VI/1 479
-Gewächse II 12, 13; VII 167
-Gras III 200
„ -Lattich VI/2 1125
Weidenröschen V/2 806
Alpen- V/2 848
Bach- V/2 825
Berg- V/2 827
Kies- V/2 821
Sumpf- V/2 839
„ , Wald- V/2 814
Weiden-Seide V/3 2109
„ -Würger V/3 2108
Weiderich V/2 752
, Blut- V/2 757
, Ruten- V/2 756
„ -Gewächse V/2 741; VII 191
Weidminze V/4 2348
Weier-Rose III 441
„ -Ruhr II 31
Weifäke VI/2 1084
Weigelie VI/1 235; VII 44 Fig. 1075
Wei(h)efettig VI/2 1084
Weiher-Federn II 16
-Hörnli V/2 884
-Kraut III 198
„ -Nuss V/2 884
Weihkraut III 161
Weihnachtsrose III 466
Weihrauchbaum VII 185
Weihrauchfarn VII 148
Weihrauchwurz V/2 1244
Weikmann V/2 757
Wein, Wilder V/1 357
„ -Beer IV/2 649
Weinberg-Hyazinthe II 257; V/1 392 Fig. 1934
-Klettenkraut V/3 2139
„ -Lauch II 217
Wein-Birnen IV/2 699
-Bleaml VI/2 801
-Blume III 277; V/2 866; V/3 1913
„ -Espe V/4 2357
Weinichtsbroasma VI/2 617
Wein-Kräutel IV/1 47
-Kraut V/1 69; V/2 866; V/4 2282; VI/2 634
„ -Pflaume IV/2 1109
Weinraute V/1 69; VI/2 634
Weinrebe V/1 363, 365
Weinrose IV/2 1018
-Rut'n, Falsche IV/1 47
-Scharl IV/1 7
-Stock V/1 359
-Träuberl II 256
-Wermuth VI/2 620
„ -Zäpferchen IV/1 7
Weinzekätzchen II 16
Weirakraut III 161
Weischdorn IV/3 1222
Weischta IV/3 1222
Weiss-Ahorn V/1 274
-Arle V/1 275
-Baum IV/2 713, 714; V/2 787
-Birke III 78
-Blätter VI/2 885
-Blume VI/2 610
-Bôm V/1 275
„ -Buche III 66
Weissdorn IV/2 725, 732, 735
„ -Stachelbeere IV/2 642
Weisse deutsche Theriakwurz V/2 1203
Weisseldern V/2 732
Weisse Lilie II 234
Minze V/4 2348
Pestwurz VI/2 693
„ Rade III 301
Weiss-Erle III 89
„ -Esche V/3 1922
Weisse Taubnessel V/4 2445
Weisser Andorn V/4 2394
Weiss(er) Klee IV/3 1302, 1303, 1310
Weisse Rübe IV/1 261
Schafgarbe VI/2 559
Schmele I 198
„ Seide V/3 2099
Weisses Straussgras I 223
Veilchen V/1 645
„ Vergissmeinnicht V/3 2143
Weiss-Haslach VI/1 242
-Kopf V/3 2158
-Kraut IV/1 247; VI/2 661
-Miere III 378
-Minze V/4 2369
-Moos VII 145
-Pappel III 59
-Tanne I 82
-Wurz(el) II 268; V/3 2068; VI/1 511; VII Fig. 1066, 1067
Weisszahn VII 146
Weiten I 394
Weizen I 391, 394
Polnischer I 394
„ , Türkischer I 179
Welche III 15
Welde Weichsel IV/2 1064
Wellerk IV/1 263
Wellsame IV/1 160
Welschbohne IV/3 1629
Welsche Nuss III 7
Welscher Fennich I 193

Welscher Lavendel V/4 2275
Welsches Liebstöckel V/2 1468
„ Vergissmeinnicht V/3 2145
Welsch-Kohl IV/1 247
„ -Korn I 178, 179
Weltheil V/3 2005
Wendeblumenklee IV/3 1319
Wendedocken II 193
Wendelorchis VII 165
Wendich IV/1 189
Wengtergrüen V/3 1669
Wengterwolberte V/3 1669
Wenschmerblume IV/2 615
Wentalagräs I 291
Wepelduurn IV/2 976
Wepeln IV/2 976
Werft-Weide III 34
Werm(er)t VI/2 652
Wermöten VI/2 652
Wermut VI/2 559, 626, 651
Kampfer- VI/2 657
Meer- VI/2 659
Pontischer VI/2 644
Römischer VI/2 644
„ Walliser VI/2 661
Werzwisch VI/2 637
Weschkraut V/4 2328
Wessenkräutel IV/3 1200
Wespe III 146
Westeleholz V/1 249
Weten I 394
Wetter-Bleamel VI/1 59
-Blume V/3 1869
-Distel VI/2 817, 821
-Glöckeln VI/1 352
-Kerza VI/1 16
-Nägele III 298
-Rose V/1 458, 478
„ -Scheberl I 293
Wêwinne V/3 2086
Weyde IV/1 193
Weymouths-Kiefer I 97
Wiaderich(stengel) V/2 1017
Wiägespree III 191
Wiamat, Wilde VI/2 637
Wibelewick III 457
Wibelken IV/2 725
Wibesschuh II 326
Wicheln III 15
Wichrkashe VI/2 818
Wichterkes IV/2 1106
Wicke IV/3 1506, 1546; VII 183
, Afrikanische IV/3 1565
, Blaue IV/3 1529
, Französische IV/3 1554
, Römische IV/3 1554
, Schwarze IV/3 1546
, Spanische IV/3 1564, 1574
Türkische IV/3 1564
„ , Wohlriechende IV/3 1564
Wickelwurz IV/2 566
Wicken, Wille IV/3 1489
Wicken-Stragel, Ungarischer IV/3 1424
Wicklinse IV/3 1512
Wickster IV/3 1222
Wide VI/1 242
„ -Baum VI/1 242
Widerbart II 383
Widerösli V/2 814
Widerruf V/4 2332, 2374; VI/1 445
Widerstoss V/3 1879, 1882
Widertod I 26
Widlesholz V/3 1946
Wie III 15
Wie, Wille V/3 1946
Wiechselen IV/2 1078
Wiechsler IV/2 1078
Wiedbaum VI/1 242
Wiedden III 15
Wiede III 15
Wiedenplanten III 200
Wiederich IV/1 276
Wiederkomm, Goldner VI/2 773
Wiederrîck IV/2 891
Wiefkes, Witte II 307
Wiegenkraut VI/2 651
Wieke III 118
Wielche III 15
Wiele III 511
Wielescha IV/2 708
Wiemelter IV/2 649
Wienachts-Blume III 466
„ -Rose III 466
Wier I 141
Wierbörste VI/1 281
Wieren III 15
-Dungel V/2 1164
„ -Gras I 296
Wierwin(n) III 205; V/3 2086
Wiesachnopf VI/2 944
Wiesä-Aster VI/1 292
Wiesakönkala VI/1 215
-Rappa IV/1 469
„ -Wigga IV/3 1538
Wiesdorn VI/2 901
Wiesen-Alant VI/1 483
-Bärenklau V/2 1427
-Bocksbart VI/2 1048
-Distel VI/2 898
-Flockenblume VI/2 952
-Fuchsschwanz I 217
-Gänsekresse IV/1 403
-Geissbart IV/2 971
-Gelbstern II 211
-Glockenblume VI/1 361
-Glöcklan VI/1 361
-Grind VI/1 83
-Habichtskraut VI/2 1216
-Hafer I 258
„ , Gelber I 248
„ -Hoar I 203
Wiesenkas VI/2 818
Wiesenkerbel V/2 1017
Wiesenkicher IV/3 1587
Wiesenklee IV/3 1331
„ , Weisser IV/3 1302
Wiesenknopf IV/2 935
Wiesenknopf, Grosser IV/2 937
„ , Kleiner IV/2 939
Wiesen-Königin IV/2 971
-Küchenschelle III 538
-Kümmel V/2 1182
-Leinblatt III 157
-Lieschgras I 211
-Lilien II 196
-Pippau VI/2 1162
-Raute III 587, 588; VII 175
„ , Gelbe III 595
-Rispengras I 305
-Salbei V/4 2496
-Schaumkraut IV/1 345; VII 33 Fig. 1055
-Schwingel I 343
-Silge V/2 1295
-Spinat III 270
-Spitzkiel IV/3 1447
-Storchschnabel IV/3 1688
-Veilchen V/1 638
-Wachtelweizen VI/1 79
-Wolf VI/1 83, 120
„ -Wucherblume VI/2 609
Wieskehuolern V/2 1333
Wiess-Enza V/3 1988
Wietruba V/3 1913
Wiewelbône IV/3 1556
Wîfke IV/2 725
Wigste(dorn) IV/3 1222
Wigstle IV/3 1222
Wildä Binätsch III 220
„ Haber I 261
Wilde Basilie V/4 2297
Brustwurz V/2 1333
Burket III 219
Karde VI/1 281
Kicher IV/3 1593
Kröss IV/1 348
„ Malve V/1 481
Wildemannstöck VI/2 920
Wilde Minze V/4 2348
„ Salbei V/4 2496
Wildes Gedenkemein V/3 2144
Ross III 174
Stabwurz VI/2 666
„ Veilchen V/1 619
Wilder Balsam V/4 2346
Bertram V/2 1393
Brein III 225
Dill V/2 1293
Eppich V/2 1393
Fenchel V/2 1287
Gamander V/4 2534
Haber I 363
Hawer I 253
Jager III 531
Kerbel V/2 1017
Knoblauch II 226, 227
Lattich VI/2 1116
Majoran V/4 2328
Reis I 195
„ Rosmarin V/4 2525
Wilder Spinat III 220, 225

Wilder Wein V/1 357
Wilge III 11
Wottelsaot V/2 1017
„ Zwiebel II 196
Wildfräuleinkraut VI/2 555
Wild-Gras I 309
-Haber I 379
-Häschen IV/3 1322
-Hanf V/1 126
„ -Hirs IV/2 671
Wildi Gerstä I 363
„ Pfriesli III 298
Wil(d)mage(n) IV/1 29
Wildniskraut VI/2 648
Wild' Oel IV/1 299
Wild-Rebe V/1 364
-Rose IV/2 976; VII 181
„ , Weisse IV/2 1000
„ -Safran II 196
Wile Kiässen IV/2 1064
Wilge III 11, 15
, Rote V/2 1545
„ , Wilde V/2 814
Wille Eerdbeen IV/2 805
„ Klocken IV/2 915
Willemark III 557
Willen Dönnerluk V/1 163
Flachs II 48
„ Hâwer II 48
Wille Weire III 198
„ Wilgen III 200
Wilmaskraut, Goldenes VI/2 555
„ , Weisses VI/2 555
Wimberi IV/2 649
Wimmele IV/2 649
Wimperfarn I 13; VII 148
Winda III 205
Winde V/3 2078
, Acker V/3 2086
Cantabrische V/3 2085
Grosse V/3 2080
Meerkohl- V/3 2083
Strand- V/3 2083
Ufer- V/3 2080
Wald- V/3 2083
„ , Ziegenfuss- V/3 2077
Windeli V/3 2086
Windelwääe V/3 2086
Winden III 511; VII 199
-Gewächse V/3 2073; VII 199
-Glocke VII 208
„ -Knöterich III 205
Wind-Erbis IV/3 1629
-Habern I 253
-Hafer I 253
„ -Halm I 223, 228
Windlich V/3 2086
Windröschen III 517, 522; VII 88 Fig. 1119
, Dreiblätteriges III 521
Gelbes III 520
„ , Tiroler III 524
Windrose III 522
Windsbock IV/1 287, 288
Winne V/3 2086
Winnenbeere V/3 1681
Winnposch V/3 2086
Winnsbeere V/3 1681
Wintagrüan V/3 1669
Winter-Astern VI/2 594
-Blüemli VI/1 414
-Bluema II 299
-Blueme II 195; III 466
-Bohnenkraut V/4 2284
-Eiche III 111
-Endivie VI/2 998
„ -Feigel IV/1 443
Wintergrün III 146; V/2 916; V/3 1571, 2053; VII 20 Fig. 1024
, Grosses V/3 1583
, Kleines V/3 1577
„ -Gewächse V/3 1568; VII 195
Winter-Hauch II 195
-Kartoffel V/4 2600
-Kohl IV/1 245
-Kresse IV/1 299
-Lauch II 231
-Lein, Römischer V/1 21
-Levkoje IV/1 466
-Lieb V/3 1593; VII 195
„ -Linde V/1 437
Winterling III 472; VII 9 Fig. 987 d
Wintermölken II 16
Winter-Ölrübe IV/1 261
-Rübe V/2 1517
-Rübenreps IV/1 261
-Rübsen IV/1 261
-Saat IV/1 261
-Stern VII 174 u. 9 Fig. 987 d
-Zecken V/3 1669, 1672
„ -Zwiebel II 233
Wintschkerlich V/2 1006
Winzerl VI/1 266
Wipelduurn IV/2 976
Wîpke IV/2 725
Wirbel-Dost V/4 2295
„ -Kraut IV/3 1420
Wiremkraut VI/2 620
Wirmäu VI/2 652
Wirrhabern I 253
Wirrling VII 142
Wirsching IV/1 242, 247
Wirschrut V/3 2158
Wirtel-Fennich I 191
Wirtelgewächse VII 165
Wirz IV/1 246
Wisch VI/2 637
Wischengold V/3 1852
Wise-Nägeli III 298, 300
Wise(n)-Blömli IV/1 345
Wiseschartä VI/2 898
Wispel IV/2 739
„ -Beeren IV/2 1078
Wispen III 146
Wiss-Blakte VI/2 686
„ -Dorn IV/2 725
Wisseküh II 196
Wisselbeeren IV/2 1078
Wisserbs IV/3 1610
Wissetäut V/2 1428
Wiss-Würze II 269
„ -Wurz I 383
Witars I 151
Wit-Büchsen V/3 1750
-Dôren IV/2 725
„ -Lêne V/1 280
Witrich VI/1 181
Witscherling V/2 1164
Witschge IV/3 1222
Witt-Blumenkrud III 577
-Böke III 66
„ -Dän IV/2 725
Witte III 441
„ Gräns IV/2 889
Witten I 238
Flass II 48
„ Hinnerk IV/2 889
Witt-Fötkes III 557
-Huöllern VI/1 244
-Huolern V/1 285
„ -Näbern V/1 285
Witt'n Orand VI/2 563
Witt Wesel IV/1 389
Witt-Weten I 394
„ -Wuartel V/2 1406
Witwenblume VI/1 290
, Acker- VI/1 292
, Jura- VI/1 299
, Monte Baldo- VI/1 294
, Purpur- VI/1 296
, Samt- VI/1 296
Savoyer VI/1 299
Ungarische VI/1 301
„ , Wald- VI/1 300
Wîwinne V/3 2086
Wiwkrud IV/3 1222
Wiwrdäörn IV/3 1222
Woaz I 394
Woazelkraut IV/2 522
Wodanskraut V/3 2132
Wodendung V/2 1164
Wödendunk V/2 1164
Wögrad, G'spizada VI/1 183
Wöllebohne IV/3 1637
Wörkenblom VI/2 652
Wörm(ke) VI/2 652
Wösp III 146
Wöstegrippenholt IV/2 1102
Wohlgemut V/4 2297, 2327, 2328, 2345
, Falscher V/1 527
„ -Kraut V/3 2230
Wohlschmecki V/4 2309
Wohlverleih VI/2 704
„ , Berg- VI/2 704
Woizblöaml III 273
Wolber(ten) V/3 1675
Wolf I 373; VI/1 83, 120
Wolfboss V/2 709
Wolfes-Gelegena VI/2 705
„ -Zeisala VI/2 705
Wolfs-Apfel III 163

Wolfs-Auge V/3 2202, 2203
-Beeren II 276; III 478; V/1 345; V/4 2566, 2589
-Blom V/4 2497
-Blueme III 530, 536
-Blume V/3 2214
-Bohne IV/2 522; IV/3 1148
-Chriasi V/4 2566
-Distla VI/2 874
-Eisenhut III 503
-Fuss V/4 2385
-Klau(en) I 66; V/2 1428
-Kopf VI/1 19
-Kraut III 163; V/4 2389; VI/1 120; VI/2 825
Wolfsmilch V/1 134; VI/2 1036; VII 186 Fig. 1230
Amerikanische V/1 146
Krainer V/1 156
Oesterreicher V/1 149
Ungarische V/1 181
-Gewächse V/1 113; VII 185
Wolfs-Pfote III 536
-Ranke I 66
-Schnörrli VI/1 19
-Schote IV/3 1420
-Trapp V/4 2384
-Wurz(el) III 495, 503; V/2 1017
„ -Zausat III 163
Wolftope VI/1 255
Wolga-Rauke IV/1 167
Wollampfer VII 170
Wollbaumgewächse VII 188
Wolle VI/1 16
„ -Boppele VI/1 292
Wollfaden VII 184
Wollgras II 15, 16
Wollklette, Geflecktblätterige IV/3 1269
„ Gemeine IV/3 1270
Woll-Kratzdistel VI/2 869
Wollkraut VI/1 7; VI/2 1360; VII 203 u. Fig. 1041, 1148, 1244
-Mispel VII 181
-Spinne VII 205
-Stange VI/1 16
„ -Ziest, Deutscher V/4 2424
Wolmuth VI/2 559
Worbeln V/3 1675
Wormken VI/2 652
„ , Willen VI/2 637
Wormkruut, (Wilde) VI/2 620
Worstkreidch V/4 2282
Wostestickenkrout VI/2 620
Wostkrût V/4 2307
Wougnbloama VI/2 610
Wranhanlain II 337
Wrömp VI/2 652
Wrûke IV/1 252, 255
Wubbelken IV/2 725
Wucherblume VI/1 524; VI/2 590, 781
, Dolden- VI/2 614
Wucherblume, Indische VI/2 594
Kronen- VI/2 592
Saat- VI/2 601
„ , Wiesen- VI/2 609
Wülda V/3 1690
„ Haorn III 205
Wüllebluem VI/1 16
Würger VI/1 132; VI/2 1362; VII 21 Fig. 1028
, Weiden- V/3 2108
„ -Enzian V/3 1998
Würglich III 495
Würgling V/2 1082
Würm(ken) VI/2 652
Würmlekraut VI/2 652
Würstchen III 72; VII 73, Fig. 1107
Würstla IV/2 536
Würstli III 72, 194; VI/1 181; VII 73, Fig. 1107
Würz-Kälberkropf V/2 1002
„ -Silie V/2 1161
Wüschi-Gras II 16
Wüsten-Ziest VII 203
Wüt(e)rich V/2 1082, 1164
Wuhlefswurzel III 478
Wuinsekatzen II 16
Wukshbanz I 196
Wul I 384
Wull-Band I 384
Wulla-Bloma VI/1 16
-Gras II 16
-Kerza VI/1 16
-Blüemli VI/2 676
„ -Chle IV/3 1355
Wulle-Chrut VI/1 16
„ -Kârten VI/1 283
Wulle(n)bluem(li) VI/1 16
Wullich VI/1 16
„ -Krut IV/3 1355
Wulskraut IV/1 21
Wulwes-Blaume VI/2 705
„ -Melk V/1 134
Wund-Baum V/3 1926
-Blad VI/1 34
-Chrut, Heidnisch VI/1 409; VI/2 759
Wunder-Baum V/1 120
-Blase V/4 2580
„ -Blume III 266; VII 172
Wunderblumengewächse VII 172
Wunder-Klee IV/3 1245
Wunderstrauchgewächse VII 180
Wunder-Veilchen V/1 631
„ -Weizen I 395
Wund-Fetthenne IV/2 520
Wundklee IV/3 1352, 1355
Wund-Kraut VI/1 409; VI/2 705
-Krout, Heidnisch VI/1 409
„ -Wicke IV/3 1552
Wurmähre VII 148
Wurmet VI/2 652
Wurmfarn I 18
Wurm-Kraut IV/1 160; VI/2 619, 620, 1040
Wurm-Krud VI/2 620
-Lattich VI/2 1040
„ -Samen IV/1 160; VI/2 620, 665
Wurmueth, Wildä VI/2 648
„ , Wissä VI/2 648
Wurmwurz II 388
Wurst-Kraut V/4 2334, 2284
-Krud V/4 2282, 2334
„ -Speiler VI/2 620
Wurteln V/2 1508
Wurzel V/2 1508
-Baum V/2 769
-Petersilie V/2 1158
-Sauger V/3 1597
-Schwimmfarn VII 149
„ -Sellerie V/2 1144
Wutsch(er)lich V/2 1006, 1082
Wutzel I 113
Wuuschpinndörre IV/2 1102
Wyss-Jenzä V/3 1988

Y.

Yams-Bohne IV/3 1624
Yamswurzel II 281; VII 163
Yamswurzelgewächse II 280; VII 163
Ysop V/4 2357

Z.

Zabelroashe II 293
Zacken-Schote IV/1 472
„ -Senf IV/1 473
Zaderey V/4 2282
Zägenbart I 242
Zähnblöcker IV/3 1355
Zäpfchenkraut VII 159
Zaffee V/4 2481
Zaffî V/4 2481
Zagel I 179
Zäglein I 85
Zahn-Blöckerli V/1 598
-Kraut V/4 2574
„ -Lilie II 245
Zahn(n)ickel V/2 957
Zahnstocher-Ammei V/2 1170
Zahntrost VI/1 100
Zahnwehholz V/2 709
Zahnwehkraut VI/1 83
Zah(n)würza VI/1 128
Zahnwurz IV/1 321; V/3 1878
Zahnzunge VII 165
Zallî V/4 2481
Zandelkraut VI/1 536
Zange-Bluma VI/2 570
„ -Kraut, Weiss VI/2 570
Zaniggeli V/2 957
Zapfekorn I 179
Zapfenblume VII 205
Zapfe(n)holz V/1 345
Zapfräbe IV/1 258
Zappeholz V/1 345
Zaslerblume VII 172
Zauberhasel VII 180
Zaubernuss, Virginische IV/2 656

Zaubernussgewächse VII 180
Zaucke II 274
, Wilde II 267, 269
Zaunglocke V/3 2080
Zaunickel V/2 957
Zaun-Kleber VI/1 228
-Riegel V/3 1946
Zaunrübe VI/1 316
Zaun-Seide V/3 2101
-Weide V/3 1946
-Wicke IV/3 1538
Zauzompfer III 180
Zebratute VII 157 Fig. 1184
Zeckelchrud I 163
Zecken VI/2 825
Zeder I 81; VII 151
, Japanische, siehe Cryptomeria
Zedertanne VII 150
Zed(d)erklee IV/3 1255, 1367
Zedrachgewächse V/1 84; VII 185
Zedrele, Asiatische VII 185
Zefog IV/1 242
Zêgenblaume III 522
Zehliperle I 261
Zehniblüemli V/3 1869
Zehr-Kraut V/4 2428
„ -Wurzel II 132
Zeiachrut III 163
Zeiberl IV/2 1106
Zeietli V/2 709
Zeigelgras I 271
Zeiland(er) V/2 709
Zeilandgewächse VII 194
Zeilen-Segge II 62
Zeisigkraut V/3 1869; V/4 2413
Zeitlose II 195; VII 43 Fig. 1074
Zeitlos'n II 195, 299
Zelderie V/2 1142
Zel(e)b, Schmal V/4 2481
Zellenpflanzen VII 135
Zeller(er) V/2 1142
Zellergras III 557
Zellerli V/2 1142
Zellerrich V/2 1142
Zendwehtee V/4 2328
Zenger-(Kraut) III 561
„ -Rosen III 561
Zenserli V/4 2334
Zentgros IV/2 882
Zentralsamige Gewächse VII 171
Zephirblume VII 162
Zerben I 101
Zerinke V/3 1913
Zermstaud'n I 101
Zerr-Eiche III 112
„ -Maukel IV/3 1322
Zessrach I 67
Zette(n) I 100; V/3 1635
Zettergräs I 293
Zeuritzla V/2 709
Zeus-Nelke III 296
Ziadarakraut VI/1 160
Ziaglasbeer VI/2 709
Zibart(l)e IV/2 1106
Zibbel II 232
Zibeke IV/2 1106
Zibele II 232
Ziberli IV/2 1108
Ziberl(ing) IV/2 1106
Zibetbaum, Indischer V/1 489
Zichafleisch III 276
Zichojen VI/2 993
Zichorie VI/2 993
Ziehtûd III 495
Zickelskräutchen V/4 2374
Zidriwurz'n IV/2 547
Ziedrochenkraut IV/2 536
Ziegel-Beere V/2 709
„ -Bluem VI/2 801
Ziegenbart I 373; VI/2 634
Ziegen-Bein VI/2 961
-Dill V/2 1082
-Fichte I 88
-Fleisch IV/2 915
Ziegenfuss-Winde V/3 2077
Ziegenhorn VII 196
Ziegenmekl V/2 814
Ziegen-Raute IV/3 1388, 1574
„ -Würglich III 495
Ziegerkraut IV/3 1233
Zieletebluest V/2 709
Ziereenje V/3 1913
Zieren'n V/3 1913
Zierspark III 426
Ziest V/4 2407
, Acker- V/4 2413
, Alpen- V/4 2422
, Knollen- V/4 2420
, Sumpf- V/4 2416
„ , Wald- V/4 2420
Zigerchrut IV/3 1233; V/4 2351
Zigerli IV/1 345; V/1 474
Zigeuner II 337; VI/1 373
-Blume VI/2 993
-Kraut III 294, 464, 543; V/3 1891
-Lauch II 229
-Salat III 543
-Storchschnabel IV/3 1697
„ -Wurz III 347; V/3 1891
Zigori VI/2 993
Zigufer V/3 2090
Zigurge VI/2 993
Zijabain VI/2 961
Zikojen VI/2 993
Zilander V/2 708
Zilang V/2 709
Zileholz V/2 709
Ziletеblömli V/2 709
Zilinde V/2 709
Zilland V/2 709
Zillibluest V/2 709
Zillingsbeer V/2 709
Zimeli II 16
Zimmer-Calla II 131
-Linde V/1 428
„ -Tännchen VII 50 Fig. 1081
Zimmet-Rösli IV/2 639
Zimmet-Rose IV/2 1046
Zimmt-Baum IV/1 11
-Brombeere IV/2 762
-Erdbeere IV/2 902
Zimpelfi IV/2 547
Zimzamberla V/3 1603
Zinäugl IV/2 963
Zindelkraut V/3 1964
Zingge-Rose VI/1 258
Zinggli II 257
„ Wildi II 337
Zinkkraut V/2 1468
Zinnensaat VI/2 1032
Zinn-Gras I 53
-Heu I 53
-Kraut I 53
Zintalwurz V/3 1988
Zipärle IV/2 1106
Ziperigingis V/4 2282
Zipfelkraut VII 209
Zipolle II 232
Zipollen, Wilde II 253
Zipparte IV/2 1108
Zippel II 232
Zipperleinkraut V/2 1212
Zippersamen VI/2 620
Zirbe I 104
Zirbelkiefer I 104
Zirênchen V/3 1913
Zirinke V/3 1913
Zirmet V/2 1457, 1472
Apulischer V/2 1459
, Echter V/2 1459
Zirschen I 104
Zischbe V/4 2282, 2357
Ziser IV/3 1499
Zisiblüeme VI/2 698
Zisse II 313
Zisserle II 315; V/2 1548
Zistrose V/1 554; VII 189
Zistrosengewächse V/1 552; VII 189
Zitli IV/3 1538
Zitlosa, (Wildi) III 522; V/3 1746
Zitlose II 299, 310; V/3 1743
Zitrenchen V/3 1913
Zitrêne V/3 1913
Zitrönchenbaum V/3 1913
Zitrösli VI/2 676
Zitronat-Zitrone V/1 65
Zitrone V/1 64, 66
„ , Süsse V/1 68
Zitronechrut VI/2 634
Zitronen-Geranium IV/3 1665
-Kraut V/4 2302, 2368
„ -Strauch V/3 2235
Zitrullengurke VI/1 313
Zitrull-Kürbis VI/1 326
Zittelbast V/2 708; V/3 1913
Zitter III 61
-Asp III 61
„ -Blümchen IV/2 627
Zittergras I 292
-Segge II 64

Zitter-Herzl I 292
Zitterink V/3 1913
Zitter-Kraut I 292
„ -Läuse I 293
Zitterle III 61
Zitterlichlee IV/3 1255
Zitter-Linse IV/3 1515
Zitterlischmalä I 292
Zitter-Mändl I 292
Zitterpappel III 59, 61
Zitter-Pilze VII 142
Zitter-Rösli V/3 1743
Zittlose II 195, 313
Zittrachkraut VI/1 160
Zittrichkraut IV/2 635
Zittroch III 61
Zitwersamen VI/2 665
Zitzenfichte I 88
„ -Kaktus V/2 695
Ziweken VI/1 237
Zizali II 16
Zizelsauger VI/1 120
Zizene II 147
Zizerl IV/1 7
Zizerleinsbaum V/1 322
Zizzirose II 315
Zoddelblom III 298
Zöggergras II 32
Zöpferln II 256
Zöpfli(ng) I 53; V/4 2277
Zötte I 100
Zötteligras I 294
Zoglbeer V/3 1681
Zollitsch V/3 1760
Zonalgeranium IV/3 1663
Zorene V/3 1913
Zosimie, Wermutblätterige V/2 1456
Zottach IV/3 1193
Zottel-Blume V/3 1957
-Hosen IV/1 38
-Klee IV/3 1255
-Schmalä I 294
„ -Wicke IV/3 1534
Zotten I 100
Zotternägeli II 315
Zottichtes Gretl III 338
Zottla V/3 2224
Zozelnägeli III 298
Zucker-Ahorn, Deutscher V/1 280
„ , Echter V/1 271
-Beere IV/2 905
-Birke III 75
-Blom V/4 2438
-Blueme V/3 1913
-Blüemli IV/3 1331
-Blumen VI/2 1049
-Ei VI/2 993
-Erbsen IV/3 1610, 1615
-Glocken III 481
-Gras I 211
Zucker-Haferl V/3 2223
-Hüetlin II 257
-Linsen IV/3 1504
-Melone VI/1 320
-Mohrenhirse I 185
-Nettel V/4 2438
-Plätzchenkraut V/1 474
-Rohr I 186
-Rose IV/2 1002
-Rübchen V/2 1222
-Rübe III 215
-Schmale I 238
-Schnuller V/4 2438
-Wurz V/2 1222
„ , Ninsi- V/2 1224
„ -Zöltl V/1 474
Züddek VI/1 423
Zürgelbaum III 121
Züst VI/1 83
Zuffeën V/4 2481
Zuller V/4 2438
Zunder I 100
Zungen-Aster VI/1 448
„ -Tausendschön VI/1 415
Zuntern V/3 1635
Zupfatiballa VI/1 181
Zuppenkraut V/2 1156
Zuruf V/4 2332
Zuzerler V/4 2438
Zwätschge IV/2 1106
Zwalchweizen I 363
Zwangskräutl VI/1 382
Zwanz'gabusch'n IV/1 353
Zwecke I 383
Zweck-Gras I 370, 383
„ -Holz V/1 249; VI/1 252
Zwegwurzel I 383
Zweiblatt II 267, 386
Zweiblattkeimer VII 165
Zwei-Ecker I 397
Zweiflügel-Nussbaum VII 189
Zweisamenlappige Blütenpflanzen VII 165
Zwei-Spitzhafer I 253
Zweizahn VI/1 515
Zwengerl(ing) V/3 1670
Zwencke I 370; VII 106 Fig. 1138
Zwerg-Alpenrose V/3 1644
-Alpenscharte VI/2 836
-Augentrost VI/1 90
-Baldrian VI/1 270
-Birke III 80; VII 168 u. 133 Fig. 1173
-Buchs V/1 91
-Enzian V/3 2020, 2027
-Fingerkraut IV/2 865
-Gelbstern II 212
-Gras I 220
-Hahnenfuss III 553
-Hauhechel IV/3 1219
-Heideröschen V/1 581
Zwerg-Holunder VI/1 236
-Kiefer I 103
-Kirsche IV/2 1072
-Knabenkraut II 361
-Kreuzdorn V/1 337; VII 112 Fig. 1146
-Lein V/1 2
-Mandel IV/2 1085
-Mannsschild V/3 1802
-Miere III 392
-Mispel IV/2 682, 685, 686, 721
„ , Schwarze IV/2 684
-Mutterwurz V/2 1323
-Palme II 130; VII 156
-Pfeffer VII 165
-Pippau VI/2 1146
-Porst V/3 1647
-Rösel V/3 1644
-Rübe IV/1 261
-Ruhrkraut VI/1 466
-Schafgarbe VI/2 558
-Schlüsselblume V/3 1782
-Schneckenklee IV/3 1273
-Schwertlilie II 286
-Seegras I 143
-Wacholder I 91; VII 152 Fig. 1180
-Weichsel IV/2 1072
-Wicke IV/3 1541
„ -Veilchen V/1 625
Zwe(s)bchen VI/1 237
Zwetschge IV/2 1106, 1109, 1110; VII 121 Fig. 1158 u. 182 Fig. 1226 A
Zwickel III 214
Zwickgras I 383
Zwiebel II 232
, Wilde II 196
-Fenchel V/2 1287
-Gras I 261, 309
-Steinbrech IV/2 616
„ -Zahnwurz IV/1 325
Zwifl II 232
Zwilinde V/2 709
Zwillings-Ginster IV/3 1178
Zwilsken VI/1 237
Zwisselsbeeren IV/2 1078
Zwiwecken VI/1 237
Zwiwesden VI/1 237
Zwobbecken VI/1 237
Zwöbbesten VI/1 237
Zwölfjährige Chlee IV/3 1257
Zwöschpn IV/2 1106
Zylander V/2 709
Zymbelkraut VI/1 27
Zyper-Gras II 9
„ -Segge II 58
Zypressen-Heide VII 196
-Nadelhölzer VII 151
-Wolfsmilch V/1 167

6. Kultur-, Nutz-, Arznei- und Zierpflanzen.

a) Nährpflanzen (Getreide, Hülsenfrüchte, Knollen, Zucker usw.).

A.

Acer L. V/1 270, 271
Negundo L. V/1 294
platanoides L. V/1 283
„ Pseudoplatanus L. V/1 280
Adenanthera pavoniana L. IV/3 1126
Adlerfarn I 37
Adzukibohne IV/3 1627
Aesculus Hippocastanum L. V/304
Afzelia Sm. IV/3 1130
Ahorn V/1 270, 271
Akazie, Falsche IV/3 1399
Algarobas-Linse IV/3 1515
Alisma Plantago (L.) Michalet I 151
Alocasia macrorrhiza Schott II 131
Ammer I 393
Angolaerbse IV/3 1624
Apios Moench IV/3 1143
„ tuberosa Moench IV/3 1625
Artischocke V/4 2419
Artischoke, Jerusalem- VI/1 514
Artocarpus Forst. III 124
Astragalus edulis Dur. IV/3 1405
Augenbohne IV/3 1624
Avena sativa L. I 254

B.

Batate V/3 2076/77
Bayerische Rübe IV/1 261
Berg-Ahorn V/1 280
Beta vulgaris L. III 215; VII 74 Fig. 1109 c
Betula lenta L. III 75
„ verrucosa Ehrh. III 79
Bibernell-Rebendolde V/2 1252
Birke III 79
Bockshornbaum IV/3 1132
Bockshornklee IV/3 1233
Bohne IV/3 1631 u. f.
Bohnen, Pythagoraeische III 438
Bromus Mango Desv. I 355
Brotfruchtbaum, Echter III 124
Brotwurzel II 281
Buchweizen III 208
„ Tatarischer III 209
Bunium Bulbocastanum L. V/2 1194
Buntlippe V/4 2272
Butomus L. I 158

C.

Cajanus Indicus Sprengel IV/3 1625
Canavalia ensiformis DC. IV/3 1625
Cassia fistula L. IV/3 1131
Catjangbohne IV/3 1624
Canna edulis Ker-Gawl. II 321
Castanea sativa Mill. III 105; VII 27 Fig. 1050
Ceratonia Siliqua L. IV/3 1132
Chenopodium album L. III 227
„ Quinoa L. III 233
Cicer arietinum L. IV/3 1501
Coix lacryma Jobi L. I 181
Cola vera K. Schum. V 1 492
Coleus Loureiro V/4 2272
Colocasia antiquorum Schott II 131
Conopodium maius (Gouan) Loret et Barrandon V/2 1195
Crataegus Oxyacantha L. IV/2 734
Cycas L. I 73; VII 55 Fig. 1090
Cyperus Papyrus L. II 10

D.

Daris (siehe Sorghum) I 185
Daucus Carota L. V/2 1508; VII 126
Dinkel I 392
Dioscorea L. II 281
„ Batatas Decaisne II 281
Dochan I 194
Dolichos Lablab L. IV/3 1624
Duchn I 194
Durra I 185

E.

Echinodorus rostratus Engelm. I 154
Eddoas Kalo II 131
Edelkastanie III 102, 105; VII 27 Fig. 1050
Einkorn I 389
Elephantenfußpflanze II 281
Elymus arenarius L. I 402
Emmer I 393
Erbse IV/3 1614 u. f.
Erbsenbohne IV/3 1625
Erdapfel V/4 2602; VI/1 514
Erdbirne VI/1 515; IV/3 1625
Erd-Eichel IV/3 1593
Erderbse IV/3 1624
Erdkastanie V/2 1194
„ Französische V/2 1195
Erdmäuse IV/3 1593
Erve, Einblütige IV/3 1515
Eryngium campestre V/2 976
Eschen-Ahorn V/1 294
Eucalyptus L'Hérit. V/2 782

F.

Fagopyrum esculentum Moench III 208
Tataricum Gaertn. III 209
Faselbohne IV/3 1624
Fegimaura Africana Pierre V 80
Feigenbaum III 124
Fettbohne IV/3 1620
Feuerbohne IV/3 1637
Fennich, Welscher I 194
Ficus L. III 124
Flügel-Yams II 281
Folliculigera graveolens Pasqual IV/3 1233
Fraxinus Ornus L. V/3 1925 VII 198 Fig. 1238
Fritillaria imperialis L. II 240
Froschlöffel I 151
Futter-Wicke V/3 1550

G.

Gänse-Fingerkraut IV/2 891
Gänsefuß, weißer III 227
Gänserich IV/2 891
Gartenbohne IV/3 1627, 1631 u.f.
Geranium L. IV/3 1672
Geranium dissectum L. IV 3 1682
Gerste I 397
Ginkgo biloba L. I 74
Gleditschia triacanthos L. IV/3 1129
Glossostemon Brugueri Desf. V/1 492
Glyceria fluitans R. Br. I 319
Glycine hispida (Moench) Maxim. IV/3 1620
Grundnessel I 160

H.

Hafer I 254
Hahnensporn V/4 2272
Heidekorn III 208
Helianthi VI/1 509
Helianthus annuus L. VI/1 512
giganteus L. I 508
strumosus L. I 509
„ tuberosus L. VI/1 515
Helmbohne IV/3 1624
Hirse, Echte I 188
Hordeum L. I 397
Hydrilla L. C. Rich I 160

6. Kultur-, Nutz-, Arznei- und Zierpflanzen

Seite 470—528

	Seite
a) Nährpflanzen	470
b) Obst	472
c) Gemüsepflanzen, Salate usw.	475
d) Genußmittel, Gewürze	478
e) Oelpflanzen	482
f) Pflanzen, die Farb- u. Gerbstoffe, Gummi, Harz u. dgl. liefern	485
g) Faser-, Geflecht- und Gespinstpflanzen	488
h) Nutz- und Handelshölzer	490
i) Futter- und Düngerpflanzen	493
k) Arznei-u. Giftpflanzen	498
l) Zierpflanzen	510

Vererbungslehre und Erbgesundheitspflege

Einführung nach methodischen Grundsätzen. Von Studienrat **Dr. J. GRAF.** Mit 4 Tafeln und 54 Abbildungen. 1930. Geh. Mk. 6.75, gebd. Mk. 8.—.

„Bei der ungeheuren Bedeutung, die die Vererbungswissenschaft sowohl für das Leben des einzelnen wie für die Fortentwicklung unseres ganzen Volkes besitzt, ist es für jeden Lehrer notwendig, die auf dem Gebiete der Erziehung liegenden Bildungswerte des neuen Wissenszweiges kennen und die erbbiologischen Zusammenhänge im Familien und Volksleben verstehen zu lernen. Das Studium des klar geschriebenen und mit Abbildungen gut ausgestatteten Buches ist hierfür vorzüglich geeignet."

(Schulbote für Hessen.)

J. F. LEHMANNS VERLAG / MÜNCHEN 2 SW

I.

Igelschlauch I 154
Igname II 281
Inocarpus edulis Forst. IV/3 1497
Ipomoea Batatas Lam. V/3 2076/7
Irvingia Gabonensis Baill. V/1 80

J.

Jack-Brotfruchtbaum III 124
Johannisbrotbaum IV/3 1132

K.

Kaiserkrone II 240
Kakao V/1 491
Kanariengras I 197
Karobenbaum IV/3 1131
Kartoffel V/4 2602/3
Chinesische II 281
, Süsse V/3 2076/77
Kastanie, Echte III 105; VII 27 Fig. 1050
Kicher, Deutsche IV/3 1606
„ Wilde IV/3 1601
Kichererbse IV/3 1501
Kleefarn I 48
Knollen-Baselle III 267
-Kartoffel V/4 2419
Kolanuss V/1 492
Kolbenhirse I 194
Kongoerbse IV/3 1625
Korn I 389
Kuhbohne IV/3 1623
Kuhhornklee IV/3 1233
Kukurutz I 180; VII 41 Fig. 1068
Kundebohne IV/3 1623

L.

Lablabbohne IV/3 1624
Langbohne IV/3 1623
Lathyrus pratensis L. IV/3 1589
sativus L. IV/3 1606
silvester L. IV/3 1601
„ tuberosus L. IV/3 1593
Lens culinaris Medikus IV/3 1505
Leontodon tuberosus L. VI/2 1017
Lewisia rediviva Pursh III 268
Linse IV/3 1505
Linsenbohne IV/3 1627
Linse, Spanische IV/3 1515
„ , Zottige IV/3 1517
Löwenzahn VI/2 1017
Lupine, Weiße IV/3 1154
Lupinus L. IV/3 1152
„ albus L. IV/3 1154
Luzerne IV/3 1263

M.

Mais I 180; VII 41 Fig. 1068
Mandubierbse IV/3 1624
Mangold Adans III 215
Manihot V/1 119
Manna IV/3 1131
Manna-Esche V/3 1925; VII 198 Fig. 1238
Mannaschwaden I 319
Marsilia Baumg. I 48
Medicago sativa L. IV/3 1263
Möhre V/2 1508; VII 126
Mohrenhirse I 185
„ , Zucker- I 185
Mohrrübe V/2 1508
Mondbohne IV/3 1628
Mungobohne IV/3 1627

N.

Negerhirse I 194
Nelumbium speciosum Willd. III 438
Nelumbo nucifera Gaertn. III 438
Neomammillaria V/2 683

O.

Oenanthe Californica S. Watson V 2 1251
pimpinelloides L. V/2 1251
„ sarmentosa V/2 1251
Oryza sativa L. I 195
Oxalis L. IV/3 1647

P.

Pachyrrhizus bulbosus (L.) Britton IV/3 1624
Panicum miliaceum L. I 188
Pastinaca sativa L. V/2 1414
Pennisetum typhoideum Rich. I 194
Pentaclethra macrophylla Benth. V/1 80
Pfeilkraut I 156
Pferdebohne IV/3 1559
Phalaris Canariensis L. I 197
Phaseolus L. IV/3 1627
coccineus L. IV/3 1639
lunatus L. IV/3 1628
„ vulgaris IV/3 1631 u. f.
Pisum sativum L. IV/3 1614 u. f.
Platterbse, Gelbe IV/3 1589
Plectranthus L'Hérit. V/4 2272
Potentilla Anserina L. IV/2 891
Prosopis L. IV/3 1126
Psoralea L. IV/3 1143, 1384
Pteridium aquilinum Kuhn I 37
Pueraria hirsuta (Thunbg.) C. K. Schneider IV/3 1625
„ tuberosa DC. IV/3 1625
Puffbohne IV/3 1559

R.

Rauh-Birke III 79
Reis I 195
Reismelde (Chenopodium Quinoa L.) III 233
Rispenhirse I 188
Robinia Pseudacacia L. IV/3 1399
Röhrenkassie IV/3 1131
Roggen I 389; VII 39 Fig. 1065
Rohrkolben I 111; VII 134 Fig. 1173 B, C
Rohrkolben-Hirse VII 154
Roßkastanie, Gemeine V/1 304
Rübe, Gelbe V/2 1501; VII 126
Runkelrübe III 215; VII 74 Fig. 1109 c

S.

Saathafer I 254
Saat-Platterbse IV/1 1606
Saccharum officinarum L. I 186
Sagittaria sagittifolia L. I 156
Salsifis VI/1 509
Sandhafer I 402
Saubohne IV/3 1559
Sauerklee IV/3 1647
Schildkrötenpflanze II 281
Schizoglossum E. Mey. V/3 2064
Schlitz-Storchschnabel IV/3 1682
Schraubenbohne IV/3 1126
Schwabenkorn I 392
Schwanenblume I 158
Schwarzwurzel VI/2 1061
Scorzonera Hispanica L. VI/2 1061
Secale cereale L. I 389; VII 39 Fig. 1065
Sesampflanze VI/1 176
Sesamum Indicum L. VI/1 176
Setaria Italica (L.) Pal. I 194
Silberkraut IV/2 891
Silberregen IV/3 1399
Sium Sisarum L. V/2 1224
Soja-Bohne IV/3 1620
Solanum tuberosum L. V/4 2602/3
Sonnenblume VI/1 512
Sorbus Aria (L.) Crantz IV/2 713
, Chamaemespilus (L.) Crantz IV/2 723
Sorghum cernuum Host I 185
saccharatum Pers. I 185
„ vulgare Pers. I 185
Spargelbohne IV/3 1624
Spelz I 392
Spitz-Ahorn V/1 283
Stachys paluster L. V/4 2418
„ Sieboldii Miq. V/4 2419
Stenostelma Schlecht. V/3 2064
Storchschnabel IV/3 1672
Strandhafer I 402
Strandroggen I 402
Straucherbse, Indische IV/3 1625
Sumpfziest V/4 2418
Symphytum L. V/3 2221

T.

Tacca pinnatifida Forst. II 320
Tahiti-Pfeilwurz II 320
Tarro II 131
Taubenerbse IV/3 1625
Testudinaria elephantipes Salisb. II 281
Theobroma Cacao L. V/1 491
Topinambur VI/1 514
Tränengras I 181
Trapa L. V/2 883
Trapa natans L. V/2 892
Treculia Decaisne III 124

Trifolium repens L. IV/3 1306
Triglochin procera R. Br. I 147
Trigonella Foenum graecum IV/3 1233
Triticum dicoccum Schrank I 393
monococcum L. I 393
Polonicum L. I 394
Spelta L. I 391
„ vulgare Vill. I 395
Tropaeolum L. IV/3 1729
Typha L. I 111; VII 134 Fig. 1173 B, C

U.

Ullucus tuberosus Loz. III 267

V.

Vicia articulata Hornem. IV/3 1515
Faba L. IV/3 1559
Vicia hirsuta S. F. Gray IV/3 1517
„ sativa L. IV/3 1550
Vigna Savi IV/3 1623
Voandzeia subterranea Thouars IV/3 1624
Vogelhirse I 194
Vogelwicke, Gelbe IV/3 1589

W.

Wallwurz V/3 2221
Wassernuß V/2 883, 892
Weiß-Birke III 79
Weißdorn IV/3 734
Weiß-Klee IV/3 1306
Weizen I 394, 395, 396
Polnischer I 394
„ , Welscher I 395
Welschkorn I 180; VII 41 Fig. 1068
Wiesen-Kicher IV/3 1589
Wiesenklee, Weißer IV/3 1306
Wolfsbohne IV/3 1152

Y.

Yamsbohne IV/3 1624
Yamswurzel II 281

Z.

Zea Mays L. I 180; VII 41 Fig. 1068
Ziest V/4 2408
Zitterlinse IV/3 1517
Zucker-Birke III 75
Zucker-Mohrenhirse I 185
Zuckerrohr I 186
Zuckerrübe III 215, 216
Zuckerwurz V/2 1224
Zwergmispel IV/2 723
Zypergras II 10

b) Obst (Beeren-, Kern-, Schalenobst, Nüsse, Südfrüchte usw.).

A.

Acanthopanax ricinifolius Sem. V/2 913
Achras Sapota L. V/3 1896
Ackerbeere IV/2 803, 804
Adansonia L. V/1 489
Affenbrotbaum V/1 489
Ahlbeere IV/2 653
Albizzia lucida Benth. IV/3 1123
Amarelle IV/2 1075, 1076
Ambelania acida Aubl. V/3 2051
Amelanchier ovalis Medikus IV/2 759
Anacardium Occidentale L. V/1 216
Ananas-Erdbeere IV/2 896
Ananaskirsche V/4 2579
Ananas sativus Lindl. II 143 I/CLII Fig. 286 e
Anisophyllea laurina R. Br. V/2 769
Anona L. IV/1 15
Antidesma venosum L. V/1 120
Apfelbaum IV/2 745 u. f.
Apfelsine V/1 61
Apfel-Rose IV/2 1008
Apfelsine V/1 61
Aprikose IV/2 1098
Aprikosen-Jambuse V/2 779
Araça de Praya V/2 776
Arachis hypogaea L. IV/3 1464; VII 60 Fig. 1096
Arbutus Unedo L. V/3 1666
Aristotelia Maqui L'Hérit. V/1 426
Arve I 105
Asimina triloba Dun. IV/1 14

B.

Balanites Aegyptiaca Delile V/1 41
Banane II 320
Baumhasel III 71
Berberis vulgaris L. IV/1 8
Berberitze IV/1 8
Bertholletia excelsa Humb. et Bonpland V/2 768
Birnbaum IV/2 695 u. f.
Blaubeere V/3 1679
Blighia sapida Kön. V/1 307
Bluthasel III 71
Blutnuß III 71
Bockbeere IV/2 803, 804
Bockshornbaum IV/3 1132
Brachystelma R. Br. V/3 2064
Brestling IV/2 907
Britoa Sellowiana Berg V/2 776
Brombeere IV/2 774
„ , Armenische IV/2 774
Bunchosia Rich. V/1 86
Butternuss III 7
Byrsonima Rich. et Juss. V/1 86

C.

Cactus V/2 687, 689
Calophyllum L. V/1 500
Calypthranthes Swartz V/2 777
Campomanesia Ruiz et Pav. V/2 776
Canarium L. V/1 83
Carnegiea gigantea (Engelmann) Britton et Rose V/2 691
Carpotroche Endl. V/1 656
Carya Nutt. III 7
Casimiroa Llav. et Lex. V/1 53
Castanea sativa Mill. III 102; VII 27 Fig. 1050
Celtis australis L. III 123
Cephalocereus polylophus Britton et Rose V/2 683
Ceratonia Siliqua L. IV/3 1132
Cereus quisco Remy V/2 683
Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. IV/2 693
Chile-Erdbeere IV/2 896
Chrysobalanus Icaco L. IV/2 667
Chrysophyllum L. V/3 1896
Citrullus Colocynthis Schrader VI/1 314
Citrullus vulgaris Schrader VI/1 314
Citrus Aurantium L. subsp. amara Engler (Pomeranze) V/1 59 f.; VII Fig. 1078, 1093
„ L. subsp. decumana Thellung V/1 64
L. subsp. Japonica Hook. V/1 64
L. var. myrtifolia V/1 64
„ L. var. Sinensis Gall. V/1 61
medica L. var. lageniformis Roemer V/1 65
„ L. var. macrocarpa V/1 65
„ nobilis Lour. V/1 59
Clausena Wampii Bl. V/1 54
Cordia L. V/3 2124
Cornus L. V/2 1541
„ mas L. V/2 1552
Corylus Americana Walt. III 74
Avellana L. III 73; VII Fig. 1105, 1107, 1118
colurna L. III 71, 74
maxima Mill. III 71, 74
„ rostrata Ait. III 74
Couma Aubl. V/3 2051
Crataegus azarolus L. IV/2 730
„ Oxyacantha L. IV/2 734
Cydonia oblonga Mill. IV/2 690
Cyphomandra betacea Sendtn. V/4 2559

D.

Dattelpflaume V/3 1898
Dillenia Indica L. V/1 494

Diospyros Dalech. V/3 1898
„ Lotus L. V/3 1899
Dirlitze V/2 1552
Doryalis Arn. et E. Mey. V/1 656
Dracontomelon Bl. V/1 217
Durio zibethinus L. V/1 489

E.

Eberesche IV/2 709
Edelnuß III 9; VII 36 Fig. 1061
Eiche III 107
Eierpflanze V/4 2587
Elaeagnus L. V/2 730, 731
Elefantenläuse V/1 216
Elsbeerbaum IV/2 721
Empetrum nigrum L. V/3 1607
Erdbeerbaum V/3 1666
Erdbeere IV/2 896/7; VII 84 Fig. 1117
Erdnuß IV/3 1464; VII 60 Fig. 1096
Eriobotrya Japonica Lindl. IV/2 664
Esrog V/1 65
Euclea L. V/3 1897
Eugenia L. V/2 779, 780

F.

Feigenbaum III 124, 125
Feigenkaktus V/2 689
Felsenbirne IV/2 759
Felsen-Johannisbeere IV/2 651
-Kirsche IV/2 1070
Feronia elephantum Correa V/1 54
Feuerbusch IV/2 693
Ficus L. III 124
„ Carica L. III 124, 125
Filzapfel IV/2 747
Flacourtia V/1 656
Fluhbirne IV/2 759
Fragaria L. IV/2 896/7
-Bastarde IV/2 907
moschata Duchesne IV/2 904
vesca L. IV/2 900; VII 84 Fig. 1117
Fusanus acuminatus R. Br. III 151

G.

Garcinia L. V/1 501, 502
Gartenbrestling IV/2 896
Gaylussacia resinosa Torr. V/3 1622
Glaskirsche IV/2 1076
Gomidesia Berg V/2 777
Granatapfelbaum V/2 764
Grewia L. V/1 429
Grossularia vulgaris Spacht IV/2 646, 647
Guajava V/2 775
Guman V/776

H.

Haferpflaume IV/2 1108
Haferschlehe IV/2 1108
Hagebutte IV/2 989
Halbkirsche IV/2 1084
Halbweichsel IV/2 1084
Hasel, Türkische III 71
Haselnuß III 72, 73; VII Fig. 1105, 1107, 1118
Heckenrose IV/2 989
Heidelbeere V/3 1679
Hickory-Nuss III 7
Hickorynussbaum VII 167
Hicoria Raf. VII 167
Himbeere IV/2 770
Hippophaë rhamnoides L. V/2 740
Holunder, Roter VI/1 240
Schwarzer VI/1 239
„ , Trauben- VI/1 240
Hornstrauch V/2 1541, 1548
Hügel-Erdbeere IV/2 907
Hundsrose IV/2 989
Hylocereus V/2 683

I.

Impatiens L. V/1 313
Inga Willd. IV/3 1123
Irvingia Hook. V/1 80

J.

Johannis-Apfel IV/2 747
Johannisbeere IV/2 643; VII 180 Fig. 1225
Felsen- IV/2 651
Rote IV/2 649, 650
Schwarze IV/2 653
„ , Weisse IV/2 649
Johannisbrotbaum IV/3 1132
Judenkirsche V/4 2582
Juglandaceae III 7
Juglans cinerea L. III 7
nigra L. III 7
regia L. III 9; VII 36 Fig. 1061

K.

Kaktusfeige V/2 689
Kamtschatka-Rose IV/2 994
Karobenbaum IV/3 1132
Kartoffelrose IV/2 995
Kaschunüsse V/1 216
Kastanie, Echte III 102; VII 27 Fig. 1050
Kavika V/2 779
Kirsche IV/2 1080, 1084
Knackbeere IV/2 907
Knackmandel IV/2 1088
Knorpelbeere IV/2 907
Koloquinte VI/1 314
Kornelkirsche V/2 1552
Krachmandel IV/2 1088
Krähenbeere V/3 1607
Krannbeere V/3 1685
Kratzbeere IV/2 803, 804
Kreuzdorn V/1 329

L.

Lacmellia edulis Karst. V/3 2051
Lambertshasel III 71
Lambertsnuß III 71
Lecythis L. V/2 768
Lemaireocereus V/2 683
Litchi Chinensis Sonn. V/1 307
Lotospflaume V/3 1899

M.

Maba maior G. Forst V/3 1897
Malay-Apfel V/2 779
Malpighia L. V/1 86
Malus communis Lam. IV/2 745 u. f.
Mammea L. V/1 500
Mandarine V/1 59
Mandelbaum IV/2 1087
Mangifera Indica L. V/1 215
Mangobaum V/1 215
Marille IV/2 1098
Marlierea Camb. V/2 777
Maulbeerbaum, Roter III 128
Schwarzer III 130
„ , Weisser III 129
Mehlbeerbaum IV/2 716
Melastomataceen V/2 795
Melicocca bijuga L. V/1 307
Mespilus Germanica L. IV/2 740, 741
Mirabelle IV/2 1108
Mispel, Echte IV/2 740, 741
Italienische IV/2 730
Japanische IV/2 664
„ Welsche IV/2 730
Mittelmeer-Brombeere IV/2 785
Möhre V/2 1501; VII 126
Moltebeere IV/2 766
Momordica Charantia L. VI/1 315
Morelle IV/2 1076
Morus L. III 127
alba L. III 129
nigra L. III 130
„ rubra L. III 128
Moschus-Erdbeere IV/2 904
Moutabea Aubl. V/1 87
Musa paradisiaca L. II 320
Muskateller-Erdbeere IV/2 904
Myrceugenia apiculata Niedenzu V/2 777
Myrcia DC. V/2 777
Myrrhinium Schott V/2 776
Myrte, Echte V/2 791
Myrteola Berg V/2 775
Myrtillocactus geometrizans Console V/2 683
Myrtus communis L. V/2 791

N.

Nachtschatten V/4 2587/8
Neomammillaria Britton et Rose V/2 683
Nitraria Schoberi L. V/1 41

O.

Ochrocarpus Thouars V/1 500
Oelbaum V/3 1943
Olea Europaea L. V/3 1943

Oncoba Forsk. V/1 656
Opuntia (Tournef.) Mill. V/2 683, 688, 689
Orange V/1 59; VII Fig. 1078, 1093
Oxycoccus macrocarpus Pursh V/3 1685
quadripetalus Gilibert V/3 1689

P.

Paradies-Apfel IV/2 747
Passiflora L. V/1 658
Peireskia Mill. V/2 683, 687
Pentadesma butyraceum V/1 502
Periploca L. V/3 2064
Persea gratissima Gaertn. IV/1 11
Pfersing IV/2 1091/1096
Pfirsich IV/2 1091/1096
Pflaume IV/2 1107, 1109, 1110, 1112
Phyllocactus anguliger Lem. V/2 683
Physalis Alkekengi L. V/4 2582
„ Peruviana L. V/4 2579
Pimpernuß V/1 231
Pinus Cembra L. I 105
Pirus L. IV/2 695
communis L. IV/2 698, 699, 700, 701
Pistacia L. V/1 231
Platonia Mart. V/1 502
Podophyllum L. IV/1 5
Pomeranze V/1 59; VII Fig. 1078, 1093
Preisselbeere V/3 1673
Prunus Amygdalus Stokes IV/2 1087
Armeniaca L. IV/2 1098
avium L. IV/2 1079, 1080
-Bastarde IV/2 1084
Cerasus L. IV/2 1075
domestica L. IV/2 1107, 1109, 1110; VII Fig. 1158, 1226 A
fruticosa Pallas IV/2 1074
Mahaleb L. IV/2 1070
nana Stokes IV/2 1086
Persica Sieb. et Zucc. IV/2 1091/1096
Psidiopsis Moritziana Berg V 776
Psidium L. V/2 776
Pumpelmus V/1 64
Punica Granatum L. V/2 764

Q.

Quercus L. III 107
Quitte IV/2 690
„ , Japanische IV/2 693
Quittenbaum, Wilder IV/2 693

R.

Rebstock V/1 365
Reineclaude IV/2 1109
Rhamnus L. V/1 329
Rheedia L. V/1 501
Rhodomyrtus tomentosa Wight V 776
Ribes L. IV/2 643
alpinum Delarbre non L. IV/2 651; VII 180 Fig. 1225
Grossularia L. IV/2 643, 646, 647
nigrum L. IV/2 643, 653
petraeum Wulfen IV/2 643, 651
rubrum (L.) em. Jancz. IV/2 649, 650
Riesen-Erdbeere IV/2 896
Rosa L. IV/2 989
rugosa Thunberg IV/2 995
„ villosa L. IV/2 1008
Rose, Weichhaarige IV/2 1008
Rosinen V/1 414
Rosspflaume IV/2 1108
Rubus Arcticus L. IV/2 767
Armeniacus Focke IV/2 774
bifrons Vest IV/2 774, 785
caesius L. IV/2 774, 803, 804
Chamaemorus L. IV/2 766
fruticosus L. IV/2 771
Idaeus L. IV/2 770
laciniatus Willd. IV/2 774
ulmifolius Schott IV/2 774, 785
Ruhrbirne IV/2 721
Runzel-Rose IV/2 994

S.

Sageretia Brogn. V/1 324
Sambucus nigra L. VI/1 239
„ racemosa L. VI/1 240
Sanddorn V/2 740
Sapotillbaum V/3 1896
Sargentia Wats. V/1 53
Sauerdorn IV/1 8
Sauerkirsche IV/2 1075
Scharlachquitte IV/2 693
Schleichera Willd. V/1 307
Schwarznuss III 7
Sclerocarya Hochstr. V/1 217
Shepherdia argentea Nutt. V/2 729
Silberbaum IV/2 716
Solanum L. V/4 2587/8
Lycopersicum L. V/4 2611
„ Melongena L. V/4 2587
Sonneratia L. V/2 761
Sorbus Aria (L.) Crantz IV/2 716
aucuparia L. IV/2 709, 710
domestica L. IV/2 713
torminalis (L.) Crantz IV/2 721
Speierling IV/2 713
Sperberbaum, Wilder IV/2 721
„ Zahmer IV/2 713
Spilling IV/2 1108
Spondias L. V/1 216
Springkraut V/1 313
Stachelbeere IV/2 646, 647
Steinbirnen IV/2 759
Steinweichsel IV/2 1070
Sternapfelbaum V/3 1896
Süsskirsche IV/2 1079, 1080
Süssweichsel IV/2 1076
Sultaninen V/1 414
Sumpf-Moosbeere V/3 1689; VII 116 Fig. 1150
Symphonia L. f. V/1 502
Syzygium Gaertn. V/2 780

T.

Taubeeren, Amerikanische IV/2 774
Tomate V/4 2611
Torfbeere IV/2 766
Trichocereus Chiloensis (Colla) V/2 683
Triphasia Aurantiola Lour. V/1 54

U.

Ugni Molinae Turcz. V/2 775
Uvaria L. IV/1 15

V.

Vaccinium Myrtillus L. V/3 1679
Oxycoccus L. V/3 1685
uliginosum V/3 1684; VII 116 Fig. 1150
„ Vitis Idaea L. V/3 1673
Vitellaria mammosa Radek. V/3 1896
Vitex L. V/3 2237
Vitis L. V/1 360—362
„ vinifera L. V/3 365, 386 u. f.
Vogelbeerbaum IV/2 709, 710
Vogelkirsche IV/2 1079, 1080

W.

Wald-Erdbeere IV/2 900, 902
Walnussbaum, Edler III 9; VII 36 Fig. 1061
„ , Schwarzer III 7
Wasser-Melone VI/1 314
Weichsel IV/2 1075, 1076
„ , Türkische IV/2 1070
Weinstock V/1 365, 386 u. f.
Weissbaum IV/2 716
Weissdorn IV/2 734

Z.

Ziberl IV/2 1108
Zimmt-Erdbeere IV/2 904
Zipparte IV/2 1108
Zirbelkiefer I 105
Zitronat-Zitrone V/1 65
Zitrone V/1 66
Zizyphus Juss. V/1 322/323
Zürgelbaum III 123
Zwergkirsche IV/2 1074
Zwergmandel IV/2 1086
Zwergweichsel IV/2 1074
Zwetschge IV/2 1107, 1109, 1110, 1112; VII Fig. 1158, 1226 A

c) Gemüsepflanzen, Salate usw.

A.

Achillea Millefolium L. VI/2 572
Acker-Honigklee IV/3 1245
Ackersenf IV/1 268
Aegopodium Podagraria L. V/2 1215
Aehren-Rapunzel VI/1 373
Alliaria officinalis Andrz. IV/1 151
Allium Ampeloprasum L. II 231
Ascalonicum L. II 232
Cepa L. II 232, 233; VII 97 Fig. 1125
fistulosum L. II 233
Ophioscorodon Don II 231; VII 160 Fig. 1189
Porrum L. II 231
sativum L. II 230
Schoenoprasum L. II 223, 224
Alpen-Ampfer III 173
Alpen-Wachsblume V/3 2190
Amarantus L. III 261
Anethum graveolens L. V/2 1292
Angelica Archangelica L. V/2 1344
silvestris L. V/2 1337
Aralia edulis Zucc. V/2 913
Arctium Lappa L. VI/2 829
Armoracia lapathifolia Gilib. IV/1 307
Artemisia Abrotanum L. VI/2 635
Dracunculus L. VI/2 636
Askalonische Zwiebel II 232
„ vulgaris L. VI/2 640
Artischocke VI/2 924
Asparagus officinalis L. II 262
silvaticus Waldst. et Kit. II 263
tenuifolius Lam. II 263
Atriplex hortense L. III 238, 240

B.

Bambuseen I 402
Barbaraea Beckm. IV/1 299
intermedia Boreau IV/1 304
„ vulgaris R. Br. IV/1 303
Barbenkraut IV/1 299
Echtes IV/1 303
„ , Mittleres IV/1 304
Barringtonia Forst. V/2 767
Basella rubra L. III 267
Basilie V/4 2270
Bauernsenf, Fliederblätteriger IV/1 110
Begonia L. V/1 664
Beifuss VI/2 640
Beisskohl III 215
Bellis perennis L. VI/1 415
Besenginster IV/3 1189
Beta hortensis Mill. III 215
vulgaris L. III 215; VII 74 Fig. 1109c
Bibernelle IV/2 941
Große IV/2 939
Bibernelle, Kleine V/2 1208
Bingelkraut, Einjähriges V 1 129
Blattkohl IV/1 245
Blumenkohl IV/1 248, 249
Blutkopf IV/2 939
Bocksbart VI/2 1043, 1356 Fig. 961
Bodenkohlrabi IV/1 255
Bodenrübe IV/1 255
Bohne IV/3 1631, 1637
Bohnenkraut V/4 2283
Borago officinalis L. V/3 2230, 2232
Borretsch V/3 2230, 2232
Brachrübe IV/1 261
Brassica Napus L. IV/1 253, 255
nigra (L.) Koch IV/1 238
„ oleracea L. IV/1 244
Braunelle, Grosse V/4 2384
„ , Kleine V/4 2382
Braunkohl IV/1 245
„ Gefranster IV/1 246
Broccoli, Römische IV/1 249
Bröckelkohl IV/1 249
Brunnenkresse IV/1 320
Bunge V/3 1877
Bunium Bulbocastanum L. V/2 1194

C.

Calendula officinalis L. VI/2 803
Campanula Rapunculus L. VI/1 362
Cardamine amara L. IV/1 350
„ hirsuta L. IV/1 342
Carum Carvi L. V/2 1184
Carviol IV/1 249
Cerinthe glabra Miller V/3 2190
Chaerefolium Cerefolium Schinz et Thellung V/2 1029
silvestre Schinz et Thellung V/2 1022
Chaerophyllum bulbosum L. V/2 1000
Chayote VI/1 314
Chenopodium album L. III 227
Bonus Henricus L. III 221; VII 74 Fig. 1109b
capitatum (L.) Ascherson III 232
„ virgatum (L.) Jessen III 231
Chrysanthemum L. VI/2 593
„ Leucanthemum L. VI/2 613
Cichorium Endivia L. VI/2 998, 999
„ Intybus L. VI/2 997
Cirsium Miller VI/2 867
„ oleraceum Scop. VI/2 901
Claytonia perfoliata Donn. III 268
Cochlearia Danica L. IV/1 142
„ officinalis L. IV/1 139
Conopodium maius (Gouan) Loret et Barrandon V/2 1195
Coriandrum sativum L. V/2 1073
Coronopus didymus (L.) Sm. IV/1 96
Coronopus procumbens Gilib. IV/1 94, 95
Crambe maritima L. IV/1 297
„ Tataria Jacq. IV/1 299
Cren IV/1 307
Crithmum maritimum L. V/2 1225
Cryptolepis R. Br. V/3 2064
Cryptotaenia Canadensis DC. V/2 1170
Cucumis L. VI/1 319
Melo L. VI/1 320
sativus L. VI/1 322; VII 35 Fig. 1059
Cucurbita Pepo L. VI/1 324
Cynara Cardunculus L. VI/2 924
Cynoglossum officinale L. V/3 2152

D.

Daucus Carota L. V/2 1510, 1517, 1518, 1526; VII 126
Dentaria enneaphylla L. IV 1 332
Dill V/2 1292
Dinkel I 392
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. IV/1 216
Donnerbart IV/2 525
Doppel-Dreizack I 149
Doppelsame IV/1 216
Dornmyrte II 265
Dotschen IV/1 255
Dreizack I 149

E.

Eberraute VI/2 635
Echinophora spinosa L. V/2 993
Echium vulgare L. V/3 2196
Eierpflanze V/4 2587
Endivie VI/2 998/9
Engelwurz V/2 1344
Epilobium angustifolium L. V/2 818
„ roseum Schreber V/2 837
Erbse IV/3 1615
Erbsenklee, Afrikanischer IV/3 1365
Erdbeerspinat, Aehriger III 232
„ , Echter III 231
Erdkastanie V/2 1194
„ , Französische V/2 1196
Erdrübe IV/1 255
Eruca vesicaria (L.) Cav. em. Thellung IV/1 201, 202, 203
Eryngium L. V/2 976
campestre L. V/2 991
„ maritimum L. V/2 976, 981
Eschlauch II 232
Eselsdistel VI/2 922
Eselsmöhre V/2 1508
Estragon VI/2 636

F.

Federkohl IV/1 246
Fedia Cornucopiae DC. VI/1 262

Feld-Mannstreu V/2 991
Feldsalat VI/1 263
„ , Gemeiner VI/1 267
Fenchel V/2 1288; VII 193 Fig. 1234
Ferkelkraut, Gemeines VI/2 1015
Ferula Silphium Thellung V/2 1357
Fetthenne, Große IV/2 525
„ , Weisse IV/2 536
Feuerbohne IV/3 1637
Filipendula Ulmaria (L.) Maxim. IV/2 974
Foeniculum vulgare Miller V/2 1288; VII 193 Fig. 1234
Frauenspiegel, Gemeiner VI/1 367
Frühlings-Schlüsselblume V/3 1754
Fuchsschwanz III 261
Futter-Wicke IV/3 1551

G.

Galega officinalis L. IV/3 1390, 1642 Fig. 1607
Gänseblümchen VI/1 415
Gänse-Fingerkraut IV/2 891
Gänsefuß, Weißer III 227
Gänserich IV/2 891
Garten-Bibernelle IV/2 941
Gartenbohne IV/3 1636
Gartenkerbel V/2 1029
Gartenkohl IV/1 244
Garten-Kresse IV/1 81
Garten-Melde III 239
Garten-Salat VI/2 1119/21; VII 74 Fig. 1109 e
Garten-Spargel II 262
Geißfuß V/2 1215
Geißraute IV/3 1390, 1642 Fig. 1607
Gelbdolde, Gespenster- V/2 1080
Gelbe Rübe V/2 1516; VII 126
Gemüsekohl IV/1 242, 244
Gerste I 397
Glaux maritima L. V/3 1868
Glechoma hederaceum L. V/4 2376
Goldwurzel VI/2 1006
Grünkohl IV/1 245
„ , Gefranster IV/1 246
Gundelrebe V/4 2376
Gurke VI/1 319, 322; VII 35 Fig. 1059
Guter Heinrich III 221; VII 74 Fig. 1109 b

H.

Hasenklee IV/3 1653
Hauhechel IV/3 1227
Hauszwiebel II 232, 233
Helianthus annuus L. VI/1 513
Helwingia Japonica Dietr. V/2 1539
Heracleum Sphondylium L. V/2 1453
Herbstrübe IV/1 261
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat IV/1 229
Hirschfeldie, Weißhaarige IV/1 229
Hordeum L. I 397
Hornklee IV/3 1365
Huflattich VI/2 680
Humulus Lupulus L. III 132
Hundszunge, Gemeine V/3 2152
Hypochoeris radicata L. VI/2 1015

I.

Iberis pinnata L. IV/1 110
Ipomoea aquatica Forsk. V/3 2077

J.

Jakobslauch II 233
Jekingerrübe IV/1 261
Johannislauch II 233
Johanniswedel IV/2 974

K.

Kabbes IV/1 247
Käsekohl IV/1 249
Käsepappel V/1 487
Kaffee-Erbse IV/3 376
Kapuzinerkresse, große IV/3 1731
Karfiol IV/1 249, 251
Karotte V/2 1516; VII 126
Karst-Saturei V/4 2285
Kerbelrübe V/2 1000
Klatschnelke III 281
Klette, Große VI/2 829
Knoblauch II 230
Knoblauch-Hederich IV/ 151
Knöterich III 189, 190
Kohl IV/1 229
Brüsseler IV/1 247
„ , Weißer IV/1 247
Kohldistel VI/2 901
Kohl-Gänsedistel VI/2 1108/9
Kohlrabi IV/1 248
Kohlrübe IV/1 255
Kopfkohl IV/1 247
Kopfsalat VI/2 1119
Koriander V/2 1073
Krähenfuß, Niederliegender IV/1 94, 95
„ , Zweiknotiger IV/1 96
Kratzdistel VI/2 867
Krauskohl IV/1 246
Kraut IV/1 247
Kren IV/1 307
Kresse, Breitblätterige IV/1 90
„ Virginische IV/1 87
Küchen-Zwiebel II 232, 233; VII 97, Fig. 1125
Kümmel, Wiesen- V/2 1184
Kürbis VI/1 324
Kuhblume VI/2 1089

L.

Lactuca perennis L. VI/2 1116
sativa L. VI/2 1119/21; VII 74 Fig. 1109 e
Lamium album L. V/4 2447
Lattich, Blauer VI/2 1116
Lauch II 223, 224, 230, 231, 232, 233
„ , Spanischer II 231
Lauchkraut, Gemeines IV/1 151
Legouzia Speculum Veneris Fisch. VI/1 367
Lepidium graminifolium L. IV/1 75, 92
latifolium L. IV/1 75, 90
sativum L. IV/1 75
„ Virginicum L. IV/1 87
Levisticum officinale Koch V/2 1353
Liebstöckel V/2 1353
Lilium martagon L. II 237
Löffelkraut, Dänisches IV/1 142
„ Echtes IV/1 139
Löwenzahn VI/2 1089
Lotus L. IV/3 1365
„ Tetragonolobus L. IV/3 1376
Luffa cylindrica Roem. VI/1 315
Luzerne IV/3 1263

M.

Maca IV/3 1729
Mädesüß IV/2 974
Mährrettich IV/1 305
Märkische Rübe IV/1 261
Mäusedorn, Stechender II 265
Majorana hortensis Moench V/4 2334
Malabarspinat, Weißer III 267
Malva moschata L. V/1 475
neglecta Wallr. V/1 487
„ silvestris L. V/1 484
Malve, Kleine V/1 487
„ , Wilde V/1 484
Mangold III 215
Mannstreu V/2 976
Markkohl IV/1 248
Mastix-Strauch V/1 231
Mauerpfeffer, Scharfer IV/2 538
„ , Weißer IV/2 536
Medicago sativa L. IV/3 1263
Meerfenchel V/2 1225
Meerkohl IV/1 297
Meerstrand-Milchkraut V/3 1868
Melilotus officinalis (L.) Medikus IV/3 1245
Melissa officinalis L. V/4 2305
Melisse V/4 2305
Melone VI/1 320
Mercurialis annua L. V/1 129
Merk, Aufrechter V/2 1219
Merrettich IV/1 307
Mertensia maritima G. Don V/3 2128
Milchkraut V/2 752
Möhre V/2 1510, 1517, 1518, 1526
Möhrrettich IV/1 305
Mönchs-Rhabarber III 173
Mohrrübe V/2 1508
Momordica Charantia L. VI/1 315
Myrrhis odorata Scop. V/2 1045
Myrte V/2 793
Myrtus communis L. V/2 793

N.

Nachtkerze V/2 868; VII 192 Fig. 1233

Nagelkraut IV/2 941
Nasturtium officinale R. Br. IV/1 320
Natternkopf, Gemeiner V/3 2196
Neptunia oleracea Loud. IV/3 1127

O.

Oberkohlrabi IV/1 248
Oberrübe IV/1 248
Oca IV/3 1647
Ocimum Basilicum L. V/4 2270
Oenothera biennis L. V/2 868; VII 192 Fig. 1233
Ononis spinosa L. IV/3 1227
Onopordon Acanthium L. VI/2 922
Operculina tuberosa Meiss. V/3 2077
Oxalis L. IV/3 1647
Acetosella L. IV/3 1653

P.

Palmkohl IV/1 246
Pastinaca sativa L. V/2 1411, 1414
Peplis Portula L. V/2 752
Pergularia L. V/3 2064
Perlzwiebel II 231; VII 160 Fig. 1189
Pestwurz, Gemeine VI/2 685
Petasites frigidus Fries VI/2 681
hybridus Fl. VI/2 685
Petersilie V/2 1156/60
Petersilienkohl IV/1 246
Petroselinum hortense Hoffm. V/2 1156/60
Pfefferkraut IV/1 90
Pferde-Eppich V/2 1079
Phaseolus coccineus L. IV/3 1639
lunatus L. IV/3 1628
vulgaris IV/3 1636
Phyteuma spicatum L. VI/1 373
Pimpinella saxifraga L. V/2 1208
Pistacia L. V/1 231
Pisum sativum L. IV/3 1615
Plantago Coronopus L. VI/1 189
Plumagekohl IV/1 246
Polygonum L. III 189, 190
Polyscias fruticosa Harms V/2 913
Porree II 231
Portulaca III 268
„ oleracea L. III 270
Portulak, Gelber III 270
Portulak-Afterquendel V/2 752
Potentilla Anserina L. IV/2 891
Primula veris L. V/3 1754
Prunella grandiflora Jacq. V/4 2384
vulgaris L. V/4 2382

R.

Räbe IV/1 261
Ranne III 215
Raphanus Raphanistrum L. IV/1 278—282, 284—285
Raps IV/1 253, 255
Rapunzel-Glockenblume VI/1 362
Rauke, Gemeine IV/1 201, 202, 203
Rauke, Steife IV/1 166
Raukenkohl IV/1 201, 202, 203
Reps IV/1 253, 255
Rettich IV/1 278/82, 284/85
Rhagadiolus stellatus Gaertn. VI/2 1008
Rheum officinale Baill. III 166
„ palmatum L. III 166
Ringelblume VI/2 803
Rinorea Aubl. V/1 586
Rispendolde, Kanadische V/2 1170
Röhren-Zwiebel II 233
Roripa Scop. IV/1 308
Rosenkohl IV/1 247
Rot-Klee IV/3 340
Rübe, Gelbe V/2 1516
Rote III 215
„ , Weiße IV/1 261
Rüben-Kälberkropf V/2 1000
Rübenkohl IV/1 248, 257
Rüsterstaude IV/2 974
Rumex Acetosa L. III 181
alpinus L. III 173
Hispanicus Koch III 187
hortensis Vis. III 187
Patientia L. III 177
„ scutatus L. III 184
Runkelrübe III 215; VII 74, Fig. 1109 c
Ruscus aculeatus L. II 265
Ruta graveolens L. V/1 72

S.

Saatrübe IV/1 261
Salat VI/2 1119/21; VII 74 Fig. 1109 e
Samolus Valerandi L. V/3 1877
Sanguisorba officinalis L. IV/2 939
„ minor Scopoli IV/2 941
Sarothamnus Wimmer IV/3 1189
Satureja hortensis L. V/4 2283
„ montana L. V/4 2285
Sauerampfer, Großer III 181
„ , Römischer III 184
Sauerklee IV/3 1647, 1653
Sauerkohl IV/1 251
Sauerkraut IV/1 251
Savoyerkohl IV/1 247
Scandix Pecten-Veneris L. V/2 1041
Schafgarbe VI/2 572
Schalotte II 232
Scharbockskraut IV/1 139
Scharfkohl IV/1 251
Schaumkraut, Bitteres IV/1 350
„ , Haariges IV/1 342
Schild-Ampfer III 184
Schlitz-Wegerich VI/1 189
Schlotten-Zwiebel II 233
Schmerwurz IV/2 525
„ , Gemeine II 283
Schnittlauch II 223, 224
Schnittsalat VI/2 1119
Schnitt-Zwiebel II 233
Schwamm-Kürbis VI/1 315
Schwarzes Gemüse V/2 1079
Schwarzwurzel, Kleine VI/2 1060
„ , Spanische VI/2 1063
Scolymus L. VI/2 1006
Scorzonera Hispanica L. VI/2 1063
„ humilis L. VI/2 1060
Sechium edule Jacq. VI/1 314
Sedum acre L. IV/2 538
album L. IV/2 536
rupestre aut. IV/2 542
„ Telephium L. IV/2 525
Sellerie V/2 1143
Senf IV/1 207
Weißer IV/1 207
Wilder IV/1 268
Senfkohl IV/1 201, 202, 203, 238
Senfrauke IV/1 216
Sesampflanze VI/1 176
Sesamum Indicum L. VI/1 176
Silberkraut IV/2 891
Silene inflata Sm. III 281
Sinapis alba L. IV/1 207
„ arvensis L. IV/1 268
Sisymbrium strictissimum L. IV 1 166
Sium erectum Hudson V/2 1219
„ Sisarum L. V/2 1224
Smyrner Kraut V/2 1079
Smyrnium Olus-atrum L. V/2 1079
Solanum Lycopersicum L. V/4 2611
„ Melongena L. V/4 2587
Sommerlauch II 231
Sommerzwiebel II 232
Sonchus oleraceus L. VI/2 1108/9
Sonnenblume VI/1 513
Spanischer Lauch II 231
Spargel II 262
„ , Zartblättriger II 263
Spargelerbse, rote IV/3 1376
Spargelkohl IV/1 248
Spelz I 392
Spilanthes oleracea Jacq. VI/1 528
Spinacia oleracea L. III 234
Spinat III 234
Englischer III 177
Neuseeländischer III 267
„ , Spanischer III 239
Spitzkraut IV/1 247
Sprossenkohl IV/1 247
Stacheldolde V/2 993
Stachys paluster L. V/4 2418
Stauden-Kohl IV/1 245
Stauden-Winterkohl IV/1 245
Steckrübe IV/1 255
Steinklee, Kleiner gelber IV/3 1245
Steinkresse IV/1 350
Steinwurzel IV/3 1227
Stoppelrübe IV/1 261
Stranddistel V/2 981
Strauch-Kohl IV/1 245
Süssdolde V/2 1045
Süsserbse IV/3 1615
Sumpf-Kresse IV/1 308
„ Ziest V/4 2418
Symphytum officinale L. V/3 2226

T

Talinum patens Willd. III 268
Tamus communis L. II 283
Taraxacum officinale Weber VI/2 1089
Tataren-Meerkohl IV/1 299
Taubenkropf III 281
Taubnessel, Weiße V/4 2447
Tellerrübe IV/1 262
Teltowerrübe IV/1 261
Tetragonia expansa Murr III 267
Tomate V/4 2611
Tordylium L. V/2 1460
Tragopogon porrifolius L. VI/2 1043
pratensis L. VI/2 1052, 1356 Fig. 961
Traubenkohl IV/1 248, 249
Trifolium pratense L. IV/3 1340
„ repens L. IV/3 1306
Triglochin maritima L. I 147, 149
Tripmadam IV/2 542
Triticum Spelta L. I 392
Tropaeolum maius L. IV/3 1731
Türkenbund II 237
Turnips IV/1 261
Tussilago Farfara L. VI/2 680

V.

Valerianella L. VI/1 263
„ olitoria Moench VI/1 267
Venuskamm V 1041
Vicia sativa L. IV/3 1551

W.

Wald-Weidenröschen V/2 818
Wallwurz, Grosse V/3 2226
Wasserportulak V/2 752
Wasserrübe IV/1 261, 262
Wegwarte VI/2 997
Weidenröschen, Rosablühendes V/2 837
Weinraute V/1 72
Weisse Rübe IV/1 261, 262
Weiss-Klee IV/3 1306
Weisskraut IV/1 247
Welschkohl IV/1 247
Wiesen-Bärenklau V/2 1454
Wiesen-Bocksbart VI/2 1052, 1356 Fig. 961
Wiesenkerbel V/2 1022
Wiesenklee IV 3 1340
, Weisser IV/3 1306
Wiesenknopf, Großer IV/2 939
Kleiner IV/2 941
Wiesen-Wucherblume VI/2 613
Winterlauch II 231
Winterzwiebel II 233
Wirsekohl IV/1 247
Wirsing IV/1 247
Wucherblume VI/2 593

Z.

Zettenkraut IV/1
Zirmet V/2 1460
Zuckererbse IV/3 1615
Zuckerhutkraut IV 1 247
Zuckerrübe III 215
Zuckerwurz V/2 1224
Zwergrübe IV/1 129
Zwiebel II 231, 232, 233
Askalonische II 232

d) Genußmittel, Gewürze.

A.

Abelmoschus Medikus V/1 458
Acacia Catechu Willd. IV/3 1124
Acer Pseudoplatanus L. V/1 280
Achillea L. VI/2 551
„ Millefolium L. VI/2 572
Acker-Gauchheil V/3 1871
-Honigklee IV/3 1245
gle Marmelos Correa V/1 54
culus Hippocastanum L. V/1 303, 304
Agave L. II 318
Agriopyrum repens (L.) Pal. I 384
Ahlbeere IV/2 653
Akazie, Echte IV/3 1124
„ , Falsche IV/3 1399
Akelei III 482
Albizzia Durazz. IV/3 1123
Alhagi Desv. IV/3 1462
Allium sativum L. II 230
Alpen-Liebstock V/2 1323
Amarelle IV/2 1078
Ammei, Aegyptisches V/2 1168
Ammi maius L. V/2 1173
Amomum L. II 321
Anacardium Occidentale L. V/1 215; I/CLII Fig. 286 g
Anagallis arvensis L. V/3 1871
Andorn V/4 2397
Anethum graveolens L. V/2 1292
Angelica Archangelica L. V/2 1345
Anhalonium Lewinii Henning V/2 684
Anis V/2 1210/11
Apfelbaum IV/2 752
Apfelsine V/1 62; VII Fig. 1078, 1093
Aquilegia vulgaris L. III 482
Arachis L. IV/3 1464; VII 60 Fig. 1096
„ hypogaea L. IV/3 1464
Arbutus Unedo L. V/3 1666
Arctium L. VI/2 827
Arctostaphylos Adans. V/3 1656
„ Uva ursi L. V/3 1661
Arnica montana L. VI/2 708
Artemisia L. VI/2 629
Absinthium L. VI/2 655
laxa Fritsch VI/2 649
„ vulgaris L. VI/2 640
Asarum Canadense L. III 160
„ Europaeum L. III 162
Asperula odorata L. VI/1 202
Astragalus L. IV/3 1405
Baeticus L. IV/3 1143, 1405
exscapus L. IV/3 1411
„ glycyphyllus L. IV/3 1422
Avena sativa L. I 254
Averrhoa Cerambola L. IV/3 1645

B.

Bärenschote, Stengellose IV/3 1411
„ , Süsse IV/3 1422
Bärentraube V/3 1656
Basilie V/4 2269
Batate V/3 2077
Bauern-Tabak V/4 2625
Beifuss VI/2 629, 640
Bellis perennis L. VI/1 415
Berberis Aquifolium (Nutt.) Pursh IV/1 6
„ vulgaris L. IV/1 8
Berberitze IV/1 8
Berg-Ahorn V/1 280
„ -Bärwurz V/2 1303
Bergenia crassifolia Engler IV/2 566
Bergkümmel, Echter V/2 1471, 1472
Berg-Wohlverleih VI/2 708
Besenginster IV/3 1189
Besenpfriem IV/3 1189
Beta esculenta Salisb. III 215; VII 74 Fig. 1109 c
„ sativa Bernh. III 215
Betula verrucosa Ehrh. III 80
„ lenta L. III 75
Bien(en)saug V/4 2471
Birke III 80
Birnbaum IV/2 698, 701
Bisam-Storchschnabel IV/3 1725
Bockshorn IV/3 1133
Bockshornklee IV/3 1233
Bohne IV/3 1631
Bohnenbaum IV/3 1162
Brassica iuncea (L.) Cosson, Czern. IV/1 241
nigra (L.) Koch IV/1 238
Braunsenf IV/1 239
Brennessel, Kleine III 142
Brombeere IV/2 773
Brunnenkresse IV/1 321
Buchs V/1 212
Buxus sempervirens L. V/1 212

C.

Calluna vulgaris Hull V/3 1698
Caltha palustris L. III 459
Calypthranthes V/2 777
Cannabis sativa Indica Lam. III 135
Capparis spinosa L. IV/1 490
Capsicum annuum L. V/4 2556
Carica Papaya L. V/1 661
Carum Carvi L. V/2 1184
Cassia occidentalis L. IV/3 1131
Castanea sativa Mill. III 105; VII 27 Fig. 1050
Catha edulis Forsk. V/1 244
Ceanothus L. V/1 324
Ceratonia Siliqua L. IV/3 1133
Cercis Siliquastrum L. IV/3 1135
Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. IV/2 693
Chrysanthemum L. VI/2 600
Tanacetum Karsch VI/2 622
Cicer arietinum L. IV/3 1500
Cichorium Intybus L. VI/2 995, 996
Cinnamodendron corticosum Miers V/1 585
Cinnamomum Cassia Blume IV/1 11
Zeylanicum Breyn IV/1 11
Citrullus vulgaris Schrader VI/1 314
Citrus Aurantium L. subsp. decumana Thellung V/1 64
Aurantium L. subsp. Sinensis Gall. V/1 62
hystrix DC. V/1 68
medica L. subsp. Limonum (Risso) Hook. f. V/1 66 u. f.
medica L. var. macrocarpa V/1 65
Coffea L. VI/1 196; VII 206 Fig. 1254
Cola vera K. Schum. V/1 492
Collinsonia Canadensis L. V/4 2272
Convallaria majalis L. II 274; VII 102 Fig. 1132
Coriandrum sativum L. V/2 1072
Cornus mas L. V/2 1553
Crataegus Oxyacantha L. IV/2 734
Crocus sativus L. II 297
Croton L. V/1 124
Cucurbita Pepo L. VI/1 325
Cuminum Cyminum L. V/2 1138
Cusparia trifoliata Engler V/1 51
Cyperus aureus Ten. II 10
esculentus L. II 10

D.

Dalia Cav. VI/1 529, 530, 531
Daucus Carota L. V/2 1516; VII 126
Dictamnus alba L. V/1 77
Dill V/2 1292
Dillenia Indica L. V/1 494
Diospyros Lotus L. V/3 1899
Diptam V/1 177
Dirlitze V/2 1553
Dost V/4 2332
Drachenkopf V/4 2361
Dracocephalum Moldavica L. V/4 2361
Dryas octopetala L. IV 2 925
Duboisia R. Br. V/4 2558

E.

Eberesche IV/2 710
Echinocactus Williamsii Lem. V/2 684
Edel-Kastanie III 105; VII 27 Fig. 1050
Edelnuss II 10
Edelraute VI/2 649
Eiche III 111
Elefantenlaus V/1 215; I CLII Fig. 286 g
Elsbeerbaum IV/2 721
Elsholtzia cristata Willd. V/4 2274
Empetrum nigrum L. V/3 1607
Engelwurz V/2 1345
-Laserkraut V/2 1490
Enzian, Gelber V/3 1992
„ , Purpurroter V/3 1997
Epilobium angustifolium L. V/2 818
„ hirsutum L. V/2 825
Erdbeerbaum V/3 1666
Erdbeere IV/2 901
Erd-Eichel IV/3 1593
Erdmäuse IV/3 1593
Erdnuss IV/3 1464; VII 60 Fig. 1096
Erodium moschatum L'Hérit. IV/3 1725
Eruca vesicaria (L.) Cav. em. Thellung IV/1 203
Erucastrum nasturtiifolium Poiret O. E. Schulz IV/1 224
Erythroxylon Coca Lam. V/1 37; VII 185 Fig. 1229
Esche V/3 1933; VII 54 Fig. 1088
Eucalyptus L'Hérit V/2 786
Eugenia caryophyllata Thunb. V/2 777
Eugenia Plumieri Berg V/2 780
Eupatorium L. VI/1 403

F.

Färber-Scharte VI/2 928
Feigenbaum III 127
Felsenkirsche IV/2 1072
Fenchel V/2 1288; VII 193 Fig. 1234
Ferula Silphium Thellung V/2 1357
Fettkraut VI/1 157
Fettmiere III 405
Feuerbusch IV/2 693
Feuer-Mohn IV/1 31
Fichtenspargel V/3 1602
Ficus Carica L. III 127
Filipendula Ulmaria (L.) Maxim. IV/2 974
Flachs V/1 35
Foeniculum vulgare Miller V/2 1288; VII 193 Fig. 1234
Fragaria vesca L. IV/2 901
Frankenia Berteroana Gay V/1 543
Fraxinus excelsior L. V/3 1933
„ Griffithii C. B. Clarke V/3 1920
Frühlings-Schlüsselblume V/3 1754

G.

Gänseblümchen VI/1 415
Gänse-Fingerkraut IV/2 891
Gänserich IV/2 891
Gagelstrauch III 11
Galium Aparine L. VI/1 228; VII 75 Fig. 1111
Gardal-Senf IV/1 207
Gartenbohne IV/3 1636
-Kresse IV/1 82
-Mohn IV/1 35
Gathau, Weisser IV/2 925
Gaultheria procumbens L. V/3 1620
Gelbsenf IV/1 239
Gentiana lutea L. V/3 1992
purpurea L. V/3 1997
Geranium Robertianum L. IV/3 1715
Gerste I 397
Geum urbanum L. IV/2 919
Gewürznelkenbaum V/2 777
Glechoma hederaceum L. V/4 2376
Glycine hispida Maxim. IV/3 1620, 1622
Glycyrrhiza L. IV/3 1454
Goldregen IV/3 1162
Goldrute, Gemeine VI/1 410
Gouania V/1 322
Granatapfelbaum V/2 765
Grewia L. V/1 429
Gundelrebe V/4 2376
Gymnocladus dioeca Koch IV/3 1129

H.

Habichtskraut, Orangerotes VI/2 1212
Hafer I 254
Hagebutte IV/2 988
Hanf, Indischer III 135
Haschisch III 135
Haselwurz, Europäische III 162
Hasenklee IV/3 1158, 1653
Hauswurz, Echte IV/2 550
Heckenrose IV/2 988
Hedeoma pulegioides Pers. V/4 2281
Heidekraut V/3 1698
Heidelbeere V/3 1679
Heide-Myrte III 11
Helianthus annuus L. VI/1 512
Heracleum Sphondylium L. V/2 1454
Herz-Kresse IV/1 79
Hibiscus L. V/1 460
Hieracium aurantiacum L. VI/2 1212
Himbeere IV2 770
Honckenya peploides Ehrh. III 405

Honigklee IV/3 1237
Hopfen III 132
Hordeum L. I 397
Huflattich VI/2 680
Humulus Lupulus L. III 132
Hundsrauke, Brunnenkressenblätterige IV/1 224
Hundsrose IV/2 988
Hypericum perforatum L. V/1 530

I.

Ilex L. V/1 235
Paraguariensis St. Hil. V/1 235
Illicium verum Hook. IV/1 14; VII 175 Fig. 1218 f, g
Immenblatt V/4 2471
Immergrün, Gemeines V/3 2055
Ipomoea Batatas Lam. V/3 2077
Irvingia Hook. f. V/1 80

J.

Johannisbeere, Schwarze IV/2 653
Johannisbrot, Wildes IV/3 1135
Johannisbrotbaum IV/3 1133
Johanniskraut V/1 530
Johanniswedel IV/2 974
Judasbaum IV/3 1134
Juglans regia L. III 10; VII 36 Fig. 1061
Juniperus communis L. I 90

K.

Kaffee, Schwäbischer IV/3 1158, 1160
Kaffeebaum VI/1 196; VII 206 Fig. 1254
Kaffee-Erbse IV/3 1376
Kaffeestragel IV/3 1405
Kaffeetraganth IV/3 1405
Kakao V/1 491
Kappernstrauch IV/1 490
Kapuzinerkresse, Große IV/3 1731
„ , Kleine IV/3 1731
Kartoffel V/4 2603
Kastanie, Echte III 105; VII 27 Fig. 1050
Kathstrauch VII 187
Kicher, Deutsche IV/3 1606
„ , Wilde IV/3 1601
Kichererbse IV/3 1500
Kirsche IV/2 1083
Klebkraut VI/1 228; VII 75 Fig. 1111
Klette VI/2 827
Knautia arvensis Coult. VI/1 294
Knoblauch II 230
Knorpelmöhre, Große V/2 1173
Koriander V/2 1072
Korn I 389
Krähenbeere V/3 1607
Krauseminze V/4 2352
Kresse, Türkische IV/1 79
Kreuzdorn V/1 330
Kümmel, Wiesen- V/2 1184
Kürbis VI/1 325
Kuhblume VI/2 1030, 1089
Kuhhornklee IV/3 1233

L.

Laburnum Medikus IV/3 1162
Lagenaria vulgaris Ser. VI/1 314
Lagoecia cuminoides L. V/2 992
Laser trilobum Borkh. V/2 1467
Laserkraut V/2 1481
Laserpitium L. V/2 1481
„ Archangelica Wulfen V/2 1490
Lathyrus sativus L. IV/3 1606
silvester L. IV/3 1601
„ tuberosus L. IV/3 1593
Laurus nobilis L. IV/1 12
Lein V/1 35
Leontodon hispidus L. VI/2 1030
Lepidium Draba L. IV/1 79
sativum L. IV/1 82
Leptospermum Forst. V/2 789
Levisticum officinale Koch V/2 1353
Liebstöckel V/2 1353
Ligusticum Mutellina Crantz V/2 1323
Linum usitatissimum L. V/1 35
Lippia L. V/3 2235
Lithospermum officinale L. V/3 2157
Löwenzahn VI/2 1030, 1089, 1090
Lomatia obliqua R. Br. V/1 235
Lophophora V/2 684
Lorbeer IV/1 12
Lotospflaume V/3 1899
Lotus Tetragonolobus L. IV/3 1143, 1376
Lupine, Blaue IV/3 1158, 1160
, Gelbe IV/3 1158
„ , Weiße IV/3 1154
Lupinus L. IV/3 1152, 1154
albus L. IV/3 1154
angustifolius L. IV/3 1143, 1158, 1160
„ luteus L. IV/3 1158
Lyperia atropurpurea Benth. II 298
Lysimachia Nummularia L. V/3 1854

M.

Mädesüß IV/2 974
Märzwurz IV/2 919
Maiglöckchen II 274; VII 102 Fig. 1132
Mais I 180; VII 41 Fig. 1068
Malus communis Lam. IV/2 752
Malva silvestris L. V/1 484
Malve, Wilde V/1 484
Manihot Adans. V/1 119
Marrubium vulgare L. V/4 2397
Maryland-Tabak V/4 2624
Mastix-Strauch V/1 231
Maté V/1 235
Maulbeerbaum, Schwarzer III 130
Mehlbeerbaum IV/2 716
Meisterwurz V/2 1400
Melilotus Hill IV/3 1237
altissimus Thuill. IV/3 1243
„ officinalis Medikus IV/3 1245
Melissa officinalis L. V/4 2303
Melisse V/4 2303
Melittis Melissophyllum L. V/4 2471
Mentha L. V/4 2337
longifolia Hudson V/4 2351
piperita Hudson V/4 2355
Pulegium L. V/4 2341
spicata L. V/4 2352
Menyanthes trifoliata L. V/3 1960
Mespilus Germanica L. IV/2 741
Meum athamanticum Jacq. V/2 1303
Minze V/4 2337
Mispel IV/2 741
Möhre V/2 1516
Mohn IV/1 31; VII 18 Fig. 1016
Mohrenpfeffer IV/1 15
Monodora Myristica Dun. IV/1 15
Monotropa Hypopitys L. V/3 1602
Moorbeere V/3 1685
Morus nigra L. III 130
Moschus-Schnabelkraut IV/3 1725
Mucuna Adans. IV/3 1626
Murraya Koenigii Spreng. V/1 54
Muskatellerkraut V/4 2490
Muskatnuss IV/1 15; I/CLV Fig. 296
Myrica Gale L. III 11
Myristica fragrans Houttuyn IV/15; I/CLV Fig. 296
Myrrhis odorata Scop. V/2 1045
Myrte, Brabanter III 11
Myrteola, Berg V/2 775
Myrtus Pseudocaryophyllus Gomez V/2 790

N.

Nachtschatten V/4 2588
Nasturtium officinale R. Br. IV/1 321
Nelkenpfeffer-Myrte V/2 776
Nelkenwurz, Echte IV/2 919
Nicotiana L. V/4 2617
latissima Mill. V/4 2624
rustica L. V/4 2625
„ Tabacum L. V/4 2623
Nigella sativa L. III 475
Nitraria retusa Aschers. V/1 41

O.

Ocimum Basilicum L. V/4 2269
Origanum vulgare L. V/4 2332
Ornithopus sativus Link IV/3 1480
Orthosiphon Benth. V/4 2270
Oryza sativa L. I 195
Osmanthus fragrans Lour. V/3 1905
Oxalis Acetosella L. IV/3 1653
Oxycoccus quadripetalus Gilibert V/3 1689
Osyris arborea Wall. III 151

P.

Paeonia foemina Garsault III 455
Papaver Rhoeas L. IV/1 31; VII 18 Fig. 1016

Papaver somniferum L. IV/1 35
Paprika V/4 2556
Paradieskörner II 321
Paraguay-Tee V/1 235
Passiflora L. V/1 658
Pastinaca sativa L. V/2 1414
Peganum Harmala L. V/1 41
Petersilie V/2 1156/60
Petroselinum hortense Hoffm. V/2 1156, 1160
Peucedanum Ostruthium Koch V/2
Pfeffer, Schwarzer III 209
Spanischer V/4 2556
„ Weisser III 509
Pfefferminze V/4 2355
Pfeil-Kresse IV/1 79
Pfennigkraut V/3 1854
Pferdebohne IV/3 1560
Pflaume IV/2 1111
Phaseoleen IV/3 1143
Phaseolus vulgaris IV/3 1636
Phyllocactus anguliger Lem. V/2 683
Pimenta officinalis Berg V/2 776
Pimpinella Anisum L. V/2 1210/11
Pinguicula L. VI/1 157
Piper Betle L. III 209
Cubeba L. III 209
„ nigrum L. III 209
Pirola secunda L. V/3 1577
Pirus communis L. IV/2 698, 701
Pistacia L. V/1 231
Polei V/4 2341
Potentilla Anserina L. IV/2 891
fruticosa L. IV/2 817
„ rupestris L. IV/2 834
Preisselbeere V/3 1673
Primula veris L. V/3 1754
Prunus L. IV/2 1064, 1068
avium L. IV/2 1083
Cerasus L. IV/2 1078
domestica L. IV/2 1111; VII Fig. 1158, 1226A
Mahaleb IV/2 1072
„ spinosa L. IV/2 1105
Psoralea glandulosa L. IV/3 1143
Puffbohne IV/3 1560
Pumpelmus V/1 64
Punica Granatum L. V/2 765

Q.

Quassia amara L. V/1 79
Quecke I 384
Quendel V/4 2326; VII 200 Fig. 1241
Quercus Robur L. III 111
Quitte, Japanische IV/2 693
Quittenbaum IV/2 693

R.

Rainfarn VI/2 622
Rauh-Birke III 80
Rauke, Gemeine IV/1 203
Raukenkohl IV/1 203
Reis I 195
Rhamnus L. V/1 330
Rhizophora V/2 769
Rhus L. V/1 223/4
Ribes nigrum L. IV/2 653
Robinia IV/3 1143
„ Pseudacacia L. IV/3 1399
Roggen I 389
Roripa Scop. IV/1 308
Rosa L. IV/2 988
Rosmarinus L. V/4 2520
Roßkastanie V/1 303, 304
Roßkümmel, Dreilappiger V/2 1467
Rossminze V/4 2351
„ Grüne V/4 2352
Rubus fruticosus L. IV/2 773
„ Idaeus L. IV/2 770, 773
Rüsterstaude IV/2 974
Ruhrbirne IV/2 721
Ruprechtskraut IV/3 1715
Ruta graveolens L. V/1 72
Ruten-Senf IV/1 241

S.

Saathafer I 254
Saat-Platterbse IV/3 1606
Safran, Echter II 297
Sageretia Brogn. V/1 324
Salbei, Edler V/4 2482, 2484
Salvia officinalis L. V/4 2482, 2484
Sclarea L. V/4 2490
„ viridis L. V/4 2489
Salzblume III 405
Salzmiere III 405
Sanicula Europaea L. V/2 959
Sarcostemma R. Br. V/3 2063
Sareptasenf IV/1 241, 242
Sarothamnus Wimmer IV/3 1189
Satureja vulgaris Fritsch V/4 2297
Saubohne IV/3 1560
Sauerdorn IV/1 8
Sauerkirsche IV/2 1078
Sauerklee IV/3 1653
Schabzigerklee IV/3 1233, 1235
Schafgarbe VI/2 551
„ , Gemeine VI/2 572
Scharlach-Quitte IV/2 693
Scharlach-Salbei V/4 2489
Schlehdorn IV/2 1105
Schwarzdorn IV/2 1105
Schwarzkümmel III 475
Schwarztee V/1 496
Schwarzwurzel, Spanische VI/2 1064
Sclerocarya Hochst. V/1 217
Scorzonera Hispanica L. VI/2 1064
Secale Cereale L. I 389
Sempervivum tectorum L. IV/2 550
Senf IV/1 205, 238
, Holländischer IV/1 206
, Schwarzer IV/1 238
„ , Weißer IV/1 205
Senfkohl IV/1 203, 238
Serradella IV/3 1480
Serratula tinctoria L. VI/2 928
Sida L. V/1 456
Silberbaum IV/2 716
Silberkraut IV/2 891
Silberregen IV/3 1399
Silberwurz IV/2 925
Siler montanum L. V/2 1471, 1472
Sinapis alba L. IV/1 205
Sison Amomum L. V/2 1163
Sium Sisarum L. V/2 1224
Soja-Bohne IV/3 1620, 1622
Solanum L. V/4 2588
„ tuberosum L. V/4 2603
Solidago Virga aurea L. VI/1 410
Sommer-Eiche III 111
Sonnenblume VI/1 512
Sorbus Aria (L.) Crantz IV/2 716
aucuparia L. IV/2 710
domestica L. IV/2 713
torminalis (L.) Crantz IV/2 721
Spanischer Pfeffer V/4 2556
Spargelerbse, Rote IV/3 1376
Speierling IV/2 713
Sperberbaum, Wilder IV/2 721
„ , Zahmer IV/2 713
Stein-Fingerkraut IV/2 834
Steinklee IV/3 1237
, Blauer IV/3 1233, 1235
, Hoher IV/3 1243
„ , Kleiner gelber IV/3 1245
Steinsame, Echter V/3 2157
Steinweichsel IV/2 1072
Stiel-Eiche III 111
Stipa I 203; VII 153 Fig. 1181
Stragel IV/3 1405
Succisa pratensis Moench VI/1 289
Süßdolde V/2 1045
Süßholz IV/3 1454
„ , Wildes IV/3 1422
Süßkirsche IV/2 1083
Sumach V/1 223, 224
Sumpf-Bitterklee V/3 1960
-Dotterblume III 459
-Kresse IV/1 308
-Moosbeere V/3 1689
„ -Steinklee IV/3 1243
Symphytum officinale L. V/3 2226
Symplocos L. V/1 235; V/3 1900
Syzygium Gaertn. V/2 780

T.

Tabak V/4 2617
„ , Virginischer V/4 2623
Tamarinde IV/3 1130
Tamarindus Indica L. IV/3 1130
Tamonea Aubl. V/2 795
Taraxacum officinale L. VI/2 1089/90
Tee, Paraguay- V/1 235
, Schwarz- V/1 496
, Trapezunt- V/3 1667
„ , Tschaganischer IV/2 566
Teestrauch V/1 496
Teichrose, Gelbe III 447
Teufelsabbiß VI/1 289
Thea Sinensis L. V/1 496
Theobroma Cacao L. V/1 491
Thymian V/1 2326; VII 200 Fig. 1241

Thymus Serpyllum L. V/1 2326; VII 200 Fig. 1241
Trachyspermum Link V/2 1168
Traganth IV/3 1405
Trapezunt-Tee V/3 1667
Trigonella caerulea Ser. IV/3 1143, 1233, 1235
Trigonella Foenum Graecum L. IV/3 1233
Triticum vulgare Vill. I 395
Tritonia aurea Pappe II 298
„ minus L. IV/3 1731
Tropaeolum maius L. IV/3 1731
Tussilago Farfara L. VI/2 680

U.

Ugni Molinae Turcz. V/2 775
Urtica urens L. III 142

V.

Vaccinium Arctostaphylos L. V/3 1667
Myrtillus L. V/3 1679
uliginosum L. V/3 1685; VII 116 Fig. 1150
„ Vitis Idaea L. V/3 1673
Vanille II 324
Vicia Faba L. IV 1550
Vicieen IV/3 1143
Villaresia Ruiz. et Pav. V/1 262, 235
Vinca minor L. V 3 2055
Vitis L. V/1 362
vinifera L. V/1 394 u. f., 400 u. f., 415
Vogelbeerbaum IV/2 710
Vogelkirsche IV/2 1083

W.

Wacholder I 90; VII 152 Fig. 1180
Wald-Erdbeere IV/2 901
Waldmeister VI/1 202
Wald-Sanikel V/2 959
Wald-Weidenröschen L. V/2 818
Wallwurz V/3 2226
Walnussbaum III 10
Wasserdost VI/1 403
Wegwarte VI/2 995, 996
Weichsel IV/2 1078
„ , Türkische IV/2 1072
Weide III 15
Weidenröschen, Zottiges V/2 825
Weinraute V/1 72
Weinstock V/1 394 u. f., 400 u. f., 415
Weissbaum IV/2 716
Weiss-Birke III 80
Weißdorn IV/2 734
Weizen I 395
Wermut VI/2 655
Wiesen-Bärenklau V/2 1454
Winterana Canella L. V/1 585
Wintergrün, Nickendes V/3 1577
Wirbeldost V/4 2297
Witwenblume VI/1 294
Wolfsbohne IV/3 1152, 1154
Wucherblume VI/2 600
Würzsilie V/2 1163

X.

Xanthoxylum L. V/1 47
Xylopia L. IV/1 15

Z.

Zea Mays L. I 180; VII 41 Fig. 1068
Zingiber Adans. II 321
Zitronat-Zitrone V/1 65
Zitrone V/1 66 u. f.
Zitronenstrauch V/3 2235
Zucker-Birke III 75
Zuckerwurz V/2 1224
Zwetschge IV/2 1111; VII Fig. 1158, 1226 A
Zygophyllum Fabago L. V/1 39
Zypergras II 10

e) Oelpflanzen (aetherische und fette Oele, Talge, Wachs).

A.

Acacia Farnesiana Willd. IV/3 1125
Acanthosicyos horrida Welw. VI/1 315
Achillea Millefolium L. VI/2 572
Ackerkohl, Weisser IV/1 441
Ackersenf IV/1 268
Acker-Spark III 419.
Adlerholz V/2 700
Aegle Marmelos Correa V/1 54
Aesculus Hippocastanum L. V/1 304
Ahlkirsche IV/2 1068
Akazie, Echte IV/3 1125
Alpenscharte VI/2 835
Amyris balsamifera L. V/1 53
Anethum graveolens L. V/2 1294
Angelica Archangelica L. V/2 1343
Anis V/2 1211
Anthemis nobilis L. VI/1 536
Anthoxanthum odoratum L. I 198
Apfelsine V/1 62
Apium graveolens L. V/2 1145
Aprikose IV/2 1100
Aquilaria L. V/2 700
Arachis hypogaea IV/3 1463; VII 60 Fig. 1096
Arctium L. VI/2 827
Argania Sideroxylon Roem. et Schult. V/3 1896
Argemone Mexicana L. IV/1 20
Artabotrys intermedia Hassk. IV/1 15
Artemisia Absinthium L. VI/2 655
Asphaltklee IV/3 1385
Atalantia Correa V/1 54
Azadirachta Indica L. V/1 85

B.

Balanites Aegyptiaca Delile V/1 41
Baldrian, Gemeiner VI/1 268
Barbaraea Beckm. IV/1 300
„ verna Aschers. IV/1 304
Barbenkraut IV/1 300
Barringtonia Forst. V/2 767
Basilie V/4 2269
Baumwolle V/1 462, 463
Benediktenkraut VI/2 991
Ben-Nussbaum, Echter IV/1 491; V/2 772
Bergföhre I 101
Berg-Haarstrang V/2 1389
Bertholletia excelsa Humb. et Bonpl. V/2 768
Betula verrucosa Ehrh. III 79
Bilsenkraut V/4 2577
Birke III 75, 79
Birnbaum IV/2 701
Bisam-Storchschnabel IV/3 1725
Brassica elongata Ehrh. IV/1 236
„ Napus L. IV/1 253, 255, 257
Brassica nigra (L.) Koch IV/1 238
„ oleracea L. IV/1 249
Buche III 99
Bulnesia Sarmienti Lorentz V/1 40
Butyrospermum Kotschy V/3 1896

C.

Calophyllum L. V/1 500
Camelina sativa Crantz IV/1 370, 371
Cananga odorata (Lam.) Hook. f. et Thoms. IV/1 14
Cannabis sativa L. III 134, 135
Capsella Bursa pastoris Medikus IV/1 367
Cardiospermum L. V/1 307
Carpotroche V/1 656
Carthamus tinctorius L. VI/2 987, 989
Carum Carvi L. V/2 1185
Caryocar L. V/1 494
Castanea sativa Mill. III 105; VII 27 Fig. 1050
Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. IV/2 693
Cinnamomum Camphora Nees et Ebermayr IV/1 11
Citrus Aurantium L. subsp. amara Engler V/1 59
Aurantium L. subsp. decumana Thellung V/1 64
Aurantium L. subsp. Sinensis Gall. V/1 62
hystrix DC. V/1 68

Citrus medica L. subsp. Bajoivia V/1 65
medica L. subsp. Limonum (Risso) Hook. f. V/1 66
nobilis Lour. V/1 59
„ trifoliata L. V/1 58
Clausena Anisumoleum Merill. V/1 54
Cnicus Benedictus L. VI/2 991
Cochlearia officinalis L. IV/1 139
Combretum butyrosum V/2 772
Conringia Orientalis Dumort. IV/1 441
Coriandrum sativum L. V/2 1073
Cornus sanguinea L. V/2 1547
Corylus Avellana L. III 74; VII Fig. 1105, 1107, 1118
Cotinus Coggygria Miller V/1 229
Croton L. V/1 124
Cucumis Melo L. VI/1 320
sativus L. VI/1 323; VII 35 Fig. 1059
Cucurbita Pepo L. VI/1 325
Cuminum Cyminum L. V/2 1139
Cunila origanoides Britton V/4 2281
Cydonia oblonga Mill. IV/2 692

D.

Dill V/2 1294
Dipterocarpus Gaertn. V/1 534
Dost V/4 2327, 2332

E.

Edel-Kastanie III 105; VII 27 Fig. 1050
Edelnuß III 10
Elaeagnus angustifolia L. V/2 730
Elsbeere IV/2 1068
Engelwurz V/2 1343
Erd-Eichel IV/3 1593
Erdmäuse IV/3 1593
Erdnuss IV/3 1464; VII 60 Fig. 1096
Erodium moschatum L'Hérit. IV/3 1725
Eruca vesicaria (L.) Cav. em. Thellung IV/1 203
Eselsdistel VI/2 922
Eucalyptus L'Hérit. V/2 782, 786
amygdalina Labill. V/2 785
Globulus Labill. V/2 784
Eugenia Michx. V/2 777
Euphorbia Lathyris L. V/1 147
Evonymus Europaea L. V/1 252
Excoecaria Agallocha L. V/1 120

F.

Färber-Saflor VI/2 987, 989
Färber-Waid IV/1 199
Färber-Wau IV/1 489
Fagus silvatica L. III 99
Faulbaum V/1 348
Felsenkirsche IV/2 1072
Fenchel V/2 1288; VII 193 Fig 1234
Feuerbusch IV/2 693
Fieberbaum V/2 784
Filipendula Ulmaria (L.) Maxim. IV/2 974
Flachs V/1 22, 23, 30
Flieder, Gemeiner V/3 1916
Föhre I 98
Foeniculum vulgare Miller V/2 1288; VII 193 Fig. 1234
Frühlings-Barbenkraut IV/1 304

G.

Garten-Kohl IV/1 249
-Kresse IV/1 82
„ -Mohn IV/1 34, 35, 36
Gaultheria procumbens L. V/3 1620
Gelbkraut IV/1 489
Gemüsekohl IV/1 249
Gewürznelkenbaum V/2 777
Gilbkraut IV/1 24
Glycine hispida Maxim. IV/3 1622
Goldrute VI/1 409
Gummiwurz, Große V/2 1362
Gurke VI/1 323; VII 35 Fig. 1059

H.

Hagebutte IV/2 988
Hanf III 134, 135
Hartriegel, Roter V/2 1547
Harzklee IV/3 1385
Haselnuss III 74; VII Fig. 1105, 1107, 1118
Heckenrose IV/2 988
Hedeoma pulegioides Pers. V/4 2281
Helianthus annuus L. VI/1 511
Heliotropium corymbosum V/3 2131
Hennah-Strauch V/2 747
Hesperis tristis L. IV/1 466
Hirtentäschel IV/1 367
Honigklee IV/3 1237
Hopea Roxb. V/1 534
Hopfen III 132
Horn-Mohn, Gelber IV/1 24
Hundsrose IV/2 988
Hydnocarpus Gaertn. V/1 656
Hyoscyamus niger L. V/4 2577
Hyperanthera Moringa Vahl IV/1 491
Hyssopus officinalis L. V/4 2359

I.

Illicium IV/1 14; VII 175 Fig. 1218 f, g
Illipe König V/3 1896
Impatiens L. V/1 313
Indigo, Deutscher IV/1 199
Iris L. II 285
Isatis tinctoria L. IV/1 199
Isoptera V/1 534

J.

Jasmin, Echter V/3 1906; VII 198 Fig. 1239
Jasminum L. V/3 1906
Jatropha curcas L. V/1 120
Johanniswedel IV/2 974
Juglans regia L. III 10; VII 36 Fig. 1061
Juniperus communis L. I 90; VII 152 Fig. 1180

K.

Kajeputbaum V/2 787
Kakao V/1 492
Kamille, Echte VI/2 582
„ , Römische VI/1 536
Kastanie, Echte III 105; VII 27 Fig. 1050
Kiefer I 98
Kirsche IV/2 1083
Kirschlorbeer IV/2 1063
Klette VI/2 827
Kohl L. IV/1 236
Koriander V/2 1073
Krauseminze V/4 2352, 2354
Kraut IV/1 249
Kreuzkümmel V/2 1139
Krummholzkiefer I 101
Küchenkohl IV/1 249
Kümmel, Wiesen- V/2 1185
Kürbis VI/1 325
Kuhblume VI/2 1089

L.

Lathyrus tuberosus L. IV/3 1593
Lavandula latifolia Vill. V/4 2277
officinalis Chaix ex Vill. V/4 2278, 2279
„ Stoechas L. V/4 2275
Lavendel, Echter V/4 2278, 2279
Lawsonia inermis L. V/2 747
Lein V/1 22, 23, 30
Leindotter IV/1 370, 371
Lepidium sativum L. IV/1 82
Lewat IV/1 254
Linde V/1 436
Linum usitatissimum L. V/1 22, 23, 30
Lippia L. V/3 2235
Liquidambar Orientalis Miller IV/2 656
„ styraciflua L. IV/2 656
Litsea sebifera Bl. IV/1 11
Löffelkraut, Echtes IV/1 139
Löwenzahn VI/2 1089
Lorbeerkirsche IV/2 1063

M.

Madia sativa Mol. VI/1 533
Mädesüß IV/2 974
Mais I 180; VII 41 Fig. 1068
Majorana Miller V/4 2333
Mandarine V/1 59
Mandelbaum IV/2 1088, 1090, 1091
Mangifera Indica L. V/1 215
Mangobaum V/1 215
Marille IV/2 1098
Mastix-Strauch V/1 231

Matricaria Chamomilla L. VI/2 582
Melaleuca L. V/2 787
„ Leucodendron L. V/2 787
Melia Azedarach L. V/1 85
Melilotus elegans IV/3 1237
Melissa officinalis L. V/4 2305
Melisse V/4 2305
Melone VI/1 320
Mentha crispa V/4 2354
piperita Hudson V/4 2355
Pulegium L. V/4 2341
„ spicata L. V/4 2352
Mesua L. V/1 500
Mimusops L. V/3 1896
Moringa aptera Gaertn. V/2 772
Moschus-Schnabelkraut IV/3 1725
Murraya paniculata Jacq. V/1 54
Muskatnuss IV/1 15; I/CLV Fig. 290
Myristica fragrans Houttuyn IV/1 15
Myroxylon Forst. IV/3 1144; V/1 656
Myrte V/2 791, 793
Myrtus L. V/2 789
communis L. V 2 791, 793

N.

Nachtviole IV/1 466
Naraspflanze VI/1 315
Nyctanthes arbor-tristis L. V/3 1906

O.

Ochnaceae V/1 494
Ocimum L. V/4 2269, 2270
„ Basilicum L. V/4 2269
Oelbaum V/3 1937, 1942
Olea Europaea L. V/3 1937, 1942
Onopordon Acanthium L. VI/2 922
Opopanax Chironium L. V/2 1362
Origanum L. V/4 2327
vulgare L. V/4 2332

P.

Palaquium Blanco V/3 1896
Pangium edule Reinw. V/1 656
Papaver somniferum L. IV/1 34, 35, 36
Paullinia L. V/1 307
Payena Bankensis Burck V/3 1896
Peganum Harmala L. V/1 41
Pelargonium Burm. IV/3 1667
Pentadesma butyraceum V/1 502
Persea gratissima Gaertn. IV/1 11
Perückenstrauch V/1 229
Petersilie V/2 1158
Petroselinum hortense Hoffm. V/2 1158
Peucedanum Oreoselinum Moench V/2 1389
Pfefferminze V/4 2355
Pfersing IV/2 1095
Pfirsich IV/2 1095
Pflaume IV/2 1112
Pimenta acris Wight V/2 777
Pimpernuss, Wilde V/1 260
Pimpinella Anisum L. V/2 1211
Pinus montana Mill. I 101
„ silvestris L. I 98
Pirus communis L. IV/2 701
Pistacia L. V/1 232
Poga oleosa Pierre V/2 769
Pogostemon Desf. V/4 2273
Polei V/4 2341
Polygala butyracea Heck V/1 90
Pomeranze V/1 59 u. f.
Prunus Amygdalus Stokes IV/2 1088, 1090, 1091
Armeniaca L. IV/2 1100
avium L. IV/2 1083
Brigantiaca Vill. IV/2 1096
domestica L. IV/2 1112
Laurocerasus L. IV/2 1063
Mahaleb L. IV/2 1072
nana Stokes IV/2 1086
Padus L. IV/2 1068
„ Persica Sieb. et Zucc. IV/2 1095
Psoralea bituminosa L. IV/3 1385
Pumpelmus V/1 64

Q.

Quendel V/4 2326; VII 200 Fig. 1241
Quitte IV/2 692
„ Japanische IV/2 693
Quittenbaum IV/2 693

R.

Ranunculus Ficaria L. III 544
Raphanus Raphanistrum L. IV/1 278, 285
Raps IV/1 253, 255, 257
Rauh-Birke III 79
Rauke, Gemeine IV/1 203
Raukenkohl IV/1 203
Reps IV/1 253, 255, 257
Reseda Luteola L. IV/1 489
Rettich IV/1 278, 285
Rhus L. V/1 224, 225
Ricinus communis L. V/1 121
Riesen-Eucalyptus V/2 785
Rosa L. IV/2 988
Damascena IV/2 988
„ Gallica IV/2 989
Rosmarinus L. V/4 2522
Roßkastanie V/1 304
Roßminze, Grüne V/4 2352
Rotbuche III 99
Ruchgras I 198
Rüsterstaude IV/2 974
Ruta graveolens L. V/1 72

S.

Salbei V/4 2484
Salvia officinalis L. V/4 2484
Santalum album L. III 151
Sapindus L. V/1 307
Sarepta-Senf IV/1 214, 241
Sassafras officinalis Nees ab Esenbeck IV/1 11
Saussurea DC. VI/2 835
Schafgarbe VI/2 572
Scharbockskraut III 544; IV/1 139
Scharlachquitte IV/2 693
Schleichera Willd. V/1 307
Schopf-Lavendel V/4 2275
Securidaca L. V/1 87
Sellerie Miller V/2 1140
Senfkohl IV/1 203, 238
Senf, Sarepta- IV/1 214, 241
Weißer IV/1 207
„ , Wilder IV/1 268
Serjania Schum. V/1 307
Sesampflanze VI/1 176
Sesamum Indicum L. VI/1 176
Shorea Roxb. V/1 534
Simmondsia Chinensis Link V/1 203
Sinapis alba L. IV/1 207
„ arvensis L. IV/1 268
Soja-Bohne IV/3 1622
Solidago L. VI/1 409
Sonnenblume VI/1 511
Spanische Nuß IV/3 1463; VII 60 Fig. 1096
Speik, Echter VI/1 270
„ , Großer V/4 2277
Spergula arvensis L. III 419
Springkraut V/1 313
Spring-Wolfsmilch V/1 147
Stachelmohn IV/1 20
Staphylea pinnata L. V/1 260
Steinklee IV/3 1237
Steinweichsel IV/2 1072
Stern-Anis IV/1 14; VII 175 Fig. 1218 f, g
Storaxbaum, Amerikanischer IV/3 656
„ , Orientalischer IV/2 656
Styrax L. V/3 1900
Süßkirsche IV/2 1083
Sumach V/1 224, 225
Symphonia L. V/1 502
Syringa vulgaris L. V/3 1916

T.

Taraxacum officinale Weber VI/2 1089
Telfairia Hook. VI/1 315
Terminalia L. V/2 771
Theobroma Cacao L. V/1 492
Thymian V/4 2308; VII 200 Fig. 1241
Thymus L. V/4 2306; VII 200 Fig. 1241
Serpyllum L. V/4 2326; VII 200 Fig. 1241
„ vulgaris L. V/4 2308
Tilia L. V/1 436
„ cordata Mill. V/1 442
Traubenkirsche IV/2 1068
Trauerbaum V/3 1906
Trichadenia Ceylanica Thw. V/1 656
Triphasia Aurantiola Lour. V/1 54

V.

Valeriana Celtica L. VI/1 270
„ officinalis L. VI/1 268
Vateria Indica L. V/1 534
Veilchen V/1 590
Viola L. V/1 590
Vogelkirsche IV/2 1083

W.

Wacholder I 90; VII 152 Fig. 1180
Walnußbaum III 10
Weichsel, Türkische IV/2 1072
Weinraute V/1 72
Weiß-Birke III 79
Wermut VI/2 655
Winter-Linde V/1 442
Wunderbaum V/1 121

X.

Xanthoxylum L. V/1 47
Xanthophyllum lanceolatum J. J. S. V/1 87

Y.

Ysop V/4 2359

Z.

Zea Mays L. I 180; VII 41 Fig. 1068
Zistrose V/1 555
Zitrone V/1 66 u. f.
Zitronenstrauch V/3 2235
Zwergmandel IV/2 108
Zwetschge IV 1112

f) Pflanzen, die Farb- und Gerbstoffe, Gummi, Harz u. dgl. liefern.

A.

Abies Miller I 82
Acacia Willd. IV/3 1124, 1125
Acer platanoides L. V/1 283 u. f.
Ackerdistel VI/2 906
Acker-Rittersporn III 488
Acorus Calamus L. II 136
Aesculus Hippocastanum L. V/1 303
Ailanthus excelsa Roxb. V 1 80
„ glandulosa Desf. V/1 82
Akazie, Echte IV/3 1124, 1125
„ , Falsche IV/3 1397 u. f.
Albizzia Durezz. IV/3 1123
Aleurites Forst. V/1 120
Alkanna tinctoria Tausch V/3 2205, 2206
Alkannawurzel V/3 2205, 2206
Alstonia R. Br. V/3 2049
Amyris balsamifera L. V/1 53
Andromeda polifolia L. V/3 1654
Anthemis tinctoria L. VI/1 538
Arctostaphylos Uva ursi L. V/3 1661
Aristotelia Maqui L'Hérit. V/1 426
Artemisia Absinthium L. VI/2 656
Arve I 105
Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv. II 199
Astragalus L. IV/3 1143, 1404
Atractylis gummifera L. VI/2 824
Avicennia Lc. V/3 2238

B.

Badan VII 179
Balsam-Tanne I 82
Banyan III 124
Baptisia tinctoria R. Br. IV/3 1146
Barringtonia Forst. V/2 767
Bellucia grossularioides Triana V/2 795
Berberis vulgaris L. IV/1 9
Berberitze IV/1 9
Bergenia crassifolia Engl. VII 179
Bergflockenblume VI/2 967
Besenginster IV/3 1189
Besenpfriem IV/3 1189; VII 183 Fig. 1226 B
Betula verrucosa Ehrh. III 79
Birke III 79
Bixa Orellana L. V/1 584
Blakea P. Br. V/2 795
Blasenstrauch IV/3 1460
Blauholzbaum IV/3 1128
Blutholzbaum IV/3 1127
Blut-Weiderich V/2 761
Blutwurz IV/2 884
Borago officinalis L. V/3 2232
Borretsch V/3 2232
Braunelle, Große V/4 2384
Brombeere IV/2 773
Bruguiera Lam. V/2 769
Buchanania latifolia Roxb. V/1 215
Bursera L. V/1 84
Butea monosperma Taub. IV/3 1626

C.

Caesalpinia L. IV/3 1127
Calendula officinalis L. VI/2 803
Calluna vulgaris Hull V/3 1698
Calophyllum L. V/1 500
Calotropis R. Br. V/3 2063
Canarium Rumph. V/1 84, 534
Caragana arborescens Lam. IV/3 1401
Carpodinus R. Br. V/3 2049
Carthamus tinctorius L. VI/2 987, 988
Cassine crocea O. Kuntze V/1 245
Castilloa elastica Cerv. III 123
Centaurea montana L. VI/2 967
Cercis Siliquastrum L. IV/3 1135
Cereus Haw. V/2 684
Ceriops Arn. V/2 769
Chaerefolium silvestre Schinz et Thellung V/2 1022
Chenopodium Vulvaria L. III 222
Chlorophora tinctoria D. Don III 124
Chondrilla graminea Bieb. VI/2 1072
Chrozophora Necker V/1 120
Cichorium Intybus L. VI/2 996
Circaea Lutetiana L. V/2 879
Cirsium arvense L. VI/2 906
Cistus salviifolius L. V/1 558
Cladrastis Rafin. IV/3 1145
Clitandra Benth. V/3 2049
Clitoria L. IV/3 1626
Clusia L. V/1 500
Colutea arborescens L. IV/3 1460
Comarum palustre L. IV/2 809; VII 100 Fig. 1129
Commiphora Jacq. V/1 83, 84
Copaifera L. IV/3 1130
„ copallifera Benn. IV/3 1131
Coriaria L. V/1 213
Cornus mas L. V/2 1553
„ sanguinea L. V/2 1547
Coronilla L. IV/3 1465
Cotinus Coggygria Miller V/1 228
Crataegus Oxyacantha L. IV/2 734
Crocus sativus L. II 297
Croton lacciferus L. V/1 120
Cryptostegia R. Br. V/3 2063

D.

Daphne Mezereum L. V/2 712, 713
Datisca cannabina L. V/1 663
Daucus Carota L. V/2 1526; VII 126
Delphinium Consolida L. III 488
Dillenia L. V/1 494
Diospyros Lotus L. V/3 1899
Diploknema sebifera Pierr. V/3 1896
Dipsacus silvester Huds. VI/1 282
Dipterocarpus Gaertn. V/1 534
Dirlitze V/2 1553
Discaria febrifuga Mart. V/1 322
Doona Thouars V/1 534
Dorema D. Don V/2 1357
Drosera L. IV/2 502
Drosera Whittakeri Planch. IV/2 499
Dryobalanops Gaertn. V/1 534

E.

Eberesche IV/2 710
Elsbeerbaum IV/2 721
Edelnuß III 10
Edeltanne I 82
Efeu V/2 924, 925
Eiche III 106, 107
„ , Indische V/2 767
Elaeagnus L. V/2 730
Empetrum nigrum L. V/3 1607
Enzian V/3 1954
Erbsenstrauch IV/3 1401
Erdrauch, Gemeiner IV/1 48

Erica L. V/3 1700
Erythroxylon L. V/1 38; VII 185 Fig. 1229
Esche V/3 1931; VII 54 Fig. 1088
Eucalyptus L'Hérit. V/2 782, 786
Eugenia Jambos L. V/2 779
Eupatorium L. IV/1 402, 403
Euphorbia L. V/1 119
„ resinifera Berg V/1 124
Evonymus Europaea L. V/1 252

F.

Färber-Ginster IV/3 1200
-Kamille VI/1 538
-Saflor VI/2 987, 988
-Scharte VI/2 928
-Waid IV/1 198
„ -Wau IV/1 489
Farbkraut IV/3 1200
Faulbaum V/1 348
Feigenbaum III 124
Felsenkirsche IV/2 1072
Feronia elephantum Correa V/1 54
Ferula L. V/2 1356
Feuer-Mohn IV/1 31; VII 18 Fig. 1016
Fichte I 85; VII 52 Fig. 1084
Fichtenspargel V/3 1602
Ficus L. III 123, 124
elastica Roxb. VII 169 Fig. 1209
Filipendula Ulmaria (L.) Maxim. IV/2 974
Föhre I 98
Forsteronia G. F. W. Mey. V/3 2049
Fouquiera splendens Engelm. V/1 493
Frangula Alnus Miller V/1 348
Fraxinus Chinensis Roxb. V/3 1920
excelsior L. V/3 1931; VII 54 Fig. 1088
Fumaria officinalis L. IV/1 48

G.

Gänsefuß, Stinkender III 222
Gagelstrauch III 11
Galium Mollugo VI/1 197
Garcinia L. V/1 501, 502
Gaspeldorn IV/3 1192
Gelbholz IV/3 1145; V/1 47; VII 168, 184
Gelbkraut IV/1 489
Genista tinctoria L. IV/3 1143, 1199, 1200
Gentiana L. V/3 1954
Geranium silvaticum IV/3 1686
Gerberstrauch V/1 213
Ginster, Englischer IV/3 1192
Glaux maritima L. V/3 1868
Glockenheide V/3 1700
Gluta Renghas L. V/1 216
Götterbaum V/1 82
Gold-Gilbweiderich V/3 1861
Goldrute, Gemeine VI/1 410
Guajacum officinale L. V/1 40
Guajava V/2 775
Guayule-Oelpflanze VI/1 533
Gummibaum VII 169 Fig. 1209
Gummiwurz, Große V/2 1362
Gymnocladus Lam. IV/3 1129

H.

Haematoxylon Brasiletto Krst. IV/3 1128
„ campechianum L. IV/3 1127
Hakendorn IV/3 1124
Hancornia Gomez V/3 2049
Hartriegel, Roter V/2 1547
Hasenklee IV/3 1653
Hauhechel IV/3 1227
Hedera Helix L. V/2 924, 925
Heidekraut V/3 1698
Heidelbeere V/3 1679, 1681
Hennah-Strauch V/2 747
Hevea Aubl. V/1 118, 119
Hexenkraut, Gemeines V/2 879
Hippophaë rhamnoides L. V/2 740
Holunder, Schwarzer VI/1 239
Honigklee IV/3 1238
Hopea Roxb. V/1 534
Hottonia palustris L. V/3 1836
Humiria floribunda Mart. V/1 37
Hymenaea Courbaril L. IV/3 1131
Hypericum perforatum L. V/1 530

I.

Icica Aubl. V/1 84
Impatiens L. V/1 312
Indigo, Deutscher IV/1 198
Indigofera L. IV/3 1143
„ tinctoria L. IV/3 1383
Iris Pseudacorus L. II 294
Irvingia Hook. V/1 80
Isatis tinctoria L. IV/1 198

J.

Johannisbrot, Wildes IV/3 1135
Johanniskraut, Echtes V/1 530
Johanniswedel IV/2 974
Judasbaum IV/3 1135
Juglandaceae III 7
Juglans regia L. III 10; VII 36 Fig. 1061
Juniperus communis L. I 90; VII 152 Fig. 1180
Jussieua L. V/2 799

K.

Kalmus II 136
Karde, Wilde VI/1 282
Kellerhals V/2 712, 713
Kickxia Dum. V/3 2049
Kiefer I 98
Kohl-Gänsedistel VI/2 1109
Kokospalme II 130
Krähenbeere V/3 1607
Krameria triandra Ruiz et Pavon IV/3 1135
Krapp IV/1 231/232
Kreuzdorn V/1 329
Kronwicke IV/3 1465

L.

Lachenknoblauch V/4 2532
Lärche I 95
Lafoënsia Vand. V/2 746
Laguncularia racemosa Gaertn. V/2 773
Lamium album L. V/4 2447
Landolphia Pal. V/3 2049
Lannea Rich. V/1 217
Larix decidua Mill. I 95
Lawsonia inermis L. V/2 747
Lebachbaum IV/3 1123
Leonurus Cardiaca L. V/4 2393
Ligustrum vulgare L. V/3 1949
Lithospermum L. V/3 2153
Löwenschwanz V/4 2393
Loranthaceae III 145
Loranthus Europaeus Jacq. III 150
Lotospflaume V/3 1899
Lotwurz V/3 2179
Lycopus Europaeus L. V/4 2388
Lysimachia vulgaris L. V/3 1861
Lythrum Salicaria L. V/2 761

M.

Mammea L. V/1 500
Mädesüss IV/2 974
Mallotus Philippinensis Müll.-Aarg. V/1 125
Mangifera Indica L. V/1 215
Mangobaum V/1 215
Manihot Adans. V/1 119
Mascarenhasia DC. V/3 2049
Mastixdistel VI/2 824
Mastix-Strauch V/1 231
Maulbeerbaum III 127
„ , Schwarzer III 130
Meerstrand-Milchkraut V/3 1868
Melanorrhoea usitata Wallr. V/1 216
Melastoma malabathricum L. V/2 795
Melilotus Hill IV/3 1238
Memecylon L. V/2 795, 796
Menyanthes trifoliata L. V/3 1960
Mespilus Germanica L. IV/2 741
Micrandra siphonioides Benth. V/1 119
Mimosa elegans hort. IV/3 1123
Mimusops Balata Gaertn. V/3 1896
Mispel IV/2 741
Mistel, Weisse III 149
Möhre V/2 1526; VII 126
Monotropa Hypopitys L. V/3 1602; VII 105 Fig. 1136
Moorbeere V/3 1685
Morus L. III 127
„ nigra L. III 130
Myrica L. III 11
coriaria DC. V/2 777
Gale L. III 11

Myricaceae III 11
Myroxylon L. f. IV/3 1144

N.

Nerium tinctorium Roxb. V/3 2056
Nyctanthes arbor-tristis L. V/3 1906
Nymphaea alba L. III 443; VII 62 Fig. 1097

O.

Ochnaceae V/1 494
Ochrocarpus Thouars V/1 500
Ononis spinosa L. IV/3 1227
Onosma L. V/3 2179
Opopanax Chironium L. V/2 1362
Ourouparia Gambir Baill. VI/1 196
Oxalis Acetosella L. IV/3 1653

P.

Pachylobus hexandrus (Griseb.) Engl. V/1 84
Pachynocarpus Hook. f. V/1 534
Palaquium Blanco V/3 1895
Palasabaum IV/3 1626
Panax L. V/2 913
Papaver Rhoeas L. IV/1 31; VII 18 Fig. 1016
Parthenium argentatum A. Gray VI/1 533
Paullinia Cupana H. B. et Kth. V/1 307
Peganum Harmala L. V/1 41
Periploca Graeca L. V/3 2064
Perückenstrauch V/1 228
Pfersing IV/2 1095
Pfirsich IV/2 1095
Phoradendron Nutt. III 145
Phthirusa Mart. III 145
Phyllanthus emblica Willd. V/1 120
Phytolacca Americana L. III 266
„ decandra L. V/1 394
Picea excelsa Link. I 85; VII 52 Fig. 1084
Picramnia Sw. V/1 80
Pinus L. I 107, 108
Cembra L. I 105
„ silvestris L. I 98
Pistacia L. V/1 231, 233
Plossabaum IV/3 1626
Podophyllum peltatum L. IV/1 5
Polygala tinctoria Vahl V/1 90
Polygonum alpinum All. III 193; VII 171
Pometia Forst V/1 307
Potentilla erecta (L.) Hampe IV/2 884
Pradosia lactescens Radek. V/3 1897
Preisselbeere V/3 1674
Prosopis L. IV/3 1126
Protium Burm. V/1 84
Prunella grandiflora Jacq. V/4 2384
Prunus Mahaleb L. IV/2 1072
Persica Sieb. et Zucc. IV/2 1095
Prunus spinosa L. IV/2 1105
Psidium L. V/2 775
Pterocarpus L. IV/3 1496

Q.

Quercus L. III 106, 107
„ Robur L. III 111
Quillaja saponaria Molina IV/2 663

R.

Rainweide V/3 1949
Rauh-Birke III 79
Reaumuria L. V/1 544
Reseda Luteola L. IV/1 489
Rhamnus L. V/1 329
Rheedia L. V/1 501
Rhizophora L. V/2 769
Rhus L. V/1 220, 221, 224, 225, 226
Rhynchanthera DC. V/2 795
Riemenblume, Europäische III 150
Ringelblume VI/2 803
Robinia Pseudacacia L. IV/3 1397, 1399
Rosmarinheide V/3 1654
Rosskastanie V/1 303
Rotholzbaum IV/3 1127
Rot-Klee IV/3 1341
Rottanne I 85
Rubia cordifolia L. VI/1 231
„ tinctorum L. VI/1 231/232
Rubus fruticosus L. IV/2 773
Rüsterstaude IV/2 974
Ruhrbirne IV/2 721
Rumex hymenosepalus Torr. III 167

S.

Safran, Echter II 297
Salix L. III 15
Sambucus Ebulus L. VI/1 237
„ nigra L. VI/1 239
Sanddorn V/2 740
Sapindus L. V/1 307
Sapium P. Br. V/1 119
Sarothamnus Wimmer IV/3 1189
Satureja vulgaris Fritsch V/4 2297
Sauerdorn IV/1 9
Sauerklee IV/3 1653
Sauerschotenbaum IV/3 1145
Saxifraga crassifolia L. (gerbstoffliefernd) IV/2 566; VII 179
Schinopsis V/1 217
Schinus L. V/1 217
Schlehdorn IV/2 1105
Schnurbaum IV/3 1145
Schraubenbohne IV/3 1126
Schwarzdorn IV/2 1105
Schwertlilie, Gelbe II 294
Seerose, Weisse III 443; VII 62 Fig. 1097
Seidelbast V/2 712, 713
Semecarpus Anacardium L. V/1 218
Serratula tinctoria L. VI/2 928
Shorea Roxb. V/1 534
Silberregen IV/3 1397, 1399
Solidago Virga aurea L. VI/1 410
Sonnentau IV/2 499, 502
Sonchus oleraceus L. VI/2 1109
Sophora Japonica L. V/1 329; IV/3 1145
Sorbus aucuparia L. IV/2 710
„ torminalis (L.) Crantz IV/2 721
Sperberbaum IV/2 721
Spitz-Ahorn V/1 283 u. f.
Spitzklette VI/1 499
Spondias L. V/1 216
Springkraut V/1 312
Stechginster IV/3 1192
Steckenkraut V/2 1356
Steinklee IV/3 1238
Steinsame V/3 2153
Steinweichsel IV/2 1072
Steinwurzel IV/3 1227
Sterculia L. V/1 492
Stinkkraut III 222
Stragel IV/3 1404
Struthanthus Mart. III 145
Styrax L. V/3 1900
„ officinalis L. V/3 1900
Sumach V/1 220/1, 224/6
Sumpf-Bitterklee V/3 1960
-Blutauge IV/2 809
„ -Wasserfeder V/3 1836
Symphonia L. V/1 502
Symplocos L. V/3 1900
Syzygium Gaertn. V/2 780

T.

Tabernaemontana L. V/3 2049
Tamarinde IV/3 1130
Tamarindus Indica L. IV/3 1130
Tamarix L. V/1 546, 547
Tamonea Aubl. V/2 795
Taubnessel, Weisse V/4 2447
Tectona grandis L. V/3 2236
Terminalia L. V/2 771
Teucrium Scordium L. V/4 2532
Thalictrum aquilegifolium L. III 589
Tibouchina Aubl. V/2 795
Tiekbaum V/3 2236
Topobea levigata Naud. V/2 795
Tormentill IV/2 884
Trachylobium Hayne IV/3 1131
Traganth IV/3 1404
Trauerbaum V/3 1906
Trifolium pratense L. IV/3 1341

U.

Ulex L. IV/3 1192
Urceola Roxb. V/3 2049

V.

Vaccinium Myrtillus L. V/3 1679, 1681
uliginosum L. V/3 1685; VII 116 Fig. 1150
Vitis Idaea L. V/3 1673

Vateria L. V/1 534
Vatica L. V/1 534
Veilchen, Wohlriechendes V/1 652
Veilchenholz IV/3 1124
Ventilago maderaspatana Gaertn. V/1 322
Viola odorata L. V/1 652
Viscum album L. III 149
Vismia V/1 499
Vitex L. V/3 2237
Vogelbeerbaum IV/2 710

W.

Wacholder I 90; VII 152, Fig. 1180
Wachs-Esche V/3 1920
Wald-Storchschnabel IV/3 1686
Walnussbaum III 10
Wasserdost VI/1 402, 403
Wegwarte VI/2 996
Weichsel, Türkische IV/2 1072
Weiderich V/2 761
Weiss-Birke III 79
Weissdorn, Stumpfgelappter IV 2 734
Weisstanne I 82
Wermut VI/2 656
Wiesenkerbel V/2 1022
Wiesen-Klee IV/3 1341
„ -Raute, Akeleiblätterige III 589
Willoughbya Roxb. V/3 2049
Wirbeldost V/4 2297
Wolfstrapp V/4 2388
Woodfordia Salisb. V/2 744

X.

Xanthium L. VI/1 499
Xantorrhoea Australe R. Br. II 278
hastilis R. Br. II 278

Z.

Zirbelkiefer I 105
Zistrose, Salbeiblätterige V/1 558
Zizyphus Juss. V/1 323
Zwerg-Holunder VI/1 237

g) Faser-, Geflecht- und Gespinstpflanzen
(Besen und Weidenruten, Scheuerkräuter).

A.

Abelmoschus Medikus V/1 454
Adansonia digitata L. V/1 489
Agave L. II 317
Agriopyrum iunceum Pal. I 387
„ repens (L.) Pal. I 384
Alfa I 202
Alnus glutinosa Gaertn. III 94; VII 50 Fig. 1080
Althaea cannabina L. V/1 465
„ officinalis L. V/1 469
Ammi L. V/2 1171
Ammophila arenaria Roth I 237
Anoda Cav. V/1 456
Anona L. IV/1 15
Apocynum L. V/3 2050
Artocarpus incisa Forst. III 124
Arundo Donax L. I 271
Asclepias L. V/3 2064
„ Cornuti Decaisne V/3 2065
Aster salignus Willd. VI/1 433

B.

Bambuseen I 402
Bärlapp I 66
Barringtonia Forst. V/2 767
Bauhinia L. IV/3 1133
Baumheide V/3 1707
Baumkohl IV/1 246
Baumwollbaum VII 188
Baumwolle V/1 462—63
Beaumontia Wallich. V/3 2051, 2064
Besenginster IV/3 1188; VII 183, Fig. 1226 B
Besenkraut III 251
Besenpfriem IV/3 1188; VII 183 Fig. 1226 B
Besen-Radmelde III 251
Besenried I 276
Betula nana L. III 82; VII 133 Fig. 1173
verrucosa Ehrh. III 79
Binse II 7, 29, 32, 147
Binsenginster IV/3 1215; VII 183, Fig. 1226 B
Birke III 79
Bixa Orellana L. V/1 584
Blau-Segge II 94
Boehmeria nivea (L.) Hook. et Arn. III 137
Bombax L. V/1 489
Bombay-Hanf IV/3 1147
Brachypodium pianatum (Huds.) Pal. I 371; VII 106 Fig. 1138
Brennessel, Grosse III 140, 141
Broussonetia Kazinoki Sieb. III 124
Bruch-Weide III 21
Buchs V/1 212
Butea monosperma Taub. IV/3 1626
Butomus L. I 158
Buxus sempervirens L. V/1 212

C.

Calluna vulgaris Hull V/3 1699
Calophyllum L. V/1 500
Calotropis R. Br. V/3 2063
Camelina sativa Crantz IV/1 371
Cannabis sativa L. III 134, 135
Caragana arborescens Lam. IV/3 1401
Carex L. II 7, 64, 69, 94
arenaria L. II 63
brizoides L. II 7, 64
glauca Murray II 94
paniculata L. II 64, 69
„ vulpina L. II 64
Carica L. V/1 661
Carludovica Ruiz et Pav. II 157
Ceiba pentandra Gaertn. V/1 489
Cerbera L. V/3 2050
Chayote VI/1 314
Chinagras III 137
Chorisia H. B. et Kth. V/1 489
Clematis Vitalba L. III 513
Cochlospermum Kunth V/1 493
Cocos nucifera L. II 130
Coir (Cocos) II 130
Corchorus L. V/1 428, 429
Cornus L. V/2 1545
„ sanguinea L. V/2 1548
Corylus Avellana L. III 75
Crotalaria L. IV/3 1143, 1147
„ juncea L. IV/3 1147
Cucumis Melo L. VI/1 320
Curatella L. V/1 494
Cuscuta Europaea L. V/3 2100
Cynosurus cristatus L. I 297
Cyperus Papyrus L. II 10

D.

Daemia R. Br. V/3 2063
Daphne L. V/2 705
„ papyracea Sieb. V/2 701
Datisca cannabina L. V/1 663
Deschampsia caespitosa (L.) Pal. I 245
Dipsacus sativus Honckeny VI/1 283
Dirca palustris L. V/2 702
Dornmyrte II 265

E.

Edgeworthia Meisn. V/2 701
Eibe I 80
Eibisch V/1 469
Elaeagnus L. V/2 730
Empetrum nigrum L. V/3 1607; VII 43 Fig. 1072
Enodium caeruleum Gaud. I 276
Epilobium angustifolium L. V/2 818
Equisetum L. I 53; VII 102 Fig. 1133
Erbse IV/3 1617
Erbsenstrauch IV/3 1401
Erica arborea L. V/3 1707
Eriophorum L. II 17
Erle III 94; VII 50 Fig. 1080

Eselsdistel VI/2 922
Esparto I 196, 202
Eucalyptus L'Hérit. V/2 786
Eugenia L. V/2 780

F.

Faulbaum V/1 348
Flachs V/1 20 u. f.
„ , Neuseeländischer II 277
Flachslilie II 277
Flechtbinse II 7, 29, 32
Föhre I 98
Fourcroya Schult. II 317
Frangula Alnus Miller V/1 348

G.

Genista L. IV/3 1199
Genisteen IV/3 1143
Ginster, Spanischer IV/3 1215
Giradinia heterophylla Decne. III 137
Glaskraut III 142
Glas-Weide III 21
Glyceria aquatica (L.) Wahlenb. I 322
Gnidia eriocephala Meisn. V/2 701
Gomphocarpus L. V/3 2063, 2064
Gossypium L. V/1 462, 463
Grewia L. V/1 429

H.

Halfa I 202
Hanf III 134, 135
„ , Bengalischer IV/3 1147
Hartriegel, Roter V/2 1548
Haselnuß III 75
Hasenklee IV/3 1158
Hedysarum lagopodioides IV/3 1143
Heidekraut V/3 1699
Hibiscus L. V/1 454, 460
Hopfen III 132; VII 80 Fig. 1114
Hornstrauch V/2 1545
Humulus Lupulus L. III 132; VII 80 Fig. 1114

I.

Igelkolben I 116

J.

Jamsbohne IV/3 1624
Juncus L. II 147
Jute V/1 428, 429

K.

Kammgras I 297
Kellerhals V/2 705
Kiefer I 98
Knorpelmöhre V/2 1171
Kochia scoparia (L.) Schrad. III 251
Korb-Weide III 24
Korn I 389
Krähenbeere V/3 1607; VII 43 Fig. 1072

L.

Lagetta Juss. V/2 701
Lannea Barteri (Oliv.) Engl. V/1 217
Laportea Canadensis Gaudich. III 137
Lecythis Pisonis Camb. V/2 767
Lein V/1 20 u. f.
Leindotter IV/1 371
Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Decne. V/3 2063
Ligustrum vulgare L. V/3 1949
Linde V/1 431, 436
Linodendron Lagetta Griseb. V/2 701
Linum usitatissimum L. V/1 20 u. f.
Louisiana-Moos II 143
Luffa cylindrica Röm. VI/1 315
Lupine, Gelbe IV/3 1158
Lupinus L. IV/3 1143, 1153
„ luteus L. IV/3 1158
Luzula Lam. et DC. II 173; VII 53 Fig. 1086
Lycopodium clavatum L. I 66
Lygeum spartum L. I 196

M.

Mäusedorn, Stechender II 265
Mais I 179, 180
Malachra L. V/1 454
Mammea L. V/1 500
Manniophyton V/1 120
Marsdenia tenacissima W. et Arn. V/3 2063
Mastix-Strauch V/1 231
Maulbeerbaum, Weisser III 129
Melastoma denticulatum Labill. V/2 795
Melone VI/1 320
Mitsumata V/2 701
Mohrenhirse I 185
Molinia caerulea Moench I 276
Morus alba L.

N.

Napaea dioeca L. V/1 454, 456
Nilghirrie-Nessel III 137

O.

Ochroma lagopus Sw. V/1 489
Onopordon Acanthium L. VI/2 922

P.

Pachyrrhizus bulbosus Britton IV/3 1624
Palasabaum IV/3 1626
Pandanus L. I 116
Pappel III 59, 63
Parietaria L. III 142
Pavonia spinifex W. V/1 454
Pfahlrohr I 271
Pfeifengras, Blaues I 276
Phalaris arundinacea L. I 197
Phormium tenax Forster II 277
Phragmites communis Trin. I 272
Pinus silvestris I 98
Pipturus argenteus Wedd. III 137
Pistacia L. V/1 232
Pisum sativum L. IV/3 1617
Plossabaum IV/3 1626
Polygala butryacea Heck V/1 90
Populus L. III 59
„ nigra L. III 63
Pueraria hirsuta (Thunb.) C. K. Schneider IV/3 1625
„ Novo-Guineensis IV/3 1625
Purpur-Weide III 24

R.

Rainweide V/3 1949
Ramie III 137
Raphia pedunculata Pal. V/1 432
Rasenschmiele I 245
Rauh-Birke III 79
Reispapierbaum V/2 911
Ricinus communis L. V/1 123
Riesenkohl IV/1 246
Rispen-Segge II 69
Roggen I 389
Rohr I 271, 272
Rohrkolben I 112, 113; VII 134 Fig. 1173 C
Rosshaar, Vegetabilisches II 143
Rot-Erle III 94; VII 50 Fig. 1080
Ruscus aculeatus L. II 265

S.

Sacci II 317
Salix L. III 15
alba L. III 23
-Bastarde III 51, 56
excelsior Host III 51
fragilis L. III 21
palustris Host III 51
purpurea L. III 24
viminalis L. III 27
„ viridis Fries III 51
Sanseviera Thunb. II 280
Sarothamnus Wimmer IV/3 1143, 1188
Schachtelhalm I 53; VII 102 Fig. 1133
Schilfrohr I 272
Schlangenmoos I 66
Schneeball, Wolliger VI/1 242; VII 206 Fig. 1256
Schraubenbaum I 116
Schwalbenwurz V/3 2073
Schwamm-Kürbis VI/1 315
Schwanenblume I 158
Schwarz-Erle III 94
„ -Pappel III 63
Scirpus lacustris (L.) II 7, 29; VII 116 Fig. 1151
maritimus L. II 7
„ silvaticus L. II 32
Secale Cereale L. I 389
Sechium edule Jacq. VI/1 314
Securidaca L. V/1 87
Seebinse II 29; VII 116 Fig. 1151
Seegras I 142

Segge II 64, 69, 94
„ , Blaugrüne II 94
Seidenpflanze V/3 2065
Seiden-Wollbaum VII 188
Sesbania Scop. IV/3 1143, 1390
Sida L. V/1 456
„ rhombifolia L. V/1 454
Silber-Oelweide V/2 730
Silber-Weide III 23
Simse II 7, 29, 32; VII 53 Fig. 1086
Sisalhanf II 317
Sorghum cernuum Host I 185
„ saccharatum Pers. I 185
Sparganium L. I 116
Spartium junceum L. IV/3 1215; VII 183 Fig. 1226
Stipa tenacissima L. I 202
Strophanthus DC. V/3 2051
Sunn-Hanf VI/3 1147

T.

Taxus baccata L. I 80
Teich-Binse II 29; VII 116 Fig.
Tetrapanax papyrifer K. Koch V/2 911
Thespesia lampas Dalz. et Gibs. V/1 454
Thymelaea hirsuta Endl. V/2 725
Tilia L. V/1 431, 436
Tillandsia usneoides L. II 143
Toquillo-Palme II 131
Tragia cannabina L. V/1 120
Trauer-Weide III 56
Trichospermum Javanicum Bl. V/1 428
Triticum Spelta L. I 392
Turmkraut, Kahles IV/1 394
Turritis glabra L. IV/1 394
Typha L. I 112, 113; VII 134 Fig. 1173 C

U.

Ulme III 118
Ulmus L. III 118
Urena L. V/1 454, 457
Urtica cannabina L. III 137
dioeca L. III 137, 139, 140, 141

V.

Vegetabilisches Rosshaar II 143
Ventilago maderaspatana Gaertn. V/1 322
Viburnum Lantana L. VI/1 242; VII 206 Fig. 1256
Vigna Savi IV/3 1143
Vincetoxicum officinale Moench V/3 2073
Vitex L. V/3 2237

W.

Wald-Flechtbinse II 32
Waldhaar I 245; II 64
Waldrebe III 513
Wald-Weidenröschen V/2 818
Weber-Karde VI/1 283
Weide III 15, 21, 56
„ , Kaspische III 56
Weiden-Bastarde III 51, 56
Weiß-Birke III 79
Wikstroemia Endl. V/2 701
Wissadula Med. V 1 454
Wolfsbohne IV/3 1153
Wollgras II 17
Wunderbaum V/1 123

X.

Xylopia L. IV/1 15

Y.

Yaxci II 317
Yucca L. II 279

Z.

Zea Mays L. I 179, 180
Zittergras-Segge II 64
Zostera marina L. I 142
Zwergbirke III 82; VII 133 Fig. 1173
Zypergras II 10

h) Nutz- und Handelshölzer.

A.

Abies alba Mill. I 82; VII 57 Fig. 1092
Acacia Willd. IV/3 1124, 1125
Acanthosyris Griseb. III 151
Acer L. V/1 270, 271, 273
campestre L. V/1 288
Monspessulanum L. V/1 290
Negundo L. V/1 294
Opalus Miller V/1 293
platanoides L. V/1 283, 284
„ Pseudoplatanus L. V/1 279
Adansonia digitata L. V/1 489
Adlerholz V/2 700
Aegiphila L. V/3 2236
Aegle Marmelos Correa V/1 54
Aeschynomene L. IV/3 1143
„ Elaphroxylon Taub. IV/3 1462
Aesculus Hippocastanum L. V/1 305
Affenbrotbaum V/1 489
Afzelia bijuga Coleb. IV/3 1130
Agave L. II 318
Ahlkirsche IV/2 1067
Ahorn V/1 270, 271, 273
Ailanthus glandulosa Desf. V/1 82
„ Malabarica DC. V/1 80
Akazie, Echte IV/3 1124, 1125
„ , Falsche IV/3 1397
Albizzia Durazz. IV/3 1123
Alnus glutinosa Gaertn. III 92; VII 50 Fig. 1080
incana (L.) Moench III 91
viridis (Chaix) Lam. et DC. III 89
Alpen-Goldregen IV/3 1166
Altingia excelsa Noronha IV/2 656
Amarelle IV/2 1077
Ambatsch IV/3 1462
Amyris balsamifera L. V/1 53
Ancoumea Klaineana Pierre V/1 83
Andira Lam. IV/3 1496
Anisophyllea R. Br. V/2 769
Anogeissus Wallich. V/2 773
Anonaceae IV/1 15
Apeibea Tibourbou Aubl. V/1 428
Apfelbaum IV/2 753
Aphania Bl. V/1 307
Aprikose IV/2 1100
Aquilaria L. V/2 700
Arbutus Unedo L. V/3 1666
Arve I 104
Astronia papetaria Blume V/2 795
Astronium Jacq. V/1 217
Atalantia Correa V/1 54
Aucuba Japonica Thunb. V/2 1539
Avicennia Lc. V/3 2238
Azadirachta Indica L. V/1 85

B.

Balanites Aegyptiaca Delile V/1 41
Bambuseen I 402
Barringtonia Forst. V/2 767
Baumheide V/3 1707
Berberis vulgaris L. IV/1 8
Berberitze IV/1 8
Berg-Ahorn V/1 279
„ -Erle III 89
Bergföhre I 101
Berrya Amomilla Roxb. V/1 427
Besenginster IV/3 1188 B
Betula L. III 79; VII 67 Fig. 1101
Binsen-Ginster IV/3 1213; VII 183 Fig. 1226 B
Birke III 79; VII 67 Fig. 1101
Birnbaum IV/2 702
Blasenstrauch IV/3 1461
Bohnenbaum IV/3 1162
Brombeere IV/2 773
Brownlowia Roxb. V/1 427
Bruguiera Lam. V/2 769
Buche III 99
Buchs V/1 211
Bucida buceras L. V/2 773
Bulnesia Gay V/1 40
Buxus sempervirens L. V/1 211

C.

Caesalpinia L. IV/3 1127
Callistemon R. Br. V/2 788

Calluna vulgaris (L.) Hull V/3 1698
Caraipa Aubl. V/1 499
Carpinus Betulus L. III 68
Castanea sativa Mill. III 104; VII 27 Fig. 1050
Cedrela odorata L. V/1 85
Celtis australis L. III 123
Cercis Siliquastrum L. IV/3 1135
Cereus Haw. V/2 684
Ceriops Arn. V/2 769
Chloroxylon Swietenia DC. V/1 52
Chukrasia tabularis A. Juss. V/1 85
Citharexylum L. V/3 2236
Colutea arborescens L. IV/3 1461
Combretum primigenum Marloth V/2 772
Conocarpus erecta Jacq. V/2 773
Cordia L. V/3 2124; VII 200
Cornus L. V/2 1541
mas L. V/2 1553
„ sanguinea L. V/2 1548
Corylus Avellana L. III 74
„ colurna L. III 71
Cotinus Coggygria Miller V/1 229
Crataegus Oxyacantha L. IV/2 734
Cratoxylon Blume V/1 499
Crescentia Cujete L. VI/1 176
Curtisia faginea Ait. V/2 1539

D.

Dalbergia L. IV/3 1496
Dalbergieen IV/3 1143
Dattelpflaume V/3 1897, 1898
Dillenia L. V/1 494
Diospyros Dalech. V/3 1897, 1898
„ Lotus L. V/3 1899
Dipholis DC. V/3 1897
Dirlitze V/2 1553

E.

Eberesche IV/2 710
Edel-Kastanie III 104; VII 27 Fig. 1050
Edelnuß III 9, 10
Edeltanne I 82; VII 57 Fig. 1092
Efeu V/2 924, 925
Ehretia L. V/3 2124
Eibe I 80
Eiche III 106, 110, 111
„ , Indische V/2 767
Eisenholzbaum V/2 780
Elaeocarpus Burm. V/1 426
Elsbeerbaum IV/2 721
Elsebeere IV/2 1067
Entandrophragma V/1 85
Epicharis III 151
Erdbeerbaum V/3 1666
Erica arborea L. V/3 1707
Erioglossum Bl. V/1 307
Erle III 91, 94; VII 50 Fig. 1080
Erythrina Corallodendron L. IV/3 1626
Esche V/3 1920, 1931; VII 54 Fig. 1088
Eschen-Ahorn V/1 294
Espe III 62
Eucalyptus L'Hérit. V/2 782, 785, 786
„ Globulus Labill. V/2 784, 785
Euclea Pseudebenus E. Mey. V/3 1897
Eugenia ligustrina Mig. V/2 780
Evonymus L. V/1 247
„ Europaea L. V/1 252
Exocarpus cupressiformis Labill. III 151

F.

Fagara L. V/1 47
Fagus silvatica L. III 99
Faulbaum V/1 348
Feigenbaum III 124
Feld-Ulme III 118
Felsenkirsche IV/2 1071
Fichte I 88; VII 52 Fig. 1084
Ficus Sycomorus L. III 124
Fieberbaum V/2 784, 785
Flieder, gemeiner V/3 1916
Flindersia V/1 52
Föhre I 97
Frangula Alnus Miller V/1 348
Fraxinus L. V/3 1920
excelsior L. V/3 1931; VII 54 Fig. 1088
Ornus L. V/3 1925; VII 198 Fig. 1238
Frühlings-Ahorn V/1 293

G.

Gaspeldorn IV/3 1192
Ginkgo biloba L. I 74
Ginster, Englischer IV/3 1192
Götterbaum V/1 82
Goldregen IV/3 1162
Goupia tomentosa Aubl. V/1 245
Grau-Erle III 91
Grün-Erle III 89
Guajacum L. V/1 39

H.

Hainbuche III 68
Haploclathra Benth. V/1 499
Hartriegel, Roter V/2 1548
Hasel, Türkische III 71
Haselnuss III 74
Hedera Helix L. V/2 924/5
Heeria Meissn. V/1 217
Heidekraut V/3 1698
Hennah-Strauch V/2 748
Herminiera L. IV/3 1462
Hippophaë rhamnoides L. V/2 740
Holunder, Schwarzer VI/1 239
Hopfenbuche III 70; VII 168 Fig. 1207
Hornstrauch V/2 1541
Hovenia Thunb. V/1 324
Hypelate trifoliata Sw. V/1 307

I.

Ilex Aquifolium L. V/1 243
Irvingia Hook. V/1 80

J.

Jacaranda Juss. VII 204
Johannisbrot IV/3 1135
Judasbaum IV/3 1135
Juglandaceae III 7
Juglans regia L. III 9, 10

K.

Känguruhdorn IV/3 1124
Kajeputbaum V/2 787
Kastanie, Echte III 104; VII 27 Fig. 1050
Khaja Senegalensis Juss. V/1 85
Kiefer I 97
Kielmeyera Mart. V/1 499
Krummholzkiefer I 101

L.

Laburnum Medikus IV/3 1143, 1162
„ alpinum Presl IV/3 1166
Lärche I 95; VII 131 Fig. 1171
Lafoënsia Vand. V/2 746
Lannea Rich. V/1 217
Larix decidua Mill. I 95; VII 131 Fig. 1171
Lawsonia inermis L. V/2 748
Lebachbaum IV/3 1123
Lecythis L. V/2 767
Leptospermum Amboinense Reinw. V/2 789
Ligustrum vulgare L. V/3 1949
Linde V/1 430; VII 188 Fig. 1231
Liquidambar styraciflua L. IV/2 656
Lotospflaume V/3 1899
Lumnitzera racemosa Willd. V/2 773

M.

Maackia Amurensis Ruprecht et Maxim. IV/3 1146
Machaerium Pers. IV/3 1496
Mahagonibaum, Roter V/2 786
Malus communis Lam. IV/2 753
Mangifera Indica L. V/1 215
Mangobaum V/1 215
Manna-Esche V/3 1925; VII 198 Fig. 1238
Mansonia Gagei I. R. Drumm. VI/1 492
Marille IV/2 1100
Massholder V/1 288
„ , Französischer V/1 290
Mastix tetrandra Clarke V/2 1538
„ -Strauch V/1 231
Maulbeerbaum, Weisser III 129
Maulbeer-Feigenbaum III 124
Mehlbeerbaum IV/2 716
Mehlbeere, Schwedische IV/2 717
Melaleuca Leucodendron L. V/2 787
Melanorrhoea usitata Wallr. V/1 216
Melia Azedarach L. V/1 85
Memecyclon edule Roxb. V/2 796
Mespilus Germanica L. IV/2 741
Mesua L. V/1 500

Metrosideros Banks V/2 780
Mimusops Balata L. V/3 1897
Mispel IV/2 741
Morus alba L. III 129
Mouriria Aubl. V/2 795, 796
Murraya paniculata Jacq. V/1 54
Myrceugenia Berg V/2 777
Myricaria germanica Desv. V/1 551
Myroxylon Forst. V/1 656
Myrte V/2 791
Myrtus communis L. V/2 791

N.

Nelkenpfeffer-Myrte V/2 776

O.

Ochnaceae V/1 494
Ochrocarpus Thouars V/1 500
Oelbaum V/3 1934, 1943
Oldfieldia Africana Hook. V/1 120
Olea L. V/3 1934
„ Europaea L. V/3 1943
Ostrya carpinifolia Scop. III 70; VII 168 Fig. 1207
Osyris tenuifolia Engler III 151
Oxelbirne IV/2 717

P.

Palm-Weide III 36
Pappel III 57, 58, 61, 62
Pentace Burmanica S. Kurz V/1 427
Perückenstrauch V/1 229
Phillyrea L. V/3 1919
Physcalymma scaberrimum Pohl V/2 746
Picea excelsa Link I 87; VII 52 Fig. 1084
Pimenta officinalis Berg V/2 776
Pimpernuss V/1 260
Pinus L. I 96, 97
Cembra L. I 104
montana Mill. I 101
nigra Arnold I 107
silvestris L. I 97
„ Strobus L. I 97
Pirus communis L. IV/2 702
Pistacia L. V/1 231, 233
Pithecolobium Mart. IV/3 1123
Platane IV/2 659
Platanus L. IV/2 659
„ Occidentalis L. IV/2 660
Platonia Mart. V/1 502
Pockholz V/1 39
Populus L. III 57, 58
alba L. III 61
„ tremula L. III 62
Prosopis L. IV/3 1126
Prunus Armeniaca L. IV/2 1100
avium L. IV/2 1084
Cerasus L. IV/2 1077
Mahaleb L. IV/2 1071
Padus L. IV/2 1067
„ spinosa L. IV/2 1105
Pseudocedrela Harms V/1 85
Ptaeroxylon obliguum Radlkofer V/1 85
Pterocarpus L. IV/3 1143, 1496
„ santalinus L. III 151
Purgier-Kreuzdorn V/1 335

Q.

Quercus L. III 106
Cerris L. III 115
Robur L. III 110
sessiliflora Salisb. III 111

R.

Rainweide V/3 1949
Rauh-Birke III 79
Reynosia Griseb. V/1 324
Rhamnus cathartica L. V/1 335
„ rupestris Scop. V/1 350
Rhizophora Mangle V/2 769
Rhus L. V/1 223, 226
Rispelstrauch, Deutscher V/1 551
Robinia L. IV/3 391
„ Pseudacacia L. IV/3 1397
Rohrkolben I 113; VII 134 Fig. 1173 C
Rosskastanie V/1 305
Rot-Buche III 99
-Eiche III 106
-Erle III 94
„ -Tanne I 88
Rubus fruticosus L. IV/2 773
„ Idaeus L. IV/2 773
Ruhrbirne IV/2 721

S.

Sabiaceen V/1 309
Sal-Weide III 36
Salix L. III 15
„ caprea L. III 35
Sambucus nigra L. VI/1 239
Sanddorn V/2 740
Sapindus L. V/1 307
Sarcomphalus V/1 324
Sarothamnus Wimmer IV/3 1188
Sauerdorn IV/1 8
Sauerkirsche IV/2 1077
Sauerschotenbaum IV/3 1145
Santalum album L. III 151
Schinopsis Engler V/1 217
Schlehdorn IV/2 1105
Schnurbaum IV/3 1145
Schraubenbohne IV/3 1126
Schwarzdorn IV/2 1105
Schwarz-Erle III 94; VII 50 Fig. 1080
„ -Föhre I 107
Sideroxylon L. V/3 1897
Silberbaum L. IV/2 716
Silber-Pappel III 61
-Regen IV/3 1397
Sommer-Eiche III 110
„ -Linde V/1 452
Sophora Japonica L. IV/3 1145
Sorbus Aria (L.) Crantz IV/2 716
Sorbus aucuparia L. IV/2 710
domestica All. IV/2 713
Suecica (L.) Krok et Almquist IV/2 717
„ torminalis (L.) Crantz IV/2 721
Soymida febrifuga Juss. V/1 85
Spartium junceum L. IV/3 1215; VII 183 Fig. 1226 B
Spazierstock-Palme VII 157
Speierling IV/2 713
Sperberbaum, Wilder IV/2 721
„ , Zahmer IV/2 712
Spindelstrauch V/1 247
Spitz-Ahorn V/1 283, 284
Stadmannia Sideroxylon DC. V/1 307
Staphylea pinnata L. V/1 260
Stechginster IV/3 1192
Stein-Eiche III 111
-Linde V/3 1919
„ -Weichsel IV/2 1071
Stiel-Eiche III 110
Storaxbaum, Amerikanischer IV/2 656
Strychnos L. V/3 1951
Süsskirsche IV/2 1084
Sumach V/1 223, 226
Swietenia Jacq. V/1 85
Sykomore III 124
Syringa vulgaris L. V/3 1916
Syzygium Gaertn. V/2 780

T.

Taxus baccata L. I 80
Tectona grandis L. V/3 2236
Tepualia stipularis Griseb. V/2 780
Thouinia Poit. V/1 307
Tiekbaum V/3 2236
Tilia L. V/1 430; VII 188 Fig. 1231
cordata Mill. V/1 441
„ platyphyllos Scop. V/1 452
Toonia Roem. V/1 85
Trauben-Eiche III 111
-Kirsche IV/2 1067
Triplochiton R. Schum. V/1 492
Tristania R. Br. V/2 780
Typha L. I 113; VII 134 Fig. 1173 C

U.

Ulex L. IV/3 1192
Ulme III 118
Ulmus L. III 118
campestris L. III 118

V.

Vitex L. V/3 2237
Vogelbeerbaum IV/2 710
Vogel-Kirsche IV/2 1084

W.

Wald-Mahagonibaum V/2 786
Walnussbaum III 9, 10
Warburgia Stuhlmanni Engler V/1 585

Weichsel IV/2 1077
„ , Türkische IV/2 1071
Weide III 15, 36
Weissbaum IV/2 716
Weiss-Birke III 79
„ -Buche III 68
Weissdorn, Stumpfgelappter IV/2 734
Weiss-Erle III 91
-Pappel III 61
„ -Tanne I 82
Weymouths-Kiefer I 97
Winter-Eiche III 111
-Linde V/1 441

X.

Xerospermum Bl. V/1 307

Z.

Zerr-Eiche III 115
Zirbelkiefer I 104
Zitter-Pappel III 62
Zizyphus Juss. V/1 323
Zürgelbaum, Südlicher III 123

i) Futter- und Düngerpflanzen (Gräser, Rüben, Klee, Bienenfutterpflanzen usw.).

A.

Acer L. V/1 270
campestre L. V/1 288
Opalus Miller V/1 293
„ platanoides L. V/1 283
Achillea Millefolium L. VI/2 573
Ackerbohne, Schwarze IV/3 1555
Acker-Distel VI/2 906
-Fuchsschwanz I 217
-Gänsedistel VI/2 1105
-Honigklee IV/3 1245
-Klee, Gelber IV/3 1292
-Spark III 419
„ -Winde V/3 2089
Acorus Calamus L. II 136
Adlerfarn I 37
Agriopyrum repens (L.) Pal. I 384
Agrostis alba L. I 172, 224
alpina Scop. I 172, 227
rupestris All. I 172, 227
„ vulgaris With. I 172, 225
Ahorn V/1 270
Ailanthus glandulosa Desf. V/1 82
Akazie, Falsche IV/3 1398
Albizzia Durazz. IV/3 1123
Alchemilla L. IV/2 945
„ vulgaris L. IV/2 969
Alfilaria IV/3 1723
Algarobas-Linse IV/3 1515
Alnus glutinosa Gaertn. III 94; VII 50 Fig. 1080
Alopecurus myosuroides Huds. I 217
„ pratensis L. I 172, 217, 218
Alpen-Ampfer III 173
-Hafer, Bunter I 258
-Klee IV/3 1316
-Knöterich III 194
-Kratzdistel VI/2 603
-Kreuzkraut VI/2 749
-Liebstock V/2 1322
-Lieschgras I 172, 213
-Rasenklee IV/3 1309
-Rispengras I 172, 311
-Schwingel, Niedriger I 349
-Straussgras I 172, 227
-Süssklee IV/3 1487
„ -Wegerich I 172; VI/1 192
Alsike-Klee IV 1299 u. f.
Ampfer III 167
Anethum graveolens L. V/2 1294
Anger-Trespe I 360
Angolaerbsen IV/3 1624
Anis V/2 1212
Anthoxanthum odoratum L. I 172, 199
Anthyllis Vulneraria L. IV/3 1363
Arabis Caucasica Willd. IV/1 396
Arachis hypogaea L. IV/3 1464; VII 60 Fig. 1096
Arrhenatherum elatius Mert. et Koch I 172, 262
Artemisia vulgaris L. VI/2 640
Arundinaria Michx. I 173, 402
Asclepias Cornuti Decaisne V/3 2065
Astragalus L. IV/3 1405
falcatus Lam. IV/3 1405
frigidus A. Gray IV/3 1417; VII 183 Fig. 1227
„ glycyphyllus L. IV/3 1422
Atropis distans (L.) Grisebach I 324
„ maritima Griseb. I 324
Augenbohne IV/3 1624
Avena brevis Roth I 254
nuda L. I 254
pratensis L. I 172, 258
pubescens Huds. I 172, 256
sativa L. I 254
strigosa Schreb. I 254; VII 154
versicolor Vill. I 172, 258

B.

Bärenschote, Süsse IV/3 1422
Barbaraea vulgaris R. Br. IV/1 303
Barbenkraut, Echtes IV/1 303
Basilie V/4 2270
Bastard-Klee IV/3 1299 u. f.
Batate V/3 2077
Baumkohl IV/1 246
Beckmannia Host. I 265; VII 155
Beifuss VI/2 640
Beisskohl III 215
Benediktenkraut VI/2 991
Berg-Ampfer III 182
-Bärwurz V/2 1303
„ -Trespe I 172
Bermudagras I 264
Besenginster IV/3 1188
Besenkraut III 251
Besenpfriem IV/3 1188
Besen-Radmelde III 251
Besenried I 172, 276, 278
Beta esculenta Salisb. III 215
Beta hortensis Mill. III 215
sativa Bernh. III 215
vulgaris L. III 215; VII 74 Fig. 1109 c
Betula L. III 79; VII 67 Fig. 1101
Bibernelle IV/2 941
Große IV/2 939
, Kleine V/2 1207
Bienen-Kugeldistel VI/2 809
Binse II 38
„ Stumpfblütige II 167
Binsen-Ginster IV 3 1213; VII 183 Fig. 1226 B
Birke, Gemeine III 79; VII 67 Fig. 1101
Bitterkraut VI/2 1040
Blasen-Segge II 120
Blasenstrauch IV/3 1460
Blattkohl IV/1 246
Blau-Segge II 94
Blechnum spicant With. I 35
Bluthirse I 187
Blutklee IV/3 1329 u. f.
Blutkopf IV/2 939
Blut-Weiderich V/2 761
Blutwurz IV/2 884
Bocksbart VI/2 1042, 1356 Fig. 961
Bockshorn IV/3 1133
Bockshornklee IV/3 1233
Bodenkohlrabi IV/1 255
Bodenrübe IV/1 255
Bohne IV/3 1631
Borsten-Schwingel I 340
Borstgras I 372; VII 82 Fig. 1116
Bouteloua Lagasca I 265; VII 155
Brachrübe IV/1 261
Brachypodium pinnatum Pal. I 172, 371; VII 106 Fig. 1138
Brassica Napus L. IV/1 253, 256
nigra (L.) Koch IV/1 238
„ Rapa L. IV/1 257
Braun-Klee IV/3 1297
Brennessel, Große III 141
Briza media L. I 172, 294.
Bromus erectus Huds. I 172, 359
inermis Leyss. I 355, 360
racemosus L. I 365
Schraderi Kunth I 355
unioloides (Willd.) Humb. et
„ Kunth I 355, 369
Bruke IV/1 255

Buche III 99
Buchloë Engelm. I 265; VII 155
Buchs V/1 212
Buchweizen III 208
„ , Tatarischer III 209
Buda rubra Dum. III 423
Büschelschön V/3 2119
Bunium Bulbocastanum L. V/2
Bunt-Schwingel I 348
Burgunderrübe III 215
Buxus sempervirens V/1 212

C.

Cactus Indicus L. V/2 689
Calla palustris L. II 136; VII 77 Fig. 1113
Calluna vulgaris Hull V/3 1698
Camelina sativa Crantz IV/1 371
Campanula patula L. VI/1 361; VI/2 1359 Fig. 963
Cannabis sativa L. III 135
Caragana arborescens Lam. IV/3 1401
Carex L. II 7, 52, 54, 62, 69, 71, 72, 78, 81, 82, 84, 94, 96, 104, 105, 108, 115, 119, 120, 121, 122
acutiformis Ehrh. II 7, 121
brizoides L. II 7
Buxbaumii Wahlenb. II 7, 84
curvula All. II 71; VII 51 Fig. 1082
Davalliana Sm. II 7, 54
disticha Huds. II 7, 62
ferruginea Scop. II 96, 108
firma Host II 105; VII 112 Fig. 1147
glauca Murray II 94
Goodenowii Gay II 7, 82
gracilis Curtis II 81
Hornschuchiana Hoppe II 115
lasiocarpa Ehrh. II 122
leporina L. II 72, 96
pallescens L. II 96
paniculata L. II 7, 69
paradoxa Willd. II 7
riparia Curtis II 7, 121
rostrata Stokes II 7, 119
sempervirens Vill. II 96, 104; VII 109 Fig. 1143
stricta Good. II 7, 78; VII 69 Fig. 1104
teretiuscula Good. II 7
vesicaria L. II 7, 120
„ vulpina L. II 7, 52
Carpinus Betulus L. III 68
Carthamus tinctorius L. VI/2 989
Carum Carvi L. V/2 1184
Castanea sativa Mill. III 104; VII 27 Fig. 1050
Catabrosa aquatica Pal. I 288
Catjangbohne IV/3 1624
Centaurea Jacea L. VI/2 949
Ceratochloa unioloides Pal. I 369
Ceratonia Siliqua L. IV/3 1133
Chaerefolium silvestre Schinz et Thellung V/2 1022
Chayote VI/1 314
Chenopodium album L. III 227
„ glaucum L. III 230
Cicer arietinum L. IV/3 1501
Cichorium Endivia L. VI/2 999
„ Intybus L. VI/2 996
Circaea Lutetiana L. V/2 879
Cirsium arvense L. VI/2 906
lanceolatum Hill VI/2 875
„ spinosissimum Scop. VI/2 903
Cistus L. V/1 555
Cnicus Benedictus L. VI/2 991
Colutea arborescens L. IV/3 1460
Comfrey V/3 2221
Convolvulus arvensis L. V/3 2089
Coriandrum sativum L. V/2 1074
Coriaria L. V/1 213
Coronaria Flos cuculi L. III 299
Coronopus procumbens Gilib. IV/1 94
Corylus Avellana L. III 75
Crataegus Oxyacantha L. IV/2 734
Crepis biennis L. VI/2 1165
Cucurbita Pepo L. VI/1 334
Cudrania tricuspidata Bur. III 124
Cynodon dactylon Pers. I 264
Cynosurus cristatus I 172, 297

D.

Dactylis glomerata L. I 172, 295
Dactyloctenium Willd. I 265; VII 155
Daucus Carota L. V/2 1510, 1516, 1517, 1522, 1526; VII 126
Deschampsia caespitosa Pal. I 244
Dill V/2 1294
Dolichos Lablab L. IV/3 1624
Dorschen IV/1 255
Doschen IV/1 255
Drachenkopf V/4 2361
Drachenwurz II 136; VII 77 Fig. 1113
Dracocephalum Moldavica L. V/4 2361
Dreizahn I 172

E.

Eberesche IV/2 710
Echinops sphaerocephalus L. VI/2 809
Edelkastanie III 104; VII 27 Fig. 1104
Eiche III 111
Eleusine Gaertn. I 265; VII 155
Elodea I 160
Endivie VI/2 999
Epilobium angustifolium L. V/2 818
Erbse IV/3 1614
Erbsenstrauch IV/3 1401
Erdbirne VI/1 515
Erd-Eichel IV/3 1593
Erdkastanie V/2 1194
Erdkohlrabi IV/1 255
Erdmäuse IV/3 1593
Erdnuss IV/3 1464; VII 60 Fig. 1096
Erdrübe IV/1 255
Eriophorum L. II 17
„ polystachyon L. II 7
Erle III 94; VII 50 Fig. 1080
Erodium cicutarium L'Hérit. IV/3 1723
Erve, Einblütige IV/3 1515
Esche V/3 1932
Esparsette, Spanische IV/3 1485
Eucalyptus corynocalyx F Müll. V/2 785
Euchlaena Mexicana Schrad. I 178

F.

Faden-Klee IV/3 1290
Faden-Segge II 122
Färber-Saflor VI/2 989
„ -Waid IV/1 199
Fagopyrum esculentum Moench III 208
„ Tataricum Gaertn. III 209
Fagus silvatica L. III 99
Fahnenhafer I 255
Falten-Schwaden I 320
Felsen-Kirsche IV/2 1072
-Schwingel I 336
-Storchschnabel IV/3 1709
„ -Straußgras I 172, 227
Fenchel V/2 1289; VII 193 Fig. 1234
Fennich, Welscher I 193
Ferkelkraut VI/2 1015
Ferula communis L. V/2 1355
Festuca arundinacea Schreb. I 172, 345
Halleri All. I 336
heterophylla Lam. I 340
ovina L. I 172, 333
pratensis Huds. I 172, 343
rubra L. I 172, 342
rupicaprina (Nyman) Hackel I 172, 337
„ varia Haenke I 349
Fettmiere III 405
Fieder-Zwenke I 172, 371; VII 106 Fig. 1138
Filipendula hexapetala Gilib. IV/2 975
„ Ulmaria (L.) Maxim. IV/2 974
Finger-Hirse I 265; VII 155
Finger-Hundszahn I 264
Fioringras I 172, 224
Flachs V/1 22
Flaschen-Segge II 119
Flaum-Hafer I 172, 256
Flockenblume, Gemeine VI/2 949
Foeniculum vulgare Miller V/2 1289; VII 193 Fig. 1230
Fraxinus excelsior L. V/3 1932; VII 54 Fig. 1088

Fraxinus Ornus L. V/3 1925; VII 198 Fig. 1238
Frauenmantel IV/2 945
„ , Gemeiner IV/2 969
Frühlings-Ahorn V/1 293
Fuchsschwanz I 172, 217, 218
„ -Klee IV/3 1348
Futter-Kohlrabi IV/1 248
-Wicke IV/3 1549, 1550

G.

Gänse-Fingerkraut IV/2 891
Gänsefuß, Meergrüner III 230
„ , Weisser III 227
Gänserich IV/2 891
Galega L. IV/3 1388; 1642 Fig. 1607
Gartenbohne IV/3 1636
Gaspeldorn IV/3 1191, 1192
Geissraute IV/3 1388, 1642 Fig. 1607
Gelbklee IV/3 1257
Gemsen-Schwingel I 172, 337
Genista L. IV/3 1199
Geranium macrorrhizum L. IV/3 1709
„ silvaticum L. IV/3 1685
Gerberstrauch V/1 213
Geröll-Klee IV/3 1310
Gerste I 397, 400
Gilbgras VII 155
Ginster IV/3 1199
„ , Englischer IV/3 1191, 1192
Glanzgras I 172
Glanz-Kätzkraut VI/1 309
Glatthafer, Hoher I 172, 262
Gletscherlinse IV/3 1417
Glyceria aquatica (L.) Wahlenb. I 322
fluitans R. Br. I 320
„ plicata Fries I 320
Glycine hispida Maxim. IV/3 1623
Götterbaum V/1 82
Goldhafer I 172, 249
Gossypium L. V/1 462, 463
Grannenhafer I 246; VII 154
Gratlinse IV/3 1417; VII 183 Fig. 1227
Grützblume IV/1 396
Guizotia Abyssinica Cass. VI/1 532

H.

Haarstrang IV/2 975
Hafer I 172, 254, 255, 256, 258
„ , Türkischer I 255
Hafergras, Buntes I 172
Hahnenkamm IV/3 1492 u. f.
Hahnenkopf, Italienischer IV/3 1485
Hainbuche III 68
Hainsimse, Braune II 182
Hanf III 135
Haselnuß III 75
Hasenbrod I 294
Hasenfuß-Segge II 72
Hasenklee IV/3 1157, 1640 Fig. 1606
Hedysarum coronarium L. IV/3 1485
„ obscurum L. IV/3 1487
Heidekraut V/3 1698
Heidenkorn III 208
Heleocharis palustris (L.) R. Br. II 38
Helianthus annuus L. VI/1 511, 512
debilis Nutt. VI/1 508
„ tuberosus L. VI/1 515
Helmbohne IV/3 1624
Helodea Michx. I 160
Heracleum Sphondylium L. V/2 1454
Herbstrübe IV/1 261
Heu, Wildes heiliges IV/3 1260
Hexenkraut, Gemeines V/2 879
Himmelhopfen, Gemeiner IV/3 1292
„ , Kleiner IV/3 1290
Hippophaë rhamnoides L. V 2 740
Hirschgras VII 155; VII 82 Fig. 1116
Hirse I 186
Hirtennadel IV/3 1723
Holcus lanatus L. I 172, 239
Honckenya peploides Ehrh. III 405
Honiggras, Wolliges I 172, 239
Honigklee IV/3 1238
„ , Weisser IV/3 1245
Hopfenklee IV/3 1257
Hordeum L. I 397
„ secalinum Schreb. I 400
Hornklee IV/3 1370
Horst-Segge II 104; VII 69 Fig. 1104
Huflattich VI/2 680
Hundszahn I 264
Hypochoeris radicata L. VI/2 1015
Hyssopus officinalis L. V/4 2360

I.

Igelkolben I 115
Indigo, Deutscher IV/1 199
Inkarnat-Klee IV/3 1329 u. f.
Ipomoea Batatas Lam. V/3 2077
Isatis tinctoria L. IV/1 199

J.

Johannisbrotbaum IV/3 1133
Johanniswedel IV/2 974
Juncus L. II 148
Gerardi Loisel. II 148
glaucus Ehrh. II 148
„ obtusiflorus Ehrh. II 167
Juniperus Sabina L. I 92

K.

Kaffee, Schwäbischer IV/3 1160
Kaffee-Erbse IV/3 1376
Kalmus II 135
Kammgras I 172, 297
Kammschmiele I 172
Kamm-Segge II 62
Kanariengras I 197
Kartoffel V/4 2603
Kastanie, Echte III 104; VII 27 Fig. 1050
Kicher, Deutsche IV/3 1605
, Kleine IV/3 1604
„ , Wilde IV/3 1601
Kichererbse IV/3 1501
Klatschnelke III 281
Klee, Blaßgelber IV/3 1350
, Gestreifthülliger IV/3 1326
, Kleinblütiger IV/3 1298
Pannonischer IV/3 1351
, Persischer IV/3 1322
, Rasiger IV/3 1309
, Rot- IV/3 1332
„ , Weiss- IV/3 1305
Knäuelgras I 172, 295
Knaulgras, Gemeines I 295
Knöterich III 189, 190
Knollen-Rüsterstaude IV/2 975
Kochia scoparia (L.) Schrad. III 251
Koeleria cristata (L.) Pers. I 172
Kohl-Gänsedistel VI/2 1108, 1109
Kolbenhirse I 193
Komfrey V/3 2221
Kopfbinse, Rostrote II 47
„ Schwärzliche II 46
Koriander V/2 1074
Korn I 389
Krähenfuss, Niederliegender IV/1 94
Kratzdistel, Gemeine VI/2 875
Krebsschere I 163
Kreuzgras VII 155
Kreuzkraut, Gemeines VI/2 790
Krumm-Segge II 71; VII 51 Fig. 1082
Kuckucks-Lichtnelke III 298
Kümmel, Wiesen- V/2 1185
Kürbis VI/1 334
Kuhblume VI/2 1090
Kuhbohne IV/3 1623
Kuhhornklee IV/3 1233
Kundebohne IV/3 1623
Kurzhafer I 254

L.

Lablabbohne IV/3 1624
Lactuca brevirostris Champ. VI/2 1113
Laichkraut I 122
Lampsana communis L. VI/2 1002
Langbohne IV/3 1623
Lapathum pratense Lam. III 181
Lapsana communis L. VI/2 1002
Lathyrus L. IV/3 1564
Aphaca L. IV/3 1591
Cicera L. IV/3 1604
pratensis L. IV/3 1589
sativus L. IV/3 1605
silvester L. IV/3 1601
„ tuberosus L. IV/3 1593
Lattich VI/2 1113
Lavandula latifolia Vill. V/4 2277
Lavatera L. V/1 472
Leimkraut, Aufgeblasenes III 281

Lein V/1 22
Leindotter IV/1 371
Lemnaceen II 139
Lens culinaris Medikus IV/3 1505
Leontodon hispidus L. VI/2 1030
Leonurus Cardiaca L. V/4 2393
Levisticum officinale Koch V/2 1353
Liebstöckel V/2 1353
Lieschgras I 172, 213, 215
Ligusticum Mutellina Crantz I 172; V/2 1322
Ligusticum mutellinoides Vill. V/2 1325
Linde V/1 432
Linse IV/3 1505
„ , Spanische IV/3 1515
Linum usitatissimum L. V/1 22
Lobularia maritima Desv. IV/1 448
Löwenschwanz V/4 2393
Löwenzahn VI/2 1030, 1090
Lolch I 172
Lolium multiflorum Lam. I 173, 379
„ perenne L. I 172, 380
Lotus L. IV/3 1143
corniculatus L. IV/3 1366, 1370
Tetragonolobus L. IV/3 1376
„ uliginosus Schkuhr IV/3 1373
Lupine, Blaue IV/3 1160
, Gelbe IV/3 1157, 1158
Weisse IV/3 1153
„ , Zottige IV/3 1154
Lupinus L. IV/3 1143, 1151, 1154, 1155
albus L. IV/3 1153
angustifolius L. IV/3 1160
„ luteus L. IV/3 1157, 1158
Luzerne IV/3 1260 u. f.
Luzula spadicea (All.) DC. II 182
Lychnis Flos cuculi L. III 299
Lycopus Europaeus L. V/4 2388
Lythrum Hyssopifolia L. V/2 756
Salicaria L. V/2 761

M.

Maclura aurantiaca Nutt. III 124
Mädesüß IV/2 974
Mais I 180; VII 41 Fig. 1068
Malachium aquaticum Fries III 349
Mandelbaum IV/2 1090
Mangold III 215
Manna-Esche V/3 1925; VII 198 Fig. 1238
Mannaschwaden I 320
Massholder V/1 288
Matten-Lieschgras I 215
Maulbeerbaum III 127
, Schwarzer III 130
„ , Weisser III 128
Maus-Wicke IV/3 1555
Medicago L. IV/3, 1143, 1250
falcata L. IV/3 1260
lupulina L. IV/3 1257
minima Desr. IV/3 1274
sativa L. IV/3 1261 u. f.
Medicago varia Martyn IV/3 1264
Meerschwingel I 324
Meerstrand-Steinkraut IV/1 448
Mehlbeerbaum IV/2 716
Melandrium rubrum Garcke III 300
Melilotus albus Medikus IV/3 1246
altissimus Thuill. IV/3 1243
dentatus Pers. IV/3 1241
Indicus All. IV/3 1248
„ officinalis Medikus IV/3 1245
Melissa officinalis L. V/4 2303, 2305
Melisse V/4 2303
Mentha piperita Hudson V/4 2355
Meum athamanticum Jacq. V/2 1303
„ Mutellina Gaertn. V/2 1322
Mistel III 146
Möhre V/2 1510, 1516, 1517, 1522, 1526; VII 127
Mönchs-Rhabarber III 173
Molinia caerulea Moench I 172, 276, 278
Moor-Segge II 84
Morus L. III 127
alba L. III 128
„ nigra L. III 124, 130
Mucuna Adans. IV/3 1626
Myrrhis odorata Scop. V/2 1045

N.

Nachtkerze, Gemeine V/2 868; VII 192 Fig. 1233
Nackthafer I 254
Nagelkraut IV/2 941
Nardus stricta L. II 372; VII 82 Fig. 1116
Nuphar luteum Sibth. et Sm. III 447

O.

Ocimum Basilicum L. V/4 2270
Oenothera biennis L. V/2 868; VII 192 Fig. 1233
Onobrychis Miller IV/3 1143
„ viciifolia Scop. IV/3 1492 u. f.
Opuntia Miller V/2 683, 684, 688, 689
Ornithopus L. IV/3 1143
compressus L. IV/3 1476
sativus Link IV/3 1479, 1480

P.

Panicum L. I 186
„ sanguinale L. I 187
Parmentiera cerifera Seem. VI/1 176
Pastinaca sativa L. V/2 1411
Pestwurz, Gemeine VI/2 685
Petasites hybridus (L.) Fl. Wett. VI/2 685
Pfefferminze V/4 2355
Pfeifengras, Blaues I 172, 276, 278
Pferdebohne IV/3 1557
Pfersing IV/2 1094
Pfirsich IV/2 1094
Pforschen IV/1 255
Phacelia tanacetifolia Benth. V/3 2119; VII 11 Fig. 989
Phalaris arundinacea L. I 172, 197
„ Canariensis L. I 173, 197
Phaseolus vulgaris IV/3 1636
Phleum alpinum L. I 172, 213
Michelii All. I 215
„ pratense L. I 172, 211, 212
Phragmites communis Trin. I 172, 271, 274
Picris hieracioides L. VI/2 1040
Pimpinella Anisum L. V/2 1212
„ saxifraga L. V/2 1207
Pisum sativum L. IV/3 1614
Plantago alpina L. I 172; VI/1 192
lanceolata L. VI/1 184
„ maior L. VI/1 182
Platterbse, Gelbe IV/3 1589
„ , Rote IV/3 1604
Poa alpina L. I 172, 311
palustris L. I 317
pratensis L. I 172, 307
„ trivialis L. I 305
Polster-Segge II 105; VII 112 Fig. 1147
Polycnemum arvense L. III 212
Polygonum L. III 189, 190
alpinum All. III 194
aviculare L. III 191, 192
„ Bistorta L. III 195
Potamogeton L. I 122
Potentilla Anserina L. IV/2 891
„ erecta (L.) Hampe IV/2 884
Prunus Amygdalus Stokes IV/2 1090
Mahaleb L. IV/2 1072
Persica Sieb. et Zucc. IV/2 1094
Pteridium aquilinum Kuhn I 37
Puffbohne IV/3 1557

Q.

Quecke, Gemeine I 384
Quellgras, Gemeines I 288
Quercus Robur L. III 111

R.

Rainkohl, Gemeiner VI/2 1002
Raps IV/1 253, 256
Rasen-Haargras II 26
Rasenschmiele I 244
Rauh-Birke III 79
Raygras, Englisches I 172, 380
, Französisches I 172, 262
„ , Italienisches I 379
Red-top I 224
Reiherschnabel IV/3 1723
Reps IV/1 253, 256
Ricinus communis L. V/1 123
Riesenkohl IV/1 246
Riesen-Süssgras I 322
Rippenfarn I 35
Rispengras I 172, 305, 307, 311, 317
„ , Gemeines I 305
Rispen-Segge II 69
Robinia Pseudacacia L. IV/3 1398
Roggen I 389; VII 39 Fig. 1065

Roggen-Gerste I 400
Rohr I 271, 274
-Glanzgras I 197
„ -Schwingel I 172, 345
Romeye I 172, 311
Rotbuche III 99
Rot-Klee IV/3 1332
Rotschwingel I 172, 342
Rotspitz I 224
Rosmarinus L. V/4 2520
Rost-Segge II 108
Rot-Erle III 94; VII 50 Fig. 1080
Ruchgras I 172, 199
Rübe, Gelbe V/2 1510, 1516, 1517, 1522, 1526
„ , Weisse III 215
Rüsterstaude IV/2 974
Rumex L. III 167
Acetosa L. III 181
Acetosella L. III 180
alpinus III 173
„ arifolius All. III 182
Runkelrübe III 215; VII 74 Fig. 1109 c
Ruta graveolens L. V/1 73

S.

Saathafer I 254
„ -Platterbse IV/3 1605
Saatrübe IV/1 261
Sadebaum I 92
Salbei, Edler V/4 2484
Salvia officinalis L. V/4 2484
„ viridis L. V/4 2489
Salzblume III 405
Salzmiere III 405
Sanddorn V/2 740
Sandhafer I 254
Sandluzerne IV/3 1264
Sanguisorba officinalis L. IV/2 939
Saponaria officinalis L. III 345
Sarothamnus Wimmer IV/3 1143, 1188
Saubohne IV/3 1557
Sauerampfer, Großer III 181
„ , Kleiner III 180
Saum-Segge II 115
Scabiosa lucida Vill. VI/1 309
Schafgarbe VI/2 573
Schafschwingel I 172, 333
Scharlach-Salbei V/4 2489
Schilfrohr I 172, 271, 274
Schlangen-Knöterich III 195
Schleudersamengras VII 154
Schnabel-Segge II 119
Schoenus ferrugineus L. II 7, 47
„ nigricans L. II 7, 46
Schotenklee IV/3 1370
Schwaden I 320, 322
Schwarz-Erle III 94; VII 50 Fig. 1080
Schwarzwurzel III 127; VI/2 1064
Schweden-Klee IV/3 1299 u. f.
Schwedische Rübe IV/1 255, 256
Schwingel I 172, 324, 333, 336, 337, 340, 343, 345, 348, 349, 352
„ , Schöner I 172, 352
Scirpus maritimus L. II 7
„ silvaticus L. II 7
Scorzonera L. III 127
„ Hispanica L. VI/2 1064
Secale Cereale L. I 389; VII 39 Fig. 1065
Sechium edule Jacq. VI/1 314
Seegras I 142
Segge II 54, 62, 69, 71, 72, 78, 81, 82, 84, 94, 96, 104, 105, 108, 115, 119, 120, 121, 122
, Blaugrüne II 94
, Bleiche II 96
, Feste II 105; VII 112 Fig. 1147
„ , Steife II 78; VII 69 Fig. 1104
Seidenpflanze V/3 2065
Senecio alpinus Scop. VI/2 749
„ vulgaris L. VI/2 790
Senf IV/1 205, 207, 238
, Schwarzer IV/1 238
„ , Weisser IV/1 205, 207
Senfkohl IV/1 238
Serradella IV/3 1479, 1480
„ , Flachhülsige IV/3 1476
Sesamgras I 178
Setaria Italica (L.) Pal. I 172, 193
Seviebaum I 92
Sichelklee IV/3 1260
Sichel-Luzerne IV/3 1260
Sieglingia decumbens (L.) Bernhardi I 172
Silberbaum IV/2 716
Silberhafer I 254
Silberkraut IV/2 891
Silberregen IV/3 1398
Silene inflata Sm. III 281
Sinapis alba L. IV/1 205, 207
Sinau IV/2 945
Soja-Bohne IV/3 1623
Solanum tuberosum L. V/4 2603
Sommer-Eiche III 111
„ -Linde V/1 452
Sonchus arvensis L. VI/2 1105
„ oleraceus L. VI/2 1108/9
Sonnenblume VI/1 511/2
Sorbus Aria (L.) Crantz IV/2 716
„ aucuparia L. IV/2 710
Sorghum cernuum Host I 185
Sparganium L. I 115
Spargelbohne IV/3 1624
Spargelerbse, Rote IV/3 1376
Speckrübe IV/1 255
Speik, Großer V/4 2277
Spergula arvensis L. III 419
Spergularia campestris (All.) Aschers. III 423
Spitz-Ahorn V/1 283
-Segge II 81
-Wegerich VI/1 184
Sporobolus R. Br. I 238
Staudenkohl IV/1 246
Stechginster IV/3 1191, 1192
Steckenkraut V/2 1355
Steckrübe IV/1 255
Steinklee IV/3 1238
, Hoher IV/3 1243
, Kleiner, gelber IV/3 1245
, Kleinblütiger IV/3 1248
Orientalischer IV/3 1248
, Sägeblätteriger IV/3 1241
„ , Weisser IV/3 1246
Steinweichsel IV/2 1072
Stellaria media (L.) Vill. III 352, 353
„ nemorum L. III 352
Sterngras VII 155
Stiel-Eiche III 111
Stinkwacholder I 92
Stoppelrübe IV/1 261
Stragel IV/3 1405
Strandklee IV/3 1241
Stratiotes aloides L. I 163
Straussgras I 172, 223, 224, 225, 227
Rotes I 172, 225
„ , Weisses I 172, 224
Süssdolde V/2 1045
Süssgras I 318; VII 155
Süssholz, Wildes IV/3 1422
Sumpfbinse, Gemeine II 38
Sumpf-Drachenwurz II 136
-Hornklee IV/3 1373
-Rispengras I 317
-Segge II 121
„ -Steinklee IV/3 1243
Symphytum asperum Lepechin V/3 2221

T.

Tagnelke, Rote III 300
Taraxacum officinale Weber VI/ 1090
Taubecher IV/2 969
Taubenkropf III 281
Teichrose, Gelbe III 447
Tellerrübe III 215; IV/2 262
Thalictrum aquilegifolium L. III 589
Tilia L. V/1 432
cordata Mill. V/1 443
„ platyphyllos Scop. V/1 452
Timotheusgras I 172, 211, 212
Torf-Segge II 54
Tormentill IV/2 884
Traganth IV/3 1405
Tragopogon pratensis L. VI/2 1052; 1356 Fig. 961
Trapa natans L. V/2 892
Trauben-Trespe I 365
Trespe I 172, 359, 360, 365
„ , Aufrechte I 359
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. II 7, 26
Trifolium L. IV/3 1143, 1278, 1279
alpestre L. IV/3 1346

Trifolium alpinum L. IV/3 1316
badium Schreber IV/3 1297
campestre Schreber IV/3 1292
filiforme L. IV/3 1290
hybridum L. IV/3 1299 u. f.
incarnatum L. IV/3 1329 u. f.
ochroleucum Hudson IV/3 1350
pallescens Schreber IV/3 1310
Pannonicum L. IV/3 1351
parviflorum Ehrh. IV/3 1298
pratense L. IV/3 1332
repens L. IV/3 1305 u. f.
resupinatum L. IV/3 1322
rubens L. IV/3 1348
striatum L. IV/3 1326
„ Thalii Villars IV/3 1309
Trigonella Foenum Graecum L. IV/3 1233
Tripsacum dactyloides L. I 178
Trisetum flavescens (L.) P. B. I 172, 249
Turnips IV/1 261
Tuskarora-Reis VII 154
Tussilago Farfara L. VI/2 680

U.

Ufer-Segge II 121
Ulex L. IV/3 1143, 1191, 1192
Ulme III 118
Ulmus L. III 118
Unterkohlrabe IV/1 255
Urtica dioeca L. III 141

V.

Vicia L. IV/3 1508
articulata Hornem. IV/3 1515
Cracca L. IV/3 1534
Ervilia Willd. IV/3 1513
Faba L. IV/3 1557
Narbonensis L. IV/3 1555
sativa L. IV/3 1549, 1550
sepium L. IV/3 1540
Vicia villosa Roth IV/3 1535 u. f.
Vigna Sinensis Endlicher IV/3 1623
Viscum album L. III 146
Vogelbeerbaum IV/2 710
Vogelerbse IV/3 1508
Vogelhirse I 193
Vogel-Knöterich III 191, 192
Vogelmiere III 352, 353
Vogelwicke IV/3 1534
„ , Gelbe IV/3 1589
Voralpen-Klee IV/3 1346

W.

Wald-Klee IV/3 1346
-Nelke, Rote III 300
-Sternmiere III 352
-Storchschnabel IV/3 1685
„ -Weidenröschen V/2 818
Wasserdarm, Gemeiner III 349
Wasserhafer I 196
Wasserlinse II 139
Wassernuss V/2 892
Wasserpest I 160
Wasserreis I 196
Wasserrübe IV/1 255, 261
Wasser-Schwaden I 172, 322
Wegerich VI/1 182
Wegwarte VI/2 996
Weichsel, Türkische IV/2 1072
Weiderich, Gemeiner V/2 761
„ , Ysopblätteriger V/2 756
Weinraute V/1 73
Weissbaum IV/2 716
Weiss-Birke III 79; VII 67 Fig. 1101
„ -Buche III 68
Weissdorn IV/2 734
Weiss-Klee IV/3 1305 u. f.
Wendeblumenklee IV/3 1322
Wicke IV/3 1508
Wicklinse IV/3 1513
Wiesen-Bärenklau V/2 1454
-Bocksbart VI/2 1052, 1356 Fig. 961
Wiesen-Fuchsschwanz I 172, 218
-Glockenblume VI/1 361; VI/2 1359 Fig. 963
-Hafer I 172, 258
-Kerbel V/2 1022
-Kicher IV/3 1589
-Klee IV/3 1332
„ „ , Weisser IV/3 1305 u. f.
Wiesenknopf, Grosser IV/2 939
„ , Kleiner IV/2 941
Wiesen-Lieschgras I 211
„ -Pippau VI/2 1165
Wiesenraute, Akeleiblätterige III 589
Wiesen-Rispengras I 172, 307
-Schwingel I 172, 343
„ -Segge II 82
Windhalm I 222; VII 154
Winter-Linde V/1 443
Wolfsbohne IV/3 1151, 1154, 1155
Wolfstrapp V/4 2388
Wollblume IV/3 1363
Wollgras II 17
Wruke IV/1 255
Wunderbaum V/1 123
Wundklee IV/3 1363

Y.

Ysop V/4 2360

Z.

Zaun-Wicke IV/3 1540
Zea Mays L. I 180; VII 41 Fig. 1068
Zittergras I 172, 294
Zizania aquatica L. I 196
Zizyphus Juss. V/1 323, 324
Zostera marina L. I 142
Zottel-Wicke IV/3 1535 u. f.
Zuckerrübe III 215
Zwerg-Mutterwurz V/2 1325
-Schneckenklee IV/3 1274
-Schwingel I 172

k) Arznei- und Giftpflanzen.

A.

Abelmoschus Medikus V/1 458
Abies balsamea Mill. I 108
Abrus precatorius L. IV/3 1498
Acacia Catechu Willd. IV/3 1124
Acanthosicyos horrida Wellw. VI/1 315
Acer campestre L. V/1 288
„ platanoides L. V/1 283
Achillea L. VI/2 551
Millefolium L. VI/2 572
moschata Wulfen VI/2 557
„ Ptarmica L. VI/2 565
Achras Sapota L. V/3 1897
Acker-Durchwachs V/2 1108
Gauchheil V/3 1871
Acker-Honigklee IV/3 1245
Ackermennig IV/2 935
Acker-Rittersporn III 488
-Senf IV/1 268
-Steinsame V/3 2189
-Täschelkraut IV/1 120
-Taubnessel V/4 2452
-Winde V/3 2089
„ -Zweizahn VI/1 518
Acocanthera G. Don V/3 2050
Aconitum L. III 493; VII 174 Fig. 1216
Anthora L. III 494
Cammarum L. III 506
intermedium DC. III 506
Napellus L. III 495, 500
Acorus Calamus L. II 136
Actaea racemosa L. III 477
„ spicata L. III 478
Adansonia digitata L. V/1 489
Adiantum capillus Veneris L. I 38
Adonis vernalis L. III 598
Aegilops L. I 390
Aegle Marmelos Correa V/1 54
Aegopodium Podagraria L. V/2 1215
Aesculus Hippocastanum L. V/1 303, 304
Aethusa Cynapium L. V/2 1275
Affenbrotbaum V/1 489
Agrimonia Eupatoria L. IV/2 935
Agriopyrum repens (L.) Pal. I 384

Agrostemma Githago L. III 274
Ahlbeere IV/2 653
Ahlkirsche IV/2 1067
Ailanthus glandulosa Desf. V/1 82
Ajuga Chamaepitys (L.) Schreb. V/4 2541
„ reptans L. V/4 2543
Akazie, Echte IV/3 1124
„ , Falsche IV/3 1397
Akelei, Gemeiner III 482; VII 9 Fig. 987 e, f
Alangium begoniifolium Harms V/2 770
Alant, Deutscher VI/1 479
, Echter VI/1 476
„ Sparriger VI/1 482
Alchemilla L. IV/2 945
alpina L. IV/2 952
arvensis (L.) Scopoli IV/2 948
„ vulgaris L. IV/2 969
Alhagi Desv. IV/3 1462
Alisma plantago (L.) Michalet I 151; VII 6 Fig. 978
Alkanna tinctoria Tausch V/3 2206
Alkannawurzel V/3 2206
Allamanda L. V/3 2050
Allermannsharnisch II 219
Alliaria officinalis Andrz. IV/1 151
Allium Cepa L. II 233; VII 97 Fig. Fig. 1125
sativum L. II 230
ursinum L. II 230
„ Victorialis L. II 219
Aloë (Tournef.) L. II 277
Succotrina Lam. VII 117 Fig. 1152
Alpen-Ampfer III 173
-Augenwurz V/2 1282
-Glöckel V/3 1721, 1819
-Klee IV/3 1316
„ -Liebstock V/2 1323
Alpenrose V/3 1629 u. f.
Alpen-Scharte VI/2 835
-Veilchen V/3 1846
„ -Wachsblume V/3 2190
Alpinia officinarum Hance II 321
Alstonia R. Br. V/3 2050
Althaea officinalis L. V/1 469
Altingia excelsa Noronha IV/2 656
Amarelle IV/2 1078
Ammania baccifera L. V/2 744
Ammei, Aegyptisches V/2 1168
Ampfer, Alpen- III 173, 174
„ , Stumpfblättriger III 174
Amyris balsamifera L. V/1 53
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. II 324
Anacardium Occidentale L. V/1 216
Anacyclus officinarum Hayne VI/2 673/4
Anagallis arvensis L. V/3 1871
Anagyris foetida L. IV/3 1146
Anamirta Cocculus (L.) Wight et Arnold IV/1 16
Anchietia salutaris St. Hil. V/1 586
Anchusa officinalis L. V/3 2199
Andira Lam. IV/3 1496
Andorn V/4 2396
„ , Schwarzer V/4 2402
Andromeda polifolia L. V/3 1654
Anemone L. III 519
Hepatica L. III 528, 530
pratensis L. III 539; VII 174 Fig. 1217
„ ranunculoides L. III 521
Anethum graveolens L. V/2 1293
Angelica Archangelica L. V/2 1343
„ silvestris L. V/2 1337
Anhalonium Lewinii Henning V/2 684
Anis V/2 1210/11
Anoda Cav. V/1 456
Antennaria dioeca Gaertn. VI/1 457
Anthemis nobilis L. VI/1 536
„ tinctoria L. VI/1 538
Anthyllis Vulneraria L. IV/3 1364
Antiaris toxicaria Lesch. III 123
Apfelbaum IV/2 753
Apium graveolens L. V/2 1145
Aplopappus discoides DC. V/1 657
Apocynum cannabinum L. V/3 2050
Aprikose IV/2 1100
Aquilegia vulgaris L. III 482; VII 9 Fig. 987 e, f
Araceen II 131
Arbutus Unedo L. V/3 1666
Arctium L. VI/2 826/7
Arctostaphylos Uva ursi L. V/3 1661
Argemone Mexicana L. IV/1 20
Aristolochia L. III 162
„ Clematitis L. III 163
Armoracia lapathifolia Gilib. IV/1 307
Arnica montana L. VI/2 707, 708
Aronstab, Gefleckter II 132
Artemisia L. VI/2 628, 629
Abrotanum L. VI/2 635
Absinthium L. VI/2 655
Anthelmintica L. VI/2 666
campestris L. VI/2 670
Dracunculus L. VI/2 637
laxa (Fritsch) VI/2 649
maritima L. VI/2 662, 665, 666
Pontica VI/2 644 u. f.
„ vulgaris L. VI/2 640
Arum maculatum L. II 132
Aruncus silvester Kosteletzky IV/2 673
Arundo Donax L. I 271
Arve I 105
Asarum Europaeum L. III 161, 162
Asclepias L. V/3 2063
„ Cornuti Decaisne V/3 2065
Asparagus officinalis L. II 263
Asperugo procumbens L. V/3 2138
Asperula odorata L. VI/1 202
Asphalt-Klee IV/3 1385
Aspidium filix mas (L.) Sw. I 18
Aspidosperma Quebracho blanco Schlechtendal V/3 2050
Asplenium L. I 25
Ceterach L. I 26; VII 132 Fig. 1172
Ruta muraria L. I 31
„ Trichomanes L. I 26
Aster Amellus L. VI/1 429
Astragalus L. IV/3 1405
exscapus L. IV/3 1411
„ glycyphyllus L. IV/3 1422
Astrantia maior L. V/2 966
Atalantia Correa V/1 54
Athamanta Cretensis L. V/2 1282
„ Macedonica Sprengel V/2 1282
Atractylis gummifera L. VI/2 824
Atropa Belladonna L. V/4 2551, 2568, 2569
Augentrost VI/1 84
Avena sativa L. I 254
Avicennia LC. V/3 2238
Azadirachta Indica L. V/1 85

B.

Bach-Nelkenwurz IV/2 917
Backenklee, Zottiger IV/3 1379
Baeckea frutescens L. V/2 789
Bärenlauch II 230
Bärenschote, Stengellose IV/3 1411
„ , Süsse IV/3 1422
Bärlapp I 65, 66; VII 148 Fig. 1174
„ , Keulenförmiger I 66
Balanites Aegyptiaca Delile V/1 41
Baldrian, Gemeiner VI/1 268, 277
Ballota nigra L. V/4 2402
Bambuseen I 402
Baptisia tinctoria R. Br. IV/3 1146
Barbaraea Beckm. IV/1 299
„ vulgaris R. Br. IV/1 303
Barbenkraut IV/1 299
„ , Echtes IV/1 303
Barosma Willd. V/1 49
Barringtonia Forst. V/2 767
Basilie V/4 2269
Bassia latifolia Roxb. V/3 1897
Bauernkresse IV/1 120
Bauernsenf, Doldiger IV/1 107
„ , Fiederblätteriger IV/1 110
Baumwolle V/1 462, 463
Begonia L. V/1 664
Beifuß VI/2 628, 629, 640
Beilwicke IV/3 1461
Beinbrech, Europäischer II 192
Beißkohl III 215
Bellis perennis L. VI/1 416
Benediktenkraut VI/2 991
Bennußbaum IV/1 491
Berberis L. IV/1 9
Berberitze IV/1 9
Berg-Bärwurz V/2 1303
-Föhre I 101, 108
-Haarstrang V/2 1389
-Rosmarin V/4 2527

Berg-Sternblume VI/1 429
-Vergißmeinnicht V/3 2167
„ -Wohlverleih VI/2 707, 708
Bermudagras I 264
Bertram VI/2 673, 674
, Wilder VI/2 565
„ -Schafgarbe VI/2 565
Berufskraut, Scharfes VI/1 438
Beschreikraut V/4 2413
„ , Einjähriges V/4 2415
Besenginster IV/3 1189
Besenpfriem IV/3 1189
Besen-Ranke IV/1 162
Beta hortensis Mill. III 215
vulgaris L. III 217; VII 74 Fig. 1109 c
Betula pubescens Ehrh. III 76
„ verrucosa Ehrh. III 79
Bibernelle IV/2 941
, Fremde V/2 1197
Große IV/2 939, 1202
„ , Kleine V/2 1208
Bidens tripartitus L. VI/1 518
Biensaug V/4 2471
Bigelovia veneta Gray V/1 657
Bilsenkraut V/4 2577
Bingelkraut, Einjähriges V/1 129
Binse II 148
Binsen-Ginster IV/3 1215; VII 183 Fig. 1226 B
Birke III 76, 79
Bisam-Storchschnabel IV/3 1724, 1725
Bittersüß V/4 2592
Bixa Orellana L. V/1 584
Blackstonia perfoliata Huds. V/3 1956, 1968
Blasenstrauch IV/3 1460
Bleiwurz V/3 1878
Blutkopf IV/2 939
Blutkraut IV/1 162
Blutröslein IV/3 1679
Blut-Storchenschnabel IV/3 1679
Blut-Weiderich V/2 761
Blutwurz IV/2 884
Bockshorn IV/3 1133
Bockshornklee IV/3 1233
Bohne IV/3 1631
Bohnenbaum IV/3 1162
Bohnenkraut V/4 2284
Borago officinalis L. V/3 2231
Borretsch V/3 2231
Botrychium Lunaria L. I 44
Bowdichia virgilioides Kunth IV/3 1144
Brach-Sinau IV/2 948
Brandkraut V/4 2436
Brassica Napus L. IV/1 256
nigra (L.) Koch IV/1 238
„ oleracea L. IV/1 249
Braunelle, Kleine V/4 2382
Brechnußbaum V/3 1950
Brennessel, Große III 140
, Kleine III 142
Briza media L. I 293
Brombeere IV/2 773
Bromus catharticus Vahl I 355
„ secalinus L. I 364
Brucea I. S. Müll. V/1 79
Bruchkraut, Kahles III 433
Brunnenkresse IV/1 321
Brustwurz, Wilde V/2 1337
Bryonia alba L. VI/1 318
„ dioeca Jacq. VI/1 319
Buche III 99; VII 36 Fig. 1060
Buchs V/211
Bunge, Gemeine V/3 1877
Bunium Bulbocastanum V/2 1194
Bupleurum falcatum V/2 1131
fruticosum L. V/2 1103
„ rotundifolium L. V/2 1108
Butomus L. I 158; VII 6 Fig. 978
Buxus sempervirens L. V/1 211

C.

Caesalpinia Bonducella Roxb. IV/3 1127
Calendula officinalis L. VI/2 802
Calla palustris L. II 137; VII 77 Fig. 1113
Callitris quadrivalvis Vent. I 108
Calluna vulgaris Hull V/3 1698
Calophyllum L. V/1 500
Calotropis R. Br. V/3 2063
Caltha palustris L. III 459; VII 3 Fig. 969
Camelina sativa Crantz IV/1 371
Cannabis sativa L. III 135
Canscora Lam. V/3 1956
Capparis coriacea Burch. IV/1 491
„ spinosa L. IV/1 490
Capsella Bursa pastoris Medikus IV/1 366, 367
Capsicum annuum L. V/4 2557
Cardamine amara L. IV/1 350
pratensis L. IV/1 348; VII 33 Fig. 1055
Cardiospermum Halicacabum L. V/1 307
Carex arenaria L. II 7, 62
Carica Papaya L. V/1 660
Carlina acaulis L. VI/2 820
Carthamus tinctorius L. VI/2 989
Carum Carvi L. V/2 1184
Casimiroa Llav. et Lex. V/1 53
Cassia L. IV/3 1131
Cassine glauca O. Kuntze V/1 245
Catha edulis Forsk. V/1 244
Ceanothus L. V/1 324
Celastrus obscurus V/1 245
Centaurea Behen Lam. VI/2 936
Calcitrapa L. VI/2 980
cerinthaefolia Sibth. VI/2 936
Cyanus L. VI/2 964
„ solstitialis L. VI/2 983
Centaurium Hill V/3 1956
„ umbellatum Gilibert V/3 1970
Centella Asiatica Urban V/2 955
Ceratonia Siliqua L. IV/3 1133
Cerbera L. V/3 2050
Cercis Siliquastrum L. IV/3 1135
Cereus Haw. V/2 684
Cerinthe glabra Miller V/3 2190
Cestrum L. V/4 2554
Chaerefolium Cerefolium Schinz et Thellung V/2 1029
silvestre Schinz et Thellung V/2 1022
Chaerophyllum bulbosum L. V/2 1000
„ temulum L. V/2 998
Chamaedaphne calyculata Moench V/3 1656
Cheiranthus Cheiri L. IV/1 444
Chelidonium maius L. IV/1 21; VII 96 Fig. 1124
Chenopodium ambrosioides L. III 233; VI/2 666
Bonus Henricus III 221; VII 74 Fig. 1109 b
Botrys L. III 219
foetidum Schrad. III 233
„ Vulvaria L. III 222
Chimaphila maculata Pursh V/3 1593
umbellata (L.) DC. V/3 1595, 1596
Chionanthus L. V/3 1905
Chloroxylon Swietenia DC. V/1 52
Chondrodendron tomentosum Ruiz et Pav. IV/1 16
Christophskraut III 478
Chrysanthemum L. VI/2 597, 598, 600
Leucanthemum L. VI/2 613
Parthenium Bernh. VI/2 619
Tanacetum Karsch VI/2 621, 622
Chryseis Californica Torr. et Gray IV/1 19
Chrysocoma Coma-aurea L. VI/1 448
Chrysosplenium alternifolium L. IV/2 636
Cicer arietinum L. IV/3 1501
Cichorium Intybus L. VI/2 995, 996
Cicuta virosa L. V/2 1166, 1167
Cimicifuga foetida L. III 480
Cinchona Calisaya Wedd. VI/1 196
„ succirubra Pav. VI/1 196
Cinnamodendron corticosum Miers. V/1 585
Cissampelos Pareira L. IV/1 16
Cistus L. V/1 555
„ salviifolius L. V/1 558
Citrullus Colocynthis Schrader VI/1 314
Citrus Aurantium L. subsp. amara Engler V/1 59
medica L. subsp. Limonum V/1 66 u. f.
„ trifoliata L. V/1 58
Clausena Wampii Bl. V/1 54
Clematis L. III 509

Clusia L. V/1 500
Cnicus Benedictus L. VI/2 991
Cochlearia Danica L. IV/1 142
glastifolia L. IV/1 135
„ officinalis L. IV/1 136, 137, 139
Coix lacryma Jobi L. I 181
Cola vera K. Schum. V/1 492
Colchicum autumnale L. II 196, 197, 198; VII 43 Fig. 1074
Colletia spinosa Lam. V/1 322
Collinsonia Canadensis L. V/4 2272
Colubrina Brongn. V/1 325
Colutea arborescens L. IV/3 1460
Comarum palustre L. IV/2 809; VII 100 Fig. 1129
Combretum L. V/2 772
Commiphora Jacq. V/1 83, 84
Conium maculatum L. V/2 1084 bis 1086
Convallaria majalis L. II 274; VII 102 Fig. 1132
Convolvulus arvensis L. V/3 2089
Scammonia L. V/3 2080
sepium L. V/3 2083
Soldanella L. V/3 2085
Coptis trifolia Salisb. IV/1 9
Cordia L. V/3 2124
Coriandrum sativum L. V/2 1072, 1073
Coriaria L. V/1 213
Cornus L. V/2 1541
„ mas L. V/2 1552
Coronilla L. IV/3 1465
scorpioides L. IV/3 1465
„ varia L. IV/3 1475
Coronopus didymus (L.) Sm. IV/1
„ procumbens Gilib. IV/1 95
Cortusa Matthioli L. V/3 1721, 1819
Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte IV/1 39
Cotinus Coggygria Miller V/1 228
Cotyledon Umbilicus L. IV/2 513
Coutoubea Aubl. V/3 1956
Crataegus azarolus L. IV/2 730
„ Oxyacantha L. IV/2 734
Crepis L. VI/2 1135
Crithmum maritimum L. V/2 1225
Crocus sativus L. II 297, 298
Croton L. V/1 120, 124
Cryptostegia R. Br. V/3 2063
Cucubalus baccifer L. III 308
Cucumis sativus L. VI/1 323; VII 35 Fig. 1059
Cuminum Cyminum L. V/2 1139
Cuphea Adans. V/2 745
Curcuma L. II 321
Cuscuta L. V/3 2091, 2094
„ Europaea L. V/3 2102
Cusparia trifoliata Engler V/1 51
Cyclamen Europaeum L. V/3 1846
Cydonia oblonga Mill. IV/2 691, 692
Cynanchum L. V/3 2063
Cynodon dactylon Pers. I 264
Cynoglossum officinale L. V/3 2152
Cynomorium coccineum L. III 160; V/2 698
Cyperus L. II 10
aureus Ten. II 10
esculentus L. II 10
longus L. II 10
„ rotundus II 10
Cypressenkraut VI/2 672
Cypripedium L. II 326
Cytinus Hypocistus L. V/1 558
Cytisus purgans Bentham IV/3 1168

D.

Dalbergieen IV/3 1143
Daphne Blagayana Freyer V/2 724
Gnidium L. V/2 704
Laureola L. V/2 708
„ Mezerum L. V/2 709, 712
Datura Stramonium L. V/4 2551, 2614, 2615
Daucus Carota L. V/2 1526; VII 126
Deguelia Aubl. IV/3 1497
Deianira Cham. et Schlecht. V/3 1956
Delphinium L. III 486
Consolida L. III 488
„ Staphysagria L. III 486
Dianthus Carthusianorum L. III 325
Dichapetalum Dup. V/1 113
Dictamnus alba L. V/1 76
Digitalis L. VI/1 66
purpurea L. VI/1 67; VII 41 Fig. 1121
Dill V/2 1293
Diosma L. V/1 50
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. IV/1 216
Dipsacus silvester Huds. VI/1 282
Diptam V/1 76
Dipterocarpus Gaertn. V/1 534
Dipteryx odorata Willd. IV/3 1496, 1497
Dirlitze V/2 1552
Discaria febrifuga Mart. V/1 322
Dolden-Habichtskraut VI/2 1339
Donnerbart IV/2 522, 525
Doppelsame, Feinblätteriger IV/1 216
Doronicum L. VI/2 712
„ Pardalianches L. VI/2 720
Dorstenia Contrajerva L. III 124
Dorycnium hirsutum Ser. IV/3 1379
Dost V/4 2332
Drachenkopf V/4 2361
Drachenwurz II 137
Dracocephalum Moldavica L. V/4 2361
Dracunculus vulgaris Schott II 134
Drimys Winteri Forst. IV/1 14
Drosera L. IV/2 498, 502
Duboisia R. Br. V/4 2558
Dürrwurz VI/1 486
Durchwachs-Bitterling V/3 1956, 1968

E.

Eberesche IV/2 710
Eberraute VI/2 635
Eberwurz, Stengellose VI/2 820
Echinocactus Williamsii Lem. V/2 684
Echinops L. VI/2 807
Echium plantagineum L. V/3 2192
rubrum Jacquin V/3 2197
„ vulgare L. V/3 2196
Edelgamander V/4 2529
Edelnuss III 9
Edelraute VI/2 649
Edelweiss VI/1 461
Efeu V/2 924, 925
Eibe I 80
Eibisch V/1 469
Eiche III 107, 108
Einbeere, Vierblätterige II 277
Eisenhut III 493; VII 174 Fig. 1216
„ , Blauer III 495, 500
Eisenkraut V/3 2240, 2242
„ , Gelbes IV/1 165
Elettaria Cardamomum White et Maton II 321
Elsbeerbaum IV/2 719, 721
Elsebeere IV/2 1067
Elsholtzia cristata Willd. V/4 2274
Embelia Burm. V/3 1714
Empetrum nigrum L. V/3 1607
Empleurum ensatum Eckl. et Zeyh. V/1 50
Engelsüss I 41
Engelwurz V/2 1343
„ -Laserkraut V/2 1490
Enzian V/3 1956
, Gelber V/3 1992, 1993, 1994
, Großblütiger V/3 2011
Lungen- V/3 2002
, Schwalbenwurz- V/3 1993, 2000
Ephedra distachya L. I 75; VII 104 Fig. 1135
Epilobium angustifolum L. V/2 818
„ roseum Schreber V/2 837
Equisetum L. I 52; VII 102 Fig. 1133
Heleocharis Ehrh. I 53
„ limosum Willd. I 53
Erbse IV/3 1618
Erdbeerbaum V/3 1666
Erd-Eichel IV/3 1593
„ -Johanniskraut V/1 515
Erdkastanie V/2 1194
Erdmäuse IV/3 1593
Erdrauch, Gemeiner IV/1 48
Erdscheibe V/3 1846
Erigeron acer L. VI/1 438
Eriodictyon Benth. V/3 2119
Eriophorum L. II 17
Erodium cicutarium L'Hérit. IV/3 1723
moschatum L'Hérit. IV/3 1724, 1725

Eruca vesicaria (L.) Cav. em. Thellung IV/1 203
Eryngium L. V/2 976
campestre L. V/2 976, 991
foetidum L. V/2 976
maritimum L. V/2 981
„ planum L. V/2 976
Erysimum L. IV/1 426
„ crepidifolium Rchb. IV/1 432
Erythrophloeum Afz. IV/3 1129
Erythroxylon Coca Lam. V/1 3; VII 185 Fig. 1229
Esche V/3 1931, 1932; VII 54 Fig. 1088
Eschscholtzia Californica Cham. IV/1 19; VII 74 Fig. 1109 g
Eselsdistel VI/2 922
Esenbeckia H. B. et Kth. V/1 51
Essig-Rose IV/2 1004
Estragon VI/2 637
Eucalyptus L'Hérit. V/2 786
„ Globulus Labill. V/2 784
Eugenia L. V/2 777, 780
Eupatorium L. VI/1 402, 403
„ cannabinum L. VI/1 402
Euphorbia L. V/1 135, 137, 140; VII 186 Fig. 1230
Lathyris L. V/1 147
palustris L. V/1 152
resinifera Berg V/1 124
„ Tirucalli L. V/1 136
Euphrasia L. VI/1 84
Evonymus L. V/1 247
„ Europaea L. V/1 252
Exacum L. V/3 1956
Excoecaria Agallocha L. V/1 118, 120
Exogonium Purga Bentham V/3 2076

F.

Fabiana imbricata Ruiz et Pavon V/4 2556
Färber-Ginster IV/3 1203
-Kamille VI/1 538
-Saflor VI/2 989
-Scharte VI/2 928
„ -Waid IV/1 199
Fagara L. V/1 47
Fagus silvatica L. III 99; VII 36 Fig. 1060
Falcaria vulgaris Bernh. V/2 1179
Farbkraut IV/3 1203
Faulbaum V/1 348
Feigwurz III 542, 544
Feld-Gamander V/4 2533
-Gliedkraut V/4 2405
-Kresse IV/1 80
„ -Mannstreu V/2 991
Felsen-Storchschnabel IV/3 1709
Fenchel V/2 1288; VII 193 Fig. 1234
Ferkelkraut, Gefleckter VI/2 1011
„ , Gemeines VI/2 1015
Feronia elephantum Correa V/1 54
Ferula Silphium Thellung V/2 1357
Fetthenne, Grosse IV/2 522, 525
„ , Weisse IV/2 534, 535, 536
Fettkraut VI/1 157
Feuer-Mohn IV/1 31; VII 18 Fig. 1016
Fichtenspargel V/3 1602; VII 105 Fig. 1136
Ficus L. III 124; VII 169 Fig. 1209
Fieberbaum V/2 784
Filipendula Miller IV/2 971
hexapetala Gilib. IV/2 975
„ Ulmaria (L.) Maxim. IV/2 974
Finger-Hundszahn I 264
Fingerhut VI/1 66
, Purpurroter VI/1 67; VII 91 Fig. 1121
Fingerkraut, Kriechendes IV/2 889
„ , Stein- IV/2 834
Flachs V/1 28, 35
Flecken-Schierling V/2 1084/1086
Flieder V/3 1910
„ , Gemeiner V/3 1917
Flindersia Australis R. Br. V/1 52
Flockenblume VI/2 936, 964, 980, 983
Flohkraut, Kleines VI/1 489
Fluss-Ampfer III 179
„ -Kreuzkraut VI/2 758
Föhre I 99
Foeniculum vulgare Miller V/2 1288
Forsythia Vahl V/3 1903
Fouquiera splendens Engelm. V/1 493
Fragaria vesca L. IV/2 901, 902
Frangula Alnus Miller V/1 348
„ Purshiana Coop. V/1 343
Franzosenkraut VI/1 527
Frauenhaar I 38
Frauenmantel IV/2 945
„ , Gemeiner IV/2 969
Fraxinus Ornus L. V/3 1925; VII 198 Fig. 1238
excelsior L. V/3 1931, 1932; VII 54 Fig. 1088
Fritillaria imperialis L. II 240
Froschlöffel I 151; VII 6 Fig. 978
Frühlings-Adonisröschen III 598
-Schlüsselblume V/3 1753, 1754
„ -Walderbse IV/3 1576
Fünffingerkraut IV/2 889
Fumaria officinalis L. IV/1 48
Fussblatt VII 175
Futter-Wicke IV/3 1550

G.

Gänseblümchen VI/1 416
Gänse-Fingerkraut IV/2 891
Gänsefuss, Stinkender III 222
Gänserich IV/2 891
Galega officinalis L. IV/3 1389, 1390, 1642 Fig. 1607
Galeopsis dubia Leers V/4 2463
Galinsoga parviflora Cavan. VI/1 527
Galipea Aubl. V/1 51
Galium L. VI/1 207
Aparine L. VI/1 207; VII 75 Fig. 1111
Mollugo L. VI/1 207
„ verum VI/1 207
Gamskresse IV/1 134
Garcinia L. V/1 501, 502
Gartenbohne IV/3 1636
Gartenkerbel V/2 1029
Gartenkohl IV/1 249
Garten-Kresse IV/1 82
-Mohn IV/1 35
-Salat VI/2 1122; VII 74 Fig. 1109 e
„ -Spargel II 263
Gasteria disticha Haw. II 277
Gaultheria procumbens L. V/3 1620
Geissblatt IV/2 673
Geissfuss V/2 1215
Geissospermum Fr. Allem. V 3 2050
Geissraute IV/3 1389
Gelbdolde V/2 1078
„ , Gespenster- V/2 1080
Gelbsenf IV/1 207
Gelbwurzel II 321; III 453
„ , Kanadische III 453
Gelsemium nitidum Michx. V/3 1951
Gemswurz VI/2 712
Gemüse-Kohl IV/1 249
Genista Germanica L. IV/3 1212
„ tinctoria L. IV/3 1203
Gentiana Tournef. V/3 1956
asclepiadea L. V/3 1993, 2000
Clusii Perr. et Song. V/3 2011
lutea L. V/3 1992/1994
Pannonica Scop. V/3 1993
Pneumonanthe L. V/3 2002
„ purpurea L. V/3 1993
Geranium L. IV/3 1671, 1672
macrorrhizum L. IV/3 1709
Robertianum L. IV/3 1715
„ sanguineum L. IV/3 1679
Gerberstrauch V/1 213
Germer, Schwarzer II 192; VII 160 Fig. 1187
„ , Weisser II 192
Gerste I 396
Geruchgras I 198; VII 154
Geum rivale L. IV/2 917
„ urbanum L. IV/2 918, 919
Gewürznelkenbaum V/2 777
Gift-Hahnenfuss III 546, 552
Giftheil III 494
Gift-Lattich VI/2 1124, 1125
Gift-Wicke IV/3 1475
Gilbkraut IV/1 24
Ginster, Englischer IV/3 1192
, Färber- IV/3 1203
„ , Spanischer IV/3 1215
Glaskraut III 143
Glaucium flavum Crantz IV/1 24
Glechoma hederaceum L. V/4 2377

Gleditschia triacanthos L. IV/3 1129
Gletscher-Hahnenfuss III 574
Gluta Renghas L. V/1 216
Glycyrrhiza L. IV/3 1143, 1453, 1455
Götterbaum V/1 82
Gold-Gilbweiderich V/3 1861
Goldlack IV/1 444
Goldmelisse V/4 2507
Gold-Milzkraut IV/2 636
Goldnessel V/4 2443
Goldregen IV/3 1162
Goldrute, Gemeine VI/1 410
Gouania L. V/1 322
Gossypium L. V/1 462, 463
Gottesgnadenkraut = Gratiola VI 1 38
Granatapfelbaum V/2 765, 766
Grasnelke V/3 1890
Gras-Sternmiere III 357
Gratiola officinalis L. VI/1 38; VI/2 1360; I/LXXIX Fig. 107
Grindelia VI/1 448
Guajacum officinale L. V/1 40
Guajava V/2 775
Günsel, Kriechender V/4 2543
Gummibaum VII 169 Fig. 1209
Gummiwurz, Grosse V/2 1362
Gundelrebe V/4 2377
Gurke VI/1 323; VII 35 Fig. 1059
Guter Heinrich III 221; VII 74 Fig. 1109 b
Gymnema silvestre R. Br. V/3 2063
Gynocardia odorata R. Br. V/1 656

H.

Haarstrang IV/2 975
„ Echter V/2 1374
Habichtskraut, Langhaariges VI/2 1201
Habrothamnus Endl. = Cestrum L.
Hafer I 254
Hagebutte IV/2 989
Hagenia Abyssinica Willd. IV/2 666
Hahnenfuss III 542
, Brennender III 550
, Epheublätteriger III 577
Gift- III 545, 552
„ , Scharfer III 562
Hain-Kreuzkraut VI/2 762
Halenia Borkh. V/3 1956
Hamamelis L. IV/2 656
Hanf III 135
„ , Indischer III 136
Hanfnessel, Bleiche V/4 2463
Harpullia thanatophora Bl. V/1 307
Harzklee IV/3 1385
Haselwurz, Europäische III 161, 162
Hasenbrod I 293
Hasen-Klee IV/3 1324, 1653
Hasenlattich VI/2 1180
Hasenohr, Sichelblätteriges V/2 1131
Haspeldorn IV/3 1192
Hauhechel IV/3 1227
Hauswurz, Echte IV/2 547, 549, 550
Hauszwiebel II 233
Hecken-Kälberkropf V/2 998
Heckenrose IV/2 989; VII 107 Fig. 1140
„ , Gemeine IV/2 1035
Hedera Helix L. V/2 924, 925
Heidekraut V/3 1698
Heidelbeere V/3 1679, 1680
Heimia Link V/2 746
Heinrich, Guter III 221; VII 74 Fig. 1109 b
Helianthemum nummularium Miller V/1 571
Helichrysum arenarium DC. VI/1 471
„ Stoechas DC. VI/1 472
Heliotropium L. V/3 2130, 2133
Helleborus L. III 464
niger L. III 456
„ viridis L. 464, 471
Helmkraut V/4 2511
Hennah-Strauch V/2 748
Heracleum Sphondylium L. V/2 1454
Herbstzeitlose II 196, 197, 198; VII 43 Fig. 1074
Herniaria hirsuta L. III 433
Herz-Kresse IV/1 79
Hesperis matronalis L. IV/1 468
Hibiscus L. V/1 460
Hieracium murorum L. VI/2; 1274, 1278
Pilosella L. VI/2 1201
„ umbellatum L. VI/2 1339
Himbeere IV/2 770
Hiobs-Tränengras I 181
Hippomane Mancinella L. V/1 118
Hippophaë rhamnoides L. V/2 740
Hirschheil-Bergfenchel V/2 1249
Hirschwurz V/2 1392
Hirschzunge I 34
Hirtennadel IV/3 1723
Hirtentäschel, Gemeines IV/1 366, 367
Hohlwurz IV/1 39
Holarrhena Africana DC. V/2 2050
Holunder, Schwarzer VI/1 239
Honigklee IV/3 1237
Hopfen III 132; VII 80 Fig. 1114
Hordeum L. I 395
Hornklee, Gemeiner IV/3 1371
Horn-Mohn, Gelber IV/1 24
Hornstrauch V/2 1541
Hühnerbiss III 308
Huflattich VI/2 679
Humulus Lupulus L. III 132; VII 80 Fig. 1114
Hundskolben V/2 698
Hundspetersilie V/2 1275
Hundsrose IV/2 989, 1031; VII 95 Fig. 1122
Hundsrute V/2 698
Hundszahn I 264
Hundszunge, Gemeine V/3 2152
Hybanthus Ipecacuanha Taubert V/1 585
Hydnocarpus Gaertn. V/1 656
Hydrastis Canadensis L. III 453; IV/1 9
Hydrocotyle umbellata L. V/2 952
„ vulgaris L. V/2 955
Hydrophyllum L. V/3 2119
Hyoscyamus L. V/4 2551, 2574
„ niger L. V/4 2577
Hyperanthera Moringa Vahl IV/1 491
Hypericum Androsaemum L. V/1 512
humifusum L. V/1 515
„ perforatum L. V/1 529
Hypochoeris maculata L. VI/2 1011
„ radicata L. VI/2 1015
Hyssopus officinalis L. V/4 2360

I.

Iberis amara L. IV/1 107, 108
pinnata L. IV/1 110
„ umbellata L. IV/1 107
Ilex L. V/1 235
Aquifolium L. V/1 243
„ Paraguariensis St. Hil. V/1 235
Illicium anisatum L. IV/1 14
verum Hook. f. IV/1 14; VII 175 Fig. 1218 f, g
Immergrün, Gemeines V/3 2055
Impatiens L. V/1 313
„ Noli tangere L. V/1 317
Indigo, Deutscher IV/1 199
Inula Britannica L. VI/1 485
Germanica L. VI/1 479
Conyza DC. VI/1 486
Helenium L. VI/1 476
„ spiraeifolia L. VI/1 482
Ipo III 123
Ipomoea L. V/3 2076
Iris Florentina L. II 285
Germanica L. II 285, 292
pallida auct. tirol. nec Lam. II 285, 292
„ Pseudacorus L. II 294
Isatis tinctoria L. IV/1 199
Isopyrum thalictroides L. III 477

J.

Jakobs-Kreuzkraut VI/2 775
Jasmin V/3 1907; VII 198 Fig. 1239
Jasminum officinale L. V/3 1907; VII 198 Fig. 1239
Jatropha curcas L. V/1 120
Jatrorrhiza palmata (Lam.) Miers IV/1 16
Joannezia Velloz. VII 185
Johannisbeere, Schwarze IV/2 653
Johannisbrot, Wildes IV/3 1135
Johannisbrotbaum IV/3 1133
Johanniskraut, Echtes V/1 529
Johanniswedel IV/2 974
Judasbaum IV/3 1135

Judenkirsche V/4 2582
Juglans regia L. III 9; VII 36 Fig. 1061
Juncus L. II 148
Juniperus communis L. I 90
„ , subsp. nana (Willd.) Briquet I 92; VII 152 Fig. 1180
„ Sabina L. I 92
Jussieua L. V/2 799

K.

Kaiserkrone II 240
Kajeputbaum V/2 787
Kakao V/1 491, 492
Kalabarbohne IV/3 1624
Kalmus II 136
Kamille, Echte VI/2 583
„ , Römische VI/1 536
Kappernstrauch IV/1 490
Kapuzinerkresse IV/3 1731
Karde, Wilde VI/1 282
Karthäuser Nelke III 325
Kartoffel V/4 2603
Karwinskia Humboldtiana Zucc. V/1 324
Katzenminze V/4 2370
Katzenpfötchen VI/1 457
Kellerhals V/2 704, 709, 712
Kerbelrübe V/2 1000
Kicher, Deutsche IV/3 1606
Kichererbse IV/3 1501
Kiefer I 99
Kirsche IV/2 1083
Kirschlorbeer IV/2 1063
Klapper IV/1 120
Klatschnelke III 281
Klebkraut VI/1 207 siehe Galium Aparine L. VI/2 207; VII 75 Fig. 1111
Klee IV/3 1278
Klette VI/2 826, 827
Klettenkraut V/3 2140
Knautia arvensis Coult. VI/1 294
Knoblauch II 230
„ -Hederich IV/1 151
Knöllchen-Steinbrech IV/2 615, 616
Knollen-Rüsterstaude IV/2 975
Königsblume V/2 724
Königskerze V/1 8; VII Fig. 1041, 1148
Kohl-Gänsedistel VI/2 1109
Kokapflanze V/1 3; VII 185 Fig. 1229
Koloquinte VI/1 314
Koniferen I 107
Koriander V/2 1072, 1073
Kornblume VI/2 964
Kornrade III 274
Krähenbeere V/3 1603; VII 43 Fig. 1072
Krähenfuß, Niederliegender IV/1 95
„ , Zweiknotiger IV/1 96
Krameria triandra Ruiz et Pavon IV/3 1135
Krauseminze V/4 2352, 2354
Kraut IV/1 249
Kren IV/1 307
Kresse, Breitblätterige IV/1 90
, Grasblätterige IV/1 92
„ , Türkische IV/1 79
Kreuzblume, Bittere V/1 112
„ , Gemeine V/1 104
Kreuzdorn V/1 329
Kreuzkraut VI/2 727—729
„ , Gemeines VI/2 790
Kreuzkümmel V/2 1139
Kronwicke IV/3 1465
„ , Bunte IV/3 1475
Krummholzkiefer I 101, 108
Küchenkohl IV/1 249
Küchen-Zwiebel II 233
Kümmel, Wiesen- V/2 1185
Kugeldistel VI/2 807
Kuhblume VI/2 1089
Kuhhornklee IV/3 1233

L.

Labkraut VI/1 207; VII 75 Fig. 1111
Lachenknoblauch V/4 2532
Lactuca L. VI/2 1113
Canadensis L. VI/2 1125
sativa L. VI/2 1122
„ virosa L. VI/2 1124, 1125
Lärche I 95
Läusekörner III 486
Lagerstroemia L. V/2 746
Lagoecia cuminoides L. V/2 992
Lamium album L. V/4 2447
Galeobdolon Crantz V/4 2443
maculatum L. V/4 2450
„ purpureum L. V/4 2452
Lappula echinata Gilibert V/3 2140
Lapsana communis L. VI/2 1002
Larix decidua Mill. I 95
Larrea Mexicana Moric. V/1 40
Laserkraut V/2 1481
Laserpitium L. V/2 1481
„ Archangelica Wulfen V/2 1490
Lathraea L. VI/1 131
Lathyrus Aphaca L. IV/3 1591
sativus L. IV/3 1606
tuberosus L. IV/3 1593
„ vernus Bernh. IV/3 1576
Latsche I 101, 108
Lattich VI/2 1113
Lauchkraut, Gemeines IV/1 151
Lauch-Täschelkraut IV/1 121
Laurus nobilis L. IV/1 12
Lavandula officinalis Chaix ex Vill. V/4 2278, 2279
„ stoechas L. V/4 2275
Lavendel, Echter V/1 2278, 2279
Lawsonia inermis L. V/2 748
Leberblümchen III 528, 530
Laburnum Medikus IV/3 1162
Ledum palustre L. V/3 1626
Leimkraut, Aufgeblasenes III 281
Lein V/1 28, 35
Leindotter IV/1 371
Leontopodium alpinum Cass. VI/1 461
Leonurus Cardiaca L. V/4 2393
„ lanatus Sprengel V/4 2390
Lepidium campestre (L.) R. Br. IV/1 75, 80
Draba L. IV/1 79
latifolium L. IV 1 75, 90
ruderale L. IV/1 75, 84
sativum L. IV/1 75, 82
„ Virginicum L. IV/1 87
Lerchensporn, Hohler IV/1 39
Levisticum officinale Koch V/2 1353, 1354
Liebstöckel V/2 1353, 1354
Ligusticum Mutellina Crantz V/2 1323
Ligustrum vulgare L. V/3 1949
Lilie, Weiße II 235
Lilium candidum L. II 235
Martagon L. II 236; VII 105 Fig. 1137
Limonia acidissima L. V/1 54
Limonium vulgare Miller V/3 1882
Linum catharticum L. V/1 8
„ usitatissimum L. V/1 28, 35
Lippia dulcis Trev. V/3 2236
Liquidambar Orientalis Miller IV/2 656
„ styraciflua L. IV/2 656
Lisianthus L. V/3 1956
Lithospermum arvense L. V/3 2159
officinale L. V/3 2157
„ purpureo-caeruleum L. V/3 2156
Lobelia L. VI/1 392, 393
Löffelkraut, Dänisches IV/1 142
„ , Echtes IV/1 136, 137, 139
Löwenschwanz V/4 2393
Löwenzahn VI/2 1089
Lolium temulentum L. I 376
Lonchocarpus H. B. et Kth. IV/3 1497
Lophopetalum toxicum Loher V/1 245
Lophophora V/2 684
Lorbeer, Echter IV/1 12
Lorbeerkirsche IV/2 1063
Lorbeer-Seidelbast V/2 708
Lotus corniculatus L. IV/3 1371
Lotwurz V/3 2179
Lunaria rediviva L. IV/1 355; VII 213 Fig. 1268
Lungen-Enzian V/3 2002
Lungenkraut, Echtes V/3 2216
Lupine, Weisse IV/3 1154
Lupinus albus L. IV/3 1154
Lycopodium L. I 65; VII 148 Fig. 1174
clavatum L. I 66
„ Selago L. I 65
Lycopus Europaeus L. V/4 2388
Virginicus L. V/4 2385

Lysimachia Nummularia L. V/3
„ vulgaris L. V/3 1861
Lythrum Salicaria L. V/2 761

M.

Machaerocereus gummosus Engelm. V/2 684
Mädesüß IV/2 974
Märzwurz IV/2 918, 919
Mäuse-Klee IV/3 1324, 1640 Fig.
Magonia St. Hil. V/1 307
Maiblume II 274; VII 102 Fig. 1132
Maiglöckchen II 274; VII 102 Fig. 1132
Majorana hortensis Moench V/4 2334
Mallotus Philippinensis Müll.-Aarg. V/1 125
Malope L. V/1 455
Malteserschwamm V/2 698
Malus communis Lam. IV/2 753
Malva L. V/1 454
Alcea L. V/1 479
neglecta Wallr. V/1 485
silvestris L. V/1 484
„ verticillata L. V/1 475
Malvaviscus Dill. V/1 457
Malve, Wilde V/1 484
Mandelbaum IV/2 1090
Mandragora Juss. V/4 2551, 2559
Mangifera Indica L. V/1 215
Mangobaum V/1 215
Mangold III 215, 217
Manihot Adans. V/1 119
Manna-Esche V/3 1925; VII 198 Fig. 1238
Mannsblut V/1 512
Mannskraft IV/2 918, 919
Mannstreu V/2 976
Maranta arundinacea L. II 321
Mariendistel VI/2 917—919
Marlea (Alangium) begoniifolia V/2 770
Marrubium vulgare L. V/4 2395
Marsdenia Condurango Rchb. V/3 2062
Massholder V/1 288
Mastixdistel VI/2 824
Mastix-Strauch V/1 231
Matricaria Chamomilla L. VI/2 583
Mauer-Habichtskraut VI/2 1274, 1278
Mauerpfeffer, Scharfer IV/2 536, 538
„ , Weisser IV/2 534, 535, 536
Mauerraute I 31
Maulbeerbaum, Schwarzer III 130
Meerfenchel V/2 1225
Meerträubchen I 75; VII 104 Fig. 1135
Meer-Wermut VI/2 662, 665, 666
Meerzwiebel II 278
Mehlbeerbaum IV/2 716
Meisterwurz V/2 1400
Melaleuca Leucodendron L. V/2 787
Melandrium album (Miller) Garcke III 302
Melastomaceae V/2 795
Melia Azedarach L. V/1 85
Melilotus Hill IV/3 1143, 1237
altissimus Thuill. IV/3 1237, 1243
„ officinalis Medikus IV/3 1245
Melissa officinalis L. V/4 2303, 2305
Melisse V/4 2303, 2305
Melittis Melissophyllum L. V/4 2471
Mentha L. V/4 2337
crispa auct. V/4 2352
longifolia Hudson V/4 2351
piperita Hudson V/4 2355
Pulegium L. V/4 2341
rotundifolia Hudson V/4 2348
„ spicata L. V/4 2352
Mentzelia L. V/1 662
Menyanthes trifoliata L. V/3 1960
Mercurialis annua L. V/1 129
perennis L. V/1 133, 190 Fig. 1801
Merk, Aufrechter V/2 1219
„ , Grosser V/2 1222
Merrettich IV/1 307
Mertensia maritima G. Don V/3 2128
Mespilus Germanica L. IV/2 741
Mesua L. V/1 500
Meum athamanticum Jacq. V/2 1303
Miconia stenostachya Krasser V/2 795
Milchstern II 250; V/1 514
Milzfarn I 25
„ , Brauner I 26
Minze V/4 2337
„ , Rundblätterige V/4 2348
Mirabilis Jalapa L. III 266
Mispel, Echte IV/2 741
Italienische IV/2 730
„ , Welsche IV/2 730
Mistel, Weisse III 149
Möhre V/2 1526; VII 126
Mönchs-Rhabarber III 173
Mohn IV/1 31; VII 18 Fig. 1016
Moltebeere IV/2 766
Momordica Charantia L. VI/1 315
Monarda L. V/4 2507
Mondbohne IV/3 1628
Mondraute I 44
Monnieria trifolia L. V/1 52
Monnina Ruiz et Pav. V/1 88
Monotropa Hypopitys L. V/3 1602; VII 105 Fig. 1136
Moosbeere V/3 1689
Moor-Birke III 76
Morus nigra L. III 130
Moschus-Schafgarbe VI/2 557
„ -Schnabelkraut IV/3 1724, 1725
Murraya Koenigii Spreng. V/1 54
Muschelblümchen, Wiesenrautenblättriges III 477
Muskatellerkraut V/4 2490—2492
Muskatnuss IV/1 15; I/CLV Fig. 296
Mutterkraut VI/2 619
Myosotis silvatica Hoffm. V/3 2167
Myrcia Coriaria DC. V/2 777
Myricaria Germanica Desv. V/1 551
Myristica fragrans Houttuyn IV/1 15; I/CLV Fig. 296
Myroxylon Forsk. IV/3 1144
Myrrhis odorata Scop. V/2 1045
Myrsine L. V/3 1714
Myrte, Echte V/2 791
Myrtus communis L. V/2 791

N.

Nachtkerze, Gemeine V/2 868; VII 192 Fig. 1233
Nachtschatten, Schwarzer V/4 2594
Nachtviole, Gemeine IV/1 468
Nagelkraut IV/2 941
„ , Vierblätteriges III 426
Naraspflanze VI/1 315
Narcissus L. II 313
„ Pseudonarcissus L. II 314
Narde, Echte VI/1 268
Narthecium ossifragum Huds. II 192
Narzisse II 313
„ , Gelbe II 314
Nasturtium officinale R. Br. IV/1 321
Natternkopf, Gemeiner V/3 2196
, Roter V/3 2197
„ , Violetter V/3 2192
Neea theïfera Oerstedt III 266
Nelkenpfeffer-Myrte V/2 776
Nelkenwurz, Echte IV/2 918, 919
Nepeta Cataria L. V/4 2370
Nerium Oleander L. V/3 2057
Nicotiana L. V/4 2551, 2617, 2621
Nieswurz, Grüne III 471
„ , Schwarze III 466
Nigella sativa L. III 475
Noisettia orchidiflora Ging. V/1 586
Nyssa L. V/2 770

O.

Ocimum Basilicum L. V/4 2269
Ochsenzunge, Gemeine V/3 2199
Odermennig IV/2 935
Oelbaum V/3 1943
Oenanthe L. V/2 1251, 1253
aquatica Poiret V/2 1268
„ fistulosa L. V/2 1257
Oenothera biennis L. V/2 868
Ohmkraut IV/2 948
Olea Europaea L. V/3 1943
Oleander V/3 2057
Omphalea L. V/1 120
Ononis L. IV/3 1143
„ spinosa L. IV/3 1227
Onopordon Acanthium L. VI/2 922
Onosma L. V/3 2179
Operculina Turpethum Peter V/3 2077
Ophiocaryon paradoxum Schomb. V/1 309
Opopanax Chironium L. V/2 1362
Orchis L. II 324, 335; VII 3 Fig. 970 a, d

Origanum vulgare L. V/4 2332
Ornithogalum (L.) Salisb. II 250; V 1 514
Orthosiphon Benth. V/4 2270
Osterluzei III 162
„ , Gemeine III 162
Oxalis Acetosella L. IV/3 1653
Oxycoccus quadripetalus Gilibert V/3 1689

P.

Paeonia L. III 455; VII 38 Fig. 1064
Palaquium Blanco V/3 1896
Palm-Weide III 35
Panax L. V/2 912
Papaver officinale Gmel. IV/1 34
Rhoeas L. IV/1 31; VII 18 Fig. 1016
„ somniferum L. IV/1 35
Pappel III 63
Parameria Benth. V/3 2050
Parietaria erecta Mert. et Koch III 143
„ officinalis L. III 143
Paris quadrifolius L. II 277
Parkinsonia aculeata L. IV/3 1128
Parnassia palustris L. IV/2 639
Passiflora L. V/1 658
Pastinaca sativa L. V/2 1414, 1415
Paternoster-Erbse IV/3 1498
Paullinia L. V/1 307
Peganum Harmala L. V/1 41
Pelargonium L. IV/3 1667
Periploca Graeca L. V/3 2063, 2064
Perückenstrauch V/1 228
Pestwurz, Gemeine VI/2 685
„ , Weisse VI/2 695
Petasites albus Gaertn. VI/2 695
„ hybridus Fl. Wett. VI/2 685
Petersilie V/2 1158
Petiveria alliacea L. III 267
Petroselinum hortense Hoffm. V/2 1158
Peucedanum Cervaria Lapeyr. V/2 1392
officinale L. V/2 1374
Oreoselinum Moench V/2 1389
Ostruthium Koch V/2 1400
„ palustre Moench V/2 1396
Pfahlrohr I 271
Pfeffer, Spanischer V/4 2557
Pfefferkraut IV/1 90
Pfefferminze V/4 2355
Pfeil-Kresse IV/1 79
Pfeilwurz, Westindische II 321
Pfennigkraut V/2 955; V/3 1854
Pferdebohne IV/3 1560
Pfersing IV/2 1095
Pfingstrose III 455; VII 38 Fig. 1064
Pfirsich IV/2 1095
Pflaume IV/2 1112
Phaseolus lunatus L. IV/3 1628
vulgaris L. IV/3 1636
Phlomis L. V/4 2436
Phyllanthus emblica Willd. V/1 120
Physalis Alkekengi L. V/4 2582
Physostigma Balf. IV/3 1623; VII 183
„ venenosum Balf. IV/3 1624
Picramnia Sw. V/1 80
Picrasma excelsa Planch. V 1 79
Pilocarpus Vahl V/1 50
Pimenta acris Wight V/2 777
„ officinalis Berg V/2 776
Pimpernuss V/1 260
Pimpinella Anisum L. V/2 1210, 1211
maior Hudson V/2 1202
peregrina L. V/2 1197
„ saxifraga L. V/2 1208
Pinus Cembra L. I 105
montana Mill. I 101, 108
„ silvestris L. I 99
Pippau VI/2 1135
Pirola chlorantha Sw. V/3 1583
minor L. V/3 1583
rotundifolia Fernald V/3 1589
secunda L. V/3 1577
„ uniflora L. V/3 1592
Piscidia IV/3 1497
Pistacia L. V/1 231, 233
Pisum sativum L. IV/3 1618
Pithecolobium Avaremotemo Mart. IV/3 1123
Plantago Coronopus L. VI/1 189
lanceolata L. VI/1 179, 184
maior L. VI/1 179
Psyllium L. VI/1 179
„ ramosa Aschers. VI/1 194
Platanthera bifolia (L.) Rich. II 324; VII 3 Fig. 970 b
Plumbago Europaea L. V/3 1878
Plumiera acutifolia Poir. V/3 2050
Podophyllum L. IV/1 5
„ peltatum L. IV/1 5
Polei V/4 2341
Polemonium caeruleum L. V/3 2116
Polycarpon tetraphyllum L. III 426
Polygala L. V/1 90
amara L. V/1 112
„ vulgaris L. V/1 104
Polygonatum All. II 269; VII 39/40 Fig. 1066, 1067
Polygonum aviculare L. III 193
„ Bistorta L. III 195
Polypodium vulgare L. I 41
Pomeranze V/1 59 u. f.
Populus balsamifera III 59
„ nigra L. III 59, 63
Portulaca oleracea L. III 270
Portulak, Gelber III 270
Potentilla Anserina L. IV/2 891
erecta (L.) Hampe IV/2 884
reptans L. IV/2 889
„ rupestris L. IV/2 834
Preisselbeere V/3 1673
Prenanthes purpurea L. VI/2 1180
Primel V/3 1721
Primula L. V/3 1721
„ veris L. V/3 1753, 1754
Protium L. V/1 84
Prunella vulgaris L. V/4 2382
Prunus L. IV/2 1064
Amygdalus Stokes IV/2 1090
Armeniaca L. IV/2 1100
avium L. IV/2 1083
cerasifera Ehrh. IV/2 1100
Cerasus L. IV/2 1078
domestica L. IV/2 1112; VII Fig. 1158, 1225 B
Laurocerasus L. IV/2 1063
Padus L. IV/2 1067
Persica Sieb. et Zucc. IV/2 1095
„ spinosa L. IV/2 1105
Psidium Guayava Raddi V/2 775
Psoralea bituminosa L. IV/3 1385
Pterocarpus L. IV/3 1496
Puffbohne IV/3 1560
Pulicaria dysenterica Gaertn. VI/1 488
„ vulgaris Gaertn. VI/1 489
Pulmonaria officinalis L. V/3 2216
Punica Granatum L. V/2 765, 766
Purgierdolde V/2 1500
Purgier-Kreuzdorn V/1 335
-Lein V/1 8

Q.

Quassia amara L. V/1 79
Quecke, Gemeine I 384
Quendel V/4 2326; VII 200 Fig. Fig. 1241
Quercus L. III 107, 108
„ Robur L. III 107, 108
Quillaja saponaria Molina IV/2 663
Quitte IV/2 691, 692

R.

Rainfarn VI/2 621, 622
Rainkohl, Gemeiner VI/2 1002
Rainweide V/3 1949
Ranunculus L. III 542
acer L. III 542, 562
aconitifolius L. III 542
auricomus L. III 542
bulbosus L. III 542
Ficaria L. III 542, 544
Flammula L. III 542, 550
glacialis L. III 574
hederaceus L. III 577
lanuginosus L. III 542
Lingua L. III 542
sceleratus L. III 542, 552
„ Thora L. III 542, 546
Raphanus Raphanistrum L. IV/1 278, 285
Raps IV/1 256
Rauh-Birke III 79
Rauke, Gemeine IV/1 203
Raukenkohl IV/1 203
Rebendolde V/2 1251, 1253

Reiherschnabel IV/3 1723
Reps IV/1 256
Rettich, Gemeiner IV/1 278, 285
Rhabarber III 166
Rhammus L. V/1 329
„ cathartica L. V/1 334
Rheedia L. V/1 499, 501
Rheum officinale Baillon III 166
„ palmatum L. III 166
Rhododendron L. V/3 1629 u. f.
Rhus L. V/1 220, 222, 224, 225
Ribes nigrum L. IV/2 653
Ricinus communis L. V/1 122
Ringelblume VI/2 802
Rinorea Aubl. V/1 586
Rispelstrauch, Deutscher V/1 551
Rispen-Fettkraut IV/2 521
Rittersporn III 486
Robinia Pseudacacia L. IV/3 1397
Röhrenkassie IV/3 1131
Röhren-Rebendolde V/2 1257
Rohr I 271
Rohrkolben I 113; VII 134, 1173 BC
Roripa Scop. IV/1 308
Rosa L. IV/2 989; VII 107 Fig. 1140
canina L. IV/2 1031; VII 95 Fig. 1122
„ Gallica L. IV/2 1004
Rosenwurz IV/2 528
Rosmarinheide V/3 1654
Rosmarinus officinalis L. V/4 2520, 2522
Rosskastanie V/1 303, 304
Rosskümmel, Gemeiner V/2 1297
Rossminze V/4 2351
„ , Grüne V/4 2352
Rotbuche III 99
Rot-Klee IV/3 1336
Rubus fruticosus L. IV/2 773
Chamaemorus L. IV/2 766
„ Idaeus L. IV/2 770, 773
Rüben-Kälberkropf V/2 1000
Rühr mich nicht an V/1 317
Rüsterstaude IV/2 971, 974
Ruhrwurz VI/1 488
Ruhrbirne IV/2 719, 721
Rumex alpinus L. III 173
Hydrolapathum Huds. III 179
obtusifolius L. III 174
„ scutatus L. III 185
Runkelrübe III 217; VII 74 Fig. 1109 c
Ruprechtskraut IV/3 1715
Ruta graveolens L. V/1 72

S.

Saathafer I 254
Saat-Platterbse IV/3 1606
Sabbatia Adans. V/3 1956
Saccharum officinarum L. I 186
Sadebaum I 92
Safran, Echter II 297, 298
Salbei, Edler V/4 2482, 2484
, Klebriger V/4 2487
Salbei-Gamander V/4 2536
Salix L. III 15
„ caprea L. III 35
Salomonssiegel II 269; VII 39/40 Fig. 1066, 1067
Salvia glutinosa L. V/4 2487
officinalis L. V/4 2482, 2484
pratensis L. V/4 2501
„ Sclarea L. V/4 2490, 2492
Sal-Weide III 35
Samadera Indica Gaertn. V/1 79
Sambucus Ebulus L. VI/1 237
„ nigra L. VI/1 239
Sammetblume VI/1 534
Sammt-Rose IV/2 1004
Samolus Valerandi L. V/3 1877
Sanddorn V/2 740
Sand-Segge II 62
-Strohblume VI/1 471
„ -Wegerich VI/1 194
Sanguisorba minor Scopoli IV/2 941
„ officinalis L. IV/2 939
Sanicula Europaea L. V/2 959
„ Marylandica L. V/2 957
Santalum album L. III 151
Santolina Chamaecyparissus L. VI/2 672
Saponaria officinalis L. III 345
Sarcolobus R. Br. V/3 2063
Sarothamnus Wimmer IV/3 1189
Sarracenia IV/2 510; VII 120 Fig. 1157
Sassafras officinalis Nees ab Esenbeck IV/1 11
Satureja Acinos Scheele V/4 2299, 2548 Fig. 3380 A
hortensis L. V/4 2283
„ vulgaris Fritsch V/4 2297
Saubohne IV/3 1560
Sauerampfer, Römischer III 185
Sauerdorn IV/1 9
Sauerkirsche IV/2 1078
Sauerklee IV/3 1653
Sauerschotenbaum IV/3 1145
Saussurea DC. VI/2 835
Saxifraga granulata L. IV/2 615, 616
„ tridactylites L. IV/2 621
Scandix Pecten-Veneris L. V/2 1041
Schabzigerklee IV/3 1235
Schachtelhalm I 52; VII 102 Fig. 1133
Schafgarbe VI/2 551
„ Gemeine VI/2 572
Scharbockskraut III 542, 544; IV/1 136, 137, 139
Scharfkraut V/3 2138
Schaumkraut, Bitteres IV/1 350
Schellkraut IV/1 21; VII 96 Fig. 1124
Schild-Ampfer III 185
Schinus L. V/1 217
Schlagkräutlein V/4 2541
Schlangen-Knöterich III 195
Schlangenmoos I 66
Schlangenwurz II 134; VII 77 Fig. 1113
Schlehdorn IV/2 1105
Schlitz-Wegerich VI/1 189
Schmerwurz IV/2 522, 525
Schneeball VI/1 242; VII 206 Fig. 1256
„ , Gemeiner VI/1 245
Schneerose III 466
Schnurbaum IV/3 1145
Schöllkraut IV/1 21; VII 96 Fig. 1124
Schoenocaulon officinale (Schlecht.) A. Gray II 199
Schöterich IV/1 426
„ , Bleicher IV/1 432
Schopflavendel V/4 2275
Schotenklee IV/3 1371
Schriftfarn I 26; VII 132 Fig. 1172
Schuppenwurz VI/1 131
Schutt-Kresse IV/1 84
Schwalbenwurz V/3 2072
„ -Enzian V/3 1993, 2000
Schwanenblume I 158; VII 6 Fig. 978
Schwarzdorn IV/2 1105
Schwarzkümmel III 475
Schwarz-Pappel III 63
Schwarzwurzel, Kleine VI/2 1060
„ , Spanische VI/2 1063
Schwertlilie, Blassviolette II 292
, Deutsche II 292
„ , Gelbe II 294
Schwindelwurz VI/2 720
Scolopendrium vulgare Sm. I 34
Scopolia Jacq. V/4 2551
Carniolica Jacq. V/4 2572
„ Japonica Maxim. V/4 2570
Scopolina Schult. V/4 2569; VII 203
Scorzonera Hispanica L. VI/2 1053
„ humilis L. VI/2 1060
Scutellaria galericulata L. V/4 2511
Sebaea R. Br. V/3 1956
Secamone emetica R. Br. V/3 2063
Securidaca L. V/1 87
Securigera Securidaca Degen et Dörfler IV/3 1461
Sedum acre L. IV/2 536, 538
album L. IV/2 534, 535, 536
Anacampseros L. IV/2 521
Cepaea L. IV/2 521
roseum (L.) Scop. IV/2 528
„ Telephium L. IV/2 522, 525
Segge II 62
Sehnengras I 384
Seide, Europäische V/3 2102
Seidelbast V/2 709, 712
Seidenpflanze V/3 2065
Seifenkraut, Gemeines III 344
Selenicereus grandiflorus Mill. V/2 684
Sellerie V/2 1145
Sempervivum tectorum L. IV/2 547, 549, 550

Senecio L. VI/2 727, 729
fluviatilis Wallr. VI/2 758
Jacobaea L. VI/2 775
nemorensis L. VI/2 762
„ vulgaris L. VI/2 790
Senf IV/1 207, 238
, Schwarzer IV/1 238
Weisser IV/1 207
„ , Wilder IV/1 268
Senfkohl IV/1 203, 238
Senfrauke IV/1 216
Serjania Schum. V/1 307
Serratula tinctoria L. VI/2 928
Seseli Libanotis Koch V/2 1249
„ tortuosum L. V/2 1227
Seviebaum I 92
Shorea Roxb. V/1 534
Sichelmöhre, Gemeine V/2 1179
Sideritis montana L. V/4 2405
Sigmarskraut V/1 479
Silaum Silaus Schinz et Thellung V/2 1297
Silberbaum IV/2 716
Silberblatt, Wildes IV/1 355
Silberkraut IV/2 891
Silbermantel IV/2 952
Silberregen IV/3 1397
Silene inflata Sm. III 281
Siler montanum Crantz V/2 1471, 1472
Silybum Marianum Gaertn. VI/2 917, 919
Simaba Aubl. V/1 79
Simaruba Aubl. V/1 79
Sinapis alba L. IV/1 207
arvensis L. IV/1 268
„ nigra IV/1 238
Sinau IV/2 945
Sison Amomum L. V/2 1163
Sisymbrium officinale (L.) Scop. IV/1 165
„ Sophia L. IV/1 162
Sium erectum Hudson V/2 1219
latifolium L. V/2 1222
Ninsi V/2 912
„ Sisarum L. V/2 1224
Skorpionskraut IV/3 1466
Smilax Tournef. II 280
Smyrnium Olus-atrum L. V/2 1080
„ perfoliatum L. V/2 1078
Solanum Dulcamara L. V/4 2592
nigrum L. V/4 2551, 2594
„ tuberosum L. V/4 2603
Solenostemma Argél Hayne V/3 2063
Solidago Virga aurea L. VI/1 410
Sommer-Eiche III 107, 108
Sommerzwiebel II 233
Sonchus oleraceus L. VI/2 1109
Sonnenröschen, Gemeines V/1 571
Sonnentau IV/2 498, 502
Sonnenwende V/3 2130, 2133
Sonnenwend-Flockenblume VI/2 983
Sophienkraut IV/1 162
Sophora Japonica L. IV/3 1145
Sophoreen IV/3 1143
Sorbus Aria (L.) Crantz IV/2 716
aucuparia L. IV/2 710
domestica L. IV/2 713
torminalis (L.) Crantz IV/2 719, 721
Spargel II 263
Spartium junceum L. IV/3 1215; VII 183 Fig. 1226 B
Speierling IV/2 713
Sperberbaum, Wilder IV/2 719, 721
„ , Zahmer IV/2 713
Sperlingskraut V/2 727
Sperrkraut, Blaues V/3 2116
Spierstaude IV/2 971
Spigelia L. V/3 1952
Spilanthes oleracea Jacq. VI/1 528
Spindelstrauch V/1 247
Spitz-Ahorn V/1 283
Spitzklee IV/3 1312
Spitzklette, Dornige VI/1 503
„ , Gemeine VI/1 500
Spitz-Wegerich VI/1 179, 184
Springkraut V/1 313
„ -Wolfsmilch V/1 147
Stabwurz, Wilde VI/2 670
Stachelmohn IV/1 20
Stachys L. V/4 2408
annuus L. V/4 2415
Germanicus L. V/4 2426
officinalis Trevisan V/4 2430
paluster L. V/4 2418
„ rectus L. V/4 2413
Staphylea pinnata L. V/1 260
Statice Armeria L. V/3 1890
Stechapfel V/4 2614, 2615
Stechginster IV/3 1192
Stechpalme V/1 243
Steinbrech, Dreifingeriger IV/2 621
Stein-Fingerhut IV/2 834
Steinklee IV/3 1237
, Blauer IV/3 1235
, Hoher IV/3 1243
„ , Kleiner, gelber IV/3 1245
Steinquendel V/4 2299
Steinsame, Blauer V/3 2156
„ , Echter V/3 2157
Steinwurzel IV/3 1227
Stellaria graminea L. III 357
Stephanskörner III 486
Stern-Anis IV/1 14
Sterndolde, Große V/2 966
Stern-Flockenblume VI/2 980
Stiefmütterchen V/1 605
Stiel-Eiche III 107, 108
Stinkkraut III 222
Stink-Kresse IV/1 84
Stinkstrauch IV/3 1146
Stinkwacholder I 92
Stokesia cyanea L'Hérit. VI/1 408
Storchschnabel IV/3 1671, 1672
Stränze V/2 966
Stragel IV/3 1405
Strand-Distel V/2 981
„ -Winde V/3 2085
Streifenfarn I 25
Strophanthus DC. V/3 2049
Strychnos L. V/3 1951
„ Nux vomica L. V/3 1950
Studentenröschen IV/2 639
Sturmhut III 493
Styrax L. V/3 1900
Succisa pratensis Moench VI/1 288
Süssdolde, Wohlriechende V/2 1045
Süssholz IV/3 1453, 1454, 1455
„ , Wildes IV/3 1422
Süsskirsche IV/2 1083
Sumach V/1 220—222, 224, 225
Sumpf-Bitterklee V/3 1960
-Blutauge IV/2 809
-Dotterblume III 459
-Drachenwurz II 137
-Haarstrang V/2 1396
-Herzblatt IV/2 639
-Kresse IV/1 308
-Moosbeere V/3 1689
-Porst V/3 1626
-Steinklee IV/3 1243
-Wolfsmilch V/1 152
„ -Ziest V/4 2418
Swertia L. V/3 1956, 1974
Symphonia L. V/1 502
Symphytum officinale L. V/3 2225
Symplocos L. V/3 1900
Syringa Josikaea Jacq. V/3 1910
„ vulgaris L. V/3 1917
Syzygium Gaertn. V/2 780

T.

Tabak V/4 2617, 2621
Tabernanthe Baill. V/3 2050
Tachia Aubl. V/3 1956
Täschelkraut, Rundblätteriges IV/1 134
Tagetes patulus L. VI/1 534
Tagnelke, Weisse III 302
Tamarinde IV/3 1130
Tamarindus Indica L. IV/3 1130
Tamonea Aubl. V/2 795
Tanghinia Dupet. Thou. V/3 2050
Tannen-Bärlapp I 65
Taraxacum officinale Weber VI/2 1089
Taubecher IV/2 969
Taubenkropf III 281
„ , Gemeiner III 308
Taubnessel, Gefleckte V/4 2450
„ , Weisse V/4 2447
Taumelkerbel V/2 998
Taumellolch I 376
Tausendgüldenkraut, Echtes V/3 1970
Taxus baccata L. I 80
Tectona grandis L. V/3 2236
Teestrauch V/1 496
Teich-Schachtelhalm I 53

Terminalia L. V/2 771
Teucrium Botrys L. V/4 2533
Chamaedrys L. V/4 2529
montanum L. V/4 2527
Scordium L. V/4 2532
„ Scorodonia L. V/4 2536
Teufelsabbiss VI/1 288
Teufelszwirn V/3 2091, 2094
Thapsia Garganica L. V/2 1500
Thea Sinensis L. V/1 496
Theobroma Cacao L. V/1 491, 492
Thlaspi alliaceum L. IV/1 121
arvense L. IV/1 120
rotundifolium (L.) Gaudin IV/1 134
Thymelaea Passerina Cosson et Germain V/2 727
Thymian V/4 2308; VII 200 Fig. 1241
Thymus Serpyllum L. V/4 2326; VII 200 Fig. 1241
„ vulgaris L. V/4 2308
Tiekbaum V/3 2235
Tilia cordata Mill. V/1 442
Tollkirsche V/4 2568, 2569
Tollkraut V/4 2572
Tordylium L. V/2 1460
Torfbeere IV/2 766
Torfgränke V/3 1656
Tormentill IV/2 884
Toxicodendron Capense Thunb. V/1 120
Trachyspermum Link V/2 1168
Tränengras I 181
Traganth IV/3 1405
Tragopogon pratensis L. VI/2 1052, 1356 Fig. 961
Trapa bispinosa Roxb. V/2 883
„ natans L. V/2 892
Tribulus lanuginosus L. V/1 42
Trauben-Kirsche IV/2 1067
-Spiere VII 180
„ terrestris L. V/1 43
Trifolium L. IV/3 1278
arvense L. IV/3 1324
montanum L. IV/3 1312
pratense L. IV/3 1336
„ repens L. IV/3 1306
Trigonella caerulea Ser. IV/3 1235
Foenum Graecum L. IV/3 1233
Triticum vulgare Vill I 395
Trollblume III 460
Trollius Europaeus L. III 460
Tropaeolum maius L. IV/3 1731
Tüpfelfarn, Gemeiner I 41
Türkenbund II 236; VII 105 Fig. 1137
Turnera L. V/1 657
Tussilago Farfara L. VI/2 679
Typha L. I 113; VII 134 Fig. 1173 B, C

U.

Ufer-Winde V/3 2083
Ulex L. IV/3 1192
Upas-Baum III 123
Uragoga Ipecacuanha Baill. VI/1 196
Urechites suberecta Jacq. V/3 2050
Urena L. V/1 457
Urgebirgs-Frauenmantel IV/2 952
Urginea maritima Baker II 278
Urtica dioeca L. III 140
„ urens L. III 142
Utricularia vulgaris L. VI/1 166

V.

Vaccinium Myrtillus L. V/3 1679, 1680
Oxycoccus L. V/3 1689
uliginosum L. V/3 1685; VII 116 Fig. 1150
„ Vitis Idaea L. V/3 1673
Valeriana officinalis L. VI/1 268, 277
„ spica Vahl VI/1 268
Vanilla planifolia Andrews II 324
Veilchen, Acker- V/1 605
„ , Wohlriechendes V/1 652
Venuskamm V/2 1041
Venusnabel IV/2 513
Veratrum album L. II 194
nigrum L. II 192; VII 160 Fig. 1186
Verbascum L. VI/1 8; VII Fig. 1041, 1148
Verbena L. V/3 2240
Veronica officinalis L. VI/1 59
Viburnum L. VI/1 242; VII 206 Fig. 1256
„ Opulus L. VI/1 245
Vicia Ervilia Willd. IV/3 1513
Faba L. IV/3 1560
„ sativa L. IV/3 1550
Villaresia Ruiz et Pav. V/1 262
Vinca minor L. V/3 2055
Vincetoxicum officinale Moench V/3 2072
Viola odorata L. V/1 652
„ tricolor L. V/1 605
Viscum album L. III 149
Vitex L. V/3 2237
Vitis vinifera L. V/1 401, 414 u. f.
Vogelbeerbaum IV/2 710
Vogelkirsche IV/2 1083
Vogel-Knöterich III 193
-Miere III 353

W.

Wacholder I 90; VII 152 Fig. 1180
Wald-Bingelkraut V/1 133
„ -Ehrenpreis VI/1 59
Walderbse III 509
Wald-Erdbeere IV/2 901, 902
Waldglöckchen V/3 1583
Waldlorbeer V/2 708
Waldmeister, Echter VI/1 202
Wald-Sanikel V/2 959
„ -Weidenröschen V/2 818
Wallwurz V/3 2225
Walnussbaum III 9; VII 36 Fig. 1061
Wanzenkraut, Stinkendes III 480
Wasser-Dost VI/1 402, 403
-Fenchel V/2 1268
„ -Melone VI/1 314
Wassernabel V/2 955
Wassernuss V/2 892
Wasser-Schierling, Giftiger V/2 1166, 1167
Wasserschlauch, Gemeiner VI/1 166
Wegerich VI/1 179
„ , Grosser VI/1 179
Weg-Rauke IV/1 165
Wegwarte VI/2 995, 996
Weichsel IV/2 1078
Weide III 15, 35
Weidenröschen, Rosablühendes V/2 837
Weiderich, Gemeiner V/2 761
Weinraute V/1 72
Weinstock V/1 401, 414 u. f.
Weissbaum IV/2 716
Weiss-Birke III 79
Weissdorn IV/2 734
Weissklee IV/3 1306
Weisswurz II 269
Weizen I 395
Wermut VI/2 655
„ , Pontischer VI/2 643
Wicklinse IV/3 1513
Widerstoss V/3 1882
Wiesen-Alant VI/1 485
-Bärenklau V/2 1454
-Bocksbart VI/2 1052
-Kerbel V/2 1022
-Klee IV/3 1336
„ „ , Weisser IV/3 1306
Wiesenknopf, Großer IV/2 939
„ , Kleiner IV/2 941
Wiesen-Küchenschelle III 539; VII 174 Fig. 1217
-Salbei V/4 2501
-Schaumkraut IV/1 348; VII 33 Fig. 1055
„ -Wucherblume VI/2 613
Windröschen III 519
„ , Gelbes III 521
Winterana Canella L. V/1 585
Wintergrün, Einblütiges V/3 1592
, Nickendes V/3 1577
, Kleines V/3 1583
„ , Rundblätteriges V/3 1589
Winterlieb V/3 1593, 1595, 1596
Winter-Linde V/1 442
Wirbeldost V/4 2297
Witwenblume VI/1 294
Wolfskraut V/4 2390
Wolfsmilch siehe Euphorbia
Wolfstrapp V/4 2388

Wollblume IV/3 1364
Wollgras II 17
Wucherblume VI/2 597, 598, 600
Würzsilie V/2 1163
Wunderbaum V/1 122
Wund-Fetthenne IV/2 521
Wundklee IV/3 1364
Wurmfarn I 18
Wurmkraut IV/1 162

X.

Xanthium spinosum L. VI/1 503
„ strumarium L. VI/1 500
Xanthophyllum lanceolatum J. J. S. V/1 87
Xanthoxylum L. V/1 47
Xantorrhiza apiifolia L'Hérit. III 453; IV/1 9

Y.

Ysop V/4 2360

Z.

Zahnwurz, Weisse IV/1 332
Zaunrübe, Rote VI/1 319
„ , Weisse VI/1 318
Ziegenbart IV/2 673
Ziest V/4 2408
„ , Filziger V/4 2426
Zirbelkiefer I 105
Zirmet V/2 1460
Zistrose V/1 555
Zistrose, Salbeiblätterige V/1 558
Zitrone V/1 66 u. f.
Zittergras I 293
Zittwerwurzel II 321
Zizyphus Juss. V/1 322, 324
Zosimia absinthiifolia Link V/2 1456
Zucker-Rose IV/2 1004
Zuckerrübe III 215
Zuckerwurz V/2 1224
Zwerg-Holunder VI/1 237
Zwerg-Wacholder I 92; VII 152 Fig. 1180
Zwetschge IV/2 1112; VII Fig. 1158, 1225 B
Zwiebel II 233
Zypergras II 10

I) Zierpflanzen

A.

Aasblume VII 199
Abelia floribunda Decsne. VI, 1 235
Abies Mill. I 82; VII 57 Fig. 1092
„ alba Mill. I 84
Abronia Juss. III 266
Abutilon Gaertn. V/1 456, 457
Acacia Willd. IV/3 1123 bis 1126
Acaena Vandelli IV/2 666
Acalypha L. V/1 125
Acanthopanax Decne. V/2 913
Acanthus L. VI/1 177; VII 205 Fig. 1252
Acer L. V/1 271, 272, 273
Monspessulanum L. V/1 289
Negundo L. V/1 294
Opalus Miller V/1 293
palmatum Thunb. V/1 270
platanoides L. V/1 281, 282
Pseudoplatanus L. V/1 276
sacharinum L. V/1 271
Tataricum V/1 272
Acetosa digyna Mill. III 188
Achillea L. VI/2 550, 551
Millefolium L. VI/2 573
Ptarmica L. VI/2 564
„ tomentosa L. VI/2 577
Achimenes P. Br. VI/1 177
Achyranthes Verschaffeltii Lem. III 261
Aciphylla squarrosa Forster V/2 1328
Acker-Gauchheil V/3 1871
-Knorpelkraut III 212
„ -Rittersporn III 487
Aconitum L. III 493 u. f., 506; VII 174 Fig. 1216
„ Napellus L. III 495, 500
Acorus gramineus Ait. II 131, 134
Actaea L. III 477
Actinidia Lindl. V/1 494
Adelia R. Br. V/3 1905
Adenandra Willd. V/1 50
Adenocarpus complicatus J. Gay IV/3 1148
Adenophora (L.) Fischer VI, 365; VII 209 Fig. 1260
Adiantum capillus Veneris L. I 38
Adlumia fungosa (Gmel.) Irmisch IV/1 20
Adonis L. III 597
„ aestivalis L. III 600
Adonisröschen III 597
Aehren-Felsenbirne IV/2 755
„ -Glöckchen VII 197
Aesculus L. V/1 299 u. f.
„ Hippocastanum L. V/1 302
Aëthionema R. Br. IV/1 111
Agapanthus umbellatus L'Hérit. II 278; VII 160 Fig. 1190
Agathosma Willd. V/1 49
Agave L. II 316, 318
Ageratum L. VI/1 408
Aglaonema Schott II 131
Agrimonia L. IV/2 930
Agrostemma Githago L. III 275
Agrostis alba L. I 223
„ nebulosa Boiss. et Reut. I 229
Ahlkirsche IV/2 1066
Ahorn V/1 271, 273
Ailanthus Desf. V/1 81
„ glandulosa Desf. V/1 82
Aira capillaris Host I 240
Akazie, Echte IV/3 1123, 1126
Akebia quinata (Thunb.) Decaisne IV/1 16
Akelei III 480, 481
„ , Gemeiner III 481
Alant VI/1 474
Albizzia Durazz. IV/3 1123
Alchemilla L. IV/2 943
Aletris farinosa L. II 280
Alexandrinischer Lorbeer VII 162
Alhagi pseudalhagi IV/3 1462
Allamanda L. V/3 2051
Allermannsharnisch II 302
Allium L. II 233, 234
Alnus Hill. III 85, 86
glutinosa Gaertner III 92, 93
„ incana (L.) Moench III 90, 91
Aloë L. II 277; VII 117 Fig. 1152
Aloë-Kaktus VII 191
Alonsoa Ruiz et Pav. VI/1 6
Alpen-Aurikel V/3 1764
-Benediktenkraut IV/2 911
-Distel V/2 982
-Gänsekresse IV/1 417
-Glöckchen V/3 1823
-Glöckel V/3 1820
-Goldregen IV/3 1166
-Helmkraut V/4 2518
-Johannisbeere IV/2 651; VII 180 Fig. 1225
-Mannstreu V/2 982
-Milchlattich VI/2 1101
-Nelke III 333
-Pechnelke III 275
-Petersbart IV/2 911
-Rebe III 509
-Rispengras I 311
-Säuerling III 188
-Sockenblume IV/1 10
-Steinkraut IV/1 452
-Strahlensame III 306
-Veilchen V/3 1846; V/3 1736, 1836; VII 197
Alsine rupestris Fenzl III 392
Alstroemeria L. II 320
Alternanthera Forsk. III 261
Althaea L. V/1 463, 465
officinalis L. V/1 468
„ rosea Cav. V/1 464
Alyssoides sinuatum Poir. IV 1 460
Alyssum L. IV/1 446, 447
alpestre L. IV/1 452
„ saxatile L. IV/1 454
Amaracus Gleditsch V/4 2339
Amarantus L. III 261, 262, 263
Amarelle IV/2 1076

Amaryllis belladonna L. II 319
Amelanchier Medikus IV/2 755, 756
„ ovalis Medikus IV/2 759
Amherstia nobilis Wall. IV/3 1130
Amicia Zygomeris DC. IV/3 1462
Ammobium alatum K. Br. VI/1 494
Amorpha canescens Nutt. IV/3 1386
„ fruticosa L. IV/3 1385
Ampelopsis Michx. V/1 355, 356
Amphirrhox longifolia Spreng. V/1 586
Amsinckia Lehm. V/3 2127
Amygdalus (L.) Focke IV/2 1084
Anacampseros L. III 268
Anacardium Rhinocarpus DC. V/1 216
Anacyclus Pyrethrum DC. VI/2 673
Anagallis arvensis L. V/3 1871
Anagyris foetida L. IV/3 1146
Anaphalis margaritacea Bentham et Hooker VI/1 494
Anastatica hierochuntica L. IV/1 70
Anchusa L. V/3 2198
azurea Miller V/3 2202
„ officinalis L. V/3 2200
Andira Lam. IV/3 1496
Andorn V/4 2398
„ , Schwarzer V/4 2399
Andromeda L. V/3 1651
„ polifolia L. V/3 1654
Androsace L. V/3 1792
Androsaemum officinale All. V/1 511
Anemiopsis Californica Hook. et Arn. III 209
Anemone L. III 518
narcissiflora L. III 528
„ Pulsatilla L. III 535
Anemonopsis macrophylla Sieb. et Zucc. III 453
Angelica Archangelica L. V/2 1345
Angophora intermedia DC. V/2 781
Angrecum Thouars II 324
Anguloa Ruiz et Pav II 324
Anguria Plum. VI/1 316
Anigosanthus II 320
Anoda Cav. V/1 456
Antennaria dioeca Gaertner VI/1 457
Anthemis nobilis L. VI/1 536
Anthericum Rchb. L. II 203
Antholyza L. II 306
Anthurium L. II 131
Anthyllis Barba Jovis L. IV/3 1353
Antigonum leptopus Hook. et Arn. III 166
Antirrhinum Asarina L. VI/1 19
„ maius L. V/1 19
Apfelbaum IV/2 743, 744
Apfelbeere, Rotfrüchtige IV/2 706
„ , Schwarzfrüchtige IV/2 706
Apfelsine V/1 62
Aphelandra R. Br. VI/1 177
Apicra Willd. II 277
Apios tuberosa Moench IV/3 1625
Apocynum L. V/3 2051
Aponogeton L. f. I 164
Aquilegia L. III 480, 481
„ Canadensis L. III 480
Arabis albida Stev. IV/1 396
alpina L. IV/1 417
Caucasica Willd. IV/1 396
muralis Bertoloni IV/1 407
„ verna R. Br. IV/1 396
Aralia L. V/2 913
Araucaria excelsa R. Br. I 81; VII 50 Fig. 1081
imbricata Pav. I 81; VII 150 Fig. 1178
Arbutus Unedo L. V/3 1665
Arctium tomentosum Mill. VI/2 834
Arctostaphylos Adans. V/3 1656
Arctotis L. VI/2 806
Ardisia Sw. V/3 1715
Argemone L. IV/1 20
„ Mexicana L. IV/1 19
Aristolochia L. III 162
Sipho L'Hérit. III 162; VII 130 Fig. 1170
Aristotelia Maqui L'Hérit. V/1 426
Armeria Willd. V/3 1885
Arnebia decumbens Cosson et Kral. V/3 2128
Arnica L. VI/2 704
Aronia Pers. IV/2 755
Artemisia L. VI/2 629, 630
„ laxa Fritsch VI/2 649
Artischocke VI/2 924, 925
Arum L. II 132 ff.
Aruncus IV/2 663
astilboides Maxim. IV/2 671
„ silvester Kosteletzky IV/2 673
Arundo Donax L. I 173, 271
Arve I 106
Asclepias L. V/3 2065, 2066
„ Cornuti Decaisne V/3 2065
Asimina triloba Dun. IV/1 14
Asparagus L. II 261; VII 162
silvaticus Waldst. et Kit. II 263
Sprengeri Regel 261; VII 161 Fig. 1193
„ tenuifolius Lam. II 263
Aspe III 62
Asperula L. VI/1 199
„ Orientalis Boiss. VI/1 196
Asphodeline Liliago II 277
Asphodelus L. II 199
Aspidistra elatior Blume II 280; VII 161 Fig. 1194
Aspidium aculeatum (L.) Doell I 22
„ Filix mas (L.) Sw. I 19
Asprella Hystrix Willd. I 402
Aster L. VI/1 416 bis 420
lanceolatus Willd. VI/1 435
levis L. VI/1 431
Novae Angliae L. VI/1 430
Novi Belgii L. VI/1 431
„ Tradescanti L. VI/1 435
Astilbe D. Don IV/2 566
Astragalus L. IV/3 1405, 1406
Astrantia L. V/2 963, 965
Astrophytum myriostigma (Salm-Dyck) Lem. V/2 694
Asyneuma Griseb. et Schenk VI/1 368
Athamanta Turbith Brot. V/2 1277
Athyrium Filix femina Roth I 33
Atragene alpina L. III 509
Atriplex hortense L. III 240
Aubrietia deltoides DC. IV/1 396
Aucuba Thunb. V/2 1539
Auferstehungspflanzen VII 33
Augenwurz, Feinblätterige V/2 1277
Aurikeln V/3 1770
Australheidengewächse VII 196
Ayrshire-Rosen IV/2 1000
Azadirachta Indica L. V/1 85
Azalee V/3 1629 bis 1634
„ , Niederliegende V/3 1651
Azara Ruiz et Pav. V/1 656

B.

Bachminze V/4 2345
Backhousia myrtifolia Hook. et Harv. V/2 780
Baeckea virgata Andr. V/2 789
Bärenklau V/2 1421 u. f.; VII 205 Fig. 1252
Bärentraube V/3 1656
Baeria chrysostoma Fisch. et Mey. VI/1 534
Ballota L. V/4 2399
Bambusa Schreb II 173, 402
Banffya petraea Baumg. III 310
Bandgras I 197
Baptisia Vent. IV/3 1146
Barbaraea vulgaris R. Br. IV/1 303
Barbenkraut, Echtes IV/1 303
Barclaya F. v. Muell. III 439
Barosma foetidissimum Bartl. et Wendland V/1 49
Bart-Nelke III 319, 322
Basilicum Moench V/4 2270
Basilie V/4 2268 u. f.
Bastard-Schwertlilie II 295
Bauera Banks IV/2 566
Bauernsenf, Bitterer IV/1 107, 108
, Doldiger IV/1 106
Fliederblätteriger IV/1 109
„ , Immergrüner IV/1 192
Baum der Reisenden II 320
Baumhasel III 71
Beaucornea recurvata Lem. III 280
Becherglocke VI/1 389
Beerenapfel IV/2 743
Beeren-Malve VII 188
Begonia L. V/1 664—668
Beifuß VI/2 629, 630
Bellevalia graminifolia Nyman II 259
Bellis perennis L. VI/1 415
rotundifolia Boiss. et Reuter VI/1 414
Benediktenkraut IV/2 914
Benincasa cerifera Fisch. VI/1 315

Benthamia fragifera Lindl. V/2 1543
Berberidopsis corallina Hook. V/1 656
Berberis L. IV/1 6
Aquifolium (Nutt.) Pursh IV/1 6
„ vulgaris L. IV/1 7
Berberitze IV/1 7
Berchemia Neck. V/1 324
Bergamasker-Geißklee IV/3 1172
Berg-Bärwurz V/2 1303
Bergenia Moench IV/2 566
Berg-Ahorn V/1 276
-Erbse IV/3 1570
-Flockenblume VI/2 967
-Föhre I 102
-Johannisbeere IV/2 652
„ -Kälberkropf V/2 1009
Bergminze V/4 2280
Bergscharte VI/2 932
Berg-Ulme III 120
Bertolonia Raddi V/2 796
Bertram, Römischer VI/2 673
, Wilder VI/2 564
„ -Schafgarbe VI/2 564
Berufskraut VI/1 436
Berzelia squarrosa Sond. IV/2 655
Beschorneria Kunth II 320
Besenginster IV/3 1189
Besenpfriem IV/3 1189; VII 183 Fig. 1226 B
Betonica grandiflora Steven V/4 2408
Betula L. III 75; VII 133 Fig. 1173
„ verrucosa Ehrh. III 80
Bibernelle, Grosse V/2 1199
„ , Kleine V/2 1203
Bidens L. VI/1 516
Biensaug V/4 2471
Bignoniengewächse VI/1 175
Billardiera Smith IV/2 655
Binsenginster IV/3 1214; VII 183 Fig. 1226 B
Biota Orientalis L. I 82
Birke III 75
„ , Gemeine III 79
Bisamhyazinthe II 258, 259
, Kleine II 259
„ , Schopfige II 259
Bisam-Malve V/1 481
„ -Storchschnabel IV/3 1725
Bischofsmütze IV/1 10; V/2 694
Biscutella auriculata L. IV/1 102
Bismarck-Veilchen VI/1 177
Bitterschopf VII 150 und 117 Fig. 1152
Bixa Orellana L. V/1 584
Blasenkirsche V/4 2579
Blasenstrauch IV/3 1456, 1457
Blattkaktus V/2 696
Blaudolde V/2 956
Blauglockenbaum VII 203 Fig. 1249
Blaukissen VII 178
Blauspiere IV/2 681
Blauveilchen, Duftendes V/1 648, 649
Bleiwurz V/3 1878; VII 197 Fig. 1237
Blumenbachia Schrad. V/1 662
Blumenrohr II 321
Blutbirke III 79
Blutblume II 319; VII 68 Fig. 1102
Blut-Buche III 97
„ -Eiche III 110
Blutnuß III 71
Blutröslein IV/3 1679
Blut-Storchschnabel IV/3 1679
„ -Weiderich V/2 761
Bocconia L. IV/1 19
Bocksbart VI/2 1043
Bocksdorn IV/3 1405; V/4 2562, 2563
Chinesischer V/4 2565
„ , Gemeiner V/4 2564
Bohne IV/3 1637
Bohnenbaum IV/3 1163
Boisduvalia Spach V/2 799
Boltonia asteroides L'Hérit. VI/1 449
Bomarea Mirb. II 320
Bombardierpflanze III 137
Bonapartea hort. II 279
Bonplandia geminiflora Cav. V/3 2114
Boronia Smith V/1 48
Borsten-Schwingel I 340
Bossiaea Vent. IV/3 1147
Bougainvillea spectabilis Willd. III 266; VII 51 Fig. 1083
Bouquet-Narzisse II 313
Boussingaultia baselloides H. B. et Kth. 267
Bouvardia Salisb. VI/1 197; VII 206 Fig. 1253
Bowiea volubilis Harvey II 277
Boykinia Nutt. IV/2 567
Brachycome iberidifolia Benth. VI/1 449
Brachysema R. Br. IV/3 1147
„ lanceolatum Meissn. IV/3 1147
Brandkraut V/4 2436
Brasenia Schreb. III 438
Brassavola R. Br. II 324
Braunelle V/4 2377
„ , Große V/4 2383
Braunkohl, Gefranster IV/1 246
Braut in Haaren III 474
Bravoa Llavé et Lexarza II 319
Brennende Liebe III 296
Breitfaden VII 197
Breitglocke VII 209
Breitnarbe VII 176
Brillenschötchen, Geöhrtes IV/1 102
Brittonastrum Briquet V/4 2368
Briza L. I 292
„ maxima L. I 173
Brodiaea Sm. II 278
Brombeere IV/2 762
Bromeliaceen II 143
Bromus briziformis Fisch. et Mey. I 369
Brongniartia Humb. IV/3 1387
Broussonetia L'Hért. III 136
Browallia L. V/4 2555
Bruckenthalia spiculifolia (Salisb.) Rchb. V/3 1622
Brunfelsia L. V/4 2555
Brunia L. IV/2 655
Brutblatt VII 179
Brutkohl IV/1 246
Bryonia alba L. VI/1 318
Bryonopsis Arn. VI/1 316
Buchanania latifolia Roxb. V/1 215
Buche III 97
Buchenwald-Melisse V/4 2289
Buchs V/1 211
Bulbocodium vernum L. II 194
Buddleia L. V/3 1952
Büschel-Nelke III 321
Büschelschön V/3 2119; VII 11 Fig. 989
Bumelia sp. V/3 1898
Buntlippe V/4 2271
Bupleurum fruticescens L. V/2 1103
„ fruticosum L. V/2 1103
Busch-Hainsimse II 178
Butomus umbellatus L. I 157; VII 6 Fig. 978
Butternuß III 7
Buwardie VII 206 Fig. 1253
Buxus L. V/1 204
sempervirens L. V/1 211

C.

Cabomba Aubl. III 438
Cactus V/2 693
Caesalpinia L. IV/3 1127
Cajophora lateritia Klotzsch V/1 662
Cakile maritima Scop. IV/1 184
Caladium Vent. II 131
Calandrinia H. B. et Kth. III 268
Calathea G. F. W. Meyer I 321
Calceolaria L. VI/1 6; VII 202 Fig. 1245
Calendula officinalis L. VI/2 802
Calla L. II 131; VII 77 Fig. 1113
Aethiopica L. II 131; I/CXI Fig. 183
Calliandra grandiflora Benth. IV/3 1123
Callianthemum rutifolium (L.) Rchb. III 461
Callicarpa L. V/3 2236
Calliopsis bicolor Rchb. VI/1 529
Callistemon R. Br. V/2 788
Callistephus VI/1 448; VI/2 1355 Fig. 959
Calluna vulgaris Hull V/3 1691, 1699
Calocephalus Brownii Ferd. v. Müller VI/1 495
Calochortus Pursh II 278
Calonyction speciosum Choisy V/3 2076
Calophaca Wolgarica Fisch. IV/3 1402

Calothamnus Labill. V/2 789
Caltha palustris L. III 459; VII 58 Fig. 1094 e
Calycanthus L. IV/1 14
Calycotome spinosa Link IV/3 1148
Camellia L. VI/1 497
Campanula L. VI/1 331
glomerata L. VI/1 341
persicifolia L. VI/1 360
pyramidalis L. VI/1 345
rapunculoides L. VI/1 342
„ Rapunculus L. VI/1 361
Campsis radicans (L.) Seem. VI/1 175
Canarina Campanula L. VI/1 329
Canna Indica L. II 321
Cantua buxifolia Juss. V/3 2114
Capparis decidua Pax IV/1 491
Capsicum L. V/4 2556
Caragana Lam. IV/3 1400, 1401
Cardiospermum Halicacabum L. V/1 307
Carduus L. VI/2 845
„ pycnocephalus L. VI/2 862
Carlina vulgaris L. VI/2 824
Carludovica Ruiz et Pav. II 131
Carmichaelia R. Br. IV/3 1390
Carpinus L. III 66
„ Betulus L. III 68
Carriereà calycina Franchet V/1 657
Carthamus L. VI/2 986
Carya Nutt. III 7
Caryophyllus barbatus Moench III 319, 322
„ plumarius Moench III 339
Caryopteris Bunge V/3 2238
Cassebeeria margaritacea Krasser V/2 796
Cassia L. IV/3 1131, 1132
Cassiope D. Don V/3 1621
Castalia Salisb. III 441, 443
Castanea Miller III 101; VII 27 Fig. 1050
Catalpa Scop. VI/1 175; VII 204 Fig. 1251
Catananche L. VI/2 1007
Catasetum Knuth II 324
Cattleya Lindl. II 324
Ceanothus L. V/1 325
Cebatha Carolina IV/1 16
Cecropia Loefl. III 124
Ceder I 81
, Japanische VII 151 Fig. 1179 B
Cedronella Canariensis Willd. V/4 2368
Cedrus (Trew) Link I 81
Celastrus L. V/1 245
„ paniculatus Willd. V/1 245
Celosia argentea L. III 261
„ cristata L. III 261
Celtis L. III 121, 122
„ australis L. III 122
Centaurea L. VI/2 936, 937
Centaurea Cyanus L. VI/2 961
montana L. VI/2 967
„ Triumfetti All. VI/2 969
Centifolie IV/2 992
Centradenia G. Don V/2 795
Centranthus DC. VI/1 277
Cephalanthus occidentalis L. VI/1 196
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiffer V/2 693
Cephalotaxus Sieb. et Zucc. I 79; VII 150
Cerastium L. III 360
„ tomentosum L. III 360, 376
Cerasus (L.) Pers. IV/2 1068
Cercidiphyllum Japonicum Sieb. et Zucc. IV/2 655
Cercis L. IV/3 1133
„ Siliquastrum L. IV/3 1164
Cercocarpus H. B. et Kth. IV/2 666
Cereus Haw. V/2 693
Cerinthe maior L. V/3 2187, 2188
Ceropegia L. V/3 2066
Cestrum L. V/4 2554
Chaenomeles Lindl. IV/2 694
Japonica (Thunb.) Lindl. IV/2 693
Chaerophyllum hirsutum L. V/2 1009
„ roseum Bieb. V/2 995
Chamaecyparis pisifera C. Koch I 82
Chamaedaphne calyculata Moench V/3 1656
Chamaepeuce DC. VI/2 923
Chamaerops L. II 130
Cheiranthera Cunn. IV/2 655
Cheiranthus Cheiri L. IV/1 444
Chelidonium hybridum L. IV/1 19
Chelone L. VI/1 6
Chimonanthus praecox Link IV/1 14
Chiogenes hispidula Torrey et Gray V/3 1622
Chionanthus L. V/3 1905
Chionodoxa Boiss. II 279
Chlorophytum Ker. II 277; VII 126 Fig. 1166
Choisya ternata Knuth V/1 48
Chorizema Labill. IV/3 1147
Christophskraut III 477
Christusauge VI/2 1007
Christusdorn IV/3 1128; V/1 136, 326
Chrysanthemum L. VI/2 593 bis 596, 599, 600
Leucanthemum L. VI/2 612
macrophyllum Waldst. et Kit. VI/2 616
Parthenium Bernh. VI/2 619
„ Tanacetum Karsch VI/2 621
Chryseïs Californica Torr. et Gray IV/1 19
Chrysocoma Coma-aurea L. VI/1 449
Cicerbita Wallr. VI/2 1097
„ alpina Wallr. VI/2 1101
Cineraria hybrida hort. VI/2 740
Cineraria maritima L. VI/2 728
Cirrhopetalum Lindl. II 324
Cirsium Miller VI/2 867, 868
„ lanceolatum Hill VI/2 875
Cissus L. V/1 354
Cistus L. V/1 555, 556
„ salviifolius L. V/1 558
Citriobatus multiflorus Cunn. IV/2 655
Citrus L. V/1 56; VII Fig. 1078, 1093
Aurantium L. subsp. Japonica Hook. V/1 64
Aurantium L. subsp. Sinensis Gall. V/1 62
medica L. subsp. Bajoivia V/1 65
medica L. var. digitata Risso V/1 68
nobilis Lour. V/1 59
„ trifoliata L. V/1 58
Cladanthus Arabicus Cass. VI/2 674
Cladrastis Raf. IV/3 1145
Clarkia Pursh V/2 799, 800
Claytonia L. III 268
Clematis L. III 508, 509
integrifolia L. III 515
recta L. III 516
Vitalba L. III 512
„ Viticella L. III 517
Cleome L. IV/1 490
Cleomella Mexicana DC. IV/1 490
Clerodendron L. V/3 2238, 2239
Clethra L. V/3 1713; VII 196 Fig. 1236
Clianthus Banks et Soland. IV/3 1456; VII 89 Fig. 1120
Clitoria L. IV/3 1626
Clivia Lindl. II 319
Cneorum tricoccum L. V/1 44
Cobaea scandens Cav. V/3 2112
Coccoloba L. III 166
Cocculus Carolina IV/1 16
Cochliostema Jacobinianum C. Koch II 143
Cochranea anchusifolia Gürke V/3 2131
Codiaeum variegatum Bl. V/1 125
Coelogyne Lindl. II 324
Coix lacryma Jobi L. I 173, 181
Colchicum L. II 197; VII 43 Fig. 1074
Coleonema Bartl. et Wendl. V/1 50
Coleus Loureiro V/3 2271
Colletia Juss. V/1 322
Collinsia bicolor Benth. VI/1 5, 6
Collomia grandiflora Dougl. V/3 2118
Columnea L. VI/1 177
Coluria Laxmannii (Gaertn.) Ascherson et Graebner IV/2 928
Colutea L. IV/3 1143, 1456, 1457
Combretum L. V/2 772, 773
Commelina L. II 143

Convallaria majalis L. II 275; VII 102 Fig. 1132
Convolvulus L. V/3 2079
„ sepium L. V/3 2083
Cordyline terminalis Kth. II 279
Coreopsis Nutt. VI/1 529; VI/2 1354 Fig. 957
Cornus L. V/2 1542 bis 1545
„ sanguinea L. V/2 1547
Coronaria III 296, 297; VII 71 Fig. 1106
Coronilla Emerus L. IV/3 1469
Correa Andr. V/1 49
Cortaderia Selloana Aschers. et Graebn. VII 155
Cortusa Matthioli L. V/3 1820
Corydalis Medikus IV/1 37, 42
lutea (L.) DC. IV/1 42
„ solida (Miller) Sw. IV/1 40
Corylus Avellana L. III 73; VII Fig. 1105, 1107, 1118
Colurna L. III 71
„ maxima Mill. III 71
Corytholoma (Benth.) Decaisne VI/1 177
Cosmos Cav. VI/1 531
Costus L. II 321
Cotinus Coggygria Miller V/1 228
Cotoneaster Medikus IV/2 683, 684
integerrima Medikus IV/2 688
„ melanocarpa Lodd. IV/2 685
Cotyledon L. IV/2 513, 514
Crassula L. IV/2 514, 515
Crataegomespilus IV/2 742
Crataegus L. IV/2 727—729, 730, 731, 733, 737—739
coccinea L. IV/2 727
monogyna Jacq. IV/2 737—739
Oxyacantha L. IV/2 733, 734
„ Reginae hort. IV/2 737
Crepis L. VI/2 1135
Crimson Rambler IV/2 992
Crinum L. II 319
Cristaria coccinea Sonn. V/2 773
Crithmum maritimum L. V/2 1225
Crocosma Plach. = Tritonia Ker-Gawl. II 305; VII 164 Fig. 1198
Crocus L. II 297; VII 125 Fig. 1165
albiflorus Kit. II 300
„ biflorus Mill. II 302
Croton L. VII 185
Crucianella L. VI/1 196, 197
Cryptadenia grandiflora Meissn. V/2 702
Cryptomeria Japonica Don I 81; VII 151 Fig. 1179 B
Cucurbita L. VI/1 324—328
Cuphea Adans. V/2 745
Cupressus L. I 82
Curculigo Gaertn. II 320
Cyananthus lobatus Wall. VI/1 329
Cyanophyllum magnificum Lindl. V/2 796
Cycas L. I 73; VII 55 Fig. 1090
Cyclamen L. V/3 1841, 1842
Cydonia Japonica Pers. IV/2 693
Cymbalaria Baumg. VI/1 27
Cymbidium Sw. VII 165
Cynara L. VI/2 924, 925
Cynoglossum L. V/3 2147
Cyperus L. II 9, 10
congestus Vahl II 10
Luzulae Rottb. II 10
„ Papyrus L. II 10
Cypresse I 82
Cypressenkraut VI/2 672
Cypripedium L. II 324, 326
Cyrtandra Forst. VI/1 177
Cyrtanthus Ait. II 319
Cytisanthus radiatus L. IV/3 1194
Cytisus L. IV/3 1168
Adami Poiteau IV/3 1166
Austriacus L. IV/3 1175
-Bastarde IV/3 1181
emeriflorus Rchb. IV/3 1172
hirsutus L. IV/3 1177
nigricans L. IV/3 1170
purpureus Scop. IV/3 1180
Ratisbonensis Schäffer IV/3 1179
sessilifolius L. IV/3 1173

D.

Daboecia Cantabrica K. Koch V/3 1620
Daedalacanthus P. And. VII 205
Dahlia Cav. VI/1 529—531
Dais cotinifolia L. V/2 702
Dalea L. IV/3 1386
Dalechampia Roezliana Müll.-Aarg. V/1 125
Damaszener Rose IV/2 993
Daphne L. V/2 705
albiflora Wolf V/2 710
Blagayana Freyer V/2 724, 725
Cneorum L. V/2 719
Laureola V/2 708
Mezereum L. V/2 710, 713
papyracea Sieb. V/2 701
petraea Leybold V/2 722
„ striata Trattinik V/2 721
Dasylirion Zucc. II 279
Datisca cannabina L. V/1 663
Datura L. V/4 2612, 2613
„ Stramonium L. V/4 2614, 2616
Delphinium L. III 486
Ajacis L. III 489
„ elatum L. III 486, 490
Dendrobium Sw. II 324
Dentaria enneaphylla L. IV/1 332
Desfontainea spinosa Ruiz et Pavon V/3 1952
Desmodium Desv. IV/3 1462, 1463
Deutsche Flagge IV/3 1456; VII 89 Fig 1120
Deutzia Thunb. IV/2 565
Diacrium Lindl. II 324
Dianthus L. III 319, 320
alpinus L. III 333
Armeria L. III 321
barbatus L. III 319, 322
caesius Sm. III 319, 335, 336
Carthusianorum L. III 319, 323
Chinensis L. III 319
deltoides L. III 329
plumarius L. III 319, 339
pulcherrimus Loisel. III 319, 322
„ superbus L. III 319, 342
Dicentra Borkh. IV/1 20
Dichroa febrifuga Lour. IV/2 566
Dickblatt IV/2 514, 515
Diclytra IV/1 20
Dicranostigma leptopodum (Maxim.) Fedde IV/1 20
Dictamnus alba L. V/1 75, 76
Didiscus caeruleus DC. V/2 956
Dieffenbachia picta Schott II 131
Diervilla L. VI/1 235
Digitalis L. VI/1 66
purpurea L. VI/1 67; VII 91 Fig. 1121
Dimorphotheca Moench VI/2 806
Dionaea muscipula Ellis IV/2 498
Dillenia Indica L. V/1 494
Dioon Lindl. I 73
Dioscorea L. II 281
Diosma L. V/1 50
Diospyros Lotus L. V/3 1899
Dipcadi Med. II 279
Dipladenia DC. V/3 2051
Dipsacus L. V/1 281
Diptam, Weisser V/1 76
Dirca palustris L. V/2 702
Dirlitze V/2 1548
Disa Berg I 324
Discaria febrifuga Mart. V/1 322
Discocactus Pfeiffer V/2 696
Distel VI/2 845
Alpen- VI/2 850
„ , knäuelköpfige VI/2 862
Dodecatheon L. V/3 1732
Dodonaea L. VII 187
Dolden-Milchstern II 253
Dolichos Lablab L. IV/3 1624
Dombeya Cav. VII 188
Donax Pal. I 270
Donia digyna R. Br. III 188
„ sapida R. Br. III 188
Doppeldrilling VII 158
Doppelmalve VII 188
Doppelsporn IV/1 20
Dornmyrte II 266
Doronicum L. VI/2 711
Clusii Tausch VI/2 725
cordatum Schultz-Bip. VI/2 715
grandiflorum Lam. VI/2 722, 1354 Fig. 958
Pardalianches L. VI/2 720

Dorstenia L. III 124
Doryanthes Correa II 320
Dotterblume III 457; VII 58 Fig. 1094 e
Douglas-Tanne I 81
Dracaena Vandelli II 279
Drachenkopf V/4 2361, 2362, 2365, 2366
Dracocephalum L. V/4 2362, 2365, 2366
Moldavica L. V/4 2361
Dracunculus Mill. II 134
Drillingsblume VII 51 Fig. 1083
Drosera L. IV/2 498, 499
Drosophyllum Lusitanicum (L.) Link IV/2 498
Drüsenglocke VI/1 36; VII 209 Fig. 1260
Dryas Drummondii Richardson IV/2 922
octopetala L. IV/2 922
Duchesnea Indica Focke IV/2 908
Dünenrose IV/2 1051, 1052
Duftblüte VII 197
Duftstrauch VII 184
Dufttrichter VII 197
Dukaten-Röschen III 557; VI/2 1198
Duranta L. V/3 2236

E.

Ebenus Cretica L. IV/3 1462
Eberesche IV/2 707, 711
Ebereschen-Fiederspierstaude IV/2 681
Eberwurz, Gemeine VI/2 824
Eccremocarpus scaber Ruiz et Pav. VI/1 176
Echeveria DC. IV/2 513, 514
Echinacea purpurea Moench VI/1 504
Echinocactus Link et Otto V/2 694
Echinocereus Engelm. V/2 693
Echinodorus Rich. I 154, 156
Echinops L. VI/2 807
Echinopsis Zucc. V/2 693
Echites L. V/3 2051
Echium L. V/3 2193
Edeldistel VI/2 920, 976
Edelnuss III 7, 8
Edelraute VI/2 649
Edeltanne I 84; VII 57 Fig. 1092
Edelweiss VI/1 458, 461
„ der Dünen VI/1 457
Edgeworthia Meisn. V/2 701
Edraianthus A. DC. VI/1 389
Efeu V/2 915, 917, 918, 923
Efeugeranium IV/3 1664
Ehrenpreis VI/1 40, 58
Eibe I 79, 81
Eibisch V/1 468
Eiche III 106, 110, 112, 113, 114, 115
Eichhornia Kunth II 143
Eierpflanze V/4 2587
Eisenhut III 493 u. f., 506; VII 174 Fig. 1216
„ , Blauer III 495, 500
Eisenkraut V/3 2239, 2240
Eiskraut III 267
Elaeagnus L. V/2 730, 731
Elatostema sessile Forst. III 137
Eleutherococcus Max. V/2 913
Elfenbeindistel V/2 976
Elodea Michaux I 160
Elsbeere IV/2 719, 1066
Elymus caput Medusae L. I 400
Empetrum nigrum L. V/3 1609; VII 43 Fig. 1072
Encephalartos Lehm. I 73
Endyanthe coeli-rosa Rchb. III 277
Endymion non scriptum Garcke II 249
Engelwurz V/2 1345
Enkianthus Lour. V/3 1621
Entelea arborescens R. Br. V/1 428
Enzian, Gelber V/3 1988
„ , Grossblütiger V/3 2010
Epacris Cav. V/3 1712, 1713
Ephedra L. I 75; VII 104 Fig. 1135
Epidendrum Lindl. II 324
Epigaea repens L. V/3 1622
Epilobium L. V/2 807
angustifolium L. V/2 818
„ hirsutum L. V/2 825
Epimedium L. IV/1 5, 9
„ alpinum L. IV/1 10
Epiphyllanthus V/2 696
Epiphyllum truncatum Haw. V/2 695
Eranthis hiemalis (L.) Salisb. III 473; VII 9 Fig. 987 d
Erbsen-Wicke IV/3 1520
Erdbeerbaum V/3 1665
Erdbeer-Gewürzbaum IV/1 14
„ -Wolfsmilch V/1 153
Erdbirne IV/3 1625
Erd-Eichel IV/3 1593
Erdmäuse IV/3 1593
Erdscheibe V/3 1841, 1842
Eremurus Bieb. II 277
Erica L. V/3 1700
carnea L. V/3 1705
„ Tetralix L. V/3 1711
Erigeron L. VI/1 436
Erinacea Anthyllis Link IV/3 1148
Erinus L. VI/1 70
Eriogonum L. III 166
Eriogynia pectinata Hook. IV/2 663
Eriophorum L. II 17
Eriostachys Rchb. V/4 2407
Eritrichium barbigerum Gray V/3 2134
Erle III 90, 91, 92, 93
Erodium L'Hérit. IV/3 1717, 1718
moschatum L'Hérit. IV/3 1725
Erucastrum Presl IV/1 220
Eryngium V/2 976, 977; VII 64 Fig. 1098 A
alpinum L. V/2 982
amethystinum L. V/2 986
campestre L. V/2 991
„ planum L. V/2 984
Erysimum L. IV/1 426
Erythrina L. IV/3 1626
Erythronium L. II 245
Escallonia L. f. IV/2 566
Esche V/3 1921, 1922; VII 198 Fig. 1238
Eschen-Ahorn V/1 293
Eschscholtzia Californica Cham. IV/1 19; VII 74 Fig. 1109 g
Eselsdistel VI/2 922
Eselsohren IV/3 1565
Esparsette, Spanische IV/3 1485
Esparsetten-Wicke IV/3 1529
Espe III 62
Essigbaum V/1 222
Essig-Rose IV/2 1003, 1004
Etagenblume VII 203
Eucalyptus L'Hérit. V/2 785
amygdalina Labill. V/2 785
„ Globulus Labill. V/2 785
Eucharidium Fisch. et Mey. V/2 800
Eucomis L'Hér. II 279
Eugenia myrtifolia Sims V/2 780
Eulalia Japonica Trin. I 186
Eupatorium L. VI/1 401
Euphorbia fragifera Jan V/1 153
Lathyris L. V/1 147
„ polychroma Kern. V/1 154
Eurya Japonica Thunb. V/1 498
Euryale Salisb. III 439
Euscaphis staphyleoides Sieb. et Zucc. V/1 257
Eutaxia R. Br. IV/3 1147
Evodia hortensis Forst. V/1 48
Evonymus L. V/1 247 u. f.
latifolia Miller V/1 255, 256
„ verrucosa Scop. V/1 254
Ewigkeitsblume VI/1 469
Exacum affine Balf. V/3 1956
Exochorda Lindl. IV/2 663
Exogonium Purga Bentham V/3 2076
Eysenhardtia amorphoides Humboldt IV/3 1386

F.

Fabiana imbricata Ruiz et Pavon V/4 2556
Fächer-Gerste I 398
Färber-Ginster IV/3 1202
-Kamille VI/1 537
„ -Wanzenblume VI/1 529
Fagus Americana Sweet III 96
„ silvatica L. III 97
Fahnenblume VII 157
Farbkraut IV/3 1202
Farnpalmen I 73

Fatsia Japonica (Thunb.) Decne. et Planch. V/2 914
Faulbaum V/1 348
Federgras III 162; VII 153 Fig. 1224
Feder-Hyazinthe II 259
Federkohl IV/1 246
Feder-Nelke III 339
-Pfriemengras I 203
„ -Spiere VII 180
Fedia Cornucopiae DC. VI/1 262
Feigenbaum III 124, 125
Feigenkaktus V/2 688; VII 191 Fig. 1232
Feld-Ahorn V/1 284
-Mannstreu V/2 991
„ -Ulme III 119
Felicia VI/1 449
Felsen-Bauernsenf IV/1 105
Felsenbirne IV/2 755, 756, 759
„ , Kanadische IV/2 756
Felsen-Kaktus V/2 693 I/LXXVIII
-Miere III 392
-Seidelbast V/2 722
-Steinkraut IV/1 454
„ -Storchschnabel IV/3 1709
Ferdinanda Lag. VI/1 528
Ferocactus Britton et Rose V/2 694
Ferula L. V/2 1354 u. f.
Festuca heterophylla Lam. I 340
ovina L. I 330
„ rubra L. I 342
Fettblatt-Steinbrech IV/2 593
Fetthenne IV/2 518, 519
, Spanische IV/2 529
Unechte IV/2 526
„ , Weisse IV/2 535, 536
Feuerauge III 597
Feuerbohne IV/3 1637
Feuerbusch IV/2 693
Feuerdorn IV/2 688
Feuerlilie II 234, 237
Feuermohn IV/1 29; VII 18 Fig. 1016
Fichte I 87 VII 52 Fig. 1084
Ficus L. III 124, 125
„ elastica L. VII 169 Fig. 1209
Fieberbaum V/2 785
Fieberklee V/3 1957
Fieber-Trugblume IV/2 566
Filipendula hexapetala Gilib. IV/2 974
Ulmaria (L.) Maxim. IV/2 973, 974
Filz-Weissdorn IV/2 728
Fingerhut VI/1 66
, Purpurroter VI/1 67; VII 91 Fig. 1121
Fingerkraut IV/2 813
Hohes IV/2 849
„ , Nordrussisches IV/2 858
Fioringras I 223
Fittonia E. Coem. VI/1 178
Flachs, Neuseeländischer II 277
Flachs, Wilder I 203
Flachslilie II 277
Flammenblume V/3 2113
Flatter-Ulme III 121
Flaum-Eiche III 113, 114
Fleissiges Lieschen V/1 314
Flieder V/3 1909, 1912
„ , Gemeiner V/3 1915
Flockenblume VI/2 936, 937
„ , Bunte VI/2 969
Flügel-Ginster IV/3 1198
Flügelkaktus V/2 696
Flügelnuss III 7; VII 167 Fig. 1206
Fluhbirne IV/2 759
Flussceder, Kalifornische I 82
Fluss-Kreuzkraut VI/2 758
Föhre I 97, 100
Fontanesia Labill. V/3 1903
Forsythia Vahl V/3 1903
Fothergilla L. IV/2 655, 657
Fouquièra splendens Engelm. V/1 493
Fourcroya Schult. II 317; VII 163
Francisca uniflora Pohl V/4 2555
Francoa Cav. IV/2 567
Frangula Miller V/1 344
Alnus Miller V/1 346, 348
„ Purshiana Coop. V/1 343
Frankfurter Rose IV/2 994
Frauenherz IV/1 20
Frauenhaar I 38
Frauenmantel IV/2 945
Fraxinus L. V/3 1921, 1922
excelsior L. V/3 1930; VII 54 Fig. 1088
Ornus L. V/3 1924; VII 198 Fig. 1238
Freesea refracta Klatt II 306; VII 165 Fig. 1199
Fritillaria imperialis L. II 239
„ Meleagris L. II 241
Frühlings-Ahorn V/1 293
Frühlingsheide V/3 1705
Frühlings-Knotenblume II 310
-Lichtblume II 194
-Safran II 300
„ -Walderbse IV/3 1576
Frühmesserln V/4 2554
Fuchsia L. V/2 801; VII 31 Fig. 1053
Fuchsschwanz III 261—263; VI/1 74, 372
Fünffaden VII 204
Fünfling VII 207
Fumaria L. IV/1 45
Funckia Spr. II 277; VII 160 Fig. 1188

G.

Gänseblümchen VI/1 415
Gaillardia Foug. VI/1 534
Galanthus L. II 307, 308
Galega L. IV/3 1143, 1388
officinalis L. IV/3 1390, 1642 Fig. 1607
Galtonia candicans Decaisne II 279
Gamander V/4 2523, 2524
Gamander-Ehrenpreis VI/1 59
Gardenia Ell. VI/1 197
Gartenaurikel V/3 1769
Garten-Hortensie IV/2 564
-Hyazinthe II 279
-Leimkraut III 286
-Melde III 240
-Milchstern II 254
-Mohn IV/1 34
-Nelke III 319
-Pfeifenstrauch IV/2 639; VII 180 Fig. 1224
-Resede IV/1 484
-Rittersporn III 489
-Scharlach V/4 2487
-Schneeball VI/1 244; VII 54 Fig. 1087
-Stiefmütterchen V/1 616
„ -Zypresse VI/2 644
Gasparrinia peucedanoides Thellung V/2 1298
Gaspeldorn IV/3 1191
Gasteria Duval II 277
Gaultheria L. V/3 1621
Gaura biennis L. V/2 800
Gaylussacia H. B. et Kth. V/3 1621
Gazania Gaertn. VI/2 806
Gebirgs-Weide III 38
Gedenkemein V/3 2143, 2146
Geißbart II 160; IV/2 673
Geißblatt VI/1 250, 251
, Deutsches VI/1 256
„ , Wohlriechendes VI/1 258
Geißelkaktus V/2 697
Geißklee IV/3 1168, 1181
, Behaarter IV/3 1177
, Meergrüner IV/3 1173
, Oesterreicher IV/3 1175
, Regensburger IV/3 1179
, Roter IV/3 1180
„ , Schwarzer IV/3 1170
Geißraute IV/3 1388, 1390, 1642 Fig. 1607
Geitonoplesium A. Cunn. VII 191
Gelber Enzian V/3 1988
Fingerhut VI/1 69
„ Jasmin V/3 1951
Gelbholz IV/3 1145
Gelbwurzel III 453
Gelsemium sempervirens Ait. V/3 1952
Gemswurz VI/2 711; VI/2 1354 Fig. 958
, Grossblütige VI/2 722
, Herzblätterige VI/2 715
„ , Zottige VI/2 725
Genista L. IV/3 1199
pilosa L. IV/3 1205
sagittalis (L.) Gams IV/3 1198
„ tinctoria L. IV/3 1199, 1202
Gentiana asclepiadea L. V/3 1998
Clusii Perr. et Song. V/3 2010

Gentiana lutea L. V/3 1988
septemfida Pall. V/3 1956
„ Tergestina Beck V/3 2017
Georgine VI/1 529
Geranie IV/3 1663 u. f.
Geranium L. IV/3 1671, 1672
argenteum L. IV/3 1676
-Bastarde IV/3 1665 u. f., 1715 u. f.
, Grossblumiges IV/3 1665
macrorrhizum L. IV/3 1709
pratense L. IV/3 1690
sanguineum L. IV/3 1679
„ Sibiricum L. IV/3 1695
Gerbera Anandria (L.) Schultz-Bip. VI/2 992
Gesneriaceae VI/1 176; VII 205
Geum L. IV/2 914
Geweihbaum IV/3 1129
Gewürzbaum IV/1 14
Gilbkraut IV/1 23
Gilbweiderich V/3 1851
Gilia Ruiz et Pav. V/3 2113
Gillenia trifoliata L. IV/2 663
Giftbeere V/4 2561
Ginkgo biloba L. I 74
Ginster IV/3 1199
, Englischer IV/3 1191
, Spanischer IV/3 1214, 1215
Gipskraut III 310; VII 173 Fig. 1215
Kriechendes III 313
Rispiges III 314
Gladiolen II 302 u. f.
Gladiolus L. II 302; VII 81 Fig. 1115
„ refractus Jacq. II 306
Glaucium flavum Crantz IV/1 23
Gleditschia L. IV/3 1129
triacanthos L. IV/3 1129
Gliedkraut V/4 2403
Globba L. II 321
Glockenblume VI/1 331
Glockenheide V/3 1700, 1711
Gloriosa superba L. II 199
Gloxinie VI/1 176
Glücksklee IV/3 1304, 1647
Glyceria aquatica (L.) Wahlenb. I 322
Glycine L. IV/3 1386
Glycyrrhiza L. IV/3 1143
Gnaphalium lanatum hort. VI/1 470
„ , margaritaceum L. VI/1 494
Götterbaum V/1 82
Götterblume V/3 1732
Goldball VI/1 507
Goldbandlilie II 235
Goldglocke = Forsythia V/3 1903
Goldkolben, Sibirischer VI/2 799
Goldlack IV/1 444
Goldlärche, Chinesische I 81
Gold-Melisse V/4 2507
Goldregen IV/3 1163
Goldribisel IV/2 642
Goldröschen IV/2 665
Goldrute, Grasblätterige VI/1 413
Kanadische VI/1 411
Goldrute, Spätblühende VI/1 412
Goldschwanzgras VII 155
Goldtraube IV/2 642
Goldfussia Nees VI/1 178
Gomphrena globosa L. III 261
Goniolimon Tataricum Boiss. V/3 1880
Gordonia Ell. V/1 498
Granatapfelbaum V/2 763, 766
Grannenhafer, Zweizeiliger I 250
Graslilie II 203
Grasnelke V/3 1886
Gras-Sternmiere III 357
Gratröschen IV/2 1051, 1052
Grau-Erle III 90, 91
„ -Weide III 26
Gravesia guttata Triane V/2 796
Greisenhaupt V/2 693
Greiskraut VI/2 728
Gretl im Busch III 474
Grevillea Meisn. VII 170 Fig. 1210
Grewia L. V/1 429
Greyia Hook. et Harv. V/1 309
Gronovia scandens L. V/1 662
Grünkohl, Gefranster IV/1 246
Grützblume IV/1 107, 108, 396; VI/2 570
Gürtelgeranium IV/3 1663
Guizotia Abyssinica Cass. VI/1 532
Gummibaum III 124; V/2 782; VII 169 Fig. 1209
Gundelrebe V/4 2372
Gunnera L. V/2 895
Gutierrezia Euthamiae Torr. et Gray VI/1 449
Gymnocalycium (nicht Gymocalycium) V/2 694
Gymnocladus Lam. IV/3 1129
Gynerium argenteum Nees I 173, 372; VII 155
Gypsophila L. III 310; VII 173 Fig. 1215
paniculata L. III 314
repens L. III 313

H.

Haargerste I 400
Haargurke VI/1 328
Haar-Schmielenhafer I 240
Haar-Same VII 205
Haarstrang V/2 1368, 1369
„ , Echter V/2 1374
Habichtskraut VI/2 1182, 1211
Hablitzia tamnoides Bieb. III 260
Habrothamnus Endl. V/4 2554
Haemanthus L. II 319; VII 68 Fig. 1102
Hagedorn IV/2 727—731, 733, 737 bis 739
Hahndorn, Gemeiner IV/2 727
Hahnenfuß III 541
„ , Kriechender III 557
Hahnenkamm III 261, 546; IV/3 1485
Hahnenkopf, Italienischer IV/3 1485
Hahnensporn V/4 2270
Hainbuche III 68
Halimodendron halodendron Voss IV/3 1400
Hamamelis L. IV/2 656
Hammerstrauch VII 203
Hariota DC. V/2 697
Hartheu V/1 502
Hartriegel V/2 1545, 1554
Hartwegia Lindl. II 277
Hasel-Erle III 86
Haselnuss III 73; VII Fig. 1105, 1107, 1118
Hasel, Türkische III 71
Hasenglöckchen II 249
Hasenklee IV/3 1158
Hasenschwanzgras I 173
Hauhechel, Rundblätterige IV/3 1122
Hauswurz IV/2 544
Echte IV/2 547
„ , Falsche IV/2 595
Hebeclinium DC. VI/1 401
Heckenkirsche, Blaue VI/1 254; VII 207 Fig. 1257
„ Rote VI/1 252
Hedera L. V/2 915
„ Helix L. V/2 917, 918, 923
Hedychium Retz. II 321
Hedysarum L. IV/3 1485
„ varium Willd. IV/3 1485
Heideginster IV/3 1205
Heidekraut V/3 1691, 1699
Heidemyrte III 33
Heidelbeere V/3 1668
Heideröschen V/1 579; V/2 719
Heilzwiebel II 250
Helenium L. VI/1 534
Helianthemum nummularium Miller V/1 568—570
Helianthus L. VI/1 507—509
Helichrysum Gaertn. VI/1 469, 470
„ arenarium DC. VI/1 471
Heliopsis Pers. VI/1 528
Heliosperma alpestre (Jacq.) Rchb. III 306
Heliotropium L. V/3 2130, 2131
Helipterum Manglesii F. v. Müller VI/1 495
Helleborus foetidus L. III 466; VII 9 Fig. 937 a bis c
niger L. III 466, 467
„ viridis L. III 471
Helmbohne IV/3 1624
Helmkraut V/4 2509
„ , Hohes V/4 2516
Helodea C. Rich. I 160
Helonias L. II 199
Helwingia Japonica Dietr. V/2 1539
Hemerocalis L. II 204, 205; VII Fig. 1070, 1154
Hemlock-Fichte (-Tanne) I 81; VII 151 Fig. 1179 A
Hennah-Strauch V/2 747

Hepatica Spreng. III 528
Heracleum L. V/2 1421 u. f.
Heracleum Sphondylium L. V/2
Herbst-Feuerröschen III 600
„ -Meerzwiebel II 248
Herbstzeitlose II 197; VII 43 Fig. 1071
Herings-Geranium IV/3 1664
Hermannia L. V/1 492
Herzblatt-Weißdorn IV/2 731
Herz-Lilie VII 160 Fig. 1188
Hesperis matronalis L. IV/1 468
tristis L. IV/1 466
„ violacea Boissier IV/1 464
Heteranthera Ruiz et Pav. II 143
Heterotoma lobelioides Zucc. VI/1 392
Heuchera L. IV/2 567
Heurnia R. Br. V/3 2067
Hibbertia Andr. V/1 494
Hibiscus L. V/1 459, 460
Hicoria Raf. III 7
Hieracium amplexicaule L. VI/2 1318
„ aurantiacum L. VI/2 1211
Himmelsröschen III 277
Hiobs-Tränengras I 181
Hippeastrum Herb. II 319; VII 162 Fig. 1195
Hippophaë rhamnoides L. V/2 732, 740
„ salicifolia Don V/2 732
Hirschzunge I/CXVI Fig. 199 u. I/34
Hirse, Echte I 189
Hirtennadel IV/3 1717, 1718
Holunder VI/1 235
, Schwarzer VI/1 239
„ -Schwertlilie II 290
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim. IV/2 663
Homalocephala V/2 694
Honigklee IV/3 1238
Hookera Salisb. II 278
Hopfen III 130
Hopfenbuche III 70; VII 168 Fig. 1207
Hopfenstrauch VII 184
Hordeum jubatum L. I 173, 396
Hornklee IV/3 1365
Hornkraut III 360
Horn, Filziges III 376
-Mohn, Gelber IV/1 23
„ -Sauerklee IV/3 1656
Hornstrauch V/2 1545
Hortensia IV/2 563—565
Hosta Tratt. II 277; VII 160 Fig. 1188
Houstonia L. VI/1 196
Houttuynia cordata Thunb. III 209
Hovea R. Br. IV/3 1147
Hovenia Thunb. V/1 324
Hoya R. Br. V/3 2067
Huegelia Rchb. V/2 956
Humulus Japonicus Sieb. et Zucc. III 130
Hundsrauke IV/1 220
Hundszunge V/3 2147
Hyacinthus L. II 279
comosus L. II 259
„ paniculatus Lam. II 259
Hydrangea Commers. IV/2 563 bis 565
Hydrocleis Rich. I 157
Hydrocotyle umbellata L. V/2 952
Hydrolea spinosa L. V/3 2122
Hydromystria stolonifera G. F. W. Mey. I 159
Hydropeltis purpurea Michx. III 438
Hydrophyllum L. V/3 2122
Hymenanthera crassifolia Hook. V/1 586
Hymenocallis Salisb. VII 159 Fig. 1186
Hypericum L. V/1 503—550
Androsaemum L. V/1 512
Coris L. V/1 514
„ Helodes L. V/1 511
Hyssopus officinalis L. V/4 2360

I.

Iberis L. IV/1 102, 103
pinnata L. IV/1 109
saxatilis L. IV/1 105
„ umbellata L. IV/1 106
Idesia polycarpa Maxim. V/1 656
Igel-Kaktus V/2 694
Igelschlauch I 154, 156
Igelstrauch IV/3 1148
Ilex L. V/1 236
„ Aquifolium L. V/1 237 u. f.
Immenblatt V/4 2468
Immergrün, Gemeines V/3 2055
„ , Grosses V/3 2053
Immortelle VI/1 469
Impatiens L. V/1 313, 314
Incarvillea Juss. VI/1 176
Indigo, Falscher IV/3 1385
Indigofera L. IV/3 1384
Inula L. VI/1 474
Ipomoea L. V/3 2076, 2077
Iresine Herbstii Hook. III 261
Iris L. II 284, 285
Benacensis Kerner II 292
Germanica L. II 292
graminea L. II 295
lutescens Lam. II 288
pallida auct. tirol. nec Lam. II 292
pumila L. II 287
sambucina L. II 290
Sibirica L. II 296
spuria L. II 295
squalens L. II 290
„ variegata L. II 289
Irrlichtpflanze VII 159
Ischnosiphon Körnicke II 321
Isolepis R. Br. II 9
Isomeris arborea Nutt. IV/1 490
Isotoma senecioides DC. VI/1 392
Itea L. IV/2 566
Ixia L. II 305; VII 164 Fig. 1197

J.

Jamesia Americana Torr. et Gray IV/2 566
Jasmin, Deutscher IV/2 639; VII 180 Fig. 1224
, Echter V/3 1906, 1907; VII 198 Fig. 1239
, Falscher IV/2 639; V/3 1951; VII 180 Fig. 1224
Jasminum L. V/3 1906; VII 198 Fig. 1239
Jatropha L. V/1 125
Jerichorose IV/1 69 Fig. 750 b, c
Jerusalemsblume III 296
Jochroma tubulosum Benth. V 4 2554
Johannisbeere IV/2 642; VII 180 Fig. 1225
„ , Blutrote IV/2 643
Johannisbrot, Wildes IV/3 1134
Johanniskraut V/1 503—550
Johanniswedel IV/2 973, 974
Judasbart IV/2 575
Judasbaum IV/3 1133, 1134
Judaskirsche V/4 2582
Judas-Silberling IV/1 356
Juglans L. III 7
„ regia L. III 7, 8; VII 36 Fig. 1061
Jungfrau im Grün III 474
Jungferngesichtchen VI/1 529
Juniperus communis L. I 91; VII 152 Fig. 1180
Jupitersbart IV/3 1353
Justicia L. VI/1 178

K.

Kaempferia L. II 321
Kärntner Kuhtritt VI/1 65
Kaffeeblümchen IV/3 1365
Kaffee-Erbse IV/3 1376
„ , Schwäbischer IV/3 1159
Kaiserkrone II 239
Kakteen V/2 679
Kalmia L. V/3 1620; VII 195
Kamille VI/2 580
„ , Römische VI/1 536
Kanariengras I 198
Kannenpflanzen IV/2 510; I/CVII
Kapuzinerkresse, Große IV/3 1729, 1730
„ , Kleine IV/3 1731
Kapuzinerrose IV/2 996
Karpaten-Spierstrauch IV/2 676
Karst-Enzian V/3 2017
Karthäuser-Nelke III 319, 323
Kartoffel-Rose IV/2 994
Kassia-Akazie IV/3 1125
Katzenminze V/4 2368
Katzenpfötchen, Gemeines VI/1 457
Kedrostis Medic. VI/1 316
Kellerhals V/2 705, 710, 713

Kennedya Vent. IV/3 1626
Kentranthus Necker VI/1 262
„ ruber DC. VI/1 278
Kerria Japonica DC. IV/2 665
Kicher, Deutsche IV/3 1605, 1606
„ , Wilde IV/3 1597 u. f.
Kiefer I 97, 100
Kirschapfel IV/2 743
Kirsche IV/2 1080
Japanische IV/2 1084
„ , Türkische IV/2 110
Kirschpflaume IV/2 1100
Klebakazie IV/3 1391
Klebnelke, Gemeine III 277
Kleinia DC. VI/2 727
Klette, Filzige VI/2 834
Klettertrompete VI/1 175
Klugea Schlecht. VI/1 177
Knackbusch IV/2 680
Knäuel-Glockenblume VI/1 341
Kniphofia Moench II 277
Knöllchen-Steinbrech IV/1 615
Knöterich III 189, 190
Kochia Roth III 251
Koelreuteria paniculata Laxm. V/1 308
Königin der Nacht V/2 693
Königsblume V/2 724, 725
Königsfarn I 42
Königskerze VI/1 8; VII 202 Fig. 1244
Kompaßpflanze VI/1 495
Kopf-Eiche VII 150
Kopsia Bl. V/3 2051
Korallenbaum IV/3 1626
Korallenbeere VII 207
Korallenstrauch IV/2 743
Korb-Weide III 24, 27
Kornblume VI/2 961
Kornelkirsche V/2 961
Kornrade III 275
Krähenbeere V/3 1609
Krätzkraut VI/1 303
Kranz-Lichtnelke III 298; VII 71 Fig. 1106
Kratzdistel VI/2 867, 868
„ Gemeine VI/2 87
Kraunhia IV/3 1386
Krauseminze V/4 2350
Krauskohl IV/1 246
Kresse, Virginische IV/1 86
Kreuzdorn V/1 330, 331
Kreuzkraut VI/2 727, 728
Krummholzkiefer I 102
Kronwicke IV/3 1473
Krugglocke VII 208
Krummröhre VII 209
Küchenschelle III 535
Kürbis VI/1 326
Kugel-Amarant VII 172
-Distel VI/2 807
-Ginster IV/3 1193
„ -Kaktus V/2 695
Kunzea Rchb. V/2 788

L.

Lablabbohne IV/3 1624
Laburnum IV/3 1143
alpinum Presl IV/3 1166
„ anagyroides Medikus IV/3 1163
Lachenalia Jacq. II 279
Lactuca Sibirica Benth. VI/2 1113
Laelia Lindl. II 324
Lärche I 95; VII 131 u. Fig. 1171
Lagenaria Ser. VI/1 310
Lagerstroemia Indica L. V/2 746
Lagurus ovatus L. I 173
Laiya Hook. VI/1 532
Lallemantia Fisch. et Meyer V/4 2362
Lamarckia aurea Moench I 173
Lambertshasel III 71
Lambertsnuß III 71
Lamium L. V/4 2440
„ Orvala L. V/4 2445
Lantana L. V/3 2235
Lapageria rosea Ruiz et Pav. II 280
Lapathum digynum Lam. III 188
Laportea moroides Wedd. III 137
Larix Mill. I 95; VII 131 Fig. 1171
Laserkraut V/2 1475
Laserpitium hispidum Bieb. V/2 1475
Lasiandra DC. V/2 795
Lathyrus L. IV/3 1564, 1565
luteus Peterm. IV/3 1564, 1570
odoratus L. IV/3 1564
sativus L. IV/3 1605, 1606
silvester L. IV/3 1597 u .f.
tuberosus L. IV/3 1593
„ vernus Bernh. IV/3 1576
Lauch-Scheibenschötchen IV/1 148
Lauchschön VII 159
Laurus nobilis L. IV/1 12
Lavandula L. L. V/4 2274
Lavatera L. V/1 471
Lawsonia inermis L. V/2 747
Lebachbaum IV/3 1123
Lebensbaum, Abendländischer I 82
„ , Morgenländischer I 82
Ledum palustre L. V/3 1626
Leea crispa L. V/1 351
Leimkraut III 277, 278
Leimsaat, Gelbe V/3 2118
Lein V/1 5
Narbonner V/1 15
„ , Oesterreicher V/1 20
Leinkraut VI/1 20
„ , Zweiteiliges VI/1 24
Leiophyllum busifolium Elliot V/3 1622
Leontopodium Cass. VI/1 458
„ alpinum Cass. VI/1 461
Lepachis pinnatifida Torr. et Gray VI/1 505
Lepidium Virginicum L. IV/1 86
Leptospermum Forst. V/2 788, 789
Lerchensporn, Gefingerter IV/1 40
Gelber IV/1 42
Lespedeza L. IV/3 1463
Lessertia perennans DC. IV/3 1457
Leuchtenbergia principis Hook. V/2 694
Leuchterblume VII 199
Leucoium vernum L. II 310
Levisticum officinale Koch V/2 1353
Levkoje IV/1 469; VII 178 Fig. 1221
„ , Trübe IV/1 471
Liatris spicata Willd. VI/1 408
Libertia formosa Grah. II 306
Libocedrus decurrens Torr. I 82
Lichtblume, Frühlings- II 194
Lichtnelke III 296; VII 71 Fig. 1106
„ , Jupiter's III 296
Liebe, Brennende III 296
Liebstock, Glänzender V/2 1317
Liebstöckel V/2 1353
Ligularia Sibirica Cass. VI/2 799
Liguster V/3 1944 u. f.
Ligusticum lucidum Miller V/2 1317
Ligustrum L. V/3 1944 u. f.
„ vulgare L. V/3 1949
Lilie II 234, 235, 237
„ , Weisse II 234, 235
Liliendolde VII 162
Lilienflachs VII 159
Liliengrün VII 126 Fig. 1166
Lilium L. II 235
bulbiferum L. II 234, 237
candidum L. II 234, 235
Dalmaticum Vis. et Maly II 237
Martagon L. II 237; VII 1085 1137, 1191
Limnanthemum Sm. V/3 1961
Limonium Miller V/3 1879—1881
Linaria L. VI/1 20
bipartita Willd. VI/1 24
„ Cymbalaria L. VI/1 27
Linde V/1 434, 435; VII 188 Fig. 1231
Lindheimera Texana A. Gray VI/1 528
Lindleya mespiloides H. B. et Kunth IV/2 663
Linum L. V/1 5
Austriacum L. V/1 20
grandiflorum Desf. V/1 5
Narbonense L. V/1 15
„ perenne L. V/1 18
Lippia L. V/3 2235
Liquidambar styraciflua L. IV/2 656
Liriodendron tulipifera L. IV/1 13
Lithospermum L. V/3 2153
purpureo-caeruleum V/3 2156
„ officinale L. V/3 2157
Littonia modesta Hook. II 199
Loasa Adans. V/1 662
Lobelia L. VI/1 392, 393
Lobularia maritima Desv. IV/1 448

Lochnera Rchb. V/3 2051
Löwenmaul VI/1 19
„ , Grosses VI/1 19
Loiseleuria procumbens Desv. V/3 1651
Lonicera L. VI/1 250, 251
caerulea VI/1 254, VII 207 Fig. 1257
Caprifolium L. VI/1 258
Periclymenum L. VI/1 256
„ Xylosteum L. VI/1 252
Lopezia Cav. V/2 803
Lophospermum Don VII 204
Loorbeer, Alexandrinischer VII 162
„ , Echter IV/1 12
Loorbeerrose V/3 1620; VII 195
Lorbeer-Schlinge VI/1 241
Lorbeer-Seidelbast V/2 708
„ -Weide III 20
Lotos, Blauer III 440
Lotosblume, Ägyptische weisse III 440
„ , Indische III 438
Lotospflaume V/3 1899
Lotus L. IV/3 1365
„ Tetragonolobus L. IV/3 1376
Luculia Sweet VI/1 197
Luffa Ludw. VI/1 314
Lunaria annua L. IV/1 356
redivia L. IV/1 355; VII 213 Fig. 1268
Lungenkraut V/3 2210
„ , Echtes V/3 2216
Lupine, Blaue IV/3 1159; VII 75 Fig. 1110
Gelbe IV/3 1158
, Weisse IV/3 1154
Lupinen-Klee IV/3 1314
Lupinus L. IV/3 1143; VII 75 Fig. 1110
albus L. IV/3 1154
angustifolius L. IV/3 1159
hybridus hort. IV/3 1160
„ luteus L. IV/3 1158
Luzula nemorosa (Poll.) E. Mey. II 178
Lycaste Lindl. II 324
Lychnis L. III 296
alpina L. III 275
Coronaria (L.) Desr. III 298; VII 71 Fig. 1106
Flos Jovis (L.) Desr. III 296
„ saxifraga Scop. III 284
Lycium L. V/4 2562, 2563
halimifolium Mill. V/4 2564
„ rhombifolium Dippel V/4 2565
Lysimachia L. V/3 1851
Nummularia L. V/3 1854
„ punctata L. V/3 1858
Lythrum Salicaria L. V/2 761

M.

Maackia Amurensis Ruprecht et Maxim. IV/3 1146
Macleaya cordata R. Br. IV/1 19
Maclura aurantiaca Nutt. III 136
Macrotomia echioides Boiss. V/3 2128
Macrozamia Miq. I 73
Mädchenauge V/1 529; VI/1 5 98
Mädesüss IV/2 973, 974
Mähnen-Gerste I 173, 396
Märzbecher II 313
Mäusedorn II 266
Madia sativa Mol VI/1 533
Magnolia L. IV/1 13; VII 175 Fig. 1218 a bis e
Mahonie IV/1 6
Maiblume II 274
Maiglöckchen II 275; VII 102 Fig. 1132
Mairose IV/2 1048
Mais I 173, 180, 181
Majorana Miller V/4 2334
Malcolmia maritima R. Br. IV/1 464
Malope L. V/1 455
Malus Hill IV/2 743, 744
Malva L. V/1 476
Alcea L. V/1 479
moschata L. V/1 481
„ verticillata L. V/1 475
Malvastrum A. Gray V/1 456
Mammillaria Harv. V/2 695
Mammutbaum I 82
Mandarine V/1 59
Mandelbaum IV/2 1088
Manettia Mut. VI/1 197
Manna-Esche V/3 1924; VII 198 Fig. 1238
Mannsblut V/1 512
Mannsschild V/3 1792
Mannstreu II 365; V/2 976, 977; VI/2 869
, Flachblätterige V/2 984
„ , Stahlblaue V/2 986
Maranta L. II 321
Marcgravia L. V/1 494
Marianthemum grandiflorum hort. VI/1 331
Marianthus Hueg. IV/2 655
Marica caerulea Ker-Gawler II 306
Marienblatt VI/2 599
Mariendistel VI/2 918
Marien-Glockenblume VI/1 331
Marrubium catariaefolium Desr. V/4 2394
„ peregrinum L. V/4 2398
Masdevallia Ruiz et Pav. VII 145
Massholder V/1 290
„ , Französischer V/1 290
Massliebchen VI/1 414, 609; VI/2 590
Matricaria L. VI/2 580
Matthiola incana R. Br. IV/1 470; VII 178 Fig. 1221
oxyceras DC. IV/1 469
tristis R. Br. IV/1 471
Mauer-Gänsekresse IV/1 407
Mauerpfeffer, Falscher IV/2 540
Scharfer IV/2 537, 538
„ , Weisser IV/2 535, 536
Maulbeerbaum, Schwarzer III 130
„ Weisser III 128
Maurandia Barcleayana Lindl. VI/6
Maxillaria Ruiz et Pav. II 324; VII 165
Meconopsis Cambrica Viguier IV/1 19
Medeola asparagoides L. II 261
Medicago L. IV/3 1250, 1251
Medinilla Gaud. V/2 796
Medium grandiflorum Spach VI/1 331
Medusenhaupt-Haargras I 400
Meerfenchel V/2 1225
Meersenf, Europäischer IV/1 184
Meerstrand-Steinkraut IV/1 448
Meerzwiebel II 246, 248, 250
Falsche II 250
„ , Zweiblätterige II 248
Mehlbeerbaum IV/2 714, 715
Mehlbirne, Südliche IV/2 707
Mehlprimel V/3 1757
Meisterwurz V/2 961
Melaleuca L. V/2 787, 788
Melandrium album (Miller) Garcke III 302
Melanthium Damascenum Medic. III 474
Melastomataceae V/2 794
Melia Azedarach L. V/1 85
Melianthus major L. V/1 309
Melica altissima L. I 292
Melilotus Hill IV/3 1238
Melittis Melissophyllum L. V/4 2471
Melocactus Link et Otto V/2 694
Melothria L. VI/1 316
Menispermum L. IV/1 16
Menodora Humb. et Bonpl. V/3 1906
Mentha aquatica L. V/4 2345
„ undulata Willd. V/4 2350
Mentzelia L. V/1 662
Menyanthes trifoliata L. V/3 1960
Merendera Bulbocodium Ram. VII 159
Mertensia Roth V/3 2128
Mesembrianthemum L. III 267; VII 38 Fig. 1063; I/CIV Fig. 165
Mespilus Germanica L. IV/2 740
Mesua L. V/1 500
Metaplexis R. Br.; VII 199
Metrosideros Banks V/2 780
Meum athamanticum Jacq. V/2 1303
Michauxia campanuloides L'Hérit. VI/1 329
Mikania scandens Lem. VI/2 728
Milchlattich VI/2 1097
Milchstern II 253, 254
, Nickender II 254; V/1 514 Fig. 1943

Miltonia Lindl. II 324
Mimosa elegans hort. IV/3 1123
„ pudica L. IV/3 1126
Mimulus L. VI/1 36; VII 74 Fig. 1109f
Mina lobata Llavé et Lex. V/3 2075, 2076
Mina-Prunkwinde V/3 2075, 2076
Mirabilis Jalapa L. III 266
„ longiflora L. III 266
Miscanthus Andersson I 186
Mispel, Echte IV/2 740
Italienische IV/2 730
„ Welsche IV/2 730
Mittagsblume III 267; VII 38 Fig. 106 ; I/CIV Fig. 165
Mitella Tourn. IV/2 567
Mönchskraut V/3 2205
„ Gelbes V/3 2208
Mohn IV/1 19; VII 18 Fig. 1016
„ Isländischer IV/1 26
Molopospermum Peloponnesiacum Koch V/2 1048
Molucella L. V/4 2440
Momordica L. VI/1 316
Monanthes polyphylla Haw. IV/2 514
Monarda L. V/4 2507
Monatsrose IV/2 993
Mondsame, Kanadischer IV/1 16
Monocharia vaginalis Presl II 144
Monochaetum Naud. V/2 795
Monophyllaea R. Br. VI/1 177
Monstera deliciosa Liebm. II 131
Montanoa Llav. et Lex. VI/1 528
Montbretia DC. II 305; VII 164 Fig. 1198
Moorglocke VI/1 388
Moosfarn I 69
Moraea irioides L. II 306
Morgenröschen III 286
Morina L. VI/1 280
Mormonen-Tulpen II 278
Morus alba L. III 128
nigra L. III 130
„ rubra L. III 128
Moschosma Rchb. V/4 2270
Moschuskraut VI/1 38
Moschus-Rose IV/2 1724
„ -Schnabelkraut IV/3 1725
Mottenkönig V/4 2270
Muehlenbeckia platyclada Meissn. III 166
Mulgedium Cass. VI/2 1096
Muraltia Neck. V/1 88
Murraya exotica L. V/1 54
Musa L. II 320
Muscari botryoides Mill. II 259
comosum Mill. II 259
paniculatum Medic. II 259
racemosum Lam. et DC. II 258
Muschelblümchen III 476
Muskatellerkraut V/4 2490
Mutterkraut VI/2 619
Myosotis L. V/3 2160
Myrica cerifera L. III 11
„ Gale L. III 11
Myricaria Germanica Desv. V/1 551
Myriophyllum L. V/2 896, 898
Myrsine Africana L. V/3 1714
Myrsiphyllum Willd. II 260
Myrte, Echte V/2 793
Myrtus communis L. V/2 793

N.

Nachtkerze V/2 864/66; VII 192 Fig. 1233
„ , Gemeine V/2 868
Nachtschatten V/4 2585/6, 2588
Nachtviole IV/1 464
„ Gemeine IV/1 468
Naegelia Reg. V/1 177
Nadelhölzer I 76/81
Nadel-Johanniskraut V/1 514
Nandina domestica Thunb. IV/1 5
Napoleona Pal. V/2 767
Napoleons-Weide III 56
Narcissus L. II 312/3
biflorus Curt. II 317
incomparabilis Mill. II 315
poëticus L. II 315
„ pseudonarcissus L. II 314
Narzisse II 312/3
Gelbe II 314
Weiße II 315
„ Zweiblütige II 317
Natternkopf V/3 2193
Neillia Don IV/2 663
Nelke III 319, 320
„ Chinesische III 319
Nelkenwurz IV/2 914
Nelkenwurz-Steinbrech IV/2 628
Nelumbium speciosum Willd. III 438
Nelumbo lutea Pers. III 438
„ nucifera Gaertn. III 438
Nemophila Nutt. V/3 2122
Neomammillaria Britton et Rose V/2 695
Nepenthes L. IV/2 510; I/CVII
Nepeta L. V/4 2368
Nerium odorum Sol. V/3 2056
„ Oleander L. V/3 2056
Nertera Banks et Sol. VI/1 197
Nesselröschen IV/2 665
Neuseeländer-Flachs II 277
Neviersia Alabamensis A. Gray IV/2 665
Nicandra physaloides Gaertn. V/4 2561
Nicotiana L. V/4 2616/7, 2622
Nierenbergia Ruiz et Pav. V/4 2555
Nieswurz, Grüne III 471
„ , Stinkende III 466
Nigella L. III 475
caerulea Lam. III 474
Damascena L. III 474
multifida Gatereau III 474
Nolina Michx. II 280
Nonnea Medikus V/3 2205
„ lutea Rchb. V/3 2208
Norfolk-Tanne I 81; VII 50 Fig. 1081
Nuphar luteum Sibth. et Sm. III 445
„ pumilum (Timm) DC. III 447
Nuttalia cerasiformis Torr. et Gray IV/2 667
Nyctanthes arbor-tristis L. V/3 1906
Nymphaea L. III 440; VII 62 Fig. 1097
alba L. III 442, 443, 444
candida Presl III 444; VII 110 Fig. 1144
Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze V/3 1961
Nyssa L. V/2 770

O.

Ochna atropurpurea DC. V/1 494
Ochsenzunge V/3 2198
Gemeine V/3 2200
„ Italienische V/3 2202
Ocimum Basilicum L. V/4 2268 u. f.
Odermennig IV/2 930
Odontoglossum H. B. et Kth. II 324
Odontospermum aquaticum O. Hoffmann VI/1 495
pygmaeum (Coss. et Dur.) O. Hoffmann IV/1 70
Oelbaum V/3 1936
Oenothera L. V/2 1249
Oenothera L. V/2 864/66
biennis L. V/2 868; VII 192 Fig. 1233
„ grandiflora Aiton V/2 868
Ogeechee V/2 770
Ohr-Schlüsselblume V/3 1760
Olea chrysophylla Lam. V/3 1934
Europaea L. V/3 1936
„ laurifolia Lam. V/3 1934
Oleander V/3 2056
Olearia Moench VI/1 449
Omphalodes Moench V/3 2143, 2146
Oncidium Sw. II 324
Onoclea Struthiopteris Hoffm. I 12
Ononis fruticosa L. IV/3 1216
„ rotundifolia L. IV/3 1222
Onopordon L. VI/2 920
„ Acanthium L. VI/2 922
Operculina Silv. Manso V/3 2077
Ophiopogon Japonicus Ker-Gawler VII 192
Opuntia Mill. V/2 688, 689; VII 191 Fig. 1232
Orange V/1 59, 61
Orangenblume VII 184
Oreocereus Celsianus Riccobono V/2 693
Orgelkaktus V/2 691
Ornithogalum (L.) Salisb. II 250 u. f.
Boucheanum Aschers. II 254
caudatum Ait. II 250

Ornithogalum nutans L. II 254; V/1 514 Fig. 1943
„ umbellatum L. II 253
Oryxa Japonica Thunb. V/1 48
Osbeckia Chinensis L. V/2 795
Osmanthus Lour. V/3 1905
Osmunda regalis L. I 42
Osterblume II 313; III 457, 522, 529, 536
Osterluzei III 162
Ostrowskia magnifica Reg. VI/1 329
Ostrya carpinifolia Scop. III 70; VII 168 Fig. 1207
Othonna L. VI/2 799
Ouvirandra Thouars I 164
Oxalis L. IV/3 1646/7
„ corniculata L. IV/3 1656
Oxydendron arboreum DC. V/3 1622
Oxylapathon digynum St. Lag. III 188
Oxylobium Andr. IV/3 1147
Oxypetalum R. Br. V/3 2066
Oxyria digyna (L.) Hill III 188
reniformis Hook. III 188

P.

Pachysandra Michx. V/1 203
Paeonia L. III 454, 455, 456; VII 38 Fig. 1064
„ foemina Garsault III 455, 456
Palafoxia Lag. VI/1 534
Palava Cav. V/1 455
Paliurus Spina-Christi Miller V/1 328
Palmen III 15
Palmietschilf II 145
Palmkohl IV/1 246
Palmlilie VII 161 Fig. 1192
Palm-Weide III 35
Pampasgras I 372; VII 155
Panax L. V/2 914
Pancratium L. II 319
Panicum capillare L. I 173, 190
miliaceum L. I 189
„ plicatum Lam. I 173
Pantoffelblume VI/1 5, 6; VII 202 Fig. 1245
Papagei-Siegwurz II 302
Papaver IV/1 19, 26; VII 18 Fig. 1016
alpinum IV/1 25
Pyrenaicum IV/1 26
Rhoeas IV/1 25
„ somniferum L. IV/1 25, 34
Paphiopedilum Pfitzer II 324
Papierblume II 131
Papierknöpfchen, Geflügeltes VI/1 494
Papier-Maulbeerbaum III 136
Pappel III 57, 58, 60, 63, 64, 65
Papyrusstaude L. II 10
Paradisia Liliastrum (L.) Bert. II 200
Parinarium Aubl. IV/2 667
Parrya integerrima Don IV/1 476
Parthenocissus Planchon V/1 356 bis 359
Passiflora L. V/1 658, 660
Patrinia Juss. VI/2 1363
Paulownia Sieb. et Zucc. VI/1 5; VII 203 Fig. 1249
Pavia Poir. V/1 299, 300
Pavonia L. V/1 457
Pechkiefer I 97
Pechnelke III 275
„ , Gemeine III 277
Pedicellaria pentaphylla Schrank IV/1 490
Peganum Harmala L. V/1 41
Peireskia Miller V/2 687
Pelargonium-Bastarde IV/3 1665 u. f.
grandiflorum Willd. IV/3 1665
inquinans Aiton IV/3 1664
odoratissimum Aiton IV/3 1664
peltatum Aiton IV/3 1664
Radula L'Hérit. IV/3 1665
„ zonale Aiton IV/3 1663
Pelecyphora aselliformis Ehrenb. V/2 695
Pellionia Daveauana N. E. Br. III 137
Peltaria alliacea Jacq. IV/1 148
Peltiphyllum peltatum (Torr.) Engl. IV/2 566
Pennisetum Pers. I 173
Pentas carnea Benth. VI/1 197
Pentstemon Mitch. VI/1 6
Peperomia Ruiz et Pav. III 209
Pepperidge V/2 770
Perilla ocimoides L. V/4 2272
Periploca L. V/3 2064
Perlkörbchen VI/1 494
Pernettya Gaudich. V/3 1621
Perückenstrauch V/1 228
Pestwurz VI/2 680
Petalostemon Michx. IV/3 1386
Petasites Miller VI/2 680
Petiveria alliacea L. III 267
Petrocallis Pyrenaica (L.) R. Br. IV/1 115
Petteria ramentacea Presl IV/3 1148
Petunia Juss. V/4 2554
Peucedanum altissimum Thellung V/2 1403
Gallicum Latourette V/2 1369
officinale L. V/2 1374
„ Ruthenicum Bieb. V/2 1368
Pfahlrohr I 271
Pfauenlilie II 305
Pfeffer, Spanischer V/4 2558
Pfeifenstrauch III 162
, Falscher IV/2 639; VII 180 Fig. 1224
Pfeilkraut I 156
Pfennigkraut V/3 1854
Pfersing IV/2 1093
Pfingstnelke III 329, 335, 336
Pfingstrose III 455/6; VII 38 Fig. 1064
Pfingstrose, Großblumige III 456
Pfirsich IV/2 1093
Pflaume IV/2 1108
Phacelia Juss. V/3 2121; VII 11 Fig. 989
„ tanacetifolia Benth. V/3 2119
Phaedranthus buccinatorius Miers VI/1 176
Phaenocoma prolifera Don VI/1 495
Phajus Lour. II 324
Phalaenopsis Bl. II 324
Phalaris arundinacea L. I 197
„ Canariensis L. I 198
Pharbitis L. V/3 2077
Phaseolus Caracalla L. IV/3 1628
„ coccineus L. IV/3 1639
Phellodendron Rupr. V/1 53
Philadelphus L. IV/2 639; VII 180 Fig. 1224
Phillyrea L. V/3 1917, 1918
Philodendron pertusum II 131
Philydrum Gaertn. II 144
Phlomis L. V/4 2436
Phlox L. V/3 2113
Phoenix L. II 130
Phormium Forst. II 277
Photinia Lindl. IV/2 664
Phragmites communis Trin. I 272
Phrynium Willd. II 321
Phuopsis stylosa Griesebach VI/1 196
Phygelius Capensis E. Mey. VI/1 6; VII 202 Fig. 1246
Phyllanthus L. V/1 125
Phyllitis Ludwig VII 149
Phyllocactus Link V/2 696
Phyllodoce caerulea Salisb. V/3 1621
Phyllostachys Sieb. et Zucc. I 173, 402
Physalis L. V/4 2579
„ Alkekengi L. V/4 2582
Physocarpus Maxim. IV/2 680
Physocaulis nodosus Koch V/2 994
Physostegia Virginiana Bentham V/4 2472
Phyteuma L. VI/1 371
Phytolacca L. III 266
Picea Dietrich I 84
„ excelsa Link I 87
Pilea Lindl. III 137
Pilocereus V/2 693
Pimelea Banks et Soland. V/2 702
Pimpernuss V/1 257
„ , Wilde V/I 259 u. f.
Pimpinella maior Hudson V/2 1199
„ saxifraga L. V/2 1203
Pinellia tuberifera Ten. II 131
Pinie I 97
Pinus L. I 97
Cembra L. I 106
montana Mill. I 102
nigra Arnold I 107
silvestris L. I 97, 100
Strobus L. I 97

Pippau VI/2 1135
Piptanthus Nepalensis D. Don IV/3 1146
Pirus L. IV/2 694
Pistacia L. V/1 230/1
Pistia Stratiotes L. II 131
Pittosporum Gaertn. IV/2 654
Platane IV/2 659
Morgenländische IV/2 662
„ , Nordamerikanische IV/2 660
Platanus L. IV/2 659
Occidentalis L. IV/2 660
„ Orientalis L. IV/2 662
Platterbse IV/3 1564/5
Plectranthus L'Hérit. V/4 2270
Plumagekohl IV/1 246
Plumbago L. V/3 1878; VII 197 Fig. 1237
Plumiera L. V/3 2051
Poa alpina L. I 311
Podaliria Lam. IV/3 1147
Podolepis Labill. VI/1 495
Poinciana regia (Bojer) IV/3 1129
Poinsettia Grah. V/1 136
Poivrea coccinea DC. V/2 773
Polanisia graveolens Raf. IV/1 490
Polemonium caeruleum L. V/3 2116
Poliothyrsis Sinensis Oliv. V/1 656
Polyanthes tuberosa L. II 319; VII 163 Fig. 1196
Polygala L. V/1 89
Polygonatum All. II 269
Polygonum L. III 165, 189, 190; VII 170 Fig. 1211
Polypodium L. I 40; VII 57 Fig. 1091
Pomaderris Lab. V/1 325
Pomeranzen-Habichtskraut VI/2 1211
Pontederia L. II 143
Populus L. III 57, 58, 64, 65
alba L. III 60
nigra L. III 63, 64
tremula L. III 62
Portulaca grandiflora Hook. III 268; VII 172 Fig. 1213
Portulacaria afra Jacqu. III 268
Portulak III 268; VII 172 Fig. 1213
Potentilla L. IV/2 813
canescens f. degenerata Th. Wolf IV/2 842
fruticosa L. IV/2 813, 816
nitida L. IV/2 817
Norvegica L. IV/2 813, 858
procumbens Sibth. IV/2 813, 884
„ recta L. IV/2 813, 849
Poterium L. IV/2 935
Pracht-Aehre VII 182
-Kerze VII 172
„ -Nelke III 342
Prangos ferulacea Lindley V/2 1093
Primel V/3 1737/41
Primula V/3 1737/41
Auricula L. V/3 1764
Primula Carniolica Jacq. V/3 1765
Japonica A. Gray V/3 1739
obconica Hance V/3 1740
pubescens Jacq. V/3 1769
Sinensis Lindl. V/3 1740
„ vulgaris Hudson V/3 1746
Prinzessin der Nacht V/2 693
Prionium serratum Drége II 145
Pritchardia filifera Linden II 130
Pronaya Hueg. IV/2 655
Prophetenblume V/3 2128
Protea pallens III 144; VII 127 Fig. 1167
Prunella L. V/4 2377
„ grandiflora Jacq. V/4 2383
Prunus L. IV/2 1064, 1069, 1084/5, 1096, 1112a
Amygdalus Stokes IV/2 1088
avium L. IV/2 1080
Cerasus L. IV/2 1076
domestica L. IV/2 1108; VII Fig. 1158, 1225 B
Laurocerasus L. IV/2 1062
Lusitanica L. IV/2 1063
Maximowiczii Rupr. IV/2 1069
monticola C. Koch IV/2 1101
nana Stokes IV/2 1086
Padus L. IV/2 1066
Persica Sieb et Zucc. IV/2 1093
„ serotina Ehrh. IV/2 1061
Przwalskia Maxim. VII 103
Pseudobaeckea Ndz. IV/2 655
Pseudolarix Kaempferi Gord. I 81
Pseudopanax crassifolius K. Koch V/2 914
Pseudotsuga Carr. VII 151
Psoralea L. IV/3 1385
Ptelea trifoliata L. V/1 52
Pteris L. I 38
Pterisanthus Blume V/1 354
Pterocarya Sieb. et Zucc. III 7; VII 167 Fig. 1206
Pueraria DC. V/3 1625
Pulmonaria L. V/3 2210
„ officinalis L. V/3 2216
Pulsatilla pratensis Mill. III 538; VII 174 Fig. 1214
„ vulgaris Mill. III 535
Pultenaea Sm. IV/3 1147
Punica Granatum L. V/2 763, 766
Purgierdolde V/2 1500
Purpurglöckchen IV/2 567
Purpur-Weide III 24
Puschkinia scilloides Adams II 279
Pyracantha coccinea (L.) Roem. IV/2 688
Pyramiden-Eiche III 110
„ -Pappel III 64
Pyrenäen-Steinschmückel IV/1. 115
„ -Stiefmütterchen V/1 615
Pyrethrum Gaertn. VI/2 591
Pyrostegia ignea Presl VI/1 176
Pyrus IV/2 693

Q.

Quamoclit Tournef. V/3 2076
Quercus L. III 106
Cerris L. III 114, 115
palustris Muenchh. III 106
pubescens Willd. III 113, 114
Robur L. III 110
rubra L. III 106
„ sessiliflora Salisb. III 112
Quinaria Raf. V/1 356
Quisqualis L. V/2 772
Quitte, Japanische IV/2 693
Quittenbaum IV/2 693

R.

Rainfarn VI/2 621
„ -Weissdorn IV/2 731
Rainweide V/3 1949
Raketenblume VII 159
Ramondia Rich. VI/1 176
Rampe IV/1 220
Ramse IV/3 1198
Ranunculus L. III 541
„ repens L. III 557
Ranunkel III 542
Ranunkelstrauch (siehe Kerria) IV/2 665
Raphiolepis (nicht Rhaphiolepis) Lindl. IV/2 664
Rapunzel VI/1 371
Rapunzel-Glockenblume VI/1 362
Rasselblume VI/2 1007
Rattenschwanz-Kaktus V/2 692
Rauh-Birke III 80
Rauke IV/1 154
Ravenala Madagascariensis Sonnerat II 320
Ravenna-Seidengras I 186
Regelia Schauer V/2 789
Rehmannia Chinensis Fisch. et Mey. VI/1 6
Reif-Weide III 25
Reiherschnabel IV/3 1717, 1718
Reiherbusch VII 192
Reineckea carnea Kunth II 280
Reinwardtia Indica Dum. V/1 1
Remontant-Nelken III 319
Reseda alba L. IV/1 485
„ odorata L. IV/1 484
Rhamnus L. V/1 330; VI/1 112 Fig. 1146
Rhaponticum Lam. VI/2 932
Rheum L. III 165
„ digynum Wahlenb. III 188
Rhexia L. V/2 795
Rhipsalis Gaertn. V/2 697
Rhododendron L. V/3 1629, 1632
Rhodothamnus Chamaecistus Rchb. V/3 1647
Rhodotypus Sieb. et Zucc. IV/2 665
Rhoeo discolor Hance II 143
Rhoicissus Planch. V/1 354
Rhus L. V/1 220/6

Ribes L. IV/2 642, 643
alpinum L. IV/2 652; VII 180 Fig. 1225
Richardia Africana Kunth II 131; I/CXI Fig. 183
Ricinus communis L. V/1 121, 124
Riesen-Eucalyptus V/2 785
-Haarstrang V/2 1403
„ -Süssgras I 322
Ringelblume VI/2 802
Rispelstrauch, Deutscher V/1 551
Rispenhirse I 189
Rittersporn III 486, 487, 488, 489, 490
„ , Hoher III 490
Rivina L. III 267
Robinia L. IV/3 1143, 1391
„ -Bastarde IV/3 1391
Rochea DC. IV/2 514
Rodgersia A. Gray IV/2 567
Roella ciliata A. DC. VI/1 329
Roemeria DC. IV/1 19
Roettlera Vahl VI/1 177
Rohr I 271, 272
„ , Italienisches I 173
Rohrkolben I 111; VII 134 Fig. 1173 B C
Romeye I 311
Romneya Coulteri Harv. IV/1 19
Rondeletia L. VI/1 197
Rosa L. IV/2 988, 992/6; VII Fig. 1073, 1122, 1140
cinnamomea L. IV/2 1048
Gallica L. IV/2 1003, 1004
pervirens Gren. IV/2 1000
rubrifolia Villars IV/2 1007
rugosa Thunb. IV/2 994
sempervirens L. IV/2 1000
„ spinosissima L. IV/2 1051, 1052
Roscoea Sm. II 321
Rose, Japanische IV/2 564
von Jericho VI/1 495
Immergrüne IV/2 1000
„ , Rotblätterige IV/2 1007
Rosen-Geranium IV/3 1665
Rosmarinheide V/3 1651, 1654
Rosmarinus L. V/4 2519, 2520
Rosskastanie V/1 299 u. f.
„ , Gemeine V/1 302
Rotbuche III 97
Rotdorn IV/2 737, 738
Rot-Eiche III 106
-Erle III 92, 93
„ -Rüster III 119
Rotschwingel I 342
Rottanne I 87
Rubus L. IV/2 762
bellidiflorus C. Koch IV/2 785
„ odoratus L. IV/2 762
Rudbeckia L. VI/1 504
hirta L. VI/1 505
„ laciniata L. VI/1 506
Rüsterstaude IV/2 973, 974
Ruhmesblume VII 182
Ruhmeskrone VII 159
Rumex digynus L. III 188
Runzel-Erle III 85
Ruscus L. II 264
Rutenkaktus V/2 697

S.

Saat-Platterbse IV/3 1605, 1606
Sadebaum I 92
Säckelblume (= Ceanothus) V/1 324
Saflor VI/2 986
Safran II 297, 300, 302; VII 125 Fig. 1165
„ , Zweiblütiger II 302
Sagina subulata (Sw.) Presl III 380, 386
Sagittaria L. I 155
Saintpaulia ionantha Wendl. VI/1 177
Salbei V/4 2477/9
„ , Klebriger V/4 2487
Salix L. III 15
alba L. III 23
-Bastarde III 50/57
bicolor Ehrh. III 45
caesia Vill. III 48
caprea L. III 35
cuspidata Schultz III 50
daphnoides Vill. III 25
dasyclados Wimm. III 50
Friesii Kerner III 50
grandifolia Seringe III 38
incana Schrank III 26; VII 167 Fig. 1205
pentandra L. III 20
Pokornyi Kerner III 51
purpurea L. II 24
viminalis L. III 27
„ Zabelii Dieck. III 48
Salpiglossis sinuata Ruiz et Pavon V/4 2554
Salvia L. V/4 2477/79
glutinosa L. V/4 2487
pratensis V/4 2500
Sclarea L. V/4 2490
„ viridis L. V/4 2489
Sal-Weide III 35
Sambucus L. VI/1 235
nigra L. VI/1 239
„ racemosa L. VI/1 241
Sammetblume VI/1 534
Sammt-Rose IV/2 1003, 1004
Sanchezia Ruiz et Pav. VI/1 178
Sanddorn V/2 732, 740
Sand-Ginster IV/3 1205
„ -Strohblume VI/1 471
Sanguisorba L. IV/2 936
Sanseviera Thunb. II 280
Santolina L. VI/2 673
„ Chamaecyparissus L. VI/2 672
Sanvitalia procumbens Lam. VI/1 528; VI/2 1353 Fig. 956
Sapindus L. V/1 308
Saponaria bellidifolia Sm. III 344
lutea L. III 348
ocymoides L. III 347
officinalis L. III 344
pumila (St. Lag.) Janchen III 347
Saracha viscosa Schrad. V/4 2554
Sarcococcus saligna Müll.-Aarg. V/1 203
Sarothamnus Wimmer IV/3 1143, 1182, 1189
Sarracenia L. IV/2 510; VII 120 Fig. 1157
Satureja L. V/4 2279
Acinos Scheele V/4 2299, 2548
grandiflora Scheele V/4 2289
Sauerdorn IV/1 7
Sauerkirsche IV/2 1076
Sauerklee IV/3 1646, 1647
Sauerschotenbaum IV/3 1144
Saurauja Willd. V/1 494
Sauromatum Schott II 131
Sawara-Ceder I 82
Saxifraga L. IV/2 574; VII 31 Fig. 1054
Burseriana L. IV/2 586
Cotyledon L. IV/2 593; VII 103 Fig. 1134
decipiens Ehrh. IV/2 614
Geum L. IV/2 628
rotundifolia L. IV/2 630
sarmentosa L. IV/2 575
„ umbrosa L. IV/2 627
Scabiosa L. VI/1 303
Schachblume II 241
Schafgarbe VI/2 550, 551
Gelbe VI/2 577
„ , Gemeine VI/2 573
Scharlachdorn IV/2 727
Scharlachpelargonium IV/3 1664
Scharlachquitte IV/2 693
Scharlach-Salbei V/4 2489
„ -Verbene V/3 2240
Scharte VI/2 926
Schatten-Steinbrech IV/2 627
Schauera Nees VI/1 178
Schaumblüte IV/2 567
Scheineller VII 196 Fig. 1236
Scheinerdbeere, Indische IV/2 908
Scheingeissbart, Japanischer IV/2 566
Schein-Kerrie VII 180
-Malve VII 188
-Spiere VII 180
„ -Veilchen VII 177
Schelmkraut IV/2 635
Schierlings-Tanne I 81; VII 151
Schildblatt, Kalifornisches IV/2 566
„ -Sumpfrose V/3 1961
Schildfarn, Stacheliger I 22
Schild-Geranium IV/3 1664
Schilfrohr I 272
Schinus molle L. V/1 217
Schirmtanne, Japanische I 81

Schizanthus Ruiz et Pav. V/4 2555
Schizopetalum Walkeri Hook. IV/1 357
Schlangenkaktus V/2 692
Schleiergras I 240
Schleierkraut III 314
Schleifenblume IV/1 102
Schlüsselblume V/3 1737
Krainer V/3 1765
Schaftlose V/3 1746
Schmuckblume III 461
„ Rautenblätterige III 461
Schmucklilie, Blaue VII 160 Fig. 1190
Schneeball VI/1 241; VII 54 Fig. 1087
, Gemeiner VI/1 241, 244; VII 54 Fig. 1087
, Wolliger VI/1 241; VII 206 Fig. 1256
-Hortensie IV/2 564
„ -Spierstrauch IV/2 680
Schneebeere VI/1 234; VII 206 Fig. 1255
Schneeglöckchen II 308
Schneerose III 466, 467
Schnurbaum IV/3 1144
Schönblatt VII 189
Schönmalve VII 188
Schöterich IV/1 426
Schopflavendel V/4 2275
Schopflilie VII 162
Schusserbaum IV/3 1129
Schwalbenwurz V/3 2067
Schwanenblume I 157
Schwarz-Erle III 92, 93
Schwarzföhre I 107
Schwarzfrucht-Weissdorn IV/2 730
Schwarzkümmel III 475
Damaszener III 474
Schwarz-Pappel III 63, 64
Schwertlilie II 287, 288, 289, 290, 292, 295, 296
Blassviolette II 292
Blaue II 296
Deutsche II 292
Gelbliche II 288
Gescheckte II 289
Grasblätterige II 295
„ Schmutziggelbe II 290
Schwindelwurz VI/2 720
Sciadopitys verticillata Sieb. et Zucc. I 81
Scilla L. II 246, 247
Scirpus Tabernaemontani Gmel. II 30
autumnalis L. II 248
bifolia L. II 248
non scripta Hoffmannsegg et Link II 249
Scolopendrium vulgare Sm. I/CXVI Fig. 199; I 34
Scutellaria L. V/4 2509
alpina L. V/4 2518
Scutellaria altissima L. V/4 2516
„ Orientalis L. V/4 2508
Sedum IV/2 518, 519
acre L. IV/2 537, 538
album L. IV/2 535, 536
Anacampseros L. IV/2 521
arboreum L. IV/2 518
Hispanicum L. IV/2 529
mite Gilib. IV/2 540
rupestre L. IV/2 542
Sieboldii Sw. IV/2 518; VII 178 Fig. 1222
spectabile Bov. IV/2 518
„ spurium Bieb. IV/2 526
Seerose III 440; VII 110 Fig. 1144 und 62 Fig. 1097
„ , Weisse III 442, 443
Seidelbast V/2 705, 710, 713
„ , Gestreifter V/2 721
Seidenpflanze V/3 2065
Seifenbaum IV/3 1129
Seifenkraut, Gelbes III 348
Gemeines III 344, 345
Niedriges III 347
„ , Rotes III 347
Selaginella Pall. I 69
lepidophylla (Hook. et Grev.) Spring IV/1 70; VII 33 Fig. 1056
Selenicereus V/2 693
Selenipedilium Rchb. II 324
Sellerie-Weissdorn IV/2 731
Semele androgyna (L.) Kunth II 264
Sempervivum L. IV/2 544
Funckii Braun IV/2 561
soboliferum Sims IV/2 560
„ tectorum L. IV/2 547
Senecio L. VI/2 727, 728
abrotanifolius L. VI/2 770
Cineraria DC. VI/2 728
cruentus DC. VI/2 728
fluviatilis Wallr. VI/2 758
Sequoia gigantea Loud. I 82
„ sempervirens Carr. I 82
Serratula L. VI/2 926
Sesamgras I 178
Seseli gummiferum Pallas V/2 1227
Shepherdia argentea Nutt. V/2 729
„ Canadensis Nutt. V/2 730
Sibiraea Maxim. IV/2 663
„ levigata (L.) Maxim. IV/2 681
Sicyos angulatus L. VI/1 328
Sidalcea Neomexicana A. Gray V/1 455
Sideritis L. V/4 2403
Siegesbeckia Orientalis L. VI/1 533
Siegwurz II 302; VII 81 Fig. 1115
„ , Gemeine II 302
Sieversia montana (L.) R. Brown IV/2 911
Sigmarskraut V/1 479
Silber-Ahorn V/1 271
-Akazie IV/3 1125
Silberbaum IV/2 714, 715
Silberblatt, Wildes IV/1 355
Silber-Distel VI/2 817, 917
-Oelweide V/2 730
-Pappel III 60
-Storchschnabel IV/3 1676
„ -Weide III 23
Silene L. III 277, 278
Armeria L. III 286
coeli-rosa (L.) A. Br. III 277
pendula L. III 277
saxifraga L. III 284
„ Vallesia L. III 284
Silphium L. VI/1 495
Silybum Marianum Gaertn. VI/2 918
Simmondsia Chinensis Link V/1 203
Sinningia speciosa (Lodd.) Benth. et Hook. VI/1 176
Siphonocampylus microstoma Hook. VI/1 392
Sisymbrium L. IV/1 15
Sisyrinchium L. II 305
Skimmia Thunb. V/1 53
Smilacona Desf. VII 162
Smilax Tournef. II 280
Smithiantha O. Kuntze VI/1 177
Sobralia Ruiz et Pav. II 324
Solandra Sw. V/4 2555
Solanum L. V/4 2585/86, 2588
capsicastrum Lk. V/4 2588
Lycopersicum L. V/4 2608
„ Melongena L. V/4 2587
Soldanella L. V/3 1823
Solidago Canadensis L. VI/1 411
graminifolia Elliot VI/1 413
„ serotina Ait. VI/1 412
Sollya Lindley IV/2 655
Sommer- Aster VI/1 448; 1355 Fig. 959
Sommer-Eiche III 110
Sommer-Linde V/1 452
Sonerila Roxb. V/2 796
Sonnenblume VI/1 507/9
Sonnenfeind VII 202 Fig. 1246
Sonnenfreund VII 177
Sonnenhut VI/1 504
, Rauher VI/1 505
, Schlitzblätteriger VI/1 506
Sonnenröschen, Gemeines V/1 568
Sonnentau IV/2 498/9
Sonnenwende V/3 2130/1
Sophora L. IV/3 1143, 1145
„ Japonica L. IV/3 1144
Sorbaria (Ser.) R. Br. IV/2 663, 681
Sorbus L. IV/2 707
arbutifolia (L.) Heynhold IV/2 706
Aria (L.) Crantz IV/2 714, 715
aucuparia L. IV/2 707, 711
aurea hort. IV/2 715
-Bastarde IV/2 723/24
melanocarpa (Willd.) Heynhold IV/2 706
salicifolia Hedlund IV/2 716

Sorghum Halepense Pers. I 173
„ vulgare Pers. I 173
Spalt-Blume VII 203
-Griffel VII 163
-Kölbchen VII 175
Spanischer Steinbrech IV/2 627
Spanische Wicke IV/3 1564, 1574
Sparaxis Ker-Gawler II 306
Spargel II 261; VII 161 Fig. 1192
, Zartblättriger II 263
Spargelerbse, Rote IV/3 1376
Sparmannia Africana L. V/1 428
Spartium junceum L. IV/3 1214; VII 183 Fig. 1226 B
Spathicarpa Hook. VII 157
Sperrkraut, Blaues V/3 2116
Sphaeralcea St. Hilaire V/1 457
Spierstrauch IV/2 675, 676
Spigelia L. V/3 1952
Spilanthes oleracea Jacq. VI/1 528
Spinat, Spanischer III 240
Spindelstrauch V/1 247 u. f.
Spinifex L. I 194
Spiraea L. IV/2 663, 675, 676
media Schmidt IV/2 676
salicifolia L. IV/2 678, 679
ulmifolia Scop. IV/2 677
Spiraeanthus Fisch. et Mey. IV/2 663
Spitz-Ahorn V/1 281, 282
Spornblume VI/1 278
Spornfahne VII 183
Sporn-Veilchen V/1 609
Sprekelia formosissima Herb. II 319
Spreublume VI/2 813
„ , Einjährige VI/2 815
Springkraut V/1 313/4
Spring-Wolfsmilch V/1 147
Sprossen-Hauswurz L. IV/2 560
Stachelmohn IV/1 19
Stachys L. V/4 2408
Germanicus L. V/4 2426
lanatus Jacquin V/4 2427
„ officinalis Trevisan V/4 2430
Stachytarpheta Vahl V/3 2236
Stangeria T. Moore I 73
Stanhopea Hook. II 324
Stapelia L. V/3 2066/67
Staphylea L. V/1 257
„ pinnata L. V/1 259 u. f.
Statice L. V/3 1886
„ plantaginea All. V/3 1895
Stauden-Lein V/1 18
Stauden-Phlox V/3 2113
Stechapfel V/4 2612/3, 2614, 2615
Stechblatt V/2 1328
Stechginster IV/3 1191
Stechpalme V/1 237 u. f.
Steckenkraut V/2 1093, 1354 u. f.
Steinbrech IV/2 574, 575; VII 31 Fig. 1054 u. 103 Fig. 1134
Burser's IV/2 586
Knöllchen- IV/2 615
Nelkenwurz- IV/2 627
Steinbrech, Rosenblütiger IV/2 614
, Rundblättriger IV/2 630
, Spanischer IV/2 628
-Felsennelke III 317
„ -Leimkraut III 284
Stein-Eiche III 112
Steinklee IV/3 1238
Steinkraut IV/1 446/47
Steinkresse IV/1 111
Steinlinde V/3 1917, 1918
Steinmispel IV/2 683, 684
Steinquendel V/4 2299
Steinröschen V/2 721
Steinsame V/3 2153, 2156
„ , Echter V/3 2157
Stellaria graminea L. III 357
Stephanandra incisa Zabel IV/2 663
Stephanotis floribunda A. Brong. V/3 2067
Steppen-Lilie VII 159
Stern-Anemone III 518
Sternbergia Waldst. et Kit. II 319
Sternblume II 252; V/2 964; VI/1 316, 416/35
Sterndolde V/2 963
Sternschild II 280; VII 161 Fig. 1194
Steudnera colocasiaefolia C. Koch II 131
Stevia Cav. VI/1 408
Stewartia L. V/1 498
Stiefmütterchen V/1 603, 605
„ , Gelbes V/1 606, 608
Stiel-Eiche III 110
Stinkende Hoffart VI/1 534 (für Tagetes); VI/2 801
Stinkstrauch IV/3 1146
Stipa L. I 173; VII 153 Fig. 1181
pennata L. I 203; VII 153 Fig. 1181
Stockmalve VII 188
Stockrose V/1 463
Stokesia cyanea L'Hér. VI/1 408
Storaxbaum, Amerikanischer IV/2 656
Storchschnabel IV/3 1671/2, 1690
„ , Sibirischer IV/3 1695
Stragel IV/3 1405/6
Strandnelke V/3 1879
Strauch-Fingerkraut IV/2 816
Strauchwicke IV/3 1469
Straußfarn I 12
Straussgras, Weisses I 223
Strelitzia reginae Ait. II 320
Streptocarpus Lindl. VI/1 177
Striemensamen V/2 1048
Strobilanthes Bl. VI/1 178
Strohblume VI/1 469/70
Struthiopteris Germanica Willd. I 12
Stundenblume V/1 458
Sturmhut III 493 u. f.
Süßkirsche IV/2 1080
Süßklee IV/3 1485
Sumach V/1 220/6
Sumpf-Bitterklee V/3 1960
-Dotterblume III 459
-Johanniskraut V/1 511
-Porst V/3 1626
Sumpfzypresse, Amerikanische I 82
Sutherlandia frutescens R. Br. IV/3 1457
Swainsonia Salisb. IV/3 1456, 1457
Swertia L. V/3 1973
Sykomore IV/2 662
Symphoricarpus racemosus Michx. VI/1 234; VII 206 Fig. 1255
Symphyandra DC. VI/1 329
Symphytum L. V/3 2222
asperum Lepechin V/3 2221
„ Tauricum Willd. V/3 2222
Symplocos L. V/3 1900
Syringa L. V/3 1909/1912
vulgaris L. V/3 1915

T.

Tabak V/4 2616/7, 2622
Täschelkraut IV/1 117
Tagetes L. VI/1 534/5; VII 58 Fig. 1094
Taglilie, Gelbe II 204, 205; VII Fig. 1070, 1154
„ , Gelbrote II 204
Tagnelke, Weisse III 302
Tamarinde IV/3 1130
Tamarindus Indica L. IV/3 1130
Tamarix L. V/1 546 u. f.
Tamonea magnifica Voss V/2 796
Tanacetum L. VI/2 591, 592, 619
Tanne I 82; VII 57 Fig. 1092
Tarchonanthus camphoratus L. VI/1 495
Tatarischer Ahorn V/1 272
Taubnessel V/4 2440
„ , Großblütige V/4 2445
Taxodium distichum Rich. I 82
Taxus L. I 79, 81
Tectona radicans (DC.) V/3 2237
Teichrose, Gelbe III 445
„ Kleine III 447
Telegraphenpflanze IV/3 1462
Telekia Baumg. VI/1 492
Tellima grandiflora (Pursh) R. Br. IV/2 567
Templetonia R. Br. IV/3 1147
Tephrosia Pers. IV/3 1386
Tetragonolobus purpureus Moench IV/3 1375
Tetrapanax papyrifer K. Koch V/2 914
Tetrastigma Planch. V/1 354
Teucrium L. V/4 2523/24
Teufelsauge III 597
Teufels Nadelkissen V/2 694
Thalia L. II 321
Thapsia Garganica L. V/2 1500
Thalictrum aquilegifolium L. III 589
Thea Japonica Nois. V/1 497
Thelesperma Less. VI/1 531

Thermopsis R. Br. IV/3 1146
Thladiantha dubia Bunge VI/1 315
Thlaspi L. IV/1 117
Thomasia quercifolia Gay V/1 492
Thuja orientalis L. I 82
„ occidentalis L. I 82
Thunbergia L. VI/1 177
Tiarella cordifolia L. IV/2 567
Tibouchina Aubl. V/2 795
Tigerlilie II 235, 305
Tigridia pavonia Ker-Gawler II 305
Tilia L. V/1 434—436; VII 188 Fig. 1231
cordata Mill. V/1 443
platyphyllos Scop. V/1 452
Tinantia fugax Scheidw. II 143
Tithonia tagetiflora Desf. VI/1 528
Tithymalus Scop. V/1 136
Tolmiea Menziesii (Hook.) Torr. et Gray IV/2 567
Tolpis barbata Gaertn. VI/2 1007
Tomate V/4 2608
Torfgränke V/3 1656
Torreya Arn. I 79
Totenstrauch VI/1 495
Townsendia Wilcoxiana Wood VI/1 449
Trachelium caeruleum L. VI/1 329
Trachelospermum lucidum K. Schum. V/3 2051
Trachycarpus excelsa Wendl. II 130
Trachymene Rudge V/2 956
TrachystemonOrientalisDonV/3 2128
Tradescantia L. II 143
Tränengras I 173, 181
Tränen-Weide III 56
Tragopogon L. VI/2 1043
Trapa natans L. V/2 892
Trauben-Eiche III 112
-Holunder VI/1 241
Traubenkirsche IV/2 1066
Trauerbaum V/3 1906
Trauer-Buche III 98
-Iris II 284
„ -Klee IV/3 1314
Trauerweide III 48
Trichosanthes L. VI/1 315
Trichosporum Don VI/1 177
Trichterlilie II 200
Tricyrtis hirta W. J. Hook. II 199
Tridax trilobata Hemsl. VI/1 532
Trifolium Lupinaster L. IV/3 1314
Trigonella caerulescens Bieb. IV/3 1229
Trillium grandiflorum Salisb. II 280
Tripmadam IV/2 542
Tripsacum dactyloides L. I 178
Trisetum distichophyllum (Vill.) Pal. I 250
Triteleia uniflora Benth. II 278
Tritonia Ker-Gawler II 305; VII 164 Fig. 1198
Trollblume III 459
Trollius Asiaticus L. III 459
Trollius Europaeus L. III 459
Trompetenbaum VI/1 175; VII Fig. 1243, 1251
Trompetenblume VII 204
Trompetenkaktus V/2 693
Tropaeolum L. IV/3 1731/2
maius L. IV/3 1729, 1730
„ minus L. IV/3 1731
Tsuga Canadensis Carr. I 81; VII 151 Fig. 1179 A
„ taxifolia Britt. I 81
Tuberaria Spach V/1 559
Tuberose II 319; VII 163 Fig. 1196
Tüpfelstern V/3 1858
Türkenbund II 237; VII Fig. 1085, 1137, 1190
Türkische Hasel III 71
Tulipa L. II 242, 243, 244, 245; VII 118 Fig. 1153
australis Link II 244
Didieri Jord. II 245
„ silvestris L. II 244
Tulpe II 242, 243, 244, 245, 278; VII 118 Fig. 1153
, Didier's II 245
Südliche II 244
„ Wilde II 244
Tulpenbaum IV/1 13
Tunica saxifraga (L.) Scop. III 317
Turban-Kapsel IV/2 567
„ -Kürbis VI/1 326
Typha L. I 111; VII 134 Fig. 1173 B, C

U.

Ufer-Winde V/3 2083
Ulex L. IV/3 1191
Ulme III 118, 119, 120, 121
Ulmen-Spierstrauch IV/2 677
Ulmus III 118
campestris L. III 119
effusa Willd. III 121
„ montana With. III 120
Ungarische Silberlinde V/1 434
Ungnadia speciosa Endl. V/1 308
Uniola latifolia L. I 173
Urtica pilulifera L. III 137
Usambara-Veilchen VI/1 177
Uvularia grandiflora Sm. II 199

V.

Vaccinium L. V/3 1668
Valeriana L. VI/1 262; VII 207 Fig. 1258
Vallisneria spiralis L. I 161
Vallota purpurea Herb. II 319
Vanda R. Br. II 324
Vauquelinia corymbosa Corr. IV/2 663
Veilchen V/1 593/4
„ , Wohlriechendes V/1 651
Veltheimia Gleditsch II 279
Venusnabel IV/2 513
Veratrum nigrum L. II 192; VII 160 Fig. 1187
Verbascum L. VI/1 8; VII Fig. 1041, 1147, 1244
„ Olympicum Boiss. VI/1 8
Verbena L. V/3 2239/40
Verbesina encelioides Benth. et Hook. VI/1 529
Vergißmeinnicht V/3 2160
Vernonia Schreb. VI/1 467
Veronica L. VI/1 40
Vexiernelke III 298
„ Teucrium L. VI/1 58
Viburnum L. VI/1 241
Lantana L. VI/1 241
Opulus L. VI/1 241; VII 54 Fig. 1087
Vicia L. IV/3 1508
galegifolia Andr. IV/3 1456
onobrychioides L. IV/3 1529
„ pisiformis L. IV/3 1520
Victoria regia L. III 438; I/CI Fig. 156
Villarsia Vent. V/3 1953
Viminaria Sm. V/3 1147
Vinca maior L. V/3 2053
„ minor L. V/3 2055
Vincetoxicum Moench V/3 2067
Viola L. V/1 593—594
cornuta L. V/1 615
lutea Hudson V/1 606, 608
odorata L. V/1 651
sepincola Jordan V/1 648, 649
„ tricolor L. V/1 603, 605
Viscaria Roehling III 275
alpina (L.) Don III 275
„ vulgaris Roehling III 277
Visnea Mocanera L. V/1 498
Vitis L. V/1 360—362
Vittadinia Australis A. Rich. VI/1 449
Vogelbeerbaum IV/2 711
Vogelkirsche IV/2 1080
Vogelwicke, Großblütige IV/3 1529
Voralpen-Spindelstrauch V/1 255, 256
Vossianthus VII 188

W.

Wacholder I 91; VII 152 Fig. 1180
Wachsblume V/3 2067, 2187, 2188
Wachs-Gagel III 11
Wachs-Myrte III 11
Wahlenbergia Schrad. VI/1 329, 388
Waitzia corymbosa Wendl. VI/1 495
Walderbse, Gelbe IV/3 1520
Waldfarn, Weiblicher I 33
Waldlorbeer V/2 708
Waldmeister VI/1 199
Waldrebe III 508/9
, Aufrechte III 516
Ganzblättrige III 515
, Gemeine III 512
„ , Italienische III 517
Waldsteinia Willd. IV/2 927
Wald-Weidenröschen V/2 818

Walliser-Leinkraut III 284
Wallwurz V/3 2222
Walnuß III 7
Walnußbaum III 7, 8; VII 36 Fig. 1061
Waltheria L. VII 188
Wanzenblume VI/1 529
Warzenkaktus V/2 695
Warzen-Spindelstrauch V/1 254
Washingtonia Winslow I 82; VII 151
Wasserdost VI/1 401
Wasserkerbel V/2 1009
Wasserliesch I 157
Wassernuß V/2 892
Wasserpest I 160
Wasser-Schwaden I 322
Wasserstrauch IV/2 564
Watsonia aletroides Ker-Gawler II 306
Wegerich-Strandnelke V/3 1895
Weichsel IV/2 1076
Weide III 15, 20, 35, 38, 45, 48, 56, 57
Blaugrüne III 48
Kaspische III 56
„ , Zweifarbige III 45
Weiden-Bastarde III 50/57
Weidenröschen, Zottiges V/2 825
Weiden-Spierstrauch IV/2 679
Weiderich, Gemeiner V/2 761
Weigelia VI/1 235; VII 44 Fig. 1075
Weihnachtsrose III 466
Weinbergs-Bisamhyazinthe II 258
Weissbaum IV/2 714, 715
Weiss-Birke III 80
Weissbuche III 66, 68
Weissdorn IV/2 727, 728, 729, 730, 731, 733, 737, 738, 739
, Blutroter IV/2 729
, Eingriffeliger IV/2 737, 738, 739
, Stumpfgelappter IV/2 733
„ -Stachelbeere IV/2 642
Weiss-Erle III 90, 91
„ -Pappel III 60
Weisstanne I 84
Weisse Lilie II 234
Wellingtonia Lindl. VII 151
Weymouths-Kiefer I 97
Wicke, Afrikanische IV/3 1565
, Spanische IV/3 1564, 1574
„ , Wohlriechende IV/3 1564
Wickelwurz IV/2 566
Widerstoß V/3 1879/81
Wiesen-Bärenklau V/2 1454
Wiesenknopf IV/2 936
Wiesenraute, Akeleiblätterige III 589
Wiesen-Salbei V/4 2500
Wiesen-Storchschnabel IV/3 1690
Wigandia H. B. et Kth. V/3 2122
Wild Elder V/2 913
Winde V/3 2079
Windröschen III 518
„ , Narzissenblütiges III 528
Winter-Astern VI/3 594
Winter-Eiche III 112
Winterlevkoje IV/1 470
Winter-Linde V/1 443
Winterling III 473; VII 9 Fig. 987 d
Wistaria Nutt. IV/3 1143, 1386, 1387
Wolfsbohne IV/3 1154, 1155
Wolfsmilch, Vielfarbige V/1 154
Wollgras II 17
Woll-Kratzdistel VI/2 869
Wucherblume VI/2 593/6, 599/600, 612
„ , Großblätterige VI/2 616
Wüsten-Ziest VII 203
Wulfenia Jacq. VI/1 64
Wunderbaum V/1 121, 124
Wunderblume III 266; VII 51 Fig. 1083
Wund-Fetthenne IV/2 521
Wurmfarn I 19

X.

Xanthoceras sorbifolium Bunge V/1 308
Xantorrhiza apiifolia L'Hérit. III 453
Xanthoxylum L. V/1 47
Xeranthemum L. VI/2 813
annuum L. VI/2 815

Y.

Ysop V/4 2360
Yucca L. II 279; VII 161 Fig. 1192

Z.

Zäpfchenkraut VII 159
Zahnwurz, Weiße IV/1 332
Zamia L. I 73
Zanonia L. VI/1 316
Zantedeschia Spr. II 131; I/CXI Fig. 183
Zaubernuss, Virginische IV/2 656
Zaunglocke V/3 2080
Zaunrübe, Weiße VI/1 318
Zauschneria Californica Presl V/2 799
Zea Mays L. I 173, 180, 181; VII 41 Fig. 1068
Zebratute VII 157 Fig. 1184
Zebrina Schnizl. II 143; VII 157 Fig. 1184
Zeder I 81
, Japanische VII 151 Fig. 1179 B
Zelkowa Spach III 117
Zephirblume VII 162
Zephyranthes Herb. II 319
Zerr-Eiche III 114, 115
Zeus-Nelke III 296
Ziegenbart IV/2 673
Ziest V/4 2408
„ Filziger V/4 2426
Zimmer-Calla II 131; I/CXI Fig. 183 a
-Linde V/1 428
„ -Tännchen VII 50 Fig. 1081
Zimmet-Rose IV/2 1048
Zimmt-Brombeere IV/2 762
Zinnia L. VI/1 527
Zipfelkraut VII 209
Zirbelkiefer I 106
Zistrose V/1 555, 556
„ Salbeiblätterige V/1 558
Zitronen-Geranium IV/3 1665
Zitronenstrauch V/3 2233
Zittergras I 292
Zitter-Pappel III 62
Zitzenkaktus V/2 695
Zizania aquatica L. I 196
Zizyphora capitata L. V/4 2281
Zosimia absinthiifolia Link V/2 1457
Zucker-Ahorn V/1 271, 280
Zuckerrohr I 173
Zucker-Rose IV/2 1003, 1004
Zürgelbaum III 121, 122
Zweizahn VI/1 516
Zwerg-Alpenrose V/3 1647
Zwergkakteen V/2 695
Zwerg-Mandel IV/2 1085
-Mispel IV/2 683, 684
„ -Palme II 130
Zwerg-Schwertlilie II 287
„ Wacholder VII 152 Fig. 1180
Zwetschge IV/2 1108; VII Fig. 1158, 1225 B
Zwillings-Ginster IV/3 1180
Zygocactus truncatus Schum. V/2 695
Zygophyllum Xanthoxylum Engler V/1 39
Zymbelkraut VI/1 27
Zypergras II 10

7. Pflanzenerzeugnisse, Inhaltsstoffe, Drogen usw.

Seite 529—548

Das grundlegende Werk der deutschen Erblichkeitsforschung:
BAUR-FISCHER-LENZ:

Menschliche Erblichkeitslehre und Rassenhygiene

Bd. I: **Menschliche Erblichkeitslehre.** 3. Aufl. 1927. 600 Seiten mit 172 Textabbildungen und 9 Tafeln mit 54 Rassenbildern. Geh. Mk. 16.—, geb. Mk. 18.—.

Bd. II: **Menschliche Auslese und Rassenhygiene (Eugenik).** Von Prof. Dr. Fr. Lenz. 600 Seiten mit 12 Textfiguren. Geh. Mk. 15.—, geb. Mk. 17.—.

„Dieses Buch kann man als die umfassendste deutsche Zusammenfassung der menschlichen Erblichkeitslehre bezeichnen, die von jedem Forscher auf diesem Gebiet mit Nutzen verwendet werden wird." *(Deutsche Med. Wochenschr.)*

„Der „Baur-Fischer-Lenz" steht an anerkannt hervorragender Stelle unter dem Schrifttum der letzten Jahre." *(Zeitschr. f. Naturwissenschaften.)*

„Der Erzieher bedarf eines solchen zuverlässigen Werkes sehr, auf keinen Fall darf es in den Schulbüchereien fehlen." *(Badische Schulztg.)*

J. F. LEHMANNS VERLAG / MÜNCHEN 2 SW

7. Verzeichnis der Pflanzenerzeugnisse, Inhaltsstoffe, Drogen usw.

A.

Aalkräuter IV/2 941
Abiëtinsäure I 107
Abrahams Baum V/1 233
Abrin IV/3 1498
Abrotin VI/2 635
Absinth V/4 2305; VI/2 649, 655
Absinthiin VI/2 628
Absinthlikör VI/2 655
Acacetin IV/3 1398
Acajougummi V/1 216
Acajouharz V/1 216
Acajouholz V/1 85
Acanthomastix VI/2 824
Acetum aromaticum V/2 1343
Rubi Idaei IV/2 771
Achillëin VI/2 557, 572
Aconitin III 493
Acorin II 136
Acus muscata IV/3 1724, 1725
Adanson-Fibre V/1 489
Adlerholz V/1 120; V 700
Adonidin III 598
Adoniskraut III 598
Adonit III 598
Aegagropilae V/2 1323
Aesculetin V/1 303
Aesculin V/1 303
Aetherische Oele VII 28
Aethylalkohol V/1 400, 414; V/4 2603
Agrostemma-Sapotoxin III 274
Agrumen V/1 55
Ahornessig V/1 270
Ahornzucker V/1 269, 283
Aigagropillen IV/2 984
Ailanthussäure V/1 81
Ajowan-Samen V/2 1168
Akaju-Nüsse V/1 218
Akaroïdharz II 278
Akazien-Gummi IV/3 1124
Akokantheraholz V/3 2050
Akonitin III 493
Akonit-Knollen III 493
Akon-Sedde V/3 2064
Alabastra Sophorae IV/3 1145
Alangin V/2 771
Alantkampfer VI/1 476
Alantoel VI/1 476
Alantol VI/1 476
Alantolacton VI/1 476
Alantsäure VI/1 476
Alantwurzel VI/1 476
Alaunwurzel IV/3 1671
Alban V/3 1896, 2063
Albedo V/1 60
Albumin IV/3 1140
Aleuronkörner siehe Kristalloide VII 78
Alepponüsse V/1 232
Alga vitrariorum I 142
Alizarin VI/1 232
Alkaloide VII 28
Alkannarot V/3 2206
Alkannawurzel V/3 2205
Alkannin V/3 2125, 2151, 2153, 2179, 2206
Alkornoko-Wurzel IV/3 1144
Allermannsharnisch II 219
Allylsenföl IV/1 57, 120, 238, 307
Allylsulfid IV/1 151
Almapotzen III 63
Almond oil IV/2 1090
Aloë II 277
Aloë-Emodin II 278
Aloëharz II 278
Aloëholz II 318; V/1 120
Aloïn II 278
Alraun(e) II 219; V/4 2559
Alsines bacciferae III 308
Althaea-Salbe VI/1 470
Althaeïn V/1 464
Alvelozbalsam V/1 140
Alvelozmilch V/1 140
Amazonasmandeln V/2 768
Amberkraut V/4 2524
Ambrosia campestris IV/1 95
Ameisensäure VII 103
Amenta uvae marinae I 75
Ammeisamen V/2 1168, 1173
Ammium Alexandrinum V/2 1168
Ammoniacum V/2 945
Ammoniakgummi V/2 945, 1356
Ammoniak-Harz V/2 945
Ammoresinotannol V/2 945
Amiadgummi IV/3 1124
Amraharz V/1 216
Amygdalae amarae IV/2 1088
dulces IV/2 1090
Amygdalin IV/2 664, 667, 692, 710, 1056, 1067, 1084, 1090
Amylum Maydis I 180
Marantae II 321
Oryzae I 195
Solani V/4 2603
„ Tritici I 395
Amyrol V/1 54
Anacardgummi V/1 216
Anacardsäure V/1 216
Anagyrin IV/3 1146
Anakahuiteholz V/3 2124
Ananasfrucht II 143; I/CL Fig. 286
Ananiharz V/1 502
Anaplasten VII 80
Anchusarot V/3 2206
Anchusin V/2 2125, 2206
Androl V/2 1268
Andromedotoxin V/3 1626, 1629, 1654
Anemonenkampfer III 519
Anemonin III 519
Anethol V/2 1211, 1288
Angelicasäure V/2 1343
Angelicin V/2 1343
Angolaerbse IV/3 1624
Angosturarinde V/1 51
Anhalamin V/2 684
Anhalin V/2 684
Anhalonidin V/2 684
Anhalonin V/2 684
Anhalonium V/2 684
Anis V/2 1211
Anisaldehyd V/2 1211
Anisette IV/1 14
Aniskörner V/2 1073
Anis-Öl V/2 1211
Anissäure V/2 1211
Anthemidol VI/1 536
Anthyocyane VII 31
Anthodium Arnicae VI/2 707
„ Chamomillae vulgaris VI/2 583
Anthophylli V/2 779
Anthranilsäuremethylester IV/3 1398; V/1 62; V/3 1906
Antienzyme VII 31
Antifermente VII 31
Antigene VII 31
Antillen-Kassie IV/3 1125
Anyswartel V/2 943
Apfelsäure IV/2 502, 512, 545, 648, 654, 664, 701, 710, 741, 752, 766, 770, 774, 1077, 1084; V/1 62, 79; V/2 925; V/3 1689 VI/1 237, 239; VII 103
Apfelsine V/1 61
Apfelsinenschalenöl V/1 62
Apfelsorten IV/2 748
Apfelwein IV/2 753
Apigenin V/2 1158
Apiin V/2 1029, 1145, 1159
Apiol V/2 1158
Apiton-Öl V/1 534

Apoatropin V/4 2551
Apothekerbirnen IV/2 701
Aprikosen von St. Domingo V/1 500
Aprikosenöl IV/2 1100
Aprikosenwasser IV/2 1100
Aqua Amygdalarum amararum IV/2 1091
auri IV/2 502
Carvi V/2 1185
Chamomillae VI/2 584
Foeniculi V/2 1288
Laurocerasi IV/2 1063
Menthae piperitae V/4 2355
Petroselini V/2 1159
Reginae Hungariae V/4 2521
„ Rubi Idaei IV/2 771
Arabin IV/2 1054; IV/3 1404
Arabinose III 216
Arabinsäure IV/3 1124
Arachinsäure IV/3 1464
Arachisöl IV/3 1464; VII 60 Fig. 1096
Arak I 195
Araroba IV/3 1496
Arbutase V/3 1661, 1688
Arbutin V/3 1589, 1592, 1595, 1626, 1661, 1673
Arekanuss II 130
Arnicin VI/2 708
Arnikablüten VI/2 707
Arnikatinktur VI/2 708
Arnikawurzel VI/2 707
Arongift II 133
Aronknollen II 133
Arrow-root II 320, 321
Brasilianisches V/1 119
Ostindisches II 320
„ , Westindisches II 321
Artemisiin VI/2 628
Arthanitin V/3 1847
Artischocken VI/2 924
Asa foetida V/2 944, 945, 1356
Asaresinotannol V/2 944
Asaron III 162
Asche (Pflanzen-) VII 92
Asclepiadin V/3 2063, 2073
Asparagin II 263; III 216; IV/2 701; IV/3 1141, 1453; V/1 247, 469, 491; V/2 1145; VI/1 515
Aspidosamin V/3 2050
Aspidospermatin V/3 2050
Aspidospermin V/3 2050
Assiminier IV/1 14
Asterin VI/1 449
Asthmakraut V/4 2615
Atlasholz V/1 47
Atractylsäure VI/2 824
Atropin V/4 2551, 2569, 2572
Atropurpurin V/1 247
Aucubin VI/1 179
Augentrost VI/1 84
Aurantiamarinsäure V/1 60
Aurum potabile V/4 2521
Avocato-Birnen IV/1 11
Azotogen IV/3 1118
Azulen VI/2 583, 654

B.

Bablah IV/3 1125
Baccae aucupariae IV/2 710
domesticae V/1 334
Halicacabi V/4 2582
Jujubae V/1 323
Juniperi I 108
Lauri IV/1 12
myrtillorum V/3 1679
Oxycoccos V/3 1689
Ribium IV/2 650
Solani vesicarii V/4 2582
spinae cervinae V/1 334
„ Zizyphi V/1 323
Bacterium radicicola IV/3 1117
Badan VII 179
Badian (Sternanis) IV/1 14
Bärenlauch II 230
Bärlappmehl I 67
Bahiapulver IV/3 1496
Balamtalg V/3 1896
Balata V/3 1896
Balaustia granati V/2 766
Baldracan IV/1 299
Baldrianöl VI/1 267
Baldrianwurzel VI/1 277
Balsam, Littauer III 79
Balsame VII 35
Balsamharze V/1 83
Balsamkraut VI/2 599
Balsamum Canadense I 108
carpaticum I 105
Copaivae IV/3 1131
de Mecca V/1 84
Gurjunae V/1 534
Mariae V/1 500
peruvianum IV/3 1144
Styracis officinalis IV/2 656
„ tolutanum IV/3 1144
Bankul-Nüsse V/1 120
Baptigenin IV/3 1146
Baptisin IV/3 1146
Barbados-Kirschen V/1 86
Barchent V/1 462
Baros-Kampfer V/1 534
Barringtogenitin V/2 767
Barringtonin V/2 767
Barttrauben V/3 2095
Bartsch V/2 1453
Basilikumöl V/4 2269
Basilikumwasser V/4 2270
Bassorin IV/3 1404; V/1 216, 218; V/2 684
Basswood-Öl V/1 436
Bastard-Indigo IV/3 1385
„ -Nüsse III 74
Batate V/3 2076
Batjang-Muskatnuss IV/1 15
Baumhaselnüsse III 74
Baumwolle V/1 460
Baumwollsamenöl V/1 462
Baumwollstoffe V/1 462
Bay-Öl V/2 777
Bay-Rum V/2 777
Bdellium Siculum V/2 946
Bedegar IV/2 984; VII Fig. 1140
Behenöl IV/1 491
Belladonna, Japanische V/4 2570
Belladonnin V/4 2551
Bellericae V/2 771
Benediktenkraut VI/2 991
Benediktenwein VI/2 991
Benediktiner-Likör V/2 1343
Benöl IV/1 491
Benzaldehyd IV/2 1056, 1063, 1091
Benzoësäure IV/3 1144; V 3 1673, 1900; VII 103
Berberin III 453; IV/1 9
Berberrubin IV/1 9
Bergamotte V/1 60
Bergamotten-Öl V/1 61
Bernstein VII 36
Bernsteinsäure V/1 399; VII 103
Bertramwurzel V/2 673
Besen I 80, 185, 276; II 265; III 79, 251; IV/1 371; IV/3 1188; V/1 212, 348; V/3 1699, 1707
Betaïn III 216; V/4 2564; VI/1 513, 515
Betelbissen II 130
Betelnuss II 130
Betonienkraut V/4 2430
Betonienwasser V/4 2430
Betulin III 79
Bezoar-Kugeln, Deutsche V/2 1323
Bezoarwurzel III 124
Bibernell, Falsche IV/2 939
Bibernellwurzel V/2 1208
Bierhopfen III 132
Bilsenkrautblatt V/4 2577
Bilsenkrautöl V/4 2577
Binsenwurzel II 148
Birkenöl III 79
Birkensaft III 76, 80
Birkenteer III 79
Birkenwein III 80
Birnensorten IV/2 698
Birnwein IV/2 701, 753
Bisamholz, Australisches VI/1 499
Bisem IV/3, 1725
Biskuitwurzeln V/2 943
Bistorta maior radice intorta III 195
Bitterholz V/1 79
Bitter-Kola V/1 502
Bittermandelöl IV/2 1067, 1090
Bittermandelwasser IV/2 1091
Bittertee VI/2 991
Bixin V/1 584
Bizarria V/1 64
Blackwood IV/3 1496
Blättertraganth IV/3 1404
Blasengrün V/1 330
Blauholz IV/3 1128

Blausäure IV/2 664, 667, 673, 1063, 1067, 1091; IV/3 1366, 1628, 1635; V/1 119, 656, 658; V/2 795; VI/1 239
Bleiholz V/2 702
Blitzpulver I 67
Blütentraganth IV/3 1404
Blutholz IV/3 1128
Blutkraut III 193
Blutnuss III 71
Blutwurz IV/2 884
Bockshornsamen IV/3 1233
Bohnenmehl IV/3 1560
Bohnenöl IV/3 1622
Bohnensamen IV/3 1633
Bohnenstroh IV/3 1558, 1636
Bokharagallen V/1 232
Bolusseife V/1 304
Bombay-Ebenholz V/3 1898
-Hanf V/1 454, 460
-Muskatnuss IV/1 15
Borke VII 38
Borneokampfer IV/1 11; V/1 534; VI/1 267
Borneokampferöl V/1 534
Borneol V/1 534; V/4 2277, 2279; VI/1 267
Borneotalg V/3 1896, V/1 534
Botanybay-Gummi II 278
Bouandjo-Butter V/1 501
Boxwood V/2 1527
Brahmkappern IV/3 1189
Brasilholz, Gelbes III 124
Brasilienholz IV/3 1127, 1128
Brasilianische China V/1 322
Brasilienrinde IV/3 1123
Brasilin IV/3 1127
Brasilnüsse V/2 768
Brasilnussöl V/2 768
Braugerste I 397
Brautkranz V/2 793
Brechnüsse V/1 120; V/3 1950
Brechweinstein V/1 415
Brechwurzel VI/1 196
Brechwurzel, Weisse V/1 586
Brennesselkraut III 140, 142
Brennesselwurzel III 140
Brignolen IV/2 1111, 1112
Brombeertee IV/2 773
Bruch-Eicheln I 156
Bruchkraut III 433
Brucin V/3 1950
Brunellenwasser V/4 2382
Brustbeeren, Rote V/1 323
Brustpulver V/2, 1289
Brusttee VI/2 679
Bruyèreholz V/3 1707
Bryonidin VI/1 319
Bryonin VI/1 319
Bryresin VI/1 319
Buazefaser V/1 87
Buccoblätter V/1 49
Buccoblätteröl V/1 49
Buchnüsschen III 99
Buchsbaumholz V/1 211
Buchweizengrütze III 208
Bulbocapnin IV/1 37
Bulbuli Dulcina II 10
„ Trasi II 10
Bulbus Coronae imperialis II 240
„ Scillae II 278
Bursin IV/1 366
Buteakinoharz IV/3 1626
Butterbohnen V/1 534
Butternüsse V/1 494
Buttersäure IV/3 1132
Butyrum Cacao V/1 492
Buxin V/1 210
Buxinidin V/1 210

C.

Cacaorot V/1 491
Cadinen I 108; V/2 945
Cadinol V/2 945
Calabarbohne IV/3 1624
Calabarin IV/3 1624
Calamin II 136
Calcitrapasäure VI/2 983
Calendulin VI/2 802
Caliaturholz IV/3 1496
Calico V/1 462
Callistephin VI/1 449
Callutannsäure V/3 1698
Calumbawurzel IV/1 15
Calungarinde V/1 79
Cambogiasäure V/1 501
Campecheholz IV/3 1128
Camphen V/1 67; V/2 784, 791
Camul-Öl V/1 125
Canadabalsam I 82, 108
Canadin III 453
Canaigrewurzel III 167
Canangaöl IV/1 14
Cantharidenpflaster V/1 124
Caparrosa III 266
Caprylsäure V/1 72
Capsaïcin V/4 2557
Caranna-Harz V/1 84
Carapa-Öl V/1 85
Carbo Belloci III 59
Ligni III 99
Populi III 59
„ Tiliae V/1 442
Cardamomen II 321
Cardobenediktenkraut VI/2 991
Cardol V/1 216
Caricae III 127
Caricin V/1 661
Carlina-Öl VI/2 820
Carotin I/XIX, XX; V/2 1525; VII 126 (siehe Vitamin)
Carpaïn V/1 661
Carthamin V/2 988
Carvacrol V/4 2283, 2286, 2306, 2308, 2332, 2507
Carvon V/2 1185, 1294; V/4 2336, 2352
Caryophyllen V/1 585; V/2 776, 778
Caryophylli V/2 778
Cascara Sagrada V/1 343
Cascarillin V/1 124
Cascarillrinde V/1 124
Cascarol V/1 343
Casimirin V/1 53
Cassia caryophyllata V/2 780
Castanhas-Öl VI/1 315
Cataplasma Sinapis IV/1 239
Catechu II 130; VI/1 196
Caules Dulcamarae V/4 2591
Caya IV/3 1647
Cay-Cay-Butter V/1 80
Ceanothin V/1 324
Cedratöl V/1 65
Cedro-Öl V/1 65
Celasteröl V/1 245
Celastrin V/1 245
Cera Japonica V/1 225
„ Myricae III 11
Chaerophyllin V/2 1000
Champagner V/1 401
Chara Caesaris IV/1 299
Charas III 135
Chartreuse-Likör V/2 1343, 1345
Chaulmogra-Samen V/1 656
Chebulae V/2 771
Chebulinsäure V/2 771
Cheiranthin IV/1 445
Cheirinin IV/1 445
Chelerythrin IV 1 22
Chelidonin IV/1 22
Chelidonsäure II 194; IV/1 22
Chenopodiumöl III 233
Chestnutoak III 106
Chicha I 180
Chichem IV/3 1131
Chicle (Chicli-Gummi) V/3 1897
Chimaphilin V/3 1595
Chinagrün V/1 330
Chinarinde VI/1 196
Chinovasäure V/1 51
Chinovin V/1 51
Chionanthin V/3 1906
Chionanthusrinde V/3 1906
Chios-Terpentin V/1 233
Chirata V/3 1974
Chiratin V/3 1954, 1974
Chironji-Öl V/1 215
Chlorogensäure V/2 925; V/3 1950
Chlorophyll VII 42
Cholesterin III 166; VII 42
Cholin II 136; IV/1 445; IV/3 1141, 1162, 1233, 1551; V/1 491; VI/1 513, 515
Christusdorn IV/2 936; IV/3 1128; V/1 136, 328; V/4 2563
Christwurzkraut III 598
Chromatophoren I/XIX, XXI
Chromoretine VII 42
Chrysanthemin VI/2 598
Chrysarobin IV/3 1496
Chrysoëriodictyol V/3 2119

Chrysophansäure III 166; IV/3 1131 V/1 343, 347
Chymase siehe Labferment
Cicuten V/2 1167
Cicutin V/2 1167
Cicutoxin V/2 1166
Cineol V/1 585; V/2 776, 784 ff.; V/4 2269, 2277, 2279; VI/2 628, 665
Cinnameïn IV/3 1144
Citral V/1 62; V/3 2235; V/4 2305
Citronellal V/1 62; V/4 2305
Citronellol IV/2 989; IV/3 1661, 1667
Citronnier-Öl V/1 67
Cnicin VI/2 983, 991
Cocablatt V/1 37; VII 185 Fig. 1229
Cocain V/1 37; VII 185 Fig. 1229
Coccionella V/2 685
Coccognin V/2 712
Coco IV/3 1454
Cocquelicot-Rot IV/1 31
Codëin IV/1 35
Coffeïn V/1 235, 307, 491, 492, 496; VII 206 Fig. 1254
Cognac V/1 414
Colchicin II 198
Colletin V/1 322
Collinsoniawurzel V/4 2272
Collinsoniin V/4 2272
Collodium cantharidatum V/1 462
„ elasticum V/1 462; VII 43
Colocynthin VI/1 314
Colombowurzel IV/1 16
Colophonium I 107
Columbamin IV/1 16
Columbin IV/1 16
Columbosäure IV/1 16
Condurangin V/3 2063
Condurangorinde V/3 2062
Condurit V/3 2063
Conglutin IV/3 1140, 1150
Coniceïn V/2 1084
Coniferin VI/2 1063
Coniin V/2 1084
Conserva Anthos V/4 2521
Cynorrhodi IV/2 1035
floris Betonicae V/4 2430
Consolicin V/3 2152, 2225
Consolidin V/3 2152, 2225
Convallamarin II 274
Convallarin II 274
Convicin IV/3 1551
Convolvulin V/3 2076
Conydrin V/2 1084
Copaiva-Balsam IV/3 1131
Coriamyrtin V/1 213
Cornus-Resinoid V/2 1527
Cornutin I 389
Coromandel-Ebenholz V/3 1898
Coronillin IV/3 1465, 1475
Cortex Ailanthi V/1 80
Ailanthi excelsae V/1 80
Ailanthi malabaricae V/1 80
Cortex Alstoniae V/3 2050
Angosturae Brasiliensis V/1 51
Angosturae verus V/1 51, 52
Aurantii fructus V/1 60
Calotropidis radicis V/3 2063
Canellae albae V/1 585
Cascarae amargae (Picramnia) V/1 80
Cascarillae V/1 124
Cassiae caryophyllatae V/2 780
Chionanthi virginicae radicis V/3 1905
Cinchonae VI/1 196
Cinnamomi chinensis IV/1 11
„ Zeylanici IV/1 11
Citri fructus V/1 67
Condurango V/3 2063
Crotonis V/1 124
Dita V/3 2050
Eluteriae V/1 124
Esenbeckiae febrifugae V/1 51
Esulae V/1 140
Esulae majoris V/1 152
Eucalypti V/2 785
Evonymi atropurpureae radicis V/1 247
Frangulae V/1 347
Fraxini V/3 1931
Fructus Aurantii V/1 60
Citri V/1 67
„ Granati V/2 766
Geoffroyae IV/3 1496
Genistae IV/3 1215
Gossypii radicis V/2 766
Granati V/2 766
Guajaci V/1 79
Hamamelidis IV/2 656
Hippocastani V/1 303
Linguae avis V/3 1931
Lophopetali toxici V/1 245
Malicorium V/2 766
Malicorrii V/2 766
Margosae V/1 85
Mezerei V/2 709, 712
Monesiae V/3 1897
Parameriae V/3 2050
Pereiro V/3 2050
Periplocae Graecae V/3 2064
Peruvianus spurius V/1 124
Plumierae acutifoliae V/3 2050
Pruni Padi IV/2 1067
Quebracho V/3 2050
Quercus III 107
Quillajae IV/2 663
radicis Gossypii V/1 462
„ Granati V/2 766
Rhamni catharticae V/1 335
Frangulae V/3 347
„ Purshianae V/1 343
Rhois aromaticae V/1 220
Salicis III 15
Sambuci VI/1 239
Sassafras IV/1 11
Sebipirae IV/3 1144
Cortex Simarubae V/1 79
Syzygii Jambolani V/2 780
Thuris IV/2 656
Thymiamatis IV/2 656
Tithymali V/1 140
Viburni VI/1 242
Viburni Opuli VI/1 245
Winteranus IV/1 14
„ „ verus V/1 585
Corydin IV/1 37
Corytuberin IV/1 37
Costus corticosus V/1 585
dulcis V/1 585
Cottonöl V/1 462
Cresson de savanne IV/1 87
Crocetin II 298; VII 126
Crotonöl V/1 124
Cumarin I 198, 201; IV/2 1072; IV/3 1237, 1497; VI/1 202
Cuminal V/2 1139
Curaçao V/1 60
Curare V/3 1951
Curarin V/3 1951
Curin V/3 1951
Currypulver V/2 1139; V/4 2557
Cyanidin IV/1 285; IV/2 979
Cyanin IV/2 979, 989; VI/2 964
Cyclamin V/2 1838, 1847
Cyder IV/2 741, 753
Cymol V/2 1073, 1139, 1168; V/4 2306, 2326
Cynoglossin V/3 2133, 2151
Cynorrhodon IV/2 989
Cyprische Salbe V/2 748
Cytisin IV/3 1141, 1145, 1162, 1186, 1189, 1192
Cystolith I/XXV

D.

Dahlin VI/1 476
Damascener Pflaumen V/3 1896
Damiana V/1 657
Dammarharz V/1 534
, Schwarzes V/1 84
Dammarolsäure V/1 534
Dammarresen V/1 534
Daphnetin V/2 713
Daphnin V/2 708, 712
Datiscetin V/1 663
Datiscin V/1 663
Datteln II 130
„ , Chinesische V/1 323
Daturin V/4 2551, 2615
Dax'n I 84
Deak-Nüsse V/1 87
Decoctum lignorum VI/2 827
Dekkan-Hanf V/1 454, 460
Delphinin III 486
Dextran III 216
Dextrose IV/2 648, 770, 774, 989, 1077; VII 44
Djambublätter V/2 776
Digitalin VI/1 66
Digitonin VI/1 66

Digitoxin VI/1 66
Dika-Brot V/1 80
„ -Butter V/1 80
Dillapiol V 1226
Dillöl V/2 1294
Diosmin V 49
Diosphenol V/1 49
Dioxybernsteinsäure IV/3 1130; V/1 415
Dipsacan VI/1 282
Dipsacotin VI/1 282
Diptamdostenöl V/4 2334
Distelöl VI/2 922
Disteltuch VI/2 922
Ditamin V/3 2050
Dita-Rinde V/3 2050
Dividivi IV/3 1127
Dogwood V/2 1527
Dorant V/4 2332
Dostenöl V/4 2332
Drachenblut, Westindisches IV/3 1496
Dragonöl VI/2 636
Driftnüsse IV/3 1587; V/1 500
Droserin IV/2 502
Drupae domesticae V/1 334
„ Juniperi I 108
Duboisin V/4 2558
Dulcamarin V/4 2591
Dwarf Ginseng V/2 912

E.

Ebenholz IV/3 1496
Ecgonin V/1 37
Echiin V/3 2192
Echinopsin VI/2 807
Echitamin V/3 2050
Edelgamanderkraut V/4 2529
Eibenkraut I 80
Eibischblätter V/1 469
Eichelkaffee III 108, 111
Eichengallen III 107
Eichenholz, Afrikanisches V/1 120
„ , Indisches V/2 767
Eichenrinde III 106, 107
Eichenrosen III 107; VII 47 Fig. 1079
Eierfrucht V/4 2587
Einbeerblätter II 277
Eisenhölzer IV/2 657; V/1 307; V/2 780; V/3 1897
Eisenholz, Ostindisches V/1 500
„ , Schwarzes V/3 1934
Eisenhut-Knollen III 493
Eiweisskörper VII 48
Eiserpeter II 62
Elefantenläuse, Ostindische V/1 218
Elemi-Harz V/1 83, 84
Elfenbein-Palme VII 157
Ellagensäure V/2, 771
Ellaggerbsäure IV/3 1127
Ellagsäure III 107; V/1 217, 547; V/2 766; V/3 1661
Ellagtannin V/1 82; V/3 1661
Emodin IV/3 1131
Emplastrum adhaesivum V/1 534
Cantharidum perpetuum V/1 124
„ Capsici V/4 2557
Emulsin IV/2 667, 692, 1056, 1091; VI/1 239
Endiviensalat VI/2 999
Engelwurz V/2 1343
Enzianschnaps V/3 1993
Enzianwurzel V/3 1992
Enzym siehe Ferment
Ephedrin VII 151 und 104 Fig. 1135
Equisetin I 53
Erbsen IV/3 1618
Erdbeerblättertee IV/2 901
Erdbeersirup IV/2 902
Erdbeerwein IV/2 901
Erdbirne IV/3 1625
Erdeicheln IV/3 1593
Erderbse IV/3 1624
Erdmäuse IV/3 1593
Erdmandeln II 10
Erdnüsse IV/3 1463; VII 60 Fig. 1096
Erdnuss-Öl IV/3 1464
Erdschellak II 278
Erechthites-Öl VI/2 704
Ericodin V/3 1698
Ericolin V/3 1592, 1595, 1626, 1629, 1698
Eriodictyol V/3 2118
Eriodonöl V/3 2119
Erucin IV/1 203
Erva da Collegio VI/1 408
Erva lenta IV/3 1505
Ervenmehl IV/3 1514
Erytaurin V/3 1970
Escariol VI/2 999
Esdragol VI/2 636
Eserin IV/3 1624
Essence de Fustet V/1 229
„ de rose IV/2 989
Essig V/1 414
Essigbakterien VII 50
Essigsäure V/1 414; VII 50
Esterasen VII 50
Esterharze VII 50
Estragon VI/2 636
Estragonöl VI/2 636
Ethrog-(Esrog-)Zitrone V/1 56, 65
Eucalyptol V/2 784
Eucalyptusblätter V/2 784
Eucalyptus-Manna V/2 782
Eucalyptusöl V/2 784
Eugenol V/1 585; V/2 776, 778
Euphorbium V/1 124
Euphorbon V/1 140
Evodin V/1 51
Evonsäure V/1 247
Evonymin V/1 247
Extractum Absinthii VI/2 655
Belladonnae V/4 2569
Calami II 136
Extractum Cardui Benedicti VI/2 991
Chionanthi fluidum V/3 1906
corticis Granati V/2 766
Erodii cicutarii aquosum spissum IV/3 1723
ferri pomati IV/2 753
Galegae IV/3 1390
Gentianae V/3 1993
Granati corticis V/2 766
Hyoscyami V/4 2577
Mezerei fluidum V/2 712
Pichi-Pichi V/4 2556
Pirolae umbellatae V/3 1596
Scordii dialysatum V/4 2532
Secalis cornuti fluidum I 389
Senecionis Jacobaeae fluidum VI/2 775
Stramonii V/4 2615
Strychni V/3 1951
Taraxaci VI/2 1089
Thymi saccharatum V/4 2308
Trifolii fibrini V/3 1960
Uvae ursi fluidum V/3 1661
Viburni opuli fluidum VI/1 245
Viburni prunifolii fluidum VI/1 241

F.

Fabae albae IV/3 1636
Calabarienses IV/3 1624
febrifugae V/3 1951
Mexicanae V/1 491
St. Ignatii V/3 1951
„ Tonka IV/3 1497
Fabianol V/4 2556
Färber-Scharte VI/2 928
Färber-Wau IV/1 489
Faradiol VI/2 679
Farina seminum Sinapis IV/1 238
Farnsamen I 18
Farnwurzel I 18
Fasertorf II 17
Faulbaumrinde V/1 347
„ , Falsche IV/2 1067
Feigen III 127
Feigenkaffee III 127
Fenchelholz IV/1 11
Fenchel-Öl V/2 1288
Fenchen V/2 784
Fenchon V/2 1288
Fermente VII 53
Feronia-Gummi V/1 54
Ferulasäure V/2 944
Fette VII 53
Fette Oele VII 53
Fieberklee V/3 1960
Filicin I 18
Filixgerbsäure I 18
Filixrot I 18
Filixsäure I 18
Filixwachs I 18
Fingerhutblätter VI/1 67
Firnis, Japanischer V/1 221
Firnis v. Martaban V/1 216

Fisetholz V/1 229
Fisetin V/1 217, 220, 229
Fistulae Levistici V/2 1353
Flachs V/1 23
Flachsfasern V/1 27
Flachsrost V/1 31
Flavedo V/1 60
Fliegenholz V/1 79
Flohsamen VI/1 179
Flores Acaciae (nostratis) IV 2 1105
Africani VI/1 535
Alismae VI/2 707
Althaeae V/1 469
Anethi V/2 1294
Anthos V/4 2521
Arnicae VI/2 707
Auriculae muris VI/2 1201
Balaustiorum V/2 766
Barbae caprae IV/2 673
Bellidis minoris VI/1 416
Borraginis V/3 2231
Buphthalmi vulgaris VI 1 538; VII 210 Fig. 1262
Calcatrippae (nicht Calcitrapae) III 488
Calendulae VI/2 802
„ silvestris VI/2 805
Carthami VI/2 989
Caryophylli V/2 778
Cassiae IV/3 1131
Chamomillae VI/2 583
„ Romanae VI/1 536
Chrysanthemi insecticidi VI/2 597
Cinae VI/2 665
Cisti foeminae V/1 558
Consolidae regalis III 488
Cyani VI/2 964
Farnesiani IV/3 1125
Filipendulae IV/2 975
Galii albi VI/1 207
Genistae IV/3 1189, 1215
Gnaphalii VI/1 457
Granati V/2 766
Hepaticae albae IV/2 639
Hyperici perforati V/1 530
Koso IV/2 666
Lagopi IV/3 1324
Lamii albi V/4 2447
Lavandulae V/4 2278
Lysimachiae luteae V 3 1861
Malvae V/1 484
arboreae V/1 465
„ hortensis V/1 465
Meliloti citrini IV/3 1237, 1245
„ coerulei IV/3 1235
Millefolii VI/2 572
Nagkascar V/1 500
Origani vulgaris V/4 2332
Paeoniae III 455
Paralyseos V/3 1753
Parnassiae IV/2 639
Pedis cati VI/1 457
Pilosellae VI/2 1201
Flores Pilosellae albae VI/1 457
Plantaginis montanae VI/2 707
Pneumonanthes V/3 2002
Primulae V/3 1753
Ptarmicae VI/2 565
Pyrethri VI/2 597
Reginae prati IV/2 974
Rhoeados IV/1 31
Rosae pallidae IV/2 1004
Sambuci VI/1 239
Spiraeae Ulmariae IV/2 974
Stoechados citrinae VI 1 472
Neapolitanae VI/1 472
Symphyti minimi VI/1 416
Tanaceti VI/2 622
Tiliae V/1 442
Trifolii albi IV/3 1306
Tunicae silvestris III 325
Tussilaginis VI/2 679
Urticae mortuae V/4 2447
Verbasci VI/1 8; VII 204 Fig. 1244
„ Violae odoratae V/1 652
Fluavil V/3 1896, 2063
Folia Adianti I 38
Althaeae V/1 469
Anthos V/4 2521
Arctostaphyli V/2 1661
Arnicae VI/2 707
Aurantii V/1 59
Barbae caprae IV/2 673
Belladonnae V/4 2568
Boldo VII 176
Bucco V/1 49
Caricae Papayae V/1 661
Cheken V/2 780
Chimaphilae V/3 1596
Citri vulgaris V/1 59
Cocae V/1 37; VII 185 Fig. 1229
Crithmi V/2 1225
Damianae V/1 657
Dauci sativi V/2 1526
Djamboe V/2 776
Digitalis VI/1 67
Eriodictyi V/3 2119
Eucalypti V/2 784
Farfarae VI/2 679
Foeniculi marini V/2 1225
Fraxini V/3 1932
Gaultheriae V/3 1620
Glasti IV/1 199
Gymnemae silvestris V/3 2063
Hamamelidis IV/2 656
Henna V/2 748
Hyoscyami V/4 2577
Jaborandi V/1 51
Isatidis IV/1 199
Juglandis III 9
Lauri IV/1 12
Laurocerasi IV/2 1063
Ledi palustris V/3 1626
Levistici V/2 1353
Linguae avis V/3 1932
Folia Malvae V/1 484
Mate V/1 235
Melissae V/4 2305
Menthae piperitae V/4 2355
Menyanthidis V/3 1960
Nerii V/3 2057
Nicotianae V/4 2621
Orthosiphonis staminei V/4 2270
Papavel vel Papari VI/1 315
Petasitidis VI/2 685
Petroselini V/2 1158
Pilocarpi V/1 51
Pinguiculae VI 1 157
Plantaginis maioris VI/1 179
Psidii pyriferi Guayava V/2 776
Rhoïs Toxicodendri V 1 221
Rosmarini V/4 2521
„ silvestris V 3 1626
Rubi fruticosi IV 2 773
Rutae V/1 72
Salviae V/4 2484
Sambuci VI/1 239
Scandicis Italicae V/2 1041
Scorpioides IV/3 1469
Sennae Alexandrinae IV/3 1131
Stramonii V/4 2615
„ nitrata V/4 2615
Toxicodendri V 1 221
Trifolii fibrini V/3 1960
Tussilaginis VI/2 679
Uvae ursi V/3 1661
Vitis-Idaeae V/3 1673
et flores Tanaceti VI/2 622
et stipites Rhododendri ferruginei V/3 1629
Folliculi Sennae IV/3 1131
Frangula-Emodin V/1 347
Frangulin V/1 347
Franzosenholz V/1 40
„ , Wildes V/3 1899
Frattpulver I 67
Frauenmantelkraut IV/2 969
Fraxin V/1 303; V/3 1931
Fritillarin II 240
Fructus Alkekengi V/4 2582
Amomi V/2 776
Anacardii Occidentalis V/1 216
„ Orientalis V/1 218
Anethi V/2 1293
Anisi stellati IV/1 14
Anisi (vulgaris) V/2 1211
Aurantii immaturus V/1 60
Belae V/1 54
Cannabis III 135
Capsici V/4 2557
Cardamomi II 321
Cardui Mariae VI/2 919
Carvi V/2 1184
Cassiae fistulae IV/3 1131
Cerasi acidi IV/2 1078
„ nigri IV/2 1078
Ceratoniae IV/3 1133
Cicutae terrestris V/2 1084

Fructus Cocculi IV/1 16
Colocynthidis VI/1 314
Conii V/2 1084
Cubebae III 209
Cumini V/2 1139
Cynorrhodi IV/2 1035
Cynosbati IV/2 989, 1035
Embeliae ribes V/3 1714
Foeniculi V/2 1288
„ aquatici V/2 1268
Jambolanae V/2 780
Jujubae V/1 323
Juniperi I 90, 108; VII 153
Fig. 1180
Lauri IV/1 12
Mei (athamantici) V/2 1303
Myrobalani V/2 771
Myrtilli V/3 1679
Papaveris immaturi IV/1 35
Petroselini V/2 1158
Phellandrii V/2 1268
Pimentae V/2 776
Pruni IV/2 1112
Rhamni catharticae V/1 334
Silai V/2 1297
Simulo IV/1 491
Sorbi IV/2 710
Tamarindi IV/3 1130
Terminaliae V/2 771
Tribuli lanuginosi V/1 42
Vanillae II 324
„ et semen Cardui Mariae VI/2 919
Fünffingerkrautwurzel IV/2 889
Fulwa-Butter V/3 1896
Fungus Melitensis V/2 698
Rosarum IV/2 1035; VII 107
Fig. 1140
Futtergräser I 172

G.

Gagelöl III 11
Galaktose III 216
Galbaresinotannol V/2 945
Galbanum V/2 945, 1356
Galgant II 321
Galimetta wood V/3 1897
Gallae Chinenses V/1 225
Halepenses III 107
Japonicae V/1 225
Levanticae III 107
„ Turcicae III 107
Galläpfel III 107
„ , Chinesische V/1 225
Galläpfelgerbsäure III 107
Gallerte VII 57
Galles d'Indes IV/3 1125
Gallmilben III 16
Gallotannin V/1 82; V/3 1661
Gallussäure II 198; III 107, 166; IV/2 502, 989; V/1 79, 217, 220, 399; V/2 767; V/3 1661
Gambazzo V/1 224
Gambia-Mahagoni V/1 85
Gambir-Catechu VI/1 196
Gambo-Hanf V/1 454, 460
Gambuzzo V/1 224
Ganja III 135
Gardal-Senf IV/1 207
Garouille III 106
Garrat IV/3 1125
Gaultherase IV/2 970; V/3 1620
Gaultherin IV/2 970, 975; V/3 1620
Gease IV/2 919
Geigenharz I 107; VII 58
Geïn IV/2 919
Gelbbeeren V/1 329, 337
„ , Chinesische IV/3 1145
Gelbholz V/1 244
Gelbwurzel II 321; III 453
Gelsemin V/3 1951
Gelseminin V/3 1951
Gelsemoidin V/3 1951
Gelsemiumwurzel V/3 1951
Gemmae Populi III 59
Gemskugeln V/2 1323
Genisteïn IV/3 1203
Gentiamarin V/3 1993
Gentianose V/3 1993
Gentiin V/3 1993
Gentioluteïn V/3 1955
Gentiopikrin V/3 1954, 1968, 1992
Gentiseïn V/3 1993
Gentisin V/3 1993
Geranienöl IV/3 1667
Geraniin IV/3 1660, 1679
Geraniol III 132; IV/2 989; IV/3 1661, 1667; V/2 1073; V/3 2235
Geranylacetat V/1 67
Geranyltiglinat IV/3 1667
Gerberlohe III 111
Gerbsäure III 111, 167, 195; IV/1 332; IV/2 502, 919; IV/3 1132; V/3 1673, 1932, 2050; VII 61
Gerbstoffe VII 61
Gerstenkörner I 396
Gerstenwasser IV/3 1453
Gewürznelken V/2 777
Gewürzweine V/1 401
Giftbohnen IV/3 1498
Giftsumachblätter V/1 221
Gilead-Balsam V/1 84
Ginseng-Wurzel V/2 912
Ginsterfaser IV/3 1188, 1215
Glandulae Lupuli III 132
„ Rottlerae V/1 125
Glaskraut III 143
Globulin IV/3 1140
Glukonasturtiin IV/1 320
Glycinin IV/3 1140
Glycyrrhizin IV/3 1453, 1454, 1464
Glykoside VII 62
Glyzerin VII 62
Goa-Pulver IV/3 1496
Goldrosentee VI/2 802
Goldwasser IV/2 502
Goma di Tuna V/2 684
Gomartharz V/1 84
Gombi-Pfeilgift V/3 2049
Gossypetin V/1 462
Gossypitrin V/1 463
Gossypium depuratum V 1 462
Gottesurteilbohne IV/3 1624
Grana moluccana V/1 124
Paradisi II 321
regia V/1 122
„ tiglium V/1 124
Granatapfelrinde V/2 766
Granatapfelwein V/2 765
Granatrinde V/2 766
Grasstree-Gum II 278
Gratte-cul IV/2 989
Graupen I 393, 395, 397
Grenadilla V/1 658
Grenadilleholz IV/3 1496
Grenadine V/2 765
Gries I 395, 397
Grieswurzel, Kanadische V/4 2272
Grünkern I 392
Grüntee V/1 495
Guafin V/2 776
Guajakharz V/1 40
Guajakholz V/1 40
Guajaköl V/1 40
Guajakol III 79, V/1 40
Guajakonsäure V/1 40
Guajaquilhüte II 131
Guaranin V/1 307
Guayava-Marmelade V/2 775
Guineapfeffer IV/1 15
Gum Benjamin V/3 1900
Gummi arabicum IV/3 1124
, Australisches IV/3 1124
„ , Ostindisches IV/3 1124; V/1 54
Laccae III 124
Mimosae IV/3 1124
„ Peucedani V/2 1374
Gummi-Arten VII 63; IV/2 1054
Gummigutt V/1 501
„ , Amerikanisches V/1 499
Gummiharz, Libysches V/2 1357
Gummiresina Ammoniacum V/2 945, 1356, 1357
Assa foetidae V/2 944
Bdellium V/1 84
Euphorbium V/1 124
Galbanum V/2 945
gutti V/1 501
Hederae V/2 924
Myrrha V/1 83
Opopanax V/2 1362
„ Sagapenum V/2 946
Gummiharze VII 63
Gurjunbalsam V/1 534
Guru-Nüsse V/1 492
Gutta V/3 1896, 2063
Guttan V/3 1896
Guttapercha V/3 1895 f., 2063; VII 63
Gutti V/1 501
Gymnemasäure V/3 2063
Gynocardin V/1 656

H.

Haarholz V/1 335
Haarlemer Balsam V/1 30
Haematoxylin IV/3 1128
Haferschleim I 254
Hagebutte IV/2 976, 989
Hanf, Indischer III 136
Hanfgras II 317
Hanföl III 135
Hanfsame III 135
Harmalarot V/1 41
Harmalin V/1 41
Harmin V/1 41
Hartriegelöl V/2 1547
Harze VII 65
Haschisch III 135
Haselnüsse III 73; VII 85 Fig. 1118
, Amerikanische III 74
„ , Japanische V/1 307
Haselnusswürstchen III 72; VII Fig. 1107
Haselwurz III 162
Hauhechelwurzel IV/3 1227
Hedeomol V/4 2281
Hederagerbsäure V/2 925
Hederidin V/2 925
Hederin V/2 925
Heidehonig V/3 1698
Heidelbeeren V/3 1679
Heidelbeergeist V/3 1679
Heidelbeerwein V/3 1679
Heilzwiebel II 250
Helenin VI/1 476
Helleboreïn III 464
Helleborin III 464
Hennah V/2 747
Hennequen II 317
Heraclin V/2 1453
Herba Abrotani VI/2 635
„ montani VI/2 673
Absinthii VI/2 655
Acanthi Germanici VI/2 991
Acetosa Romana III 185
Acetosellae IV/3 1653
Achilleae moschatae VI/2 557
Adonidis III 598
Aegyptiaca IV/3 1235
Agrimoniae IV/2 935
Alchemillae vulgaris IV/2 969
Alliariae IV/1 151
Alsines III 353
„ bacciferae III 308
Anagallidis V/3 1871
Anethi V/2 1294
Angelicae V/2 1343
Anserinae IV/2 891
Antirrhini caerulei V/3 2002
Apii V/2 1145
„ montani V/2 1389
Argentinae IV/2 891
Artemisiae VI/2 640
Asclepiadis curassavicae V/3 2063
Asperuginis V/3 2138
Herba Asperulae odoratae VI/1 202
Asteris Attici VI/1 429
Athanasiae VI/2 622
Atriplicis III 222
Auriculae leporis V/2 1131
„ muris VI/2 1201
Ballotae V/4 2402
Barbae Caprae IV/2 974
Barbaraeae IV/1 303
Bellidis majoris VI/2 613
minoris VI/1 416
„ pratensis VI/2 613
Berulae V/2 1219
Betonicae V/4 2430
Boni Henrici III 221
Borraginis V/3 2231
Botryos V/4 2533
Brancae ursinae Germanicae V/2 1453
Brassicae marinae V/3 2085
Buglossi agrestis V/3 2196
Bupleuri V/2 1131
Bursae pastoris IV/1 366
Cacti grandiflori V/2 684
Calcatrippae (nicht Calcitrapae) III 488
Calendulae silvestris VI/2 805
Canchalaguae V/3 1971
Cannabis aquaticae VI/1 402, 518
Cannabis indicae III 136
Capilli Veneris I 38
Cardiaca V/4 2393
Cardui Benedicti VI/2 991
Centaurii lutei V/3 1968
„ minoris V/3 1970
Centumnodii III 193
Centumorbiae V/3 1854
Cerefolii Germanici V/2 1029
„ Hispanici V/2 1045
Chaerophylli V/2 1029
Chamaecisti vulgaris V/1 571
Chamaedrys V/4 2529
Chamaepityos V/4 2541
Chelidonii IV/1 22
„ minoris III 544
Chenopodii III 233
Chimaphilae V/3 1577
Chiratae Indicae V/3 1974
Chrysosplenii IV/2 636
Cicutae aquaticae V/2 1167
(maioris) V/2 1084
minoris V/2 1275
terrestris V/2 1084
„ virosae V/2 1167
Cicutariae V/2 1022
„ odoratae V/2 1045
Cisti foeminae V/1 558
Cnici sancti VI/2 991
Cochleariae IV/1 139
Columbariae V/3 2242
Conii (maculati) V/2 1084
Consolidae regalis III 488
„ Sarracenicae VI/1 411; VI/2 762
Herba Convallariae II 274
Convolvuli V/3 2089
Conyzae caeruleae VI/1 438
maioris VI/1 486
mediae VI/1 488
„ minoris VI/1 438, 489
Cornu Cervini VI/1 189
Coronopi IV/1 95; VI/1 189
Costae bovis V/2 1131
Cotyledonis aquaticae V/2 955
Crassulae maioris IV/2 525
Crithmi V/2 1225
Cucubali III 308
Cunigundae VI/1 402
Cynamori V/2 698
Cynapii V/2 1275
Cynocrambes V/1 133
Cynoglossi minoris V/3 2140
Diapensiae V/2 959
Droserae IV/2 502
Echii V/3 2196
Empetri V/3 1607
Equiseti maioris I 52
„ minoris I 52
Ericae V/3 1698
Erodii cicutarii IV/3 1723
Eryngii V/2 991
Erysimi IV/1 165
Eschscholtziae IV/1 19
Esulae V/1 140
„ rotundifoliae V/1 140
Eupatoriae VI/1 402
Euphorbiae Peplis V/1 140
Euphrasiae VI/1 84
Fabianae imbricatae V/4 2556
Falcariae V/2 1179
febrifuga VI/2 619
Filipendulae IV/2 975
„ aquaticae V/2 1257
Flammulae Jovis III 509
Foeniculi V/2 1289
Fraxini V/3 1932
Galegae IV/3 1389
Galeopsidis V/4 2463
Gales III 11
Galii albi VI/1 207
„ Aparinis VI/1 207; VII 75 Fig. 1111
„ lutei VI/1 207
Gallitrichi V/4 2491
Gayubae V/3 1661
Genipi VI/2 557
Genistae IV/3 1189
Hispanicae IV/3 1215
„ tinctoriae IV/3 1203
Geranii IV/3 1715
Glasti IV/1 199
Glycyrrhizae silvestris IV/3 1422
Grindeliae VI/1 448
Hederae terrestris V/4 2377
Helianthemi V/1 571
Hepaticae III 530
albae IV/2 639

Herba Hepaticae aureae IV/2 636
Herniariae III 433
Hesperidis IV/1 468
Hormini sativi V/4 2491
Hydrocotylis Asiaticae V/2 955
Hydrolapathi III 179
Hyoscyami mutici V/4 2574
Hyperici perforati V/1 530
Hyssopi V/4 2360
Jacobaeae VI/2 775
Imperatoriae V/2 1400
Intybi angusti VI/2 1125
Inulae Germanicae VI/1 479
Isatidis IV/1 199
Iva moschatae VI/2 557
Lactucae virosae VI/2 1125
Lagopi IV/3 1324
Lamii sylvatici foetidi V/4 2422
Ledi palustris V/3 1626
Lentibulariae VI/1 166
Lepidii IV/1 90
linguae cervinae I 34
Lini cathartici V/1 8
Lippiae mexicanae V/3 1236
Lobeliae VI/1 392
Lithospermi repentis V/3 2156
Loti odorati IV/3 1235
Lujulae IV/3 1653
Lycopi Virginici V/4 2385
Lysimachiae luteae V/3 1861
Majoranae Germanicae V/4 2335
Mari veri V/4 2524
Marrubii V/4 2396
„ aquatici V/4 2385, 2388
Matricariae VI/2 619
„ vera aromatica VI/2 619
Meliloti citrini IV/3 1237, 1245
„ coerulei IV/3 1235
Mercurialis V/1 129
„ montanae V/1 133
Millefolii VI/2 572
Monardae V/4 2507
morsus gallinae III 353
moschata IV/3 1724, 1725
Myrrhidis majoris V/2 1045
Myrti Brabantini III 11
Nasturtii aquatici IV/1 321
hortensis IV/1 82
majoris amari IV/1 350
petraei IV/2 636
„ verrucosi IV/1 95
Nummulariae V/3 1854
Oenanthes V/2 1257
Oreoselini V/2 1389
Origani vulgaris V/4 2332
Oxalidis IV/3 1653
Papaveris corniculati IV/1 24
Parietariae III 143
Parnassiae IV/2 639
Parthenii VI/2 619
Pastinacae aquaticae V/2 1222
Pentaphylli aquatici IV/2 809
Perfoliatae V/2 1108
Herba Petroselini V/2 1158
Phyllitidis I 34
Pichi-Pichi V/4 2556
Pimpinellae V/2 1208
„ italicae minoris IV/2 941
Pilosellae VI/2 1201
Pirolae chloranthae V/3 1583
rotundifoliae V/3 1589
„ secundae V/3 1577
Plantaginis maioris VI/1 179
Podagrariae V/2 1215
Polii montani V/4 2527
Polygalae V/1 112
Polygoni III 193
Prasii V/4 2396
Prunellae V/4 2382
Ptarmicae VI/2 565
Pulegii V/4 2341
Pulicariae VI/1 489
Pulmonariae V/3 2216
Pulsatillae nigricantis III 539
Ranunculi acris III 562
aquatici III 553
palustris III 553
„ pratensis III 562
Reginae prati IV/2 974
Rhoïs radicantis V/1 221
„ Toxicodendri V/1 221
Rorellae IV/2 502
Roris maris V/4 2521
„ solis IV/2 502
Rosmarini silvestris V/3 1626
Rumicis aquatici III 179
Rutae V/1 72
„ caprariae IV/3 1389
Sabinae I 93, 108
Salviae V/4 2484
Sanctae Barbarae IV/1 299
Sancti Petri V/2 1225
sanguinalis III 193; V/3 2242
Sanguinariae III 193; IV/1 367
Saniculae V/2 959
Santa V/3 2118
Saponariae III 345
Saturejae V/4 2284
Scabiosae VI/1 294
Sclareae V/4 2491
Scolopendrii I 34
Scordii vulgaris V/4 2532
Sedi minoris IV/2 535
Senecionis Jacobaeae VI/2 775
„ vulgaris VI/2 790
Serpylli V/4 2326; VII 200 1241
Serratulae VI/2 928
Sideritis V/4 2413
Sii V/2 1219
„ palustris V/2 1222
Silai V/2 1297
Soldanellae V/3 2085
Sphondylii V/2 1453
Spilanthis oleraceae VI/ 528
Suedensis VI/1 488
Herba Symphyti minimi VI/1 416
Tanaceti VI/2 622
Taxi I 80
Telephii IV/2 525
Tertianariae V/4 2511
Teucrii scordii V/4 2532
Thymi V/4 2308
Tormentillae IV/2 884
Trifolii acetosi IV/3 1653
„ bituminosi IV/3 1385
Urticae III 140
„ minoris III 142
Valerianae Graecae V/3 2116
Verbenae V/3 2242
Verbesinae VI/1 518
Veronicae VI/1 59
Violae Damascenae IV/1 468
matronalis IV/1 468
„ tricoloris V/1 605
Viperini V/3 2196
Virgae aureae VI/1 411
Vulvariae III 222
Viscaginis bacciferi III 308
„ Xanthii spinosi VI/1 503
Herniariasäure III 433
Herniarin III 433
Hesperidenäpfel IV/2 691
Hesperidin V/1 60
Hesperidinsäure V/1 60
Hetschepetsch IV/2 989
Hexenmehl I 67
Hexensalbe V/4 2569, 2578
Hexosen VII 67
Hickory-Holz V/3 1932
„ -Nüsse III 7
Himbeeren IV/2 770
Himbeersirup IV/2 770
Himmelbrandtee VI/1 8
Himmelsbrot V/3 1925
Hips IV/2 989
Hirse I 188
Hirsebrei I 188
Hirtentäschelkraut IV/1 366
Holzessig III 111
Holzkohle III 99, 111
Holzpflaster V/2 786
Holztee VI/2 827
Homo-Eriodictyol V/3 2119
Homovitexin V/3 1237
Hondurasrinde V/1 80
Hondurassarsaparille II 280
Honigbeeren V/1 307
Hopeïn III 132
Hopfen III 130
Hopfenersatz V/3 1626, 1960
Hopfenmehl III 132
Hopfensalat III 132
Hottentottenbrot II 281
Huile d'amande amère IV/2 1090
de marmotte (Pfirsich) IV/2 1096
de marmotte (Aprikose) IV/2 1100
russe III 79

Humulen III 132
Hundszahnwurzel I 264
Hungerbrote III 227
Hydrastin III 453
Hydrocarotin V/2 1343
Hydrochinon V/3 1661
Hydrojuglon III 10
Hyoscyamin V/4 2551, 2568, 2572, 2574
Hyowaharz V/1 84
Hypogaeasäure IV/3 1464
Hypoquebrachin V/3 2050

I.

Idaeïn V/3 1673
Igagursäure V/3 1950
Ignatiusbohnen V/3 1951
Iktrogen IV/3 1151, 1158
Ilang-Ilang-Öl IV/1 15
Indienne V/1 462
Indigo IV/1 70, 199; IV/3 1146, 1383, 1384; V/3 2056; VI/1 403
Indigoblau IV/1 198; IV/3 1383
Indikan IV/3 1383, 1398
Indol V/3 1906
Indoxyl IV/1 199; IV/3 1383
Infusum Secalis cornuti I 389
Ingwer II 321
Inklusen IV/3 1454
Insektenpulver VI/2 597 f., 619
Insektenwachs, Chinesisches V/3 1944
Inulin I/XXII; VI/1 476, 515, 531; VI/2 673, 685, 996, 1064, 1089
Invertzucker IV/2 650, 664, 741, 897, 989, 1084
Ipecacuanha V/1 586
Ipuranol V/3 1943, 1951
Iridin II 285
Irisöl II 285
Iron II 285; V/1 590
Isatan IV/1 199
Isomethylpelletierin V/2 766
Isopelletierin V/2 766
Isorhamnetin IV/1 445
Isovaleriansäure VI/1 267; VII 103
Ivabitter VI/2 557
Ivaïn VI/2 557
Ivakraut VI/2 557
Ivaöl VI/2 557

J.

Jaborandiblätter V/1 51
Jabordin V/1 51
Jaborin V/1 51
Jalapa, Falsche III 266
Jalapawurzel V/3 2076
Jalapin V/3 2080
Jamaika-Eisenholz V/1 47
Jamaika-Quassie V/1 79
Jams V/1 62
Japanerde IV/3 1124
Japankampfer IV/1 11
Japanknollen V/4 2419
Japanlack V/1 221
Japanwachs V/1 222, 225
Jasminöl V/3 1906
Jasminwurzel, Gelbe V/3 1951
Jasmon V/3 1906
Jatrorrhizin IV/1 16
Java-Jute V/1 460
Javatee V/4 2270
Jervin II 194
Jesuitentee III 233
Johannisbrot IV/3 1132
Jonon V/1 590
Juchtenöl III 79
Juckbohnen IV/3 1626
Judascaroben IV/3 1132
Judenweihrauch V/3 1900
Juglandin III 9
Juglon III 10
Jujuben V/1 323
Juniperin I 108
Jute V/1 428

K

Siehe auch unter C.

Kadam-Öl VI/1 316
Kade-Öl I 89, 105, 108
Känguruh-Wein V/1 362
Kaffee VI/1 196; VII 206 Fig. 1254
Kaffeersatzstoffe I 384, 397; II 263; III 105, 111, 127; IV/2 1083, 1100; IV/3 1129, 1133, 1154, 1160, 1233, 1405, 1411, 1464, 1500, 1505, 1606; V/1 148, 443, V/2 892, 1224; V/3 1674; VI/1 207, 403; VI/2 995, 1030, 1043, 1064, 1089
Kaffeegerbsäure V/3 1950
Kaffeetraganth IV/3 1405
Kaftanhonig IV/3 1133
Kajeputöl V/2 787
Kaisertee IV/2 925
Kakao V/1 491
Kakaobohnen V/1 490
Kakaobutter V/1 492
Kakaoersatz IV/3 1464
Kaki-Pflaume V/3 1898
Kaktusfeigen V/2 685
Kakung-Nüsse V/1 120
Kalabarbohne IV/3 1624
Kalanutholz V/1 492
Kalisalze VII 73
Kalliandra-Rinde V/3 2063
Kalmusöl II 136
Kalmuswurzel II 136
Kalumbawurzel IV/1 16
Kamala V/1 125
Kamillenöl VI/2 582, 584
Kamillentee VI/2 583, 587
Kampfer IV/1 11; V/1 534
Kanadabalsam I 82, 108
Kananga-Essenz IV/2 693
Kanarienfutter I 197
Kanell-Rinde V/1 585
Kanya-Butter V/1 502
Kapgummi IV/3 1124
Kap-Mahagoni V/1 85
Kapok V/1 489
Kappern IV/1 490
, Deutsche IV 491; IV/3 1189
Kardobenediktenkraut VI 2 991
Kariben-Eisenholz V 1 47
Karlsdistelwurz VI 2 820
Karmelitergeist V/4 2305
Karminsäure V/2 685
Kartoffelbranntwein V/4 2603
Kartoffelsago V/4 2603
Kartoffelstärke V/4 2603
Kaschu-Nüsse V/1 218
Kaschuwein V/1 215
Kassiablüten-Öl IV/3 1125
Kastanien III 105; VII 27 Fig. 1050
Kastaniengerbsäure V 1 303
Kastanienmehl V/1 304
Kastanien-Öl V/1 304
Kastormehl IV/3 1560
Katappaöl V/2 771
Katechin IV/3 1124, 1496; V 1 307
Katechingerbsäure IV/3 1124
Katharinenpflaumen IV/2 1112
Kathin V/1 245
Katjangöl IV/3 1464
Kat-Tee V/1 244
Kattun V/1 462
Katzenminzenöl V/4 2370
Katzenminzenwurzel V/4 2370
Kaugummi V/3 1897
Kaurikopal V/1 534
Kautabak V/4 2619
Kautschuk III 123, 124, 145; V/1 118; V/3 2049; VI/1 583; VI/2 906, 1130
Kerguelen-Kohl IV 1 70
Kermesbeere III 267
Kernrot V/1 584
Ketianoel V/3 1896
Kewiri-Nüsse V/1 120
Khussambinüsse V/1 307
Kiefernharz I 98
Kienholz I 98; VII 75
Kienöl I 98
Kieselsäure I 52; V/4 2458
Kino Amboinense IV/3 1496
„ Malabaricum IV/3 1496
Kinogerbsäure IV/3 1496
Kinoharz IV/3 1496
, Bengalisches IV/3 1626
Ostindisches IV/3 1496
„ , Westafrikanisches IV/3 1496
Kirschensorten IV/2 1080
Kirschgummi IV/2 1054
Kirschholz, Amerikanisches IV/2 1061
Kirschlorbeerblätter IV/2 1063
Kirschlorbeeröl IV/2 1063
Kirschlorbeerwasser IV/2 1063
Kirschwasser IV/2 1083
Ki-Urushi V/1 221

Klebreis I 195
Kleeheu IV/3 1278, 1302, 1306, 1352 f., 1494
Kleesalz IV/3 1653
Klettensamenöl VI/2 827
Klettenwurzel VI/2 826
Knoppern III 107
Koagulasen VII 76
Kölnischwasser V/4 2521
Koffeïn V/1 491, 496
Kohlenhydrate VII 77
Kohombafett V/1 85
Kokain V/1 37; VII 185 Fig. 1229
Koka-Kauen V/1 37
Kokkelskörner IV/1 16
Kokosnuss II 130
Kokumbutter V/1 502
Kola-Nüsse V/1 492
Kollodium V/1 462
Kolloide VII 77
Kolophonium I 99, 107
Kopaiva-Balsam IV/3 1131
Kopal IV/3 1131; VII 78
Korallenholz IV/3 1626
Kordofan-Gummi IV/3 1124
Korianderöl V/2 1073
Koriandersamen V/2 1072
Korinthen V/1 414
Kork I XXV, XXXI; III 106
Korkholz IV/3 1462
Kosidin IV/2 666
Kosmosfaser V/1 28
Kosoblüten IV/2 666
Kosoin IV/2 666
Kosotoxin IV/2 666
Koton Oel V/1 462
Krähenaugen V/3 1950
Kräuterbüschel I 113; V/2 814
Kräuterkäse IV/3 1235
Kräuterkissen I 198
Kräutersuppen V/2 1029, 1215
Krapp VI/1 232
Krauseminzöl V/4 2336, 2352
Krebao-Samen V/1 656
Kresol III 79
Kristalloide VII 78
Krotonöl V/1 124
Krummholz-Öl I 101, 108
Kuba-Bast V/1 454, 460
Kubeben III 209
Kümmelöl V/2 1185
Kümmelspiritus V/2 1185
Kumarin I 198, 201; IV/2 1072; IV/3 1237, 1497; VI/1 202
Kundibaum-Oel V/1 85
Kusanza-Knollen III 493
Kuteragummi IV/3 1405
Kuth IV/3 1124
Kwass V/3 1689
Kyphi IV/3 1233

L.

Labferment VII 79
Lack, Japanischer V/1 221
Lackmus V/1 120
Lactucarium VI/2 1124
Lactucasäure VI/2 1124
Lactucerin VI/2 1124
Lactucin VI/2 1122, 1124
Lactucon VI/2 1124
Ladanumharz V/1 554
Lärchenharz I 95
Läusekörner III 486
Laevulose III 80; IV/2 648, 770, 774, 1077; V/1 216
Lagerstaudenöl I 101
Lakritzensaft IV/3 1454
Lambertsnuss III 71
Lamy-Nüsse V/1 502
Lappula hepatica IV/2 935
Laretia-Harze V/2 946
Laserpitiin V/2 1481
Lathyrin IV/3 1606
Latschenöl I 108
Laurineenkampfer IV/1 11
Lavendelblüten V/4 2278
Lavendelöl V/4 2278
Lebensholz V/2 780
Leberkraut III 530
Lecithin IV/3 1141
Lederholz V/2 702
Leditannsäure V/3 1626
Ledixanthin V/3 1626
Ledumkampfer V/3 1626
Legumin IV/3 1140
Leindotteröl IV/1 371
Leinkuchen V/1 29
Leinöl V/1 30
Leinsamen V/1 28, 35
Lepidin IV/1 75
Leucin IV/3 1141
Leucoplasten VII 80
Libidibi IV/3 1127
Liebstockwurzel V/2 1354
Lignocerinsäure IV/3 1464
Lignum Acocantherae V/3 2050
Agallochin V/1 120
Aloës V/1 120; V/2 700
benedictum V/1 40
Campechianum IV/3 1128
colubrinum V/3 1951
Guajaci V/1 40
„ Patavini V/3 1899
Haematoxyli IV/3 1128
Juniperi I 90, 108
Nyssae V/2 770
Pichi-Pichi V/4 2556
Quassiae Jamaicense V/1 79
„ Surinamense V/1 79
Rhodii V/3 2079
sanctum V/1 40
Santali album III 151
Sassafras IV/1 11
Tupelo V/2 770
„ vitae V/1 40; V/2 780
Ligustron V/3 1949
Lilienblüten II 235
Limettensaft V/1 67
Limettoel V/1 67
Limonade V/1 66 Anm.
Limone, Wilde IV/1 5
Limonen V/1 62; V/2 1185; V/3 2235
Linalool III 132; V/1 62; V/2 1073; V/3 1906; V/4 2269, 2277, 2279
Linamarin V/1 29
Lindenbast V/1 431
Lindenblüten V/1 442
Lindenblütenöl V/1 442
Lindenholzöl V/1 436
Linin V/1 8
Linsen IV/3 1505
Linsengallen III 58, 107
Linsengericht IV/3 1504
Litchipflaumen V/1 307
Lithospermin V/3 2125.
Lobelin VI/1 393
Lodhrinde V/3 1900
Löffelkraut IV/1 139
Löffelkrautgeist IV/1 139
Löffelkrautöl IV/1 139
Löwenzahnwein VI/2 1090
Löwenzahnwurzel VI/2 1089
Loganin V/3 1950
Lohrinde III 111
Lokansäure V/1 330
Lokao V/1 330
Lokaonsäure V/1 330
Lophopetalin V/1 245
Lophophorin V/2 684
Lorbeeröl IV/1 12
Lotase IV/3 1366
Lotoflavin IV/3 1366
Lotusin IV/3 1366
Loxopterygin V/1 217
Lungenkraut V/3 2216
Lupanin IV/3 1151
Lupinin IV/3 1151
Lupinotoxin IV/3 1151
Lupulin III 132
Luteolin IV/3 1203
Lycin V/4 2564
Lycopin V/4 2388
Lycopodium I 67

M.

Macaknolle IV/3 1729
Macassar-Oel IV/1 15; V/1 307
Macis IV/1 15
Madagaskar-Bohne IV/3 1625
Madar-Guttapercha V/3 2063
Madi-Oel VI/1 533
Mädesüsstee IV/1 974
Maggiwürze V/2 1353
Maguefaser II 317
Mahagoniholz V/1 85; V/2 786
, Japanisches V/1 324
Indisches V/1 85, 500
„ , Weisses V/1 216
Mahalebsamen IV/2 1072
Mahwa-Butter V/3 1896
Majalin II 274

Maiglöckchenkraut II 274; VII 102 Fig. 1132
Majorankraut V/4 2335
Majoran-Oel V/4 2335
Maisöl I 180
Maitrank I 198; VI/1 202
Makarbukett I 189, 292
Makassar-Oel IV/1 15; V/1 307
Malabartalg V/1 534
Malletrinde V/2 786
Malonsäure VII 103
Malteserschwamm III 160; V/2 698
Maltose VII 82
Malukangfett V/1 90
Malvidin V/1 484
Malz I 397
Mammi-Aepfel V/1 500
Manacawurzel V/4 2555
Manaceïn V/4 2555
Manacin V/4 2555
Mandarinenöl V/1 59
Mandelkleie IV/2 1088, 1091
Mandelmilch IV/2 1090
Mandeln IV/2 1090
Mandelöl IV/2 1056, 1090
„ , Süsses IV/2 1095
Mandelseife IV/2 1091
Mandrake IV/1 5
Mandubierbse IV/3 1624
Manga robeira V/2 769
Mangobutter V/1 215
Mangopflaumen V/1 215 f.
Mangrove-Rinde V/2 769
Manihot V/1 119
Manila-Elemi V/1 84
Manilakopal V/1 534
Maniok V/1 119
Manna IV/3 1131, 1405; V/1 547; V/3 1925; VII 198 Fig. 1238
, Persisches IV/3 1462
, Sinaitisches V/1 547
Novae Hollandiae V/2 782
„ von Briançon I 95
Manneotetrose V/3 1925; V/4 2419
Manninotriose V/3 1925
Mannit IV/3 1453; V/1 585; V/3 1906, 1916, 1925, 1931, 1949; VII 82
Mannogalaktan IV/3 1129
Maoholz V/1 52
Maracaibo-Rinde V/1 79
Maraschino IV/2 1075, 1078
Marienblatt VI/2 599
Marienkörner VI/2 919
Marmelade IV/2 691 Anm.
Marmottöl IV/2 1096
Maronen III 105
Marrubiin V/4 2396
Marzipan IV/2 1095, 1100
Massaranduha-Holz V/3 1897
Masticinsäure V/1 231
Masticolsäure V/1 231
Masticonsäure V/1 231
Mastiki-Branntwein V/1 231
Mastix V/1 231
Mastix, Amerikanischer V/1 217
Levantina V/1 231
„ vulgaris V/1 231
Mastuerzo IV/1 87
Mate-Tee V/1 235
Maulbeeren III 130
Maulbeersirup III 130
Maulbeerwein III 130
Mauritiushanf II 317
May apple IV/1 5
Medicagol IV/3 1263
Medizinweine V/1 401
Meerbälle VII 110
Meerbohnen IV/3 1127
Meerkohlkraut V/3 2085
Meerzwiebel II 278
Meisterwurzel V/2 1400
Mekka-Balsam V/1 84
Mekka-Senna IV/3 1131; V/3 2063
Mekonin IV/1 35
Mekonsäure IV/1 35
Meleguetta IV/1 15
Meleguetta-Pfeffer II 321; IV/1 15
Melezitose I 95
Melia-Oel V/1 85
Meliatin V/3 1960
Melilotol IV/3 1237
Melilotsäure IV/3 1237
Melin IV/3 1145
Melissenöl V/4 2305
Melissenwasser V/4 2305
Melitose V/2 782
Meni-Oel V/1 494
Menthol V/4 2336, 2355
Menthon V/4 2336, 2355
Menyanthin V/3 1954, 1960
Mé-Oel V/3 1896
Mercurius vegetabilis V/4 2555
Merrettich IV/1 307
Mescalin V/2 684
Meskal II 318
Mesquite-Gummi IV/3 1126
Methoxyvitexin IV/3 1189
Methylchavicol V/1 54
Methylconiin V/2 1084
Methylnonylketon V/1 72
Methylsalicylat IV/2 931; V/1 586, 589; V/2 1602, 1620
Mezereïnsäure V/2 712
Mezkalbottom V/2 684
Milchsäure VII 84
Minjak-Kenangan-Oel IV/1 15
Miso-Butter IV/3 1622
Mkanifett V/1 501
Möhrensirup V/2 1526
Mönchspfefferöl V/3 2237
Mogdad-Kaffee IV/3 1131
Mohnkuchen IV/1 36
Mohnöl IV/1 35
Mohnsamen IV/1 36
Mohrenpfeffer IV/1 15
Molleharz V/1 217
Mombinpflaumen V/1 216
Mombutti-Pfeilgift V/2 772
Momeka III 135
Monardenöl V/4 2507
Monesiarinde V/3 1897
Morphin IV/1 35
Moschatin VI/2 557, 572
Moschuswurzel V/2 943
Moses' Bitterwasser V/1 41
Mostrich IV/1 239
Mottenkraut V/3 1626
Mucilago seminum cydoniorum IV/2 692
Mudarin V/3 2063
Muskatblüte IV/1 15
Muskatbutter IV/1 15
Muskatellersalbeiöl V/4 2491
Muskatnuss IV/1 15; I/CLV Fig. 296
Muskatöl IV/1 15
Musseline V/1 462
Muttergummi V/2 945
Mutterkorn I 389
Mutternelken V/2 779
Myrcen III 132
Myricetin V/1 224, 228, 231; V/3 1661
Myrobalanen V/1 120; V/2 771
Myrobalanenöl V/2 772
Myrobalani V/2 771
„ Emblicae V/1 120
Myrosin IV/1 57, 75, 120, 207, 238, 320, 445
Myrrha V/1 83 f.
Myrrhin V/1 84
Myrtenöl V/2 791
Myrtensamenöl V/2 791
Myrtenwasser V/2 793
Myrtillin V/3 1679

N.

Nafaöl V/1 60
Nagasholz V/1 500
Nangel-Nüsse V/1 500
Nanking V/1 462
Naraskerne VI/1 315
Narcitin II 314
Narde, Echte VI/1 268
Nardupflanzen I 48
Narzissenöl II 313
Narzissenzwiebel II 313
Ndilo-Oel V/1 500
Neb-Neb IV/3 1125
Negerkaffee IV/3 1131
Negerpfeffer IV/1 15
Nektar I/CXXI
Nelken V/2 777
Nelkenöl V/2 778; V/4 2276
Nelkenpfeffer V/2 776
Nelkenrinde V/2 780
Nelkenwurzel IV/2 919
Nelkenzimt V/2 780
Nepeta-Öl V/4 2370
Nerianthin V/3 2057
Neriin V/3 2057
Neroliöl V/1 60

Neroliöl, Chinesisches V/1 58
Nesselgarn III 140
Nesseltuch V/1 462
Nessin V/2 746
Neuguinea-Muskatnuss IV/1 15
Neu-Yersey-Tee V/1 324
Niaouli-Oel V/2 787
Nicker-seed IV/3 1127
Nierentee, Indischer V/4 2270
Niespulver II 274
Nieswurz II 194; III 464
Niesswurzkraut III 598
Niger-Oel VI/1 532
Nikotin V/4 2551, 2617, 2621
Nil-Gummi IV/3 1124
Ninsingwurzel V/2 912
Nitragin IV/3 1118
Njave-Butter V/3 1896
Nuces catharticae V/1 120
vomicae V/3 1950
Nucit III 9
Nucitannin III 9
Nucitannsäure III 9
Nuclei Cembrae I 105
Nuculae aquaticae V/2 892
Nüsse, Spanische IV/3 1463; VII 60 Fig. 1096
Nukleïne VII 88
Nussbeize III 10
Nusslikör III 10
Nussöl III 10, 74
Nuttharz II 278
Nycanthin V/3 1906

O.

Oca-Knollen IV/3 1647
Ocimen V/4 2269
Ocotillawachs V/1 493
Odermennigkraut IV/2 935
Odermennigwasser IV/2 935
Oele, Aetherische VII 28
„ , Fette VII 53
Oelgallen V/3 1944
Oelsenitzwurzel V/2 1396
Oenanthin V/2 1251, 1257
Oenanthotoxin V/2 1251
Oenidin V/1 398, 484
Oenin V/1 398
Okume-Holz V/1 83
Oleandrin V/3 2057
Olenitol V/3 1943
Oleum Amygdalarum IV/2 1090
Amygdalarum amararum aethereum IV/2 1091
Amygdali amari IV/2 1090
Anethi V/2 1294
Angelicae V/2 1343
Anisi V/2 1211
Apii V/2 1145
Asae foetidae V/2 944
Aurantii dulcis V/1 62
Bardanae VI/2 827
Basilici V/4 2269
Oleum Bergamottae V/1 61
Betulae empyreumaticum III 79
betulinum III 75
Buccu foliorum V/1 49
Cacao V/1 492
Cadinum I 108
Cajeputi V/2 787
Carthami VI/2 989
Carvi V/2 1185
Castoris V/1 122
Chamomillae VI/2 582, 584
citratum VI/2 584
„ Romanae VI/1 536
Chenopodii III 233
Cinnamoni IV/1 11
Citri V/1 67
Cochleariae IV/1 139
cocos II 131
Coriandri V/2 1073
Crotonis V/1 124
Cumini V/2 1139
Dracunculi VI/2 636
Eucalypti V/2 784 ff.
Foeniculi V/2 1288
Galbani V/2 945
Gaultheriae V/3 1620
Geranii IV/3 1667
Gossypii V/1 462
Granae regiae V/1 122
Helianthi annui VI/1 511
Hyoscyami V/4 2577
Hyperici V/1 530
Hyssopi V/4 2359
infernale V/1 118, 120
Jasmini V/3 1906
Juniperi e baccis I 90, 108
„ empyreumaticum I 90, 108
Lauri IV/1 12
„ foliorum IV/1 12
Laurocerasi IV/2 1063
Lavandulae V/4 2278
Limonis V/1 67
Lini V/1 30
„ sulfuratum V/1 30
Macidis IV/1 15
Majoranae V/4 2335
Mandarinae V/1 59
Melissae V/4 2305
Germanicum V/4 2305
„ Indicum V/4 2305
Menthae crispae V/4 2352
„ piperitae V/4 2355
Mezerei V/2 712
Millefolii VI/2 572
moscoviticum III 75
Myrciae V/2 777
Myristicae expressum IV/1 15
Myrti V/2 791
Napi IV/1 256
Nucistae IV/1 15
Ocimi citrati V/4 2269
olivarum V/3 1943
Oleum Oreoselini V/2 1389
Origani V/4 2332
Palmae Christae V/1 122
Papaveris IV/1 31, 36
Persicarum IV/2 1095
Petroselini V/2 1158
Phellandrii V/2 1268
Pimentae V/2 776
Pini Pumilionis I 108
Pulegii V/4 2341
Rapae IV/1 256
Ricini V/1 122
Rosae IV/2 989
Rosmarini V/4 2521
Rusci III 79
Rutae V/1 72
sanctum V/2 730
Santali III 151
„ indici V/1 54
Sassafras IV/1 11
Secalis cornuti pingue I 389
Serpylli V/4 2326; VII 200 Fig. 1241
Sesami VI/1 176
„ vulgaris IV/1 371
Sinapis aethereum IV/1 238
Spicae V/4 2276
Sumbuli V/2 944
Tanaceti VI/2 622
Terebinthinae I 99
Thymi V/4 2308
Valerianae VI/1 268
„ Wittnebianum V/2 787
Oleuropeïn V/3 1943
Olibanum V/1 84
Olio di Mandorla IV/2 1090
Oliven V/3 1943
„ -Oel V/3 1941
Ombenen-Nüsse V/1 492
Onocerin IV/3 1227
Onon IV/3 1227
Ononin IV/3 1227
Opium IV/1 35
Opodeldok VI/2 708
„ , Flüssiger V/4 2522
Opopanax-Gummi V/2 1362
„ -Öl V/2 1362
Orangenblütenöl V/1 60, 62
Orangenblütenwasser V/1 62
Orangenschalenöl V/1 62
Orangenwein V/1 62
Orelhana V/1 584
Orellin V/1 584
Origanumöl, Kretisches V/4 2332
Orinoko-Rinde V/1 79
Orleans-Farbstoff V/1 584
Orogbo-Kola V/1 502
Orthosiphonin V/4 2270
Oschak V/2 1356
Osthol V/2 1400
Ostruthin V/2 1400
Ostruthol V/2 1400
Osyris-Tee III 151
Otto of rose IV/2 989

Oxalsäure I/XXII; IV 3 1653; VII 103
Oxalsaurer Kalk VII 90
Oxylacksäure V/1 221
Oxylupanin IV/3 1151
Oxypeucedanin V/2 1400

P.

Padukholz IV/3 1496
Palasabaum IV/3 1626
Palay-Kautschuk V/3 2063
Palisanderholz IV/3 1496
Palm I 180; III 35, 72, 76; V/1 236f.
Palmarosaöl IV/2 989
Palmwedel I 73
Palmzweige I 73
Palo balsamo V/1 40
„ Panguy V/2 896
Palomabi-Rinde V/1 325
Panakilon V/2 912
Panamahüte II 131
Panamarinde IV/2 663
Panao-Oel V/1 534
Panaquilon V/2 912
Papaïn V/1 661
Papaverin IV/1 35
Papayacin V/1 661
Papayotin V/1 661
Papier, Chinesisches V/2 911
Pappelknospen III 59
Paprika V/4 2557
Papuamuskatnuss IV/1 15
Parabuxin V/1 210
Paradiesapfel V/1 56
Paradiesholz V/1 120; V/2 700
Paradieskörner II 321
Paradiesnüsse V/2 768
Paradiesnussöl V/2 768
Paraguay-Tee V/1 235
Parakautschuk V/1 118
Parana-Tee V/1 235
Paranüsse V/2 768
Paranussöl V/2 768
Paridin II 277
Parillin II 280
Paristyphnin II 277
Paronychin III 433
Parquin V/4 2554
Passulae majores V/1 414
„ minores V/1 414
Pasta Althaeae V/1 469
Guarana V/1 307
„ seminum Paulliniae V/1 307
Pastinakwurzel V/2 1414
Paternoster-Erbse IV/3 1498
Patschulialkohol V/4 2273
Patschulikampfer V/4 2273
Patschuli-Oel V/4 2273
Pech I 98
Pectenin V/2 684
Pedunculi Cerasorum IV/2 1078
Pegu-Katechu IV/3 1124
Pekafett V/1 494
Pekea-Nüsse V/1 494
Pektine VII 91
Pelargonidin IV/1 285; V/4 2478
Pelargoniumöl IV/3 1667
Pelawachs V/3 1944
Pelletierin V/2 766
Pellotin V/2 684
Pereiro-Rinde V/3 2050
Pericarpium Aurantii V/1 60
„ Citri V/1 67
Periploca-Rinde V/3 2064
„ -Samen V/3 2064
Periplocin V/3 2064
Perkal V/1 462
Pernambukholz IV/3 1127, 1128
Peronospora V/1 420
Persico IV/2 1095
Persimonholz V/3 1898
Perubalsam IV/3 1144
Petcheri V/4 2558
Petitgrain-Oel V/1 67
Peucedanin V/2 1374
Peyotl V/2 684
Pfahlrohrwurzel I 271
Pfeffer, Schwarzer III 209
, Spanischer V/4 2557
„ , Weisser III 209
Pfefferminzkraut V/4 2355
Pfefferminzöl V/4 2336, 2355
Pfeilgifte V/3 1951, 2050
Pferdefleischholz V/3 1897
Pfirsichkernöl IV/2 1095
Pfirsichkernschwarz IV/2 1095
Pflanzenschwefel I 67
Pflanzenasche VII 92
Pflanzenbutter VII 53
Pflanzenschleim VII 92
Phaseolin IV/3 1140, 1635
Phaseolunatin IV/3 1628
Phellandral V/2 1268
Phellandren V/1 67; V/2 776, 777, 1139, 1268, 1294
Phenylaethylsenföl IV/1 320
Physalin V/4 2582
Physostigmin IV/3 1141, 1624
Phytin IV/3 1561
Phytomelan VI/2 709
Phytosterol V/3 1951
Picramnin V/1 80
Picrasmin V/1 79
Picroadonidin III 598
Pikrocrocin II 298
Pikrotoxin IV/1 16
Pilae marinae VII 110
Pili-Nüsse V/1 83
Pilocarpidin V/1 51
Pilocarpin V/1 51
Pilocereïn V/2 684
Pimpinellin V/2 1208
Pinen I 108; III 162; V/1 67; V/2 791, 945, 1139
Pineytalg V/1 534
Pinocamphon V/4 2359
Piper album III 209
Piper Hispanicum V/4 2557
Jamaicense V/2 776
„ nigrum III 209
Piqué V/1 462
Pistaciengallen V/1 233
Pistacienmandeln V/1 232
Pistacienöl V/1 232
Pitjung-Oel V/1 656
Pituri V/4 2558
Pix liquida I 99
Pi-Yu V/1 120
Placenta seminis Lini V/1 29
Plossabaum IV/3 1626
Podophyllinum IV 1 5
Podophyllumharz IV 1 5
Poelé-Rinde V/3 2050
Poleikraut V/4 2341
Polei-Oel V/4 2336, 2341
Polenta I 180; III 208, 209
„ nerastra III 208
Polygalasäure V/1 90, 112
Polygalit V/1 112
Polygamarin V/1 112
Pomeranzen V/1 59
Ponang-Nüsse V/1 500
Poplar-Holz III 58
Porphyrin V/3 2050
Porstbier V/3 1626
Porst-Öl V/3 1626
Powidl IV/2 1111, 1112
Praezipitate VII 96
Preisselbeeren V/3 1673, 1686
Preisselbeerwein V/3 1673
Primulaverin V/3 1753
Primulin V/3 1753
Primverase V/3 1871
Primverin V/3 1753
Proteasen VII 97
Proteïde VII 48
Proteïne VII 48
Protokosin IV/2 666
Protopin IV/1 37
Protoveratridin II 194
Protoveratrin II 194
Prünellen IV/2 1111, 1112
Pseudo-Baptisin IV/3 1146
Pseudocurarin V/3 2057
Pseudofrangulin V/1 347
Pseudojervin II 194
Pseudokumarin IV/3 1465
Pseudoononin IV/3 1227
Pseudopelletierin V/2 766
Pseudopurpurin VI/1 232
Ptomaïne VII 98
Pulegon V/4 2334, 2336, 2341
Pulpa Cassiae IV/3 1131
Prunorum IV/2 1112
„ Tamarindorum IV/3 1130
Pulque II 318
Pulsatilla-Kampfer III 519
Pulverkohle V/1 348
Pulvis dentifricius niger III 99
„ equorum VI/2 820
Punicin V/2 766

Purgierkörner V/1 124
Purgiernüsse V/1 120
Purgierquitten IV/2 691
Purpurin VI/1 232
Purpuroxanthin VI/1 232
Pyrethrin VI/2 598, 673
Pyrethrolon VI/2 598
Pyrethrumseifenlösung VI/2 598
Pyrogallol V/3 1661

Q.

Quassienholz V/1 79
Quassiin V/1 79, 80
Quassol V/1 79
Quebrachamin V/3 2050
Quebrachin V/3 2050
Quebracho-Gerbstoff V/1 217
-Holz V/1 217, 307
-Rinde V/3 2050
Queckenwurzel I 384
, Rote II 62
Quellstifte V/2 770
Quendel V/3 2326
Quendelöl V/4 2326
Quercetagetin VI/1 535
Quercetin IV/1 489; IV/2 735, 1105; V/1 72, 82, 303, 335, 414; V/2 740; V/3 1661, 1698
Quercit III 107; V/3 1951
Quercitrin III 106; IV/2 989; V/1 303
Quercosin IV/1 445
Quillajasäure IV/2 663
Quina-Rinde V/1 51
Quittensamen IV/2 692
Quittensamenöl IV/2 692
Quittenschleim IV/2 692

R.

Racine de Bruyère V/3 1707
Radix Aconiti racemosi III 478
Acori palustris II 294
Acus Veneris V/2 991
Adonidis II 598
Alcannae V/3 2206
Orientalis V/2 748
spuria V/2 748; V/3 2206
„ verae V/2 748
Althaeae V/1 469
Anblati VI/1 131
Anchusae luteae V/3 2179
Anethi ursini V/2 1303
Angelicae Brisgoicae V/2 1344
(sativae) V/2 1343
„ silvestris V/2 1337
Anthorae III 494
Apii V/2 1145
„ montani V/2 1389
Apocyni cannabini V/3 2050
Ari II 133
Aristolochiae cavae IV/1 39
Armoraciae recens IV/1 307
Arnicae VI/2 707
Radix Artemisiae VI/2 640
Asclepiadeae V/3 2000
Asparagi II 263
Asteris Attici VI/1 429
„ inguinalis V/2 976, 991
Astragali exscapi IV/3 1411
Astrantiae V/2 966
Auriculae muris VI/2 1201
Baptisiae tinctoriae IV/3 1146
Barbae caprae IV/2 673
„ hirci VI/2 1052
Bardanae VI/2 826
Behen albus III 281
„ ruber V/3 1882
Belladonnae V/4 2569
Benedictae silvestris IV/2 917
Bistortae III 195
Boni Henrici III 221
Brancae ursinae Germanicae V/2 1453
Bryoniae VI/1 319
Buglossi agrestis V/3 2196
Bulbocastani V/2 1194
Cannabis aquaticae VI/1 402
Capituli Martis V/2 991
Cardopatiae VI/2 820
Carlinae VI/2 820
Caryophyllatae IV/2 919
„ aquaticae IV/2 917
Cerefolii Hispanici V/2 1045
Cervariae albae V/2 1481
„ nigrae V/2 1392
Chamaeleontis albae VI/2 820
Chelidonii majoris IV/1 22
„ minoris III 544
Christophorianae III 478
Cichorii VI/2 996
Cicutariae odoratae V/2 1045
Colombo IV/1 16
Consolidae majoris V/3 2225
„ Sarraceniae VI/1 411
Costi VI/2 835
Crassulae maioris IV/2 525
Cunigundae VI/1 402
Cyclaminis arthanitae V/3 1847
Cynapii V/2 1275
Cynoglossi V/3 2151
Dauci sativi V/2 1526
„ silvestris V/2 1526
Dentariae V/3 1878; VI/1 131
„ antidysentericae IV/1 332
Diapensiae V/2 959
Dictamni V/1 76
Dipsaci VI/1 282
Diptamni V/1 76
Doronici VI/2 720
Dracunculi palustris II 137
Echii V/3 2196
Enulae VI/1 476
Eryngii V/2 976, 991
„ maritimi V/2 981
Eupatoriae VI/1 402
Filipendulae IV/2 975
aquaticae V/2 1257
Radix Foeniculi V/2 1888, 1289
porcini V/2 1374
„ ursini V/2 1303
Francisceae uniflorae V/4 2555
Fraxinellae V/1 76
Gei rivalis IV/2 917
Gentianae V/3 1992
albae V/2 1481
cruciatae V/3 2000
„ nigrae V/2 1392
Ginseng V/2 912; VI/2 835
Glycyrrhizae IV/3 1453
„ echinatae IV/3 1454
graminis I 384
Helenii VI/1 476
Hellebori albi II 194
„ viridis III 464
Hirundinariae V/3 2072
Hydrolapathi III 179
Jalapae V/3 2076
„ fibrosae V/3 2076
Imperatoriae V/2 1400
„ nigrae V/2 966
Ipecacuanhae VI/1 156
„ albae V/1 586
Iridis II 285
Junci floridi I 158
Lapathi hortensis III 167
Lepidii IV/1 90
Levistici V/2 1354
Liquiritiae IV/3 1453
Lysimachiae chamaenerion V/2 818
Manaca V/4 2555
Mandragorae V/4 2558
Mei athamantici V/2 1303
Meu V/2 1303
Mudari V/3 2063
Mutellinae V/2 1323
Myrrhidis majoris V/2 1045
Ninsi V/2 1224
Nyctaginis Mechoacannae III 266
Oenanthes V/2 1257
Olsnitii V/2 1396
Ononidis IV/3 1227
Oreoselini V/2 1389
Ostruthii V/2 1400
Papaveris corniculati IV/1 24
Paradisiaca V/3 1753
Pareirae bravae IV/1 16
Pastinacae aquaticae V/2 1222
„ sativae V/2 1414
Patientiae III 167
Pentaphylli IV/2 889
„ aquatici IV/2 809
Petasitidis VI/2 685
Petroselini V/2 1158
Peucedani V/2 1374
Picramniae V/1 80
Pilosellae VI/2 1201
Pimpinellae V/2 1208
Italicae IV/2 939

Radix Pimpinellae nigrae V/2 1208
„ spuriae V/2 1208
Pneumonanthes V/3 2002
Polypodii I 41
Primulae V/3 1753
Pyrethri germanici VI/2 673
„ romani VI/2 673
Quinquefolii fragiferi IV/2 834
Raphani nigri seu hortensis IV/1 285
recens IV/1 285
„ rusticani IV/1 307
Ratanhiae IV/3 1135
Reginae prati IV/2 974
Restae bovis IV/3 1227
Rhei III 166
„ monachorum III 167
Rhodiae IV/2 528
Rumicis aquatici III 179
Sanamundae IV/2 919
Saniculae V/2 959
Saponariae III 345
„ albae III 302
Sarsaparillae II 280
„ Germanicae II 7, 62
Saxifragae rubrae IV/2 975
Scammoniae V/3 2080
Selini palustris V/2 1396
Senegae V/1 90
Serratulae VI/2 928
sigilli Salomonis II 269; VII Fig. 1067
Sii palustris V/2 1222
Silai V/2 1297
Sileris montani V/2 1472
Sisari V/2 1224
Sphondylii V/2 1453
Spinae solstitialis VI/2 983
Squamariae VI/1 131
Sumbul V/2 943
Symphyti V/3 2225
Syringii V/2 991
Taraxaci VI/2 1089
Telephii IV/2 525
Thapsiae V/2 1501
Thysselini V/2 1396
Tormentillae IV/2 884
Tragopogonis VI/2 1052, 1356 Fig. 961
Tragoselini V/2 1208
Turpethi V/3 2077
„ spurii V/2 1501
Valerianae VI/1 277
Verbasculi V/3 1753
Victorialis femina II 219
longa II 219
mas II 219
„ rotunda II 219
Violae odoratae V/1 652
Viperini V/3 2196
„ Virgae aureae V/1 411
Räucherkerzen II 199
Rajemahl-Hanf V/3 2063
Raki-Branntwein V/1 231
Ramtilla-Samen VI/1 532
Raphanol IV/1 285
Raphia-Bast V/1 432
Rapskuchen IV/1 256
Rapsöl IV/1 256
Rasamala IV/2 656
Ratafia IV/2 1078, 1100
Rataholz V/2 780
Ratanhiagerbsäure IV/3 1135
Rauken-Kraut IV/1 165
Rautenkrone V/1 73
Rautenöl V/1 72
Rebenschwarz V/1 415
Rebensorten V/1 386
Rebhuhnholz IV/3 1496
Regianin III 9
Reis I 195
Reisbesen I 185
Reismehl I 195
Reispapier V/2 911; VI/2 1359
Renghas-Holz V/1 216
Resedasamenöl IV/1 489
Resenharze VII 101
Resenretine VII 101
Resina Benzoë V/3 1900
Dammar V/1 534
Jalapae V/3 2076
Lacca V/1 120
Mastix V/1 231
Podophylli IV/1 5
„ storax V/3 1900
Resine VII 65
Resinharze VII 50
Resinretine VII 50
Resinolsäureharze VII 101
Rettich IV/1 285
Revalenta arabica IV/3 1505, 1551, 1560; V/1 492
Rhabarber III 166
Rhamnacin V/1 330
Rhamnetin V/1 329
Rhamno-Emodin V/1 335
Rhamnol V/1 343
Rhamnose V/1 220, 330
Rhamnoxanthin V/1 335
Rhamnustoxin V/1 347
Rheïn III 66
Rheum-Emodin III 166
Rhizoma Arnicae VI/2 707
Asari III 162
Calami II 136
Caricis arenariae II 62
Chinae II 280
Collinsoniae V/4 2272
Curcumae II 321
Filicis I 18
Galangae II 321
Gei urbani IV/2 919
Gelsemii V/3 1951
Geranii maculati IV/3 1671
Graminis I 384
„ Italici I 264
Hydrastidis III 453
Rhizoma Imperatoriae albae V/2 1400
Iridis II 285
Iridis pro infantibus II 285
Ostruthii V/2 1400
Polypodii I 41
Rhei III 166
Scopoliae Carniolicae V/4 2572
„ japonicae V/4 2570
Serpentariae III 162
Spigeliae Marylandicae V/3 1952
Tormentillae IV/2 884
Valerianae VI/1 277
Veratri II 194; VII 555 Fig. 1272; I/LXIII Fig. 77
Vincetoxici V/3 2072
Zedoariae II 321
„ Zingiberis II 321
Rhodinol IV/2 989; IV/3 1661
Rhododendrin V/3 1629
Rhodotannsäure V/3 1629
Rhodoxanthin V/3 1630
Rhoeadin IV/1 31
Rhoeadinsäure IV/1 31
Rhusgerbsäure V/1 221
Ricin V/1 122
Ricinolsäure V/1 123
Riechholz V/2 120
Riechsträusschen V/1 72
Rigabalsam I 105
Rio-Elemi V/1 84
Rizinus-Oel V/1 122
„ -Samen V/1 122
Roafaser III 137
Robigenin IV/3 1397
Robin IV/3 1397
Robinin IV/3 1397
Rochellesalz V/1 415
Rohrwurz VI/2 820
Rohrzucker I 186; III 217; IV/2 897, 1095; IV/3 1132; V/1 264, 269; VII 102
Roob Dauci V/2 1526
„ Sambuci VI/1 239
Rosaginin V/3 2057
Rosa sanctae Mariae IV/1 70
Rosenäpfel IV/2 984; VII 107 Fig. 1140
Rosenholz IV/3 1496; V/1 500; V/3 2079
, Westindisches V/1 54
Rosenkränze siehe VII S. 553
Rosenöl IV/2 988 f.
Rosenwasser IV/2 988; IV/3 1593
Rosenwurz IV/2 528
Rosinen V/1 414
Rosmarin V/4 2521
Rosmarinöl V/4 2521
Rosmarinsalbe V/4 2521
Rosellahanf V/1 460
Rosshaar, Falsches I 203
„ , Vegetabilisches II 143
Rosspulver VI/2 820
Rote Grütze IV/2 770

Rotholz IV/3 1127
Rotrepsöl IV/1 468
Rottlerin V/1 125
Ruberythrinsäure VI/1 232
Rubijervin II 194
Rübenwein V/2 1526
Rübenzucker VII 102
Rüböl IV/1 263
Ruprechtskraut IV/3 1715
Rutin IV/2 538; IV/3 1145; V/1 72, 589

S.

Sabinol I 108
Saccharose VII 102
Sadebaumkraut I 93
Sadebaumspitzen I 108
Säuren, Organische VII 103
Saffranhout V/1 244
Saflor VI/2 988
Saflorgelb VI/2 988
Safran II 298
Safranverfälschungen II 298
Saftgrün V/1 330
Sagapenum V/2 946
Sago I 73
„ , Deutscher V/4 2603
Sal essentiale Rubi Idaei IV/2 771
Salat VI/2 1118
Salbei V/4 2484
Salbeiöl V/4 2484
Salbeneicheln IV/1 491
Salbennüsse V/2 772
Salep II 324
„ , Westindischer II 321
Salicylaldehyd IV/2 970, 975; VI/2 1176
Salicylsäure IV/2 774, 1072; V/1 399, 589, 658; V/3 1620; VII 103
Salicylsäuremethylester IV/2 971; V/1 586, 589; V/3 1602, 1620
Salvinin V/4 2478
Samariterbalsam V/1 41
Samaun-Oel V/1 656
Sambucin VI/1 239
Sambunigrin VI/1 237, 239
Sandarak I 108
„ , Deutscher I 90
Sandbeerenöl V/3 1666
Sandelholz III 151
, Afrikanisches IV/3 1496
, Rotes IV/3 1496
„ , Westindisches V/1 54
Sandelöl V/1 54
St. Luzienholz IV/2 1071
Sansibar-Kopal IV/3 1131
Santalsäure IV/3 1496
Santonin VI/2 628, 665
Sapindus-Saponin V/1 307
Saponine III 345; VII 105
Sapotoxin IV/2 663
Sappanholz IV/3 1127
Sapucajanüsse V/2 768
Sarsaparille, Deutsche II 7, 62
Sarsaparillwurzel II 280
Sassafrasöl IV/1 11
Saturejaöl V/4 2283, 2286
Sauerkraut IV/1 247, 251
Saulharz V/1 534
Scammonium V/3 2080
„ Gallicum V/3 2063
Scammoniumwurzel V/3 2080
, Deutsche V/3 2089
„ , Mexikanische V/3 2076
Schabzigerkäse IV/3 1235, 1237, 1243
Schachtelhalmkraut I 52
Schafgarbenkraut VI/2 572
Schafgarbenöl VI/2 572
Schaumwein V/1 401
Schellack III 124; V/1 323
Schellkraut = Schöllkraut IV/1 22
Scherbet V/2 765, 1552
Schiessbaumwolle V/1 462
Schiffspech I 98
Schlafäpfel IV/2 983; VII 107 Fig. 1140
Schlangenknöterich III 195
Schlehenwein IV/2 1106
Schlichte I 197
Schlüsselblumenwein V/3 1754
Schneeberger Schnupftabak II 274; III 162; V/1 304
Schnupftabak I 198; II 274; IV/2 1078; IV/3 1243, 1245; V/4 2620; VI/2 705
Schöllkraut IV/1 22
Schokolade V/1 491
Schüttgelb III 79; IV/3 1203; V/1 330; VI/2 928
Schüttgrün III 79
Schurjan V/4 2532
Schusterpech I 98
Schwadengrütze I 319
Schwanenblumenwurzel I 158
Schwarzkümmel III 475
Schwarzpulver V/1 348
Schwarztee V/1 495
Schwefelbalsam V/1 30
Schweinsgummi V/1 501, 502
Schweizertee IV/2 925
Schwertbohne IV/3 1625
Scillaïn II 279
Scillin II 279
Scillipikrin II 279
Scillitoxin II 279
Scoparin IV/3 1189
Scopolamin V/4 2551, 2572
Scopoletin V/3 1951
Scopolin V/4 2551, 2568
Scutellareïn V/4 2516
Scutellarin V/4 2508, 2516
Secale cornutum I 389
Seebälle VII 110
Seefenchelöl V/2 1226
Seegras I 142
Seeknödel VII 110
Seidelbastrinde V/2 712
Seidenholz V/1 47
Seife III 345; V/3 1943
Seifenkraut III 345
Seifenrinde IV/2 663
Seifenwurzel III 310, 345
„ , Weisse III 302
Seignette-Salz V/1 415
Sekt V/1 401
Sellerie-Oel V/2 1145
Semen Absinthii dulcis V/2 1211
Adjowan V/2 1168
agni casti V/3 2237
Ammeos veri V/2 1168
„ vulgaris V/2 1173
Amomi V/2 776
„ vulgaris V/2 1163
Amygdali amari IV/2 1090
Anacardii occidentalis V/1 216
„ orientalis V/1 218
Angelicae V/2 1343
Anisi vulgaris V/2 1211
Apii V/2 1145
montani V/2 1389
„ petraei V/2 1282
Arecae II 130
bombacis V/1 462
Cacao V/1 491
Candiani V/2 1282
Cardui Mariae VI/2 919
Carvi V/2 1184
Cataputiae majoris V/1 122
„ minoris V/1 147
Cerefolii V/2 1029
„ Hispanici V/2 1045
Cervariae V/2 1392
Cicutae V/2 1084
Cicutariae odoratae V/2 1045
Cinae VI/2 665
Cismae IV/3 1131
Cochleariae IV/1 139
Colae V/1 492
Colchici II 198
Contra VI/2 665
Coriandri V/2 1072
Cucumeris VI/1 323
Cumini III 475; V/2 1139
Cydoniae IV/2 692
Cynosbati IV/2 1035
Dauci Cretici V/2 1282
„ silvestris V/2 1526
Empetri V/3 1607
Erucae IV/1 207
Ervi IV/3 1514
Foeniculi V/2 1288
„ porcini V/2 1374
Foenugraeci IV/3 1233
Galegae nemorensis IV/3 1576
Genistae IV/3 1189
„ Hispanicae vel junceae IV/3 1215
Gentianae nigrae V/2 1392
Gossypii V/1 462
Jambolanae V/2 780
Jequirity IV/3 1498
Ignatii V/3 1951

Semen Junci floridi I 158
Lathyridis majoris V/1 147
Lentium IV/3 1505
Levistici V/2 1353
Lini V/1 28
Melanthii III 475
Milii solis V/3 2157
Myristicae IV/1 15; I/CLV Fig 296
Myrrhidis annuae V/2 1282
„ majoris V/2 1045
Nasturtii hortensis IV/1 82
Nigellae III 475
Oreoselini V/2 1389
Papaveris IV/1 35, 36
Paradisi II 321
Pastinacae sativae V/2 1414
Perfoliatae V/2 1108
Periplocae Graecae V/3 2064
Petroselini Macedonici V/2 1282
Peucedani V/2 1374
Physostigmatis IV/3 1624
Pimpinellae V/2 1208
Psyllii VI/1 179
Raphani nigri seu hortensis IV/1 285
Rapistri arvorum IV/1 268
Ricini V/1 122
„ majoris V/1 120
Rutae sylvestris V/1 41
Sabadillae II 199
Scordothlaspeos IV/1 121
Seseleos V/2 1472
„ Cretici V/2 1460
Seseli Massiliensis V/2 1228
Sileris montani V/2 1472
Sinapis IV/1 238
albae IV/1 207
„ nigrae IV/1 238
Staphidis Agriae III 486
Stramonii V/4 2615
Strophanthi V/3 2049
Strychni V/3 1950
Tanghiniae V/3 2050
Thlaspeos IV/1 80, 120
Tiglii V/1 124
Tithymali latifolii V/1 147
Tordylii V/2 1460
Urticae minoris III 142
Violae graecae IV/1 355
Senecifolidin VI/2 790
Senecionin VI/2 790
Senegal-Gummi IV/3 1124
Senegin V/1 90, 112
Senfgeist IV/1 239
Senföl IV/1 207, 238
Senfpflaster IV/1 239
Senfsamen IV/1 207, 238
Sennesbälge IV/3 1131
Sennesblätter, Aegypt. IV/3 1131
Aleppische IV/3 1131
„ , Syrische IV/3 1131
Serratulin VI/2 928
Sesammehl VI/1 176
Sesamöl VI/1 176
„ , Deutsches IV/1 371
Shamrock IV/3 1306, 1654
Shikimmen IV/1 14
Shinisblätter V/1 231
Shoju-Sauce IV/3 1622
Sikadoengdoeng IV/2 656
Siliquae dulces IV/3 1133
Silserkugeln I 95
Simullofrüchte IV/1 491
Sinalbin IV/1 207
Sinalbinsenföl IV/1 207
Sinigrin IV/1 57, 120, 207, 238
Sinigrinsenföl IV/1 207
Sirupus Cerasorum IV/2 1078
Mannae V/3 1925
Menthae piperitae V/4 2355
murorum III 130
Rhamni catharticae V/1 334
Rubi Idaei IV/2 770
spinae cervinae V/1 334
„ Violarum V/1 653
Sisalhanf II 317
Siur-Nüsse V/1 87
Sklavendatteln V/1 41
Slibovitz IV/2 1111, 1112
Smieter I 158
Soda V/1 41
Sodomsäpfel V/3 2064
Soja-Bohne IV/3 1622
Sojabohnenöl IV/3 1622
Sojasterol IV/3 1622
Solanidin V/4 2551, 2591
Solanin V/4 2551, 2591, 2599, 2608
Sonnenblumenöl VI/1 511
Sonnentaukraut IV/2 502
Sonora-Gummi IV/3 1126
Sophorin IV/3 1145
Sorbette IV/2 713
Sorbinsäure IV/2 710
Sorbit IV/2 710
Spanisch-Hopfenöl V/4 2327
-Rot VI/2 988
Spanische Nüsschen IV/3 1463; VII 60 Fig. 1096
Spargelsirup II 263
Spargelwurzel II 263
Spartein IV/3 1141, 1151, 1189, 1215
Spearmint-Oil V/4 2352
Species diureticae IV/3 1227
lignorum IV/3 1227; V/1 40; VI/2 827
Sphacelotoxin I 389
Sphaerokristalle I/XXIII
Spigeliin V/3 1952
Spik-Oel V/4 2276
Spiraein IV/2 970, 975
Spiritus Carvi V/2 1185
Chamomillae VI/2 584
Cochleariae IV/1 139
Lavandulae V/4 2278
Melissae compositus V/4 2305
Russicus V/4 2557
saponatus V/3 1943
Spiritus Sinapis IV/1 239
Spitzwegerichkraut VI/1 179
Spitzwegerichsaft VI/1 184
Spongia Cynosbati IV/2 1035
Sporae Lycopodii I 67
Springwurz II 269
Stachelmohnöl IV/1 20
Stachyose V/4 2419, 2447
Stärke II 240; IV/3 1496
Stärkekörner I/XIX; II 240 IV/3 1496
Stechapfelblätter V/4 2615
Stechapfelsamen V/4 2615
Stechkörner VI/2 991
Steinbeerwasser V/3 1674
Steinkraut III 405
Stephani-Kaffee IV/3 1131
Stephanskörner III 486
Sternanis IV/1 14; VII Fig. 1218 f, g
Sterz III 208
Stiefmütterchenkraut V/1 605
Stink-Asant V/2 944, 1356
Stipites Cerasorum IV/2 1078
Dulcamarae V/4 2591
Jalapae V/3 2076
Tupelae V/2 770
„ Visci III 149
Stocklack V/1 323
Stoechas-Oel V/4 2275
Storax V/3 1900
, Amerikanischer IV/2 656
Streugräser I 172, 197; II 7, 119, 120
Streupulver I 67
Strobuli Lupuli III 132
Strophanthin V/3 2049
Strophanthus-Samen V/3 2049
Strychnicin V/3 1950
Strychnin V/3 1950
Stupp I 67
Stylophorin IV/1 22
Styrax IV/2 656; V/3 1900
„ liquidus IV/2 656
Styrocampher IV/2 656
Styrol IV/2 656
Suak-Gummi IV/3 1124
Suari-Nüsse V/1 494
Suberin I/XXV, XXX
Succus Aloës inspissatus II 278
„ Liquiritiae IV/3 1454
Süssholz IV/3 1453
, Amerikanisches IV/3 1498
Indisches IV/3 1498
„ , Russisches IV/3 1454
Süssholzsaft IV/3 1454
Sultaninen V/1 414
Sumach V/1 224, 228
, Amerikanischer V/1 224
Italienischer V/1 224
, Provenzalischer V/1 213
, Sizilianischer V/1 224
Sumachgerbstoff V/1 224
Sumachwachs V/1 225
Sumatrakampfer IV/1 11

Sumbulwurzel V/2 943
Summitates Cannabis III 136
Genistae tinctoriae IV/3 1203
Hyperici perforati V/1 530
Juniperi I 90
Meliloti IV/3 1237
Millefolii VI/2 572
Sabinae I 108
Taxi I 80
Sunteitalg V/3 1896
Suppengrün V/2 1160
Surinam-Guttapercha V/3 1896
-Quassienholz V/1 79
„ -Rinde V/1 79
Surli-Nüsse V/1 500
Sykomoren III 124
Symphyto-Cynoglossin V/3 2225
Syringin V/3 1910, 1916, 1949
Syringopikrin V/3 1916, 1949
Syrische Nüsse V/1 232

T.

Tabak V/4 2617 f.
Tabakersatz IV/2 988, 1072, 1105; V/1 442; V/4 2621; VI/2 722
Tabakpfeifen V/3 1707
Tabaschir I 402
Tabonucoharz V/1 84
Tabulae diatraganthi frigidi IV/3 1405
Tacamahac V/1 500
Takamahak-Harz V/1 84
Takut V/1 546
Talg VII 53
Tamarindenfrüchte IV/3 1130
Tamarindenmus IV/3 1130
Tampica-Wurzel V/3 2076
Tanacetin VI/2 622
Tangkawangfett V/1 534
Tannin VII 61
Tannolharze VII 50
Tapioka V/1 119
Taraxacerin VI/2 1089
Taraxacin VI/2 1089
Tartarus V/1 415
Tatar-Kenyer IV/1 299
Tatzé V/3 1714
Taubenkropfkraut III 308
Taubnesselblüten V/4 2447
Tausendgüldenkraut V/3 1970
Taxin I 80
Teakholz V/1 52
Tee, Böhmischer V/3 2157
Deutscher IV/2 770
Kurilischer V/2 818
, Mexikanischer III 233
-Ersatzmittel III 455, 513, 530; IV/1 445; IV/2 773, 901, 1105; V/1 35, 77, 496; V/2 775, 795, 818; V/3 1620, 1674, 1698, 1753, 1854, 2055, 2242; V/4 2507; VI/1 294, 402, 411; VI/2 929
Teelsamen VI/2 532
Teer I 98
Teeröl III 79
Téggaut V/1 546
Temulin I 377
Terebinthina I 99
communis I 107
„ veneta I 95
Terpene VII 119
Terpentin I 82, 99, 105, 107; V/1 233; VII 119
Jura- I 85
Karpatischer I 105
Straßburger I 82
Ungarischer I 105
„ , Venetianischer I 95
Terpentingallaepfel IV/3 1132
Terpentingallen V/1 233
Terpentinöl I 99, 107
Terpineol V/2 787
Terra Japonica, Falsche IV/3 1124
„ Lemnia V/1 489
Teufelsdreck V/2 944
Thapsia-Säure V/2 1501
Thebain IV/1 35
Theïn III 266; V/1 496
Theriak IV/3 1390; V/2 1210, 1343; V/4 2333, 2532; VI/1 268
Theobromin V/1 491, 492, 496
Theophyllin V/1 496
Thujon V/4 2484; VI/2 622, 628, 654
Thujylalkohol VI/2 628, 654
Thymian V/4 2308
Thymianöl V/4 2308
Thymol V/2 1168; V/4 2306, 2308, 2507
Tiekholz V/3 2236
Tiliadin V/1 442
Tinctura Absinthii VI/2 655
amara VI/2 655
Arnicae VI/2 708
Benzoës V/3 1900
Calami II 136
Calotropis V/3 2063
Chamomillae VI/2 584
Lobeliae VI/1 392
Myrrhae V/1 83
Opii IV/1 35
Secalis cornuti I 389
Stramonii V/4 2615
Strophanthi V/3 2049
„ Strychni V/3 1951
Tinnevelly-Senna IV/3 1131
Tintenholz V/3 1898
Togomandeln V/2 771
Tokio-Purpur V/3 2153
Tollkirschenblätter V/4 2568
Tolubalsam IV/3 1144
Tonka-Bohnen IV/3 1497
Topinamburknollen VI/1 514
Torf II 19; VII 120
Tormentillgerbsäure IV/2 884
Tormentillrot IV/2 884
Tourka-Faser V/3 2050
Toxicodendrol V/1 220
Toxisenecin VI/2 729
Tragacantha IV/3 1404
vermicularis IV/3 1404
Traganthgummi IV/3 1404; V/1 492
Traubenstein I/XXV
Traubenzucker VII 120
Traumaticinum (nicht Traumaticum) V/3 1896
Trehalamanna VI/2 807
Trehalose VI/2 807
Trester V/1 415
Triester Origanumöl V/4 2327, 2332
Trigonellin IV/3 1141, 1233; V/3 2049
Tripmadam-Suppe IV/2 542
Trimethylamin II 221, 222; IV 735; V/2 1547; VII 121
Trisaccharide VII 121
Triticin I 384
Trockenbukett I 173, 189, 203, 402; III 310; IV/1 356; V/4 2579; VI/1 469, 494
Tropasäure V/4 2551
Tsao V/1 323
Tubera Aconiti III 493
Ari II 133
Aristolochiae longae III 162
„ rotundae III 162
Chinae II 280
Jalapae V/3 2076
„ Salep II 324; VII 3 Fig. 970
Türkenbundzwiebel II 236
Türkischrot V/1 41
Tulucuna-Oel V/1 85
Tupelo-Holz(-stifte) V/2 770

U.

Ugni-Tee V/2 775
Umbelliferon V/2 944, 945
Umiri-Balsam V/1 37
Unguentum Althaeae V/1 470
Glycerini I 395
Rosmarini compositum V/4 2521
Uni-Beeren V/2 775
Urson V/3 1612, 1661, 1673
Urushinsäure V/1 221
Usego-Papier V/2 702
Uvae passae V/1 414

V.

Vaivarang-Frucht V/3 1714
Valerol III 132
Vanille II 324
Vanillin II 324; V/1 442
Vateriafett V/1 534
Veilchenessig V/1 652
Veilchenholz IV/3 1124; V/1 590
Veilchensirup V/1 652
Veilchenstein V/1 590
Veilchenwurzel II 285; V/1 590
Velany III 107
Ventilagin V/1 322

Veratralbin II 194
Veratramarin II 194
Veratrin II 199
Veratroidin II 194
Verbandwatte V/1 462
Verbenalin V/3 2242
Verbenaöl, Spanisches V/3 2235
Viburnin VI/1 245
Vicianin IV/3 1517
Vicin IV/3 1551
Vigantol VII 126
Vignin IV/3 1140
Vincetoxin V/3 2063
Vincetoxitin V/3 2072
Vinum Colae V/1 492
„ moratum III 130
Violanin V/1 590, 652
Violaquercitrin V/1 589
Viscum quernum III 149
Vitamine VII 129
Vitexin V/3 2237
Vogelbeeren IV/2 710
Vogelknöterich III 193
Vogelleim III 149, 150

W.

Wacholderbeeren I 90, 108
Wacholderbranntwein I 90
Wacholderharz I 90
Wacholderholz I 108
Wacholderholzöl I 90
Wacholderholzteer I 108
Wacholderöl I 90
Wacholderspiritus I 90
Wacholdersprosse I 90
Wachs I/XXVII, CIV, 167; III 11
„ , Chinesisches V/3 1920, 1944
Wahoorinde V/1 247
Waidblätter IV/1 199
Waidöl IV/1 199
Waldhaar I 245; II 7
Waldwolle I 98
Wali Kambing V/3 2063
Wallonen III 107
Walnuss III 7; VII 36 Fig. 1061
Walnussblatt III 9
Walnussoel III 10
Wappatoo I 156
Waschblau IV/3 1383
„Wassermais" III 438
Wausamenöl IV/1 489
Weichselsirup IV/2 1078
Weihrauch IV/1 14; V/1 84
„ , Unechter I 90
Weihrauchrinde IV/2 656
Weidenpfeifen III 16
Weidenrinde III 15
Wein V/1 394 f.
Weinessig V/1 414
Weinhefe V/1 400
Weinsäure IV/3 1130; V/1 415, VI/1 237, 239; VII 103
Weinstein IV/3 1130; V/1 415
Weintrauben V/1 413
Weintraubenreife V/1 398
Weizenstärke I 395
Wermutkraut VI/2 655
Wermutwein VI/2 655
Wintergreen-Oil V/3 1620
Wintergrünwein V/3 1589
Winterrinde IV/1 14; V/1 585
Wollkletten IV/3 1272
Wooraragift V/3 2050
Worcester-Sauce IV/3 1622
Wundklee IV/3 1364
Wurmsamen VI/2 665
„ , Ungarischer VI/2 622
Wurmsamenöl VI/2 665
„ , Amerikanisches VI/2 666

X.

Xanthoëriodictyol V/3 2119
Xanthophyll VII 131
Xanthoramnin V/1 330, 335
Xylan III 216; V/2 795

Y.

Yamsbohne IV/3 1624
Yamsknollen II 281
Yarak V/1 119
Yercum-Faser V/3 2063
Ysop V/4 2333, 2360
Ysop-Oel V/4 2359

Z.

Zachäusöl V/2 730
Zachunöl V/1 41
Zaunrübe VI/1 319
Zeder v. Singapore V/1 85
Zedernholz, Westindisches V/1 85
Zedrach-Oel V/1 85
Zedrelenholz V/1 85
Zeitlosensamen II 198
Zelluloid V/1 462
Zellulose VII 132
Zibeben V/1 399
Zichorienkaffee VI/2 995
Zichorienwurzel VI/2 996
Ziegenraute IV/3 1576
Zigarren V/4 2619
Zigaretten V/4 2619
Zimt, Weisser V/1 585
Zimtaldehyd IV/1 11; V/4 2273
Zimtoel IV/1 11
Zimtrinde IV/1 11
Zimtsäureester IV/2 656; IV/3 1144
Zinnkraut I 53
Zirbelnuss I 104
Zitronat V/1 65
Zitrone V/1 67
Zitronenkalk V/1 67
Zitronenkrautöl V/4 2305
Zitronenlimonade V/1 67
Zitronenöl V/1 67
Zitronensäure IV/2 502, 648, 650, 701, 770, 989, 1077, 1084, 1095; V/1 62, 67; V/3 1673, 1689; VII 103
Zitterlinse IV/3 1517
Zittwerwurzel II 321
Zitwerblütenöl VI/2 665
Zitwersamen VI/2 665
Zwetschgenwasser IV/2 1111
Zwiebelsaft II 233
Zwiebelzeltchen II 233

Fig. 1270. Polygonum Convolvulus L., Winden-Knöterich (III, 205). Phot. Dr. M. Lutz und Dr. G. Hegi, München.

Fig. 1271. Campanula excisa Schleicher (VI/1, 347), Ausgeschnittene Glockenblume, im Wallis (Saas-Fée). Phot. Dr. G. Hegi, München.

8. Kulturgeschichte, Volkskunde
Seite 549—555

9. Botaniker-verzeichnis
Seite 556—561

Rassenkunde des deutschen Volkes

Von **Prof. Dr. HANS F. K. GÜNTHER,** Jena. 14. und 15. umgearbeitete Auflage. 1930. Mit 29 Karten und 564 Abbildungen. Geh. Mk. 12.—, in Lwd. Mk. 14.—, in Halbldr. Mk. 18.—.

Aus dem Inhalt: Der Rassenbegriff / Zur Geschichte der Rassenkunde / Menschenkundliche Maße: Feststellung und Forschungsweise / Die leiblichen und seelischen Merkmale der europäischen Hauptrassen (nordische, westische, dinarische, ostische und ostbaltische) / Die Rassenverteilung im deutschen Sprachgebiet / Rasse und Sprache / Umwelteinflüsse / Vererbungserscheinungen / Mischlinge / Rassen- oder Blutgruppen oder Konstitutionstypen / Neuentstehung der Rassen / Gibt es eine neue deutsche Rasse? / Die Rassen Alteuropas / Die fälische Rasse / Die Rassengeschichte der keltischen und germanischen Stämme und des deutschen Volkes / Der Untergang des Abendlandes im Mischlings- und Industriezeitalter eine Rassenfrage / Wo stehen wir heute? / Was können wir tun?

Die vornehme und sachliche, sorgfältig abwägende Art der Darstellung, verbunden mit einem glänzenden Stil, macht das Studium des ausgezeichneten Buches zu einem Genuß. *(Prof. La Baume, Blätter für deutsche Vorgeschichte.)*

J. F. LEHMANNS VERLAG / MÜNCHEN 2 SW

8. Beziehungen der Pflanzen zur Kulturgeschichte, Volkskunde, Glaube und Aberglaube.

A.

Abies alba Mill. I 82
Abrus precatorius L. IV/3 1498
Acanthus L. VI 1 177 VII 205
Acer campestre L. V/1 288
„ platanoides L. V/1 283, 284
Achillea Millefolium L. VI/2 572
„ moschata Wulfen VI/2 557
Ackerbohne, Schwarze IV 1553
Acker-Gauchheil V/3 1871
Acker-Gelbstern II 207
Acker-Honigklee IV 3 1245
Ackermennig IV 2 935
Acker Winde V 3 2089
Aconitum L. III 493
Napellus L. III 495
Acorus Calamus L. II 135
Actaea spicata L. III 478
Adansonia digitata L. V 1 489
Adenanthera pavonina L. IV 3 1126
Adlerfarn I 37
Aegopodium Podagraria L. V/2 1215
Aesculus Hippocastanum L. V 1 303
Affenbrotbaum V/1 489
Affodill II 199
Agriopyrum repens (L.) Pal. I 384
Agrimonia Eupatoria L. IV/2 935
Ahlbeere IV 2 653
Ahlkirsche IV 1068
Ajuga L. V/4 2537, 2541
Alant, Echter VI/1 477
„ , Sparriger VI/1 482
Alchemilla arvensis (L.) Scopoli IV/2 948
„ vulgaris IV/2 969
Alisma Plantago (L.) Michalet I 151
Allermannsharnisch II 219
Allerseelentag I 67
Allium Cepa L. II 232
sativum L. II 230
„ Victorialis L. II 219
Alnus glutinosa Gaertn. III 92
Alpen-Ampfer III 173
-Bärlapp I 69
-Goldregen IV/3 1166
-Klee IV/3 1316
„ -Kreuzkraut VI 2 749
Alpenrose V/3 1629
Alpen-Veilchen V/3 1846
„ -Wachsblume V/3 2190
Alraune V/4 2558
Amarelle IV/2 1078
Ampfer III 173, 174
, Stumpfblätteriger III 173, 174
Amulette I 18; III 35; IV/2 502; V 1 479; V/2 893; V/4 2397; VI/2 1202
Anacyclus L. VI/2 673/4
Anagallis arvensis L. V/3 1871
Anastatica hierochuntica L. IV/1 70
Andorn V/4 2396
Anemone nemorosa L. III 522
„ ranunculoides L. III 521
Anethum graveolens L. V/2 1294
Angelica Archangelica L. V/2 1344
„ silvestris L. V/2 1338
Anhalonium Lewinii Henning V/2 684
Anis V 2 1211
Antennaria dioeca Gaertn. VI/1 456
Anthyllis Vulneraria L. IV/3 1364
Apfelbaum IV/2 751
Apium graveolens L. V/2 1145
Arbutus Unedo L. V/3 1666
Arctium L. VI/2 827
Arctostaphylos Uva ursi L. V/3 1661
Aristolochia Clematitis L. III 163
Arnica montana L. VI/2 708, 709
Aronstab, Gefleckter II 132
Artemisia Abrotanum L. VI/2 635
Absinthium L. VI/2 655
campestris L. VI/2 670
Cina Berg VI 2 665
Dracunculus L. VI/2 637
laxa (Fritsch) VI/2 649
Pontica L. VI/2 645
vulgaris L. VI/2 640
Arum maculatum L. II 132
Asarum Europaeum L. III 161
Aspe III 61
Asperula odorata L. VI/1 202
Asphodelus L. II 199
Aspidium Filix mas (L.) Sw. I 18
Asplenium L. I 25
Ruta muraria L. I 31
Trichomanes L. I 26
Astragalus glycyphyllus L. IV/3 1422
Atropa Belladonna L. V/4 2569
Auferstehungspflanzen VII 33
Avena sativa L. I 254

B.

Bach-Nelkenwurz IV/2 917
Bärenschote, Süsse IV/3 1422
Bärentraube V/3 1661
Bärlapp, Keulenförmiger I 66
Baldrian, Gemeiner VI/1 276
Bambuseen I 402
Barbarazweige IV/2 1083
Baumwolle V/1 462/63
Beifuß VI/2 640
Beilwicke IV/3 1461
Benediktenkraut VI/2 991
Bergflachs III 152
Berg-Föhre I 101
Berg-Johannisbeere IV/2 651
Berg-Wohlverleih VI/2 708
Bermudagras I 264
Bertram VI/2 673, 674
Berufskraut, Scharfes VI/1 437, 438
Beschreikräuter II 132, 230; III 152; IV 3 1364; V/4 2413, 2415; VI/1 21, 25, 437, 445
Beschreikraut V/4 2413
, Einjähriges V/4 2415
Besenginster IV/3 1189
Besenpfriem IV/3 1189; VII 183 Fig. 1226 B
Bettstroh VI/1 215
Betula pubescens Ehrh. III 76
Bibernelle IV/2 941
„ Große IV/2 939
Biensaug V/4 2471
Bilsenkraut V/4 2574, 2578
Bingelkraut, Einjähriges V/1 129
Binse II 29, 33, 148
Birke III 76
Bittersüss V/4 2592
Blutkopf IV/2 939
Bocksdorn V/4 2563
Bockshornklee IV/3 1233
Bohne IV/3 1631
Bohnenkraut V/4 2284
Botrychium Lunaria L. I 44
Brach-Sinau IV/2 948
Brassica nigra (L.) Koch IV/1 239
„ oleracea L. IV/1 249
Braunwurz VI/1 33
Brennessel III 138
„ Grosse III 139, 140
Briza media L. I 293
Brombeere IV/2 773, 774
Bromus mutabilis F. Schultz I 363
secalinus L. I 363
Brustwurz, Wilde V/2 1337
Bryonia L. II 219
Buche III 96, 100
Buchs V/1 211
Busch-Windröschen III 522
Butomus L. I 158
Buxus sempervirens L. V/1 211

C.

Calendula officinalis L. VI/2 802, 803
Calla palustris L. II 137
Calluna vulgaris Hull V/3 1699
Cannabis sativa L. III 134
Capsella Bursa pastoris (L.) Medikus IV/1 364
Cardiospermum L. V/1 307
Carduus L. VI/2 845
Carlina L. VI/2 817
acaulis L. VI/2 818, 820
Carthamus tinctorius L. VI/2 987, 989
Carum Carvi L. V/2 1185
Castanea sativa Mill. III 103
Catha edulis Forsk. V/1 244
Celtis australis L. III 123
Centaurea Cyanus L. VI/2 965
Jacea L. VI/2 949
Centaurium umbellatum Gilibert V/3 1970, 1971
Cercis Siliquastrum L. IV/3 1134
Cereus Haw. V/2 684, 686, 692
Cerinthe glabra Miller V/3 2190
Chaerefolium Cerefolium (L.) Schinz et Thellung V/2 1029
Chelidonium maius L. IV/1 21, 22
Chenopodium Bonus Henricus L. III 221
Chimaphila umbellata DC. V/3 1595, 1596
Chlorangium Jussuffii Link V/1 547
Christbaum V/1 242
Christophskraut III 478
Christusdorn, Echter IV/2 936
Chrysanthemum L. VI/2 596, 597
Leucanthemum L. VI/2 609, 613
Parthenium Bernh. VI/2 619
Tanacetum Karsch VI/2 621, 622
Cicer arietinum L. IV/3 1501
Cichorium Intybus L. VI/2 995
Cirsium Miller VI/2 867
„ oleraceum Scop. VI/2 901
Cistus L. V/1 555
Citrus L. V/1 56
medica L. subsp. Limonum V/1 66 u. f.
medica L. var. digitata Risso V/1 68
medica L. var. lageniformis Roemer V/1 65
Cnicus Benedictus L. VI/2 991
Coix lacryma Jobi L. I 181
Colchicum autumnale L. II 195, 198
Comarum palustre L. IV/2 809
Commiphora Jacq. V/1 83, 84
Conium maculatum L. V/2 1085, 1086
Convallaria majalis L. II 274; VII 102 Fig. 1132
Convolvulus arvensis L. V/3 2089
Coriandrum sativum L. V/2 1073
Coriaria L. V/1 213
Cornus mas L. V/2 1552, 1553
Corylus Avellana L. III 72
Cotinus Coggygria Miller V/1 228
Crataegus azarolus L. IV/2 730
Crepis tectorum L. VI/2 1167
Crocus L. II 298
Cucumis sativus L. VI/1 322
Cuminum Cyminum L. V/2 1139
Cycas revoluta Thunb. I 73
Cyclamen Europaeum L. V/3 1846
Cydonia oblonga Mill. IV/2 691
Cynodon dactylon Pers. I 264
Cyperus flavescens L. II 11
Cypressenkraut VI/2 672
Cytisus Kewensis hort. IV/3 1168
purgans Bentham IV/3 1168

D.

Dach-Pippau VI/2 1167
Dactylis glomerata L. I 294
Daphne Blagayana Freyer V/2 724
Mezereum L. V/2 709, 712, 713
Datura Stramonium L. V/4 2616
Daucus Carota L. V/2 1525
Dentaria enneaphylla L. IV/1 332
Dictamnus alba L. V/1 77
Dill V/2 1294
Dipsacus sativus (L.) Honckeny VI/1 283
Diptam V/1 77
Dirlitze V/2 1552, 1553
Distel VI/2 845
Donnerbart IV/2 522, 525
Dornenkrone IV/2 936; V/1 328
Dornmyrte II 265
Dost V/4 2332
Draba verna L. IV/1 389
Drachenwurz II 137
Dracunculus vulgaris Schott II 134
Dreifaltigkeitsblümchen V/1 597, 605
Drosera L. IV/2 498, 502

E.

Eberesche IV/2 711
Eberraute VI/2 635
Eberwurz VI/2 817, 818
„ , Stengellose VI/2 820
Echinocactus Link et Otto V/2 684
Echium plantagineum L. V/3 2192
„ vulgare L. V/3 2196
Edelgamander V/4 2529
Edelnuß III 7, 9
Edelraute VI/2 649
Edeltanne I 82
Edelweiß VI/1 458, 461
Efeu V/2 924, 925
Eibe I 80
Eiche III 108
Einbeere, Vierblätterige II 277
Eisenhut III 493
Blauer III 495
Eisenkraut V/3 2242
Elodea Michx. I 160
Elsbeere IV/2 1068
Engelsüss I 41
Engelwurz V/2 1344
Enzian V/3 1956
„ , Gelber V 1993
Epilobium angustifolium L. V/2 814
Erbse IV/3 1613, 1618
Erdbeerbaum V
Erdbeere IV/2 991
Erd-Eichel IV/3 1593
Erdmäuse IV/3 1593
Erdrauch, Gemeiner IV 1 47
Erdscheibe V/3 1846
Erigeron acer L. VI 437 438
Eriophorum L. II 17
Erle III 92
Erodium cicutarium L'Hérit. IV/3 1723
Eruca vesicaria (L.) Cav IV 1
Eryngium L. V/2 976
maritimum L. V/2 981
Erythroxylon Coca Lam. V 4 37; VII 185 Fig. 1229
Esche V/3 1933
Espe III 61
Esrog V/1 65
Estragon VI/2 637
Ethrog-Zitronen V/2 792
Eucalyptus L'Hérit. V 2 786
Eugenia caryophyllata Thunb. 779
Eupatorium cannabinum L. VI 402
Evonymus L. V/1 249, 252
Exacum L. V/3 1956

F.

Färber-Saflor VI/2 989
Färber-Waid IV 1 198
Fagus silvatica L. III 96, 100
Fastnacht I 188; V/1 36
Faulbaum V/1 347, 348
Feder-Pfriemengras I 203; VII Fig. 1181
Feigwurz III 542, 544
Fenchel V/2 1288
Ferula communis L. V/2 1355
Fetthenne, Grosse IV/2 522, 525
, Weisse IV/2 536
Feuerlilie II 237
Feuer-Mohn IV/1 31
Fichtenspargel V/3 1602
Filipendula Miller IV/2 971
hexapetala Gilib. IV/2 975
„ Ulmaria (L.) Maxim. IV/2 974
Finger-Hundszahn I 264
Fingerkraut, Kriechendes IV/2 889
Flachs V/1 32 u. f.
„ , Wilder I 203
Flechtbinse II 29, 33
Flecken-Schierling V/2 1086
Fleischbeere IV/2 651, 652

Flieder V/3 1910
Flockenblume, Gemeine VI/2 949
Foeniculum vulgare Miller V/2 1288
Fragaria vesca L. IV/2 901
Frangula Alnus Miller V/1 347, 348
Frauenmantel, Gemeiner IV/2 969
Fraxinus excelsior L. V/3 1933
Ornus L. V/3 1925; VII 198 Fig. 1238
Fronleichnamsbirke III 76
Froschlöffel I 151
Frühlingsenzian V/3 2014
Frühlings-Hungerblümchen IV/1 389
„ -Schlüsselblume V/3 1753, 1754
Fünffingerkraut IV/2 889
Fumaria officinalis L. IV/1 47

G.

Gänse-Fingerkraut IV/2 891
Gänserich IV/2 891
Gagea arvensis Dum. II 207
Gagelstrauch, Echter III 11
Galega officinalis L. IV/3 1390
Galium verum L. VI/1 215
Gamskresse IV/1 134
Garcinia L. V/1 501, 502
Gartenbohne IV/3 1636
Gartenkohl IV/1 249
Gartensalat VI/2 1121, 1122
Gauklerblume VI/1 37
Geissfuss V/2 1212
Geissraute IV/3 1390
Gemüsekohl IV/1 249
Gentiana L. V/3 1956
Cruciata L. V/3 2006
lutea L. V/3 1993
verna L. V/3 2014
Gerberstrauch V/1 213
Germer, Weisser II 193; VII 555 Fig. 1272
Gerste I 396
Geum rivale L. IV/2 917
Gewürznelkenbaum V/2 779
Gift-Hahnenfuß III 546
Ginkgo biloba L. I 74
Glaux maritima L. V/3 1868
Glechoma hederaceum L. V/4 2377
Gleditschia triacanthos L. IV/2 936
Gletscher-Hahnenfuß III 574
Gliedkraut V/4 2402
Glücksklee IV/3 1304, 1647
Glycine hispida Maxim. IV/3 1621
Gnaphalium silvaticum L. VI/1 463
Gold-Gilbweiderich V/3 1861
Gold-Klee IV/3 1294
Goldmelisse V/4 2507
Gossypium L. V/1 462, 463
Granatapfelbaum V/2 764, 765
Günsel IV/4 2537
Gundelrebe V/4 2377
Gundermann V/4 2377
Guter Heinrich III 221

H.

Haarstrang IV/2 975
Haberfeldtreiben I 254
Habichtskraut VI/2 1201
Langhaariges VI/2 1201, 1202
Hagedorn, Gemeiner IV/2 1018
Hahnenfuss, Brennender III 550
Hahnensporn V/4 2270
Hanf III 134
Haselnuss III 72
Haselwurz, Europäische III 161
Hasenbrod I 293
Hasen-Klee IV/3 1324
Hauhechel IV/3 1227
Hauswurz IV/2 547, 549, 550
Hauszwiebel II 232
Heckenrose IV/2 1035
Hedera Helix L. V/2 924, 925
Heidekraut V/3 1699
Heidelbeere V/3 1680, 1681
Heide-Myrte III 11
Helichrysum Gaertn. VI/1 470
Helleborus foetidus L. III 465
Helodea Michx. I 160
Hemerocallis fulva L. II 204
Hennah-Strauch V/2 748
Heracleum Sphondylium L. V/2 1454
Herbstzeitlose II 198
Hexen I 67, 93; II 132, 219; III 108; IV/2 711, 1068; IV/3 1341; V/1 332, 443; V/2 713, 1086, 1159, 1185, 1400; V/3 2055; V/4 2377, 2569, 2578, 2616; VI/2 640, 827
Hexendorn V/1 332
Hieracium Pilosella L. VI/2 1201, 1202
Hierochloë odorata Wahlenb. I 201
Himmelfahrtsblümle VI/1 456
Himmelhopfen, Echter IV/3 1294
Hirschzunge I 34
Hirse, Echte I 188
Hirtennadel IV/3 1723
Hirtentäschel IV/1 364
Holcus borealis Schrad. I 201
„ odoratus L. I 201
Holunder, Schwarzer VI/1 238, 239
Honigklee IV/3 1237
Hopfen III 130
Hordeum L. I 396
Hornklee, Gemeiner IV/3 1371
Hülsenfrüchte IV/3 1142
Huflattich VI/2 678
Hummel-Ragwurz II 330
Humulus Lupulus L. III 130
Hunds-Rose IV/2 1035
Hundszahn I 264
Hyoscyamus niger L. V/4 2574, 2578
Hypericum perforatum L. V/1 529
Hyssopus officinalis L. V/4 2360

I. (J.)

Jacquinia L. V/3 1714
Jakobitag V/1 36
Jakobs-Kreuzkraut VI/2 775
Jerichorose IV/1 70
, Echte IV/1 70
Ilex Aquifolium L. V/1 237, 242, 243
Immergrün V/3 2055
Immortelle VI/1 470
Impatiens Noli tangere L. V/1 317
Inula Helenium L. V/1 477
„ spiraeifolia L. VI/1 482
Johanneshändchen I 18; II 337
Johannisbeere, Schwarze IV/2 653
Johannisbrot, Wildes IV/3 1134
Johanniskraut, Echtes V/1 529
Johannisnacht I 18
Johannistag III 96; V 529; V/3 1932
Johanniswedel IV/2 974
Iris L. II 219
Germanica L. II 292
Pseudacorus L. II 293
Isatis tinctoria L. IV/1 198
Judasbaum IV/3 1134
Judasverbrennen III 108
Juglans regia L. III 7, 9
Juniperus communis L. I 90
Juncus L. II 148
Juniperus communis subsp. nana (Willd.) Briquet I 92; VII 152 Fig. 1180
Sabina L. I 92, 93

K.

Käsepappel V/1 487
Kalabarbohne IV/3 1624
Kalmus II 135
Kamille, Echte VI/2 583
Karfreitag I 179 III 92; IV/2 1105; V/3 1932
Karsamstag III 108
Kartoffel V/4 2606
Katzenminze V/4 2370
Katzenpfötchen VI/1 456
Kellerhals V/2 709, 712, 713
Kicher, Deutsche IV/3 1606
Kichererbse IV/3 1501
Kirsche IV/2 1083
Klee IV/3 1278
Kleeblatt, Vierblätteriges IV/3 1341
Klette VI/2 827
Knäuelgras I 294
„ Gemeines I 294
Knautia arvensis Coult. VI/1 292
Knoblauch II 230
Knöllchen-Knöterich III 196
„ -Steinbrech IV/2 615
Knollen-Rüsterstaude IV/2 975
Koelreuteria paniculata Laxm. V/1 307
Königsblume V/2 724
Königskerze VI/1 8
Kleinblumige VI/1 16

Kohldistel VI/2 901
Kohlröschen II 365
Korn I 389
Kornblume VI/2 965
Krapp VI/1 232
Kratzdistel VI/2 867
Kräuterbüschel I 113; V/2 814
Kräuterkissen I 198
Kraut IV/1 249
Krautweihe IV/3 1278
Krebsschere I 163
Kresse, Grasblätterige IV/1 92
Kreuzblume, Bittere V/1 112
Kreuz-Enzian V/3 2006
Kreuzkümmel V/2 1139
Krummholzkiefer I 101
Küchen-Kohl IV/1 249
Küchen-Zwiebel II 232
Kümmel, Wiesen- V/2 1186
Kuhhornklee IV/3 1281

L.

Labkraut, Echtes VI/1 215
Laburnum alpinum Presl IV/3 1106
Lactuca sativa L. VI/2 1121, 1122
Lärche I 95
Lagenaria vulgaris Ser. VI/1 314
Lamium album L. V/4 2447
maculatum L. V/4 2450
Lappa Adans. VI/2 827
Lapsana communis L. VI/2 1002
Larix decidua Mill. I 95
Lathyrus sativus L. IV/3 1606
„ tuberosus L. IV/3 1593
Laurus nobilis L. IV/1 12
Lavandula latifolia Vill. V/4 2277
officinalis Chaix ex Vill. V/4 2279
Lavendel, Echter V/4 2279
Lawsonia inermis L. V/2 748
Ledum palustre L. V/3 1626
Lein V/1 32 u. f.
Leinblatt III 152
Leinkraut VI/1 25
Lens culinaris Medikus IV/3 1504
Leontopodium alpinum Cass. VI/1 458, 461
Lepidium graminifolium L. IV/1 92
ruderale L. IV/1 84
„ sativum L. IV/1 82
Levisticum officinale Koch V/2 1352, 1353
Lichtmess V/1 36
Liebstöckel V/2 1352, 1353
Ligusticum Mutellina (L.) Crantz V/2 1322
Ligustrum vulgare L. V/3 1949
Lilie, Weisse II 235
Lilium bulbiferum L. II 237
candidum L. II 235
„ Martagon L. II 236
Limonium vulgare Miller V/3 1882
Linaria vulgaris Miller VI/1 25
Linde V/1 443 u. f.
Linse IV/3 1504
Linum catharticum L. V/1 8
„ usitatissimum L. V/1 32 u. f.
Llagunoa nitida Ruiz et Pav. V/1 307
Löwenzahn VI/2 1084, 1091
Lolium temulentum L. I 376
Lophophora Coult. V/2 684
Lorbeer, Echter IV/1 12
Lotosblume, Indische III 438
Lotus, Blauer III 441
, Weisser III 441
„ corniculatus L. IV/3 1371
Lungenkraut, Echtes V/3 2216
Lupine, Weisse IV/3 1154
Lupinus albus L. IV/3 1154
Lycium Europaeum L. V/4 2563
Lycopodium alpinum L. I 69
clavatum L. I 66
complanatum L. I 67; VII 148 Fig. 1174
„ Selago L. I 65
Lysimachia vulgaris L. V/3 1861
Lythrum Hyssopifolia L. V/2 756

M.

Mädesüss IV/2 974
Mäusedorn II 265
Mäuse-Klee IV/3 1324
Maibäume III 76, 79
Maienstecken III 63
Maiglöckchen II 274; VII 102 Fig. 1132
Mais I 179; VII 41 Fig. 1068
Majorana hortensis Moench V 4 2334
Maitrank VI/1 202
Malus communis Lam. IV/2 751
Malva L. V/1 454
Alcea L. V/1 479
neglecta Wallr. V/1 487
„ verticillata L. V/1 475
Malve, Kleine V/1 487
Mandragora Juss. V/4 2559
Manna V/3 1925; VII 198 Fig. 1238
Mannaregen V/1 547
Mannstreu V/2 976
Mariä Himmelfahrt I 113
Margarethentag III 72
Mariendistel VI/2 917, 919
Mariengras, Wohlriechendes I 201
Marrubium vulgare L. V/4 2396
Massholder V/1 288
Mastix-Strauch V/1 231
Matricaria Chamomilla L. VI/2 583, 584
Mauerpfeffer, Falscher IV/2 540
, Scharfer IV/2 536
„ , Weisser IV/2 536
Mauerraute I 31
Maulbeerbaum, Schwarzer III 130
Maus-Wicke IV/3 1553
Medicago Arabica All. IV/3 1270
Medicago arborea L. IV 1250
„ sativa L. IV/3 1261
Meerstrand-Milchkraut V 3 1868
Meerzwiebel, Zweiblätterige II 247
Mehlbeerbaum IV/2 716
Meisterwurz V/2 1400
Melia Azedarach L. V 85
Melilotus Hill IV 37
altissimus Thuill IV 3 1243
„ officinalis Medicus IV 3 1245
Melissa officinalis 4 2306
Melisse V/4 2306
Melittis Melissophyllum L. V/4 2471
Mentha Pulegium L. V 4 2341
Menyanthes trifoliata L. V 3 1960
Mercurialis annua L. V 129
Milzfarn I 25
„ , Brauner I 26
Mimulus guttatus DC VI 37
Mispel, Italienische IV 730
„ , Welsche IV
Mistel III 146, 148
Möhre V/2 1526
Mönchs-Rhabarber III
Mohn IV/1 31
Monarda L. V/4 2507
Mondraute, Gemeine I 44
Monotropa Hypopitys L.
Moorbeere V/3 1685
Moor-Birke III 76
Morus nigra L. III
Moschus-Schafgarbe VI 557
Moses' Dornbusch IV/2 726
Mutterkraut VI/2 619
Myrica Gale L. III 11
Myroxylon Forst. IV 3 1144
Myrrhis odorata Scop. V/2 1045
Myrte, Brabanter III 11
, Echte V/2 792
Myrtenkranz V/2 792
Myrtus communis L. V/2 792

N.

Nachtschatten V/4 2594
Nagelkraut IV/2 941
Narcissus poëticus L. II 316
Narzisse, Weisse II 316
Natternkopf, Gemeiner V/3 2196
„ , Violetter V/3 2192
Nelumbium speciosum Willd. III 438
Nelumbo nucifera Gärtn. III 438
Nepeta Cataria L. V/4 2370
Neujahr III 149
Nicotiana L. V/4 2621
Nieswurz, Stinkende III 465
Nigritella nigra (L.) Rchb. II 365
Nitraria retusa Aschers. V/1 41
Nymphaea alba L. III 441
Lotus L. III 441

O.

Odermennig IV/2 935
Odontospermum pygmaeum (Coss. et Dur.) O. Hoffmann IV/1 70

Oelbaum V/3 1938
Oenanthe aquatica Poiret V 1268
Ohmkraut IV/2 948
Olea chrysophylla Lam. V/3 1934
„ Europaea L. V/3 1938
Ononis spinosa L. IV/3 1227
Ophiocaryon paradoxum Schomb. V/1 309
Ophrys L. II 330
Opium IV/1 35
Orchis L. II 335, 337; VII 3 Fig. 970
Origanum vulgare L. V/4 2332
Osterluzei, Gemeine III 163
Oxycoccus quadripetalus Gilibert V/3 1689

P.

Paeonia L. III 454, 455
Paliurus aculeatus IV/2 936
„ Spina-Christi Miller V/1 328
Palm III 35, 72, 76; V/1 237.
Palmsonntag I 80, 93; II 35; V 1 212
Palm-Weide III 34
Panicum miliaceum L. I 188
Papaver Rhoeas L. IV/1 31
„ somniferum L. IV/3 35
Pappel III 59, 61, 63
Paris quadrifolius L. II 277
Pastinaca sativa L. V/2 1414
Paternoster-Erbse IV/3 1498
Periploca L. V/3 2064
Perückenstrauch V/1 228
Petersilie V/2 1159
Petroselinum hortense Hoffm. V/2 1159
Peucedanum Ostruthium Koch V 1400
Pferdebohne IV/3 1560
Pfingsten II 63, 76, 135
Pfingstrose III 454, 455
Phalaris arundinacea L. I 197
Phaseolus vulgaris L. IV/3 1636
Physostigma venenosum Balf. IV/3 1624
Pimpernuss, Wilde V/1 260
Pimpinella Anisum L. V/2 1211
„ saxifraga L. V/2 1207, 1208
Pinus montana Mill. I 101
Pirola rotundifolia Fernald V/3 1589
„ uniflora L. V/3 1592
Pistacia L. V/1 231
Pisum sativum L. IV/3 1613, 1616, 1618
Plantago Coronopus L. VI/1 189
lanceolata L. VI/1 179, 184
„ maior L. VI/1 181, 182
Plectranthus L'Hérit. V/4 2270
Poa pratensis L. I 305
Polei V/4 2341
Polygala amara L. V/1 112
Chamaebuxus L. V/1 94
„ Senega L. V/1 90
Polygonatum All. II 269; VII Fig. 1066/67
Polygonum viviparum L. III 196
Polypodium vulgare L. I 41
Populus nigra L. III 63
„ tremula L. III 61
Potamogeton L. I 122
Potentilla anserina L. IV/2 891
„ reptans L. IV/2 889
Preisselbeere V/3 1674
Primula glutinosa Wulfen V/3 1782
„ veris L. V/3 1753, 1754
Protium Burm. V/1 84
Prunus avium L. IV/2 1083
Cerasus L. IV/2 1078
domestica L. IV/2 1112
Padus L. IV/2 1068
„ spinosa L. IV/2 1105
Pteridium aquilinum Kuhn I 37
Puffbohne IV/3 1560
Pulmonaria officinalis L. V/3 2216
Punica Granatum L. V/2 764, 765
Purgier-Lein V/1 8

Q.

Quecke, Gemeine I 384
Quendel V/4 2326
Quercus Robur L. III 108
Quitte IV/2 691

R.

Rainfarn VI/2 621/2
Rainkohl, Gemeiner VI/2 1002
Rainweide V/3 1949
Ranunculus Ficaria L. III 542, 544
Flammula L. III 550
glacialis L. III 574
„ Thora L. III 546
Raphanus Raphanistrum L. IV/1 285
Räucherkerzen II 199
Rauke IV/1 203
Raute V/1 72
Reiherschnabel IV/3 1723
Rettich, Gemeiner IV/1 285
Rhamnus cathartica L. V/1 332
Rhododendron L. V/3 1629
Rhynchospora alba Vahl II 48
Ribes alpinum L. IV/2 651
nigrum L. IV/2 653
Ricinus communis L. V/1 121
Riesen-Süßgras I 322
Ringelblume VI/2 802/3
Rispenhirse I 188
Roggen I 389
Rohr I 272
Rohr-Glanzgras I 197
Rohrkolben I 112
Rosa L. IV/2 986, 987, 988
Rosa canina L. IV/2 1035
„ eglanteria L. IV/2 1018
Rosenkränze I 181; II 285; IV/2 787; IV/3 1498; V/1 85, 307, 585; V/2 786, 892, 1353
Rosmarinus officinalis L. V/4 2520, 2522
Rosskastanie, Gemeine V/1 303
Rotbuche III 96, 100
Rot-Erle III 92
Rot-Klee IV/3 1341
Rubia tinctorum L. VI/1 232
Rubus fruticosus L. IV/2 773, 774
„ Idaeus L. IV/2 773, 774
Ruhrkraut VI/1 463
Rumex Acetosa L. III 180
alpinus L. III 173
„ obtusifolius L. III 173, 174
Rüsterstaude IV/2 971, 974
Ruscus aculeatus L. II 265
Ruta graveolens L. V/1 72, 73

S.

Saathafer I 254
Saat-Platterbse IV 3 1606
Sadebaum I 92, 93
Salbei, Edler V/4 2485
Salix alba L. III 23
Babylonica V/2 792
„ caprea L. III 34
Salomonssiegel II 269; VII Fig. 1067
Salvia officinalis L. V/4 2485
„ pratensis L. V 1 2501
Sal-Weide III 34
Sambucus Ebulus L. VI/1 237
nigra L. VI/1 238, 239
Sanguisorba minor Scopoli IV/2 941
officinalis L. IV/2 939
„ spinosa (L.) Bertoloni IV/2 936
Santalum L. III 151
Santolina Chamaecyparissus L. VI/2 672
Sapindus L. V/1 307
Saponaria officinalis L. III 345
Sarcostemma R. Br. V/3 2064
Sarothamnus Wimmer IV/3 1189
Saxifraga granulata L. IV/2 615
Satureja hortensis L. V/4 2284
Saubohne IV/3 1560
Sauerampfer, Großer III 180
Sauerkirsche IV/2 1078
Sauerkraut IV/1 247, 251
Schabzigerklee IV/3 1234 u. f.
Schafgarbe, Gemeine VI/2 572
Scharbockskraut III 542, 544
Schellkraut IV/1 21, 22
Schilfrohr I 272
Schlafäpfel IV/2 983; VII 107 Fig. 1140
Schlagkräutlein V/4 2541
Schlangenmoos I 66
Schlangenwurz, Gemeine II 134; VII 134
Schlehdorn IV/2 1105
Schleichera Willd. V/1 307
Schlitz-Wegerich VI/1 189
Schlüsselblume, Frühlings- V/3 1754
„ , Klebrige V/3 1782
Schmerwurz IV/2 522, 525
Schnabelbinse, Weiße II 48
Schöllkraut IV/1 21, 22
Schotenklee IV/3 1371

Schutt-Kresse IV/1 84
Schwalbenwurz V/3 2072
Schwanenblume I 158
Schwarzdorn IV/2 1105
Schwarz-Erle III 92
„ -Pappel III 63
Schwarzwurzel, Kleine VI/2 1060
Schwertlilie II 219
Scilla bifolia L. II 247
Scirpus L. II 29, 33
lacustris L. II 29
„ maritimus L. II 33
Scolopendrium vulgare Sm. I 34
Scopolia Carniolica Jacq. V/4 2573
Scorzonera Hispanica L. VI/2 1063
„ humilis L. VI/2 1060
Scrophularia nodosa L. VI/1 33
Secale cereale L. I 389
Securigera Securidaca Degen et Dörfler IV/3 1461
Sedum acre L. IV/2 536
album L. IV/2 536
mite Gilib. IV/2 540
„ Telephium L. IV/2 522, 525
See-Binse II 29
Seidelbast V/2 709, 712, 713
Seifenkraut III 345
Selenicereus grandiflorus Mill. V/2 684
Sellerie V/2 1145
Sempervivum tectorum L. IV/2 547, 549, 550
Senecio alpinus Scop. VI/2 749
„ Jacobaea L. VI/2 775
Senf IV/1 239
Schwarzer IV/1 239
, Weißer IV/1 207
Senfkohl IV/1 239
Setaria Italica (L.) Pal. I 194
Seviebaum I 92, 93
Sideritis L. V/4 2402
Sigmarskraut V/1 479
Silberbaum IV/2 716
Silberkraut IV/2 891
Silber-Weide III 23
Siler montanum Crantz V/2 1471
Silybum Marianum Gaertn. VI/2 917, 919
Simse II 29, 33
Sinapis alba L. IV/1 207
Sinngrün V/3 2055
Smyrnium Olus-atrum L. V/2 1079
Soja-Bohne IV/3 1621
Solanum Dulcamara L. V/4 2592
nigrum L. V/4 2594
„ tuberosum L. V/4 2606
Sommer-Eiche III 108
-Linde V/1 452
„ -Zwiebel II 232
Sonnentau IV/2 498, 502
Sorbus Aria (L.) Crantz IV/2 716
„ aucuparia L. IV/2 711
Sphaerothallia V/1 547
Speik, Großer V/4 2277
Spierstaude IV/2 971
Spindelstrauch V/1 249, 252
Spitz-Ahorn V/1 283
-Klee IV/3 1312
„ -Wegerich VI/1 179, 184
Stabwurz, Wilde VI/2 670
Stachys annuus L. V/4 2415
Germanicus L. V/4 2426
paluster L. V/4 2418
„ rectus L. V/4 2413
Staphylea pinnata L. V/1 260
St. Benedikt II 223
Stechapfel V/4 2616
Stechpalme V/1 237, 242, 243
Steckenkraut V/2 1355
Steinklee IV/3 1237
Blauer IV/3 1234 u. f.
Hoher IV/3 1243
Kleiner gelber IV 1245
Steinwurzel IV/3 1227
Steppenhexen III 310; VI/2 936
Stiefmütterchen V/1 597, 605
Stiel-Eiche III 108
Stink-Kresse IV/1 84
Stink-Wacholder I 92, 93
Stipa pennata L. I 203; VII 153 Fig. 1181
Stranddistel V/2 981
Strand-Flechtbinse II 33
Stratiotes aloides L. I 163
Streifenfarn I 25
Sturmhut III 493
Styrax L. V/3 1900
officinalis L. V/3 1900
Succisa pratensis Moench VI/1 288
Süßdolde, Wohlriechende V/2 1045
Süßholz, Wildes IV/3 1422
Süßkirsche IV/2 1083
Sumpf-Bitterklee V/3 1960
-Blutauge IV/2 809
-Drachenwurz II 137
-Porst V/3 1626
-Steinklee IV/3 1243
„ -Ziest V/4 2418
Syringa villosa Vahl V/3 1910
Syzygium Gaertn. V/2 780

T.

Tabak V/4 2621
Täschelkraut, Rundblätteriges IV/1 134
Tamarix Nilotica Ehrenb. V/1 547
Tanghinia Dupet. Thou. V/3 2050
Tannen-Bärlapp I 65
Taraxacum officinale Weber VI/2 1084, 1088, 1091
Taubecher IV/2 969
Taubnessel, Gefleckte V 4 2450
„ Weiße V/4 2447
Tausendgüldenkraut V/3 1970, 1971
Taxus baccata L. I 80
Teichbinse II 29
Teucrium Chamaedrys L. V 4 2529
Teufelsabbiß VI/1 288
Thesium L. III 152
Thlaspi rotundifolium (L. Gaudin IV/1 134
Thymian V/4 2308
Thymus Serpyllum L. V 4 2326; VII 200 Fig. 1241
„ vulgaris L. V/4 2308
Tilia cordata Mill. V 1 443 u. f.
„ platyphyllos Scop. V/1 452
Tollkirsche V/4 2569
Tollkraut, Krainer V/4
Tränengras I 181
Tränenweide V/2 792
Trapa natans L. V/2 892
Traubenkirsche IV 1068
Trespe I 363
Trifolium L. IV/3 1278
agrarium L. IV 3 1294
alpinum L. IV 3 1316
arvense L. IV 3 1324
montanum L. IV 3 1312
pratense L. IV/3 1341
„ repens L. IV/3 1366
Trigonella caerulea Ser IV 1234 u. f.
„ Foenum Graecum I IV
Triticum aestivum L. I 395
cereale Schrank I 395
sativum Lam. I 395
Spelta L. I 392
tenax Aschers. et Graebner
subsp. vulgare Aschers. et Graebner I 395
„ vulgare Vill. I 394
Tüpfelfarn, Gemeiner I 41
Türkenbund II 236
Tussilago Farfara L. VI/2 678
Typha L. I 112, 113; VII 134

U.

Unruh siehe Hexen
Urechites Müll.-Arg. V 2050
Urtica L. III 138
dioeca L. III 139, 140

V.

Vaccinium Myrtillus L. V/3 1680, 1681
uliginosum L. V/3 1685
„ Vitis Idaea L. V/3 1674
Valeriana officinalis L. VI/1 276
Veilchen, Wohlriechendes V/1 651, 652
Veratrum album L. II 193; VII 555
Verbascum L. VI/1 8
„ Thapsus L. VI/1 16
Verbena officinalis L. V/3 2242
Veronica officinalis L. VI/1 59
Vicia Ervilia Willd. IV/3 1514
Faba L. IV/3 1560
„ Narbonensis L. IV/3 1553
Vinca minor L. V/3 2055
Vincetoxicum officinale Moench V/3 2072

Viola odorata L. V/1 651, 652
„ tricolor L. V/1 597, 605
Viscum album L. III 146, 148
Vitex L. V/3 2237
Vitis vinifera L. V/1 372 bis 379, 384 bis 398, 424
Vogelbeerbaum IV/2 711
Vogelkirsche IV/2 1083

W.

Wacholder I 90
Wald-Ehrenpreis VI/1 59
„ -Erdbeere IV/2 901
Waldmeister VI/1 202
Wald-Weidenröschen V/2 814
Walnussbaum III 7, 9
Warburgia Stuhlmanni Engler V/1 585
Warzenkraut siehe Chelidonium und Euphorbia
Wasserdost VI/1 402
Wasserfenchel V/2 1268
Wassernuß V/2 892
Wasserpest I 160
Wasser-Schwaden I 322
Weber-Karde VI/1 283
Wegerich, Großer VI/1 179, 182
Wegwarte VI/2 995
Weichsel IV/2 1078
Weide III 34
Weidenpfeifen III 16
Weiderich, Ysopblätteriger V/2 756
Weihnachten III 148; IV/2 1068
Weihrauch V/1 83
Weinraute V/1 72/3
Wein-Rose IV/2 1018
Weinstock V/1 372 bis 379, 384 bis 398, 424
Weißbaum IV/2 716
Weiss-Klee IV/3 1306
Weisstanne I 82
Weisswurz II 269
Weizen I 395
Wermut VI/2 655
„ , Pontischer VI/2 643
Wetterdistel VI/2 818, 820
Wicklinse IV/3 1514
Widerstoß V/3 1882
Wiesen-Bärenklau V/2 1454
Wiesenklee IV/3 1341
„ , Weißer IV/3 1306
Wiesenknopf, Großer IV/2 939
„ , Kleiner IV/2 941
Wiesen-Wucherblume VI/2 609, 613
Windröschen, Gelbes III 521
Wintergrün, Einblütiges V/3 1592
„ , Rundblätteriges V/3 1589
Winterlieb V/3 1595/6
Winter-Linde V/1 443 u. f.
Witwenblume VI/1 292
Wollblume IV/3 1364
Wollgras II 17
Wollklette, Geflecktblätterige IV/3 1270
Wucherblume VI/2 596/7
Wundklee IV/3 1364
Wurmfarn I 18

Y.

Ysop V/4 2360

Z.

Zahnwurz, Weiße IV/1 332
Zaunrübe II 219
Zea Mays L. I 179; VII 41
Ziest V/4 2415, 2418, 2426
Zistrose V/1 555
Zitrone V/1 66
Zittergras I 293
Zitter-Pappel III 61
Zizyphus vulgaris Lam. IV/2 936
Zürgelbaum, Südlicher III 123
Zwerg-Holunder VI/1 237
„ -Wacholder I 92
Zwiebel II 232
Zwiebelorakel II 232
Zypergras, Gelbliches II 11

Fig. 1272. Veratrum album L. (II, 193), Weißer Germer, mit Früchten. Phot. Dr. G. Hegi, München.

Fig. 1273. Melandrium rubrum Garcke (III, 300), Rote Lichtnelke. Phot. Otto Ziegler, Zollikon (Schweiz).

9. Verzeichnis der Botaniker, die in den Fußnoten der Flora behandelt sind.

(Mit Ergänzungen).

A.

Ade, Alfred IV/2 1019
Afzelius, Adam IV/2 1035
Albizzi, Filippo del IV/3 1123
Aldrovandi, Ulisses IV/2 506
Allioni, Carlo IV/2 557; V/2 1514
Allioth, Sigismund IV/2 1005
Arduino, Pietro (1728—1805)
Arduino, Luigi (1759—1834)
Alschinger, Andreas IV/3 1164; V/2 1080
Ammann, Paul V/2 744
Amsinck, Wilhelm V/3 2127
Andersson, Gunnar, 1865 (Ystad) bis 1928
Arbe, Antonie del' III 348
Arvet-Touvet, Casimir VI/2 1246
Ascherson, Paul I 296; IV/3 1253; VI/1 106
Asnières, Jules de Carrey d' IV/2 742
Aubriet, Claude IV/1 396
Aucher-Eloy, Pierre Martin Remi V/2 1101
Außerdorfer, A. VI/2 1284
Avé-Lallemant, Leopold, Eduard V/2 1422

B.

Babington, Charles Cardale III 245
Balansa, Benjamin V/2 993
Balbis, Giovanni Battista VI/2 1304
Bänitz, K. G. (gest. 1913) VI/2 1219
Baer, Ernst, Karl von VI/1 534
Barckhausen, Gottlieb VI/2 1171
Barrelier, Jacques VI/1 115
Bartsch, Joh. VI/1 82
Bartling, Fr. Gottl. (1798—1875)
Bassi, Ferdinando (1710—1774 in Bologna)
Bastard, T. VI/1 17
Battandier, Jules-Aimé (geb. 1848) V/1 593
Baudot, de III 579
Bauhin, Johann B. III 593; IV/3 1133
Bauhin, Kaspar III 593; VI/2 1238
Baumgarten, Johann Christian Gottlob VI/1 359
Baumgartner, Andreas IV/2 1020
Beauharnais, Eugène de V/2 694
Beauverd, Gustav VI/2 1328
Beck, Günther, Ritter von Managetta V/2 1235; VI/1 358; VI/2 1323
Becke, Friedrich VI/1 17
Becker, Wilhelm VI/2 1271 (1874 bis 1928)
Beer, F. VI/2 1231
Beger, Herbert VI/2 1343
Begon, Michael V/1 663
Bellardi, Carlo Antonio Ludovico IV/2 802; V/2 1385
Belleval Richer de, Pierre IV/1 242
Belli, Honorio V/2 995
Belli, Saverio Carlo IV/1 173
Bentham, George V/2 1329
Benz, Robert von VI/2 1296
Berard, Pierre VI/2 1318
Berini, Giuseppe VI/2 1024
Bertero, C. Joseph IV/1 458
Berthollet, Claude Louis von V/2 767
Bertoloni, Antonio II 332; IV/1 379; V/2 1336; V/4 2500
Besse, François-Maurice V/2 1479; VI/2 985, 1300
Besser, Wilibald S. J. G. IV/1 241; V/2 1295; VI/2 1239
Biasoletto, Bartolommeo V/2 993
Bicknell, Clarence V/2 1098; VI/1 86
Bieberstein, Marschall Friedrich August von IV/3 1544; V/4 2312
Billiet IV/2 1023
Binz, August VI/2 1316
Bitter, Georg (geb. 1873) V/4 2548
Bivona-Bernardi, Antonio VI/2 1269
Blackstone, J. V/3 1966
Blondeau, Pierre IV/2 1033
Bligh, W. V/1 307
Blocki, Bronislaw (gest. 1917 in Lemberg)
Blumenbach, Joh. Friedr. V/1 662
Blytt, M. N. VI/2 1214
Boccone, Paolo IV/3 1280; V/2 1520
Bock siehe Tragus
Boeber, J. v. V/2 1171
Böhmer, Georg Rudolf I 214
Bohadsch, Joh. B. IV/1 146
Boissier, Pierre Edmond V/2 1517; VI/2 1258
Bonanni, Antonio IV/1 204
Bonanni, Vincenzio IV/1 204
Bonjean, Jean-Louis IV/3 1377
Borbás, Gizella v. IV/2 1022
Boreau, Alexander IV/1 192; VI/2 1334
Borone, Francesco V/1 48
Boros, Adam V/4 2319
Borrer, William IV/2 1028
Bouché, Peter Karl II 254
Boussingault, J. B. J. Dieudonné, geb. 1802 in Paris
Bouquoy IV/2 865
Bourgat V/2 977
Bowles, W V/2 956
Bradley, Richard V/2 1464
Brancion, Jan V/2 1090
Brandis, P. Erich VI/1 91
Bras V/2 1126
Braun, Alexander I 23
Braun, Heinrich IV/2 1019
Braun-Blanquet, Josias VI/2 1259
Braune, Franz Anton von IV/2 865
Bray, Fr. G. Graf von IV/1 157, 461
Bremi, Jakob VI/1 167
Breyne, Jakob III 559
Bridel, S. E. (geb. 1763) VI
Briquet, John Isaak V/2 1013, VI 1267
Britton, Nathaniel Lord V/4 2305
Brongnart, A. Th. IV/3 1386
Brotero, Felix de Avellar V/2 1504
Broussonet, Pierre Marie Auguste V/2 1171
Browal, Joh. V/4 2555
Brown, Robert 1781—1858
Brügger, Christian G. IV/2 969, 1043
Brunfels, Otto V/4 2555
Budai, J. VI/2 1242
Buddle, Adam V/3 1952 (lebte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in London)
Buffon, Graf von III 389
Buek, Joh. Nikolaus II 79
Bulliard, Peter IV/2 515
Buonarota VI/1 43
Burnat, Emile (gest. 1920) II 241
Burser, Joachim IV/2 585; V/2 1124
Buser, Robert IV/2 958
Buser, Othmar IV/2 958
Buxbaum, Joh. Christian II 84

C.

Caesalpinus, Andrea IV/3 1127
Caflisch, Jakob Friedrich IV/2 795
Caldesi, Ludovico I 153
Candolle, Augustin Pyramus de IV/1 272
Carmichael, Dug. (1772 bis 1827) IV/3 1390
Carron, C. VI/2 672

Cavanilles, Antonio Jose (gest. 1804) I 247
Cavillier, François VI/2 1327
Čelakovsky, Ladislaus V/4 2327 VI 2 1272
Cesalpino, Andrea III 315; IV/3 1127
Chabert, A. VI/1 108
Chabrey, Dominique V/2 1305
Chaix, Dominique I 303; VI/1
Charmeil VI/1 381
Charpentier, G. F V/3 1797
Chavin, Fr. IV/2 1044
Chenal, Werner de la I 329
Chenevard, Paul VI/2 1318
Cherler, J. H. (1570—1610) III 392
Chesney V/2 1196
Chodat, Robert VI/2 1337
Choisy, Jacques Denys V/1 48
Christ, Hermann V/2 1321; VI/1 96; VI/2 672, 1332
Christiansen, Albert IV/2 1029
Christener, Ch. VI/2 1261
Clairville, Jos. Phil. de VI/2 1300
Clark, Daniel V/2 799
Clarke, J. D. V/2 799
Clary V/2 1287
Clavena, Nikolaus VI/2 559
Clusius, Carolus (de l'Escluse) IV/2 820; V/3 1776; VI/2 724
Cobres, Paul v. II 50
Cogswell V/2 1365
Colladon, Louis Théodore Frédéric V/2 1093
Collins, Z. VI/1 5
Collinson, Peter V/4 2272
Colonna, Fabio IV/1 179; IV/3 1219
Columna IV/3 1219
Conring, Hermann IV/1 440
Coquoz, Denis VI/2 1299
Cordienne, Alexander, Joseph V/2 1298
Cornaz, Eduard IV/2 1024
Cornuti, J. Phill. († 1651 zu Paris)
Correa de Serra, Josef Franz V/1 49
Correns, Carl Erich (geb. 1864) VI/2 1263
Cortusi, J. A. V/3 1816
Corvinus, Georg Ludwig IV/1 189
Coste, Chanoine Hippolyte IV/1 181
Cottet, C. M. VI/2 1304
Crantz, Johann Heinrich Nepomuk IV/2 868; V/2 1311
Cruse, Wilhelm VI/2 778
Cunningham, Richard (1793—1835)
Cupani, Francesco IV/1 204
Cusson, Pierre V/2 1090

D.

Dahl, Andreas VI/1 529
Dalberg, Karl IV/3 1496
Dalla Torre, Karl, Wilhelm († 1928)
Dana, J. Peter Martin V/2 1080
Danthoine, Etienne I 263
Dardar IV/2 742
Davall, Edmund II 54
Deering, Charles V/2 1169
Delasoie, Gaspard IV/2 1038
Dematra IV/2 1030
Deppe, Ferdinand IV/3 1647
Deschamps I 243
Déséglise, Pierre Alfred IV/2 1034; VI/2 1230
Desfontaines, René (Louiche) V/2 1101; V/3 1903
Desvaux, Augustin, Nicaise IV/2 1026
Deutz, Johann van der IV/2 565
Dichtl, P. A. VI/2 1290
Didier, Eugène II 245
Dillenius (Dillen), Johann Jakob IV/3 1362; V/1 493; VI/1 49
Dillon, Quartin IV/1 241
Dioskurides (Dioscorides) Pedanios II 280; V/2 1077
Dodonaeus (Dodoëns), Rembert III 430; V/2 819, 1078
Döll, Joh. Christian VI/2 1242
Dolliner, G. IV/1 410
Dondi, Giacomo de V/2 959
Dortmann VI/1 393
Douglas, David V/2 1421; V/3 1787
Dubois V/4 2558
Duby, J. E. V/1 608
Duchesne, A. N. IV/2 907
Dufft, K. VI/2 1272
Dufour, Jean Marie Léon V/2 1498
Dumortier, Barth. Charles (1797 bis 1877
Durande, Jean François IV/1 273
Dürer, M. VI/2 1243
Durieu de Maisonneuve V/2 830
Dürrnberger, Adolf IV/2 1015

E.

Escluse, Charles de l' IV/2 820; V 3 1776; VI/2 724
Eichenfeldt, Michael VI/2 966
Elsholtz (Elssholz) Joh. Sigismund V/4 2272
Einsele, E. III 483
Engler, Adolf VI/2 1328 († 10. Okt. 1930 in Berlin)
Erdner, Eugen († 1927 in Donauwörth)
Eschscholtz, Johannes Friedrich IV/1 19
Esenbeck, Nees ab V/1 51
Eugen von Savoyen, Prinz V/2 777
Evers, Georg V/4 2465; VI/2 794, VI/2 1296

F.

Fabiano, Franzisco V/4 2556
Facchini, Francesco III 392; IV/2 601; V/2 1450; VI/2 1012
Farkaš-Vukotinovič, Ludwig von IV/2 263; V/2 1364
Farnese IV/3 1125
Farseti, Filippo Antonio IV/1 456
Fauconnet, Ch. VI/2 1299
Faure, A. VI/2 1209
Favrat, Louis V/3 2018; VI/ 100; VI/2 1343
Favre, E. VI/2 1266
Fehr, Michael VI/2 1061
Fenzl, E. (1808—1879)
Ferdinand III, König VI 528
Fest, Bernhard VI/1 17
Fibig, Johann IV/1 456
Fieber, Franz Xaver V/2 994
Fiek, Emil VI/2 1322
Figert, Ernst († 1925)
Figdor, Wilhelm VI/2 907
Fischer, Friedrich Ernst V/2 1326
Fleischer, Franz V/2 821
Fleischer, Bohumil VI/2 908
Fleischmann, Andreas V/2 1410
Flora der Wetterau, von J. Gaertner (1732—1791), Bernhard Meyer und J. Scherbius (1799—1801)
Forster, Edward II 175
Forsyth, W. A. V/3 1903
Fothergill, John IV/2 657
Frankenius, Johann V/1 543
Franzoni, Alberto IV/2 1010
Freyer, Heinrich V/2 993; VI/2 909
Freyn, Joseph V/2 1409; VI/1 100; VI/2 1227
Friedländer IV/2 1028
Friedrichsthal, E. R. V/2 1054
Fries, Elias Magnus VI/2 1335
Fritsch, Karl IV/3 1213; VI/2 1275
Fritze, Richard VI/2 1316
Froelich, Jos. Al. V/3 2003
Fröhlich, Joseph Alois (1766—1841) VI/2 1160
Fuchs, Alfred (1872—1927)
Fuchs, Leonhard von V/2 801, 1384; VI/2 759, 1199
Fuckel, Leopold VI/2 1229
Fürnrohr, Hrch. (gest. 1918 in Regensburg)
Funck, Hrch., Christian (1771—1839) in Gefrees (Fichtelgebirge) IV/2 561

G.

Gaertner, Joseph (1732—1791)
Gage, Thomas II 205
Gaillard de Marentonneau VI/1 534
Gaillard Georges IV/2 1007
Galinsoga, Martinez VI/1 523
Gams, Helmut VI/2 1332
Gander, H. VI/2 1248
Garcin, Lawrence V/1 501
Garcke, August (1819—1904)
Gasparrini, Guglielmo V/2 1298
Gaudin, Jean François Gottlieb Philippe I 262; IV/1 124; IV/2 551; IV/3 1443; V/2 1485; VI/2 1257

Gay, Jacques IV/1 278; V/2 1314
Gay-Lussac, Louis Joseph V/3 1621
Gaza, Theodor v. (1393—1478)
Geisenheyner, F. A. Ludwig VI/2 1271
Gelmi, Enrico VI/2 1294
Gérard, Louis II 159; IV/3 1531; V/1 177
Gerhardt, Karl VI/2 908
Gerstlauer, L. VI/2 985
Gesner, Conrad (1516—1565)
Gibelli, Giuseppe IV/2 1010
Gilibert, Jean Emmanuel V/2 1328
Gioannini, Giaele IV/2 844
Gisler, Anton IV/2 1014
Glaab, Ludwig, in Salzburg († 1928)
Gleditsch, J. G. IV/3 1128
Gmelin, Johann Friedrich V/2 1090
Gmelin, Johann Georg V/2 1090, 1311, 1329
Gmelin, Karl Christian IV/1 221; V/2 1090; VI/2 1245
Gmelin, Samuel Gottlieb V/2 1090
Godet, Charles Henry VI/1 299; VI/2 1259
Godron, Dominique Alexandre IV/2 787
Gohorry, J. V/2 1170
Goller, Andreas VI/2 915
Goodenough, Samuel II 81
Goodyer, John II 390
Gouan, Antoine V/2 1193
Graebner, Erika V/3 1691
Grabowski, Heinrich VI/2 985, 1261
Graf, Sigmund V/2 1087
Gregoire, J. V/3 1787
Gremblich, Julius VI/2 1213
Gremli, August IV/1 134; IV/2 789; VI/1 100; VI/2 1259
Grenier, Charles IV/2 1010
Grisebach, H. R. A. VI/2 1349
Gronovius, Johann Friedrich V/3 2108
Grütter, Max Eugen Heinrich VI/2 590
Gunner, Johann Ernst V/2 895
Günther, Karl Christian IV/1 229; IV/2 802
Guthnick, H. J. VI/2 1225
Guizot, Pierre Guillaume VI/1 532
Guyot, H. VI/2 1299

H.

Hackel, Eduard († 1916)
Hacquet, Balthasar V/2 959; VI/1 123
Hacquet, Belsazar IV/2 678
Haenke, Thaddaeus (1761—1817)
Hagen, Karl Gottfried VI/1 12
Hahn, K. VI/2 1218
Halácsy, Eugen von IV/2 1029
Haller, Albrecht von I 335; III 533; V/2 1492; V/3 1889; VI/2 1307
Hampe, Ernst IV/2 1005
Handel-Mazzetti, Heinrich von VI/2 1086, 1209
Hanhart VI/2 1203
Hänseler, Felix V/2 1080
Hansen V/2 1314
Harder, H. VI/2 962
Haring, Johann IV/2 1022
Harz, Kurt VI/2 1251
Hasselquist, Fredric V/2 1457
Hausmann, Franz Freih. v. V/3 1799; VI/2 1213
Haussknecht, Karl (1838—1903) VI/1 100
Hayek, August von III 284; VI/2 1248
Haynald, Stephan Franz Ludwig V/2 1282
Hayne, Fr. Gottl. (1763—1832)
Heeger, Georg IV/1 365
Heer, Oswald IV/2 1043; V/2 883; VI/2 909
Hegelmaier, Friedrich (1833—1906)
Hegetschweiler, Johann VI/2 1325
Heidenreich, A. VI/2 1044
Heister, Lorenz V/1 88
Hellweger, P. Michael VI/1 161; VI/2 1340
Henning, Johannes V/2 1133
Heucher, J. H. von IV/2 566
Heufler, Ludwig von (1817—1885)
Hildegard, heilige I 112
Hinterhuber, Rudolph VI/2 1212
Hirschfeld, C. C. L. IV/1 226
Hladnik, Franz X. V/2 1026; VI/1 307; VI/2 1026
Hoffmann, Georg Franz V/2 1132
Höger, E. (richtig: A.) in Landeshut VI/2 1323
Hohenwarth, Sigmund Graf zu (1730 bis 1820)
Holm, Th. VI/2 1227
Honckeny, Gerhard August (gest. 1805 in Prenzlau) III 403
Hope, John V/1 534
Hoppe, David Heinrich IV/1 376; IV/2 953; VI/1 35
Hornschuch, Christian Friedrich II 114
Hosack, David IV/3 1352
Host, Nic. Thomas IV/2 589; VI/2 1347
Hotton, Peter V/3 1832
Hudson, William V/1 552
Huegel, Karl Freiherr v. V/2 956
Huet du Pavillon V/2 993
Huguenin, August IV/1 159; VI/2 1294
Hutchins IV/1 132, 357
Huter, P. Rupert IV/1 124; IV/3 1444; VI/2 610

J.

Jabornegg-Gamsenegg, Markus von VI/2 1258
Jaccard, Henri VI/2 1281
Jacquet, Firmin VI/2 1322
Jacquin Nikol. Jos. v. II 152; IV/3 1164, 1354 VI/2 760, 1144
Jäggi, Jakob VI/2 672
Jaquet IV/2 960
Jávorka, Sandor (geb. 1883)
Johann v. Oesterreich, Erzherzog IV/1 384
Jordan, Alexis IV/2 1023; V 1409; VI/2 1301
Irmisch, Thilo (1816—1879)
Isnard, Ant. Danty d' V 2 804
Issler, E. VI/2 1268
Juarez, Carlo Benito VI/1 531
Jundzill, Bonifacius Stanislaus IV 1004
Juratzka, Jakob VI/2 912
Jurine, André VI/2 841
Jussieu, Bernhard (1699—1776) V 799
Justin, Rajko VI/1 355

K.

Kablik, Josephine (1787—1863) VI/2 690
Kaiser, Stanislaus VI/2
Kalm, Peter V/3 1620
Kalmuss, Fr. II 31
Kaltenbach, Johann Heinrich IV 802
Kamel, Georg Jos. V/1 494
Karthäuser Friedrich III 323
Karthäuser, Johann III 323
Käser, Friedrich VI/2 1215
Kerner, J. S. IV/1 142
Kerner von Marilaun, Anton Josef IV/2 1039; IV/3 1173 VI/1 93; VI/2 1304
Khek, Eugen VI/2 911
Kickx, J. VI/1 27
Killermann, Sebastian IV/2 1039
Killias, Eduard IV/2 1042; VI/1 18; VI/2 1291
Kirschleger, Friedrich IV/1 45
Kitaibel, Paul IV/3 1544; V/1 455, 600; V/2 1077, 1136; VI/2 664
Klekovski, Ritter von V/2 1364
Kluk, Christoph IV/1 154; IV/2 1024
Knaf, Josef (1801—1865) IV/2 865
Knaf, Karl fil. VI/2 1333
Knaut, Christoph VI/1 290
Koch, W. D. J. III 248; V/2 1008; V/3 2011; VI/2 910
Koder III 414
Koehler, Johann Christian Gottlieb IV/2 796
Koeler, Georg Ludwig I 281
Koelle, Joh. Ludw. Chr. (1763 bis 1797)
Kollmann, Friedrich V/4 2317
Koelreuter, Johann Gottlieb V/1 308
Korb, E. VI/2 1246
Kornhuber, Andreas VI/2 911

Körnicke, Friedrich A. VI/2 1241
Kotschy, Theod. IV/1 383
Krocker, Anton Johann (1744—1823)
Kükenthal, G. VI/2 1313
Kunze, Gustav (1793—1851) V/2 788
Kylling, Peter V/2 1276

L.

Lachenal, Werner de V/2 1262
Lagasca, Mariano IV/1 154
Lagerström, Magnus von V/2 746
Lagger, Franz IV/2 1045
Lagger, J. VI/2 1224
Laelius, C. IV/1 474
Lamarck, J. B. A. P. M. IV/1 221
La Marck IV/1 221
Lamy, Eduard V/2 843
Lapeyrouse, Philipp, Picot von V/2 1124
Lasch, W S. VI/2 1223
Lassaux V/2 977
La Tourette, Marc Antoine V/2 1370
Lawson, John V/2 746
Leche, Johann V/1 552
Ledebour, Karl Friedrich von V/2 1196
Leers, J. D. II 66
Lehmann, Alexander V/2 1422
Leichtlin, Max V/2 1403
Le Monnier, Louis Guillaume V/2 1304
Leo V/1 17
Leresche, Louis IV/1 123; V/2 1169
Lespedez, D. IV/3 1463
Lesson, R. P. V/2 974
Levier, Emile IV/2 1042
Leysser, Friedrich Wilhelm von VI/2 1034
Linder af Lindestolpe V/2 994
Lindern, Franz. Balth. VI/1 39
Link, Heinrich Friedrich VI/2 911
Linné, Karl Ritter von VI/1 245
Liotard, Pierre II 210
Lippi, August V/3 2235
Lister, Martin II 386
Lloyd, Edward II 213
Lobelius (de l'Obel), Matthias IV/1 160; VI/1 392
Löfling, Peter (1729—1756)
Logan, James V/3 1949
Löhr, Matthias Joseph IV/2 795
Loiseleur-Deslongchamps, J. L. A. V/3 1647
Longa, Massimo VI/2 1248
Lonitzer, Adam VI/1 249
Lopez, Theodor V/2 803
Loret, Henri V/2 1027
Loesel, Johann II 393; IV/1 174; VI/1 25
Louiche V/2 1101
Loyola, Ignatius V/3 1951
Ludwig, C. H. V/2 804
Luerssen, Christian V/2 1138
Lumnitzer, Stephan (1750—1806)
Lüscher, Hermann VI/2 1343
Lutze, Günther IV/2 1013

M.

Mac Mahon (1750—1816)
Malabaila v. Canal V/2 1087
Malpighi, Marcello V/1 86
Mantegazzi, Paolo V/2 1422
Maranta, Bartolommeo I 39
Marcgraf, Georg (1610—1644)
Marchesetti, Karl v. VI/1 354; VI/2 1347
Margittai, E. VI/2 1347
Mari, G. L. IV/3 1202
Marschall v. Bieberstein IV/3 1544; V/2 1258; V/4 2312
Marsigli, L. F. I 48
Martens, Charles IV/1 192
Marti, Benedikt V/3 1787
Mathonnet, R. IV/2 1052
Matthiolus (Mattioli), Pietro Andrea IV/1 468; V/2 1078, 1277
Mauchart, B. D. V/2 1176
Maurandy VI/1 6
Maurer, J. VI/2 1293
Mauri, Ernst (1791—1836)
Mayer, Anton VI/2 1240
Mendel, Johann Gregor (1822 bis 1884) VI/2 1206
Meneghini, Giuseppe IV/3 1280
Menke, Karl Theodor IV/2 792
Mentzel, Chr. V/1 662
Menzies, Archibald (1754—1842)
Mercier, E. IV/2 782
Meriwether Lewis V/2 799
Mertens, Franz Karl (geb. 1764) V/3 2128
Michaux, Franz Andreas (1770 bis 1885)
Michelangelo, Tilli IV/2 517
Micheli, Pietro Antonio I/215; IV/3 1278; VI/1 377, 425; VI/2 1231
Micon, Don V/2 795
Mielichhofer, Matthias VI/2 1310
Minuart, Juan (1693—1788)
Moehring, Paul Heinrich III 410 (geb. 1710, nicht 1729)
Molendo, Ludwig VI/2 1235
Molina, Juan Ignacio I 277; V 775
Moellendorff, O. v. V/2 1422
Monardes, Nicolaus V/4 2506
Moench, Konrad III 378
Monnier-Legrand IV/2 1044
Monson, Anna IV/3 1660
Monti, Giuseppe III 270
Moretti, Giuseppe VI/1 346
Morin, Louis VI/1 280
Moris, G. H. VI/2 1254
Morison, Robert III 419; V/2 1122, 1368
Morthier, P. VI/2 1300
Moesz, G. von V/4 2314
Mougeot, Jean Baptiste IV/2 717; VI/2 1267
Mühlenbeck, L. A. VI/1 17
Mühlenberg, Hrch. Ludwig (1756 bis 1817)
Müller, Jakob Theodor II 30
Müllner, Michael Ferdinand VI/2 911
Muralt, Joh. von V/1 88
Murbeck, Svante VI/1 17
Muret, Jean IV/1 125; VI/2 1248
Murith, S. J. IV/2 1010; VI/2 1266
Murr, Josef IV/3 1453; V/4 2322; VI/2 1292
Murray, Joh. Andr. V/1 54

N.

Nägeli, C. W. von VI/2 1225
Naudin, Charles V/2 1463
Navière-Laboissière IV/3 1656
Necker, Noël, Josef v. (1729—1793)
Nees, ab Esenbeck V/1 51
Neilreich, August VI/1 18, 205; VI/2 1294
Nesle, J. A. N. de IV/1 371
Nestler, Chr. Gottfried IV/2 865; V/2 1348; VI/2 1222
Neumayer, Josef V/2 1370
Nevole, Johann VI/2 914
Nieremberg, Joh. Eus. V/4 2555
Nikandros V/4 2560
Nocca, Domenico IV/1 132
Nonne, Johann Philipp (geb. 1729) V/3 2205
Nuttal, Thomas (1785—1859)

O.

L'Obel (Lobelius) Matthias IV/1 160; VI/1 392
Oberleitner, F. VI/2 1303
Oborny, Adolf IV/2 1028; VI/2 1241
Obrist, Johann VI/2 1247
Oeder, Georg Christian V/1 541; VI/1 127
Olivier, Antoine V/2 992
Opiz, Philipp Maximilian IV/2 848
Orlay, Johann V/2 1066
Osbeck, Peter V/2 795
Oettel, Karl Christian VI/1 484
Ortgies, Eduard (1829—1916)
Ozanon, Chr. VI/2 1256

P.

Paaw, Peter V/1 300
Pacher, David IV/1 384; VI/2 1087
Paiche IV/2 960
Palisot, de Beauvais A. M. F. J. (1755—1820)
Pallas, Peter Simon IV/1 155
Palmstruch IV/2 733
Pančić, Joseph V/2 1196
Pape, G. C. IV/3 1518
Paradisi, Giovanni II 200
Parkinson, John IV/3 1127
Parlatore, Filippo I 256
Patrin, Eugène Louis Melchior V/4 2273

Paulli, Simon V/1 307
Paulowna, Anna VI/5
Peletier VI/2 1197
Perleb, Karl Julius V/2 1093
Pernetty, Ant. Jos. V/3 1621
Pernhoffer, Gustav v. V/4 2467
Persoon, Christian Hendrik (1755 bis 1837)
Peter, A. VI/2 1214
Petiver, James III 583
Petry, Hermann V/1 18; VI/2 1345
Petter, Franz IV/3 1148; V/2 1368
Pfaff, Wilhelm V/4 2322
Pfeiffer, Ludwig V/2 696
Phelipeaux, L. et H. VI/1 136
Picot de Lapeyrouse, Philipp V/2 1124
Pirona, G. A. IV/3 1269
Pittoni, Josef Claudius IV/2 552
Plumier, Charles VI/2 1098
Podpěra, Josef (geb. 1878) in Brünn
Pöll, Jos. VI/2 1337
Poeverlein, Hermann (geb. 1874 in Regensburg)
Pollich, Andreas VI/1 841
Pollich, Johann Adam IV/1 224
Pollini, Ciro V/2 1448
Pona, Giovanni (1565—1630 in Verona) III 414
Pontedera, Guilio (1719—1757 in Padua)
Porta, Pietro VI/1 96
Portenschlag-Ledermayer, Franz v. VI/1 118
Pospichal, Eduard V/2 1252; VI/2 1252
Potonié, Henry IV/3 1518
Prantl, Karl VI/2 1242
Preismann, Ernst (geb. 1844)
Prescott, John D. V/2 1000
Presl, Karel Boriwog V/4 2338
Przybylsky, Bronislaw (geb. 1858 in Jablunka/Schlesien, † 1894 in Saybusch/Galizien) VI/2 913
Puerari, Marc Nicolas IV/3 1625
Purkyne VI/2 1331

R.

Rainer, Erzherzog VI/1 345
Ramisch, F. A. V/3 1574
Ravaud, L. C. M. VI/2, 1302
Ray (Rajus), John III 193
Rebholz, E. VI/2 1236
Rechinger, Karl VI/1 100
Regel, Eduard (geb. 1815)
Regel, Fritz IV/2 1006
Rehmann, A. VI/2 1225
Rehmann, J. VI/1 6
Reichardt, H. W VI/2 1246
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig V/1 634
Reichenbach (filius), Heinrich Gustav VI/2 1085
Reinwardt, Caspar Georg Karl (geb. 1773) V/1 1
Reisseck, A. VI/1 18
Requien, Esprit V/2 1412
Ressmann, F VI/1 297
Reuter, Georges F. V/2 1196; VI/2 1348
Richardson, John IV/1 153
Richen, P. Gottfried VI/2 1035, 1262
Richer, P. V/1 530
Richer de Belleval, Pierre IV/1 242
Ridolfi, Cosimo V/2 1161
Rion, Alphonse IV/2 1046; VI/2
Ripart, Jean Baptiste IV/2 1052
Risso, J. A. V/2 1116
Rivinus (Bachmann), August Quirinus V/1 635; V/2 1177
Robin, Jean IV/3 1390
Rochel, Anton V/2 1298
Roehling, Johann Christian (1757 bis 1813)
Römer, Johann Jakob IV/1 19
Rostan, Pierre Edouard V/3 2023
Rostkov, Friedrich Wilhelm Gottlieb VI/1 92
Roth, Albrecht Wilhelm VI/2 1228
Rottler, Johann Peter (1749—1836)
Royle, John Forbes (1800—1858)
Royen, Adrian van V/2 1060
Rübel-Blass, Eduard VI/2 1260
Rudbeck, Olaus VI/1 503
Rudolphi, Karl Asmund IV/2 581
Ruelle, Jean de la IV/1 189
Ruellius, Joh. IV/1 189
Ruppius (Rupp), Heinrich Bernhard I 140; V/1 621
Russell, Alexander V/2 1032
Ruysch, Fredrik V/4 2363

S.

Sadler, Joseph V/2 1116
Sagorski, Ernst (gest. 1929 in Altenburg) IV/2 1017
Salis-Marschlins, Ulysses Adalbert von IV/1 123
Salvini, Antonio Maria I 47
Sandoz-Rollin, H. A. VI/2 1299
Sanio, Karl Gustav VI/2 774
Saracha, Isidor V/4 2554
Sardagna, Michele de IV/3 1362
Saussure, Theodor de VI/2 835
Sauter, Eleutherius IV/1 375; VI/2 1213
Savignone, Francesco V/2 1098
Scharlok, K. J. A. VI/2 1217
Scheffler, Ludwig V/2 1102
Schenk, A. VI/2 1245
Scheuchzer, Johann I 147
Schiede, Chr. VI/1 18
Schimper, A. F. W. IV/3 1253
Schimper, Wilhelm Philipp IV/1 154
Schinz, Hans IV/2 1029; V/4 2270; VI/1 75
Schiwereck, A. V/2 1393
Schkuhr, Christian IV/1 266
Schlagintweit, Herm. et Ad. VI/2 1319
Schleicher, Joh. Christoph IV/1 50; IV/2 798; VI 1 442
Schlickum, A. VI/2 1220
Schlickum, Julius IV/2 791
Schlosser, Joseph Calasanz Ritter v. Klekovski IV 1 263; V/2 1364
Schmidely, Aug. IV/2 960; VI/2 1245
Schmidt, F. W VI/2 1269
Schnizlein, Adalbert V/2 1299
Schott, Heinrich Wilhelm V/2 1377; VI/1 17
Schrader, H. A. VI/1 16; VI/2 1264
Schramm, Otto IV/1 50
Schrank, Franz v Paula v. IV/1 286
Schreber, Johann Christian Daniel (1739—1810)
Schroeter, Carl VI/2 915
Schultes, Josef August VI/1 210; VI/2 1205
Schulthes, Julius Hermann (1773 bis 1831)
Schultz, Karl Heinrich VI/2 1206
Schultz, Friedrich Wilhelm V/1 621; VI/2 1206
Schulze, Max IV
Schweigger, August [illegible]drich (1783 bis 1821)
Scopoli, Giovanni Antonio IV/1 410; IV/3 1544; V 4 2569; VI/1 34
Sebastiani, Antonio IV/3 1278
Seelos, Gustav I 29
Seguier, Jean François III 327, 570 IV/2 604; V 1 177; V/2 1318
Seiler, Alexander VI/2 672
Semler, Karl VI/1 75
Sendtner, Otto IV/1 27; VI/2 1290
Senebier, Joh. (1742—1809)
Sennen VI/1 98
Sennholz, Gustav VI/2 912
Serapio[n] IV/1 183
Seringe, N. C. IV/2 1037
Sesler, Leonhard I 265
Sextus Niger V/2 1061
Shepherd, John V/2 729
Sherard, William VI/1 197
Sibbald, Robert IV/2 892
Sibthorp, John V/2 1130
Sieber, F. W. I 350; VI/1 380; VI/2 1331
Siebold, Philipp Franz v. V/4 2419
Siegert, Gottlob VI/2 911
Siegling I 275
Sievers, Johannes IV/2 908
Smith, James Eduard VI/2 1209
Soie, de la VI/2 1258
Solander, Daniel C. V/4 2555
Solms-Laubach, H. Graf zu IV/1 365
Sommerfelt, S. Chr. VI/2 1295
Songeon, André VI/1 107

Sonklar, K. v. VI/2 1294
Spach, Eduard (1801—1879)
Sparmann, Andreas († 1787 in Stockholm)
Spenner, Fridolin Karl Leopold (1798—1841)
Spiegel (Spigel), Adrian (1558 bis 1625) V/3 1952
Spielmann, Jakob Reinbold V/2 1131
Spitzel, Anton v. II 346; IV/1 376
Sprecher, F. VI/2 1293
Sprengel, Kurt Polykarp Joachim IV/2 788; V/2 1087
Steller, Georg W V/2 726
Sternberg, Kaspar M. von II 319; IV/2 1050
Sterneck, Jakob von VI/1 106
Steven, Christian III 563
Stoerck, Anton von (1741—1803)
Strähler, A. VI/2 1284
Strampff, Heinrich Leopold von V/3 1579
Střibrný V/2 1118
Strobl, P. Gabriel VI/2 914
Subert, Claude IV/2 1033
Sündermann, Fr. (geb. 1864 in Würzburg) in Lindau i. B.
Sulger-Buel, Conrad (geb. 1864) VI/2 1205
Sutton, Arthur W IV/1 245
Swainson IV/3 1456
Swartz, Olaf (1760—1818) IV/2 733
Swert, Emanuel V/3 1973
Swieten, Gerard von V/1 85
Szabó, Joseph von IV/2 1024

T.

Tabernaemontanus, Johann Theodor II 30; IV/2 880
Tappeiner, Franz v. VI/2 912
Tausch, J. F. (geb. 1793) VI/2 1242
Teesdale, Robert IV/1 72
Teleki de Szek VI/1 492
Tenore, Michele V/2 1094
Ternstroem, C. V/1 494
Teyler, Alois VI/1 17
Thal (Thallius), Johannes IV/1 392
Theissen, P. Ferdinand VI/2 1262
Thellung, Albert IV/1 51, 219; V/2 1504; VI/2 1313
Thomas, Abraham IV/2 1030; V/1 643
Thomas, Emanuel V/1 643; VI/2 1316
Thomas, Louis V/1 386, 643
Thuillier, Jean Louis IV/2 1034
Tiling V/2 1304
Tilli, Mich. Aug. (1653—1740)
Tillier, Antoine Bernard de IV/1 173
Timbal-Lagrave, Edouard V/2 1175
Tofield II 189
Tommasini, Muzio Spirito von V/2 1228; VI/2 1045
Torea, Olaf VI/1 6
Tournefort, Joseph Pitton de IV 1 222, 231; IV/3 1177; V/3 2131; VI/1 53; VI/2 631
Touton, Anna VI/2 1249
Touton, Karl VI/2 1289
Tozzi, Lucas VI/1 71
Trabut, L. V/1 593
Trachsel, K. VI/2 1293
Tragus (Bock), Hieronymus (1498 bis 1553)
Traunsteiner, Joseph II 352
Treffer, Georg VI/2 1257
Trinius, Karl Bernhard von V/2 1131
Trionfetti, Giovanni Batt. VI/1 538; VI/2 967
Turgeneff, Alexander V/2 1061
Turner, William V/1 657

U.

Ullepitsch, J. VI/2 1210
Uechtritz, Rudolf von IV/1 202; VI/2 1316
Unger, Franz (1800—1870)
Urban, Ignaz IV/1 242

V.

Vahl, Martin (1749—1804)
Vaillant, Sebastian IV/1 49; VI/1 227, 477; VI/1 1222
Valerand, Douvez V/3 1875
Vallisnieri de Vallisnera, Antonio I 161
Vandelli, Domenico IV/2 586
Vater, Abraham V/1 534
Ventenat, Pierre Etienne I 251
Verdera, Palauy V/1 455
Verlott, Jean Baptist VI/2 631
Vetter, Joh. Jakob IV/2 1024
Vetter, Joh. VI/2 1349
Vierhapper, Friedrich VI/2 1349
Villars (Villar), Dominique IV/1 126; VI/2 1233
Visiani, Roberto de V/2 992; V/3 2183; VI/2 1232
Vitalianus, Anton V/3 1787
Viviani, Domenico (1772—1840)
Vogel, R. A. IV/1 371
Vollmann, Franz VI/1 110; VI/2 1311
Vulpius, F. W. VI/2 1262
Vulpius, Johann Samuel I 325

W.

Wahlenberg, Göran (Georg) V/2 1341; VI/1 388
Waldstein-Wartenberg, Franz Adam, Graf von IV/2 927; V/1 600
Wallich, Nathanael (1787—1854)
Wallroth, Karl Friedrich Wilhelm V/2 1189
Walther, Augustin Friedrich IV/1 169
Wankel VI/2 910
Warburg, Otto V/1 585
Weigel, Christian Ehrenfred von (1748—1831)
Weingärtner I 242
Westring, J. P. V/4 2522
Wettstein, Richard V/2 1116
Wibel, Aug. Wilh. Eberh. Christ. I 245; 844
Wichura, Max Ernst IV/2 966
Wiemann IV/2 845
Wiesbaur, Johann, Baptist IV/2 1039; VI/2 1272
Wilczek, Ernst VI/2 672
Willdenow, C. L. VI/2 1246
Willemet, Paul VI/2 1076
Willkomm, Moriz VI/1 172
Wimann IV/2 845
Wimmer, Friedrich VI/2 910, 1328
Winter, John V/1 585
Wiprächtiger, P. Amandus IV/2 959
Wirtgen, Philipp Wilh. VI/1 18; VI/2 1272
Wislicenus, Wilhelm Gustav IV 2 839
Wistar, Kaspar IV/3 1386
Wittrock, Veit Brecher V/1 616
Wocke, Erich III 520
Wolf, Ferdinand Otto V/1 649
Wolf, Franz Theodor IV/2 846
Wolff, Johann Friedrich II 142
Woloszczak, Eustach IV/2 1034
Woodford, James V/2 744
Woods, Joseph I, 12
Wulfen, Franz Xaver v. VI/1 64
Wydler, Heinrich V/2 1140
Wylie, Sir James V/2 1032

Z.

Zabel, Hermann IV/2 1015; V/2 992
Zahlbruckner, Johann Bapt. VI/1 377
Zahlbruckner, Alexander III 500
Zahn, Hermann, Konrad VI/2 1332
Zannichelli, Gian Girolamo I 140
Zanoni, Giacomo IV/1 153
Zantedeschi, Francesco (geb. 1797)
Zauschner, Johann Baptist Joseph II 208; V/2 799
Zea, Francesco Antonio IV/1 155
Zinn, Joh. Gottfried VI/1 527
Ziz, Johann Baptist I 129; IV/1 115
Zobel, August VI/2 1295
Zois, Philipp Eugen III 414
Zollikofer, G. K. VI/2 1224
Zosima, Zoa V/2 1456
Zoya, M. VI/2 1312
Zoys, Karl Freiherr von V/1 611; VI/1 363
Zwinger, Theodor (1658—1724)

Berichtigungen zu Band VII:

Seite 148 Zeile 3 von oben: Botrychium muss gesperrt sein.
159 Zeile 20 von unten: Scilla muss gesperrt sein.
162 Zeile 11 von unten: Narcissus muss gesperrt sein.
164 Mitte: Chamaeorchis Rich. muss gesperrt sein.
169 Zeile 12 von unten: der Klammerausdruck muss heissen: (nicht Osýris). — Auf Ósyris L. folgen Santalum L. (III 151) und Acanthósyris Griseb. (III 151).
173 Zeile 7 von unten: Brasénia ist versehentlich gesperrt gedruckt.
177 Zeile 10 von unten: bei Lunaria L. ist in der Klammer VII 213 Fig. 1268 hinzufügen.
180 Zeile 15 von unten: bei Kagenéckia ist Ruiz et Pav. hinzusetzen.
181 Mitte: Statt Rhapiolepis ist Rapiolepis zu schreiben.
182 Als erste Gattung der Tribus Galégeae ist Indigofera L. (IV/3 1383) zu ergänzen.
182 Zeile 21 von unten: Richtig ist Brongniartia (nicht Brogniartia).
182 Zeile 6 von unten: Nach Hippócrepis L. ist Hedýsarum L., Süssklee (IV 3 1484) einzuschalten.
190 Die Unterfamilie **Cereoídeae** muss die Ziffer 3 (nicht 8) führen.
191 Zeile 5 von oben: Statt Dyx ist Dyck zu setzen.
192 Zeile 3 von unten: Richtig ist Loudónia (nicht Laudonia).
197 Mitte: Richtig ist Butyrospermum (nicht Blutyrospermum).
204 Zeile 15 von oben: Statt Fig. 1269 ist 1249 zu setzen.
205 Zeile 1/2 von unten: Die richtige Schreibweise ist nach Alfred Becherer Littorélla nicht Litorélla) Bergius.
208 Zeile 1 von oben: Nach Patrinia ist der Autor Juss. einzufügen.
229 Die Seitenzahl muß 229 lauten und nicht, wie gedruckt 239.
262 Spalte 1 Mitte: Statt Dieryilla ist Diervilla zu schreiben.