

des Spessartbundes (2): 7-8, Aschaffenburg.  
WAITZMANN, M. (1991): Zur Morphologie einiger Reptilien des südlichen Odenwaldes (Nordbaden, Südhessen). - *Salamandra* **27** (4): 266-281, Bonn.

## Verfasser

Peter Heimes, Wurzerstraße 33, D-53175 Bonn  
Frank Nowotne, Zur Forelle 28, D-88662 Überlingen-Nußdorf

Hessische Faunistische Briefe <b>12</b> (4)	Seiten 60 - 64	Darmstadt 1992
---	----------------	----------------

## Käferfunde der Jahre 1990 bis 1992 aus Hessen

5. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen.

Teil 2: Familie Staphylinidae <sup>1)</sup>

H. Bathon, Roßdorf

Nachdem in vorangegangenen Heft die Familien Carabidae bis Buprestidae unter Ausschluß der Staphylinidae behandelt wurden, seien hier nun die Staphyliniden mitgeteilt. Die Fundmeldungen stammen von: U. BRENNER, J. FRISCH, W. HÖHNER, M. KARNER und M. SCHÖLLER. Die Aufstellung folgt den vorhergehenden Teilen der Reihe. Angaben über den Gefährdungsgrad der Arten liegen bis auf die Gattung *Stenus* keine vor, da die übrigen Staphyliniden wegen eines zu geringen Bekanntheitsgrades in der "Roten Liste der Bundesrepublik Deutschland" nicht bearbeitet wurden. Gattungen und Arten sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

*Aleochara stichai* LIKOVSKY: Fulda, Oberrode, 300 m NN (NA 49), 1 Weibchen in altem Vogelnest in Nistkasten, 20.10.1990 leg. FRISCH.

*Amarochara bonnairei* (FAUVEL): Nidderau, NSG Krebsbachtal, 180 m NN (MA 86), 1 Expl. in Bodenfalle auf verbuschtem Trockenhang über sandigem Boden, 06.1992 leg. FRISCH. - **Neu für Hessen.**

*Atheta cinnamoptera* (THOMSON): Vogelsberg, Umg. Geiselstein, 700 m NN (NA 19), 1 Expl. in einem anmoorigen Bestand von *Betula pubescens* (EHRH.) und *Alnus glutinosa* (L.) aus feuchter Laubstreu gesiebt, 17.01.1992 leg. FRISCH.

*Atheta debilis* (ERICHSON): Nähe Erfelden, 100 m NN (MA 51), 1 Expl. am Reinufer aus Genist auf Schotter, 23.02.1992 leg. FRISCH.

---

<sup>1)</sup> 5. Bericht, Teil 1, in: Hess. Faun. Briefe **12**., 1992

- Atheta episcopalis* BERNHAUER: Vogelsberg, Umg. Geiselstein, 700 m NN (NA 19), 1 Expl. in einem Erlenbruch aus feuchter Laubstreu gesiebt, 15.01.1992 leg. FRISCH.
- Atheta fallaciosa* (SHARP): Fulda, Nonnenrod, 300 m NN (NA 49), 15 Expl. in Torfmoos am Rande eines anmoorigen Waldtümpels, 5.05.1990 leg. FRISCH.
- Atheta hygrobica* (THOMSON): Nähe Erfelden (MA 51), 1 Expl. an Holz in Tümpel, 28.03.1992 leg. BRENNER.
- Atheta malleus* JOY: Dillenburg, Manderbach, 350 m NN (MB 42), 1 Expl. in Bodenfalle eines Bestandes von *Scirpus sylvaticus*, 08.1992 leg. FRISCH.
- Atheta obtusangula* JOY: 6 Expl. aus Torfmoos am Rande eines anmoorigen Waldtümpels, 19.01.1992 leg. FRISCH. - Rhön, Rotes Moor, 800 m NN (NA 69), ca. 30 Expl. in Carex-Bülten auf anmooriger Wiese bei hohem Wasserstand durch Schneeschmelze, 28.02.1992 leg. FRISCH, in coll. FRISCH und coll. VONDERAU (Museum Fulda).
- Atheta parca* (MULSANT ex REY): Fulda, Nonnenrod, 300 m NN (NA 49), 1 Weibchen in Torfmoos am Rande eines anmoorigen Waldtümpels, 19.01.1992 leg. FRISCH.
- Atheta pfaundleri* BENICK: Vogelsberg, Umg. Geiselstein, 700 m NN (NA 19), 2 Männchen, 3 Weibchen in einem anmoorigen Bestand von *Betula pubescens* (EHRH.) und *Alnus glutinosa* (L.) aus feuchter Laubstreu gesiebt, 4. und 6.03.1992 leg. FRISCH in coll. FRISCH und coll. Künanzhaus (s.a. FRISCH 1992 c). **Neu für Hessen.**
- Atheta pittonii* SCHEERPELTZ: Hünfeld, Ulmenstein/Linzberg, 500 m NN (NB 51), 1 Weibchen in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 27.04.1990 leg. FRISCH.
- Bledius dissimilis* ERICHSON: Rheinufer bei Riedstadt (MA 51), 7 Expl. am 7. und 1 Expl. am 28.09.1991 (weitere Expl. vid.) an Sandufer, leg. BRENNER.
- Bledius filipes* SHARP: Trebur-Hessenaue (MA 52), 2 Expl. am 31.08. und 1 Expl. am 28.09.1991 an Kiesufer, leg. BRENNER. - Rheinufer bei Riedstadt (MA 51), 1 Expl. an Sandufer, 28.09.1991 leg. BRENNER.
- Bledius procerulus* ERICHSON: Hofbieber (Rhön), Hessenlode, 350 m NN (NB 50), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 22.06.1990 leg. FRISCH.
- Bledius tricornis* (HERBST): Wisselsheim-Steinfurt (MA 88), 10 Expl. auf Pferdekoppel am Rande eines Grabens mit salzhaltigem Wasser an der Wetter. Die Art besiedelte die durch Pferdevertritt im schlammigen Boden entstanden senkrechten Lehmwände. 09.1992 leg. FRISCH.
- Bolitobius pulchellus* MANNERHEIM: Lauterbach, 400 m NN (NB 20), 1 Ex. in einem Eichenaltbestand der Altholzparzelle Hainich aus Laubstreu gesiebt, 30.03.1990 leg. FRISCH.
- Bolitochara bella* MÄRK.: Nidderau, NSG Krebsbachtal, 180 m NN (MA 86), 1 Expl. in Bodenfalle in einem Erlenbruch, 06.1992 leg. FRISCH.
- Boreophilia eremita* (RYE): Vogelsberg, Niddaquelle, 700 m NN (NA19), 3 Weibchen auf anmooriger Wiese an Carex-Bülten, s.a. bei *Schistoglossa curtippennis*, 3.02.1991 leg. FRISCH und KARNER (FRISCH 1992).
- Brachyusa concolor* (ERICHSON): Rheinufer bei Riedstadt (MA 51), 3 Expl. an Sandufer, 28.09.1991 leg. BRENNER.
- Callicerus rigidicornis* (ERICHSON): Nidderau, NSG Krebsbachtal, 180 m NN (MA 86), 1 Expl. in Bodenfalle in einem Carex-Bestand, 06.1992 leg. FRISCH.
- Carpelimus gracilis* (MANNERHEIM): Nidderau, NSG Krebsbachtal (MA 86), 1 Expl. in Bodenfalle in Carex-Bestand, 06.1992 leg. FRISCH.

- Carpelimus lindrothi* PALM: Mainz-Mombach (MA 44), 1 Expl. auf dem Schlammufer eines Tümpels, 22.09.1990 leg. BRENNER.
- Carpelimus punctatellus* ERICHSON: Oppenheim (MA 52), 1 Expl. unter Moos in Steinbruch, 30.03.1991 leg. BRENNER.
- Cryptobium collare* REITTER: Wisselsheim-Steinfurt (MA 88), 1 Expl. auf feuchter Salzwiese an der Wetter, 09.1992 leg. FRISCH. - **Neu für Hessen.**
- Cypha hanseni* (PALM): Lorch (MA 14), 1 Männch. am Nollig von trockenem Eichenast geklopft, 26.05.1990 leg. FRISCH; Lauterbach, 400 m NN (NB 20), 1 Männch. in der Altholzparzelle Hainich von trockenem Eichenast geklopft, 17.06.1990 leg. FRISCH.
- Dasygnypeta velata* (ERICHSON): Rheinufer bei Riedstadt (MA 51), je 1 Expl. am 7. und 28.09.1991 an Sandufer, leg. BRENNER.
- Encephalus complicans* WESTWOOD: Dillenburg, Manderbach, 350 m NN (MB 42), 1 Expl. in Bodenfalle auf Mähwiese, 08.1992 leg. FRISCH.
- Eusphalerum atrum* (HEER): Wispertal (MA 14/25), 4 Expl. in Blüten von *Helleborus foetidus* L., 29.03.1992 leg. SCHÖLLER. - Frankfurt-Ginnheim, Ginnheimer Wäldchen (MA 75), in Anzahl in Blüten von *Anemone nemorosa* L., 3.04.1992 leg. SCHÖLLER.
- Gabrius bishopi* SHARP: Gießen, 150 m NN (MB 70): 1 Männchen in Hochwassergebiet der Lahn, 9.12.1989 leg. FRISCH.
- Gyrophypnus scoticus* (JOY): Großenlüder bei Fulda (NB 30), 2 Expl. aus Streu auf Kalkmagerrasen des Langenbergs (370 m NN) gesiebt, -12.1991 leg. FRISCH.
- Gyrophana boleti* (L.): Vogelsberg, Nähe Hoherodskopf (NA 19), 1 Expl. an einem Baumschwamm, 19.09.1992 leg. Höhner. **Neu für Hessen.**
- Haploglossa marginalis* (GRAVENHORST): Hanau-Wilhelmsbad (MA 95), 1 Expl. unter Platanen-Rindenschuppe, 1.12.1990 leg. BRENNER.
- Ilyobates propinquus* (AUBÉ): Gießen, Wißmarsee, 200 m NN (MB 70), 1 Expl. an schlammigem Bachufer in Bodenfalle, -08.1991 leg. FRISCH.
- Ischnoglossa obscura* WUNDERLE: Vogelsberg, Umg. Geiselstein, 700 m NN (NA 19), je 1 Expl. am 17.01. und 4.03.1992 aus Laubstreu in einem montanen Laubmischwald gesiebt, leg. FRISCH, vid. WUNDERLE.
- Ischnopoda objecta* MULSANT & REY: Rheinufer bei Riedstadt (MA 51)), 3 Expl. an Sandufer, 28.09.1991 leg. BRENNER.
- Lathrobium pallidum* NORDM.: Dillenburg, Manderbach, 350 m NN (MB 42), 1 Expl. in Bodenfalle auf Mähwiese, 08.1992 leg. FRISCH.
- Liogluta pagana* (ERICHSON): Rhön, Kaskadenschlucht, 700 m NN (NA 69), 6 Expl. in montanem Laubmischwald in Bodenfalle, -09.1990 leg. FRISCH.
- Megaloscapa punctipennis* (KRAATZ): Hünfeld, Ulmenstein/Linzberg, 500 m NN (NB 51), 1 Männch. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 27.04.1990 leg. FRISCH.
- Mycetoporus rufescens* (STEPHENS): Wetzlar, 300 m NN (MA 69), 1 Expl. am Stopfelberg aus Laubstreu eines Eichenmischwaldes gesiebt, 30.05.1990 leg. FRISCH.
- Myllaena gracilis* (MATTHEWS): Nonnenrod bei Fulda, 300 m NN (NA 49), 8 Expl. aus Torfmoos am Rande eines anmoorigen Waldtümpels, 5.05.1990 leg. FRISCH.
- Ochtheophilus flexuosus* (FAIRMAIRE, LABOULBENE): Gießen, Wißmarsee, 200 m NN (MB 70), 15 Expl. auf vegetationslosem, schlammigem Uferbereich des Wißmarbaches in Bodenfallen, -08.1991 leg. FRISCH.
- Ocyopus pedator* (GRAVENHORST): Heringen (Werra) (NB 73), 5 Expl. unter Stein auf Salzboden, 27.06.1990 leg. BRENNER.

- Oxypoda funebris* KRAATZ: Vogelsberg, Niddaquelle, 700 m NN (NA 19), 15 Expl. auf anmooriger Wiese in *Carex*-Bülten (Näheres s. bei *Schistoglossa curtipennis*), 3.02.1990 leg. FRISCH. - Rhön, Rotes Moor, 800 m NN (NA 69), 6 Expl. aus Torfmoos am Rande eines Waldtümpels, 2.04.1991 leg. FRISCH.
- Paederus brevipennis* BOISDUVAL et LACORDAIRE: Fulda, 200 m NN (NB 40), 2 Expl. im Hochwassergenist der Fulda, 30.12.1990 leg. FRISCH.
- Philonthus nitidus* (FABRICIUS): Nähe Milseburg bei Hilders (NA 69), 5 Expl. in frischen Kuhfladen, 17.08.1991 leg. BRENNER.
- Phloeonomus bosnicus* BERNHAUER: Aschaffenburg, Fasanerie (NA 13), 2 Expl. unter gärender Robinien-Rinde, 21.12.1991 leg. BRENNER.
- Placusa atrata* SAHLBERG: Umg. Groß-Gerau (MA 63), 3 Expl. unter morscher Lärchen-Rinde, 8.08.1992 leg. BRENNER.
- Platystethus nitens* (SAHLBERG): Wisselsheim-Steinfurt (MA 88), 1 Expl. auf feuchter Salzwiese an der Wetter, 09.1992 leg. FRISCH.
- Platystethus spinosus* ERICHSON: vic. Riedstadt-Leeheim (MA 52), 9 Expl. (zahlreiche weitere Expl. wurden beobachtet) auf liegenden Kiefern-Stämmen, 25.04.1992 leg. BRENNER.
- Quedius boopoides* MUNST.: Vogelsberg, Niddaquelle, 700 m NN (NA 19), 5 Expl. auf anmooriger Wiese in *Carex*-Bülten, 3.02.1991 leg. FRISCH; Fulda, 200 m NN (NB 40), 1 Expl. aus Hochwassergenist der Fulda, 30.12.1990 leg. FRISCH.
- Quedius limbatoides* COIFFAIT: Rhön, Umg. Schafstein, 800 m NN (NA 69), 25 Expl. in montanem Laubmischwald aus Laubstreu und Moos zwischen Basaltblöcken gesiebt, 17.11.1991 leg. FRISCH, in coll. FRISCH und coll. VONDERAU (Museum Fulda).
- Quedius ochripennis* (MENETRIES): Grund-Schwalheim, 130 m NN (MA 98), 1 Expl. der ab. *rufipennis* TRELLA im feuchten Mulm einer alten Kopfweide, 27.06.1990 leg. FRISCH.
- Quedius pseudoumbrinus* LOHSE: Vogelsberg, Umg. Taufstein, 750 m NN (NA 19), 1 Männ. in montanem Laubmischwald aus Moos gesiebt, 9.11.1991 leg. FRISCH; Vogelsberg, Umg. Geiselstein (NA 19), 25 Expl. aus Laubstreu eines anmoorigen Gehölzbestandes von *Betula pubescens* (EHRH.) und *Alnus glutinosa* (L.) gesiebt, leg. FRISCH.
- Schistoglossa curtipennis* (SHARP): Vogelsberg, Niddaquelle, 700 m NN (NA 19), ca. 50 Expl. auf anmooriger quelliger Wiese. Die Tiere befanden sich zusammen mit anderen Arten der Bodenstreu in *Carex*-Bülten über einer flächigen Eislage, die die Wiese bedeckte. Vermutlich wurden die Tiere durch starke Niederschläge aus der Streu getrieben, worauf ein starker Frosteinbruch folgte. Das Eis schloß die Käfer ein. Zum Zeitpunkt der Aufsammlung am 3.02.1991 herrschte Tauwetter. Die obere Eislage schmolz und gab die Tiere frei, leg. FRISCH und KARNER. - Neu Isenburg (Gravenbruch), 120 m NN (MA 84), 3 Expl. in *Carex*-Bülten an einem Graben der Eirundwiese, 4.01.1991 leg. FRISCH. - Rhön, Rotes Moor, 800 m NN (NA 49), 5 Expl. in *Carex*-Bülten auf anmooriger Wiese bei hohem Wasserstand durch Schneeschmelze, 28.02.1992 leg. FRISCH. - Fulda, Nonnenrod, 300 m NN (NA 49), 1 Expl. aus *Sphagnum* am Rande eines anmoorigen Waldtümpels, 19.01.1992 leg. FRISCH.

- Sepedophilus bipunctatus* (GRAVENHORST): Nidda, 300 m NN (NA 08), 2 Expl. in Buchenaltholzbestand am Eschberg in morschem Buchenholz, 24.06.1990 leg. FRISCH.
- Siagonium humerale* GERMAR: Aschaffenburg, Fasanerie (NA 13), 35 Expl. unter gärender Robinien-Rinde zusammen mit *Siagonium quadricorne* KIRBY (fast so häufig wie dieser), und je 1 Expl. unter Eichen- bzw. Pappel-Rinde, 21.12.1991 leg. BRENNER.
- Stenus bohemicus* MACH.: Wisselsheim-Steinfurt (MA 88), 1 Expl. auf feuchter Salzwiese an der Wetter, 09.1992 leg. FRISCH. (3)
- Stenus melanopus* (MARSHAM): Wisselsheim-Steinfurt (MA 88), 5 Expl. auf feuchter Salzwiese an der Wetter, 09.1992 leg. FRISCH.
- Stenus picipes* STEPHENS: Schlitz 450 m NN (NB 31), aus feuchter Laubstreu eines montanen Buchenwaldes am Eisenberg, 18.01.1992 leg. FRISCH.
- Stilicis angustatus* (FOURCROY): Frankfurt-Schwanheim (MA 75), 1 Expl. im Anspülicht am Mainufer, 28.04.1991 leg. SCHÖLLER.
- Velleius dilatatus* (FABRICIUS): Erbach (NA 00), 2 Expl. in Abfall unter einem Hornisennest auf einem Dachboden, -.08.1989 leg. CHALWATZIS in coll. CHALWATZIS und coll. BATHON.
- Zyras haworthi* (STEPHENS): Nidderau, NSG Krebsbachtal, 180 m NN (MA 86), 1 Expl. in Bodenfalle in einem *Carex*-Bestand, 06.1992 leg. FRISCH.

#### **Verfasser**

Dr. Horst Bathon, Drosselweg 6, D-64380 Roßdorf

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Bathon Horst

Artikel/Article: [Käferfunde der Jahre 1990 bis 1992 aus Hessen 5. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen. Teil 2: Familie Staphylinidae 60-64](#)