

Käferfunde der Jahre 1996 und 1997 aus Hessen

9. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen ¹⁾

ULI BRENNER

Summary

Faunistic records of 121 species of beetles are recorded from the state of Hesse (Germany). Of these 74 are dealt with as endangered species in the Red Book of Animals of Germany. Two species are new to Germany and nine species are recorded as new to Hesse.

Zusammenfassung

Es werden 121 Fundmeldungen aus 34 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen 3 Arten nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (1998) als vom Aussterben bedroht (1), 27 Arten als stark gefährdet (2) und 43 Arten als gefährdet (3) eingestuft werden. Acht weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste (V), eine Art weist eine geographische Restriktion (R) und eine weitere Art eine defizitäre Datenlage (D) auf, so daß keine Einstufung möglich ist. Zwei Arten werden als Neunachweise für Deutschland (*Melanophthalma sericea* (MANNERHEIM), *Noxius curtirostris* (MULSANT)) und neun Arten als Neunachweise für Hessen angesehen: *Baeocrara japonica* (MATTHEWS), *Siagonium humerale* GERMAR, *Gabrieus astutus* (ERICHSON), *Ocypus macrocephalus* (GRAVENHORST), *Nephus bisignatus claudiae* FÜRSCH, *Corticeus bicoloroides* (ROUBAL), *Phratora atrovirens* (CORNEL), *Longitarsus membranaceus* (FOUDRAS), *Ceutorhynchus pumilio* (GYLLENHAL).

Etwa 40 % der hier als faunistisch interessant mitgeteilten Arten aus Hessen leben in Totholz, die anderen Arten sind entweder phytophag (ca. 14 %), mycetophag (ca. 7 %) oder ernähren sich räuberisch (ca. 40 %).

Nach den Fundorten sind in Klammern die zugehörigen UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten die Gefährdungskategorie nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ 1998) (= RL D), bei abweichender Einstufung der Carabiden zusätzlich auch nach MALTEN (1998) (= RL Hessen) geklammert angegeben [(RL D)/(RL Hessen)]. Auch in diesen Bericht wurden wieder Funde aus teilweise weit zurückliegenden Jahren aufgenommen, wenn deren Bedeutung erst jetzt erkannt wurde.

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von Horst BATHON (Roßdorf), Günter BORNHOLDT (Schlüchtern), Uli BRENNER (Frankfurt am Main), Günter FLECHTNER (Frankfurt am Main), Matthias ERNST (Alsbach), Johannes FRISCH (Gießen), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Günter HOFMANN (Stockstadt), Damir KOVAC (Frankfurt am Main), Andreas MALTEN (Dreieich), Carsten MORKEL (Butzbach), Bernd NAUMANN (Gunzenhausen), Andreas SCHMIDT (Wetzlar) und Martin SCHROTH (Hanau).

¹⁾ 8. Bericht in: Hess. faun. Briefe 17(2/3): 45-59, 1998.

Carabidae

- Carabus coriaceus* LINNAEUS: Soisberg bei Hohenroda/Rhön (NB 62), 1 Expl. unter Totholz in Buchenwald, 15.8.1997, leg. NAUMANN. – Schellnhäusen/Vogelsberg (NB 11), 1 Expl. unter Meterholzstapel in Buchenwald, Mai 1996, leg. NAUMANN. Die Art ist in Hessen im allgemeinen zwar recht häufig, wird aber in den Mittelgebirgen, insbesondere im Vogelsberg (SCHERF 1968, SCHERF & DRECHSEL 1971), nur selten gefunden.
- Carabus cancellatus* ILLIGER: Nähe Schotten-Eichelsachsen (NA 08), vom 22.4.-6.5.1995 insgesamt 7 Expl. auf Mähwiese, 15 Expl. in Weizenfeld und 9 Expl. an einer Straßenböschung in Bodenfallen, und vom 27.6.-11.7.1995 insgesamt 2 Expl. auf Mähwiese und 34 Expl. in Haferfeld ebenfalls in Bodenfallen, leg. SCHMIDT. (V)
- Carabus arvensis* HERBST: Amöneburg, Brücker Wald (MB 92), 1 Expl. unter Moos auf Totholz, April 1996, leg. NAUMANN. (V)/(3)
- Nebria livida* (LINNAEUS): Groß-Gerau (MA 63), 2 Expl. an Tümpelrand, 16.9.1997, leg. HÖHNER. (3)
- Brosicus cephalotes* LINNAEUS: Homberg/Ohm (NB 02), 5 Expl. in Sandgrube unter Steinen im Uferbereich der Tümpel, 19.7.1997, leg. NAUMANN. (V)/(2)
- Bembidion gilvipes* STURM: Groß-Gerau (MA 63), 2 Expl. in Hochwassergnist, 1.3.1997, leg. HÖHNER. (V)/(zur Zeit nicht gefährdet)
- Bembidion azurescens* (DALLA TORRE): Homberg/Ohm (NB 02), 1 Expl. in Sandgrube im Uferbereich eines Tümpels, 19.7.1997, leg. NAUMANN, det. BUCK. (2)
- Diachromus germanus* (LINNAEUS): Nidda-Eichelsdorf (NA 08), alle Expl. in Bodenfallen in Gebüschnähe auf Enzian-Schillergrasrasen auf Basalt oder Magerer Fettweide (*Lolium-Cynosuretum*), insgesamt 7 Expl. im April, Mai, Juli und November 1996 sowie im März 1997, leg. MORKEL. – Vogelsberg, Breungeshain (NA 19), 1 Expl. in Bodenfalle auf Borstgrasrasen, 24.6.-1.7.1996, leg. FRISCH und MORKEL (in coll. FRISCH). (keine Einstufung)/(3)
- Harpalus signaticornis* (DUFTSCHMIDT): Gießen-Allendorf (MB 70), 1 Expl. auf Therophyten-Magerassen am Hoppenstein in Bodenfalle, Juni 1995, leg. SCHMIDT. (keine Einstufung)/(3)
- Ophonus sticticus* STEPHENS: Ronneburg-Hüttengesäß (NA 06), 1 Expl. in Bodenfalle an Wegrain zwischen Getreidefeldern, 29.7.1994, leg. BORNHOLDT, det. BRENNER. (D)/(2)
- Pterostichus quadrioveolatus* LETZNER: Nähe Rauschenberg-Bracht, Burgwald (MB 84), 4 Expl. unter Steinen in Sandgrube, 16.8.1998, leg. NAUMANN. (V)
- Pterostichus cristatus* (DUFOR): Homberg/Ohm, Harbtschlucht (NB 01), 3 Expl. unter Steinen am Rand eines Fichtenforstes, 5.10.1997, leg. NAUMANN. (keine Einstufung)/(V)
- Platynus longiventris* (MANNERHEIM): Riedstadt, Kühkopf (MA 51), 5 Expl. unter toter Rinde, 26.2.1996, leg. HÖHNER. (2)
- Platynus livens* (GYLLENHAL): Groß-Gerau (MA 63), 1 Expl. an Tümpelrand, 24.8.1996, leg. HÖHNER. (3)
- Chlaenius nigricornis* (FABRICIUS): Homberg/Ohm (NB 02), 1 Expl. in Lehmgrube im Uferbereich eines Tümpels, 18.5.1997, leg. NAUMANN. (V)/(3)
- Panagaeus cruxmajor* (LINNAEUS): Homberg/Ohm (MB 91), 5 Expl. im Uferbereich des Schächchenbachs unter einem Weidenpfosten, 26.2.1997, leg. NAUMANN. (V)/(3)
- Philorhizus sigma* (ROSSI): Heringen (Werra) (NB 73), 1 Expl. an Schilf, leg. HÖHNER. (V)/(3)

Dytiscidae

Nartus grapii (GYLLENHAL): Hanau, Klein-Auheim (MA 95), 1 Expl. am 15.10.1983 und 4 Expl. am 21.9.1984 auf überschwemmter Sumpfwiese, leg. HÖHNER. Aus Hessen liegen **nur alte Meldungen von vor 1950** vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)!

Rhantus consputus STURM: Groß-Gerau (MA 63), 1 Expl. in lehmigem Tümpel, 24.8.1996, leg. HÖHNER. (2)

Dytiscus circumflexus FABRICIUS: Groß-Gerau (MA 63), 1 Expl. in lehmigem Tümpel, 24.8.1996, leg. HÖHNER.

Hydraenidae

Limnebius papposus MULSANT: Wiesbaden-Schierstein (MA 44), 1 Expl., 30.4.1923, in coll. HÖHNER befindet sich dieses Exemplar. Es ist bislang das einzige hessische Stück dieser Art aus dem 20. Jahrhundert, die aus Hessen bislang **nur von sehr alten Funden aus dem 19. Jahrhundert bekannt** war (HEYDEN 1904, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)! Der Sammler ist unbekannt. (3)

Limnebius atomus (DUFTSCHMID): Groß-Gerau (MA 63), 2 Expl. am 25.9.1982 in Moos und 3 Expl. am 30.4.1983 an einem Tümpelrand, leg. HÖHNER. Aus Hessen liegen **nur alte Meldungen aus dem 19. Jahrhundert** vor (HEYDEN 1904, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)! (3)

Histeridae

Plegaderus dissectus ERICHSON: Groß-Gerau (MA 63), 5 Expl. an verpilztem Roßkastanienholz, 16.9.1997, leg. HÖHNER. (3)

Hister quadrinotatus SCRIBA: Neuberg bei Hanau (NA 06), 1 Expl. an Rübenmiete, 2.4.1997, leg. HÖHNER. – Erlensee (MA 95), 1 Expl. an Rübenmiete, 25.4.1997, leg. HÖHNER. (3)

Cholevidae

Anemadus strigosus (KRAATZ): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. in Eichenmulm, 29.5.1996, leg. HÖHNER. (2)

Ptiliidae

Baeocrara japonica (MATTHEWS): Schlüchtern (NA 37), 5 Expl. in altem Heu in Ufernähe der Kinzig in Gesellschaft von *Nephanes titan* (NEWMAN), 13.9.1997, leg. FLECHTNER.

Diese Adventivart, die vorher nur aus Japan und von den Philippinen bekannt war, tauchte in Europa 1974 zuerst in Finnland und 1976 in Schweden auf (LOHSE 1989). 1992 wurde sie erstmals in Mitteleuropa in Rankweil (Vorarlberg, Österreich) festgestellt (KÖHLER 1998). Im Juni 1997 konnte sie dann in Deutschland an Mosel (Cochem-Cond) und Mittelrhein (Rheinbrohl) nachgewiesen werden (KÖHLER 1998). Auch aus Schleswig-Holstein scheint die Art vorzuliegen (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Der Fund aus Schlüchtern stellt einen **Neunachweis für Hessen** dar!

Staphylinidae

Siagonium humerale GERMAR: Frankfurt, Enkheimer Wald (MA 85), 2 Expl. unter der teilweise noch saftenden Rinde einer dicken, entwurzelten Hainbuche, 6.4.1997, leg. FLECHTNER. In Deutschland ist die Art nur aus Aschaffenburg (Bayern) gemeldet worden (BATHON 1992, ELBERT 1994). Weitere mitteleuropäische

- Vorkommen liegen in Österreich (HORION 1963). Der Fund von Frankfurt stellt einen **Neunachweis für Hessen** dar!
- Phloeonomus bosnicus* BERNHAUER: Riedstadt, Kühkopf (MA 51), 1 Expl. unter Rinde, 26.2.1996, leg. HÖHNER.
- Medon piceus* (KRAATZ): Mainhausen-Zellhausen (MA 94), 1 Expl. an *Calluna vulgaris* (L.) HULL, 22.3.1997, leg. HÖHNER. (3)
- Gabrius astutus* (ERICHSON): Darmstadt (MA 72), 1 Expl. im Autokäscher, 16.3.1972, leg. VOGT, in coll. HÖHNER. Bei diesem Exemplar handelt es sich um den **ersten sicheren Nachweis aus Hessen** (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)!
- Ocypus macrocephalus* (GRAVENHORST): Soisberg bei Hohenroda/Rhön (NB 62), 1 Expl. unter Totholz in Buchenwald, 15.8.1997, leg. NAUMANN, det. BUCK, in coll. BUCK. Nach HORION (1965) ist die Art in den Mittelgebirgen des östlichen Mitteleuropa verbreitet. In Deutschland dringt sie im Westen bis in den Thüringer Wald, den Harz und das Wesergebirge vor. In der Rhön war sie bislang nur auf dem bayerischen Kreuzberg gefunden worden. Somit stellt der Fund aus der nördlichen Rhön einen **Neunachweis für Hessen** dar!
- Mycetoporus forticornis* FAUVEL: Mainhausen-Zellhausen (MA 94), 1 Expl. an *Calluna vulgaris* (L.) HULL, 22.3.1997, leg. HÖHNER.
- Lamprinodes saginatus* (GRAVENHORST): Vogelsberg, Breungeshain, Gackerstein (NA 19), 2 Expl. in Bodenfalle, 24.6.-8.7.1996, leg. FRISCH und MORKEL (in coll. FRISCH).
- Encephalus complicans* STEPHENS: Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. in Bodenfalle in Hecke, 16.8.1996, leg. MORKEL.
- Gyrophaena rousi* DVORAK: Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 3 Expl. an Pilz, 6.8.1997, leg. HÖHNER. (2)
- Gyrophaena polita* (GRAVENHORST): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 2 Expl. an Pilz, 6.8.1997, leg. HÖHNER. (3)
- Agaricochara latissima* (STEPHENS): Gettenbach (NA 16), 3 Expl. an Weiden-Porling, 25.1.1997, leg. HÖHNER. (3)
- Aloconota insecta* (THOMSON): Bad Nauheim-Wisselsheim (MA 88), 1 Expl. in Uferschotter, 17.8.1996, leg. HÖHNER.
- Aloconota ultima* (BENICK & LOHSE): Groß-Gerau (MA 63), 3 Expl. am Rand eines Tümpels, 16.9.1997, leg. HÖHNER. (2)
- Liogluta granigera* (KIESENWETTER): Vogelsberg, Breungeshain, Oberwald (NA 19), 3 Expl. in Bodenfallen in Buchenbestand, 24.6.-8.7.1996, leg. FRISCH und MORKEL (in coll. FRISCH).
- Liogluta wuesthoffi* (BENICK): Vogelsberg, Breungeshain, Oberwald (NA 19), 4 Expl. in Bodenfallen in Fichtenforst, 24.6.-8.7.1996, leg. FRISCH und MORKEL (in coll. FRISCH).
- Atheta sequanica* BRISOUT: Groß-Gerau (MA 63), 4 Expl. am Rand eines Tümpels, 24.8.1996, leg. HÖHNER.
- Zyras laticollis* (MÄRKEL): Nähe Hanau (MA 95), 2 Expl. in Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE), 17.5.1984, leg. SCHROTH, in coll. HÖHNER. – Mühlheim-Dietesheim (MA 95), 1 Expl. in Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE), 28.8.1984, leg. SCHROTH, in coll. HÖHNER. – Frankfurt, Enkheimer Ried (MA 85),), 1 Expl. in Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE), 11.12.1984, leg. SCHROTH, in coll. HÖHNER. Aus Hessen liegen **nur alte Meldungen aus dem 19. Jahrhundert** vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)!
- Lomechusa emarginata* (PAYKULL): Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. in Bodenfalle auf Enzian-Schillergrasrasen auf Basalt, 21.6.1996, leg. MORKEL.

Thiasophila inquilina (MÄRKEL): Mühlheim-Lämmerspiel (MA 94), 1 Expl. in Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE), 9.7.1983, leg. SCHROTH, in coll. HÖHNER. – Frankfurt, Seckbacher Ried (MA 85), in Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE), 14.6.1985, leg. SCHROTH, in coll. HÖHNER. Aus Hessen liegen **nur alte Meldungen aus dem 19. Jahrhundert** vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)! (2)

Pselaphidae

Bryaxis nodicornis (AUBÉ): Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. in Bodenfalle in Gebüsch, 26.7.1996, leg. MORKEL.

Claviger testaceus PREYSSLER: Steinau an der Staße (NA 37), 1 Expl. in Ameisennest, 4.6.1972, leg. HÖHNER. – Roßdorf, Roßberg (MA 82), 2 Expl. unter einem Stein, 1.10.1988, leg. HÖHNER. Aus Hessen liegen **nur alte Meldungen aus dem 19. Jahrhundert** vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)! (3)

Malachiidae

Troglops albicans (LINNAEUS): Lorch (MA 14), 1 Expl. an Eichen-Ast, 27.7.1996, leg. HÖHNER. (3)

Ebaeus thoracicus (FOURCROY): Lorch (MA 14), 1 Expl. an Eichenast, 3.7.1997, leg. HÖHNER. (3)

Cleridae

Opilo domesticus STURM: Alsbach, Katharinenberg (MA 71), 1 Expl. an Licht 20.8.1997, leg. ERNST, det. BATHON. (2)

Necrobia ruficollis (FABRICIUS): Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. am Licht auf magerer Fettweide (*Lolium-Cynosuretum*), 19.8.1996, leg. MORKEL.

Trogositidae

Tenebroides fuscus (GOEZE): Groß-Gerau (MA 63), 1 Expl. unter Eichenrinde, 1.3.1997, leg. HÖHNER. (2)

Elateridae

Ampedus rufipennis (STEPHENS): Groß-Gerau (MA 63), 2 Expl. an verpilztem Roßkastanienholz, 16.9.1997, leg. HÖHNER. (2)

Ampedus brunnicornis GERMAR: Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 2 Expl. in Eichenmulm, 29.5.1996, leg. HÖHNER. (1)

Ampedus nigerrimus (LACORDAIRE): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. in Eichenmulm, 29.5.1996, und 1 Expl. an Eichenstamm, 6.8.1997, leg. HÖHNER. (3)

Anostirus castaneus (LINNAEUS): Vogelsberg, Hoherodskopf (NA 19), 1 Expl. 11.6.1996, leg. MORKEL.

Stenagostus rufus (DEGEER): Alsbach, Katharinenberg (MA 71), 2 Expl. am Licht, 12.7. und 18.7.1997, leg. ERNST, det. BATHON. (3)

Stenagostus rhombeus (OLIVIER): Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. am Licht auf magerer Fettweide (*Lolium-Cynosuretum*) in der Nähe eines Eichen-Hainbuchenwaldes, 7.8.1996, leg. MORKEL. (3)

Eucnemidae

Eucnemis capucina AHRENS: Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. in einem Eichen-Hainbuchenwald von Hainbuchen-Altholz geklopft, 2.8.1996, leg. MORKEL. (3)

Dirhagus lepidus (ROSENHAUER): Frankfurt am Main, Stadtwald (Oberrad) (MA 84), 3 Expl. an einem dickem, rindenlosem Ast einer liegenden, toten, während der 1990er-Orkane gefällten Buche, 29.5.1997, leg. FLECHTNER. (3)

Buprestidae

Agrilus guerini LACORDAIRE: Hanau-Steinheim (MA 95), 2 Expl. an *Salix caprea* L., 22.6.1996, ein weiteres Stück wurde aus einem eingetragenen Ast gezogen, es schlüpfte am 15.9.1996, leg. HÖHNER. (3)

Agrilus subauratus GEBLER: Hanau-Steinheim (MA 95), 1 Expl. am 5.8.1996, 3 Expl. am 6.6.1997, 2 Expl. am 11.6.1997 und 1 Expl. am 28.6.1997 an *Salix caprea* L., leg. HÖHNER. (3)

Aphanisticus emarginatus (OLIVIER): Hanau-Steinheim (MA 95), 1 Expl. in *Sphagnum*, 9.5.1997, leg. HÖHNER. (3)

Cerylonidae

Philothermus evanescens (REITTER): Groß-Gerau (MA 63), 13 Expl. an verpilztem Roßkastanienholz, 16.9.1997, leg. HÖHNER. (1)

Erotylidae

Triplax lepida (FALDERMANN): Groß-Gerau (MA 63), jeweils 2 Expl. an trockenen Ästen und am Schuppigen Porling (*Polyporus squamosus* (HUDS. ex FR.) FR.), 14.5.1977, leg. HÖHNER. Die einzigen weiteren Funde dieses Pilzkäfers aus diesem Jahrhundert stammen aus Lampertheim (BRENNER 1997). (2)

Cryptophagidae

Cryptophagus labilis ERICHSON: Frankfurt, Enkheimer Wald (MA 85), 3 Expl. im morschem Holz eines Hainbuchen-Dürrständers (15-20 cm Durchmesser), 6.9.1997, leg. FLECHTNER.

Latridiidae

Melanophthalma sericea (MANNERHEIM): Hanau (MA 95), 1 Expl. an *Chenopodium album* L., 9.9.1996, leg. HÖHNER. Die bisher bekannten Vorkommen dieser Art liegen in Portugal, Südfrankreich, Italien, Griechenland, der Schweiz, der Tschechoslowakei, dem Libanon, Iran und Afghanistan (RÜCKER 1992). Sie ist somit **neu für Deutschland!** Der Fund stellt das bislang nördlichste Vorkommen der Art dar.

Mycetophagidae

Mycetophagus populi FABRICIUS: Vogelsberg, Hoherodskopf (NA 19), 1 Expl. am Licht, 4.6.1996, leg. MORKEL. (2)

Colydiidae

Colydium elongatum (FABRICIUS): Groß-Gerau (MA 63), 2 Expl. unter Eichenrinde, 1.3.1997, leg. HÖHNER. (3)

Corylophidae

Orthoperus nigrescens STEPHENS: Lorch (MA 14), 1 Expl. an Eichenast, 27.7.1996, leg. HÖHNER. (2)

Endomychidae

Endomychus coccineus (LINNAEUS): Biblis (MA 60), 1 Expl. am Licht, 2.8.1985, leg. KRISTAL, in coll. BATHON. – Messel (MA 83), 1 Expl. an Eichen-Ast, 22.5.1993, leg. HÖHNER. Aus Hessen liegen **nur alte Meldungen von vor 1950** vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998)!

Coccinellidae

Scymnus ater KUGELANN: Umgebung Echzell (MA 98), 3 Expl. an *Salix*-Stamm, 3.7.1996, leg. HÖHNER. (2)

Nephus bisignatus claudiae FÜRSCH: Lorch, Nollig (MA14), 1 Expl. von grasigem Weinbergsweg gekäschert, 15.6.1996, leg. HOFMANN, det. FÜRSCH, in coll. HOFMANN. Die Nominatform (*N. bisignatus bisignatus* BOHEMAN) dieser Art findet sich in Deutschland in Küstennähe nicht selten auf Kraut- und Zwergstrauchvegetation (FÜRSCH 1967, HORION 1961). Die ssp. *claudiae* konnte bisher nur am Kaiserstuhl (Baden-Württemberg) nachgewiesen werden (FÜRSCH 1984). Damit stellt der Fund vom Nollig einen **Neunachweis für Hessen** dar! (R)

Coccinella hieroglyphica LINNAEUS: Mainhausen-Zellhausen (MA 94), 2 Expl. an *Calluna vulgaris* (L.) HULL, 22.3.1997, leg. HÖHNER. (3)

Anobiidae

Oligomerus ptilinoides (WOLLASTON): Darmstadt (MA 72), mehrere Exemplare aus Möbeln, die vor etwa einem Jahr von Italien nach Deutschland gebracht worden waren. 16.7.1997, leg. BATHON.

Gastrallus laevigatus (OLIVIER): Lorch (MA 14), 1 Expl. an Eichenast, 16.6.1997, leg. HÖHNER. Zum ersten Mal nicht an Walnuß! (2)

Dorcatoma robusta STRAND: Dreieich (MA 74), 6 Expl. an Baumpilz einer Birke in Gesellschaft von *Bolitochara obliqua* ERICHSON, *Placonotus testaceus* (FABRICIUS), *Enicmus rugosus* HERBST, *Litargus connexus* (FOURCROY), *Rhopalodontus perforatus* (GYLLENHAL), *Bolitophagus reticulatus* (LINNAEUS) und *Taphrorychus bicolor* HERBST, 4.6.1996, leg. MALTEN, in coll. BRENNER. (2)

Oedemeridae

Oedemera femoralis OLIVIER (= *Oncomera femorata* FABRICIUS): Alsbach, Katharinenberg (MA 71), mehrere Expl. an Licht 1.11.1996 und 3.5.1997 (davon je 1 Belegexpl.), leg. ERNST, det. BATHON. - Ebenfalls von Alsbach (Schloß) wird das wohl erste in Hessen gesammelte Exemplar gemeldet (SCRIBA 1869). Die Tiere werden nur sehr vereinzelt gefangen, da sie nachtaktiv sind und Lichtfang bei Koleopterologen nur recht selten betrieben wird. HORION (1956) kennt nur alte Funde bis 1903 aus Hessen; neuere Funde scheinen zu fehlen. (2)

Scaptiidae

Scaptia fuscula MÜLLER: Lorch, (MA 14), 1 Expl. an Eichenast, 3.7.1997, leg. Höhner. - Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 1 Expl. an Eichenstamm, 6.8.1997, leg. HÖHNER. (3)

Anaspis costai ERMISCH: Lorch (MA 14), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 13.7.1996, leg. HÖHNER. (3)

Melandryidae

Ochesia fasciata (ILLIGER): Lorch (MA 14), 1 Expl. an Kirschbaumrinde, 13.7.1996, leg. HÖHNER. (3)

Anisoxia fuscula (ILLIGER): Lorch (MA 14), 1 Expl. an Eichenast, 3.7.1997, leg. HÖHNER. (3)

Conopalpus brevicollis KRAATZ: Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. in Eichen-Hainbuchenwald von Hainbuchen-Altholz geklopft, 26.6.1996, leg. MORKELE. (2)

Alleculidae

- Allecula morio* (FABRICIUS): Lorch, Nollig (MA14), 1 Expl. von Eiche geklopft, 3.8.1996, leg. BRENNER. (3)
Allecula rhenana BACH: Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 1 Expl. an Eichenstamm, 6.8.1997, leg. HÖHNER. (2)
Cteniopus flavus (SCOPOLI): Lorch (MA 14), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 13.7.1996, leg. HÖHNER. (3)

Tenebrionidae

- Bolitophagus reticulatus* (LINNAEUS): Rodenbach bei Hanau (NA 05), 1 Expl. an Buchenstamm, 16.1.1996, leg. HÖHNER. – Messel (MA 83), 1 Expl. in *Fomes*, 26.10.1996, leg. HÖHNER. (3)
Corticeus bicoloroides (ROUBAL): Frankfurt, Enkheimer Wald (MA 85), 3 Expl. im morschem Holz eines Hainbuchen-Dürrständers (15-20 cm Durchmesser), 6.9.1997, leg. FLECHTNER. Diese Art wurde bisher von Niedersachsen und Brandenburg bis Tirol nachgewiesen (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, SCHAWALLER & GRIMM 1992). Für Hessen lag aber bislang noch keine Meldung vor, weshalb die Art hier als **Neunachweis für Hessen** eingestuft wird!
Tenebrio obscurus FABRICIUS: Homberg/Ohm, Ober-Ofleiden (MB 92), 1 Expl. im Hausflur der Alten Mühle, 14.7.1996, leg. NAUMANN, vid. BUCK, in coll. BUCK.

Scarabaeidae

- Polyphylla fullo* (LINNAEUS): Alsbach, Katharinenberg (MA 71), 1 Expl. an Licht 14.7.1997, leg. ERNST. (2)

Cerambycidae

- Rhamnusium bicolor* (SCHRANK): Lampertheimer Wald (MV 69), insgesamt etwa 10 Expl. in einer morschen Stelle in Buchenstamm, 31.5.1997, leg. BRENNER, FLECHTNER, HÖHNER, KOVAC. (2)
Leptura sexguttata FABRICIUS (nach BENSE (1995) in der Gattung *Anoplodera*): Nidda-Eichelsdorf (NA 08), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte an besonntem Waldrand, 10.6.1996, leg. MORKEL. (3)
Leptura scutellata FABRICIUS: Mörfelden, Mönchbruch (MA 63), 1 Expl. an Buchenstamm, 11.6.1996, leg. HÖHNER. (3)
Ropalopus spinicornis (ABEILLE): Lampertheimer Wald (MV 69), 1 Expl. auf dem Boden in Eichenwald, 31.5.1997, leg. BRENNER. (2)
Xylotrechus arvicola (OLIVIER): Lorch (MA 14), 1 Expl. an *Crataegus*-Holz, 13.7.1996, leg. HÖHNER. (2)
Chlorophorus sartor (MÜLLER): Lorch, Nollig (MA14), am 13.7.1996 (leg. HÖHNER) 1 Expl. von Wiese gekäschert, am 3.8.1996 (leg. BRENNER) 2 Expl. auf Umbelliferen-Blüte. (3)
Anaethetis testacea (FABRICIUS): Mörfelden, Mönchbruch (MA 63), 1 Expl. an trockenem Weidenast, 13.6.1997, leg. HÖHNER. (3)
Exocentrus adpersus MULSANT: Lorch, Nollig (MA14), am 6.7.1991 2 Expl. und am 3.8.1996 1 Expl. von Eiche geklopft, leg. BRENNER. (3)
Menesia bipunctata (ZOUBKOFF): Mörfelden, Mönchbruch (MA 63), 2 Expl. von *Rhamnus frangula* L., 13.6.1997, leg. HÖHNER. (3)

Chrysomelidae

Zeugophora frontalis SUFFRIAN: Hanau (MA 95), am 9.9.1996 erst 2 Expl., am 16.9.1996 noch einmal 3 Expl. und am 5.9.1997 schließlich 1 Expl. von *Populus tremula* L. geklopft, leg. HÖHNER. (2)

Phratora atrovirens (CORNEL): Nähe Hanau (MA 95), 1 Expl. unter Kastanien-Rinde, 15.1.1972, leg. HÖHNER. – Gründau-Gettenbach (NA 16), 1 Expl. an *Populus tremula* L., 18.8.1979, leg. HÖHNER. – Obertshausen (MA 84), 1 Expl. an trockenem Ast, 23.7.1988, leg. HÖHNER. – Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 1 Expl. auf einem trockenen Weiden-Ast, 9.8.1993, leg. HÖHNER. Diese einige Zeit zurückliegenden, aber bislang nicht publizierten Funde stellen **die ersten sicheren Nachweise für Hessen** dar!

Aphthona violacea (KOCH): Groß-Gerau (MA 63), 12 Expl. an *Euphorbia palustris* L., 24.8.1996, leg. HÖHNER. (2)

Longitarsus aeruginosus (FOUDRAS): Hanau-Steinheim (MA 95), 1 Expl. an *Eupatorium cannabinum* L., 6.8.1997, leg. HÖHNER. (3)

Longitarsus membranaceus (FOUDRAS): Erlensee (MA 95), 1 Expl. an *Lamium album* L., 18.5.1977, leg. HÖHNER. – Gründau-Breitenborn (NA 16), 2 Expl. an *Galeopsis tetrahit* L., 24.9.1977, leg. HÖHNER. – Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. von Trockenrasen gekäschert, 18.9.1993, leg. BRENNER. Diese Funde des an *Teucrium*-Arten lebenden Blattflohs stellen **die ersten sicheren Nachweise aus Hessen** dar!

Longitarsus obliteratoides GRUEV: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. von Wegrand gekäschert, 8.8.1997, leg. HOFMANN, det. FLECHTNER. (2)

Cassida murraea LINNAEUS: Bad Nauheim-Wisselsheim (MA 88), 3 Expl. an *Pulicaria dysenterica* L., 17.8.1996, leg. HÖHNER.

Anthribidae

Rhaphitropis marchicus (HERBST): Hanau-Steinheim (MA 95), 2 Expl. an *Salix caprea* L., 22.6.1996, leg. HÖHNER.

Noxius curtirostris (MULSANT): Lorch, Nollig (MA 14), am 13.7. (leg. HÖHNER) 1 Expl., am 27.7. (leg. HÖHNER) 1 Expl. und am 3.8.1996 (leg. HÖHNER & BRENNER) 13 Expl. von *Cotoneaster integerrimus* MEDIKUS geklopft. Diese mediterrane Art konnte nördlich bis Südtirol nachgewiesen werden (FRIESER 1981). Die Funde vom Nollig stellen somit einen **Neunachweis für Deutschland** dar, und zusammen mit einem neuen Fund aus der Slowakei (FRIESER 1998) sind sie **die einzigen Nachweise aus Mitteleuropa!**

Curculionidae

Cossonus cylindricus SAHLBERG: Umgebung Echzell (MA 98), 1 Expl. an *Salix*-Stamm, 3.7.1996, leg. HÖHNER. (3)

Anthonomus bituberculatus THOMSON: Erlensee (MA 95), 1 Expl. von Weißdorn geklopft, 20.3.1996, leg. HÖHNER. (3)

Hypera pastinacae (ROSSI): Lorch (MA 14), 1 Expl. an *Anthemis tinctoria* L., 13.7.1996, leg. HÖHNER. (2)

Gasterocercus depressirostris (FABRICIUS): Alsbach, Katharinenberg (MA 71), 1 Expl. an Licht 2.7.1997, leg. ERNST, det. BATHON; s.a. BATHON & BRENNER (1996). (1)

Cryptorhynchus lapathi (LINNAEUS): Hanau-Steinheim (MA 95), 1 Expl. an *Salix caprea* L., leg. HÖHNER.

Acalles dubius SOLARI: Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 1 Expl. an Eichenstamm, 6.8.1997, leg. HÖHNER. (3)

- Baris morio* (BOHEMAN): Lorch (MA 14), 1 Expl. an *Reseda luteola* L., 13.7.1996, leg. HÖHNER. (3)
- Baris lepidii* GERMAR: Erlensee (MA 95), 1 Expl. an *Berteroa incana* (L.) DE CANDOLLE., 25.6.1996, leg. HÖHNER.
- Baris fallax* (BRISOUT): Lorch (MA 14), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 16.6.1997, leg. HÖHNER. (3)
- Baris picicornis* (MARSHAM): Hanau (MA 95), 3 Expl. an *Reseda luteola* L., 10.6.1996, leg. HÖHNER.
- Ceutorhynchus ignitus* GERMAR: Erlensee (MA 95), 3 Expl. an *Berteroa incana* (L.) DE CANDOLLE, 25.6.1996, leg. HÖHNER.
- Ceutorhynchus pumilio* (GYLLENHAL): Rodenbach (NA 05), 5 Expl. an *Teesdalia nudicaulis* (LINNAEUS) BROWN, 22.5.1977, leg. HÖHNER. – Hanau-Großauheim (MA 95), 1 Expl. im Wurzelbereich von *Calluna vulgaris* (LINNAEUS) HULL, 26.5.1979, leg. HÖHNER. – Rhön, Rotes Moor (NA 79), 1 Expl. an *Betula carpatica* WALDSTEIN & KITAIBEL, 30.6.1995, leg. HÖHNER. Die Art wurde in der Vergangenheit zwar mehrfach in Hessen gesammelt, aber nie publiziert (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998), weswegen sie hier als **Neufund für Hessen** gemeldet wird!
- Weitere Funde aus dem benachbarten Bayern: Alzenau (Unterfranken) (NA 04), 1 Expl. gekäschert, 12.5.1983, leg. HÖHNER. – Kahl (Unterfranken) (NA 04), 1 Expl. an *Teesdalia nudicaulis* (LINNAEUS) BROWN, 7.5.1993, leg. HÖHNER.
- Miarus micros* (GERMAR): Lorch (MA 14), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 16.6.1997, leg. HÖHNER. (3)

Literatur

- BATHON, H. (1992): Käferfunde der Jahre 1990 bis 1992 aus Hessen. – Hess. faun. Briefe **12**(4): 60-64, Darmstadt.
- BATHON, H. & U. BRENNER (1996): Käferfunde des Jahres 1993 aus Hessen. 6. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen. – Hess. faun. Briefe **15**(1): 1-10, Darmstadt.
- BENSE, U. (1995): Longhorn Beetles / Bockkäfer. – Margraf Verlag, Weikersheim.
- BRENNER, U. (1997): Käferfunde des Jahres 1994 aus Hessen. – Hess. faun. Briefe **16**(2): 17-28, Darmstadt.
- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft **55**, 434 S., Bonn-Bad Godesberg.
- ELBERT, A. (1994): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Untermaingebiet zwischen Hanau und Würzburg. 2. Nachtrag zur Gebietsfauna von Dr. Karl Singer, 1955. – Mitt. naturwiss. Mus. Aschaffenburg **16**: 3-113, Aschaffenburg.
- FRIESER, R. (1981): 90. Familie: Anthribidae (Breitmaulrüßler). – In: H. FREUDE, K.W. HARDE & G.A. LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas, Band **10**: 22-34, Goecke & Evers, Krefeld.
- FRIESER, R. (1998): 90. Familie: Anthribidae. – In: W.H. LUCHT & B. KLAUSNITZER: Die Käfer Mitteleuropas, Band **15** (4. Supplementband): 325, G. Fischer, Jena.
- FÜRSCH, H. (1967): 62. Familie: Coccinellidae (Marienkäfer). – In: H. FREUDE, K.W. HARDE & G.A. LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas, Band **7**: 227-278, Goecke & Evers, Krefeld.

- FÜRSCH, H. (1984): Bemerkenswerte Coccinelliden-Funde vom Kaiserstuhl (Coleoptera, Coccinellidae). – Nbl. Bayer. Entomol. **33**(4): 116-119, München.
- HEYDEN, L. von (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – Frankfurt am Main.
- HORION, A. (1956): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 5: Heteromera. – Entomol. Arb. Mus. Frey, Sonderband, Tutzing.
- HORION, A. (1961): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 8: Clavicornia 2. Teil (Thorictidae bis Cisidae), Terebrantia, Coccinellidae. – Überlingen (Selbstverlag).
- HORION, A. (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 9: Staphylinidae, 1. Teil: Micropeplinae bis Euaesthetinae. – Überlingen (Selbstverlag).
- HORION, A. (1965): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 10: Staphylinidae, 2. Teil: Paederinae bis Staphylininae. – Überlingen (Selbstverlag).
- KÖHLER, F. (1998): 21. Familie: Ptiliidae. – In: W.H. LUCHT & B. KLAUSNITZER: Die Käfer Mitteleuropas, Band **15** (4. Supplementband): 117-118. – G. Fischer, Jena.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomol. Nachr. Ber. Beiheft **4**: 1-185, Dresden.
- LOHSE, G.A. (1989): 21. Familie: Ptiliidae. – In: G.A. LOHSE & W.H. LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas, Band **12** (1. Supplementband): 118-120, Goecke & Evers, Krefeld.
- LOHSE, G.A., W. SCHAWALLER & R. GRIMM (1992): 83. Familie: Tenebrionidae. In: G.A. LOHSE & W.H. LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas Band **13** (2. Supplementband): 193-199, Goecke & Evers, Krefeld.
- MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz (Natur in Hessen), Wiesbaden.
- RÜCKER, W.H. (1992): 58. Familie: Latridiidae. – In: G.A. LOHSE & W.H. LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas, Band **13** (2. Supplementband): 139-160, Goecke & Evers, Krefeld.
- SCHERF, H. (1968): Die Carabidenfauna des Naturschutzparkes Hoher Vogelsberg. – Entomol. Bl. **64**(3): 130-156, Krefeld.
- SCHERF, H. & U. DRECHSEL (1971): Die Carabidenfauna des Naturschutzparkes Hoher Vogelsberg. 1. Nachtrag. – Entomol. Bl. **67**(3): 147-156, Krefeld.
- SCRIBA, W. (1869): Die Käfer im Großherzogthum Hessen und seiner nächsten Umgebung. – Ber. oberhess. Ges. Natur- und Heilkde. **13**: 89-99, Gießen.

Verfasser

Uli Brenner, Strauchweg 2, 36381 Schlüchtern

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: [Käferfunde der Jahre 1996 und 1997 aus Hessen 17-27](#)