

Käferfunde der Jahre 2004 und 2005 aus Hessen

14. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen ¹⁾

ULI BRENNER

Summary

Faunistic records of 319 species of beetles are recorded from the state of Hesse (Germany). Of these 256 are dealt with as endangered species in the Red Book of Animals in Germany. 12 species are recorded as new to Hesse.

Zusammenfassung

Es werden 578 Fundmeldungen von 319 Arten aus 64 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen 31 Arten nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) als vom Ausstreben bedroht (1), 78 Arten als stark gefährdet (2) und 132 Arten als gefährdet (3) eingestuft werden. 15 weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste (V). 12 Arten werden als Neunachweise für Hessen angesehen: *Cypha imitator* (LUZE), *Meligethes caudatus* GUILLEBEAU, *Triplax collaris* (SCHALLER), *Enicmus geminatus* RÜCKER, *Corticaria alleni* JOHNSON, *Gastrallus knizeki* ZAHRADNIK, *Dorcatoma punctulata* MULSANT & REY, *Cyclodinus constrictus* (CURTIS), *Longitarsus pulmonariae* WEISE, *Longitarsus quadriguttatus* (PONTOPPIDAN), *Chaetocnema tibialis* (ILLIGER) und *Ceutorhynchus cakilis* (HANSEN). Außerdem wurden 5 Arten nach mehr als 100 Jahren in Hessen wiedergefunden: *Laemostenus terricola* (HERBST), *Batrissodes oculus* (AUBÉ), *Dibolia cynoglossi* (KOCH), *Cassida prasina* ILLIGER und *Hadroplontus trimaculatus* (FABRICIUS). Eine Art stellt einen Wiederfund in Hessen nach mehr als 70 Jahren dar: *Atomaria ornata* HEER.

In dieser Ausgabe der „Käferfunde“ sind mehr faunistische Meldungen als in jede zuvor in dieser Reihe erschienene eingegangen. Dies ist zum einen dem Umstand zu verdanken, dass wieder zwölf Sammler bereit waren, ihre herausragenden Funde den Kollegen mitzuteilen. Zum anderen aber ist dies auch dem ungeheuren Sammelfleiß einiger dieser Faunisten zuzuschreiben. Hier zeigt sich, wie groß der Kenntniszuwachs durch ehrenamtlich tätige Entomologen sein kann. Die stolze Zahl von 319 faunistisch interessanten Arten, darunter 12 Arten, die noch nie in Hessen nachgewiesen werden konnten und 256 Arten der Roten Liste, sprechen für sich.

Auch diesmal dominieren wieder Holzkäfer die Liste. Dies liegt – wie auch in der Vergangenheit – am bevorzugten Sammelhabitat der südhessischen Koleopterologen. Es ist erfreulich, aber doch auch erstaunlich, dass immer wieder für Hessen neue Arten aus den „altbekannten“ südhessischen Wäldern gesammelt werden können. Hier zeigt sich, wie wichtig eine kontinuierliche faunistische Arbeit für den Erkenntnisgewinn ist. Es wird aber auch sichtbar, dass Wälder keinen statischen Lebensraum darstellen, sondern dass durch Einwanderung (Stichwort Klimaerwärmung) oder durch die Förderung bestimmter bislang als Seltlinge geltender Arten und die damit einhergehende Zunahme der Populationsgrößen neue Arten für die Region festgestellt werden können.

¹⁾13. Bericht in: Hess. faun. Briefe 24(3): 41-62

Erfreulich ist auch, dass eine Anzahl der Meldungen aus einer koleopterologisch bislang weißen Region auf der hessischen Landkarte stammt. Die Gegend um Hadamar trat meines Wissens faunistisch bislang kaum in Erscheinung. Dass dort eine für Hessen neue Art sowie etliche Arten der Roten Liste gefunden werden konnten, zeigt, dass auch diese Gegend eine Exkursion wert ist.

Um den Umfang dieser Arbeit nicht zu sprengen, wurde diesmal weitgehend darauf verzichtet, so detailliert, wie aus den letzten Ausgaben gewohnt, auf die faunistische Situation vieler Arten in Hessen einzugehen. Der interessierte Faunist wird auf die zurückliegenden „Käferfunde“ verwiesen, in denen für eine große Zahl von Arten bereits umfangreiche faunistische Angaben gemacht wurden.

Nach den Fundorten sind in Klammern die zugehörigen UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten die Gefährdungskategorien nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) (=RL D), bei abweichender Einstufung der Carabidae bzw. Trogidae, Geotrupidae, Scarabaeidae und Lucanidae zusätzlich auch nach den hessischen Roten Listen von MALTEN (1998) und SCHAFFRATH (2003) (=RL H), geklammert angegeben [(RL D)/(RL H)].

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von Horst BATHON (Roßdorf), Uli BRENNER (Schlüchtern), Hans-Georg FRITZ (Darmstadt), Günter HOFMANN (Stockstadt), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Werner HORN (Erbach), Mathias KOCH (Darmstadt), Frank KÖHLER (Bornheim), Roland KUNZ (Hadamar), Frank LANGE (Seeheim-Jugenheim), Wolfgang NÄSSIG (Schlüchtern) und Gerd REDER (Flörsheim-Dalsheim).

Carabidae

Cicindela sylvicola DEJEAN: Roßdorf, Roßberg (MA 82), 1 Expl. an Sandhang, 10.4.2004, leg. HÖHNER. (V/3)

Calosoma inquisitor (LINNAEUS): Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald (MA 60), 1 Expl. auf Waldweg, 2.5.2004, leg. LANGE. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), Sichtbeobachtungen von auf Waldwegen laufenden Tieren, z. B. je 1 Expl. 28.4.2005, 29.4.2005 und 6.5.2005. Die Art trat im Kranichsteiner Forst in den Jahre 2004 und 2005 sehr häufig auf, vid. KOCH. (3)

Carabus ulrichii GERMAR: Riedstadt–Crumstadt, Lehrbruch (MA 61), 1 Expl. tagsüber auf Weg, 3.4.2005, leg. LANGE. – Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 1 Expl. in Hausgarten, 4.5.2005, leg. BRENNER. (3)

Carabus arvensis HERBST: Brensbach–Wersau (MA 91), je 1 Expl. in morscher liegender Buche, 10.1. und 24.3.2005, leg. HORN. (V/3)

Leistus rufomarginatus (DUFTSCHMID): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. auf Waldweg, 22.10.2005, leg. KOCH. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Dianaburg (MA 73), 1 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Eichen-Höhle, 27.5.-6.7.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 7 Expl. in Fallen (Salzlösung) im Mulm in Buchen-Höhlen, 27.5.-5.7.2005, leg. LANGE. – Ronneburg–Neuwiedermulß (NA 06), 1 Expl. in der Streu in Laubwald, 2.10.2004, leg. BRENNER. (-/3)

Omophron limbatum (FABRICIUS): Heusenstamm (MA 84), 1 Expl. am Ufer einer Kiesgrube, 22.8.2005, leg. HÖHNER. (3)

Clivina collaris (HERBST): Heringen (Werra) (NB 73), 1 Expl. auf Salzboden, 29.6.2004, leg. HÖHNER. (VI/-)

- Dyschirius tristis* STEPHENS: Heringen (Werra) (NB 73), 1 Expl. auf Salzboden, 29.6.2004, leg. HÖHNER. (3)
- Brosicus cephalotes* (LINNAEUS): Weiterstadt–Gräfenhausen (MA 73), 1 Expl. auf Spargelfeld, 17.6.2005, leg. HÖHNER. (V/2)
- Bembidion assimile* GYLLENHAL: Heppenheim, Jochimsee (MA 70), 3 Expl. am schlammigem Ufer eines Teiches, 19.9.2004, leg. LANGE. (V/-)
- Bembidion quadripustulatum* SERVILLE: Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 5 Expl. im Uferbereich eines wassergefüllten Grabens, 28.4.2005, leg. KOCH. (V/3)
- Bembidion octomaculatum* (GOEZE): Hanau, Kleine Bulau (MA 95), 1 Expl. am Ufer der Kinzig, 3.9.2005, leg. HÖHNER. (2/3)
- Anisodactylus signatus* (PANZER): Lampertheim–Hofheim, Damm entlang der Weschnitz (MA 50), 1 Expl. bei Sonne auf dem Damm, 28.3.2004, leg. LANGE. (V/3)
- Acupalpus parvulus* (STURM): Lampertheim (MV 59), 1 Expl. unter der Rinde eines dicken, am Boden liegenden Asts an Gewässerrand, 21.2.2004, leg. LANGE. (V/3)
- Acupalpus dubius* SCHILSKY: Gernsheim, Rhein-Ufer (MA 60), 1 Expl. bei Hochwasser an schwimmendem Holzstück in Altarm, 25.8.2005, leg. LANGE. (V/3)
- Anthraxus consputus* (DUFTSCHMID): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. auf Waldweg, 29.4.2005, leg. KOCH. (3)
- Pterostichus diligens* (STURM): Ehrenberg–Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 17.7.2004, leg. HÖHNER. (V/-)
- Pterostichus cristatus* (DUFTSCHMID): Oberursel, Hohe Mark (MA 66), 1 Expl. unter Stein am Fuß einer Blockhalde, 26.5.2005, leg. LANGE. (-/V)
- Calathus micropterus* (DUFTSCHMID): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. unter toter Kiefern-Rinde, 23.1.2005, leg. LANGE. (V)
- Laemostenus terricola* (HERBST): Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 11 Expl. an Käseköder in Kaninchen-Bau, 26.4.2005, leg. HÖHNER.
Aus Hessen sind mir lediglich Altfunde aus dem Rheingau sowie von Wiesbaden und Frankfurt aus dem 19. Jahrhundert bekannt (HEYDEN 1904). Der Fund vom Berger Hang stellt damit einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar! (3)
- Zabrus tenebrioides* (GOEZE): Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. auf Schotterweg zwischen Wiesen (kein Getreidefeld in unmittelbarer Nähe), 22.8.2004, leg. LANGE. – Langenselbold (NA 05), 1 Expl. auf Weg, 23.8.2004, leg. HÖHNER. – Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 1 Expl. an Wegrand, 4.10.2004, leg. HÖHNER. (-/3)
- Amara tibialis* (PAYKULL): Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotbühl (MA 73), 1 Expl. auf Feldweg, 24.4.2005, leg. KOCH. (V/3)
- Demetrias imperialis* (GERMAR): Erlensee–Rückingen (MA 95), 1 Expl. an Sauergras, 25.6.2004, leg. HÖHNER. (V/3)
- Philorhizus sigma* (ROSSI): Erlensee–Rückingen (MA 95), 1 Expl. unter Ahorn-Rinde, 3.12.2004, leg. HÖHNER. (V/3)
- Philorhizus melanocephalus* DEJEAN: Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 2 Expl. in weißfaulem Pappel-Stammteil am Boden, 7.3.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. in Laubgesiebe unter einer Pappel und einer Eiche, die direkt nebeneinander wachsen, 21.11.2004, leg. LANGE. (-/V)

Haliplidae

- Halipus fulvus* (FABRICIUS): Freiensteinau – Ober-Moos (NA 28), 1 Expl. in Teich, 30.4.2004, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER. (3)

Dytiscidae

Stictotarsus duodecimpustulatus (FABRICIUS): Schlüchtern–Kressenbach (NA 37), 1 Expl. unter Stein in Bach, 9.7.2005, leg. BRENNER.

Hydraenidae

Hydraena pygmaea WATERHOUSE: Hadamar (MA 38), 17 Expl. in Bachmoos im Lohbach zusammen mit zahlreichen *H. gracilis* GERMAR und *H. nigrita* GERMAR, 8.4.2005, leg. KUNZ. (V)

Hydraena minutissima STEPHENS: Hadamar (MA 38), 5 Expl. in Bachmoos im Lohbach zusammen mit den oben genannten Arten, 8.4.2005, leg. KUNZ.

Histeridae

Plegaderus dissectus ERICHSON: Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 2 Expl. unter der Rinde einer toten, umgestürzten Kiefer, 4.9.2004, leg. LANGE. – Gernsheim – Klein-Rohrheim, Hammer Aue (MA 60), 1 Expl. im weißfaulen Holz einer umgestürzten Schwarzpappel, 2.4.2004, leg. LANGE. – Biblis–Wattenheim, am Weschnitz-Ufer (MA 50), 1 Expl. in morschem, aber trockenem Pappel-Stamm, 28.3.2004, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. im morschen Holz eines liegenden Buchen-Stamms, 27.4.2005, leg. LANGE. – Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 4 Expl. im weißfaulen Holz einer Buchen-Höhle, 16.5.2005, leg. LANGE. (3)

Aeletes atomarius (AUBÉ): Heppenheim (MV 79), 28 Expl. im Mulm in den Stubben frisch gefällter hohler Linden, 27.3.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. in morschem Buchen-Stubben bei *Lasius* (Holzameise), 25.4.2004, leg. LANGE. (1)

Margarinotus merdarius (HOFFMANN): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Buchen-Höhle, 1.6.-1.7.2004, leg. LANGE. – Linden – Großen-Linden, Ortslage (MA 79), 3 Expl. in einem alten Schafstall, 18.2.1986, leg. KÖHLER.

Aus Hessen sind mir nur Altfunde aus dem 19. Jahrhundert von Frankfurt und Weilburg (HEYDEN 1904) sowie von Kassel (WEBER 1903) bekannt. Deshalb stellen die Funde von Groß-Gerau und Linden **Wiederfunde in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar!

Agyrtidae

Agyrtus bicolor CASTELNAU: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 5 Expl. an liegenden, stark verpilzten und bemoosten Buchen-Stämmen, 4.12.2005, leg. LANGE. (2)

Cholevidae

Dreposcia umbrina (ERICHSON): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde vom Stammfuß mit *Lasius* (Holzameise), 26.4.2005, leg. LANGE. – Bensheim–Schwanheim, Jägersburger Wald (MA 60), 1 Expl. in dünnem, hohlem, liegendem Buchen-Stamm, 28.3.2004, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. im Mulm einer Eichen-Höhle, 5.8.2005, leg. HÖHNER. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. aus abgestorbenen *Meripilus giganteus* (PERS. ex FRIES) KARST. (Riesenporling) am Fuß einer toten Buche, 23.9.2005, leg. LANGE. (2)

Scydmaenidae

Euconus unicus FRANZ: Hanau – Klein-Auheim (MA 95), 10 Expl. in Kompost, 23.10.2004, leg. HÖHNER.

Nachdem HÖHNER die Art 2001 für Hessen nachweisen konnte (BRENNER 2005), bestätigte er nun das Vorkommen in Klein-Auheim und machte dadurch das Vorkommen einer stabilen Population wahrscheinlich.

Euconnus maeklinii (MANNERHEIM): Hanau – Klein-Auheim (MA 95), 10 Expl. in Kompost, 23.10.2004, leg. HÖHNER. (3)

Euconnus fimetarius (CHAUDOIR): Linden–Leihgestern, Ortslage (MA 79), 2 Expl. in einem kleinen Hühnerstall, 14.12.1985, leg. KÖHLER.

Scydmaenus perrisii REITTER: Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 5 Expl. im etwas feuchten Mulm unter der sehr lockeren Rinde einer umgestürzten Kiefer mit *Lasius* (Holzameise) (nicht *Pinus sylvestris* LINNAEUS, evtl. Art aus Nordamerika), 4.4.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. unter Kiefern-Rinde, 16.4.2005, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 2 Expl. je unter Eichen- und Buchen-Rinde, 16.4.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde vom Stammfuß mit *Lasius* (Holzameise), 26.4.2005, leg. LANGE. (2)

Scydmaenus hellwigii (HERBST): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 2 Expl. je unter Eichen- und Buchen-Rinde, 16.4.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde vom Stammfuß mit *Lasius* (Holzameise), 26.4.2005, leg. LANGE. – Riedstadt–Crumstadt, Lehrbruch (MA 61), 8 Expl. unter der Rinde älterer Pappel-Stubben mit *Lasius* (Holzameise), 3.4.2005, leg. LANGE. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. im Mulm einer Buchen-Höhle, die nach oben offen ist, 8.8.2004, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 2 Expl. in Laubgesiebe, 3.1.2004, leg. LANGE. – Bensheim–Schwanheim, Jägersburger Wald (MA 60), 2 Expl. unter der Rinde eine dicken, toten Buche, 28.3.2004, leg. LANGE. (3)

Ptiliidae

Ptenidium gressneri ERICHSON: Seeheim-Jugenheim – Steigerts (MA 71), 1 Expl. in Hohlraum am Fuß einer Buche, 14.11.2004, leg. LANGE. (3)

Staphylinidae

Siagonia humerale GERMAR: Erlensee–Rückingen (MA 95), je 1 Expl. am 3.12.2004 und 3.1.2005 unter Ahorn-Rinde, leg. HÖHNER.

Scaphium immaculatum (OLIVIER): Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 3 Expl. an *Meripilus giganteus* (PERS. ex FRIES) KARST. (Riesenporling) am Fuß einer toten Buche, 11.9.2005, leg. LANGE. (3)

Scaphisoma balcanicum TAMANUKI: Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an morschem Holz in Laubwald, 18.4.2004, leg. LANGE. (3)

Thoracophorus corticinus MOTSCHULSKY: Lampertheim (MV 59), 6 Expl. in hohler Pappel zusammen mit *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 21.2.2004, leg. LANGE. – Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden, (MA 60), 1 Expl. im etwas feuchten Mulm unter der sehr lockeren Rinde einer umgestürzten Kiefer mit *Lasius* (Holzameise) (nicht *Pinus sylvestris* LINNAEUS, evtl. Art aus Nordamerika), 4.4.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Rhein-Ufer (MA 60), 1 Expl. zwischen den Jahresringen eines liegenden Pappel-Stamms mit weißfaulem Holz, 18.12.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 3 Expl. in hohlem, liegenden Buchen-Stamm mit *Lasius*-Nest (Holzameise), 9.6.2005, leg. LANGE. (1)

Phyllodrepa nigra (GRAVENHORST): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 83), 1 Expl. an Blätterpilz an Buche, 17.10.2004, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 2 Expl. in Laubgesiebe, 3.1.2004, leg. LANGE. (3)

- Xylostiba bosnica* (BERNHAEUER): Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Dianaburg (MA 73), 5 Expl. an vertrockneten Hutzpilzen an Buchen-Stamm, 23.10.2004, leg. LANGE.
– Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 83), 9 Expl. an Blätterpilzen an Buche, 17.10.2004, leg. LANGE.
- Bledius defensus* FAUVEL: Hanau, Große Bulau (MA 95), 5 Expl. am Ufer der Kinzig, 24.7.2004, leg. HÖHNER; am gleichen Fundort noch einmal je 1 Expl. 9.9.2004 und 13.7.2005, leg. HÖHNER. (3)
- Oxyporus maxillosus* FABRICIUS: Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. an Baumpilz an Buche, 5.8.2005, leg. HÖHNER.
- Stenus glacialis* HEER: Oberursel, Hohe Mark (MA 66), 2 Expl. in Laubstreu und Moos zwischen Steinen, 26.5.2005, leg. LANGE.
- Hypnogyra angularis* (GANGLBAUER) (= *H. glabra* (NORDMANN)): Heppenheim (MV 79), 6 Expl. in Mulm aus den Stümpfen hohler, frisch gefällter Linden, 27.3.2005, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde vom Stammfuß mit *Lasius* (Holzameise), 26.4.2005, leg. LANGE. (3)
- Hesperus rufipennis* (GRAVENHORST): Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 2 Expl. im Mulm einer Buchen-Höhle, die nach oben offen ist, 8.8.2004, leg. LANGE. – Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 2 Expl. in Hohlraum im Stumpf einer relativ frisch gefällten Esche, der Mulm, Sägemehl sowie ein Nest von *Lasius brunneus* (LATREILLE) (Braune Holzameise) enthielt, 4.4.2004, leg. LANGE; am selben Fundort am selben Tag 4 Expl. in großer Eschen-Höhle, leg. LANGE. (2)
- Philonthus sparsus* LUCAS (= *Bisnius* s.): Linden – Großen-Linden, Ortslage (MA 79), 21 Expl. in einem alten Schafstall in Strohresten und kompostiger Bodenstreu, 18.2.1986, leg. KÖHLER.
Die Art war in Hessen bislang nur einmal im Schwanheimer Wald bei Frankfurt gefunden worden (BRENNER 2003).
- Ocypus tenebricosus* (GRAVENHORST): Glashütten–Schloßborn, Dattenberg (MA 56), 1 Expl. in Wald unter Stein, 28.9.2005, leg. LANGE. (3)
- Velleius dilatatus* (FABRICIUS): Hadamar (MA 38), 1 Expl. an alter Eiche (Köderfang), 20.7.2004, leg. KUNZ. (3)
- Quedius truncicola* FAIRMAIRE & LABOULBÈNE: Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Buchen-Höhle, 26.5.-4.7.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 3 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Buchen-Höhle, 27.5.-5.7.2005, leg. LANGE. (3)
- Quedius brevicornis* THOMSON: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. in Buchen-Höhle, 27.4.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Buchen-Höhle, 27.5.-5.7.2005, leg. LANGE. (3)
- Carphacis striatus* (OLIVIER): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an *Polyporus (tuberaster)* (PERS.) ex FRIES ?) (Porling), 28.5.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 2 Expl. an Pilz, 30.6.2005, leg. HÖHNER. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 1 Expl. an *Meripilus giganteus* (PERS. ex FRIES) KARST. (Riesenporling) am Fuß einer toten Buche, 11.9.2005, leg. LANGE. – Frankfurt–Sachsenhausen (MA 74), 1 Expl. an Pilz, 25.7.2005, leg. HÖHNER. (2)
- Cypha imitator* (LUZE): Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 2 Expl. am 30.12.2003 und 1 Expl. am 1.1.2004 in Hausgarten in Kompost, leg. KUNZ.
Die Art ist bislang in Europa nur im südlichen Skandinavien und nördlichen Mitteleuropa sehr sporadisch bekannt geworden (HORION 1967). Aus Deutschland liegen Nachweise aus Baden, vom Nordrhein und aus Westfalen vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Der Fund von Hadamar stellt somit einen **Neunachweis für Hessen** dar!

- Gyrophæna rousi* DVORAK: Hanau, Kleine Bulau (MA 95), 1 Expl. an *Polyporus squamosus* (HUDS. ex FRIES) FRIES (Schuppiger Porling), 23.6.2005, leg. HÖHNER. (2)
- Bolitochara bella* MÄRKEL: Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 3 Expl. an Pilz, 30.6.2005, leg. HÖHNER. – Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 1 Expl. an Baumpilz an Kirschbaum, 23.4.2005, leg. HÖHNER.
- Notothecta confusa* (MÄRKEL): Lich, Kloster Arnsburg (MA 89), 1 Expl. in Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE), 13.4.1986, leg. KÖHLER.
- Alaobia scapularis* (SAHLBERG): Kelsterbach, Mönchwald (MA 64), 1 Expl. auf Sandboden, 28.4.2004, leg. LANGE. (3)
- Zyras laticollis* (MÄRKEL): Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 3 Expl. in hohler Pappel, 3.4.2004, leg. LANGE.
- Aleochara funebris* WOLLASTON (= *A. albobillosa* BERNHAUER): Linden – Großen-Linden, Ortslage (MA 79), 19 Expl. in einem alten Schafstall, 18.2.1986, leg. KÖHLER.
- Aleochara peusi* WAGNER: Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 1 Expl. an Käseköder in Kaninchen-Bau, 26.4.2005, leg. HÖHNER. (1)
- Aleochara irmgardis* VOGT: Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. in Maulwurfs-Nest auf feuchter Wiese, 15.2.2004, leg. KUNZ.

Pselaphidae

- Batrissodes adnexus* (HAMPE): Darmstadt, Darmstädter Kreuz (MA72), 1 Expl. in hohlem, trockenen Pappel-Stamm, 21.3.2004, leg. LANGE. – Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 1 Expl. im etwas feuchten Mulm unter der sehr lockeren Rinde einer umgestürzten Kiefer mit *Lasius* (Holzameise) (nicht *Pinus sylvestris* LINNAEUS, evtl. Art aus Nordamerika), 4.4.2004, leg. LANGE. (2)
- Batrissodes buqueti* (AUBÉ): Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 1 Expl. im etwas feuchten Mulm unter der sehr lockeren Rinde einer umgestürzten Kiefer mit *Lasius* (Holzameise) (nicht *Pinus sylvestris* LINNAEUS, evtl. Art aus Nordamerika), 4.4.2004, leg. LANGE. (2)
- Batrissodes oculatus* (AUBÉ): Riedstadt–Crumstadt (MA 61), 19 Expl. unter der Rinde älterer Pappel-Stubben bei *Lasius* (Holzameise), 3.4.2005, leg. LANGE.
Aus Hessen war bislang nur ein Altfund vom Ende des 19. Jahrhunderts aus Wiesbaden bekannt (HORION 1949). Der Fund von Crumstadt stellt damit einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar! (1)

Lycidae

- Platycis cosnardi* (CHEVROLAT): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 2 Expl. an stark beschatteter Buchen-Ruine, 11.5.2004, leg. LANGE. – Oberursel, Hohe Mark (MA 66), 2 Expl. an der Schnittfläche einer gefällten Fichte, 26.5.2005, leg. LANGE. (2)

Cantharidae

- Metacantharis discoidea* (AHRENS): Steinau an der Straße – Marborn (NA 37), 1 Expl. an *Juniperus communis* LINNAEUS (Wacholder), 29.5.2004, leg. BRENNER.
- Absidia schoenherri* (DEJEAN): Ehrenberg–Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 17.7.2004, leg. HÖHNER.

Malachiidae

- Troglops albicans* (LINNAEUS): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an Pilz, 30.6.2005, leg. HÖHNER. (3)

- Clanoptilus elegans* (OLIVIER): Heringen (Werra) (NB 73), 1 Expl. an *Phragmites communis* LINNAEUS (Schilf), 29.6.2004, leg. HÖHNER. (3)
Cerapheles terminatus (MENETRIES): Heringen (Werra) (NB 73), 2 Expl. an *Phragmites communis* LINNAEUS (Schilf), 29.6.2004, leg. HÖHNER. (2)

Phloiophilidae

- Phloiophilus edwardsii* STEPHENS: Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 1 Expl. an Erlen-Ast, 24.12.2005, leg. HÖHNER. (2)

Cleridae

- Tillus elongatus* (LINNAEUS): Büttelborn bei Groß-Gerau (MA 62), 2 Expl. aus trockenem Hainbuchen-Holz geschlüpft, 18.5.2004, leg. LANGE. (3)
Dermestoides sanguinicollis (FABRICIUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Talschneise (MA 74), 10 Expl. an gefällten Eichen-Stämmen (darunter viele Heldbock-Eichen), 16.-30.5.2005, leg. LANGE. (1)

Trogositidae

- Tenebroides fuscus* (GOEZE): Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. unter der Rinde eines abgebrochenen Pappel-Stammteils, 29.2.2004, leg. LANGE. – Bensheim, Fehlheimer Wald (MA 60), 2 Expl. unter Rinde eines gefällten Eichen-Stamms, 17.12.2004, leg. LANGE. – Bensheim–Schwanheim, Jägersburger Wald (MA 60), 2 Expl. unter der Rinde eine dicken, toten Buche, 28.3.2004, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 1 Expl. unter der aufgeplatzten Rinde einer toten, stehenden Buche, 29.8.2004, leg. LANGE. – Büttelborn bei Groß-Gerau, Nähe Tankstelle (MA 62), 1 Expl. unter Buchen-Rinde, 19.3.2004, leg. LANGE. – Darmstadt, Nähe Waldfriedhof (MA 72), 1 Expl. unter der Rinde einer umgestürzten Buche, 20.3.2004, leg. LANGE. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. unter der aufgeplatzten Rinde einer toten Buche, 28.8.2004, leg. LANGE. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 83), 1 Expl. unter der Rinde vom unteren Stammbereich einer toten Eiche, 12.11.2005, leg. LANGE. – Erlensee–Rückingen (MA 95), 1 Expl. unter Ahorn-Rinde, 3.12.2004, leg. HÖHNER. (2)

Peltidae

- Thymalus limbatus* (FABRICIUS): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 2 Expl. an weißem Pilz an liegendem Buchen-Stamm, 28.5.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. an trockenem Ast, 30.6.2005, leg. HÖHNER. (3)

Lymexylidae

- Lymexylon navale* (LINNAEUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 1 Expl. an gefälltem Eichen-Stamm bei der Eiablage, 28.5.2005, leg. LANGE. (3)

Elateridae

- Ampedus sinuatus* GERMAR: Bensheim–Langwaden (MA 60), 1 Expl. an dünnem Buchen-Stämmchen, 16.4.2005, leg. HÖHNER. – Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 4 Expl. an Waldrand auf Vegetation, 13.5.2005, leg. LANGE. – Darmstadt, Darmstädter Kreuz (MA 72), 1 Expl. unter Ahorn-Rinde, 21.3.2004, leg. LANGE. (2)
Ampedus rufipennis (STEPHENS): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 3 Expl. in liegendem, weißfaulem Buchen-Stamm, 1.2.2004, leg. LANGE. (2)
Ampedus quercicola (BUYSSON): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. in morschem Buchen-Stamm, 4.12.2004, leg. LANGE. (3)

- Ampedus elongatulus* (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. in Laubwald, 18.4.2004, leg. LANGE. – Bensheim–Langwaden (MA 60), 1 Expl. an dünnem Buchen-Stämmchen, 16.4.2005, leg. HÖHNER. (3)
- Brachygonus megerlei* (LACORDAIRE): Bensheim–Schwanheim, Jägersburger Wald (MA 60), 1 Expl. unter der lose sitzenden Rinde eines liegender Kiefern-Stamms, 28.3.2004, leg. LANGE. (2)
- Ischnodes sanguinicollis* (PANZER): Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Dianaburg (MA 73), 1 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer hohlen Buche, 27.5.-6.7.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 4 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer hohlen Buche, 27.5.-5.7.2005, leg. LANGE. (1)
- Procræus tibialis* (LACORDAIRE): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde vom Stammfuß mit *Lasius* (Holzameise), 26.4.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 2 Expl. in liegendem, trocken-weißfaulem Buchen-Stamm, außerdem 4 Expl. in hohlen, stehenden Buchen, 1.2.2004, leg. LANGE. – Weilburg, Tierpark (MA 49), 1 Expl. in alter anbrüchiger Buche, 30.4.2005, leg. KUNZ. (2)
- Elatér ferrugineus* LINNAEUS: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. entwickelte sich aus einer Larve, die im Dezember 2004 mit 42 mm Länge aus dem Mulm einer hohlen Buche eingetragen wurde, Käfer bei Zimmertemperatur am 23.2.2005 geschlüpft, leg. LANGE. (2)
- Denticollis rubens* PILLER et MITTERPACHER: Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 1 Expl. in Hausgarten fliegend, 30.5.2004, leg. BRENNER. (2)
- Limonicus violaceus* (MÜLLER): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 4 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Buchen-Höhle, 1.6.-1.7.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. außen an einer anderen hohlen Buche, 29.6.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. in der Puppenwiege in morschem, sehr feuchtem Holzstück, das etwa 40 cm tief im Mulm einer Buchen-Höhle eingebettet war, 6.10.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 5 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Buchen-Höhle, 27.5.-5.7.2005, leg. LANGE. (1)
- Stenagostus rhombeus* (OLIVIER): Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 1 Larve im dunklen Mulm unter der losen Rinde eines dicken, am Waldboden liegenden Eichen-Stammabschnitts, 4.4.2004 (Käfer im Mai geschlüpft), leg. LANGE. (3)
- Cardiophorus nigerrimus* ERICHSON: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. von Vegetation geklopft, 1.5.2005, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde vom Stammfuß mit *Lasius* (Holzameise), 26.4.2005, leg. LANGE. (3)
- Cardiophorus ruficollis* (LINNAEUS): Bensheim–Langwaden (MA 60), 1 Expl. an dünnem Buchen-Stämmchen, 16.4.2005, leg. HÖHNER. – Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. auf blühendem Strauch, 13.5.2005, leg. LANGE. – Kelsterbach, Mönchwald (MA 64), 2 Expl. unter der Rinde am Boden liegender Eichen-Stammstücke, 28.4.2004, leg. LANGE. (3)
- Cardiophorus atramentarius* ERICHSON: Darmstadt, Nähe Waldfriedhof (MA 72), 1 Expl. an toter Kiefer, 20.3.2004, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim – Jugenheim (MA 71), 1 Expl. unter Rinde, 14.10.2004, leg. LANGE. – Hanau–Steinheim, Gailenberg (MA 95), 3 Expl. unter der toten Rinde eines Apfelbaums, 12.10.2005, leg. BRENNER. (2)
- Cardiophorus ebeninus* (GERMAR): Hanau–Steinheim (MA 95), 2 Expl. unter Apfelbaum-Rinde, 16.10.2004, leg. HÖHNER. (3)
- Dicronychus equiseti* (HERBST): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. von Vegetation geklopft, 1.5.2005, leg. LANGE.

Cerophytidae

Cerophytum elateroides (LATREILLE): Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 1 Expl. in Laubwald fliegend, leg. 2.5.2004, LANGE. (2)

Eucnemidae

Isorhipis melasoides (CASTELNAU): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. nach Einbruch der Dunkelheit an anbrüchigem Buchen-Stamm, 31.7.2004, leg. LANGE. – Erlensee-Rückingen (MA 95), 1 Expl. an totem Erlen-Stamm, 9.4.2005, leg. HÖHNER. (2)

Eucnemis capucina AHRENS: Lampertheim-Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. am Stamm einer liegenden Pappel, 2.5.2004, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. an alter Astbruchstelle einer sehr dicken Buche, 17.5.2004, leg. LANGE. (3)

Dromaeolus barnabita (VILLA): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. an Eichen-Gebüsch, 17.7.2004, leg. LANGE. (2)

Hylis olexai PALM: Flörsbachtal-Mosborn (NA 25), 1 Expl. unter Fichten-Rinde, 30.7.2004, leg. HÖHNER. – Niedernhausen-Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Gebäude an Fenster, 6.8.2004, leg. LANGE. (3)

Lissomidae

Drapetes cinctus (PANZER): Langenselbold (NA 05), 1 Expl. an liegendem Pappel-Stamm, 31.5.2005, leg. HÖHNER. (3)

Buprestidae

Dicerca berolinensis (HERBST): Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. am Stamm einer umgestürzten Buche mit zahlreiche *Dicerca*-Schlupflöchern, 8.8.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. unter der aufgeplatzten Rinde einer stehenden, toten Buche, 28.8.2004, leg. LANGE. – Weiterstadt Im Triesch (MA 62), 2 Expl. an den Stämmen stehender, toter Buchen, 29.8.2004, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am Stamm einer dünnen Buche, 11.05.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. an Astbruchverletzung eines dicken Buchen-Stamms, 16.7.2004, leg. LANGE. (2)

Eurythyrea quercus (HERBST): Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 1 totes Expl. im Mulm einer Eichen-Höhle, 5.8.2005, leg. HÖHNER. (1)

Anthaxia candens (PANZER): Hadamar-Niederhadamar (MA 38), 8 Expl. unter der Rinde liegender Pflaumenbaum-Stämme im Puppenlager, 10.6.2005, leg. KUNZ. (2)

Anthaxia salicis (FABRICIUS): Ehrenberg-Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 3.6.2005, leg. HÖHNER. (3)

Anthaxia mendizabali COBOS: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 3 Expl. am 29.5.2005 und 5 Expl. am 1.5.2005 an blühendem *Cytisus scoparius* (LINNAEUS) LINK (= *Sarothamnus* s.) (Besenginster), leg. LANGE. – Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 3 Expl. an blühendem *Cytisus scoparius*, 13.5.2005, leg. LANGE. (2)

Anthaxia similis SAUNDERS: Seeheim-Jugenheim – Seeheim (MA 71), 1 Expl. auf gelber Blüte, 8.5.2005, leg. LANGE. (3)

Agrilus graminis CASTELNAU & GORY: Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 4 Expl. an Eichen-Ästen, 26.6.2004, leg. HÖHNER. (3)

Agrilus cuprescens MÉNÉTRIÉS: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. an Gebüsch, 6.7.2004, leg. LANGE.

Aphanisticus elongatus VILLA: Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. von Vegetation an Wegrand gekäschert, 20.5.2005, leg. HÖHNER. – Frankfurt, Palmengarten (MA 75), 5 Expl. an zwei verschiedenen *Carex*-Arten (Seggen), 8.5.2004, leg. LANGE. (3)

Habroloma nana (PAYKULL): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. an *Geranium* (Storchschnabel) auf Felsen, 21.4.2002, leg. KOCH. (3)

Elmidae

Elmis rioloides (KUWERT): Steinau an der Straße, Steinaubachtal (NA 37), 2 Expl. an einem Stein im Wasser, 7.8.2004, leg. HÖHNER.

Dermestidae

Attagenus punctatus (SCOPOLI): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. in liegendem, weißfaulem Buchen-Stamm, 24.12.2005, leg. LANGE. (2)

Globicornis nigripes (FABRICIUS): Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. an Eichen-Ast, 20.5.2005, leg. HÖHNER. (3)

Megatoma undata (LINNAEUS): Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. unter der Rinde eines abgebrochenen Pappel-Stammteils, 29.2.2004, leg. LANGE. – Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald (MA 60), 1 Expl. in totem, stehenden Buchen-Stamm mit zahlreichen Fraßgängen, 9.10.2005, leg. LANGE. (3)

Trinodes hirtus (FABRICIUS): Echzell – Grund-Schwalheim (MA 98), 1 Expl. in einem Spinnennetz in hohler Kopfwende, 15.6.2005, leg. HÖHNER. (3)

Bothrideridae

Teredus cylindricus (OLIVIER): Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 1 Expl. im dunklen Mulm unter der lockeren Rinde eines dicken, am Waldboden liegenden Eichen-Stammabschnitts, 4.4.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 3 Expl. im feuchten Mulm unter der unterirdisch gelegenen Rinde einer toten Eiche, 9.1.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde vom Stammfuß mit *Lasius* (Holzameise), 16.04.2005, leg. LANGE. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 83), 3 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 12.11.2005, leg. LANGE. – Hanau – Klein-Auheim (MA 94), 1 Expl. unter der Rinde eines morschen Eichen-Stamms, 1.6.2005, leg. BRENNER. (1)

Oxylaemus cylindricus (PANZER): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 5 Expl. im feuchten Mulm unter der unterirdisch gelegenen Rinde einer toten Eiche, 9.1.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 8 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde vom Stammfuß mit *Lasius* (Holzameise), 16.4.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. im Mulm einer hohlen Eiche, 16.4.2005, leg. HÖHNER. (1)

Cerylonidae

Philothermus evanescens REITTER: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 3 Expl. in liegendem, weißfaulem Buchen-Stamm, 15.7.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. aus abgestorbenem *Meripilus giganteus* (PERS. ex FRIES) KARST. (Riesenporling) am Fuß einer toten Buche, 8.9.2005, leg. LANGE. (1)

Nitidulidae

Meligethes obscurus ERICHSON: Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. an *Nonea pulla* (LINNAEUS) DE CANDOLLE (Braunes Mönchskraut), 20.5.2005, leg. HÖHNER. (3)

Meligethes egenus ERICHSON: Erlensee–Rückingen (MA 95), 4 Expl. an *Mentha longifolia* (LINNAEUS) HUDSON (Ross-Minze), 6.8.2005, leg. HÖHNER. (3)

Meligethes caudatus GUILLEBEAU: Heringen (Werra) (NB 73), 1 Expl. an *Campanula* (Glockenblume), 29.6.2004, leg. HÖHNER. – Wetzlar–Magdalenenhausen (MA 69), 2 Expl. von Wiese gekäschert, 6.7.2004, leg. HÖHNER.

Die Art wurde bislang mit *M. subrugosus* (GYLLENHAL) vermengt. Sichere Nachweise stammen vom Leithagebirge (Österreich), vom Fränkischen Jura und aus dem Alpenvorland (SPORNRAFT 1998) bzw. aus Bayern, Baden und Sachsen-Anhalt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Die Funde von Heringen und Wetzlar stellen somit **Neunachweise für Hessen** dar!

Epuraea ocularis FAIRMAIRE: Heppenheim, Jochimsee (MA 70), 2 Expl. in Tresterhaufen, 19.9.2004, leg. LANGE. – Hanau – Klein-Auheim (MA 95), 2 Expl. in Kompost, 23.10.2004, leg. HÖHNER.

Epuraea boreella (ZETTERSTEDT): Ehrenberg–Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 3 Expl. an Kiefern-Ästen, 17.7.2004, leg. HÖHNER. (3)

Epuraea muehli REITTER: Ehrenberg–Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 3 Expl. an *Fomitopsis pinicola* (SOW. ex FRIES) KARST. (Rotrandiger Baumschwamm), 3.6.2005, leg. HÖHNER. (3)

Cybocephalidae

Cybocephalus fodori ENDRÖDY-YOUNGA: Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. an Birken-Ruine, 20.5.2005, leg. HÖHNER. (3)

Erotylidae

Triplax lepida (FALDERMANN): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 4 Expl. an *Polyporus* (Porling) an liegendem Baumstamm, 30.4.2005, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 4 Expl. an *Polyporus (tuberaster)* (PERS.) ex FRIES ? (Porling), 28.5.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 10 Expl. an Pilz, 30.6.2005, leg. HÖHNER. – Seeheim-Jugenheim – Jugenheim, Nähe Ruine Jossa (MA 71), 1 Expl. an *Polyporus (tuberaster)* ? an am Boden liegendem Buchen-Ast, 8.8.2004, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 2 Expl. an *Polyporus* an am Boden liegenden Buchen-Ästen, 29.8.2004, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 3 Expl. an *Polyporus* an am Boden liegenden Buchen-Ästen, 18.7.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 2 Expl. an größerem Fruchtkörper (*Polyporus tuberaster* ?), 9.8.2004, leg. LANGE. (2)

Triplax rufipes (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß (MV 69), 4 Expl. unter verpilzter Eichen-Rinde, 1.7.2004, leg. BRENNER. – Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald (MA 60), 4 Expl. an Pilzen (*Pleurotus*, Seitling ?) an liegenden Buchen-Stämmen, 9.10.2005, leg. LANGE. – Alsbach-Hähnlein – Alsbach, Nähe Ruine Jossa (MA 71), 1 Expl. an weißem, stark zerfressenem Blätterpilz an Kiefer-Holz, 8.8.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 2 Expl. an Blätterpilz an liegendem Buchen-Stamm, 9.9.2005, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 2 Expl. an *Pleurotus* (Seitling) an stehender Buche, 29.8.2004, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. an Blätterpilz an toter Buche, 29.8.2005, leg. LANGE. – Langen, Wald westlich von Langen (MA 73), 8 Expl. an weißen Blätterpilzen (*Pleurotus*-ähnlich) an toten Buchen-Stämmen (zahlreiche weitere Expl. wurden gesehen), 19.8.2004, leg. LANGE. – Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 9 Expl. in *Pleurotus* (Seitling) an Buche, 10.9.2004, leg. KUNZ. (1)

Triplax collaris (SCHALLER): Umgebung Hanau (MA 94/95), 1920er Jahre, leg. NEUMANN.

Die Art wird von HORION (1960) für Hessen abgelehnt, da er „wieder die gewohnte Verwechslung mit Hamburg („Ha“ bei Schilsky 1909) annimmt“. Nun befindet sich aber der oben genannte, eindeutig zu *T. collaris* gehörende Beleg in der Sammlung KUTSCHEIDT, bezettelt mit „Hanau Umg. / leg. Ludwig Neumann“ (t. HOFMANN). Neumann lebte in Hanau–Großauheim, seine Funde stammen im allgemeinen aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Das Exemplar gelangte über die coll. SCHINDLER in die coll. KUTSCHEIDT. Es stellt den **ersten eindeutig aus Hessen stammenden Nachweis** dar! Die Art ist also doch in Hessen indigen. Weitere aktuelle deutsche Funde stammen aus Baden, vom Niederelbegebiet, aus Sachsen-Anhalt und Sachsen (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). (1)

Dacne rufifrons (FABRICIUS): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an *Polyporus tuberaster* (PERS.) ex FRIES (Porling) an liegendem, morschem Hainbuchen-Stamm, 11.5.2005, leg. LANGE. (2)

Cryptophagidae

Telmatophilus brevicollis AUBÉ: Hadamar (MA 38), 1 Expl. an Teichufer in pflanzlichem Abfall, 14.1.2004, leg. KUNZ. (3)

Pteryngium crenatum (FABRICIUS): Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. im Holz eines morschen Eichen-Stubbens, 18.4.2005, leg. KUNZ. – Ehrenberg–Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 11 Expl. an *Fomitopsis pinicola* (Sow. ex FRIES) KARST. (Rotrandiger Baumschwamm), 3.6.2005, leg. HÖHNER. (3)

Atomaria plicata REITTER: Marburg–Cappel, Lahnaue (MB 82), 4 Expl. in altem Hochwassergenist, 12.4.1986, leg. KÖHLER.

Aus Hessen lag bislang nur ein Nachweis von Steinau an der Straße vor (BRENNER 2005). (2)

Atomaria ornata HEER: Ehrenberg–Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. an Kiefern-Ast, 17.7.2004, leg. HÖHNER.

Aus Hessen sind mir nur Alt funde aus dem 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts von Kassel (WEBER 1903) und vom Hohen Meißner (FRANCK 1933) bekannt. Deshalb stellt der Fund vom Stirnberg einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 70 Jahren** dar! (3)

Atomaria zetterstedti (ZETTERSTEDT): Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 1 Expl. von Weide geklopft, 23.4.2005, leg. HÖHNER. (3)

Languriidae

Cryptophilus integer (HEER): Gernsheim, Rhein-Ufer (MA 60), 1 Expl. bei Hochwasser an Holzstücken im Genist, 25.8.2005, leg. LANGE.

Der einzige hessische Nachweis lag bislang aus Borken–Gombeth vor (BRENNER 2006).

Phalacridae

Phalacrus fimetarius (FABRICIUS): Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. unter der Rinde eines abgebrochenen Pappel-Stammteils, 29.2.2004, leg. LANGE. (3)

Olibrus baudieri FLACH: Hanau–Steinheim (MA 95), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 9.10.2004, leg. HÖHNER. (2)

Olibrus bimaculatus KÜSTER: Langenselbold (NA 05), 1 Expl. von Feldrain gekäschert, 31.5.2005, leg. HÖHNER. (3)

Laemophloeidae

- Laemophloeus monilis* (FABRICIUS): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 3 Expl. an verpilztem Buchen-Ast, 26.4.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 3 Expl. an verpilzten Buchen-Ästen, 11.5.2005, leg. LANGE. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. unter Buchen-Rinde, 28.8.2004, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 10 Expl. unter der aufgeplatzten Rinde toter, stehender Buchen, 29.8.2004, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. an Buchen-Ast, 27.5.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 2 Expl. an Hainbuchen-Ästen, 5.8.2005, leg. HÖHNER. – Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 1 Expl. an liegendem Buchen-Stamm, 16.5.2005, leg. LANGE. (3)
- Cryptolestes spartii* (CURTIS): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. an *Cytisus scoparius* (LINNAEUS) LINK (= *Sarothamnus* s.) (Besenginster), 29.5.2005, leg. LANGE. (3)
- Lathropus sepicola* (MÜLLER): Seeheim-Jugenheim – Seeheim, Ortsmitte (MA 71), 1 Expl. in Biergarten auf Tisch unter Rosskastanien, 3.6.2005, leg. LANGE. (2)

Latridiidae

- Latridius hirtus* (GYLLENHAL): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 2 Expl. an dunkelgrauem, pulverigem Schleimpilz, 16.7.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. aus trockenem Mulm und Nestmaterial in der Höhle einer umgestürzten Buche, 1.9.2005, leg. LANGE. – Erlensee-Rückingen (MA 95), 3 Expl. am 3.12.2004 und noch einmal 4 Expl. am 3.1.2005 unter Ahorn-Rinde, leg. HÖHNER. – Langenselbold (NA 05), 3 Expl. an liegenden, rindenlosen Pappel-Stämmen, 31.5.2005, leg. HÖHNER. (3)
- Enicmus brevicornis* (MANNERHEIM): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an verpilztem Buchen-Ast, 26.4.2005, leg. LANGE. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. unter loser, trockener Rinde einer toten Buche, 8.8.2004, leg. LANGE. (3)
- Enicmus testaceus* (STEPHENS): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 2 Expl. im feuchten Mulm unter der unterirdisch gelegenen Rinde einer toten Eiche, 9.1.2005, leg. LANGE. (2)
- Enicmus geminatus* RÜCKER: Biblis-Nordheim, Maulbeeraue (MA 50), 2 Expl. in hohlem Pappel-Stamm mit Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 13.11.2005, leg. LANGE.
Die Art war in Deutschland bislang nur aus Brandenburg und Sachsen bekannt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Damit stellt der Fund von Biblis einen **Neunachweis für Hessen** dar! (1)
- Corticaria alleni* JOHNSON: Erlensee-Rückingen (MA 95), 1 Expl. unter Ahorn-Rinde, 3.1.2005, leg. HÖHNER.
Die Art ist in Deutschland anscheinend eher nördlich verbreitet, denn KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) kennen Funde vom Nordrhein, vom Niederelbegebiet, von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Somit stellt der Fund von Rückingen einen **Neunachweis für Hessen** dar! Der Ort bildet damit auch den südlichsten Fundpunkt in Deutschland. Nur aus Ungarn ist bislang ein südlicheres Vorkommen bekannt (RÜCKER 1992). (2)

Mycetophagidae

- Triphyllus bicolor* (FABRICIUS): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 2 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Buchen-Höhle, 27.5.-5.7.2005, leg. LANGE. (3)

- Litargus balteatus* LECONTE: Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 1 Expl. an faulendem *Meripilus giganteus* (PERS. ex FRIES) KARST. (Riesenporling) am Fuß einer toten Buche, 18.9.2005, leg. LANGE. – Biblis-Nordheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. in hohlem Pappel-Stamm mit Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 13.11.2005, leg. LANGE.
Der einzige hessische Nachweis lag bislang aus Knüllwald-Niederbeisheim vor (BRENNER 2006).
- Mycetophagus ater* (REITTER): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 2 Expl. an totem *Meripilus giganteus* (PERS. ex FRIES) KARST. (Riesenporling) am Fuß einer toten Buche, 5.9.2005, leg. LANGE. (1)
- Mycetophagus piceus* (FABRICIUS): Lampertheim-Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 2 Expl. unter der Rinde eines liegenden Buchen-Stamms mit zahlreichen Fruchtkörpern von *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm), 18.4.2004, leg. LANGE. – Einhausen, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 1 Expl. an der Schnittfläche eines relativ frisch gefällten Eichen-Stamms, 16.4.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. im Mulm einer Buchen-Höhle, 16.4.2005, leg. HÖHNER; am selben Fundort 3 Expl. an *Fomes fomentarius* an Buche, 28.5.2005, leg. LANGE. – Kelsterbach, Mönchwald (MA 64), 1 Expl. über gefällten Kiefern-Stämmen fliegend, 28.4.2004, leg. LANGE. – Hadamar-Niederhadamar (MA 38), 3 Expl. in *Laetiporus sulphureus* (BULL. ex FRIES) MURR. (Schwefelporling) an Eiche, 23.6.2005, leg. KUNZ. (3)
- Mycetophagus decempunctatus* FABRICIUS: Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Buche, 29.5.2005, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 1 Expl. an *Meripilus giganteus* (PERS. ex FRIES) KARST. (Riesenporling) am Fuß einer toten Buche, 2.9.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 2 Expl. an stehender Buche neben *Fomes fomentarius*, 19.5.2004, leg. LANGE. (1)
- Mycetophagus quadriguttatus* MÜLLER: Hanau – Klein-Auheim (MA 95), 1 Expl. in Kompost, 23.10.2004, leg. HÖHNER. (3)
- Mycetophagus multipunctatus* FABRICIUS: Seeheim-Jugenheim – Jugenheim, Karlshöhe (MA 71), 1 Expl. in vertrockneten Hutzpilzen an totem Buchen-Stamm, 24.10.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. in Laubwald-Gesiebe, 20.11.2004, leg. LANGE. – Pfungstadt-Eschollbrücken, Sandbach-Ufer (MA 61), 1 Expl. an *Laetiporus sulphureus* (BULL. ex FRIES) MURR. (Schwefelporling) an Pappel, 24.3.2005, leg. LANGE. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Dianaburg (MA 73), 2 Expl. an vertrockneten Hutzpilzen an Buchen-Stamm, 23.10.2004, leg. LANGE. – Langen, Schloss Wolfsgarten (MA 73), 2 Expl. an *Inonotus* (Schillerporling) in Buchen-Höhle, 15.5.2005, leg. LANGE. – Hanau-Steinheim (MA 95), 5 Expl. unter verpilzter Apfelbaum-Rinde, 12.10.2005, leg. BRENNER; an der gleichen Stelle zur gleichen Zeit 1 Expl. leg. HÖHNER. (3)
- Mycetophagus fulvicollis* FABRICIUS: Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 2 Expl. unter der Rinde einer toten, verpilzten Buche, 4.9.2004, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 4 Expl. in liegendem, weißfaulem Buchen-Stamm, 26.5.2004, leg. LANGE. – Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 3 Expl. an liegenden Buchen-Stämmen, 16.5.2005, leg. LANGE. (2)
- Berginus tamarisci* WOLLASTON: Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 1 Expl. an trockenem Kirschbaum-Ast, 23.4.2005, leg. HÖHNER.

Colydiidae

- Pycnomerus terebrans* (OLIVIER): Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 3 Expl. unter toter Kiefern-Rinde, 1 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 18.4.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde mit *Lasius* (Holzameise) vom Stammfuß, 16.4.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. in hohlem, liegendem Buchen-Stamm mit *Lasius*-Nest, 9.6.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 2 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde mit *Lasius* vom Stammfuß, 14.6.2005, leg. LANGE. (1)
- Rhopalocerus rondanii* (VILLA): Lampertheim (MV 59), 21.2.2004, 15 Expl. in hohler Pappel zusammen mit *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), leg. LANGE. – Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 5 Expl. in weißfaulem Pappel-Stamm, 29.2.2004, leg. LANGE. (1)
- Cicones variegatus* (HELLWIG): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. im Mulm einer hohlen Buche, 16.4.2005, leg. HÖHNER; am selben Fundort 1 Expl. unter toter Buchen-Rinde am Stammfuß, 30.4.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. unter Rinde an verpilzter Buche, 27.4.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. an liegendem, stark verpilztem Buchen-Stamm, 4.12.2005, leg. LANGE. – Langen, Schloss Wolfsgarten (MA 73), 1 Expl. an *Inonotus* (Schillerporling) in Buchen-Höhle, 15.5.2005, leg. LANGE. (3)
- Cicones undatus* (GUÉRIN): Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald (MA 60), 1 Expl. an dürrerem Zweig, 16.4.2005, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 1 Expl. unter der aufgeplatzten Rinde einer toten, stehenden Buche, 29.8.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 10 Expl. unter der Rinde toter, stehender Bergahornen, 4.9.2004, leg. LANGE. – Groß-Rohrheim, Jägersburger Wald (MA 60), 14 Expl. unter der mit rußartigem Pilz versehenen Rinde eines abgestorbenen Bergahorns, 18.9.2004, leg. LANGE. – Erlensee–Rückingen (MA 95), je 1 Expl. 3.12.2004 und 3.1.2005 unter Ahorn-Rinde, leg. HÖHNER. (3)
- Colobicus hirtus* (ROSSI): Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm), 26.5.2005, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an dürrerem Buchen-Ast, 11.5.2005, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 1 Expl. unter der aufgeplatzten Rinde einer toten, stehenden Buche, 29.8.2004, leg. LANGE. (1)
- Colydium elongatum* (FABRICIUS): Bensheim, Fehlheimer Wald (MA 60), 1 Expl. unter der losen Rinde einer gefällten Eiche, 17.12.2004, leg. LANGE. – Darmstadt, Stadtwald (MA 72), 1 Expl. an totem Eichen-Stamm, 1.5.2005, leg. BRENNER. – Kelsterbach, Mönchswald (MA 64), 1 Expl. unter der Rinde einer gefällten Eiche, 28.4.2004, leg. LANGE. (3)
- Aulonium trisulcum* (FOURCROY): Seeheim-Jugenheim – Jugenheim (MA 71), 22 Expl. nachmittags und abends an dünner Ulme, seit Anfang Juli 2004 bohrt sich zahlreiche *Scolytus multistriatus* (MARSHAM) in die Rinde des Baums ein, aus den Löchern traten anfangs große Mengen Saft aus, 20.7.2004, leg. LANGE. (2)

Corylophidae

- Sacium nanum* (MULSANT & REY): Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. an Birken-Ruine, 20.5.2005, leg. HÖHNER. (2)
- Arthrolips obscura* (SAHLBERG): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an trockenem, verpilztem Buchen-Ast, 26.4.2005, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim – Jugenheim, Karlshöhe (MA 71), 2 Expl. in Laubwald-Gesiebe, 20.11.2004, leg. LANGE. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. unter der aufgeplatzten Rinde einer toten Buche, 28.8.2004, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 5 Expl. unter der aufgeplatzten Rinde toter, stehender Buchen, 29.8.2004, leg. LANGE. (2)

Orthoperus nigrescens STEPHENS: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 15 Expl. in Laubgesieße, 3.1.2004, leg. LANGE. (2)

Endomychidae

Symbiotes gibberosus (LUCAS): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 2 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde mit *Lasius* (Holzameise) vom Stammfuß, 16.4.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. in hohlem, liegenden Buchen-Stamm mit *Lasius*-Nest, 9.6.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 2 Expl. an dünnen Zweigen, 16.7.2005, leg. LANGE. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. unter der grünschimmelig verpilzten Rinde einer toten Buche, 28.8.2004, leg. LANGE. – Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden, teilweise schon sehr morschen Hainbuchen-Stamms, 22.4.2004, leg. LANGE. – Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 2 Expl. in weißfaulem Holz in Buchen-Höhle, 16.5.2005, leg. LANGE. – Langenselbold (NA 05), 1 Expl. an liegendem, rindenlosem Pappel-Stamm, 31.5.2005, leg. HÖHNER. (2)

Lycoperdina bovistae (FABRICIUS): Bensheim-Hochstädten, Schließ (MA 70), 4 Expl. in großen, aufgeplatzten Bovisten auf Viehweide, 9.1.2005, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 1 Expl. an *Meripilus giganteus* (PERS. ex FRIES) KARST. (Riesenporling) am Fuß einer toten Buche, 11.9.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 5 Expl. an liegendem, stark verpilztem Buchen-Stamm, 4.12.2005, leg. LANGE. (3)

Mycetina cruciata (SCHALLER): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 7 Expl. an liegendem, verpilztem Buchen-Stamm, 26.4.2005, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 1 Expl. an *Meripilus giganteus* (PERS. ex FRIES) KARST. (Riesenporling) am Fuß einer toten Buche, 2.9.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. an *Meripilus giganteus* am Fuß einer toten Buche, 11.9.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 3 Expl. in liegendem, weißfaulem Buchen-Stamm, 25.4.2004, leg. LANGE. (3)

Endomychus coccineus (LINNAEUS): Lampertheim (MV 59), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden Laubbaums, 21.2.2004, leg. LANGE. – Alsbach-Hähnlein, Alsbacher Schloss (MA 70), 1 Expl. an umgestürzter Buche mit vielen gelben Hutzpilzen (*Pholiota*, Schüppling?), 7.11.2004, leg. LANGE. – Riedstadt-Crumstadt, Lehrbruch (MA 61), 2 Expl. unter Pappel-Rinde, 3.4.2005, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 1 Expl. an *Meripilus giganteus* (PERS. ex FRIES) KARST. (Riesenporling) am Fuß einer toten Buche, 11.9.2005, leg. LANGE. – Roßdorf (MA 82), 1 Expl. an liegendem Eichen-Stamm, 1.5.2005, leg. BATHON. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. an verpilztem Totholz, 18.7.2004, leg. LANGE. – Erlensee-Rückingen (MA 95), 1 Expl. unter Ahorn-Rinde, 3.12.2004, leg. HÖHNER.

Cisidae

Cis glabratus MELLÉ: Hadamar-Niederhadamar (MA 38), 4 Expl. im Holz eines morschen Eichen-Stubbens, 18.4.2005, leg. KUNZ. (3)

Orthocis lucasi (ABEILLE DE PERRIN): Bensheim-Langwaden (MA 60), 1 Expl. an *Schizophyllum commune* FRIES (Spaltblätling), 16.4.2005, leg. HÖHNER. (2)

Lyctidae

Lyctus cavicollis LECONTE: Lampertheim-Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an totem Eichen-Ast am Boden, 31.5.2004, leg. LANGE.

Bostrichidae

Lichenophanes varius (ILLIGER): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an totem Buchen-Stamm, 30.6.2005, leg. HÖHNER. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. aus mitgenommenem Buchen-Stammstück am 1.7.2004 geschlüpft, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 1 Expl. unter der aufgeplatzten Rinde einer toten, stehenden Buche, 4.9.2004, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am trockenen Ast eines liegenden Buchen-Stamms, 15.7.2004, leg. LANGE. (2)

Anobiidae

Dryophilus anobioides CHEVROLAT: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 2 Expl. an *Cytisus scoparius* (LINNAEUS) LINK (= *Sarothamnus* s.) (Besenginster), 29.5.2005, leg. LANGE. (2)

Oligomerus brunneus (OLIVIER): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. im Mulm einer Eichen-Höhle, 30.6.2005, leg. HÖHNER. – Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. an Eichen-Ast, 15.7.2004, leg. LANGE. (3)

Gastrallus knizeki ZAHRADNIK: Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald (MA 60), 2 Expl. aus abgestorbenem *Viscum laxum* BOISSIER & REUTER (Nadelholz-Mistel) an liegender Kiefer gezogen, Juli 2004, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim – Seeheim (MA 71), 17 Expl. aus trockenem *Viscum laxum* an umgestürzter Kiefer gezogen, Juni 2005, leg. LANGE.

Die Art wurde von ZAHRADNIK (1996) als eigenständiges mittel-europäisches Taxon erkannt. Bislang wurde sie mit *Gastrallus laevigatus* (OLIVIER) vermergt. BÜCHE (1998) beschrieb erstmals Funde aus Deutschland (Nordbaden). Nun stellen die Funde aus dem Jägersburger Wald und von Seeheim die **ersten Nachweise aus Hessen** dar!

Anobium denticolle (CREUTZER): Hadamar-Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. unter Eichen-Rinde, 25.3.2004, leg. KUNZ. (3)

Dorcatoma flavicornis (FABRICIUS): Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. an Birke, 26.6.2004, leg. HÖHNER. (3)

Dorcatoma setosella MULSANT & REY: Seeheim-Jugenheim – Seeheim (MA 71), 18 Expl. aus mitgenommenem *Phellinus pomaceus* (PERS. ex GRAY) MAIRE (Pflaumenfeuerschwamm) von Pflaumen-Baum bei Zimmertemperatur im Februar 2004 geschlüpft, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim – Jugenheim, Nähe Tankstelle (MA 71), 1 Expl. an *Phellinus pomaceus* an Zierpflaume (Straßenbepflanzung), 1.8.2004, leg. LANGE. – Hadamar (MA 38), 5 Expl. aus *Phellinus pomaceus* an Schlehe gezogen, eingetragen 1.2.2004, Käfer geschlüpft 25.2.-2.3.2004, leg. KUNZ. (2)

Dorcatoma substriata HUMMEL: Maintal-Hochstadt (MA 85), 12 Expl. an Baumpilz an Apfelbaum, 13.2.2004, leg. HÖHNER. (2)

Dorcatoma minor ZAHRADNIK: Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 7 Expl. aus mitgenommenem *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) von Buche bei Zimmertemperatur im März 2004 geschlüpft, leg. LANGE.

Dorcatoma punctulata MULSANT & REY: Mainhausen, Auwald östlich der Röderbaumschneise (NA 04), 12 Expl. aus alter *Fomitopsis pinicola* (SOW. ex FRIES) KARST. (Rotrandiger Baumschwamm) gezogen, 2.5.2004, leg. HOFMANN. KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) kennen aus Deutschland Funde nur von Bayern, Baden, Württemberg, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Der Fund von Mainhausen stellt somit einen **Neunachweis für Hessen** dar!

Dorcatoma dresdensis HERBST: Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Fehlheim (MA 60), 4 Expl. an *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Buche, 18.5.2004, leg. LANGE. – Hadamar (MA 38), 12 Expl. aus

Phellinus pomaceus (PERS. ex GRAY) MAIRE (Pflaumenfeuerschwamm) gezogen, eingetragen 1.2.2004, Käfer geschlüpft 25.2.-2.3.2004, leg. KUNZ. – Hadamar-Niederhadamar (MA 38), >30 Expl. aus Baumpilz an Buche gezogen, eingetragen 2.4.2005, Käfer geschlüpft 15.4.2005, leg. KUNZ. – Waldsolms-Kraftsolms (MA 68), >30 Expl. an *Fomes fomentarius* an Buche, eingetragen 5.1.2004, Käfer geschlüpft 12.2.2004, leg. KUNZ. (3)

Dorcatoma robusta STRAND: Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 5 Expl. aus mitgenommenem *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) von Buche bei Zimmertemperatur im März 2004 geschlüpft, leg. LANGE. – Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Fehlheim (MA 60), 2 Expl. in *Fomes fomentarius*, 18.5.2004, leg. LANGE. – Waldsolms-Kraftsolms (MA 68), >30 Expl. aus *Fomes fomentarius* an Buche, eingetragen 5.1.2004, Käfer geschlüpft 12.2.2004, leg. KUNZ. (2)

Ptinidae

Ptinus pilosus MÜLLER: Lampertheim-Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. in stehendem, weißfaulem Buchen-Stamm, 25.1.2004, leg. LANGE. (3)

Ptinus sexpunctatus PANZER: Hanau-Wolfgang (MA 95), Juni/Juli 2005, 30 tote und 5 lebende Imagines und 3 lebende Larven in Raupennest von *Thaumetopoea processionea* (LINNAEUS) (Eichen-Prozessionsspinner) an Stieleiche, coll. BATHON. Hinsichtlich der Biologie erscheint es bemerkenswert, dass alle Meldungen bei BATHON (1991) und BRENNER (2003, 2005) mit Eichen in Verbindung stehen. Demgegenüber gibt es eine Gruppe von Funden, die in den Nestern solitärer Bienen, insbesondere von *Osmia*-Arten (Mauerbiene) getätigt wurden (HORION 1961), so auch der erste Fund der Art in Kanada (Nova Scotia, 2003) bei *Osmia lignaria* SAY (MAJKA 2004).

Oedemeridae

Ischnomera sanguinicollis (FABRICIUS): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. an hohler, lebender Buche, 17.5.2004, leg. LANGE. – Schafstein in der Rhön (NA 69), 1 Expl. 27.5.2005, vid. Walter MÜLLER (Fotobeleg), det. KÖHLER. (3)

Ischnomera caerulea (LINNAEUS): Lampertheim-Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 2.5.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an Buchen-Stamm, 30.4.2005, leg. LANGE. – Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. an blühendem Strauch, 13.5.2005, leg. LANGE. (3)

Oedemera monticola SVIHLA: Ehrenberg-Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 3 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 3.6.2005, leg. HÖHNER. (3)

Salpingidae

Rabocerus gabrieli (GERHARDT): Rodenbach-Niederrodenbach (NA 05), 1 Expl. an Erlen-Ast, 24.12.2005, leg. HÖHNER. (2)

Scaptiidae

Scaptia fuscula MÜLLER: Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an dürrerem Zweig mit vertrockneten Blättern einer umgestürzten Hainbuche, 16.7.2005, leg. LANGE. (3)

Aderidae

Aderus populneus (CREUTZER): Lampertheim-Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 3 Expl. in Pappel-Höhle, 3.4.2004, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim – Jugenheim, Karlshöhe (MA 71), 1 Expl. in Laubwald-Gesiehe, 20.11.2004, leg. LANGE. (3)

Anthicidae

Cyclodinus constrictus (CURTIS): Heringen (Werra) (NB 73), 2 Expl. auf Salzboden, 29.6.2004, leg. HÖHNER.

Die halobionte Art wurde in Deutschland bislang nur in Westfalen gefunden (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Der Fund von Heringen stellt somit einen **Neunachweis für Hessen** dar!

Meloidae

Meloe decorus BRANDT & ERICHSON: Lampertheim-Hofheim, Damm entlang Weschnitz (MA 50), 1 Expl. bei Sonne auf dem Damm an einem Maulwurfs-Haufen nach geeignetem Eiablageplatz suchend, 28.3.2004, leg. LANGE. (1)

Meloe scabriusculus BRANDT & ERICHSON: Rüsselsheim-Bauschheim, Nähe Kläranlage (MA 53), 1 überfahrenes/zertretenes Expl. auf Damm, 30.3.2004, leg. LANGE; vom selben Fundort sei hier schon ein Fund vorweggenommen: 1 Expl. an der sonnenbeschienenen, vegetationsarmen Südseite des Damms, 1.4.2006, leg. LANGE. – Hadamar-Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. in Hausgarten im Gras, 16.3.2005, leg. KUNZ. (2)

Meloe rugosus MARSHAM: Biebesheim, Rheinwiesen (MA 61), 1 Expl. und ein weiterer Sichtnachweis auf dem Radweg des Hochwasserdamms, 16.10.2005, leg. KOCH. – Seeheim-Jugenheim – Seeheim, Gewinn „Am Braunen Berg“ (MA 71), 1 Expl. am 3.11.2005 und 2 Expl. am 5.11.2005 auf Obstwiese an Waldrand (von Mitte Oktober bis Anfang November wurden 30 bis 50 weitere Exemplare gesehen), leg. FRITZ, in coll. BRENNER. (1)

Sitaris muralis (FORSTER): Seeheim-Jugenheim – Jugenheim, Nähe Forsthaus (MA 71), 3 tote Expl. auf Gehweg unterhalb einer Natursteinmauer, 21.8.2005, leg. LANGE. – Weiterstadt, südlich des Bahnhofs (MA 72), 1 Expl. an einer Hauswand, 23.7.1998, leg. KOCH. (3)

Mordellidae

Mordellistena parvuloides ERMISCH: Lich, Wetterau (MA 89), 1 Expl. in Hochwassergenist, 21.6.1985, leg. KÖHLER.

Bislang war in Hessen nur ein Fund vom Nollig bei Lorch bekannt (BRENNER 2001). (3)

Mordellistena pseudopumila ERMISCH: Wetzlar-Magdalenenhausen (MA 69), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 6.7.2004, leg. HÖHNER. (3)

Melandryidae

Orchesia fasciata (ILLIGER): Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 1 Expl. an abgestorbenem Ast, 2.5.2004, leg. LANGE. (3)

Anisoxya fuscata (ILLIGER): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. an Ulmen-Ast, 15.7.2004, leg. LANGE. – Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. an *Cotoneaster integerrimus* MEDIKUS (Gemeine Zwergmispel), 1.8.2005, leg. LANGE. (3)

Phloiodya vaudoueri MULSANT: Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 3 Expl. unter der aufgeplatzten Rinde toter, stehender Buchen, 28.8.2004, leg. LANGE. (2)

Hypulus quercinus (QUENSEL): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 3 Expl. an am Boden liegendem, braunfaulem Eichen-Ast, 17.5.2004, leg. LANGE. (2)

Melandrya caraboides (LINNAEUS): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an Buchen-Stamm, 29.5.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. an morschem Ast, 1.6.2004, leg. LANGE. (3)

Melandrya barbata (FABRICIUS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Dianaburg (MA 73), 1 Expl. auf Waldweg, 27.5.2005, leg. LANGE. (2)

Alleculidae

Allecula morio (FABRICIUS): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 4 Expl. an stehenden, toten Buchen-Stämmen und Hochstubben, 15.7.2004, leg. LANGE. (3)

Allecula rhenana BACH: Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. unter loser Rinde einer toten, hohlen Buche, 8.8.2004, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. außen an hohler Buche, 9.8.2004, leg. LANGE. (2)

Prionychus ater (FABRICIUS): Bensheim-Schönberg (MA 70), 1 Expl. aus mitgenommenem Mulm einer Apfelbaum-Höhle im Juni 2004 geschlüpft, leg. LANGE. (3)

Hymenalia rufipes (FABRICIUS): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 8 Expl. an Ulmen-Ästen, 15.7.2004, leg. LANGE. (2)

Pseudocistela ceramboides (LINNAEUS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Dianaburg (MA 73), 1 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Eichen-Höhle, 27.5.-6.7.2005, leg. LANGE. (2)

Ctenioporus flavus (SCOPOLI) (= *C. sulphureus* LINNAEUS): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. an Ulme-Ast, 15.7.2004, leg. LANGE. (3)

Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus (LINNAEUS): Lampertheim Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 2 Expl. in weißfäulem Pappel-Stammteil, der, in größerer Höhe abgebrochen und herabgestürzt, mit zahlreichen *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) versehen war, 7.3.2004, leg. LANGE. – Bensheim-Schwanheim, Jägersburger Wald (MA 60), 2 Expl. in *Fomes fomentarius* an Buche, 28.3.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 3 Expl. in von Buche abgefallenem *Fomes fomentarius*, 20.3.2004, leg. LANGE. – Büttelborn bei Groß-Gerau (MA 62), 1 Expl. an *Fomes fomentarius* an Hainbuche, 29.4.2004, leg. LANGE. – Langen, Wald westlich von Langen (MA 73), 3 Expl. in abgefallenem, völlig ausgehöhltem *Fomes fomentarius*, neben einer Buche liegend, 19.8.2004, leg. LANGE. – Oberursel, Hohe Mark (MA 66), 1 Expl. in *Fomes fomentarius* von Buche, eingetragen am 26.5.2005, geschlüpft im September 2005, leg. LANGE. (3)

Neomida haemorrhoidalis (FABRICIUS): Lampertheim-Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 2 Expl. in abgefallenem *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) der an Pappel gewachsen war, 29.2.2004, leg. LANGE. – Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Fehlheim (MA 60), 2 Expl. in *Fomes fomentarius* an Buche, 4.7.2004, leg. LANGE. – Gernsheim – Klein-Rohrheim, Hammer Aue (MA 60), 7 Expl. in *Fomes fomentarius* an umgestürzter Schwarzpappel, 2.4.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 2 Expl. in *Fomes fomentarius* an Buche, 20.3.2004, leg. LANGE. (1)

Platydemia violaceum (FABRICIUS): Gernsheim, Haselschlag (MA 61), 3 Expl. in Gesiebe von mit *Inonotus* (Schillerporling) bewachsener Rinde an Laubbaum, 7.2.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an dürrer Ast, 29.5.2005, leg. LANGE. – Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 3 Expl. unter toter Kiefern-Rinde, 21.3.2004, leg. LANGE. – Hadamar-Niederhadamar (MA 38), 3 Expl. unter Eichen-Rinde, 1.3.2004, leg. KUNZ. (3)

Pentaphyllus testaceus (HELLWIG): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. im Mulm einer Eichen-Höhle, 30.6.2005, leg. HÖHNER. – Frankfurt, Schwanheimer

- Wald (MA 74), 1 Expl. unter Rinde eines gefällten Eichen-Stamms, 16.5.2005, leg. LANGE. (3)
- Corticeus bicolor* (OLIVIER): Hadamar (MA 38), 1 Expl. unter Apfelbaum-Rinde, 9.3.2005, leg. KUNZ. (3)
- Corticeus bicoloroides* (ROUBAL): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 3 Expl. in hohlem, liegenden Buchen-Stamm mit *Lasius*-Nest (Holzameise), 9.6.2005, leg. LANGE. (1)
- Corticeus fasciatus* FABRICIUS: Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 4 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 18.4.2004, leg. LANGE. – Kelsterbach, Mönchwald (MA 64), 3 Expl. unter der Rinde und an der Schnittfläche eines gefällten Eichen-Stamms, 28.4.2004, leg. LANGE. (2)
- Palorus depressus* (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 2 Expl. unter toter Kiefern-Rinde, 18.4.2004, leg. LANGE. – Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 5 Expl. in hohler Pappel, 3.4.2004, leg. LANGE. – Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Fehlheim (MA 60), 2 Expl. unter toter Buchen-Rinde, 28.3.2004, leg. LANGE. – Biblis–Nordheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. in Pappel-Stammhöhle mit Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 13.11.2005, leg. LANGE. – Weiterstadt, Im Triesch (MA 62), 1 Expl. unter der aufgeplatzten Rinde einer toten Buche, 29.8.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. an *Meripilus giganteus* (PERS. ex FRIES) KARST. (Riesenporling) am Fuß einer toten Buche, 11.9.2005, leg. LANGE. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 83), 1 Expl. unter Rinde am unteren Stammbereich einer toten Eiche, 12.11.2005, leg. LANGE. – Kelsterbach, Mönchwald (MA 64), 2 Expl. unter der Rinde eines gefällten Eichen-Stamms, 28.4.2004, leg. LANGE. – Erlensee–Rückingen (MA 95), 4 Expl. unter Ahorn-Rinde, 3.12.2004, leg. HÖHNER. (3)
- Diadclina fagi* (PANZER): Bensheim, Fehlheimer Wald (MA 60), 1 Expl. unter der Rinde eines gefällten Eichen-Stamms, 17.12.2004, leg. LANGE. – Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 5 Expl. in weißfaulem Pappel-Stamm, 29.2.2004, leg. LANGE. (2)
- Uloma culinaria* (LINNAEUS): Gernsheim – Klein-Rohrheim, Hammer Aue (MA 60), 1 Expl. im weißfaulen Holz einer umgestürzten Schwarzpappel, 2.4.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an totem Buchen-Stamm, 16.4.2005, leg. HÖHNER; am selben Fundort 1 Expl. in morschem Laubholz, 26.4.2005, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim – Steigerts (MA 71), 1 Expl. im weißfaulen Holz eines Buchen-Stubbens, 14.11.2004, leg. LANGE. – Brensbach–Wersau (MA 91), 2 Expl. in weißfauler Buche, 10.12.2005, leg. HORN. – Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 6 Expl. im Holz eines morschen Eichen-Stubbens, 18.4.2005, leg. KUNZ. (2)
- Uloma rufa* (PILLER & MITTERPACHER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 3 Expl. in morschem Kiefern-Holz, 1.5.2005, leg. LANGE. – Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. unter toter Kiefern-Rinde, 18.4.2004, leg. LANGE. – Michelstadt–Würzburg, ehemaliger Wildschweinpark (NA 00), 2 Expl. in morscher Fichte, 28.9.2004, leg. HORN. (2)
- Tenebrio opacus* DUFTSCHMID: Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Dianaburg (MA 73), 3 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Eichen-Höhle, 27.5.-6.7.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. in liegendem, weißfaulem Buchen-Stamm, 25.4.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 3 Expl. in Buchen-Höhlen, 1.7.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Buchen-Höhle, 27.5.-5.7.2005, leg. LANGE. (2)

Neatus picipes (HERBST): Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 8 Expl. in kleinen Hohlräumen im morschen Holz an der Basis eines vor längerer Zeit abgebrochenen Asts mit alten Pilzen an einer liegenden, toten Pappel, 2.5.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Rhein-Ufer (MA 60), 1 Expl. in morschem, weißfaulem liegendem Pappel-Stamm, 18.12.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. unter *Hericius ramosus* (BULL. ex MÉR.) LET. (= *H. coralloides* SCOP. ex FRIES) (Stachelige Bartkoralle) an liegendem Buchen-Stamm, 9.9.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. unter loser Rinde einer stehenden, toten Eiche, 25.4.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 7 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Buchen-Höhle, 27.5.-5.7.2005, leg. LANGE. – Langen, Schloss Wolfsgarten (MA 73), 1 Expl. in Buchen-Höhle an *Inonotus* (Schillerporling), 15.5.2005, leg. LANGE. – Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 3 Expl. unter Rinde und in Höhle gefällter Eichen-Stämme, 16.5.2005, leg. LANGE. (1)

Trogidae

Trox perrisii FAIRMAIRE: Biblis–Nordheim, Maulbeerauer Altrhein (MA 50), 1 Expl. auf Wasserschutzdamm an Grashalm sitzend, 17.4.2005, leg. LANGE. – Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 1 Expl. in großer Höhle in relativ frisch gefälltem Eschen-Stamm, 16.4.2004, leg. LANGE. (1/R)

Geotrupidae

Typhaeus typhoeus (LINNAEUS): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. in Gang in Sandboden, 23.1.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. auf Sandboden, 9.4.2005, leg. LANGE. – Roßdorf (MA 82), 1 Expl. in Hausgarten, 7.11.2005, leg. BATHON. – Hanau – Klein-Auheim (MA 95), 1 Expl. an Pferde-Mist, 23.10.2004, leg. HÖHNER. (-/3)

Geotrupes spiniger (MARSHAM): Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 1 Expl. auf Wiesenweg, 17.9.2005, leg. HÖHNER. (3/-)

Scarabaeidae

Psammodius asper (FABRICIUS): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. in Laubwald fliegend, 30.4.2005, leg. LANGE. (-/3)

Rhyssalus germanus (LINNAEUS): Riedstadt–Crumstadt, Lehrbruch (MA 61), 1 Expl. auf Wasserschutzdamm, 3.4.2005, leg. LANGE. (-/3)

Maladera holosericea (SCOPOLI): Seeheim-Jugenheim – Jugenheim (MA 71), 2 Expl. Hauswand anfliegend, 4.9.2004, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim, Wald westlich Seeheim (MA 71), 1 Expl. auf Sandboden in Kiefern-Wald, 10.5.2005, leg. LANGE. (3)

Rhizotrogus marginipes MULSANT: Mörfelden-Walldorf (MA 64), 2 Expl. nachts beim Lichtfang, 29.5.2004, leg. BRENNER. (1)

Aphodius fasciatus (OLIVIER): Hanau – Klein-Auheim (MA 95), 1 Expl. an Pferde-Mist, 23.10.2004, leg. HÖHNER.

Tropinota hirta (PODA): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Blüte, 1.5.2005, leg. LANGE. (3/2)

Oxythyrea funesta (PODA): Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 3 Expl. auf Blüten in Hausgarten, 21.6.2004, leg. KUNZ. – Hadamar (MA 38), 6 Expl. auf Umbelliferen-Blüten am Elbbach-Ufer, 10.7.2005, leg. KUNZ. (2/3)

Protaetia aeruginosa (DRURY): Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 1 Larve im Mulm in großem Hohlraum in relativ frisch gefälltem Eschen-Stamm, eingetragen 16.4.2004, Käfer geschlüpft im September 2005, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Larve

entwickelte sich in Eichen-Mulm, der 2002 eingetragen wurde, geschlüpft im August 2004, leg. LANGE. – Mühltal–Traisa, Nähe Kuhfalltor (MA 72), 1 totgefahrenes Expl. auf Waldweg, 13.7.2004, leg. MOTAMEDI, in coll. HORN. (1/2)

Trichius sexualis BEDEL: Erlensee–Rückingen (MA 95), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 13.6.2005, leg. HÖHNER. (3/2)

Lucanidae

Lucanus cervus (LINNAEUS): Seeheim-Jugenheim – Jugenheim (MA 71), 1 relativ kleines Expl. (♀) innerorts auf Gehweg (totgetreten), Juli 2005, leg. BATHON. (2/3)

Sinodendron cylindricum (LINNAEUS): Biebergemünd–Bieber, Lochborn (NA 25), 1 Expl. unter der Rinde einer Buchen-Ruine, 14.6.2004, t. NÄSSIG. – Hadamar–Steinbach (MA 39), 7 Expl. in morschen Buchen-Ästen, 14.3.2004, leg. KUNZ. – Waldsolms–Kraftsolms (MA 68), >30 Expl. im morschen Holz eines Kirschbaums, 2.5.2005, leg. KUNZ. (3/-)

Cerambycidae

Megopis scabricornis (SCOPOLI): Langen, Wald südöstlich von Langen (MA 73), 1 Expl. am 27.7.2004 und 3 Expl. am 9.8.2004 an Buchen-Stamm mit abplatzender Rinde in von Windbruch geschädigter Waldabteilung, leg. BRENNER. (1)

Rhagium sycophanta (SCHRANK): Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 2 Expl. an vor allem aus Eichen-Holz bestehendem Brennholzstapel, 2.5.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. im feuchten Mulm unter der unterirdisch gelegenen Rinde einer toten Eiche (außerdem mehrere Expl. in Puppenwiegen), 9.1.2005, leg. LANGE. (3)

Rhamnusium bicolor (SCHRANK): Hadamar, Bahnhof (MA 38), 3 Expl. an alten anbrüchigen Kastanien, 5.6.2004, leg. KUNZ. Die Art war alljährlich (seit mindestens 1995) im Juni zu beobachten. Mittlerweile wurden die Bäume jedoch gefällt. (2)

Cortodera humeralis (SCHALLER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 4 Expl. an Eichen-Ästen, 1.5.2005, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde mit *Lasius* (Holzameise) vom Stammfuß, 26.4.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. von Laubholz geklopft, 17.5.2004, leg. LANGE. – Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 1 Expl. am Ufer eines Waldbachs (Rodenbach) gekäschert, 19.5.2005, leg. HÖHNER. (3)

Leptura aurulenta (FABRICIUS): Egelsbach bei Langen (MA 73), 1 Expl. auf Buchen-Stubben, 23.7.2004, leg. BRENNER. (2)

Anoplodera sexguttata (FABRICIUS): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 29.5.2005, leg. LANGE. – Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 17.6.2004, leg. KUNZ. (3)

Corymbia scutellata (FABRICIUS): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. auf Holzlagerplatz, 8.6.2002, leg. ERNST, in coll. BATHON. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. an stehendem Buchen-Stamm, 19.5.2004, leg. LANGE. – Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 3 Expl. an alten liegenden Pappel-Stämmen in den Ausschlupflöchern, 18.6.2005, leg. KUNZ. (3)

Pedostrangalia revestita (LINNAEUS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Dianaburg (MA 73), 1 totes Expl. auf Waldweg, 27.5.2005, leg. LANGE. (2)

Cerambyx cerdo LINNAEUS: Groß-Gerau (MA 63), 5 Imagines und 4 Larven beim Holzmachen in einem liegenden Eichen-Stamm (Durchmesser ca. 50 cm). Beim

Zerkleinern des Stamms krochen die Käfer aus den Bohrgängen, hierbei fand Peter WEBER auch die sehr großen, fingerdicken Larven, 18.10.2005, ein Käfer wurde von REDER fotografiert. (1)

Cerambyx scopolii FUESSLY: Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 2 Expl. an aus Eiche, Hainbuche u. a. bestehendem Brennholzstapel und an blühender *Crataegus* (Weißdorn), 2.5.2004, leg. LANGE. (3)

Trichoferus pallidus (OLIVIER): Lampertheim-Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 3 Expl. am Stamm einer absterbenden Eiche, 27.7.2005, leg. LANGE. (1)

Callimus angulatus (SCHRANK): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. an blühender *Crataegus* (Weißdorn), 13.5.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau (MA 63), 2 Expl. an Eichen-Gebüsch, 27.4.2005, leg. REDER. (2)

Phymatodes pusillus (FABRICIUS): Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. an Eichen-Ast, 20.5.2005, leg. HÖHNER. (2)

Xylotrechus rusticus (LINNAEUS): Einhausen bei Lorsch, Jägersburger Wald westlich Langwaden (MA 60), 1 Expl. an gefällttem Buchen-Stamm, 4.7.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an Buchen-Stamm, 28.5.2005, leg. LANGE. – Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. auf Kletten-Blatt an Holzlagerplatz, 2.5.2004, leg. REDER. – Griesheim bei Darmstadt (MA 62), 3 Expl. unter der Rinde einer vor etwa zwei Jahren gefällten Pappel, Juli 2004, erhalten durch Firma KLEINLOGEL, in coll. BATHON. – Groß-Gerau (MA 63), 5 Expl. an geschädigtem, stehendem Buchen-Holz, 24.5.2005, leg. REDER. (2)

Plagionotus detritus (LINNAEUS): Lampertheim-Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an Eichen-Stamm, 1.7.2004, leg. BRENNER; am gleichen Fundort 3 Expl. am Stamm einer absterbenden Eiche, 27.7.2005, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 3 Expl. auf Holzlagerplatz, 2. und 8.6.2002, leg. ERNST, in coll. BATHON. (2)

Mesosa nebulosa (FABRICIUS): Bensheim-Langwaden (MA 60), 1 Expl. an totem Buchen-Stamm, 16.4.2005, leg. HÖHNER. – Alsbach-Hähnlein – Alsbach (MA 70), 1 Expl. in Hausgarten, 18.7.2002, leg. ERNST, in coll. BATHON. (3)

Exocentrus adpersus MULSANT: Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an trockenem Ast, 30.6.2005, leg. HÖHNER. (3)

Exocentrus lusitanus (LINNAEUS): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. an Linden-Zweig, 29.5.2005, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. an trockenem Ast, 30.6.2005, leg. HÖHNER. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 3 Expl. an toten Linden-Ästen, 18.7.2004, leg. LANGE. (3)

Exocentrus punctipennis MULSANT & GUILLEBEAU: Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 2 Expl. an Ulmen-Ast, 15.7.2004, leg. LANGE. (2)

Phytoecia nigricornis (FABRICIUS): Weiterstadt, Forst Teufelshölle (MA 72), 1 Expl. (genaue Fundumstände nicht mehr bekannt), 9.5.1999, leg. KOCH. (3)

Chrysomelidae

Donacia brevicornis AHRENS: Philippsthal-Heimboldshausen (NB 63), 1 Expl. von Wiese in der Werraau gekäschert, 14.6.2004, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER. (3)

Labidostomis longimana (LINNAEUS): Darmstadt, Nähe Hauptbahnhof (MA 72), 1 Expl. an Hauswand, 28.6.2004, leg. KOCH.

Cryptocephalus elegantulus GRAVENHORST: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. von niedriger Vegetation gekäschert, 1.8.2005, leg. LANGE. (3)

Cryptocephalus pygmaeus FABRICIUS: Darmstadt, Botanischer Garten (MA 72), 2 Expl. an *Satureja* (Bohnenkraut), 2.7.2004, leg. KOCH.

Cryptocephalus macellus SUFFRIAN: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. an *Crataegus*-Ast (Weißdorn), 11.8.2004, leg. LANGE. (2)

- Cryptocephalus populi* SUFFRIAN: Biebesheim, Rheinwiesen (MA 61), 2 Expl. an Weiden-Ästen, 17.7.2005, leg. KOCH. (3)
- Cryptocephalus rufipes* GOEZE: Darmstadt–Kranichstein (MA 72), je 1 Expl. am 29.6.2004 und 20.4.2005 an schmalblättriger Weide am Rande eines kleinen Gehölzes, leg. KOCH.
- Oreina alpestris* (SCHUMMEL): Rhön, Fulda-Quelle (NA 69), 3 Expl. an grabenbegleitenden Umbelliferen, 27.6.2004, leg. KOCH.
- Chrysomela cuprea* (FABRICIUS): Schlüchtern–Elm (MV 48), 1 Expl. auf Weiden-Blatt, 5.5.2005, leg. BRENNER.
- Timarcha tenebricosa* (FABRICIUS): Hadamar (MA 38), 1 Expl. auf Feldweg, 14.1.2004, leg. KUNZ. – Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 5 Expl. auf Feldweg, 10.4.2005, leg. KUNZ. (3)
- Galeruca interrupta* ILLIGER: Griesheim bei Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 72), 19 Expl. in Barberfallen auf Sandboden, 8.10.-4.11.2005, leg. FRITZ, ein Beleg in coll. BRENNER. (2)
- Phyllotreta astrachanica* LOPATIN: Biebesheim, Rheinwiesen (MA 61), 1 Expl. auf dem Hochwasserdamm von Vegetation gestreift, 21.7.2005, leg. KOCH. – Darmstadt, östlich Eberstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 71), 1 Expl. auf Freifläche im Wald unter Hochspannungsleitung gestreift, 7.8.2005, leg. KOCH.
- Phyllotreta aerea* ALLARD: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. an *Reseda luteola* LINNAEUS (Färber-Resede) an Wegrain, 23.8.2004, leg. KOCH. (3)
- Phyllotreta procera* (REDTENBACHER): Biebesheim, Rheinwiesen (MA 61), 3 Expl. an *Reseda luteola* LINNAEUS (Färber-Resede) auf Hochwasserdamm, 17.7.2005, leg. KOCH. – Riedstadt–Leeheim (MA 52), 1 Expl. an *Reseda luteola*, 22.9.2005, leg. HÖHNER. (3)
- Aphthona pallida* (BACH): Frankfurt, Palmengarten (MA 75), 3 Expl. an *Geranium* (Storachschnabel), 29.9.2005, leg. KOCH. (3)
- Longitarsus aeruginosus* (FOUDRAS): Hirschhorner Höhe östlich Finkenbach im Odenwald (MV 98), 1 Expl. an *Eupatorium cannabinum* LINNAEUS (Wasserdost) an Waldwegrand (weitere Expl. wurden gesehen), 3.9.2005, leg. KOCH. (3)
- Longitarsus lycopi* (FOUDRAS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 2 Expl. an am Waldwegrand stehender *Glechoma hederacea* LINNAEUS (Gundermann), 9.5.2004, leg. KOCH.
Die Art tritt im Kranichsteiner Forst zahlreich an *Glechoma hederacea* auf, welcher von BÖHME (2001) nicht, wohl aber von DOUGET (1994) als Futterpflanze angegeben wird. An *Mentha* (Minze), wie in der Literatur angegeben, hat KOCH die Art im Kranichsteiner Forst noch nicht gefunden.
- Longitarsus ferrugineus* (FOUDRAS): Darmstadt–Kranichstein (MA 72), 1 Expl. am Ufer eines Teiches an *Mentha aquatica* LINNAEUS (Wasser-Minze), 14.9.2004, leg. KOCH.
- Longitarsus membranaceus* (FOUDRAS): Dieburg, östlich Mainzer Berg (MA 82), 1 Expl. am 3.9.2005 und 3 Expl. am 13.9.2005 an südexponiertem innerem Waldwegrand an *Teucrium scorodonia* LINNAEUS (Salbei-Gamander), leg. KOCH. – Hirschhorner Höhe östlich Finkenbach im Odenwald (MV 98), 2 Expl. an *Teucrium scorodonia* an Waldwegrand, 3.10.2005, leg. KOCH. – Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 4 Expl. an *Teucrium scorodonia*, 10.9.2005, leg. HÖHNER.
- Longitarsus pulmonariae* WEISE: Darmstadt, Botanischer Garten (MA 72), 1 Expl. an *Symphytum officinale* LINNAEUS (Beinwell), 2.7.2004, leg. KOCH.
Funde dieser Art sind sowohl aus dem Norden als auch aus dem Süden Deutschlands bekannt, jedoch nicht aus allen Regionen (KÖHLER &

- KLAUSNITZER 1998). Da mir keine hessischen Funde bekannt sind, stellt das Exemplar aus Darmstadt einen **Neunachweis für Hessen** dar! (3)
- Longitarsus lewisii* (BALY): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 2 Expl. an *Plantago major* LINNAEUS (Breit-Wegerich) an Wegrand, 9.5.2004, leg. KOCH. – Hirschhorner Höhe östlich Finkenbach im Odenwald (MV 98), 2 Expl. an *Plantago major* an Waldwegrand, 3.10.2005, leg. KOCH.
- Longitarsus reichei* (ALLARD): Biebesheim, Rheinwiesen (MA 61), 3 Expl. am 17.7. und 2 Expl. am 21.7.2005 gekäschert, 4 Expl. am 10.9.2005 an *Plantago lanceolata* LINNAEUS (Spitz-Wegerich) auf Feuchtwiese sowie 2 Expl. am 16.10.2005 an *Plantago major* LINNAEUS (Breit-Wegerich), leg. KOCH.
- Die Funde wurden bereits von KOCH (2006) publiziert, werden hier aber noch einmal zur leichteren Verfügbarkeit für die hessischen Faunisten wiedergegeben.
- (3)
- Longitarsus ballotae* (MARSHAM): Darmstadt, Botanischer Garten (MA 72), 1 Expl. an *Marrubium peregrinum* LINNAEUS (Wander-Andorn), 15.5.2004, leg. KOCH. – Weiterstadt, Riedbahn (MA 72), 2 Expl. an einem Feldwegrand an der Autobahn von *Ballota nigra* LINNAEUS (Schwarznessel) gekäschert, 6.11.2005, leg. KOCH.
- (3)
- Longitarsus quadriguttatus* (PONTOPPIDAN): Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. an *Nonea pulla* (LINNAEUS) DE CANDOLLE (Braunes Mönchskraut), 20.5.2005, leg. HÖHNER.
- KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) kennen Funde dieser Art aus dem Süden und dem Nordosten Deutschlands (Bayern, Württemberg, Baden, Pfalz, Rheinland, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen). Der Fund von Kelsterbach stellt somit einen **Neunachweis für Hessen** dar und schließt die Lücke in der bislang bekannten Verbreitung! (1)
- Longitarsus fulgens* (FOUDRAS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. am 15.5.2005 und 3 Expl. am 28.5.2005 jeweils am gleichen Bestand von *Scutellaria galericulata* LINNAEUS (Gemeines Helmkraut) am feucht-nassen Rand eines Waldwegs, leg. KOCH. – Dieburg, östlich Mainzer Berg (MA 82), 1 Expl. an *Scutellaria galericulata* an Wegrand, 2.6.2005, leg. KOCH. (2)
- Altica aenescens* WEISE: Dieburg, östlich Mainzer Berg (MA 82), 1 Expl. an südexponiertem innerem Rand eines Waldwegs an Birke, 9.7.2005, leg. KOCH.
- Altica quercetorum* FOU DRAS: Dieburg, östlich Mainzer Berg (MA 82), 1 Expl. südexponiertem innerem Rand eines Waldwegs an Eiche, 2.6.2005, leg. KOCH. (3)
- Chaetocnema tibialis* (ILLIGER): Lampertheim, südlich Biedensand (MV 59), 1 Expl. unmittelbar neben dem Weg auf dem Hochwasserdamm auf Vegetation, 2.4.2004, leg. KOCH.
- HEIKERTINGER (1951) gibt Südwestdeutschland und speziell Frankfurt am Main als Fundort an. GRUEV & DOUGET (2005) zitieren RHEINHIMER (2000), in der Artenliste dieser Arbeit ist die Art aber nicht zu finden. Deshalb wird sie hier als **Neunachweis für Hessen** angesehen! KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) kennen die Art nur aus Baden. (2)
- Männchen, Bestimmung (genitaliter, det. KOCH) nach DOUGET (1994) und <http://culex.biol.uni.wroc.pl/cassidae/european%20Chrysomelidae/index.htm>
- Dibolia cynoglossi* (KOCH): Steinau an der Straße, Weinberg (NA 37), 2 Expl. an *Stachys recta* LINNAEUS (Aufrechter Ziest) an südexponiertem Feldwegrand, 27.4.2004, leg. KOCH.
- HEYDEN (1904) kennt nur alte hessische Funde aus dem 19. Jahrhundert von Frankfurt. Deshalb stellt der Fund von Steinau einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar! (3)

Psylliodes laticollis KUTSCHERA: Hanau–Steinheim (MA 95), 1 Expl. am 6.4.2005 und noch einmal 4 Expl. am 24.5.2005 an *Nasturtium officinale* BROWN (Brunnenkresse), leg. HÖHNER. (3)

Cassida sanguinosa SUFFRIAN: Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 2 Expl. an *Achillea ptarmica* LINNAEUS (Sumpf-Schafgarbe) auf Waldparkplatz am Straßenrand, 10.7.2004, leg. KOCH.

Cassida prasina ILLIGER: Wetzlar–Magdalenenhausen (MA 69), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 6.7.2004, leg. HÖHNER.

HEYDEN (1904) kennt nur hessische Altfundate aus dem 19. Jahrhundert von Frankfurt, Bad Homburg und Weilburg. Deshalb stellt der Fund von Wetzlar einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar!

Anthribidae

Tropideres albirostris (HERBST): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 1 Expl. an gefälltem Eichen-Stamm, 31.5.2005, leg. LANGE. (3)

Noxius curtirostris (MULSANT): Lorch, Nollig (MA 14), 6 Expl. an *Cotoneaster integerrimus* MEDIKUS (Gemeine Zwergmispel), 1.8.2005, leg. LANGE.

Apionidae

Rhopalapion longirostre (OLIVIER): Erlensee–Rückingen (MA 95), 2 Expl. an *Alcea rosea* LINNAEUS (Stockrose), 2.7.2005, leg. HÖHNER. – Hadamar–Niederhadamar (MA 38), >50 Expl. an Stockrosen an einem Waldrand, 10.6.2005, leg. KUNZ.

Exapion formaneki (WAGNER): Hadamar (MA 38), 7 Expl. an *Genista sagittalis* LINNAEUS (Flügelginster) auf Magerrasen, 1.6.2005, leg. KUNZ. (3)

Pseudoprotapion astragali (PAYKULL): Ellerode, südwestlich Kreideberg (NB 59), 3 Expl. an *Astragalus* (Tragant) am Rande eines Kalkmagerrasens, 5.7.2004, leg. KOCH.

Curculionidae

Coniocleonus hollbergi (FAHRAEUS): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf sandigem Weg, 30.4.2005, leg. LANGE.

Rhyncolus reflexus BOHEMAN: Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. in Pappel-Höhle, 17.4.2005, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Buche-Höhle, 1.6.-1.7.2004, leg. LANGE; am selben Fundort 2 Expl. in Falle (Salzlösung) im Mulm einer Buchen-Höhle, 27.5.-5.7.2005, leg. LANGE. (2)

Rhyncolus punctatulus BOHEMAN: Büttelborn bei Groß-Gerau, Nähe Tankstelle (MA 62), 4 Expl. im Holz eines Buchen-Stamms, 19.3.2004, leg. LANGE. – Bensheim–Schwanheim, Jägersburger Wald (MA 60), 1 Expl. in liegendem, dünnem, hohlem Buchen-Stamm, 28.3.2004, leg. LANGE. (2)

Hexarthrum capitulum (WOLLASTON): Hainburg – Klein-Krotzenburg (MA 94), mehrere Expl. aus altem Haus mit feuchtem Gebälk, 17.6.2004, 1 Expl. in coll. BATHON.

Stenopelmus rufinasus GYLLENHAL: Riedstadt–Leeheim, Schusterwörth (MA 52), 4 Expl. an *Azolla filiculoides* LAMARCK (Großer Algenfarn) am Rhein-Altarm, 26.9.2004, leg. LANGE.

Lignyodes enucleator (PANZER): Erlensee–Rückingen (MA 95), 1 Expl. an Esche, 25.6.2004, leg. HÖHNER. (3)

Tychius pusillus GERMAR: Wetzlar–Magdalenenhausen (MA 69), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 6.7.2004, leg. HÖHNER. (3)

Magdalis rufa GERMAR: Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 3 Expl. an Kiefern-Ästen, 31.7.2004, leg. LANGE. (2)

- Hylobius transversovittatus* (GOEZE): Hanau–Steinheim (MA 95), 1 Expl. auf Wiesenweg, 24.5.2005, leg. HÖHNER. (3)
- Sphenophorus striatopunctatus* (GOEZE): Hainburg – Klein-Krotzenburg (MA 94), 1 Expl. auf Feldweg, 16.6.2005, leg. BRENNER. (2)
- Dryophthorus corticalis* (PAYKULL): Gernsheim, Rhein-Ufer (MA 60), 1 Expl. im morschen, weißfaulen Holz eines liegenden Pappel-Stamms, 18.12.2004, leg. LANGE. – Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 1 Expl. im Mulm unter Eichen-Rinde mit *Lasius* (Holzameise) vom Stammfuß, 26.4.2005, leg. LANGE. – Bensheim–Schwanheim, Jägersburger Wald (MA 60), 1 Expl. unter Kiefern-Rinde, 28.3.2004, leg. LANGE. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 83), 1 Expl. an braunfaulem Holz in hohler, umgebrochener Eiche, 17.10.2004, leg. LANGE. (3)
- Marmaropus besseri* GYLLENHAL: Erlensee–Rückingen (MA 69), 2 Expl. an *Rumex obtusifolius* LINNAEUS (Stumpfbblätteriger Ampfer), 24.6.2004, leg. HÖHNER. (3)
- Ceutorhynchus resedae* (MARSHAM): Wetzlar–Magdalenenhausen (MA 69), 1 Expl. an *Reseda luteola* LINNAEUS (Färber-Resede), 6.7.2004, leg. HÖHNER.
Nachdem HÖHNER die Art 1999 für Hessen nachweisen konnte (BRENNER 2001), bestätigte er nun das Vorkommen bei Magdalenenhausen und machte dadurch das Vorkommen einer stabilen Population wahrscheinlich. (3)
- Ceutorhynchus cakiliis* (HANSEN): Heringen (Werra) (NB 73), 1 Expl. an *Phragmites communis* LINNAEUS (Schilf), 29.6.2004, leg. HÖHNER.
Diese ursprünglich nur von den Küsten bekannte Art listen KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) für Bayern, Westfalen, das Niederebegebiet, für Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern auf. Aus Hessen war bislang kein Fund bekannt, weshalb das Exemplar von Heringen einen **Neunachweis für Hessen** darstellt!
- Ceutorhynchus pervicax* WEISE: Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 2 Expl. am Ufer eines Waldbachs (Rodenbach) an *Cardamine amara* LINNAEUS (Bitteres Schaumkraut), 19.5.2005, leg. HÖHNER.
- Datonychus arquatus* (HERBST): Dieburg, östlich Mainzer Berg (MA 82), 1 Expl. an *Lycopus* (Wolfstrapp) an Wegrand, 2.6.2005, leg. KOCH. (3)
- Datonychus angulosus* (BOHEMAN): Ehrenberg–Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 3.6.2005, leg. HÖHNER.
- Hadroplontus trimaculatus* (FABRICIUS): Riedstadt–Leeheim (MA 52), 1 Expl. an *Cirsium* (Kratzdistel), 22.9.2005, leg. HÖHNER.
HEYDEN (1904) kennt alte hessische Nachweise aus dem 19. Jahrhundert von Frankfurt und Friedberg. Da mir keine aktuelleren Funde bekannt sind, stellt der Fund von Leeheim einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar! (3)
- Mecinus heydeni* WENCKER: Hanau–Steinheim, Gailenberg (MA 95), 2 Expl. am 9.10.2004, 2 Expl. am 16.10.2004, 1 Expl. am 12.10.2005 und 2 Expl. am 14.10.2005 an *Linaria vulgaris* MILLER (Gemeines Leinkraut), leg. HÖHNER; an der gleichen Stelle 4 Expl. 12.10.2005, leg. BRENNER. (2)
- Gymnetron rostellum* (HERBST): Wetzlar–Magdalenenhausen (MA 69), 3 Expl. von Wiese gekäschert, 6.7.2004, leg. HÖHNER.
Nachdem HÖHNER die Art 1999 für Hessen nachweisen konnte (BRENNER 2001), bestätigte er nun das Vorkommen bei Magdalenenhausen und machte dadurch das Vorkommen einer stabilen Population wahrscheinlich. (3)
- Gymnetron netum* (GERMAR): Hanau–Steinheim (MA 95), 4 Expl. an *Linaria vulgaris* MILLER (Gemeines Leinkraut), 14.10.2005, leg. HÖHNER. – Wetzlar–Magdalenenhausen (MA 69), 1 Expl. von Wiese gekäschert, 6.7.2004, leg. HÖHNER. (3)

Literatur

- BATHON, H. (1991): Käferfunde der Jahre 1987 bis 1989 aus Hessen. – Hess. faun. Briefe **11**(1): 1-18, Darmstadt.
- BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTKE & P. PRETSCHER (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenr. Landschaftspfl. Natursch., Bonn-Bad Godesberg, **55**: 3-434.
- BÖHME, J. (2001): Phytophage Käfer und ihre Wirtspflanzen in Mitteleuropa. Ein Kompendium. – Heroldsberg.
- BRENNER, U. (2001): Käferfunde der Jahre 1998 und 1999 aus Hessen. – Hess. faun. Briefe **20**(4): 53-65, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2003): Käferfunde des Jahres 2000 aus Hessen. – Hess. faun. Briefe **22**(3/4): 37-71, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2005): Käferfunde des Jahres 2001 aus Hessen. – Hess. faun. Briefe **24**(1): 1-19, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2006): Käferfunde der Jahre 2002 und 2003 aus Hessen. – Hess. faun. Briefe **24**(3): 41-62 (2005), Darmstadt.
- BÜCHE, B. (1998): *Gastrallus knizeki* Zahradnik 1996, eine für Deutschland neue Art (Coleoptera: Anobiidae). – Mitt. entomol. Ver. Stuttgart **33**: 74-76, Stuttgart.
- DOGUET, S. (1994): Coléoptères Chrysomelidae. Vol. **2** Alticinae. – Faune de France **80**: 1-694; Paris.
- FRANCK, P. (1933): Zur Käferfauna des Meißner. – Entomol. Bl. **29**(4): 150-155, Krefeld.
- GRUEV, B. & M. DÖBERL (2005): General Distribution of the Flea Beetles in the Palaearctic Subregion (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae). Supplement. – Sofia, Moscow.
- HEIKERTINGER, F. (1951): Bestimmungstabellen der paläarktischen Arten der Gattungen Podagrica Foudr., Mantura Stephens und Chaetocnema Stephens. – Kol. Rundschau **32**: 1-84, Wien.
- HEYDEN, L. VON (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – Frankfurt am Main.
- HORION, A. (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. **2**: Palpicornia – Staphylinoidea (außer Staphylinidae). – Frankfurt am Main.
- HORION, A. (1960): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. **7**: Clavicornia, 1. Teil: (Sphaeritidae bis Phalacridae). – Überlingen.
- HORION, A. (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. **11**: Staphylinidae, 3. Teil: Habrocerinae bis Aleocharinae (Ohne Subtribus Athetae). – Überlingen.
- KOCH, M. (2006): Bemerkenswerte Blattkäferfunde aus dem südlichen Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und der Pfalz (Coleoptera, Chrysomelidae). – Entomol. Nachr., Ber. **50**(3): 164, Dresden.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomol. Nachr. Ber., Beiheft **4**: 1-185, Dresden.
- MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz: Natur in Hessen).
- MAJKA, C. (2004): *Ptinus sexpunctatus* (Panzer). – http://www.chebucto.ns.ca/Environment/NHR/Ptinus_sexpunctatus.html.
- RHEINHEIMER, J. (2000): Die Käferfauna des Landkreises Karlsruhe und einiger angrenzender Gebiete. – Mitt. entomol. Ver. Stuttgart **35**: 1-141, Stuttgart.
- RÜCKER, W. H. (1992): 58. FAMILIE: LATRIDIIDAE. – In: G. A. Lohse & W. LUCHT: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. **13** (2. Supplementband): 139-160. – Krefeld.
- SCHAFFRATH, U. (2003): Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens (Coleoptera: Familienreihen Scarabaeoidea und Lucanoidea). – 47 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten: Natur in Hessen).
- SPORNRAFT, K. (1998): 50. FAMILIE: NITIDULIDAE. – In: W. LUCHT & B. KLAUSNITZER: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. **15** (4. Supplementband): 240-243. – Krefeld & Jena.
- WEBER, L. (1903): Verzeichnis der bei Cassel in einem Umkreis von ungefähr 25 Kilometern aufgefundenen Coleopteren. – Abh. Ber. Ver. Naturkunde Cassel **48**: 97-212, Kassel.
- ZAHRADNIK, P. (1996): New species of *Gastrallus* from Europe (Coleoptera: Anobiidae). – Klapelekiana **32**: 267-269, Prag.

Verfasser

Uli Brenner, Strauchweg 2, 36381 Schlüchtern

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: [Käferfunde der Jahre 2004 und 2005 aus Hessen 14. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen 45-74](#)