

Käferfunde des Jahres 2006 aus Hessen

15. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen ¹⁾

ULI BRENNER

Summary

Faunistic records of 214 species of beetles are delt with from the state of Hesse (Germany). Of these 194 are delt with as endangered species in the Red Book of Animals in Germany. Five species are recorded as new to Hesse.

Zusammenfassung

Es werden 214 Fundmeldungen aus 52 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen 1 Art nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) als ausgestorben oder verschollen (0), 15 Arten als vom Ausstreben bedroht (1), 58 Arten als stark gefährdet (2) und 110 Arten als gefährdet (3) eingestuft werden. Weitere 9 Arten stehen auf der Vorwarnliste (V). Bei einer Art ist die Datenlage defizitär (D). Die Angabe „GD“ bei *Cicindela hybrida pseudoriparia* MANDL und *Harpalus subcylindricus* DEJEAN aus der hessischen Roten Liste von MALTEN (1998) bedeutet eine anzunehmende Gefährdung, wobei die Datenlage jedoch mangelhaft erscheint. 5 Arten werden als Neunachweise für Hessen angesehen: *Lordithon trimaculatus* (PAYKULL), *Trixagus gracilis* WOLLASTON, *Xyletinus longitarsis* JANSSON, *Anastrangalia dubia* (SCOPOLI) und *Cassida seladonia* GYLLENHAL. 9 Arten stellen Wiederfunde in Hessen nach mehr als 100 Jahren dar: *Stenus subaeneus* ERICHSON, *Zyras lugens* (GRAVENHORST), *Ancistronycha cyanipennis* (FALDERMANN), *Melanotus crassicolis* (ERICHSON), *Vibidia duodecimguttata* (PODA), *Anobium rufipes* FABRICIUS, *Cheilotoma musciformis* (GOEZE), *Oomorhynchus concolor* (STURM) und *Chrysolina analis* (LINNAEUS). 1 Art wurde nach mehr als 90 Jahren in Hessen wiedergefunden: *Agrilus derasofasciatus* LACORDAIRE.

Neben den Ergebnissen der einzelnen hessischen Käfersammler, bei denen ich mich für die Überlassung der Daten herzlich bedanken möchte, gehen in diese Ausgabe der „Käferfunde“ auch die Resultate zweier gemeinschaftlicher Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen ein. Diese Streifzüge durch Hessens Natur gingen im Jahr 2006 auf den Eckersteinkopf bei Rüdesheim-Assmannshausen und ins Naturwaldreservat Bodenthal bei Lorch. Eine andere Quelle der Funddaten sind Aufsammlungen, die von mir im Auftrag des Forschungsinstituts Senckenberg in einem Randbereich des zum Frankfurter Stadtwald gehörenden Schwanheimer Waldes in unmittelbarem Anschluss an den Flughafen Frankfurt durchgeführt wurden. Diese Daten sind an dem Zusatz „Gateway Gardens“ zu erkennen. Ich danke Andreas MALTEN für sein Einverständnis, diese Daten hier zu publizieren. Mein besonderer Dank gilt Sibylle GROSS, die mir die Sammlung ihres verstorbenen Mannes Michael GROSS großzügig zur Entnahme faunistisch interessanter Käfer überließ. Dabei konnte auch ein für Hessen neuer Bockkäfer – *Anastrangalia dubia* (SCOPOLI) – in die Auflistung aufgenommen werden. Auch andere Fundmeldungen aus zum Teil länger zurückliegender Zeit sind wieder gewohnheitsgemäß in dieser Zusammenstellung zu finden.

¹⁾14. Bericht in: Hess. faun. Briefe 25(3/4): 45-74, 2007

Nach den Fundorten sind in Klammern die zugehörigen UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten die Gefährdungskategorien nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) (=RL D), bei abweichender Einstufung der Carabiden bzw. Scarabaeidae und Lucanidae zusätzlich auch nach den hessischen Roten Listen von MALTEN (1998) und SCHAFFRATH (2003) (=RL H), geklammert angegeben [(RL D)/(RL H)] .

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von, Uli BRENNER (Schlüchtern), Sibylle GROSS (Schlüchtern), Günter HOFMANN (Stockstadt), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Mathias KOCH (Darmstadt), Frank KÖHLER (Bornheim), Roland KUNZ (Hadamar), Frank LANGE (Seeheim-Jugenheim), Rüdiger RUPP (Wetzlar) und Uli WEIH (Hainburg).

Carabidae

- Cicindela hybrida pseudoriparia* MANDL: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Sandfläche, 8.4.2006, leg. LANGE. (-/GD)
- Calosoma inquisitor* (LINNAEUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. in Eklektor an Eichen-Stamm, 30.4.-29.5.2006, leg. BRENNER. – Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. an *Prunus mahaleb* LINNAEUS (Weichselkirsche), 4 Expl. auf Eichen-Ästen, 3.6.2006, leg. HOFMANN (4 Expl.) und leg. LANGE (1 Expl.). (3)
- Calosoma sycophanta* (LINNAEUS): Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. an *Prunus mahaleb* LINNAEUS (Weichselkirsche) und 1 Expl. in Eichen-Wald am Boden, 3.6.2006, leg. HOFMANN und leg. LANGE. (2)
- Carabus intricatus* LINNAEUS: Seeheim-Jugenheim, Stettbacher Tal (MA 71), 1 Expl. unter Holzstück, 16.9.2006, leg. LANGE. (3)
- Notiophilus aesthuans* MOTSCHULSKY: Rüdesheim-Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. auf dem Boden in Weinberg laufend, 22.4.2006, leg. KOCH. (V/-)
- Notiophilus germnyi* FAUVEL: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Sandboden, 22.9.2006, leg. LANGE. – Rüdesheim-Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 2 Expl. auf dem Boden in Weinberg laufend, 22.4.2006, leg. KOCH. (3)
- Bembidion octomaculatum* (GOEZE): Heusenstamm (MA 84), 1 Expl. auf schlickigem Ufer eines Baggersees unter Holzstückchen, 1.10.2006, leg. HOFMANN. (2/3)
- Perigona nigriceps* (DEJEAN): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim (MA 71), 1 Expl. am Licht auf Balkon, 11.7.2006 und 1 Expl. aus Gesiebe von Komposthaufen, 10.8.2006, leg. LANGE.
- Harpalus dimidiatus* (ROSSI): Biebesheim, westlich des Rheinwiesenhofs (MA 51), 1 Expl. auf Wasserschutzdamm, 2.4.2006, leg. LANGE. (V)
- Harpalus autumnalis* (DUFTSCHMID): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. in Eklektor an Buchen-Stamm, 30.4.-29.5.2006, leg. BRENNER. (3)
- Harpalus melancholicus* DEJEAN: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 2 Expl. unter Holzstück auf Freifläche, 15.10.2006, leg. LANGE. (2)
- Harpalus pumilus* STURM: Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. in Eklektor an Buchen-Stamm, 30.4.-29.5.2006, leg. BRENNER. (V/-)
- Harpalus servus* (DUFTSCHMID): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Sandfläche, 8.4.2006, leg. LANGE. – Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotböhl (MA 73), 2 Expl. auf Sandboden, 21.4.2006, leg. LANGE. (3/2)
- Harpalus subcylindricus* DEJEAN: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Sandfläche, 8.4.2006, leg. LANGE. (D/GD)

- Harpalus serripes* (QUENSEL): Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 2 Expl. unter einer Blattrosette von *Echium vulgare* LINNAEUS (Natternkopf) und 3 Expl. unter Steinen, 22.4.2006, leg. HOFMANN (2 Expl.) und leg. KOCH (3 Expl.). – Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotbühl (MA 73), 2 Expl. auf Sandboden, 21.4.2006, leg. LANGE. (V/3)
- Ophonus cordatus* (DUFTSCHMID): Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. unter Stein am Rand eines Weinbergs, 3.6.2006, leg. LANGE. (2)
- Ophonus rupicola* STURM: Seeheim-Jugenheim (MA 71), 4 Expl. in Fruchtstand von *Daucus carota* LINNAEUS (Wilde Möhre) in Kiefernwald, 19.8.2006, leg. HOFMANN. (3)
- Agonum versutum* (STURM): Hanau–Klein-Auheim (MA 94), 1 Expl. in *Sphagnum* (Torfmoos), 3.5.2006, leg. HÖHNER. (2)
- Amara tibialis* (PAYKULL): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. in Eklektor an Buchen-Stamm, 30.4.-29.5.2006, leg. BRENNER. (V/3)
- Amara fulva* (MÜLLER): Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 2 Expl. auf Sandfläche unter Holzstück, 7.5.2006, leg. LANGE. (-/3)
- Masoreus wetterhallii* (GYLLENHAL): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 immatures Expl. unter Holzstück auf Sandfläche, 18.6.2006, leg. LANGE. – Lampertheim–Neuschloß, Funkstelle (MV 69), 1 totes Expl. von Spinnennetz in Vegetation gekätschert, 20.7.2006, leg. LANGE. – Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. unter am Boden liegendem Holzstück auf Freifläche, 4.8.2006, leg. LANGE. (V/2)
- Lebia chlorocephala* (HOFFMANN): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 2 Expl. auf *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH, 16.6.2006, leg. LANGE. (V)
- Cymindis humeralis* (GEOFFROY): Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 3 Expl. unter Holzstück auf grasbewachsener, von Kiefernwald umgebener Freifläche mit Sandboden, 1.9.2006, leg. LANGE. (3)
- Philorhizus sigma* (ROSSI): Trebur–Geinsheim, Großer Goldgrund (MA 52), 1 Expl. in Bodenstreu, 8.1.2006, leg. LANGE. (V/3)
- Brachinus crepitans* (LINNAEUS): Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. unter Stein, 22.4.2006, leg. LANGE. (V)
- Brachinus expodens* DUFTSCHMID: Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 4 Expl. unter Stein, 22.4.2006, leg. LANGE. – Lorch, Bodenthal (MA 14), 2 Expl. unter Stein, 3.6.2006, leg. LANGE. (-/V)

Hydrochidae

- Hydrochus nitidicollis* MULSANT: Erlensee–Rückingen (MA 95), 1 Expl. in einem Altarm der Kinzig, 9.9.2006, leg. HÖHNER. (R)

Histeridae

- Plegaderus dissectus* ERICHSON: Seeheim-Jugenheim, Umgebung Steigerts (MA 71), 1 Expl. unter der Rinde eines am Boden liegenden Birken-Stammstücks, 12.2.2006, leg. LANGE. (3)
- Aeletes atomarius* (AUBÉ): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. unter toter Rinde an Buchen-Stubben, 7.6.2006, leg. BRENNER. (1)
- Margarinotus purpurascens* (HERBST): Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. unter der Blattrosette von *Echium vulgare* LINNAEUS (Natternkopf), 22.4.2006, leg. HOFMANN.
- Atholus corvinus* (GERMAR): Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. unter der Blattrosette von *Echium vulgare* LINNAEUS (Natternkopf), 22.4.2006, leg. HOFMANN. (3)

Hetaerius ferrugineus (OLIVIER): Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 8 Expl. unter am Boden liegenden Holzstücken bei Ameisen, 4.8.2006, leg. LANGE. (3)

Silphidae

Ablattaria laevigata (FABRICIUS): Flörsheim–Weilbach, Weilbacher Kiesgruben (MA 64), 1 Expl. am Boden, -4.2006, vid. ZIMMERMANN, t. KÖHLER. (2)

Cholevidae

Nemadus colonoides (KRAATZ): Heppenheim (MV 79), Landstraße (B3) zwischen Heppenheim und Laudenbach, 5 Expl. im Mulm aus den Stümpfen hohler, frisch gefällter Linden, 10.5.2006, leg. LANGE. (3)

Choleva spadicea (STURM): Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 7 Expl. in Mäusegängen unter Holz in Buchen-Wald, 28.5.2006, leg. KUNZ. (3)

Leiodidae

Leiodes oblonga (ERICHSON): Mörfelden-Walldorf (MA 63), 1 Expl. an Hutpilz, 16.10.1999, leg. LANGE. Der Fund wurde von BRENNER(2003) als *Leiodes cinnamomea* (PANZER) gemeldet. Eine Überprüfung des Tieres durch Kai BURGARTH (Winsen an der Luhe) im Jahr 2007 ergab jedoch, dass es sich um *Leiodes oblonga* handelt. (3)

Colenis immunda (STURM): Seeheim-Jugenheim, Stettbacher Tal (MA 71), 1 Expl. an faulendem *Meripilus giganteus* (PERS. ex FRIES) KARST. (Riesenporling), 16.9.2006, leg. LANGE.

Ptiliidae

Ptenidium gressneri ERICHSON: Mainhausen, Abtswald (NA 03), 21 Expl. in Buchen-Mulm, 16.12.2006, leg. HOFMANN. (3)

Staphylinidae

Siagonium quadricorne KIRBY: Riedstadt–Crumstadt, Lehrbruch (MA 61), 4 Expl. unter der Rinde von Pappel-Stubben, 30.12.2006, leg. LANGE. (3)

Siagonium humerale GERMAR: Schlüchtern–Breitenbach (NA 38), 2 Expl. unter toter Eschen-Rinde, 4.5.2006, leg. BRENNER.

Scaphium immaculatum (OLIVIER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. unter Holzstück auf Freifläche, 15.10.2006, leg. LANGE. – Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. unter Holzstück auf grasbewachsener, von Kiefernwald umgebener Freifläche mit Sandboden, 1.9.2006, leg. LANGE. – Lampertheim–Neuschloß, Funkstelle (MV 69), 2 Expl. unter dem Hut eines kleinen Pilzes, der aus Eselskot wuchs, 3.10.2006, leg. LANGE. – Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 2 Expl. unter Holzstück, 9.9.2006, leg. LANGE. (3)

Scaphisoma balcanicum TAMANINI: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 12 Expl. unter stellenweise verpilztem Holzstück auf Sandfläche, 18.6.2006, leg. LANGE. (3)

Phyllodrepa nigra (GRAVENHORST): Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. in einem Vogelnistkasten an Fledermaus-Kot, 17.10.2006, leg. KUNZ. (3)

Hapalarea pygmaea (GYLLENHAL): Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. in altem *Laetiporus sulphureus* (BULL. ex FRIES) MURR. (Schwefelporling) an Eiche, 22.6.2006, leg. KUNZ; am selben Fundort 1 Expl. in Bodenfalle am Fuß einer alten Eiche, 30.9.2006, leg. KUNZ. (3)

Xylostiba bosnica (BERNHAEUER): Pfungstadt (MA 71), 1 Expl. an Baumstumpf, 16.5.2006, leg. LANGE.

- Xylodromus testaceus* (ERICHSON): Lautertal (Odenwald) (MA 70), 1 Expl. im Laubwald (Autokescher), 21.10.2006, leg. LANGE. (3)
- Stenus excubitor* ERICHSON: Hanau, Rote Lache in der Großen Bulau (MA 95), 2 Expl. von *Carex*-Bulten (Segge) geklopft, 16.11.2006, leg. HOFMANN. – An der selben Stelle konnte HOFMANN am 15.12.2007 zwei weitere Expl. aus abgeschnittenem Horstgarn auflesen. Ein Männchen von 2007 wurde von PUTHZ überprüft, die anderen 3 Expl. sind Weibchen. Von dieser Art existieren keine veröffentlichten Funde für Hessen, PUTHZ (in lit.) kennt jedoch einen Fund von Hanau (leg. DEHNERT). (2)
- Stenus subaeneus* ERICHSON: Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 2 Expl. im Moos unter der Blattrosette von *Echium vulgare* LINNAEUS (Natternkopf), 22.4.2006, leg. HOFMANN.
Die Art ist in Deutschland nördlich bis ins Rheinland, Nordrhein-Westfalen und Thüringen verbreitet (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Aus Hessen liegen nur alte Meldungen aus dem 19. Jahrhundert von Frankfurt und Bad Soden–Neuenhain vor (HEYDEN 1904). Der Nachweis vom Eckersteinkopf stellt also einen **Wiederfund in Hessen nach über 100 Jahren** dar! (1)
- Hypnogyra angularis* (GANGLBAUER) (= *glabra* (NORDMANN)): Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 3 Expl. in Mulm einer hohlen Pappel mit Öffnung im unteren Stammbereich, 26.12.2006, leg. LANGE. – Büttelborn (MA 62), 2 Expl. in Holz-/Mulm-Gesiebe aus hohlen Laubbäumen (Buche, Esche), 12.11.2006, leg. LANGE. – Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. unter toter Rinde an Buchen-Stubben, 15.5.2006; 1 Expl. in Eklektor an Kiefern-Stamm, 30.9.-31.10.2006, leg. BRENNER. (3)
- Hesperus rufipennis* (GRAVENHORST): Mainhausen, Abtswald (NA 03), 5 Expl. in Buchen-Mulm, 16.12.2006, leg. HOFMANN. (2)
- Ocytus tenebricosus* (GRAVENHORST): Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. unter Stein, 3.6.2006, leg. LANGE. (3)
- Lordithon trimaculatus* (PAYKULL): Rüsselsheim, Rüsselsheimer Wald (MA 63), 1 Expl. an *Pholiota* (Schüppling), 2.10.2006, leg. LANGE.
Von diesem boreomontanen Urwaldrelikt (HORION 1967) kennen KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) neben alten Funden aus Westfalen und Sachsen aktuelle Nachweise nur aus Bayern, Baden und Württemberg. Deshalb wird der Fund hier als **Neunachweis für Hessen** angesehen! (1)
- Gyrophaena obsoleta* GANGLBAUER: Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. in *Pleurotus* (Seitling) an Buche, 20.6.2006, leg. KUNZ. (2)
- Gyrophaena rousi* DVORAK: Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. in *Pleurotus* (Seitling) an Buche, 22.6.2006, leg. KUNZ. (2)
- Thamiaraea cinnamomea* (GRAVENHORST): Hadamar–Niederhadamar (MA 38), insgesamt 6 Expl. in Bodenfalle am Fuß einer alten Eiche, 28.5., 28.7. und 24.8.2006, leg. KUNZ. (3)
- Thamiaraea hospita* (MARKEL): Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. in Bodenfalle am Fuß einer alten Eiche, 28.7.2006, leg. KUNZ. (2)
- Zyras lugens* (GRAVENHORST): Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. im Mulm einer hohlen Pappel mit Öffnung im unteren Stammbereich, 26.12.2006, leg. LANGE. – Lampertheim, Viernheimer Heide (MA 69), je 1 Expl. in der Streu eines Kiefern-Wäldchens in Bodenfallen, 28.6.-19.7.1996 und 30.6.-31.7.1997, leg. BRENNER. – Lorch-Lorchhausen (MA 14), insgesamt 59 Expl. von April bis August (Schwerpunkt im Mai) der Jahre 1996-1999 in der Streu unter einer mit *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise) besetzten Eiche in Bodenfallen, leg. BRENNER.

SCRIBA (nach ELBERT 1994) hielt die Art im 19. Jahrhundert für im ganzen Großherzogtum Hessen zuweilen nicht selten. HEYDEN (1904) kennt noch Funde aus dem Frankfurter Wald und von Königstein, die wohl auch aus dem 19. Jahrhundert datieren. Danach scheint sie in Hessen nicht mehr gefunden worden zu sein. Worauf sich der Hinweis eines Fundes zwischen 1900 und 1950 bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) begründet, ist für mich nicht nachvollziehbar. Die genannten Funde werden deshalb hier als **Wiederfunde in Hessen nach mehr als 100 Jahren** angesehen!

Haploglossa gentilis (MÄRKEL): Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue, (MA 50), 21 Expl. im Mulm einer hohlen Pappel mit Öffnung im unteren Stammbereich, 26.12.2006, leg. LANGE. (3)

Pselaphidae

Batrissodes buqueti (AUBÉ): Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. im Mulm einer hohlen Pappel mit Öffnung im unteren Stammbereich, 26.12.2006, leg. LANGE. – Mainhausen, Abtswald (NA 03), 2 Expl. in Buchen-Mulm, 16.12.2006, leg. HOFMANN. (2)

Tyrus mucronatus (PANZER): Büttelborn (MA 62), 1 Expl. unter Rinde, 12.11.2006, leg. LANGE. (3)

Claviger testaceus PREYSSLER: Lorch, Lehrener Kopf (MA 14), 2 Expl. unter Stein mit *Lasius*-Nest (*L. niger* (LINNAEUS)?, Wegmeise) oberhalb der Mauer einer Weinbergsbrache, 1.5.2006, leg. KOCH. (3)

Lycidae

Platycis cosnardi (CHEVROLAT): Schlüchtern–Hohenzell, Ratzerod (NA 37), 1 Expl. in Laubwald, 27.5.2006, leg. BRENNER. (2)

Cantharidae

Ancistrorycha cyanipennis (FALDERMANN): Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf *Cornus* (Hartriegel), 3.6.2006, leg. HOFMANN.

Die Art ist in Deutschland aus fast allen Regionen (mit Ausnahme Brandenburgs) gemeldet (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Aus Hessen liegen nur einige alte Funde aus dem 19. Jahrhundert vom Feldberg im Taunus, von Weilburg und von Langenschwalbach (den Namen scheint es heute nicht mehr zu geben; gemeint ist wohl Schwalbach am Taunus) vor (HEYDEN 1904, dort als *Cantharis* (*Ancistrorycha*) *violacea* PAYKULL). Da mir keine neueren hessischen Nachweise bekannt sind, stellt der Fund von Lorch einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar!

Malthinus facialis THOMSON: Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. auf Ast von *Acer campestre* LINNAEUS (Feld-Ahorn), 21.6.2006, leg. BRENNER. (3)

Dasytidae

Aplodermus virens (SUFFRIAN): Lorch, Bodenthal (MA 14), 25 Expl. von *Prunus mahaleb* LINNAEUS (Weichselkirsche), von Eichen, von Rosen und von Gebüsch am Wegrand geklopft, 3.6.2006, leg. HOFMANN (14 Expl.) und leg. LANGE (11 Expl.). (2)

Cleridae

Tilloidea unifasciata (FABRICIUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), je 1 Expl. am 15.5. und 7.6., 2 Expl. am 21.6.2006 auf Eichen-Ästen; 4 Expl. auf Ast von blühendem *Acer campestre* LINNAEUS (Feld-Ahorn), 8.5.2006,

leg. BRENNER. – Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 3.6.2006, leg. HOFMANN. (2)

Lymexylidae

Lymexylon navale (LINNAEUS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. auf Eichen-Stamm an Holzlagerplatz, 27.6.2006, leg. HOFMANN. (3)

Elateridae

Ampedus sinuatus GERMAR: Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Kiefer, 3.6.2006, leg. HOFMANN. (2)

Ampedus cinnabarinus (ESCHSCHOLZ): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. auf Eichen-Ast sowie 3 Expl. unter toter Rinde an Buchen-Stubben, 15.5.2006, leg. BRENNER. (3)

Ampedus elongatulus (FABRICIUS): Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. auf Gebüsch, 22.4.2006, leg. LANGE. – Morschen–Neumorschen, Halberg (NB 45), 1 Expl. auf Gebüsch, 10.6.2006, leg. LANGE. (3)

Procræus tibialis (LACORDAIRE): Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. am Fuß einer alten, äußerlich gesunden Eiche, 7.5.2006, leg. LANGE. – Biebergemünd (NA 25), 1 Larve im Bohrgang einer Buprestide unter Eichen-Rinde, 1.11.1999, der fertige Käfer schlüpfte im August 2000, leg. RUPP. (2)

Melanotus crassicornis (ERICHSON): Lorch, Bodenthal (MA 14), 14 Expl. auf Gebüsch, meist Eichen, 3.6.2006, leg. HOFMANN (3 Expl.) und leg. LANGE (11 Expl.). HORION (1953) nennt einen hessischen Fund von Darmstadt aus dem 19. Jahrhundert und einen Fund von Hanau aus dem Jahr 1902. Die Funde von Lorch werden deshalb hier als **Wiederfunde in Hessen nach mehr als 100 Jahren** angesehen! (2)

Stenagostus rhombeus (OLIVIER): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim (MA 71), 2 Expl. am Licht auf Balkon, 19.7.2006, leg. LANGE. (3)

Crepidophorus mutilatus (ROSENHAUER): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. außen an einer hohlen Buche, 13.6.2006, leg. LANGE. (2)

Cardiophorus nigerrimus ERICHSON: Lorch, Bodenthal (MA 14), 5 Expl. auf Eichen, 3.6.2006, leg. HOFMANN (3 Expl.) und leg. LANGE (2 Expl.). (2)

Cardiophorus atramentarius ERICHSON: Pfungstadt (MA 71), 1 Expl. an *Crataegus* (Weißdorn), 16.5.2006, leg. LANGE. (2)

Eucnemidae

Dromaeolus barnabita (VILLA): Seeheim-Jugenheim, westlich von Seeheim (MA 71), 1 Expl. auf Kiefern-Zweig zwischen den Nadeln, 1.7.2006, leg. LANGE. (2)

Lissomidae

Drapetes cinctus (PANZER): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 3 Expl. unter toter Rinde an Buchen-Stubben, 7.6.2006, leg. BRENNER. (3)

Throscidae

Triaxus gracilis WOLLASTON: Seeheim-Jugenheim–Jugenheim (MA 71), 1 Expl. am Licht auf Balkon, 11.7.2006, leg. LANGE.

Nachdem die Art 2001 in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hessen (Mainz) für Rheinland-Pfalz neu nachgewiesen werden konnte (BRENNER 2005), gelang nun auch mit dem Fund aus Jugenheim der **Neunachweis für Hessen!**

Buprestidae

Ptosima flavoguttata (ILLIGER): Lorch, Bodenthal (MA 14), 4 Expl. auf *Prunus mahaleb* LINNAEUS (Weichselkirsche), 3.6.2006, leg. HOFMANN (1 Expl.) und leg. LANGE (3 Expl.). (2)

Buprestis octoguttata LINNAEUS: Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. in Eklektor an Kiefern-Stamm, 30.6.-31.7.2006, leg. BRENNER. (3)

Anthaxia manca (LINNAEUS): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 2 Expl. an abgesägtem, nicht direkt am Boden aufliegenden Ulmen-Ast bei der Paarung, 19.6.2006, leg. LANGE. (2)

Anthaxia mendizabali COBOS: Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH (Besenginster), 3.6.2006, leg. HOFMANN. (2)

Anthaxia similis SAUNDERS: Lampertheim-Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf gelber Blüte, 7.5.2006, leg. LANGE. (3)

Agrilus ater (LINNAEUS): Gernsheim (MA 60), 9 Expl. an liegenden, noch recht frischen Pappel-Stämmen, diese z. T. mit Ausschlägen, 15.6.2006, leg. LANGE. (2)

Agrilus graminis CASTELNAU & GORY: Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. am 18.8.2005, 3 Expl. am 23.8.2005, 1 Expl. am 30.8.2005, 2 Expl. am 1.9.2005, 2 Expl. am 26.6.2006 und 2 Expl. am 11.7.2006 an Eichen-Ästen, leg. BRENNER. (3)

Agrilus derasofasciatus LACORDAIRE: Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. von Gebüsch geklopft, 3.6.2006, leg. LANGE.

Die Art wurde nur einmal in Hessen vor fast 100 Jahren (1911) im zu dem Naturwaldreservat Bodenthal unmittelbar benachbarten Bodental gefunden (BÜCKING 1930-1932, HORION 1955). Der Fund vom Bodenthal stellt deshalb einen **Wiederfund in Hessen nach über 90 Jahren** dar! (2)

Agrilus hyperici (CREUTZER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 8 Expl. an *Hypericum* (Johanniskraut), 9.7.2006, leg. LANGE. – Lampertheim-Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an *Hypericum*, 12.7.2006, leg. LANGE. – Lampertheim-Neuschloß, Funkstelle (MV 69), 4 Expl. an *Hypericum*, 20.7.2006, leg. LANGE. – Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 7 Expl. an *Hypericum*, 22.7.2006, leg. LANGE. (3)

Eucinetidae

Eucinetus haemorrhoidalis (GERMAR): Lampertheim-Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 2 Expl. an Schleimpilz-Sporenmasse auf gehäckseltem Buchen-Stamm, 20.7.2006, leg. LANGE. (3)

Limnichidae

Pelochares versicolor (WALTJ.): Heusenstamm (MA 84), 1 Expl. am Ufer eines Baggersees, 13.9.2006, leg. HÖHNER. Der Neunachweis für Hessen von 1998 (BRENNER 2001) konnte nun durch diesen Fund von bestätigt werden. (2)

Dermestidae

Globicornis nigripes (FABRICIUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. in Eklektor an Kiefern-Stamm, 30.4.-29.5.2006, leg. BRENNER. (3)

Globicornis corticalis (FABRICIUS): Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 3.6.2006, leg. LANGE. (2)

Megatoma undata (LINNAEUS): Gernsheim (MA 60), 1 Expl. unter der Rinde einer toten Erle, 1.4.2006, leg. LANGE. (3)

Nitidulidae

Meligethes obscurus ERICHSON: Lorch, Bodenthal (MA 14), 3 Expl. auf *Ranunculus*-Blüten (Hahnenfuß), 3.6.2006, leg. HOFMANN. – Oberursel, Hohe Mark, Weiße Mauer (MA 66), 1 Expl. in Blüte von *Leontodon autumnalis* LINNAEUS (Herbst-Löwenzahn), 1.9.2006, leg. HOFMANN. – Waldsolms-Kraftsolms (MA 68), 1 Expl. an *Teucrium scorodonia* LINNAEUS (Salbei-Gamander), 18.7.2006, leg. KUNZ. (3)

Erotylidae

Triplax rufipes (FABRICIUS): Lampertheim-Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 5 Expl. an Pilzfruchtkörpern von *Pleurotus* (?) (Seitling) und unter der Rinde an liegendem Buchen-Stamm, 12.8.2006, leg. LANGE. (1)

Phalacridae

Phalacrus fimetarius (FABRICIUS): Morschen-Neumorschen, Halberg, (NB 45), 4 Expl. von Gras gestreift, 10.6.2006, leg. LANGE. (3)

Laemophloeidae

Laemophloeus monilis (FABRICIUS): Lampertheim-Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 1 Expl. bei Dunkelheit an *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an liegendem Buchen-Stamm, 20.7.2006, leg. LANGE. – Rüdesheim, Niederwalddenkmal (MA 23), 1 Expl. unter Robinien-Rinde, 31.7.2006, leg. KUNZ. (3)

Cryptolestes corticinus (ERICHSON): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), je 1 Expl. in Eklektor an Eichen- und Kiefern-Stamm, 8 Expl. an Buchen-Stamm, 6.-30.4.2006; 1 Expl. in Eklektor an Eichen-Stamm, 30.4.-29.5.2006; 1 Expl. in Eklektor an Kiefern-Stamm, 29.5.-30.6.2006, leg. BRENNER. (3)

Cryptolestes spartii (CURTIS): Rüdesheim-Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 4 Expl. an *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH (Besenginster), 22.4.2006, leg. HÖHNER (1 Expl.), leg. HOFMANN (2 Expl.) und leg. LANGE (1 Expl.). – Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 4 Expl. an teilweise abgestorbenen *Sarothamnus scoparius*, 3.5.2006, leg. LANGE. (3)

Mycetophagidae

Triphyllus bicolor (FABRICIUS): Lampertheim-Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 2 Expl. zwischen den Lamellen eines verschimmelten Hutzpilzes am Fuß einer Eiche, 3.10.2006, leg. LANGE. (3)

Mycetophagus decempunctatus FABRICIUS: Lampertheim-Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 2 Expl. bei Dunkelheit an *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an liegendem Buchen-Stamm, 20.7.2006, leg. LANGE. (1)

Mycetophagus multipunctatus FABRICIUS: Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 2 Expl. an Pilz an Kirschbaum, 18.3.2006, leg. HÖHNER. (3)

Colydiidae

Coxelus pictus (STURM): Rüdesheim-Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 2 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 22.4.2006, leg. HOFMANN und leg. LANGE (je 1 Expl.). – Lorch, Bodenthal (MA 14), 4 Expl. auf *Prunus mahaleb* LINNAEUS (Weichselkirsche), 3.6.2006, leg. HOFMANN und leg. LANGE (je 2 Expl.). (1)

Cicones variegatus (HELLWIG): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. unter toter Rinde an Buchen-Stubben, 15.5.2006, leg. BRENNER. (3)

- Colobicus hirtus* (ROSSI): Darmstadt, Innenstadt an der Feuerwache (MA 72), 1 Expl. unter Platanen-Rinde, 17.11.2006, leg. KOCH. (1)
- Colydium elongatum* (FABRICIUS): Darmstadt, Wald südlich des Darmstädter Kreuzes (MA 72), 1 Expl. in Laubwald, 22.10.2006, leg. LANGE. (3)

Endomychidae

- Lycoperdina bovistae* (FABRICIUS): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 3 Expl. in der staubigen Sporenmasse aufgeplatzter Boviste, 15.10.2006, leg. LANGE. (3)
- Lycoperdina succincta* (LINNAEUS): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 5 Expl. in der staubigen Sporenmasse kleiner Boviste (2-3 cm Durchmesser), aber auch außen an den Fruchtkörpern, 1.5.2006, leg. LANGE; an der gleichen Stelle neben weiteren 5 Expl. auch 3 Puppen, die sich noch in den Larvenhäuten befanden, 10.9.2006, leg. LANGE. – Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), neben 3 Imagines auch 3 Puppen in der staubigen Sporenmasse kleiner Boviste, die Käfer schlüpften nach einigen Tagen, 3.10.2006, leg. LANGE. – Lampertheim–Neuschloß, Funkstelle (MV 69), 2 unausgefärbte, fast einheitlich hellrote Expl. in der staubigen Sporenmasse kleiner Boviste, 3.10.2006, leg. LANGE. (3)
- Mycetina cruciata* (SCHALLER): Rüsselsheim, Rüsselsheimer Wald (MA 63), 1 Expl. in angeschimmelter *Sparassis crispa* (WULF ex FRIES) FRIES (Krause Glucke), 2.10.2006, leg. LANGE. (3)

Coccinellidae

- Scymnus apetzi* MULSANT: Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 2 Expl. auf Vegetation an Wegrand, 22.4.2006, leg. HOFMANN. – Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation an Wegrand, 3.6.2006, leg. LANGE. (1)
- Nephus quadrimaculatus* (HERBST): Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 5 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu), 22.4.2006, leg. HÖHNER (2 Expl.) und leg. LANGE (3 Expl.). (3)
- Clitostethus arcuatus* (ROSSI): Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu), 22.4.2006, leg. HOFMANN. (2)
- Coccinella magnifica* REDTENBACHER: Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. auf Ulmen-Ast, 16.7.2006, leg. LANGE. (3)
- Vibidia duodecimguttata* (PODA): Büttelborn (MA 62), 1 Expl. in Holz-Mulm-Gesiebe aus hohlem Laubbaum (Buche oder Esche), 12.11.2006, leg. LANGE.
HEYDEN (1904) kennt alte Funde aus dem 19. Jahrhundert von Frankfurt, Bad Soden am Taunus und Weilburg. Neuere hessische Nachweise sind mir nicht bekannt, weshalb der Fund von Büttelborn einen **Wiederfund in Hessen nach über 100 Jahren** darstellt! (3)

Cisidae

- Orthocis lucasi* (ABEILLE): Mörfelden-Walldorf, Gundwald (MA 64), 4 Expl. unter Buchen-Rinde mit *Schizophyllum commune* FRIES (Spaltblättling), 19.3.2006, leg. HOFMANN. (2)

Bostrichidae

- Bostrichus capucinus* (LINNAEUS): Aßlar (MB 60), 2 Expl. am 3.6., 5 Expl. am 13.6., 3 Expl. 17.6. und 4 Expl. am 24.6.1972 in der Nachmittagssonne auf geschlagenen Eichen-Stämmen, leg. RUPP. (3)

Lichenophanes varius (ILLIGER): Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 12 Expl. in 1-3 m Höhe an Buchen-Dürrständer nur an noch berindeten Stellen, 14.6.2006, leg. LANGE. (2)

Xylopertha retusa (OLIVIER): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 11 Expl. am 7.6., 7 Expl. am 21.6. und 8 Expl. am 26.6.2006 an Eichen-Ästen am Boden, leg. BRENNER. (3)

Anobiidae

Hedobia regalis (DUFTSCHMID): Pfungstadt (MA 71), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 16.5.2006, leg. LANGE. (2)

Ochina ptinoides (MARSHAM): Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu), 3.6.2006, leg. LANGE. (3)

Gastrallus immarginatus (MÜLLER): Alsbach-Hähnlein, Alsbacher Schloß (MA 70), 4 Expl. aus morschem Hainbuchen-Ast gezogen, 7.11.2004 Ast eingetragen im Juni 2006 geschlüpft, leg. LANGE. (3)

Gastrallus laevigatus (OLIVIER): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 6 Expl. an Eichen-Ästen, 21.6.2006, leg. BRENNER. (2)

Gastrallus knizeki ZAHRADNIK: Lampertheim (MV 69), 1 Expl. aus abgestorbenem *Viscum laxum* BOISSIER & REUTER (Nadelholz-Mistel) an Kiefer gezogen, 3.3.2006, leg. LANGE. – Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 4 Expl. aus abgestorbenem *Viscum laxum* an umgestürzter Kiefer gezogen, im Januar/Februar 2006 eingetragen im März 2006 geschlüpft, leg. LANGE. – Pfungstadt (MA 71), 6 Expl. aus abgestorbenem *Viscum laxum* an Kiefer gezogen, 3.3.2006, leg. LANGE.

Anobium rufipes FABRICIUS: Knüllwald–Niederbeisheim (NB 35), 1 Expl. in Bauerngarten, 16.6.2006, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER. **Wiederfund in Hessen seit über 100 Jahren!** (3)

Xyletinus longitarsis JANSSON: Lorch, Bodenthal (MA 14), 3 Expl. auf Eichen-Ästen, 3.6.2006, leg. HOFMANN (2 Expl.) und leg. LANGE (1 Expl.).

Die Art ist in Deutschland extrem selten gefunden worden. Es liegen lediglich Nachweise aus dem Rheinland, vom Nordrhein und aus Brandenburg vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Da mir keine hessischen Funde bekannt sind, wird der Fund von Lorch hier als **Neunachweis für Hessen** gewertet! (1)

Mesocoelopus niger (MÜLLER): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim (MA 71), 1 Expl. am Licht auf Balkon, 9.7.2006, leg. LANGE. (3)

Caenocara affinis (STURM): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. an Eichen-Ast, 18.8.2005, leg. BRENNER. (2)

Ptinidae

Ptinus pilosus MÜLLER: Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 3.6.2006, leg. LANGE. (3)

Oedemeridae

Nacerdes carniolica (GISTEL): Seeheim-Jugenheim, westlich von Seeheim (MA 71), 1 Expl. auf Zweig einer jungen Kiefer zwischen den Nadeln, 1.7.2006, leg. LANGE. (3)

Ischnomera caerulea (LINNAEUS): Lorch, Bodenthal (MA 14), 2 Expl. auf *Cornus* (Hartriegel), 3.6.2006, leg. HOFMANN. – Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. an Birken-Holz, 15.4.2006, leg. HÖHNER. (3)

Ischnomera cinerascens (PANDELLÉ): Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch, 3.6.2006, leg. LANGE. (2)

Prostomidae

Anasomis mandibularis (FABRICIUS): Hofgeismar–Beberbeck, Urwald Sababurg (NC 31), 5 Expl. im Bohrmehl eines abgebrochenen Eichen-Kronenasts (ca. 10 weitere Expl. wurden gesehen), 11.4.1974, leg. RUPP. (1)

Scaptiidae

Anaspis ruficollis (FABRICIUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. in Eklektor an Kiefern-Stamm, 30.4.-29.5.2006, leg. BRENNER. (2)

Anaspis pulicaria COSTA: Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. von Vegetation am Wegrand gestreift, 3.6.2006, leg. HOFMANN. (3)

Aderidae

Aderus populneus (CREUTZER): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim (MA 71), 1 Expl. am Licht auf Balkon, 11.7.2006, leg. LANGE. – Mainhausen, Abtswald (NA 03), 6 Expl. in morschem Buchen-Holz, 10.12.2006, leg. HOFMANN. – an der gleichen Stelle 1 Expl. in Buchen-Mulm, 16.12.2006, leg. HOFMANN. (3)

Meloidae

Meloe violaceus MARSHAM: Dornburg im Westerwald (MA 29/39), mehrere Exemplare auf nassem Waldweg in gemischtem Hochwald, 28.5.2006, vid. Walter MÜLLER (Fotobeleg), det. KÖHLER (3).

Mordellidae

Mordellistena pseudoparvula ERMISCH: Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 2 Expl. aus Stengel von *Artemisia campestris* LINNAEUS (Feld-Beifuß) gezogen, 22.4.2006, leg. HOFMANN. (2)

Melandryidae

Anisoxya fuscula (ILLIGER): Lorch, Bodenthal (MA 14), 3 Expl. an Ästen einer toten Eiche, 3.6.2006, leg. LANGE. (3)

Melandrya caraboides (LINNAEUS): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl., 4.6.2006, leg. LANGE. (3)

Conopalpus brevicollis KRAATZ: Lorch, Bodenthal (MA 14), 6 Expl. auf *Prunus mahaleb* LINNAEUS (Weichselkirsche) und Buche, 3.6.2006, leg. HOFMANN (2 Expl.) und leg. LANGE (4 Expl.). (2)

Alleculidae

Allecula morio (FABRICIUS): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim (MA 71), 2 Expl. am Licht auf Balkon, 4.7.2006, leg. LANGE. (3)

Prionychus ater (FABRICIUS): Mainhausen, Abtswald (NA 03), 1 Expl. im Mulm einer Eichen-Stammhöhle, 30.6.2006, leg. HOFMANN. (3)

Pseudocistela ceramoides (LINNAEUS): Lorch, Bodenthal (MA 14), 2 Expl. auf Gebüsch, 3.6.2006, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. auf Vegetation am Wegrand, 13.6.2006, leg. LANGE. (2)

Mycetochara axillaris (PAYKULL): Knüllwald–Niederbeisheim (NB 35), 1 Expl. in Bauerngarten, 16.6.2006, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER. (2)

Tenebrionidae

Neomida haemorrhoidalis (FABRICIUS): Weiterstadt, Triesch (MA 62), 1 Expl. nachts am Licht, 14.6.2006, leg. BRENNER. (1)

Geotrupidae

- Odonteus armiger* (SCOPOLI): Knüllwald–Niederbeisheim (NB 35), 2 Expl. in Bauerngarten, 18.7.2006, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER. (3)
- Typhaeus typhoeus* (LINNAEUS): Lampertheim–Neuschloß, Funkstelle (MV 69), 1 Expl. auf Sandboden, 3.10.2006, leg. LANGE. – Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. auf Sandboden, 4.5.2006, leg. LANGE. – Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotbühl (MA 73), 1 Expl. auf Sandboden, 10.10.2006, leg. LANGE. (-/3)

Scarabaeidae

- Onthophagus verticicornis* (LAICHARTING): Schlüchtern–Hohenzell, Ratzerod (NA 37), 1 Expl. auf Magerrasen, 21.5.2006, leg. BRENNER. (3)
- Pleurophorus caesus* (CREUTZER): Seeheim-Jugenheim, westlich von Seeheim (MA 71), 4 Expl. auf Sandboden, 9.5.2006, leg. LANGE. (2/3)
- Maladera holosericea* (SCOPOLI): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. am Abend an Waldrand von Vegetation gestreift, 15.10.2006, leg. LANGE. (3)
- Amphimallon burmeisteri* (BRENSKE): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. unter Holzstück auf Sandfläche, 1.7.2006, leg. LANGE.
Über das Vorkommen in der Viernheimer Heide wurde bereits berichtet (BRENNER 1997). Damals war die genaue Artzugehörigkeit jedoch noch nicht ganz geklärt. Heute werden die Tiere als eindeutig zu *A. burmeisteri* gehörend angesehen. (0/1)
- Rhizotrogus aestivus* (OLIVIER): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim, Umgebung Forsthaus (MA 71), 1 zertretenes Expl. auf Gehweg, 7.5.2006, leg. LANGE. (3/-)
- Anoxia villosa* (FABRICIUS): Lampertheim, Viernheimer Heide (MV 69), 8 Expl. in der Abenddämmerung um Weißdorn-Hecke zwischen Spargelfeldern schwärmend, in den Feldern viele Schlupflöcher, 1.7.2006, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim–Jugenheim (MA 71), 1 Expl. nachts an Straßenrand unter Laterne, 24.6.2006, leg. LANGE. (3/1)
- Polyphylla fullo* (LINNAEUS): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim (MA 71), 2 Expl. nach Sonnenuntergang am Licht auf Balkon, 28.6.2006, leg. LANGE. – Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 1 Expl. in Garten, 11.7.2006, leg. H. FISCHER, in coll. HÖHNER; im Sandboden des Gartens beobachtete HÖHNER mindestens 10 Ausschlupf-Löcher, als deren Verursacher er *Polyphylla fullo* vermutete. (2/1)
- Hoplia praticola* DUFTSCHMID: Frankfurt–Sachsenhausen, Oberschweinstiege (MA 74), 1 Expl. im Flug gefangen, mindestens 10 weitere Expl. wurden gesehen, 3.5.2006, leg. HÖHNER. (3/2)
- Oxythyrea funesta* (PODA): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), je 3 Expl. auf Blüten von *Rubus* (Brombeere) und *Achillea millefolium* LINNAEUS (Schafgarbe), 21.6.2006; 3 Expl. am 26.6.2006 und 4 Expl. am 11.7.2006 auf Blüten von *Achillea millefolium*, leg. BRENNER. – Lorch, Bodenthal (MA 14), 2 Expl. auf *Cornus* (Hartiegel), 3.6.2006, leg. HOFMANN und leg. LANGE (je 1 Expl.). (2/3)
- Protaetia aeruginosa* (DRURY): Frankfurt–Schwanheim, Schwanheimer Wald, Tal-schneise (MA 74), 1 Larve wurde im Mai 2005 zusammen mit Holz und Mulm aus einer gefällten, hohlen Buche entnommen, im August 2006 schlüpfte die Imago, leg. LANGE. (1/2)
- Gnorimus nobilis* (LINNAEUS): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch (MA 63), 1 Larve im Mulm eines Eichen-Stamms, 27.3.2002, der fertige Käfer schlüpfte im Juni 2004, leg. RUPP. (3)

Lucanidae

Lucanus cervus (LINNAEUS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Oberwaldhaus (MA 72), 1 Expl. auf der Staße, 12.6.2006, leg. HOFMANN. – Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), in den Jahren 2005 und 2006 wurden hier mindestens 100 Individuen des Hirschkäfers festgestellt, leg. BRENNER. Darunter fanden sich neben zahlreichen Fragmenten auch 20 lebende Tiere. Beim Aufgraben eines Buchen-Stubbens (am 11.7.2006) wurden eine Larve sowie zwei Puppen in ihren „Puppenwiegen“ aufgedeckt. (Aus einer mitgenommenen Puppe schlüpfte am 28.7.2006 ein Hirschkäfer-Männchen.) Außerdem fand sich (am 23.8.2005) ein lebendes Weibchen beim Aufgraben eines Eichen-Stubbens. Das Tier saß völlig entwickelt in seiner „Puppenwiege“ in der Erde.

Die Tatsache, dass es sehr „schwergewichtig“ war, lässt darauf schließen, dass es erst vor kurzem aus seiner Puppe hervorgegangen war und nun auf das nächste Frühjahr wartete, um sich dann zur Erdoberfläche durchzugraben. Es gehörte also der Fortpflanzungsgeneration des Jahres 2006 an. Exemplare der Generation des Jahres 2005 haben um die Jahreszeit des Auffindens des Weibchens (falls sie dann überhaupt noch leben, was nur selten der Fall ist) bereits einen Großteil ihres Fettvorrats verbraucht und (wenn es sich um Weibchen handelt) ihre Eier abgelegt, wodurch sie fast hohl werden und nur noch wenig wiegen. Von einem Vorliegen adulter Tiere bereits im Juli bzw. August wurde in der Literatur bislang nicht berichtet. KLAUSNITZER (1982) teilt mit, dass die Puppe im September, die Imago aber erst im Oktober zu finden sei. BRECHTEL & KOSTENBADER (2002) geben (HORION 1958 folgend) eine Verpuppung von Mitte bis Ende September an. Nachdem die Puppenruhe etwa sechs Wochen dauern soll, errechnet sich daraus ein Schlüpfen der Imagines Ende Oktober bis Mitte November (BRECHTEL & KOSTENBADER: „noch im Herbst“, an anderer Stelle „im Oktober“). Als Ursache, dass die Imagines in ihren Puppenwiegen schon so früh im Jahr zu finden waren, ist wahrscheinlich das sehr milde Klima des Rhein-Main-Gebiets anzusehen. Durch die höheren Temperaturen in dieser Region entwickeln sich Larven und Puppen im Vergleich mit denen aus Regionen mit rauherem Klima schneller, so dass die fertigen Käfer auch früher aus den Puppen schlüpfen können. (2/3)

Sinodendron cylindricum (LINNAEUS): Aßlar, Haard (MB 60), 1 Expl. in weißfaulem Buchen-Holz, 1.5.1970, leg. RUPP. (3)

Cerambycidae

Ergates faber (LINNAEUS): Hainburg (MA 94), 1 Expl. im Ort ca. 20 m von einer einzelnen anbrüchigen Kiefer entfernt auf dem Boden, 16.8.2006, leg. WEIH, in coll. KÖHLER. (2)

Cortodera humeralis (SCHALLER): Lorch, Bodenthal (MA 14), 4 Expl. auf *Cornus* (Hartriegel), 3.6.2006, leg. HOFMANN (1 Expl.) und leg. LANGE (3 Expl.). (3)

Anoplodera rufipes (SCHALLER): Lorch, Bodenthal (MA 14), 2 Expl. auf Blüten am Wegrand, 3.6.2006, leg. HOFMANN und leg. LANGE (je 1 Expl.). (3)

Anoplodera sexguttata (FABRICIUS): Lorch, Bodenthal (MA 14), 2 Expl. auf Blüten am Wegrand, 3.6.2006, leg. HOFMANN und leg. LANGE (je 1 Expl.). (3)

Corymbia scutellata (FABRICIUS): Mainhausen, Abtswald (NA 03), 1 Expl. nachts an Buchen-Stamm, 10.6.2006, leg. HOFMANN. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 2 Expl. auf Eichen-Stamm an Holzlagerplatz, 27.6.2006, leg. HOFMANN. (3)

Anastrangalia dubia (SCOPOLI): Fulda-Bernhards (NB 50), 2 Expl., VII.1980, leg. M. GROSS, in coll. BRENNER.

Die Art ist in Deutschland aus Bayern, Baden-Württemberg, der Pfalz und Sachsen mit aktuellen Funden vertreten. Ältere Nachweise liegen aus Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Der Fund bei Fulda passt also gut in das bisher bekannte Verbreitungsgebiet. Ein hessischer Nachweis war jedoch bislang nicht bekannt geworden; deshalb stellt der Fund von Bernhards einen **Neunachweis für Hessen** dar! Nach HORION (1974) handelt es sich bei dem hübschen Böckchen um eine montane bis subalpine Art, die in Gebirgslagen von wenigstens ca. 500 m weit verbreitet ist. Vom Großen Winterberg bis ins Kirtal in Sachsen wurde sie meist in ca. 450 m Höhenlage gefunden (HORION 1974). Bernhards liegt in den niederen Lagen der Rhön auf immerhin etwas über 300 m. Die genaue Fundstelle läßt sich leider nicht mehr rekonstruieren.

- Cerambyx cerdo* LINNAEUS: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. tot an stehendem Buchenstamm "sitzend", 19.8.2006, leg. LANGE. – Darmstadt, Kränichsteiner Forst (MA 72), 2 Expl. an Alt-Eiche, 15.6.2006, leg. HOFMANN. (1)
- Cerambyx scopolii* FUESSLY: Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf *Cornus* (Hartriegel), 3.6.2006, leg. HOFMANN. (3)
- Ropalopus femoratus* (LINNAEUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 2 Expl. auf Eichen-Ästen, 15.5.2006, leg. BRENNER. (3)
- Phymatodes pusillus* (FABRICIUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), je 1 Expl. auf Eichen-Ast am Boden und auf blühendem *Acer campestre* LINNAEUS (Feld-Ahorn), 8.5.2006, leg. BRENNER. (2)
- Phymatodes rufipes* (FABRICIUS): Lorch, Bodenthal (MA 14), 4 Expl. auf Eiche und *Sorbus torminalis* LINNAEUS (CRANTZ) (Elsbeere), 3.6.2006, leg. HOFMANN und leg. LANGE (je 2 Expl.). (2)
- Xylotrechus rusticus* (LINNAEUS): Gernsheim (MA 60), 1 Expl. an liegendem, noch recht frischem Pappel-Stamm, 15.6.2006, leg. LANGE. (2)
- Plagionotus detritus* (LINNAEUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. tot unter der Rinde eines liegenden Eichen-Stamms, 23.8.2005; 1 Expl. in Eklektor an Eichen-Stamm, 29.5.-30.6.2006; 1 Expl. an Eichen-Ast, 11.7.2006, leg. BRENNER. (2)
- Monochamus galloprovincialis* (OLIVIER): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 7 Expl. 30.6.-31.7., 4 Expl. 31.7.-31.8., 1 Expl. 31.8.-30.9. und 1 Expl. 30.9.-31.10.2006 in Eklektor an Kiefern-Stamm, leg. BRENNER. (3)
- Mesosa nebulosa* (FABRICIUS): Rüdesheim-Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. an dürrer Eichen-Ast, 22.4.2006, leg. LANGE; am selben Fundort 2 Expl. in totem Walnuß-Ast, am 22.4.2006 eingetragen, am nächsten Tag geschlüpft, leg. HOFMANN. – Lorch, Bodenthal (MA 14), 2 Expl. auf Buchen-Ästen, 3.6.2006, leg. HOFMANN. (3)
- Oplosia fennica* (PAYKULL): Lorch, Bodenthal (MA 14), 3 Expl. in Laubmischwald auf Linden-Ästen, 3.6.2006, leg. HOFMANN (1 Expl.) und leg. LANGE (2 Expl.). (2)
- Exocentrus lusitanus* (LINNAEUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. an Eichen-Ast, 21.6.2006, leg. BRENNER. (3)
- Exocentrus punctipennis* MULSANT & GUILLBEAU: Darmstadt, Wald östlich des Darmstädter Kreuzes (MA 72), 6 Expl. aus abgestorbenen Ulmen-Ästen, Ende Februar 2006 eingetragen, im Juni 2006 geschlüpft, leg. LANGE. (2)
- Agapanthia violacea* (FABRICIUS): Morschen-Neumorschen, Halberg (NB 45), 1 Expl. von Gras gestreift, 10.6.2006, leg. LANGE. (3)
- Oberea erythrocephala* (SCHRANK): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. an *Euphorbia cyparissias* LINNAEUS (Zypressen-Wolfsmilch), 16.6.2006, leg. LANGE. (2)

- Stenostola ferrea* (SCHRANK): Lorch, Bodenthal (MA 14), 12 Expl. in Mischwald auf Linden-Ästen, 3.6.2006, leg. HOFMANN (8 Expl.) und leg. LANGE (4 Expl.). (3)
- Phytoecia nigricornis* (FABRICIUS): Lorch, Bodenthal (MA 14), 2 Expl. an *Tanacetum vulgare* LINNAEUS (Rainfarn), 3.6.2006, leg. HOFMANN. (3)
- Phytoecia pustulata* (SCHRANK): Lorch, Lehrener Kopf (MA 14), 2 Expl. an *Tanacetum vulgare* LINNAEUS (Rainfarn), 7.5.2006, leg. KOCH. (2)

Chrysomelidae

- Cheilotoma musciformis* (GOEZE): Morschen-Neumorschen, Halberg (NB 45), 1 Expl. von Gras gestreift, 10.6.2006, leg. LANGE.
Die Art ist in Deutschland bislang nur sehr sporadisch gefunden worden. KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) kennen neben alten Nachweisen aus Baden und der Pfalz aktuelle Funde nur aus Bayern, Hannover, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Aus Hessen ist mir nur der alte Nachweis aus dem 19. Jahrhundert von Friedberg (HEYDEN 1904) bekannt, weshalb das Exemplar vom Halberg einen **Wiederfund in Hessen nach über 100 Jahren** darstellt! (2)
- Pachybrachis picus* WEISE: Lorch, Bodenthal (MA 14), 23 Expl. auf Linden- und Eichen-Ästen am Rand einer Blockhalde, 3.6.2006, leg. HOFMANN (10 Expl.) und leg. LANGE (13 Expl.). (3)
- Cryptocephalus coryli* (LINNAEUS): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. auf Ulmen-Ast, 16.6.2006, leg. LANGE. (3)
- Cryptocephalus frontalis* MARSHAM: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 18.6.2006, leg. LANGE. (3)
- Oomorphus concolor* (STURM): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim, Heiligenberg (MA 71), 1 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu), 1.5.2006, leg. LANGE.
Die Art ist aus fast allen Gebieten Deutschlands gemeldet (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, KÖHLER 2000). Aus Hessen liegt nur ein alter Nachweis aus dem 19. Jahrhundert von Weilburg vor (HEYDEN 1904), weshalb der Fund vom Heiligenberg einen **Wiederfund in Hessen nach über 100 Jahren** darstellt!
- Chrysolina analis* (LINNAEUS): Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotbühl (MA 73), 1 Expl. unter Stein, Ende August/Anfang September 2006, leg. FLECHTNER (t. HOFMANN). – Rodgau–Dudenhofen, Dudenhofener Düne (MA 94), 1 Expl. im Eingang eines Kaninchen-Baus, 29.9.2006, leg. HOFMANN.
HEYDEN (1904) kennt nur Funde von Frankfurt aus dem 19. Jahrhundert. SINGER (1955) nennt noch einen weiteren Fund von Hanau vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Deshalb stellt der Fund vom Rotbühl einen **Wiederfund nach über 100 Jahren**, der von der Dudenhofener Düne einen **Wiederfund nach fast auf den Tag genau 100 Jahren** (Hanau: 30.9.1906) dar! (3)
- Oreina alpestris* (SCHUMMEL): Sinntal–Neuengronau, Westerngrund (NA 46), 1 Expl. auf Blatt von *Angelica sylvestris* LINNAEUS (Wald-Engelwurz), 6.8.2006, leg. BRENNER.
- Timarcha tenebricosa* (FABRICIUS): Lorch, Lehrener Kopf (MA 14), 8 Expl. auf Wegen und auf *Galium* (Labkraut) gesehen, 1.5.2006, vid. KOCH. (3)
- Calomicrus circumfusus* (MARSHAM): Lorch, Lehrener Kopf (MA 14), 2 Expl. an *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH (Besenginster), 21.6.2006, leg. KOCH. (3)
- Longitarsus membranaceus* (FOUDRAS): Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 7 Expl. an *Teucrium scorodonia* LINNAEUS (Salbei-Gamander) an Waldrand, 22.4.2006, leg. HOFMANN.
- Longitarsus gracilis* KUTSCHERA: Lorch, Lorchhausen (MA 14), 6 Expl. an *Senecio inaequidens* DE CANDOLLE (Schmalblättriges Greiskraut), 6.10.2006, leg. KOCH. (3)

Longitarsus dorsalis (FABRICIUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. in Eklektor an Buchen-Stamm, 6.-30.4.2006, leg. BRENNER. – Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. auf Grundblatt von *Senecio* (Greiskraut), 22.4.2006, leg. KOCH. (2)

Longitarsus echii (KOCH): Darmstadt–Eberstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 71), 2 Expl. auf *Echium vulgare* LINNAEUS (Natternkopf) am Wegrand, 9.4.2006, leg. KOCH. (3)

Cassida seladonia GYLLENHAL: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Sandfläche, 8.4.2006; 8 Expl. an *Filago* (Filzkraut) und am Boden in dessen Umgebung, 4.6.2006; 1 Expl. an „Kamille“, 9.7.2006; 14 Expl. entwickelten sich aus Larven, die am 4.6.2006 eingetragen und an im Blumentopf wachsender *Filago* gehalten wurden, sie schlüpften alle noch während des Juni, leg. LANGE. Dieser Schildkäfer wurde in Deutschland nur sehr sporadisch nachgewiesen. Neben alten Funden aus Bayern, Hessen, vom Nordrhein, Westfalen und Schleswig-Holstein kennen KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) aktuelle Belege nur von Baden und Sachsen. Die Angabe für Hessen bezieht sich jedoch wohl auf HEYDEN (1904), der die Art für Mainz angibt, das heute jedoch zu Rheinland-Pfalz gehört. Deshalb ist die Art mit Nachweisen von vor über 100 Jahren **neu für die Fauna der Pfalz**; die Funde aus der Viernheimer Heide stellen einen **Neunachweis für Hessen** dar! (1)

Bruchidae

Bruchidius seminarius (LINNAEUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. in Eklektor an Buchen-Stamm, 30.6.-31.7.2006, leg. BRENNER. (3)

Anthribidae

Phaeochrotes cinctus (PAYKULL): Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 3.6.2006, leg. HOFMANN. (3)

Scolytidae

Kissophagus hederæ (SCHMITT): Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 12 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu), 22.4.2006, leg. HÖHNER und leg. HOFMANN (je 6 Expl.). (3)

Thamnurgus kaltenbachi (BACH): Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 1 Expl. an *Teucrium scorodonia* LINNAEUS (Salbei-Gamander) an Waldrand, 22.4.2006, leg. HOFMANN. – Lorch, Bodenthal (MA 14), 1 Expl. an *Teucrium scorodonia* auf Felssporn, 3.6.2006, leg. HOFMANN. (3)

Platypodidae

Platypus cylindrus (FABRICIUS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. auf Eiche an Holzlagerplatz, 27.6.2006, leg. HOFMANN. – Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 2 Expl. unter toter Rinde an Eichen-Stubben, 24.7.2006, leg. BRENNER. (3)

Curculionidae

Omiamima mollina (BOHEMAN): Frankfurt – Bonames (MA 75), 2 Expl. an *Cardamine hirsuta* LINNAEUS (Viermänniges Schaumkraut), 25.4.2006, leg. BRENNER.

Lixus angustatus (FABRICIUS): Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. an der Unterseite eines Blattes von *Arctium lappa* LINNAEUS (Große Klette),

- 3.8.2006, leg. LANGE. – Biebesheim, Rheinwiesen (MA 61), 2 Expl. an *Cirsium* (Kratzdistel) auf Hochwasserdamm, 14.5.2006, leg. KOCH. (3)
- Cyphocleonus dealbatus* (GMELIN): Lorch, Lehrener Kopf (MA 14), 1 Expl. von Weinbergsbrache gekäschert, 1.5.2006, leg. KOCH. (3)
- Magdalis rufa* GERMAR: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. an Kiefer, 9.7.2006, leg. LANGE. – Frankfurt, Schwanheimer Wald, Gateway Gardens (MA 74), 1 Expl. an Eichen-Ast, 23.8.2005, leg. BRENNER. (2)
- Sphenophorus striatopunctatus* (GOEZE): Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 3 Expl. auf Weg zwischen Weinbergsbrache und Eichen-Wald laufend, 22.4.2006, leg. HOFMANN, leg. KOCH und leg. LANGE (je 1 Expl.). – Großkrotzenburg bei Hanau, Krotzenburger Moor (MA 94), 1 Expl. auf Weg zwischen Feuchtgebiet und Acker, 3.5.2006, leg. HÖHNER. (2)
- Gasterocercus depressirostris* (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Wildbahn (MV 69), 10 Expl. abends an weitgehend abgestorbener Eiche im unteren Stammbereich, hier auch zahlreiche *Plagionotus detritus* (LINNAEUS), 14.6.2006, leg. LANGE. (1)
- Acalles dubius* SOLARI: Lorch, Bodenthal (MA 14), 7 Expl. an *Prunus mahaleb* LINNAEUS (Weichselkirsche), 3.6.2006, leg. HOFMANN (4 Expl.) und leg. LANGE (3 Expl.). (3)
- Baris fallax* (BRISOUT): Lorch, Lehrener Kopf (MA 14), 1 Expl. an *Isatis tinctoria* LINNAEUS (Färber-Waid), 3.5.2006, leg. KOCH. (3)
- Marmaropus besseri* GYLLENHAL: Darmstadt–Kranichstein, südlich der Haardt-Kolonie (MA 72), 2 Expl. auf Brache an Blättern von *Rumex thyrsiflorus* FINGERHUTH (Rispen-Ampfer) in Kopula, 21.5.2006, leg. KOCH. (3)
- Ceutorhynchus parvulus* BRISOUT: Lorch, Lehrener Kopf (MA 14), 2 Expl. von Vegetation gekäschert, 1.5.2006, leg. KOCH. (3)
- Ceutorhynchus cakilis* (HANSEN): Das bei BRENNER (2007) mitgeteilte Exemplar (Heringen (Werra) (NB 73), 1 Expl. an *Phragmites communis* LINNAEUS (Schilf), 29.6.2004, leg. HÖHNER) wurde inzwischen von Herrn SUKAT überprüft und als *Ceutorhynchus floralis* (PAYKULL) bestimmt. *Ceutorhynchus cakilis* ist damit für die hessische Fauna zu streichen.
- Cionus olens* (FABRICIUS): Viernheim, Viernheimer Heide (MA 69), 2 Expl. auf der Unterseite von *Verbascum*-Blättern (Königskerze), 1.10.2006, leg. KOCH. (3)

Literatur

- BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTKE & P. PRETSCHER (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenr. Landschaftspfl. Natursch., Bonn-Bad Godesberg, **55**: 3-434.
- BRECHTEL, F. & H. KOSTENBADER (2002): Die Pracht- und Hirschkäfer Baden-Württembergs. – Stuttgart (Eugen Ulmer).
- BRENNER, U. (1997): Bericht über die Exkursion der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen in die Viernheimer Heide am 17.6.1995. – Mitt. int. entomol. Ver. **22**(1/2): 21-37, Frankfurt
- BRENNER, U. (2001): Käferfunde der Jahre 1998 und 1999 aus Hessen. 10. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen. – Hess. faun. Briefe **20**(4): 53-65, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2003): Käferfunde des Jahres 2000 aus Hessen. – Hess. faun. Briefe **22**(3/4): 37-71, Darmstadt
- BRENNER, U. (2005): Käferfunde des Jahres 2001 aus Hessen. – Hess. faun. Briefe **24**(1): 1-19, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2007): Käferfunde der Jahre 2004 und 2005 aus Hessen. 14. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen. – Hess. faun. Briefe **25**(3-4): 45-74 (2006), Darmstadt.

- BÜCKING, H. (1930-32): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Erster Nachtrag zur II. Auflage des Hauptverzeichnisses von Lucas von HEYDEN (1904). – Entomol. Bl. **26**: 145-163; Entomol. Bl. **27**: 39-42, 83-89, 122-128, 174-183; Entomol. Bl. **28**: 73-80, 122-125, 167-170; Berlin.
- ELBERT, A. (1994): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Untermaingebiet zwischen Hanau und Würzburg. (2. Nachtrag zur Gebietsfauna von Dr. Karl Singer, 1955). – Mitt. naturwiss. Mus. Aschaffenburg **16**: 3-113, Aschaffenburg.
- HEYDEN, L. von (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – Frankfurt am Main.
- HORION, A. (1953): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 3: Malacodermata, Sternoxia (Elatерidae bis Throscidae). – München.
- HORION, A. (1955): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 4: Sternoxia (Buprestidae), Fossipedes, Macrodactylia, Brachymera. – Tutzing.
- HORION, A. (1958): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 6: Lamellicornia (Scarabaeidae - Lucanidae). – Überlingen.
- HORION, A. (1967): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 11: Staphylinidae, 3. Teil: Habrocerinae bis Aleocharinae (Ohne Subtribus Athetae). – Überlingen.
- HORION, A. (1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 12: Cerambycidae – Bockkäfer. – Überlingen.
- KLAUSNITZER, B. (1982): Die Hirschkäfer. – Die Neue Brehm-Bücherei, Bd. **551**, Wittenberg (Ziemsen).
- KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“. – Entomol. Nachr. Ber. **44**(1): 60-84, Dresden.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomol. Nachr. Ber., Beiheft **4**: 1-185, Dresden.
- MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz: Natur in Hessen).
- SCHAFFRATH, U. (2003): Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens (Coleoptera: Familienreihen Scarabaeoidea und Lucanoidea). – 47 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten: Natur in Hessen).
- SINGER, K. (1955): Die Käfer (Coleoptera). Beiträge zur Fauna des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts. – Mitt. Naturwiss. Mus. Stadt Aschaffenburg, N. F. Heft **7**: 1-272, Aschaffenburg.

Verfasser

Uli Brenner, Strauchweg 2, 36381 Schlüchtern

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: [Käferfunde des Jahres 2006 aus Hessen 15. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen 57-75](#)