

Käferfunde des Jahres 2007 aus Hessen

16. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen ¹⁾

ULI BRENNER

Summary

Faunistic records of 236 species of beetles are recorded from the state of Hesse (Germany). Of these 214 are dealt with as endangered species in the Red Book of Animals in Germany. Nine species are recorded as new to Hesse.

Zusammenfassung

Es werden 327 Fundmeldungen von 236 Arten aus 55 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen 19 Arten nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) als vom Ausstreben bedroht (1), 63 Arten als stark gefährdet (2) und 118 Arten als gefährdet (3) eingestuft werden. 13 weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste (V). Die Angabe „GD“ bei *Cicindela hybrida* LINNAEUS aus der hessischen Roten Liste von MALTEN (1998) bedeutet eine anzunehmende Gefährdung, wobei die Datenlage jedoch mangelhaft erscheint. Neun Arten werden als Neunachweise für Hessen angesehen: *Acrotrichis cognata* (MATTHEWS), *Brachygonus dubius* (PLATIA & CATE), *Agrilus ribesi* SCHAEFER, *Cyphon ruficeps* TOURNIER, *Trogoderma versicolor* (CREUTZER), *Cryptophagus nitidulus* MILLER, *Melanophthalma taurica* (MANNERHEIM), *Latheticus oryzae* WATERHOUSE und *Scolytus laevis* CHAPIN. Drei Arten stellen Wiederfunde in Hessen nach über 100 Jahren dar: *Scymnus subvillosus* (GOEZE), *Myrmexichenus subterraneus* (CHEVROLAT) und *Cryptocephalus marginatus* FABRICIUS. Drei Arten wurden nach mehr als 50 Jahren in Hessen wiedergefunden: *Hister funestus* ERICHSON, *Aphthona atrocaerulea* (STEPHENS) und *Omphalopion laevigatum* (PAYKULL).

Auch für diese Ausgabe der „Käferfunde“ sandten mir die hessischen Koleopterologen wieder die Ergebnisse ihrer Aufsammlungen zu, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Außerdem gehen in die Zusammenstellung auch die Resultate der vier gemeinschaftlichen Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen ein, die 2007 stattfanden. Diese Sammelausflüge gingen an die Hänge auf dem Nollig bei Lorch am Rhein (28.4.2007), in das Sandrasen- und Reliktwaldgebiet „Untere Wildbahn“ bei Lampertheim (19.5.2007), auf den Biedensand in der Rheinaue bei Lampertheim (14.7.2007) und an die Binnensalzstellen bei Heringen und Bad Hersfeld-Kathus (2.9.2007). Gewohnheitsgemäß gehen auch Fundmeldungen aus zum Teil länger zurückliegender Zeit wieder in diese Zusammenstellung ein.

Nach den Fundorten sind in Klammern die zugehörigen UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten die Gefährdungskategorien nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) (= RL D), bei abweichender Einstufung der Carabidae bzw. Scarabaeidae und Lucanidae zusätzlich auch nach den hessischen Roten Listen von MALTEN (1998) und SCHAFFRATH (2003) (= RL H), geklammert angegeben [(RL D)/(RL H)].

¹⁾15. Bericht in: Hess. faun. Briefe 26(4): 57-75, 2008 (2007)

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von Uli BRENNER (Schlüchtern), Hans-Joachim FLÜGEL (Knüllwald), Günter HOFMANN (Stockstadt), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Mathias KOCH (Darmstadt), Barbara und Klaus KÜRSCHNER (Darmstadt–Eberstadt), Roland KUNZ (Hadamar), Frank LANGE (Seeheim-Jugenheim), Rüdiger RUPP (Wetzlar), Andreas SCHMIDT (Wetzlar) und Wolfram SONDERMANN (Ludwigshafen).

Carabidae

- Cicindela hybrida* LINNAEUS: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf Sandboden, 19.5.2007, vid. HOFMANN. – Darmstadt–Eberstadt, Pfungstädter Düne (MA 71), ca 50 Expl. an einer Bahntrasse, vid. KÜRSCHNER. (-/GD)
- Calosoma inquisitor* (LINNAEUS): Lorch, Nollig (MA 14), 2 Expl. in der Laubstreu eines Eichen-Wäldchens, 28.4.2007, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. KÜRSCHNER (1 Expl.). (3)
- Carabus intricatus* LINNAEUS: Hanau, Neuwirtshaus (MA 95), 2 Expl. unter der Rinde eines Kiefern-Stamms, 15.12.2007, leg. HOFMANN. – Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 1 Expl. unter Kiefern-Rinde, 3.3.2007, leg. HÖHNER. – Flörsbachtal, Wiesbüttmoor (NA 25), 1 Expl. am Rand des Moors unter Rinde einer toten Buche, 7.7.2007, leg. BRENNER. (3)
- Carabus ullrichii* GERMAR: Gernsheim (MA 60), 1 Expl. unter Holzstück in Schilfbestand, 7.4.2007, leg. LANGE. (3)
- Leistus rufomarginatus* (DUFTSCHMID): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 6 Expl. unter Holzstück in Wald, 5.5.2007, leg. LANGE. (-/3)
- Notiophilus germiny* FAUVEL: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. unter Stein auf Sandboden, 21.9.2007, leg. LANGE. (3)
- Dyschirius intermedius* PUTZEYS: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. am sandigen Ufer eines überschwemmten Grabens, 14.7.2007, leg. KOCH. (3)
- Bembidion gilvipes* STURM: Heringen (Werra) (NB 73), 1 Expl. an Salzstelle am Boden, 2.9.2007, leg. HOFMANN. (V/-)
- Bembidion assimile* GYLLENHAL: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. am Ufer eines überschwemmten Grabens, 14.7.2007, leg. HOFMANN. (V/-)
- Bembidion aspericolle* (GERMAR): Bad Hersfeld–Kathus (NB 53), 12 Expl. an Salzstelle am Rand der Autobahn (A4), 2.9.2007, leg. HOFMANN (9 Expl.), leg. KOCH (3 Expl.). (2/1)
- Bembidion octomaculatum* (GOEZE): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 2 Expl. am Ufer eines überschwemmten Grabens, 14.7.2007, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.). (2/3)
- Bembidion guttula* (FABRICIUS): Gießen, Wieseckau (MB 70), 1 Expl. in Seggenried am Rand eines Grabens in Bodenfalle, 15.-22.6.2007, leg. SCHMIDT. – Heringen (Werra) (NB 73), 1 Expl. an Salzstelle am Boden, 2.9.2007, leg. HOFMANN. (V/-)
- Harpalus smaragdinus* (DUFTSCHMID): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. unter Blattrossette auf Sandboden, 19.5.2007, leg. HOFMANN. (-/V)
- Harpalus pumilus* STURM: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. unter Blattrossette auf Sandboden, 19.5.2007, leg. HOFMANN. – Darmstadt–Wixhausen, Rotbühl (MA 73), 2 Expl. unter Pflanzenrossette, 3.4.2007, leg. HOFMANN. – Babenhausen, In den Rödern (MA 93), 1 Expl. unter Jutesack auf Sandboden, 1.8.2007, leg. HOFMANN. (V/-)
- Harpalus serripes* (QUENSEL): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. in lockerem Sandboden, 19.5.2007, leg. HOFMANN. – Biebesheim

- (MA 51), 1 Expl. auf Dammweg am Rheinufer, 14.3.2007, leg. HOFMANN. – Darmstadt–Wixhausen, Rotbühl (MA 73), 2 Expl. unter Pflanzenrosette, 3.4.2007, leg. HOFMANN. (V/3)
- Poecilus lepidus* (LESKE): Babenhausen, In den Rödern (MA 93), 1 Expl. auf Sandboden, 24.9.2007, leg. HOFMANN. (V/3)
- Pterostichus diligens* (STURM): Hanau, Rote Lache in der Großen Bulau (MA 95), 2 Expl. an abgeschnittenem Horstgras, 15.12.2007, leg. HOFMANN. – Gießen, Wieseckau (MB 70), 1 Expl. in Seggenried am Rand eines Grabens in Bodenfalle, 15.-22.6.2007, leg. SCHMIDT. (V/-)
- Platynus livens* (GYLLENHAL): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. am Ufer eines überschwemmten Grabens, 14.7.2007, leg. HOFMANN. (3)
- Amara lucida* (DUFTSCHMID): Darmstadt–Wixhausen, Rotbühl (MA 73), 1 Expl. unter Pflanzenrosette, 3.4.2007, leg. HOFMANN. (V/3)
- Chlaenius nigricornis* (FABRICIUS): Gießen, Wieseckau (MB 70), je 1 Expl. in Hochstaudenflur am Rand des Wieseck-Ufers in Bodenfalle und in Seggenried am Rand eines Grabens in Bodenfalle, 15.-22.6.2007, leg. SCHMIDT. (V/3)
- Badister peltatus* (PANZER): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim (MA 71), 1 Expl. an Lichtfanggerät auf Balkon 25.5.2007, leg. LANGE. (2/3)
- Demetrias imperialis* (GERMAR): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. an Pappel, 14.7.2007, leg. KÜRSCHNER. (V/3)
- Cymindis humeralis* (GEOFFROY): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 2 Expl. unter Holzstück, 5.5.2007, leg. LANGE. (3)
- Philorhizus notatus* STEPHENS: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an Eichen-Zweig, 23.9.2007, leg. LANGE. (V)
- Philorhizus sigma* (ROSSI): Hadamar (MA 38), 2 Expl. im Genist am Ufer des Elbbachs, 3.4.2007, leg. KUNZ. (V/3)

Hydrophilidae

- Helophorus arvernicus* MULSANT: Spangenberg (NB 46), 1 Expl. auf einer Kiesbank, 29.4.2007, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER. Bislang war die Art erst einmal in Hessen, am Ufer der Fulda, gefunden worden (KÖHLER 2000). (2)
- Hydrochara caraboides* (LINNAEUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. in Wassergraben, 14.7.2007, leg. LANGE. (V)
- Hydrophilus piceus* (LINNAEUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Larve in überschwemmtem Graben, 14.7.2007, leg. SONDERMANN. (2)
- Berosus frontifoveatus* KUWERT: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 15 Expl. in schlammiger Pfütze auf Feldweg, 14.7.2007, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. LANGE (14 Expl.).

Histeridae

- Plegaderus dissectus* ERICHSON: Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 14 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche, 6.1.2007, leg. LANGE. (3)
- Abraeus parvulus* AUBÉ: Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 2 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche 6.1.2007, leg. LANGE. (2)
- Aeletes atomarius* (AUBÉ): Weiterstadt, Triesch (MA 62), 3 Expl. an Buchenstumpf unter aufliegendem Holzstück, 3.6.2007, leg. LANGE. – Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. in Laubwald fliegend, 19.5.2007, leg. LANGE. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 30 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche, 6.1.2007, leg. LANGE; am selben Fundort 2 Expl. in hohler Buche, 4.2.2007, leg. LANGE. (1)

Hister quadrimaculatus LINNAEUS: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf Sandboden, 19.5.2007, leg. HOFMANN. (3)

Hister funestus ERICHSON: Heringen (Werra), Rohrlache (NB 73), 1 Expl. in Bodenfalle auf Salzboden, 11.5.-7.6.2006, leg. FLÜGEL. HEYDEN (1904) kennt hessische Funde aus dem 19. Jahrhundert von Rüdesheim (Niederwald) und Weilburg. Weitere alte Funde von Falkenstein, Sinn-Fleisbach, Wiesbaden-Dotzheim und Wiesbaden-Eiserne Hand nennen HORION (1949) und BÜCKING (1930-32). Der jüngste dieser Nachweise (Eiserne Hand) stammt dabei aus dem Jahr 1915. Deshalb stellt der Fund von Heringen einen **Wiederfund in Hessen nach über 90 Jahren** dar! In unmittelbarer Nähe Hessens wurde die Art 1961 bei Kahl in Unterfranken (Bayern) nachgewiesen (ELBERT 1994). In der Datenbank zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) wird als Quelle für einen hessischen Fund DEHNERT (1970) genannt. Dort kann ich jedoch keinen Eintrag für diese Art finden.

Hetaerius ferrugineus (OLIVIER): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. unter Holzstück bei *Formica* (kleine Schuppenameise), 5.5.2007, leg. LANGE. (3)

Cholevidae

Choleva spadicea (STURM): Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 2 Expl. in faulem liegenden Buchen-Stamm (Copula), 24.11.2007, leg. HOFMANN. (3)

Scydmaenidae

Scydmaenus perrisii REITTER: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 2 Expl. in Weiden-Mulm bei *Lasius brunneus* (LATREILLE) (Braune Holzameise), 14.7.2007, leg. HOFMANN. – Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. in hohler Eiche bei *Lasius* (Holzameise), 19.5.2007, leg. LANGE. (2)

Ptiliidae

Acrotrichis cognata (MATTHEWS): Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. in altem *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) an Eiche, 11.2.2007, leg. KUNZ. Der winzige Käfer war früher nur aus Fennoskandien und Großbritannien bekannt, breitet sich jedoch seit etwa 20 Jahren immer mehr nach Süden aus (KÖHLER 1998). Nachdem die Art in Dänemark und den Niederlanden auftauchte, wurden auch Funde aus Niedersachsen, Westfalen und der gesamten Rheinprovinz bekannt (KÖHLER 1998). KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) nennen Nachweise vom Nordrhein, aus Westfalen und dem Niederelbegebiet. Da bislang kein Fund dieser Art aus Hessen bekannt geworden ist, stellt das Exemplar aus Hadamar einen **Neunachweis für Hessen** dar! (3)

Staphylinidae

Scaphium immaculatum (OLIVIER): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. unter Holzstück, 5.5.2007, leg. LANGE. (3)

Scaphisoma balcanicum TAMANUKI: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf verpilztem Ast, 19.5.2007, leg. HÖHNER. (3)

Thoracophorus corticinus MOTSCHULSKY: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 3 Expl. in hohler Eiche bei *Lasius* (Holzameise), 2.6.2007, leg. LANGE. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 24 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche 6.1.2007, leg. LANGE. (1)

Phyllocrepa melanocephala (FABRICIUS): Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche, 11.11.2007, leg. LANGE. (3)

- Carpelimus nitidus* (BAUDI): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. am Ufer eines überschwemmten Grabens, 14.7.2007, leg. HÖHNER. (3)
- Bleidius tricornis* (HERBST): Bad Hersfeld-Kathus (NB 53), 2 Expl. an Salzstelle in feuchtem Rohboden am Rand der Autobahn (A4), 2.9.2007, leg. HOFMANN. – Heringen (Werra) (NB 73), 5 Expl. an Salzstelle in feuchtem Rohboden, 2.9.2007, leg. HOFMANN. (3)
- Hypnogyra angularis* (GANGLBAUER): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. in Weiden-Mulm, 14.7.2007, leg. HOFMANN. – Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. in trockenem Eichen-Mulm mit *Lasius* (Holzameise), 19.5.2007, leg. LANGE. (3)
- Quedius truncicola* FAIRMAIRE & LABOULBÈNE: Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. in hohler Buche 4.2.2007, leg. LANGE. (3)
- Quedius brevicornis* THOMSON: Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. in Vogelnest in hohler Buche, 12.5.2007, leg. KUNZ. (3)
- Quedius plagiatus* MANNERHEIM: Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. unter Stein in Hausgarten, 16.5.2007, leg. KUNZ. (3)
- Tachyporus formosus* MATTHEWS: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. am Ufer eines überschwemmten Grabens, 14.7.2007, leg. HOFMANN. (3)
- Myllaena gracilis* (MATTHEWS): Hanau, Rote Lache in der Großen Bulau (MA 95), 2 Expl. an abgeschnittenem Horstgras, 15.12.2007, leg. HOFMANN. (3)
- Agaricochara latissima* (STEPHENS): Mühlheim, Gailenberg (MA 95), 1 Expl. aus *Daedaleopsis confragosa* (BOLTON ex FRIES) SCHROETER (Rötende Tramete) an Weide, 26.3.2007, leg. HOFMANN. (3)
- Haploglossa nidicola* (FAIRMAIRE): Babenhausen (MA 93), 2 Expl. an *Chenopodium* (Gänsefuß), 21.7.2007, leg. HÖHNER. (3)
- Aleochara lata* GRAVENHORST: Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 1 Expl. an totem Fuchs, 14.4.2007, leg. HÖHNER. (3)

Lampyridae

- Phosphaenus hemipterus* (GOEZE): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim, im Ort (MA 71), 1 Expl. auf Gehweg, 5.6.2007, leg. LANGE. – Gießen, Wieseckau (MB 70), 14 Expl. in Hochstaudenflur am Wieseck-Ufer in Bodenfalle, 15.-22.6.2007, leg. SCHMIDT. (3)

Cantharidae

- Ancistronycha cyanipennis* (FALDERMANN): Knüllwald–Hergetsfeld (NB 34), 1 Expl. nachts am Licht auf Feuchtwiese mit Bach, 7.6.2007, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER.

Malachiidae

- Hypebaeus flavipes* (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf verpilztem Ast, 19.5.2007, leg. HÖHNER. (3)
- Malachius scutellaris* ERICHSON: Wetzlar, Lahnaue (MB 60), 1 Expl. an *Crataegus* (Weißdorn), 5.5.2007, leg. RUPP. (3)
- Clanoptilus elegans* (OLIVIER): Bad Nauheim–Wisselsheim, Löwental (MA 88), 1 Larve in Apfelbaum, 15.3.2007, die Imago schlüpfte im Mai 2007, leg. RUPP. – Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Larve in Eichen-Mulm, 20.3.2007, der fertige Käfer schlüpfte im Mai 2007, leg. RUPP. (3)

Cleridae

- Tilloidea unifasciata* (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 5 Expl. auf verpilzten Eichen-Ästen am Boden, 19.5.2007, leg. HOFMANN

- (2 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.), leg. LANGE (2 Expl.); am gleichen Fundort 1 Expl. an kürzlich umgestürzter Eiche, 25.5.2007, leg. LANGE. – Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. auf verpilztem Eichen-Ast, 2.6.2007, leg. HÖHNER. (2)
- Trichodes alvearius* (FABRICIUS): Hadamar (MA 38), 1 Expl. an totem Apfelbaum, 23.5.2007, leg. KUNZ. – Wetzlar, Lahnaue (MB 60), 1 Expl. von *Rosa canina* LINNAEUS (Hunds-Rose) gekäschert, 5.5.2007, leg. RUPP. (3)

Trogoxetidae

- Tenebroides fuscus* (GOEZE): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. unter der trockenen Rinde einer toten Buche, 3.3.2007, leg. LANGE. – Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. in Buchen-Mulm, 19.5.2007, leg. RUPP. – Lauterbach–Blitzenrod (NB 20), 2 Expl. unter der Rinde einer Buche auf Huteweide, 3.6.2007, leg. RUPP. (2)

Lymexylidae

- Lymexylon navale* (LINNAEUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. auf der Schnittfläche eines liegenden Eichen-Stamms, 19.5.2007, leg. HOFMANN. (3)

Elateridae

- Ampedus sinuatus* GERMAR: Bickenbach, Nähe Kaiserstein (MA 71), 1 Expl. an Baumstamm sitzend, 13.4.2007, leg. LANGE. (2)
- Ampedus cardinalis* (SCHIOEDTE): Biebergemünd (NA 25), 1 Larve in rotfaulem Eichen-Holz, 1.5.2007, die Imago schlüpfte im August 2008, leg. RUPP. (1)
- Ampedus nigerrimus* (LACORDAIRE): Biebergemünd (NA 25), mehrere Larven in rotfaulem Eichen-Holz, 1.5.2007, im Juli und August 2008 schlüpfen 1 Männchen und 5 Weibchen, leg. RUPP. (3)
- Ampedus cinnabarinus* (ESCHSCHOLTZ): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. in weißfaulem Eichen-Holz, 19.5.2007, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. RUPP (1 Expl.). (3)
- Ampedus quercicola* (BUYSSON): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. in Laubwald, 19.5.2007, leg. LANGE. (3)
- Ampedus nigroflavus* (GOEZE): Wetzlar, Weinberg (MB 60), je 1 Expl. am 2., 17. und 18.4.2007 in Apfelbaum, leg. RUPP. – Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Larve in Weide, 14.7.2007, die Imago schlüpfte im September 2008, leg. RUPP. – Wetzlar, Lahnaue (MB 60), 2 Larven in Weide, 1.4.2007, die fertigen Käfer schlüpfen im August 2008, leg. RUPP. (3)
- Ampedus elongatulus* (FABRICIUS): Wetzlar, Weinberg (MB 60), je 1 Expl. in Apfelbaum und Buche, 18.4.2007, leg. RUPP. – Wetzlar, Kalsmunt (MB 60), 4 Expl. in Apfelbaum und Kiefer, 12.3.2007, leg. RUPP. – Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 4 Expl. auf Kiefern-Ast, 19.5.2007; leg. RUPP. (3)
- Brachygonus megerlei* (LACORDAIRE): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 2 tote Expl. im Höhlenmulm einer vom Sturm Kyrill geworfenen Eiche, 20.3.2007, leg. RUPP. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche, 6.1.2007, leg. LANGE. (2)
- Brachygonus dubius* (PLATIA & CATE): Im seinem Nachtrag zur Elateridenfauna des Vogelsberges hatte RUPP (1976) *Brachygonus megerlei* (LACORDAIRE) (dort *Elater megerlei* LAC.) von Lauterbach gemeldet sowie Larven aus dem Groß-Gerauer Wald. Diese Meldung ist zu korrigieren (RUPP in litt. 2009): Bei den Tieren aus dem Vogelsberg handelt es sich um den erst 1990 beschriebenen

- Brachygonus dubius*. Hier noch einmal die Funddaten: Lauterbach, Hainich (NB 20), 2 Männchen am 30.4.1974 sowie zahlreiche Larven im rotfaulen Mulm mehrerer Eichen am 5.4.1974, leg. RUPP. Bis August 1976 hatte sich eine der Larven zur Imago (ebenfalls ein Männchen) entwickelt. Die Zucht der anderen Larven verlief nicht erfolgreich. Über die Verbreitung dieses Schnellkäfers ist noch nicht viel bekannt. KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) kennen Nachweise aus Baden, Württemberg, dem Saarland und Sachsen. Aus Hessen lagen bislang keine Meldungen vor, weshalb der Fund von Lauterbach einen **Neunachweis für Hessen** darstellt! (1)
- Megapenthes lugens* (REDTENBACHER): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch (MA 63), 1 Larve in den Bohrspänen einer Cerambyciden-Larve in Rosskastanie, 20.4.1976, die Imago schlüpfte im Juli 1976, leg. RUPP. Die Kastanien hinter der Mönchbruch-Mühle sind mittlerweile alle gefällt. – Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 2 Expl. an den Bohrspänen von *Megopis scabricornis* (SCOPOLI) im Inneren einer Esche, 20.3.2007. Der stattliche Baum von gut einem Meter Stammdurchmesser war vom Sturm Kyrill in etwa 3 Metern Höhe abgedreht worden, da der größte Teil des Kernholzes von *Megopis*-Larven zerfressen war; die Parkverwaltung hat Reste des Baumes in einem abgesperrten Teil des Parks gesichert, wie dies auch früher schon in vergleichbaren Fällen geschehen war (mdl. Mitteilung E. SCHWARZ, Parkverwaltung); 1 weiteres Expl. unter Rindenschuppe am Höhleneingang einer Rosskastanie (ebenfalls Brutbaum von *Megopis*), 13.4.2007, leg. RUPP. (1)
- Procaerus tibialis* (LACORDAIRE): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 3 Expl. an den Bohrspänen von *Megopis scabricornis* (SCOPOLI) im Inneren einer Esche, 20.3.2007; 1 Imago und 1 Larve im Höhlenmulm einer vom Sturm Kyrill geworfenen Eiche, 20.3.2007, der aus der Larve gezogene Käfer schlüpfte im August 2007; 1 weiteres Expl. in einer gefällten Kastanie, 5.11.2007, leg. RUPP. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche, 6.1.2007, leg. LANGE. – Wetzlar, Weinberg (MB 60), 1 Expl. im festen Totholz eines Buchen-Stamms, 17.4.2007; 1 Imago und 2 Larven im Faulholz einer gestürzten Buche, 18.4.2007, die aus den Larven gezogenen Käfer schlüpfen im August 2007; 1 Imago und 1 Larve im Inneren abgebrochener Apfelbaum-Äste, 2.4.2007, der aus der Larve gezogene Käfer schlüpfte im August 2007, leg. RUPP. – Bad Nauheim–Wisselsheim, Löwental (MA 88), 1 Imago und 1 Larve im Wandholz einer Apfelbaum-Höhle, 15.3.2007, die aus der Larve gezogene Imago schlüpfte im August 2007, leg. RUPP. (2)
- Elater ferrugineus* LINNAEUS: Bad Nauheim–Wisselsheim, Löwental (MA 88), 4 Puppen im Mulm einer Apfelbaum-Höhle, 23.4.1974, die Käfer schlüpfen im Juni 1974, leg. RUPP; mehrere Larven im Mulm einer (anderen) Apfelbaum-Höhle, 15.3.2007, vid. RUPP. Der Brutbaum von 1974 ist verschwunden, vermutlich ist das Vorkommen derzeit nicht auf einen Baum beschränkt. (2)
- Agriotes sordidus* (ILLIGER): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. unter auf dem Boden aufliegendem *Verbascum*-Blatt (Königskerze), 3.4.2007, leg. LANGE. (2)
- Hypoganus inunctus* (LACORDAIRE): Biebergemünd (NA 25), 1 Larve im trockenen Holz unter Eichen-Rinde, 1.5.2007, die Imago schlüpfte im August 2008, leg. RUPP. (3)
- Denticollis rubens* PILLER & MITTERPACHER: Nidda–Ober-Lais (NA 08), 1 Expl. unter Buchen-Rinde, 26.4.2007, leg. RUPP. (2)
- Limoniscus violaceus* (MÜLLER): Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 2 Expl. im Mulm einer hohlen Altbuche, 24.11.2007, leg. HOFMANN. (1)

- Cardiophorus gramineus* (SCOPOLI): Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. im Mulm einer hohlen Altbuche, 24.11.2007, leg. HOFMANN; am gleichen Baum 1 Expl. in der Puppenwiege in Holzstück, 24.11.2007, leg. LANGE. (2)
- Cardiophorus ruficollis* (LINNAEUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 3 Expl. auf dürrem Ast, auf verpilztem Ast und unter der Rinde einer aus dem Boden gerissenen Eichen-Wurzel, 19.5.2007, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.) und leg. RUPP (1 Expl.); am selben Fundort zur gleichen Zeit 1 Larve an der Eichen-Wurzel, der Käfer schlüpfte im August 2007, leg. RUPP. (3)
- Cardiophorus atramentarius* ERICHSON: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 2 Expl. unter der trockenen Rinde einer toten Buche, 3.3.2007, leg. LANGE. – Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. auf dürrem Ast und auf Gras unter Kiefern, 19.5.2007, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. RUPP (1 Expl.); am selben Fundort 1 Expl. unter Kiefern-Rinde, 19.11.2007, leg. LANGE. – Weiterstadt, Triesch (MA 62), 1 Expl. auf Doldenblüte, 3.6.2007, leg. LANGE. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 3 Expl. unter trockener Buchen-Rinde, 4.2.2007, leg. LANGE. (2)

Eucnemidae

- Isorhipis melasoides* (CASTELNAU): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), zahlreiche Expl. beim Verlassen des Brutbaums (Buche) beobachtet, 5 Expl. wurden mitgenommen, 19.5.2007, leg. RUPP. – Laubach, Laubacher Wald (NA 09), 2 tote Expl. in Buche, 26.10.1972, leg. RUPP. – Schotten–Eschenrod, Glauberg (NA 19), 1 Expl. auf Vegetation am Wegesrand, 6.6.1973, leg. RUPP. (2)
- Dirhagus pygmaeus* (FABRICIUS): Hadamar (MA 38), 1 Expl. an alter Linde, 3.6.2007, leg. KUNZ. (3)
- Dirhagus lepidus* (ROSENHAUER): Hadamar (MA 38), 1 Expl. an Esche, 23.5.2007, leg. KUNZ. (3)
- Hyllis olexai* PALM: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 8 Expl. auf liegendem Pappel-Stamm, die Käfer kamen aus den Bohrlöchern, in denen sie auch immer wieder verschwanden, 14.7.2007, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. KÜRSCHNER (1 Expl.), leg. LANGE (5 Expl.). (3)

Buprestidae

- Anthaxia mendizabali* COBOS: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH (Besenginster), 19.5.2007, leg. HOFMANN. (2)
- Anthaxia similis* SAUNDERS: Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. auf gelber Blüte in Kiefernwald, 25.4.2007, leg. LANGE. (3)
- Coraeus undatus* (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf dickerem Ast einer umgestürzten Eiche, 25.5.2007, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim–Jugenheim, Heiligenberg (MA 71), 1 Expl. auf Brombeerblatt in Laubwald mit alten Eichen, 24.6.2007, leg. LANGE. (2)
- Agrilus ater* (LINNAEUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf liegendem Pappel-Stamm, 14.7.2007, leg. LANGE. (2)
- Agrilus ribesi* SCHAEFER: Seeheim-Jugenheim–Jugenheim, Landesstraße nach Alsbach (MA 71), 2 Expl. an *Ribes*-Gebüsch (Johannisbeer-Ziergehölz) neben Radweg, 3.6.2007, leg. LANGE. KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) kennen deutsche Nachweise aus Baden, Württemberg und dem Rheinland, KÖHLER (2000) zusätzlich aus der Pfalz und Brandenburg. NIEHUIS (2004) kennt darüber hinaus

Funde aus Bayern und Berlin. ESSER (2006 a, b) berichtet von neuen Nachweisen aus Thüringen und Sachsen. In Hessen wurde die Art meines Wissens bislang nicht nachgewiesen, weshalb der Fund von Jugenheim einen **Neunachweis für Hessen** darstellt! (3)

Agrilus hyperici (CREUTZER): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 2 Expl. an *Hypericum perforatum* LINNAEUS (Tüpfel-Johanniskraut) auf Wiese, 14.7.2007, leg. LANGE (1 Expl.), leg. KÜRSCHNER (1 Expl.). – Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. an *Hypericum perforatum*, 16.6.2007, leg. HÖHNER. (3)

Agrilus cinctus (OLIVIER): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH (Besenginster), 19.5.2007, leg. HÖHNER; am selben Fundort 1 Expl. an *Sarothamnus scoparius*, 7.7.2007, leg. LANGE. (2)

Trachys fragariae BRISOUT: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf Weiden-Zweig, 14.7.2007, leg. RUPP. (3)

Scirtidae

Cyphon ruficeps TOURNIER: Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. an Weide am Ufer eines Teichs, 10.6.2007, leg. KUNZ. Die Art ist aus fast allen Teilen Deutschlands bekannt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Aus Hessen war bislang jedoch kein Fund zu verzeichnen, weshalb das Exemplar von Hadamar einen **Neunachweis für Hessen** darstellt! (3)

Dermestidae

Trogoderma versicolor (CREUTZER): Darmstadt–Eberstadt, Prinzenberg (MA 72), 1 Expl. auf Trockenrasen, 5.6.1966, leg. KÜRSCHNER. Aus Deutschland liegen neuere Nachweise (seit 1950) nur aus Bayern, der Pfalz und vom Nordrhein, ältere auch aus Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt vor (KÖHLER 2000, KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Aus Hessen wurde mir bislang kein Fund bekannt, weshalb das Tier vom Prinzenberg einen **Neunachweis für Hessen** darstellt!

Globicornis nigripes (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an blühendem *Cornus* (Hartriegel), 19.5.2007, leg. HOFMANN. (3)

Megatoma undata (LINNAEUS): Nidda–Ober-Lais (NA 08), 1 Larve unter Buchen-Rinde, 26.4.2007, die Imago schlüpfte im August 2007, leg. RUPP. (3)

Trinodes hirtus (FABRICIUS): Hadamar (MA 38), 1 Expl. in hohlem Apfelbaum, 23.5.2007, leg. KUNZ. (3)

Byrrhidae

Curimopsis paleata (ERICHSON): Heringen (Werra) (NB 73), 1 Expl. in Bodenfalle auf Salzboden, 11.5.-7.6.2006, leg. FLÜGEL. (2)

Bothrideridae

Teredus cylindricus (OLIVIER): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. in der Blitzrinne einer Eiche, 14.7.2007, leg. RUPP. (1)

Oxytaemus cylindricus (PANZER): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. in trockenem Eichen-Mulm mit *Lasius* (Holzameise), 19.5.2007, leg. HOFMANN. (1)

Cerylonidae

Cerylon deplanatum GYLLENHAL: Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche (nicht an Pappel wie gewöhnlich!), 6.1.2007, leg. LANGE. (3)

Kateretidae

Brachyterolus vestitus KIESENWETTER: Waldsolms–Kraftsolms (MA 68), 11 Expl. an *Antirrhinum* (Löwenmaul) in Hausgarten, 11.5.2007, leg. KUNZ.

Erotyliidae

Triplax lepida (FALDERMANN): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 7 Expl. an *Polyporus* (Porling) auf am Boden liegendem Buchen-Ast (4 Expl.), auf am Boden liegendem Eichen-Ast (1 Expl.) und an Buchen-Stamm (2 Expl.), 19.5.2007, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.), leg. LANGE (2 Expl.), leg. RUPP (2 Expl.). (2)

Triplax rufipes (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an Baumpilz an Buche, 19.5.2007, leg. HÖHNER. (1)

Cryptophagidae

Pteryngium crenatum (FABRICIUS): Flörsbachtal–Flörsbach, Wiesbütsee (NA 25), 5 Expl. an *Fomitopsis pinicola* (SWARTZ ex FRIES) KARSTEN (Rotrandiger Baumschwamm), 11.8.2007, leg. HÖHNER. (3)

Cryptophagus labilis ERICHSON: Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 2 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche, 6.1.2007, leg. LANGE. (2)

Cryptophagus nitidulus MILLER: Darmstadt–Eberstadt, Kühler Grund mit Waldmühle (MA 71), 1 Expl. in Laubansammlung unter dünnen Zweigen einer gefällten Buche, 14.10.2007, leg. LANGE, det. ESSER. Dieser kleine Schimmelkäfer, der aus Südosteuropa nach Mitteleuropa einstrahlt, gehört zu den ganz großen Seltenheiten der deutschen Käferfauna. KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) kennen alte Nachweise nur aus Thüringen und Sachsen. JUNG (2001) verzeichnet die Art auch für Sachsen-Anhalt. Der Fund von Eberstadt stellt damit einen **Neunachweis für Hessen** dar! Der von HORION (1960) wegen seiner Isoliertheit angezweifelte Nachweis aus der Pfalz gewinnt mit diesem Fund vielleicht doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit. (2)

Atomaria zetterstedti (ZETTERSTEDT): Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. an Weide, 1.6.2007, leg. KUNZ. (3)

Languriidae

Cryptophilus integer (HEER): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim (MA 71), 1 Expl. in Komposthaufen, 2.6.2007, leg. LANGE.

Phalacridae

Phalacrus fimetarius (FABRICIUS): Lorch, Nollig (MA 14), 12 Expl. auf Brache mit viel Färber-Waid (*Isatis tinctoria* LINNAEUS), 28.4.2007, leg. HOFMANN (6 Expl.), leg. LANGE (6 Expl.). (3)

Laemophloeidae

Laemophloeus monilis (FABRICIUS): Büttelborn (MA 62), 1 Expl. an am Boden liegendem Buchen-Ast, 13.10.2007, leg. LANGE. (3)

Cryptolestes spartii (CURTIS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH (Besenginster), 19.5.2007, leg. HOFMANN. (3)

Lathropus sepicola (MÜLLER): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 2 Expl. unter der Rinde eines toten Ahorns, 14.7.2007, leg. LANGE. – Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. auf verpilztem Eichen-Ast, 2.6.2007, leg. HÖHNER. (2)

Latridiidae

Melanophthalma taurica (MANNERHEIM): Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. auf Apfelbaum-Ast, 15.4.2007, leg. KUNZ. Der kleine Schimmelkäfer ist in Südeuropa und Nordafrika weit verbreitet (LOHSE 1978). Aus dem südlichen Mitteleuropa liegen Funde aus dem Burgenland sowie aus Böhmen und Mähren vor (RÜCKER 1998). Aus Deutschland war bislang nur ein Nachweis aus dem Niederelbegebiet aus dem Jahr 1953 bekannt geworden (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, LOHSE 1978), weshalb der Fund aus Hadamar einen **Neunachweis für Hessen** und gleichzeitig einen **Wiederfund in Deutschland nach über 50 Jahren** darstellt! (2)

Mycetophagidae

Litargus balteatus LÉCONTE: Hadamar (MA 38), 1 Expl. in Komposthaufen auf einer Streuobstwiese, 13.2.2007, leg. KUNZ.

Mycetophagus piceus (FABRICIUS): Wetzlar, Nähe Ruine Kalsmunt (MB 60), 1 Expl. in Hausgarten fliegend, 15.4.2007, leg. RUPP. (3)

Mycetophagus salicis BRISOUT: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden Pappel-Stamms neben *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm), 14.7.2007, leg. LANGE. (2)

Berginus tamarisci WOLLASTON: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf Gebüsch in Mischwald, 11.3.2007, leg. LANGE. – Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. auf verpilztem Eichen-Ast, 2.6.2007, leg. HÖHNER.

Colydiidae

Pycnomerus terebrans (OLIVIER): Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 3 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche, 6.1.2007, leg. LANGE. (1)

Cicones undatus (GUERIN): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf dürrer Ast, 14.7.2007, leg. LANGE. – Pfungstadt, Wald zwischen Pfungstadt und Seeheim (östlich der A5) (MA 71), 5 Expl. unter der Rinde eines toten Bergahorns, 24.3.2007, leg. LANGE. (3)

Colydium elongatum (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. unter Buchen-Rinde, 19.5.2007, leg. RUPP. (3)

Aulonium trisulcum (FOURCROY): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. am Stamm einer abgestorbenen Ulme, 18.5.2007, leg. LANGE. (2)

Corylophidae

Arthrolips obscura (SAHLBERG): Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 4 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche, 6.1.2007, leg. LANGE. (2)

Endomychidae

Symbiotes latus REDTENBACHER: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf dürrer Ast, 14.7.2007, leg. HOFMANN. (2)

Symbiotes gibberosus (LUCAS): Pfungstadt, Wald zwischen Pfungstadt und Seeheim (östlich A5) (MA 71), 1 Expl. unter der Rinde eines toten Bergahorns, 24.3.2007, leg. LANGE. – Wetzlar, Weinberg (MB 60), 1 Expl. in Apfelbaum-Höhle, 2.4.2007, leg. RUPP. (2)

Mycetina cruciata (SCHALLER): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf morschem verpilztem Holz, 19.5.2007, leg. HOFMANN. – Büttelborn (MA 62), 1 Expl. an am Boden liegendem Buchen-Ast, 9.9.2007, leg. LANGE. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. in Buchen-Mischwald fliegend, 25.4.2007, leg. KOCH. (3)

Coccinellidae

- Scymnus apetzii* MULSANT: Lorch, Nollig (MA 14), 2 Expl. auf Vegetation an Wegesrand, 28.4.2007, leg. HOFMANN. (1)
- Scymnus subvillosus* (GOEZE): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf Vegetation auf der Böschung eines Hochwasserdammes, 14.7.2007. leg. HÖHNER. Diese wärmeliebende Art konnte in Deutschland nur an wenigen Stellen nachgewiesen werden. KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) nennen aktuelle Funde (nach 1950) aus Baden, der Pfalz und dem Rheinland sowie aus Brandenburg und Sachsen. Aus Hessen liegt nur ein alter Nachweis aus dem 19. Jahrhundert von Frankfurt vor (HEYDEN 1904), weshalb das Exemplar von Lampertheim einen **Wiederfund in Hessen nach über 100 Jahren** darstellt! (2)
- Hyperaspis reppensis* (HERBST): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. von Gebüsch aus *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH (Besenginster) und jungen Kiefern geklopft, 19.5.2007, leg. LANGE. (3)
- Coccinella magnifica* REDTENBACHER: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. in der Nähe eines Ameisenhaufens (*Formica*), 11.3.2007, leg. LANGE; am gleichen Fundort 2 Expl. an kleiner Kiefer neben Ameisenhaufen (*Formica*), 25.3.2007, leg. LANGE; am gleichen Fundort 1 Expl. an *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH (Besenginster) (weitere Expl. wurden gesehen), 19.5.2007, leg. HOFMANN; am gleichen Fundort 4 Expl. an junger Kiefer neben Ameisenhaufen (*Formica*), 19.5.2007, leg. LANGE; am gleichen Fundort noch einmal 2 Expl. auf Gebüsch (davon 1 Expl. an Zitter-Pappel) an Wegesrand in Kiefern-Wald, 25.5.2007, leg. LANGE. (3)
- Halyzia sedecimguttata* (LINNAEUS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf dürrer Ast, 14.7.2007, leg. HOFMANN. (3)

Cisidae

- Ropalodontus perforatus* (GYLLENHAL): Biebesheim, Rheinufer (MA 61), 10 Expl. in hartem noch nicht zu altem *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm), 14.3.2007, leg. HOFMANN. (3)
- Orthocis pygmaeus* (MARSHAM): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf dürrer Eichen-Ast, 19.5.2007, leg. HOFMANN. (3)

Lyctidae

- Lyctus brunneus* (STEPHENS): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation an Wegesrand, 28.4.2007, leg. KÜRSCHNER.

Bostrichidae

- Rhyzopertha dominica* (FABRICIUS): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim (MA 71), 1 Expl. in Garten fliegend, 19.6.2007, leg. LANGE.
- Bostrichus capucinus* (LINNAEUS): Lorch, Nollig (MA 14), 6 Expl. an Rebenreisig auf Weinberg, 28.4.2007, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. KÜRSCHNER (2 Expl.), leg. LANGE (2 Expl.), leg. RUPP (1 Expl.). (3)
- Xylopertha retusa* (OLIVIER): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 12 Expl. auf verpilzten Eichen-Ästen am Boden, 19.5.2007, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.), leg. LANGE (9 Expl.). (3)

Anobiidae

- Hedobia regalis* (DUFTSCHMIDT): Frankfurt, Berger Hang (MA 85), 1 Expl. an *Juglans regia* LINNAEUS (Walnuss), 14.4.2007, leg. HÖHNER. Es ist erfreulich, dass sich die seltene Art am Berger Hang seit mindestens 24 Jahren halten konnte (siehe BATHON 1985). (2)

- Oligomerus brunneus* (OLIVIER): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 2 Larven im Höhlenmulm einer vom Sturm Kyrill geworfenen Eiche, 20.3.2007, die Imagines schlüpften im Juni 2007, leg. RUPP. – Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. auf verpilztem Eichen-Ast, 2.6.2007, leg. HÖHNER. (3)
- Gastrallus laevigatus* (OLIVIER): Gernsheim, Gernsheimer Wald (MA 61), 4 Expl. an Zweigen eines toten Laubbaums, 24.6.2007, leg. LANGE. (2)
- Dorcatoma chrysomelina* STURM: Wetzlar, Weinberg (MB 60), 5 Larven in Pilzresten in einer hohlen Eiche, 17.4.2007, die Imagines schlüpften im Mai 2007, leg. RUPP. – Wetzlar, Nähe Kalsmunt (MB 60), 1 Larve im Mulm eines Pflaumenbaums, 16.6.2007, der Käfer schlüpfte im Mai 2007, leg. RUPP. (3)
- Dorcatoma dresdensis* HERBST: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. in *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm), 19.5.2007, leg. RUPP. (3)

Ptinidae

- Ptinus sexpunctatus* PANZER: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. unter der Rinde einer toten Kiefer, 3.3.2007, leg. LANGE. (3)

Scaptiidae

- Scaptia fuscula* MÜLLER: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf dürrem Ast, 14.7.2007, leg. HOFMANN. – Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. an Zweigen einer frisch umgestürzten Eiche, 7.7.2007, leg. LANGE. – Hadamar (MA 38), 1 Expl. unter Apfelbaum-Rinde, 3.6.2007, leg. KUNZ. (3)

Anthicidae

- Omonadus bifasciatus* (ROSSI): Hadamar (MA 38), 3 Expl. in Komposthaufen auf einer Streuobstwiese, 13.2.2007, leg. KUNZ. (2)

Ripiphoridae

- Metoecus paradoxus* (LINNAEUS): Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), je 1 Expl. neben Nest von *Vespula vulgaris* LINNAEUS (Gemeine Wespe) in Hausgarten, 13.8.2007 und 18.10.2007, leg. BRENNER. (3)

Mordellidae

- Mordella leucaspis* KÜSTER: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. auf Umbelliferen-Blüte (Doldengewächs), 19.5.2007, leg. HOFMANN. (3)
- Curtimorda maculosa* (NAEZEN): Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. an verpilztem Fichten-Stubben in Hausgarten, 2.7.2007, leg. KUNZ. (3)

Melandryidae

- Anisoxya fuscula* (ILLIGER): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 3 Expl. auf dürrem Ast, 14.7.2007, leg. HOFMANN. – Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf totem Eichen-Ast am Boden, 25.5.2007, leg. LANGE. – Gernsheim (MA 60), 1 Expl. in abgestorbenem Pappel-Zweig, 7.4.2007 eingetragen, im Juni 2007 als Imago geschlüpft, leg. LANGE. (3)
- Phloiotrya rufipes* (GYLLENHAL): Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. auf verpilztem Eichen-Ast, 2.6.2007, leg. HÖHNER. (3)
- Phloiotrya vaudoueri* MULSANT: Darmstadt–Arheilgen, Waldgebiet Kleeneck (MA 83), 1 Expl. auf trockenem Ast einer Buche neben Bahnlinie, 18.8.2007, leg. HÖHNER. (2)

Melandrya caraboides (LINNAEUS): Sinntal–Weichersbach (NA 47), 3 Expl. an gefällter Pappel, 23.5.2007, leg. BRENNER. (3)

Melandrya barbata (FABRICIUS): Hadamar–Steinbach (MA 39), 1 Expl. unter Buchen-Rinde, 25.5.2007, leg. KUNZ. (2)

Alleculidae

Allecula morio (FABRICIUS): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Larve in Eichen-Mulm, 20.3.2007, die Imago schlüpfte im Juni 2007, leg. RUPP. (3)

Allecula rhenana BACH: Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), mehrere Larven aus dem Inneren einer Esche, 20.3.2007, 4 Imagines schlüpfen im Juli 2008, leg. RUPP. (2)

Prionychus ater (FABRICIUS): Wetzlar, Weinberg (MB 60), mehrere Larven im Mulm einer Apfelbaum-Höhle, 2.4.2007, 2 Imagines schlüpfen im Mai 2007, leg. RUPP. – Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Larve in Eichen-Mulm, 20.3.2007, 1 Imago schlüpfte im Juni 2008, leg. RUPP. – Bad Nauheim–Wisselsheim, Löwental (MA 88), 1 Larve in Weiden-Mulm, 15.3.2007, die Imago schlüpfte im Mai 2008, leg. RUPP. (3)

Hymenalia rufipes (FABRICIUS): Seeheim-Jugenheim–Jugenheim, westlich der Landesstraße nach Alsbach (MA 71), 8 Expl. an verschiedenen Sträuchern von Feldhecken, vor allem an Flieder, 21.6.2007, leg. LANGE. (2)

Pseudocistela ceramboides (LINNAEUS). Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. in Eichen-Wald, 2.6.2007, leg. LANGE. (2)

Mycetochara axillaris (PAYKULL): Wetzlar, Weinberg (MB 60), 1 Puppe in Buche, 18.4.2007, die Imago schlüpfte noch im April 2007; 1 Larve in Apfelbaum, 2.4.2007, der fertige Käfer schlüpfte im Juni 2007, leg. RUPP. (2)

Cteniopus sulphureus (LINNAEUS): Darmstadt–Eberstadt, Modau-Promenade (MA 71), 2 Expl. auf Blüte von *Daucus carota* LINNAEUS (Wilde Möhre), 8.7.2007, leg. KÜRSCHNER. (3)

Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus (LINNAEUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. in *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) (weitere Expl. wurden gesehen), 19.5.2007, leg. HOFMANN. – Biebesheim, Rheinufer (MA 61), 1 Expl. in altem *Fomes fomentarius* an gestürzter Pappel, 14.3.2007, leg. HOFMANN. (3)

Neomida haemorrhoidalis (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. in altem *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Buche, 19.5.2007, leg. HOFMANN. – Biebesheim, Rheinufer (MA 61), 1 Expl. in altem *Fomes fomentarius* an gestürzter Pappel, 14.3.2007, leg. HOFMANN. – Ober-Ramstadt, Geisenwald (MA 82), 1 Expl. in altem, stark zerfressenem *Fomes fomentarius* an Buche, 23.10.2007, leg. LANGE. (1)

Platydemia violaceum (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. unter der Rinde einer gefällten Eiche, 25.3.2007, leg. LANGE. – Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 2 Expl. auf verpilzten Eichen-Ästen, 2.6.2007, leg. HÖHNER. – Pfungstadt, Wald zwischen Pfungstadt und Seeheim (östlich der A5) (MA 71), 1 Expl. unter der Rinde eines toten Bergahorns, 24.3.2007, leg. LANGE. (3)

Pentaphyllus testaceus (HELLWIG): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 3 Expl. im trockenen Mulm einer hohlen Eiche mit *Lasius* (Holzameise), 19.5.2007, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. LANGE (1 Expl.). – Hadamar–Nieder-

- hadamar (MA 38), 3 Expl. unter der Rinde eines Eichen-Stubbens, 11.2.2007, leg. KUNZ. (3)
- Myrmexenus subterraneus* (CHEVROLAT): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 7 Expl. unter Stein auf Ameisenhaufen (*Formica*), 25.3.2007, leg. LANGE. Aus Hessen liegen nur alte Meldungen aus dem 19. Jahrhundert von Frankfurt, Kelkheim–Münster und Wiesbaden vor (HEYDEN 1904). Deshalb stellen die Tiere von Lampertheim einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar!
- Corticeus bicoloroides* (ROUBAL): Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche, 11.11.2007, leg. LANGE. (1)
- Palorus depressus* (FABRICIUS): Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 1 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche, 11.11.2007, leg. LANGE. (3)
- Diaclina fagi* (PANZER): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 2 Expl. in einem Holzspalt unter der Rinde eines liegenden Pappel-Stamms, 14.7.2007, leg. LANGE. (2)
- Latheticus oryzae* WATERHOUSE: Wetzlar–Neustadt (MB 60), 1 Expl. in Fensterfalle in einem Hausspeicher, 1.7.2004, leg. SCHMIDT. – Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. in Haus, 22.6.2006, leg. KUNZ. Dieser Kosmopolit, der ursprünglich aus Indien stammen soll (HORION 1956), gelegentlich nach Deutschland importiert wird und sich im Niederelbegebiet bereits etabliert haben soll (KÖHLER 2000), konnte daneben auch in Bayern, am Nordrhein, in Westfalen, in Hannover, im Weser-Ems-Gebiet und in Brandenburg nachgewiesen werden (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Aus Hessen lag bislang kein Fund vor, weshalb die Tiere von Wetzlar und Hadamar **Neunachweise für Hessen** darstellen!
- Uloma culinaria* (LINNAEUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 5 Expl. im Holz und unter der Rinde einer morschen Buche, 19.5.2007, leg. HOFMANN (3 Expl.), leg. RUPP (2 Expl.). (2)
- Neatus picipes* (HERBST): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 2 Larven im Inneren einer Esche, 20.3.2007, die Imagines schlüpften im Juni 2007, leg. RUPP. – Griesheim bei Darmstadt, Nähe Hof Gehaborn (MA 72), 4 Expl. in hohler, mulmhaltiger Buche, 6.1.2007, leg. LANGE. (1)

Geotrupidae

- Typhaeus typhoeus* (LINNAEUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), Fragmente von 1 Expl. auf Sandboden, 19.5.2007, vid. HOFMANN. – Büttelborn (MA 62), 1 Expl. auf Waldweg, 13.10.2007, leg. LANGE. – Darmstadt–Eberstadt, Riedberg (MA 71), 1 Expl. in einem Weingarten, 24.2.2007, leg. KÜRSCHNER. (-/3)

Scarabaeidae

- Onthophagus nuchicornis* (LINNAEUS): Darmstadt–Eberstadt, Prinzenberg (MA 72), 2 Expl. an Hunde-Kot, 18.4.2007, leg. KÜRSCHNER. (-/3)
- Aphodius fasciatus* (OLIVIER): Rodenbach–Niederrodenbach (NA 05), 1 Expl. an Pferde-Kot, 10.1.2007, leg. HÖHNER.
- Aphodius plagiatus* (LINNAEUS): Gießen, Wieseckau (MB 70), 1 Expl. in Seggenried am Rand eines Grabens in Bodenfalle, 15.-22.6.2007, leg. SCHMIDT. (-/2)
- Pleurophorus caesus* (CREUTZER): Biblis–Nordheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. auf überschwemmter Wiese an Grashalm, 4.3.2007, leg. LANGE. (2/3)
- Maladera holosericea* (SCOPOLI): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. auf und in Sandboden, 19.5.2007, vid. HOFMANN (1 Expl.), leg. LANGE (1 Expl.); am selben Fundort 2 Expl. auf Sandboden, 21.9.2007, leg. LANGE. – Mühlheim, Gailenberg (MA 95), 1 Expl. im Eingang eines Kaninchenbaus, 26.3.2007, leg. HOFMANN. (3)

- Tropinota hirta* (PODA): Griesheim, Griesheimer Düne (MA 72), 1 Expl. auf Blüte, 14.4.2007, leg. LANGE. (3/2)
- Oxythyrea funesta* (PODA): Weiterstadt, Triesch (MA 62), 1 Expl. auf Doldenblüte, 3.6.2007, leg. LANGE. (2/3)
- Protaetia aeruginosa* (DRURY): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. in Wald fliegend (von 1 weiteren Expl. wurden Fragmente gesehen), 14.7.2007, vid. HOFMANN, vid. KÜRSCHNER. – Büttelborn, Hegwald (MA 62), 1 Expl. am Rand eines Waldwegs auf Blatt von *Arctium lappa* LINNAEUS (Große Klette), 9.9.2007, leg. LANGE. (1/2)
- Protaetia lugubris* (HERBST): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. auf Pfad an Waldrand, 28.3.2007, leg. KOCH. (2)

Lucanidae

- Lucania cervus* (LINNAEUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), Fragmente mehrerer Expl. in Laubwald, 19.5.2007, vid. HOFMANN. (2/3)

Cerambycidae

- Rhagium sycophanta* (SCHRANK): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf gefälltem Eichen-Stamm, 19.5.2007, leg. HOFMANN. (3)
- Cortodera humeralis* (SCHALLER): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an blühendem *Cornus* (Hartriegel), 19.5.2007, leg. HÖHNER. – Wetzlar, Weinberg (MB 60), 1 Expl. an *Crataegus* (Weißdorn), 5.5.2007, leg. RUPP. (3)
- Anoplodera sexguttata* (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 2 Expl. auf Vegetation an Wegesrand, 19.5.2007, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. RUPP (1 Expl.). (3)
- Corymbia scutellata* (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte (Doldengewächs), 19.5.2007, vid. HOFMANN. – Wetzlar, Weinberg (MB 60), 1 Larve in morschem Buchen-Holz, 17.4.2007, die Imago schlüpfte im Mai 2007, leg. RUPP. – Weilburg (MA 49), 1 Expl. an Eichen-Stamm, 25.5.2007, leg. RUPP. (3)
- Cerambyx cerdo* LINNAEUS: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 2 Schlupflöcher an solitärer Eiche, 14.7.2007, vid. HOFMANN. – Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Flügeldecke am Fuß einer Eiche, 19.5.2007, leg. HOFMANN. (1)
- Cerambyx scopoli* FUESSLY: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. um gelagerte Eichen-Stämme fliegend, 19.5.2007, vid. HOFMANN. – Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation an Wegesrand, 28.4.2007, leg. KÜRSCHNER. (3)
- Phymatodes pusillus* (FABRICIUS): Mainhausen, Abtswald (NA 03), 1 Expl. an umgefallener Eiche, 12.4.2007, leg. HOFMANN. (2)
- Phymatodes rufipes* (FABRICIUS): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. an blühender *Sorbus torminalis* (LINNAEUS) CRANTZ (Elsbeere), 28.4.2007, leg. LANGE. (2)
- Xylotrechus rusticus* (LINNAEUS): Darmstadt, Innenstadt (MA 72), 1 Expl. in Haus mit zahlreichen Pappeln in der Umgebung (Totfund), 5.10.2007, leg. KOCH, in coll. LANGE. (2)
- Xylotrechus arvicola* (OLIVIER): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. in Laubwald fliegend, 14.7.2007, leg. HOFMANN. (2)
- Plagionotus detritus* (LINNAEUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an Eichen-Stamm, 19.5.2007, leg. HÖHNER. (2)
- Chlorophorus figuratus* (SCOPOLI): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf Blüte an Wegesrand in Laubwald, 7.7.2007, leg. LANGE. (2)

- Anaesthetis testacea* (FABRICIUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf totem Eichen-Zweig am Boden, 2.6.2007, leg. LANGE. (3)
- Exocentrus adpersus* MULSANT: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 6 Expl. auf toten Eichen-Ästen, 19.5.2007, leg. HOFMANN. – Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 10.6.2007, leg. KUNZ. (3)
- Exocentrus punctipennis* MULSANT & GUILLEBEAU: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 10 Expl. auf trockenen Ästen absterbender Ulmen, 14.7.2007, leg. HOFMANN (3 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.), leg. KÜRSCHNER (3 Expl.), leg. LANGE (3 Expl.). (2)
- Agapanthia pannonica* KRATOCHVIL: Hadamar–Steinbach (MA 39), 1 Expl. von der Vegetation einer Brache gestreift, 25.5.2007, leg. KUNZ. (2)
- Phytoecia nigricornis* (FABRICIUS): Lorch, Nollig (MA 14), 6 Expl. an *Tanacetum vulgare* LINNAEUS (Rainfarn), 28.4.2007, leg. BRENNER (1 Expl.), leg. HOFMANN (3 Expl.), leg. KOCH (1 Expl.), leg. LANGE (1 Expl.). – Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an *Tanacetum vulgare*, 25.5.2007, leg. LANGE. – Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. an *Tanacetum vulgare*, 5.5.2007, leg. LANGE. (3)

Chrysomelidae

- Cryptocephalus marginatus* FABRICIUS: Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. an *Populus tremula* LINNAEUS (Zitter-Pappel), 2.6.2007, leg. HÖHNER. Aus Deutschland liegen aktuelle Funde (seit 1950) dieser Art aus allen Teilen mit Ausnahme des Nordens vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Aus Hessen sind lediglich zwei Nachweis aus dem 19. Jahrhundert von Frankfurt und von Bad Soden im Taunus bekannt (HEYDEN 1904), weshalb das Tier von Kelsterbach einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** darstellt! Zu bedauern ist, dass mit dem Erlöschen des einzigen bekannten aktuellen Vorkommens in Hessen durch den Ausbau des Frankfurter Flughafens zu rechnen ist. (3)
- Cryptocephalus populi* SUFFRIAN: Lampertheim–Hofheim, Maulbeeraue (MA 50), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 7.7.2007, leg. LANGE. (3)
- Timarcha tenebricosa* (FABRICIUS): Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 2 Expl. auf Hochwasserdamm laufend, 21.7.2007, leg. KOCH. Auch später im Jahr konnten mehrere Exempare auf dem Damm laufend oder an *Galium* (Labkraut) fressend beobachtet werden. (3)
- Phyllotreta procera* (REDTENBACHER): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. an *Reseda luteola* LINNAEUS (Färber-Resede), 28.4.2007, leg. KOCH. – Babenhausen (MA 93), 1 Expl. an Feldrand gekäschert, 8.9.2007, leg. HÖHNER. (3)
- Aphthona atrocaerulea* (STEPHENS): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. auf der Wasseroberfläche eines Grabens, 14.7.2007, leg. HOFMANN. KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) geben aktuelle Nachweise (nach 1950) aus fast allen Teilen Deutschlands an. Auf welchen Fund sich dort der Hinweis eines Vorkommens in Hessen zwischen 1900 und 1950 bezieht, ist mir nicht bekannt. Das Tier vom Biedensand stellt danach einen **Wiederfund in Hessen nach über 50 Jahren** dar!
- Longitarsus membranaceus* (FOUDRAS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an *Teucrium scorodonia* LINNAEUS (Salbei-Gamander), 19.5.2007, leg. LANGE.
- Longitarsus reichei* (ALLARD): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. an *Plantago lanceolata* LINNAEUS (Spitz-Wegerich) an Wegrand, 19.8.2007, leg. KOCH. (3)
- Longitarsus dorsalis* (FABRICIUS): Lorch, Lorchhausen (MA 14), ca. 50 Expl. die Jungpflanzen von *Senecio vulgaris* LINNAEUS (Gemeines Greiskraut) und *Senecio*

inaequidens DE CANDOLLE (Schmalblättriges Greiskraut) teilweise fast kahl fressend, 4.3.2007, vid. KOCH. – Bickenbach, Hasengrund (MA 71), 11 Expl. an *Senecio* (Greiskraut), 24.3.2007, leg. LANGE. – Frankfurt–Bockenheim, Botanischer Garten (MA 75), 6 Expl. an Blattrosette von *Senecio fluviatilis* WALLROTH (Fluss-Kreuzkraut), 10.3.2007, leg. HÖHNER (1 Expl.), leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. LANGE (4 Expl.). (2)

Longitarsus quadriguttatus (PONTOPPIDAN): Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. an *Nonea pulla* (LINNAEUS) DE CANDOLLE (Braunes Mönchskraut), 2.6.2007, leg. HÖHNER. Der Neunachweis für Hessen von 2005 (BRENNER 2007) konnte mit diesem erneuten Fund bestätigt werden. Im Stadtwald von Kelsterbach scheint eine stabile Population vorzuliegen. Zu bedauern ist auch hier, dass mit dem Erlöschen des einzigen bekannten Vorkommens in Hessen durch den Ausbau des Frankfurter Flughafens zu rechnen ist (siehe *Cryptocephalus marginatus* F.). (1)

Longitarsus echii (KOCH): Groß-Rohrheim, Hammeraue (MA 60), 1 Expl. an *Echium vulgare* LINNAEUS (Gemeiner Natternkopf) auf Hochwasserdamm, 20.5.2007, leg. KOCH. – Bickenbach, Hasengrund (MA 71), 25.3.2007, 2 Expl. an *Echium vulgare*, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim–Seeheim, Weiherwiese (MA 71), 13 Expl. auf *Anchusa arvensis* (LINNAEUS) VON BIEBERSTEIN (Acker-Ochsenzunge, Acker-Krummhals) an Wegrand, 11.3.2007, leg. LANGE. – Darmstadt–Wixhausen, Rotböhl (MA 73), 1 Expl. an Rosette von *Echium vulgare*, 3.4.2007, leg. HOFMANN. – Frankfurt–Bockenheim, Botanischer Garten (MA 75), 8 Expl. auf Blattrosette von *Echium vulgare*, 10.3.2007, leg. HÖHNER (2 Expl.), leg. HOFMANN (3 Expl.), leg. LANGE (3 Expl.). – Dieburg, östlich Mainzer Berg (MA 82), 1 Expl. auf Vegetation an Ackerrand, 18.2.2007, leg. KOCH. – Mühlheim, Gailenberg (MA 95), 2 Expl. an Rosetten von *Echium vulgare*, 28.3.2007, leg. HOFMANN. – Hanau–Steinheim, Gailenberg (MA 95), 5 Expl. an *Echium vulgare*, leg. HÖHNER. (3)

Ochrosis ventralis (ILLIGER): Lorch, Nollig (MA 14), 3 Expl. auf *Anagallis arvensis* LINNAEUS (Acker-Gauchheil) an Weinbergsmauer, 28.4.2007, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. KOCH (1 Expl.). (3)

Mantura horioni HEIKERTINGER: Lorch, Nollig (MA 14), 5 Expl. an *Rumex scutatus* LINNAEUS (Schild-Sauerampfer), 28.4.2007, leg. KOCH. (1)

Psylliodes isatidis HEIKERTINGER: Lorch, Nollig (MA 14), 5 Expl. an *Isatis tinctoria* LINNAEUS (Färber-Waid), 28.4.2007, leg. KOCH. – Groß-Rohrheim, Hammeraue (MA 60), 10 Expl. an *Isatis tinctoria* auf Hochwasserdamm, 20.5.2007, leg. KOCH. (3)

Bruchidae

Bruchus brachialis FAHRAEUS: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. unter der Rinde einer toten Kiefer, 3.3.2007, leg. LANGE.

Bruchidius varius (OLIVIER): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. an *Trifolium repens* LINNAEUS (Weiß-Klee), 28.4.2007, leg. LANGE. (1)

Anthribidae

Phaeochrotes cinctus (PAYKULL): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 5 Expl. auf toten Eichen-Ästen am Boden, 19.5.2007, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. LANGE (4 Expl.). (3)

Scolytidae

Scolytus laevis CHAPIN: Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. am Stamm einer abgestorbenen Ulme, 25.4.2007, leg. LANGE. KÖHLER &

KLAUSNITZER (1998) kennen Nachweise aus 10 Regionen Deutschlands, sowohl aus dem Norden als auch aus dem Süden. Aus Hessen jedoch lag bislang keine Meldung vor, weshalb der Fund von Pfungstadt einen **Neunachweis für Hessen** darstellt! (3)

Pteleobius vittatus (FABRICIUS): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. am Stamm einer abgestorbenen Ulme, 25.4.2007, leg. LANGE. (3)

Apionidae

Omphalapion laevigatum (PAYKULL): Darmstadt–Eberstadt, Prinzenberg (MA 72), 1 Expl. auf Trockenrasen, 5.6.1966, leg. KÜRSCHNER. Neben wenigen alten Funden aus dem 19. Jahrhundert lag aus Hessen bislang nur ein einziger Nachweis aus dem 20. Jahrhundert (von 1942) von Kronberg/Taunus vor (LIEBEGOTT 1989). Der Fund vom Prinzenberg stellt einen **Wiederfund in Hessen nach über 50 Jahren** (allerdings in einer Sammlung) dar! (2)

Curculionidae

Lixus subtilis BOHEMAN: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an *Chenopodium bonus-henricus* LINNAEUS (Guter Heinrich), 25.5.2007, leg. LANGE. (2)

Coniocleonus hollbergi (FAHRAEUS): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 4 Expl. auf Sandboden neben *Rumex acetosella* LINNAEUS (Kleiner Ampfer), 19.5.2007, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.), leg. LANGE (2 Expl.).

Chromoderus affinis (SCHRANK): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 19 Expl. auf Sandboden neben *Chenopodium bonus-henricus* LINNAEUS (Guter Heinrich), 19.5.2007, leg. HOFMANN (8 Expl.), leg. HÖHNER (2 Expl.), leg. LANGE (8 Expl.), leg. RUPP (1 Expl.) det. KUNZ in coll. KUNZ. (3)

Rhyncholus reflexus BOHEMAN: Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 2 Expl. in Esche, 20.3.2007; 2 Larven in Eiche, 20.3.2007, die Imagines schlüpften im Mai 2007; 1 Expl. in Esche, 13.4.2007; 1 Larve in Hainbuche, 13.4.2007, die Imago schlüpfte im August 2007, leg. RUPP, det. KUNZ, in coll. KUNZ. – Lauterbach–Blitzenrod (NB 20), 1 Larve in Eiche auf Huteweide, 3.6.2007, die Imago schlüpfte im Juli 2007, leg. RUPP, det. KUNZ, in coll. KUNZ. (2)

Sibinia phalerata (GYLLENHAL): Griesheim, Griesheimer Düne (MA 72), 1 Expl. zwischen Moos auf Sandboden, 14.4.2007, leg. LANGE. (3)

Magdalis fuscicornis DESBROCHERS: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 3 Expl. auf Ästen einer kürzlich umgestürzten Eiche, 25.5.2007, leg. LANGE. (3)

Magdalis rufa GERMAR: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 2.6.2007, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim–Jugenheim, westlich der Landesstraße nach Alsbach (MA 71), 1 Expl. an Kiefer, 21.6.2007, leg. LANGE. (2)

Sphenophorus striatopunctatus (GOEZE). Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf Sandboden, 19.5.2007, leg. LANGE. (2)

Dryophthorus corticalis (PAYKULL): Lampertheim, Biedensand (MV 59), 1 Expl. im Mulm einer hohlen Weide, 14.7.2007, leg. HOFMANN. (3)

Acalles dubius SOLARI: Lampertheim, Biedensand (MV 59), 6 Expl. auf dünnen Ästen und Zweigen, 14.7.2007, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. LANGE (4 Expl.). – Alsbach-Hähnlein–Alsbach, Katharinenberg (MA 70), 5 Expl. an der Unterseite von am Boden liegenden Stämmen und Ästen von Buchen, 6.10.2007, leg. LANGE. – Ober-Ramstadt, Geisenwald (MA 82), 5 Expl. an Ästen und Zweigen gefällter Buchen, 23.10.2007, leg. LANGE. (3)

- Acalles lemur* (GERMAR): Alsbach-Hähnlein–Alsbach, Nähe Ruine Jossa (MA 71), 1 Expl. an der Unterseite eines am Boden liegenden, dicken Asts in Bachnähe, 12.8.2007, leg. LANGE. – Alsbach-Hähnlein–Alsbach, Geis-Berg (MA 70), 3 Expl. an der Unterseite von am Boden liegenden Buchen-Ästen, 16.9.2007, leg. LANGE. – Alsbach-Hähnlein–Alsbach, Katharinen-Berg (MA 70), 18 Expl. an der Unterseite von am Boden liegenden Stämmen und Ästen von Buchen, 6.10.2007, leg. LANGE. – Darmstadt–Eberstadt, Kühler Grund mit Waldmühle (MA 71), 10 Expl. in Laubansammlung unter dünnen Zweigen einer gefällten Buche, 14.10.2007, leg. LANGE. (3)
- Baris fallax* (BRISOUT): Lorch, Nollig (MA 14), 3 Expl. an *Isatis tinctoria* LINNAEUS (Färber-Waid) auf Brachfläche, 28.4.2007, leg. KOCH (2 Expl.), leg. LANGE (1 Expl.). (3)
- Ceutorhynchus constrictus* (MARSHAM): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. an *Alliaria petiolata* (BIEBERSTEIN) CAVARA & GRANDE (Knoblauchsrauke), 2.6.2007, leg. LANGE. (3)
- Ceutorhynchus rusticus* GYLLENHAL: Lorch, Nollig (MA 14), 14 Expl. an *Isatis tinctoria* LINNAEUS (Färber-Waid) auf Brachfläche, 28.4.2007, leg. HOFMANN (5 Expl.), leg. KOCH (4 Expl.), leg. LANGE (5 Expl.). (3)
- Gymnetron netum* (GERMAR): Babenhausen (MA 93), 1 Expl. an *Linaria vulgaris* MILLER (Gemeines Leinkraut), 21.7.2007, leg. HÖHNER. (3)
- Miarus micros* (GERMAR): Babenhausen, In den Rödern (MA 93), 22 Expl. an *Jasione montana* LINNAEUS (Berg-Sandköpfchen), 1.8.2007, leg. HOFMANN. (3)
- Cionus olens* (FABRICIUS): Bickenbach, Hasengrund (MA 71), 2 Expl. an *Verbascum* (Königskerze), 5.4.2007, leg. LANGE. – Griesheim, Griesheimer Düne (MA 72), 10 Expl. an *Verbascum*, 14.4.2007, leg. LANGE. – Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 1 Expl. an *Verbascum*, 3.4.2007, leg. LANGE. (3)

Literatur

- BATHON, H. (1985): Käferfunde der Jahre 1982 bis 1984 aus Hessen. 2. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen. – Hess. faun. Briefe 5(2): 20-29, Darmstadt.
- BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRÜTTKE & P. PRETSCHER (Hrsg., 1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenr. Landschaftspfll. Natursch., Bonn-Bad Godesberg, 55: 3-434.
- BRENNER, U. (2007): Käferfunde der Jahre 2004 und 2005 aus Hessen. 14. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen. – Hess. faun. Briefe 25(3-4): 45-74 (2006), Darmstadt.
- BÜCKING, H. (1930-32): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Erster Nachtrag zur II. Auflage des Hauptverzeichnis von Lucas von Heyden (1904). – Entomol. Bl. 26: 145-163; 27: 39-42, 83-89, 122-128, 174-183; 28: 73-80, 122-125, 167-170, Berlin.
- DEHNERT, E. (1970): Zur Faunistik der Käfer des Untermaingebiets einschließlich Spessart und Taunus. 2. Beitrag. – Jber. wetterau. Ges. ges. Naturkunde 121-122: 15-37, Hanau.
- ELBERT, A. (1994): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Untermaingebiet zwischen Hanau und Würzburg. (2. Nachtrag zur Gebietsfauna von Dr. Karl Singer, 1955). – Mitt. naturwiss. Mus. Aschaffenburg 16: 3-113, Aschaffenburg.
- ESSER, J. (2006 a): Ein Fund von *Agrilus ribesi* SCHAEFER, 1946 in Thüringen (Coleoptera, Buprestidae). – Entomol. Nachr. Ber. 50(4): 241 (Faunistische Notiz Nr. 851), Dresden.
- ESSER, J. (2006 b): Funde von *Agrilus ribesi* SCHAEFER, 1946 und *A. derasofasciatus* LACORDAIRE, 1835 aus Sachsen (Coleoptera, Buprestidae). – Entomol. Nachr. Ber. 50(4): 241 (Faunistische Notiz Nr. 852), Dresden.
- HEYDEN, L. von (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – Frankfurt am Main (Knauer).
- HORION, A. (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 2: Palpicornia – Staphylinoida (außer Staphylinidae). – Frankfurt am Main (Klostermann).
- HORION, A. (1956): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 5: Heteromera. – Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Tutzing bei München (Sonderband).

- HORION, A. (1960): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 7: Clavicornia, 1. Teil: (Sphaeritidae bis Phalacridae). – Überlingen (Feyel).
- JUNG, M. (2001): Coleopterologische Neu- und Wiederfunde in Sachsen-Anhalt. – Ent. Nachr. Ber. 45(1): 37-46, Dresden.
- KÖHLER, F. (1998): 21. Familie: Ptiliidae. – In: W. LUCHT & B. KLAUSNITZER: Die Käfer Mitteleuropas. 4. Supplementband (Bd. 15): 117-119. Krefeld (Goecke & Evers).
- KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“. – Entomol. Nachr. Ber. 44(1): 60-84, Dresden.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomol. Nachr. Ber., Beiheft 4: 1-185, Dresden.
- LIEBEGOTT, D. (1989): Faunistik der hessischen Koleopteren. Siebzehnter Beitrag, Familie Curculionidae I, Gattung *Apion* HERBST. – Mitt. int. entomol. Ver. 14(3): 79-220, Frankfurt am Main.
- LOHSE, G. A. (1978): Neuheiten der Deutschen Käferfauna XI. – Entomol. Bl. 74(1): 6-20, Krefeld.
- MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz: Natur in Hessen).
- NIEHUIS, M. (2004): Die Prachtkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 31: 1-713, Landau (GNOR).
- RÜCKER, W. (1998): 58. Familie: Latridiidae. – In: W. LUCHT & B. KLAUSNITZER: Die Käfer Mitteleuropas. 4. Supplementband (Bd. 15): 257-261. Krefeld (Goecke & Evers).
- RUPP, R. (1976): Nachtrag zur Elateriden-Fauna des Naturparkes Hoher Vogelsberg (Coleoptera). – Entomol. Z. 86: 112-114, Stuttgart.
- SCHAFFRATH, U. (2003): Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens (Coleoptera: Familienreihen Scarabaeoidea und Lucanoidea). – 47 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten: Natur in Hessen).

Verfasser

Uli Brenner, Strauchweg 2, 36381 Schlüchtern

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: [Käferfunde des Jahres 2007 aus Hessen 16. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen 9-29](#)