

- BÜCKING, H. (1930–1932): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Erster Nachtrag zur 2. Auflage des Hauptverzeichnisses von Lucas von HEYDEN. – Entomol. Bl. **26** (1930), 145–163; **27** (1931), 39–42, 83–89, 122–128, 174–183, Krefeld.
- ELBERT, A. (1969): Bemerkenswerte Käferfunde aus dem Untermaingebiet zwischen Hanau und Würzburg (1. Nachtrag zur Gebietsfauna von Dr. Karl SINGER, 1955). – Mitt. naturwiss. Mus. Aschaffenburg, N. F. **12**, 59 S., Aschaffenburg.
- FREUDE, H., K. W. HARDE & G. A. LOHSE (1963–1981): Die Käfer Mitteleuropas, Bde. 1–10. – Krefeld (Goecke & Evers).
- HEYDEN, L. von (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – 2. Aufl., Frankfurt a. M.
- HORION, A. (1941–1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bde. 1–12, an verschiedenen Orten.
- (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Angaben. – Stuttgart (Kernen Verlag).
- LUCHT, W. (1982): *Rhopalocerus rondanii* (VILLA) nach 130 Jahren in Deutschland wiederentdeckt (Colydiidae). – Entomol. Bl. **78**, 32–33, Krefeld.
- SINGER, K. (1955): Die Käfer (Coleoptera). Beiträge zur Fauna des unteren Maingebietes von Hanau bis Würzburg mit Einschluß des Spessarts. – Mitt. naturwiss. Mus. Aschaffenburg, N. F. **7**, 272 S., Aschaffenburg.
- ZUR STRASSEN, R. & M. TÜRKAY (1976): Faunistik der hessischen Koleopteren. 3. Beitrag. – Neueinteilung und Erweiterung des Gebietes. – Mitt. internat. Entomol. Ver. **3**, 41–46, Frankfurt a. M.


Ein Wiederfund der Zwergspinne *Baryphyma pratense* (BLACKWALL) (Araneida, Erigonidae) in Hessen

H.-G. MÜLLER und G. LÜPKES, Gießen

Von *Baryphyma pratense*, einer in Dänemark, England, Frankreich und der Tschechoslowakei nachgewiesenen Art, lagen aus Deutschland bislang lediglich zwei Funde vor. ZIMMERMANN fand im Juni 1906 ein ♀ auf Weidengebüsch am Ufer der Lahn bei Marburg (Hessen). STRAND (1908) gibt in seiner Arbeit eine detaillierte Beschreibung dieses ♀. WUNDERLICH (1971) erwähnt einen Fund mehrerer ♂♂ und ♀♀ von der Pfaueninsel in Berlin.

Es gelang uns im Juli 1982, etwa 30 km südlich des Fundortes von ZIMMERMANN, zwei ♀♀ dieser Art, ebenfalls am Lahnufer, aus *Phragmites communis* zu streifen. Die Fundstelle liegt zwischen Gießen und Wetzlar am Ortsrand von Dutenhofen in unmittelbarer Nähe der Baggerseen.

LOCKET & MILLIDGE (1953) geben als bevorzugten Biotop in England an (übersetzt): „Zwischen Gräsern und Kräutern auf feuchten Wiesen, gewöhnlich nahe bei Bächen und Flüssen.“ WIEHLE (1960) gibt eine briefliche Mitteilung von MILLER wieder: „Ziemlich häufig unter Schilf, Rohrkolben und anderen Wasserpflanzen auf schlammigen Böden.“ Somit scheint für das Vorkommen der Art eine starke Feuchtigkeit notwendig zu sein.



Bisherige Funde von
Baryphyma pratense (BLACKWALL)
 in Hessen. Halboffener Kreis: Fund
 zwischen 1900 und 1960; gefüllter
 Kreis: Fund nach 1960.

Literatur

- LOCKET, G. H., & A. F. MILLIDGE (1953): British spiders II. – Ray Society, London.
- STRAND, E. (1908): Verzeichnis der bis jetzt bei Marburg von Prof. Dr. H. ZIMMERMANN aufgefundenen Spinnenarten. – Zool. Anz. **32**, 216–243, Jena.
- WIEHLE, H. (1960): Spinnentiere oder Arachnoidea (Araneae) XI: Micryphantidae – Zwergspinnen. In: DAHL, F. (Hrsg.): Die Tierwelt Deutschlands **47**, 620 S., Jena.
- WUNDERLICH, J. (1971): Bemerkenswerte Spinnenarten (Araneae) aus Berlin. – Sitzungsber. Ges. naturforsch. Freunde Berlin N.F. **11**, 140–147, Berlin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Müller Hans-Georg, Lüpkes Günther

Artikel/Article: [Ein Wiederfund der Zwergspinne *Baryphyma pratense* \(BLACKWALL\) \(Araneida, Erigonidae\) in Hessen 71-72](#)