Hessische Faunistische Briefe **34**(3/4)	Seiten 43-68	Darmstadt 2015

Käferfunde des Jahres 2013 aus Hessen

22. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen [1)]

ULI BRENNER

Abstract

Faunistic records of 300 species of beetles are recorded from the state of Hesse (Germany). Of these 215 are delt with as endangered species in the Red Book of Animals in Germany.

Zusammenfassung

Es werden 414 Fundmeldungen von 300 Arten aus 60 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen 21 Arten nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) als vom Ausstreben bedroht (1), 62 Arten als stark gefährdet (2) und 122 Arten als gefährdet (3) eingestuft werden. 10 weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste (V). Die Angabe „GD" bei *Cicindela hybrida* LINNAEUS und *Agonum scitulum* DEJEAN aus der hessischen Roten Liste von MALTEN (1998) bedeutet eine anzunehmende Gefährdung, wobei die Datenlage jedoch mangelhaft erscheint. Sechs Arten werden als Neunachweise in Hessen angesehen: *Clambus pallidulus* REITTER, *Epuraea distincta* (GRIMMER), *Ipidia binotata* REITTER, *Cychramus variegatus* (HERBST) und *Cryptocephalus imperialis* LAICHARTING. Drei Arten stellen Wiederfunde in Hessen nach über 100 Jahren dar: *Agonum scitulum* DEJEAN, *Xyletinus ater* (CREUTZER), *Orthotomicus proximus* (EICHHOFF) und *Bruchidius cisti* (FABRICIUS). Eine Art wurde nach mehr als 50 Jahren in Hessen wiedergefunden: *Bledius agricultor* HEER.

Auch für diese Ausgabe der „Käferfunde" sandten mir die hessischen Koleopterologen wieder die Ergebnisse ihrer Aufsammlungen zu, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Außerdem gehen in die Zusammenstellung auch die Resultate der vier gemeinschaftlichen Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen ein, die 2013 stattfanden. Diese Sammelausflüge gingen auf den Kalk-Magerrasen Pfaffenrech bei Bensheim–Gronau (4.5.2013), in die Ginsheimer Rheinaue bei Ginsheim-Gustavsburg (25.5.2013), auf die Weinhänge östlich Zwingenberg und die oberhalb anschließende zu Bensheim–Auerbach gehörende Orbis-Höhe (8.6.2013) sowie zu den Forellenteichen im Oberen Niddatal bei Schotten–Breungeshain (6.7.2013). Gewohnheitsgemäß gehen auch Fundmeldungen aus zum Teil länger zurückliegender Zeit wieder in diese Zusammenstellung ein.

Nach den Fundorten sind in Klammern die zugehörigen UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten die Gefährdungskategorien nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) (= RL D), bei abweichender Einstufung der Carabidae bzw. Scarabaeidae und Lucanidae zusätzlich auch nach den hessischen Roten Listen von MALTEN (1998) und SCHAFFRATH (2003) (= RL H), geklammert angegeben [(RL D)/(RL H)].

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von Andreas BERGER (Hanau), Uli BRENNER (Schlüchtern), Hans-Joachim FLÜGEL (Knüllwald), Günter HOFMANN

[1)] 21. Bericht in: Hess. faun. Briefe **33**(4): 51-75 (2014)

(Stockstadt in Unterfranken), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Werner HORN (Erbach), Mathias KOCH (Darmstadt), Roland KUNZ (Hadamar), Frank LANGE (Niedernhausen), Rüdiger RUPP (Wetzlar), Andreas SCHMIDT (Wetzlar) und Martin SCHROTH (Hanau).

An dieser Stelle möchte ich eine Anmerkung zu Funden aus dem Mönchbruch zwischen Mörfelden-Walldorf und Rüsselsheim machen, die in vorhergehenden Berichten in dieser Zeitschrift mitgeteilt wurden. Es wurde stets vorausgesetzt, dass das Mönchbruch-Gebiet zu Mörfelden-Walldorf zu rechnen sei. Dies ist jedoch nicht richtig. Das Gebiet umfasst Flächenanteile der Städte Rüsselsheim und Mörfelden-Walldorf sowie der Gemeinde Nauheim. Da die hessischen Sammler meist die Wälder westlich der Mönchbruchwiese aufsuchten, sind die von dort stammenden Funde dem Gebiet von Rüsselsheim zuzuweisen. Sind bei den Fundortangaben die Zusätze Dachnau (auch ohne Mönchbruch) oder Schlangenloch zu finden, so ist diese Zuordnung (Rüsselsheim) eindeutig; ist lediglich die Angabe Mönchbruch vorhanden, so ist sie immerhin wahrscheinlich, es sei denn andere Gründe sprechen dagegen. So ist eine Zuordnung zu Mörfelden-Walldorf dann sicher bzw. wahrscheinlich, wenn bei den Fundumständen Angaben auftauchen, die auf die Mönchbruchwiese hinweisen; solche Angaben sind Sauergras, Wiesenvegetation, Salix bzw. Weide, Erlen (?), Wiesenbach und Lindenholz, womit sicher die Lindenallee gemeint ist, die sich durch die Mönchbruchwiese zieht. Die Zuordnung zu Nauheim ist wenig plausibel, da meines Wissens die zu dieser Gemeinde gehörenden Wälder südlich des Jagdschlosses Mönchbruch kaum besammelt wurden. Es soll von jetzt an darauf geachtet werden, aus welchen Teilbereichen die Funde aus dem Mönchbruch stammen. Die Angabe von *Carphacis striatus* (OLIVIER) in diesem Bericht ist also tatsächlich der Mörfelden-Walldorf zugehörenden Fläche zuzuweisen, alle anderen Funde dem Flächenanteil Rüsselsheims.

Carabidae

Cicindela hybrida LINNAEUS (ssp. *pseudoriparia* MANDL): Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue, Karlswert (MA 51), 5 Expl. auf dem Sandboden am Rheinufer laufend und bei Störungen sehr schnell auffliegend, 24.4.2013, leg. LANGE. (-/GD)

Calosoma inquisitor (LINNAEUS): Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. an Eichen-Ast, 6.6.2013, leg. BERGER. (3)

Carabus arvensis HERBST: Beerfelden–Olfen, NSG „Rotes Wasser" (MV 99), 1 Expl. in Barberfalle in Zwischenmoor, 30.6.-10.7.2013, leg. HORN. (V/3)

Leistus rufomarginatus (DUFTSCHMID): Glashütten–Schloßborn, Rentmauer (Butznickel) (MA 56), 1 Expl. unter Stein in Mischwald, 4.10.2013, leg. BERGER. (-/3)

Leistus fulvibarbis DEJEAN: Wiesbaden–Biebrich, Schloßpark (MA 44), 1 Expl. in der Streu am Boden, 12.10.2013, leg. LANGE.

Notiophilus aestuans DEJEAN: Bad König–Momart, Pechofen (NA 00), 1 Expl. an einer lichten Stelle in Rapsfeld, 22.4.2013, leg. HORN. (V/-)

Notiophilus germinyi FAUVEL: Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 2 Expl. in der Bodenstreu unter *Calluna vulgaris* (LINNAEUS) HULL, 4.10.2013, leg. BERGER, det. Ingo BRUNK. (3)

Bembidion argenteolum AHRENS: Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue, Karlswert (MA 51), 1 Expl. auf Sandboden am Rheinufer, 24.4.2013, leg. LANGE; am selben Fundort noch einmal 12 Expl. auf Sandboden am Rheinufer, zum Teil unter Steinen versteckt, 16.6.2013, leg. LANGE. (2)

Bembidion assimile GYLLENHAL: Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue, Nähe Schwedensäule (MA 51), 2 Expl. am Rand eines überschwemmten Auwalds, 14.4.2013, leg. LANGE. (V)

Bembidion octomaculatum (GOEZE): Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. an schlammigem Ufer unter durch Rückgang des Wassers trocken gefallener *Utricularia*-Matte (Wasserschlauch), 16.8.2013, leg. LANGE. (2/3)

Asaphidion austriacum SCHWEIGER: Riedstadt–Erfelden, Kühkopf, Krappenschlag (MA 62), 1 Expl. in Bodenfalle auf Wiese, 24.4.-1.5.2013, leg. BERGER, det. HÖHNER. (2)

Diachromus germanus (LINNAEUS): Trebur, Treburer Unteraue (MA 53), 2 Expl. unter der Rinde eines liegenden Eichen-Stamms, 1.4.2013, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf einem bei Rheinhochwasser aus dem Wasser ragendem Holzstück, 3.6.2013, leg. LANGE. (-/3)

Parophonus maculicornis (DUFTSCHMID): Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 2 Expl. in der Bodenstreu auf Kalk-Magerrasen, 4.5.2013, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf Gebüsch neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. BERGER, det. HÖHNER. (V/3)

Harpalus dimidiatus (ROSSI): Riedstadt–Erfelden, Kühkopf, Krappenschlag (MA 62), 2 Expl. in Bodenfalle auf Wiese, 24.4.-1.5.2013, leg. BERGER, det. HÖHNER. (V)

Harpalus pumilus STURM: Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf Gebüsch neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. BERGER, det. HÖHNER. (V/-)

Harpalus serripes (QUENSEL): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), je 1 Expl. auf Weinbergweg laufend und unter einem Stein neben dem Weg, 8.6.2013, leg. HOFMANN, leg. KUNZ. (V/3)

Bradycellus ruficollis (STEPHENS): Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 2 Expl. in der Bodenstreu unter *Calluna vulgaris* (LINNAEUS) HULL, 4.10.2013, leg. BERGER, det. Ingo BRUNK. (3/2)

Pterostichus gracilis (DEJEAN): Heringen (Werra), Rohrlache (NB 73), 1 Expl. am Ufer eines Grabens, 17.4.2013, leg. BERGER, det. Ingo BRUNK. (3/2)

Pterostichus cristatus (DUFOUR): Glashütten–Schloßborn, Rentmauer (Butznickel) (MA 56), 4 Expl. unter Steinen in Mischwald, 4.10.2013, leg. BERGER (1 Expl.), leg. HÖHNER (3 Expl.). (-/V)

Agonum lugens (DUFTSCHMID): Bickenbach, Schifflache (MA 71), 5 Expl. abends neben Sumpfgebiet ans Licht geflogen, zahlreiche weitere Expl. wurden gesehen, 2.8.2013, leg. HORN. (3/2)

Agonum scitulum DEJEAN: Bickenbach, Schifflache (MA 71), 1 Expl. abends neben Sumpfgebiet ans Licht geflogen, 2.8.2013, leg. HORN. Der einzige mir bekannte hessische Fund stammt von Ginsheim-Gustavsburg–Gustavsburg aus dem Jahr 1907 (BÜCKING 1930-32, HORION 1941). Deshalb stellt das Tier von Bickenbach einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar! (3/GD)

Badister peltatus (PANZER): Hanau–Wolfgang, Rote Lache in der Großen Bulau (MA 95), 1 Expl. auf im Wasser stehender Grasbulte in Sumpfgebiet, 13.4.2013, leg. HÖHNER. – Bruchköbel, Seeloch (MA 95), 1 Expl in der Bodenstreu am Ufer eines Tümpels, 13.11.2013, leg. BERGER, det. HÖHNER. (2/3)

Badister collaris MOTSCHULSKY: Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue, Nähe Schwedensäule (MA 51), 1 Expl. in der Laubstreu eines Auwalds, 14.4.2013, leg. LANGE. (3)

Cymindis humeralis (GEOFFROY): Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. in der Bodenstreu unter *Calluna vulgaris* (LINNAEUS) HULL, 4.10.2013, leg. BERGER. (3)

Paradromius longiceps DEJEAN: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 3 Expl. in der Bodenstreu mit trockenen Schilfhalmen, 2.3.2013, leg. LANGE. (2/3)

Philorhizus sigma (ROSSI): Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue, Nähe Schwedensäule (MA 51), 1 Expl. unter toter Rinde, 20.4.2013, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf Gebüsch neben Weg, 25.5.2013, leg. HOFMANN. (V/3)

Philorhizus notatus STEPHENS: Rüdesheim, Niederwalddenkmal (MA 23), 1 Expl. an totem Eichen-Ast, 9.11.2013, leg. LANGE. (V)

Philorhizus melanocephalus DEJEAN: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf Gebüsch neben Weg, 25.5.2013, leg. HOFMANN. (-/V)

Dytiscidae

Oreodytes sanmarkii (SAHLBERG): Niedernhausen, Theißtal (MA 45), 1 Expl. unter Stein in Bach, 4.8.2013, leg. LANGE.

Agabus neglectus ERICHSON: Hanau–Steinheim, Gailenberg (MA 95), 1 Expl. in der Laubstreu in Mischwald, 17.4.2013, leg. BERGER, det. HOFMANN. (3)

Hydaticus transversalis (PONTOPPIDAN): Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 7 Expl. in Teich mit Rinderleber geködert, 16.8.2013, leg. LANGE.

Graphoderus austriacus (STURM): Bickenbach, Schifflache (MA 71), 1 Expl. abends neben Sumpfgebiet ans Licht geflogen, 2.8.2013, leg. HORN. – Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 9 Expl. in Teich mit Rinderleber geködert, 16.8.2013, leg. LANGE. (V)

Graphoderus zonatus (HOPPE): Bickenbach, Schifflache (MA 71), 2 Expl. abends neben Sumpfgebiet ans Licht geflogen, 2.8.2013, leg. HORN. (3)

Dytiscus dimidiatus BERGSTRÄSSER: Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 2 Expl. in Teich mit Rinderleber geködert, 16.8.2013, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. in Waldtümpel mit Rinderleber geködert, 5.9.2013, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigseiche (MA 63), 6 Expl. in Waldtümpel mit Rinderleber geködert, 5.9.2013, leg. LANGE. – Rüsselsheim, Mönchbruch (MA 63), 1 Expl. in ca. 30 cm Tiefe am Gewässergrund eines Waldtümpels ohne Wasserpflanzen, aber mit viel Laub, 3.10.2013, leg. LANGE. – Frankfurt–Schwanheim, Schwanheimer Wald (MA 64), 2 Expl. in Waldtteich mit Rinderleber geködert, 31.8.2013, leg. LANGE.

Dytiscus circumflexus FABRICIUS: Riedstadt–Erfelden, Bruderlöcher (MA 52), 5 Expl. in Teich mit Rinderleber geködert, 14.9.2013, leg. LANGE. – Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 8 Expl. in Teich mit Rinderleber geködert, 16.8.2013, leg. LANGE.

Cybister lateralimarginalis (DEGEER): Riedstadt–Erfelden, Bruderlöcher (MA 52), 1 Expl. in Teich mit Rinderleber geködert, 14.9.2013, leg. LANGE. – Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 2 Expl. in Teich mit Rinderleber geködert, 16.8.2013, leg. LANGE. (3)

Hydrophilidae

Laccobius obscuratus (ROTTENBERG): Schotten–Breungeshain, Forellenteiche (NA 19), 2 Expl. in Quellbach, 6.7.2013, leg. BERGER, det. HOFMANN. (3)

Hydrophilus piceus (LINNAEUS): Bickenbach, Schifflache (MA 71), 1 Expl. abends neben Sumpfgebiet ans Licht geflogen, ca. 15 weitere Expl. wurden gesehen, 2.8.2013, leg. HORN. (2)

Histeridae

Plegaderus dissectus ERICHSON: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 5 Expl. im weißfaulen Holz eines liegenden, rindenlosen Pappel-Stamms, 31.3.2013, leg. LANGE. – Wetzlar–Nauborn, Theutbirg-Basilika (MA 69), 1 Expl. im Mulm eines hohlen Apfelbaums, 18.4.2013, leg. RUPP. (3)

Abraeus granulum ERICHSON: Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. im Mulm einer Höhle in Buchen-Stamm mit Baumpilz im Inneren, 15.6.2013, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)

Platysoma elongatum (THUNBERG): Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 2 Expl. unter toter Kiefern-Rinde, 12.10.2013, leg. HÖHNER.

Silphidae

Ablattaria laevigata (FABRICIUS): Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue (MA 51), 1 Expl. unter Holzstück am Rand eines teilweise überschwemmten Ackers, 16.6.2013, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. auf betoniertem Feldweg zwischen Wiese und Acker, 16.6.2013, leg. LANGE. (2)

Cholevidae

Nemadus colonoides (KRAATZ): Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 11.-28.6.2013, leg. RUPP. – Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 28.6.-19.7.2013, leg. RUPP. – Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 2 Expl. in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese, 28.6.-8.7.2013, leg. RUPP. (3)

Choleva paskoviensis REITTER: Hofheim am Taunus–Wallau (MA 54), 2 Expl. in Barberfalle auf Erdwall neben Autobahnkreuz (A3/A66), 13.9.-24.10.2013, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER (1 Expl.). (3)

Leiodidae

Liodopria serricornis (GYLLENHAL): Bensheim–Hochstädten (MA 70), 1 Expl. im rotfaulen Holz einer liegenden Buche an der Kante eines Steinbruchs, 6.3.2013, leg. HORN. (3)

Amphicyllis globiformis (SAHLBERG): Eltville, Kloster Eberbach (MA 34), 1 Expl. an Statue aus Metall in parkartigem Klostergarten, 28.5.2013, leg. LANGE. (3)

Cyrtoplastus seriepunctatus (BRISOUT): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 7 Expl. auf bei Rheinhochwasser aus dem Wasser ragenden Holzstücken, 3.6.2013, leg. LANGE. (3)

Scydmaenidae

Scydmaenus hellwigii (HERBST): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. unter der toten Rinde einer Buche, 15.6.2013, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)

Staphylinidae

Siagonium quadricorne KIRBY: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 3 Expl. unter der Rinde einer liegenden Hybrid-Pappel, 13.10.2013, leg. LANGE. (3)

Siagonium humerale GERMAR: Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. unter der Rinde einer gelagerten Linde oder Pappel, 15.10.2013, leg. RUPP.

Thoracophorus corticinus MOTSCHULSKY: Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue, Nähe Schwedensäule (MA 51), 2 Expl. unter der Rinde und im morschen Holz eines liegenden, weißfaulen Pappel-Stamms, 14.4.2013, leg. LANGE. (1)

Phyllodrepa melanocephala (FABRICIUS): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Walnussbaum, 8.9.-15.10.2013, leg. RUPP. – Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 10.9.-9.10.2013, leg. RUPP. (3)

Phyllodrepa nigra (GRAVENHORST): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Linde, 4.-18.6.2013, leg. RUPP. (3)

Hapalaraea pygmaea (PAYKULL): Gießen, Philosophenwald (MB 70), je 1 Expl. 28.6.-19.7.2013, 16.8.-10.9.2013 und 10.9.-9.10.2013 in Fensterfalle an Linde, leg. RUPP. – Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 11.-28.6.2013, leg. RUPP. (3)

Carpelimus punctatellus (ERICHSON): Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 32 Expl. in Sandabgrabung in feuchtem, lehmigem Sand neben einer Wiese, 4.5.2013, leg. HOFMANN (6 Expl.), leg. HÖHNER (5 Expl.), leg. LANGE (21 Expl.). (3)

Bledius agricultor HEER: Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Walnussbaum, 18.6.-2.7.2013, leg. RUPP. Im Verzeichnis der Käfer Deutschlands (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, KÖHLER 2000, 2011) wird die Art nicht für Hessen gelistet. Dennoch finden sich bei HORION (1963) einige alte hessische Funde von Wiesbaden, Darmstadt und Bensheim. Das Exemplar von Ockstadt stellt somit einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 70 Jahren** dar! (3)

Stenus pubescens STEPHENS: Schotten–Breungeshain, Forellenteiche (NA 19), 1 Expl. auf Bergwiese, 6.7.2013, leg. HÖHNER.

Stenus glacialis HEER: Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 2 Expl. unterhalb einer Blockhalde in der Bodenstreu in Laubwald, 10.11.2013, leg. LANGE. – Dornburg–Frickhofen, Dornburg (MA 39), 3 Expl. unter Moos auf Steinen, 13.4.2013, leg. LANGE.

Hypnogyra angularis (GANGLBAUER): Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 2 Expl. unter alten Pilzen am Fuß einer Buche, 4.5.2013, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. im Mulm einer Höhle in Buchen-Stamm mit Baumpilz im Inneren, 15.6.2013, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Wetzlar–Steindorf, Weinberg, Eschkaut (MA 69), 1 Expl. im Mulm eines hohlen Apfelbaums, 11.4.2013, leg. RUPP. – Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, 24.5.-11.6.2013, leg. RUPP. – Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 28.6.-19.7.2013, leg. RUPP. (3)

Xantholinus elegans (OLIVIER): Babenhausen, In den Rödern (MA 93), 1 Expl. unter Heidekraut auf Sandboden, 29.8.2013, leg. HÖHNER.

Hesperus rufipennis (GRAVENHORST): Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 4 Expl. im feuchten Mulm eines hohlen Buchen-Stamms in Mischwald, 4.5.2013, leg. HOFMANN (3 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.). – Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. (2)

Platydracus chalcocephalus (FABRICIUS): Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue (MA 51), 1 Expl. auf Feldweg, 16.6.2013, leg. LANGE.

Ocypus fuscatus (GRAVENHORST): Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Bodenfalle in einem Bestand von *Polygonum bistorta* LINNAEUS (Schlangen-Knöterich), 25.-27.4.2013, leg. LANGE.

Tasgius pedator (GRAVENHORST): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. unter Brett in Auwald, 11.6.2013, leg. LANGE.

Quedius limbatus (HEER): Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 4 Expl. unterhalb einer Blockhalde in der Bodenstreu in Laubwald, 10.11.2013, leg. LANGE. (3)

Quedius semiobscurus (MARSHAM): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf einem bei Rheinhochwasser aus dem Wasser ragendem Holzstück, 3.6.2013, leg. LANGE.

Mycetoporus baudueri MULSANT & REY: Dornburg–Frickhofen, Dornburg (MA 39), 2 Expl. unter Moos auf Steinen, 12.12.2013, leg. LANGE.

Carphacis striatus (OLIVIER): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch (MA 63), 1 Expl. an frischem Fruchtkörper von *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) an liegendem Eichen-Stamm, 5.10.2013, leg. LANGE. (2)

Bolitobius castaneus boreomontanicus SCHÜLKE: Beerfelden–Olfen, NSG „Rotes Wasser" (MV 99), 1 Expl. in Barberfalle in Zwischenmoor, 18.-25.4.2013, leg. HORN.

Agaricochara latissima (STEPHENS): Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 3 Expl. 10.9.-9.10.2013 und 1 Expl. 13.11.-12.12.2013 in Fensterfalle an Bruchweide, leg. RUPP. (3)

Cyphea curtula (ERICHSON): Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. (2)

Alevonota gracilenta (ERICHSON): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Kirschbaum, 14.8.2013, leg. RUPP. (3)

Thamiaraea cinnamomea (GRAVENHORST): Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. 11.-28.6.2013 und 1 Expl. 10.9.-9.10.2013 in Fensterfalle an Linde, leg. RUPP. – Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Eiche, 4.-18.6.2013, leg. RUPP. (3)

Thamiaraea hospita (MÄRKEL): Braunfels–Neukirchen, Weipersgrund (MA 59), 2 Expl. unter Eichen-Rinde auf Klafterholzstapel, 30.6.2013, leg. RUPP. (2)

Pella lugens (GRAVENHORST) (= *Zyras lugens* (GRAVENHORST)): Frankfurt–Schwanheim, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. im sehr feuchten, braunfaulen Holz eines hohlen Stubbens von *Salix fragilis* LINNAEUS (Bruch-Weide), 1.9.2013, leg. LANGE.

Pella laticollis (MÄRKEL) (= *Zyras laticollis* (MÄRKEL): Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. in der Bodenstreu auf Kalk-Magerrasen, 4.5.2013, leg. BERGER, det. HÖHNER.

Zyras haworthi (STEPHENS): Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. in Hangwald unter der losen Rinde eines alten am Boden liegenden Hainbuchen-Stamms, 8.6.2013, leg. KUNZ. (3)

Amarochara bonnairei (FAUVEL): Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 11.-28.6.2013, leg. RUPP. (2)

Stichoglossa semirufa (ERICHSON): Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 28.6.-19.7.2013, leg. RUPP. (3)

Haploglossa marginalis (GRAVENHORST): Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, 24.5.-11.6.2013, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 2 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 28.6.-19.7.2013, leg. RUPP. (3)

Pselaphidae

Batrisodes buqueti (AUBÉ): Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 11.-28.6.2013, leg. RUPP. (2)

Bryaxis nodicornis (AUBÉ): Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 2 Expl. unterhalb einer Blockhalde in der Bodenstreu in Laubwald, 10.11.2013, leg. LANGE.

Brachygluta perforata (AUBÉ): Wiesbaden–Biebrich, Schloßpark (MA 44), 1 Expl. in der Streu am Boden, 12.10.2013, leg. LANGE. (3)

Cantharidae

Cantharis paradoxa HICKER: Beerfelden–Olfen, NSG „Rotes Wasser" (MV 99), 1 Expl. in Flugeklektor an Moorbirke in Zwischenmoor, 5.-12.6.2013, leg. HORN. (3)

Rhagonycha translucida (KRYNICKI): Schotten–Breungeshain, Forellenteiche (NA 19), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 6.7.2013, leg. KUNZ.

Rhagonycha atra (LINNAEUS): Schotten–Breungeshain, Forellenteiche (NA 19), 1 Expl. auf Gebüsch neben Weg, 6.7.2013, leg. HOFMANN.

Malachiidae

Hypebaeus flavipes (FABRICIUS): Braunfels, Tiergarten (MA 59), 9 Expl. in Pilzresten (eventuell *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling)) an Eiche, 16.4.2013, leg. RUPP. (3)

Clanoptilus elegans (OLIVIER): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), je 1 Expl. auf einer Wiese zwischen Weinbauflächen und auf Krautvegetation neben einem Weinbergweg, 8.6.2013, leg. HOFMANN, leg. KUNZ. (3)

Ebaeus thoracicus (FOURCROY): Schotten–Breungeshain, Forellenteiche (NA 19), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 6.7.2013, leg. KUNZ. (3)

Cleridae

Tillus elongatus (LINNAEUS): Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. auf der Vegetation einer Streuobstwiese, 30.5.2013, leg. RUPP. (3)

Tilloidea unifasciata (FABRICIUS): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Walnussbaum, 2.7.2013, leg. RUPP. (2)

Thanasimus femoralis (ZETTERSTEDT): Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Hausgarten angeflogen, 19.8.2013, leg. LANGE.

Dermestoides sanguinicollis (FABRICIUS): Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 3 Expl. an kleinem Eichen-Holzstück auf Waldboden, 6.6.2013, leg. BERGER. (1)

Trogossitidae

Thymalus limbatus (FABRICIUS): Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. an morschem Ast, 4.5.2013, leg. LANGE. (3)

Elateridae

Ampedus praeustus (FABRICIUS): Bensheim–Hochstädten (MA 70), 1 Expl. im rotfaulen Holz einer liegenden Kiefer an der Kante eines Steinbruchs, 3.4.2013, leg. HORN. (2)

Ampedus brunnicornis GERMAR: Braunfels, Tiergarten (MA 59), 1 Expl. im Inneren einer hohlen Eiche, 3.4.2013; 1 Expl. im rotfaulem Holz eines Eichen-Stumpfs, 16.4.2013; 1 Expl. im morschen Holz einer gestürzter Eiche, 29.10.2013, leg. RUPP. (1)

Ampedus nigerrimus (LACORDAIRE): Braunfels, Tiergarten (MA 59), 1 Expl. auf am Boden liegendem Eichen-Ast, 4.3.2013; 1 Expl. auf liegender Eiche und 6 Expl. im rotfaulen Holz eines Eichen-Stumpfs, 20.4.2013, leg. RUPP. (3)

Ampedus cinnabarinus (ESCHSCHOLTZ): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl. in morschem Pappel-Holz, 25.5.2013, leg. RUPP. (3)

Ampedus quercicola (BUYSSON): Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. auf Gebüsch an Waldrand, 4.5.2013, leg. LANGE. – Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 2 Expl. auf Gebüsch neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. HOFMANN, leg. KUNZ. – Braunfels, Tiergarten (MA 59), 2 Expl. unter toter Buchen-Rinde, 16.4.2013; am selben Fundort 1 Expl. an *Phellinus robustus* (KARSTEN) BOURDOT & GALZIN (Eichen-Feuerschwamm) an Eiche, 29.10.2013, leg. RUPP. – Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. auf Eschen-Ast, 2.7.2013, leg. RUPP. (3)

Ampedus elongatulus (FABRICIUS): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf Gebüsch neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. BERGER, det. RUPP. (3)

Ampedus elegantulus (SCHÖNHERR): Trebur, Treburer Unteraue (MA 53), 3 Expl. unter der Rinde eines liegenden Eichen-Stamms, zumindest 1 Expl. noch in der Puppenwiege, Larvenhaut noch vorhanden, 1.4.2013, leg. LANGE. (1)

Brachygonus megerlei (LACORDAIRE) Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, 8.-19.7.2013, leg. RUPP. (2)

Ischnodes sanguinicollis (PANZER): Braunfels, Tiergarten (MA 59), 2 Larven in rotfaulem Eichen-Holz, 20.4.2013, die Imagines schlüpften im Juli 2013, leg. RUPP. (1)

Procraerus tibialis (LACORDAIRE): Bensheim, Pfaffenrech (MA 70), 4 Expl. unter toter Buchen-Rinde, 4.5.2013, leg. RUPP. (2)

Melanotus brunnipes (GERMAR): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf Gebüsch neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. LANGE.

Melanotus crassicollis (ERICHSON): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 4 Expl. auf Gebüsch neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. BERGER (1 Expl.), det. RUPP, leg. LANGE (3 Expl.).

Haplotarsus incanus (GYLLENHAL): Schotten–Breungeshain, Forellenteiche (NA 19), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte auf einer Wiese, 6.7.2013, leg. HÖHNER.

Hypoganus inunctus (LACORDAIRE): Wetzlar, Weinberg (MA 69), je 1 Expl. unter Eichen- bzw. Weiden-Rinde, 15.5.2013, leg. RUPP. (3)

Denticollis rubens PILLER & MITTERPACHER: Braunfels, Tiergarten (MA 59), je 1 Expl. in weißfaulem Buchen- und morschem Hainbuchen-Holz, 20.4.2013, leg. RUPP. (2)

Stenagostus rhombeus (OLIVIER): Ginsheim-Gustavsburg, Nonnenau (MA 53), 2 Larven im schwarzbraunen Mulm unter der Rinde eines liegenden Pappel-Stamms, die Tiere wurden am 15.4.2012 eingetragen und danach in beheiztem Raum gelagert, die Imagines schlüpften am 9.2. bzw. 9.4.2013, leg. LANGE. – Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 3 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Kirschbaum, 17.7.-14.8.2013, leg. RUPP. (3)

Cardiophorus nigerrimus ERICHSON: Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf Blüte von *Rosa canina* LINNAEUS (Hunds-Rose) neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. RUPP. – Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 8.6.2013, leg. LANGE. (3)

Cardiophorus atramentarius ERICHSON: Nauheim (MA 53), 1 Expl. auf Gebüsch neben alter Streuobstwiese, 31.5.2013, leg. LANGE. (2)

Cerophytidae

Cerophytum elateroides LATREILLE: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. in altem *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Pappel, 25.5.2013, leg. RUPP. (2)

Eucnemidae

Eucnemis capucina AHRENS: Wetzlar–Steindorf, Weinberg, Eschkaut (MA 69), 1 Expl. im Mulm eines hohlen Apfelbaums, 11.4.2013, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 24.5.-11.6.2013, leg. RUPP. – Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 2 Expl. in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese, 24.5.-11.6.2013, leg. RUPP. (3)

Dromaeolus barnabita (VILLA): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Walnussbaum, 2.-17.7.2013, leg. RUPP. (2)

Microrhagus pygmaeus (FABRICIUS) (= *Dirhagus pygmaeus* (FABRICIUS)): Wetzlar, Nähe Ruine Kalsmunt (MA 69), 1 Expl. in Wintergarten geflogen, 8.7.2013, leg. RUPP. (3)

Microrhagus lepidus (ROSENHAUER) (= *Dirhagus lepidus* (ROSENHAUER)): Morschen–Neumorschen, Halberg (NB 45), 2 Expl. in Malaisefalle auf Kalk-Magerrasen, je 1 Expl. 10.6.-1.7.2013 und 1.7.-19.7.2013, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER (1 Expl.). (3)

Hylis olexai (PALM): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Eiche, 2.-17.7.2013, leg. RUPP. (3)

Buprestidae

Anthaxia candens (PANZER): Hofheim am Taunus–Wallau (MA 54), 2 Expl. auf Gebüsch neben Autobahnkreuz (A3/A66), 14.5.2013, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER. – Braunfels, Lustwäldchen (MA 59), 1 Expl. (Totfund) unter der Rinde eines Pflaumenbaums, 10.7.2013, leg. RUPP. – Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 2 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Kirschbaum, 4.-18.6.2013, leg. RUPP. – Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. (Totfund) unter der Rinde eines Birnbaums auf Streuobstwiese, 24.5.2013, leg. RUPP. (2)

Anthaxia salicis (FABRICIUS): Bensheim, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. auf trockenem Obstbaum-Reisig, 4.5.2013, leg. RUPP. (3)

Agrilus cyanescens RATZEBURG: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl. an *Lonicera xylosteum* LINNAEUS (Rote Heckenkirsche), 11.6.2013, leg. LANGE.

Agrilus pratensis RATZEBURG: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 8 Expl. an Pappel-Stockausschlägen, 25.7.2013, leg. LANGE.

Habroloma nana (PAYKULL): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 6 Expl. auf *Geranium sanguineum* LINNAEUS (Blutroter Storchschnabel) neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. LANGE. (3)

Trachys scrobiculatus KIESENWETTER: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. an aus dem Wasser ragendem Holzstück in überschwemmtem Eichen-Wald, 13.4.2013, leg. LANGE. – Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Hausgarten am Boden, 24.9.2013, leg. LANGE.

Trachys fragariae BRISOUT: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 12 Expl. auf bei Rheinhochwasser aus dem Wasser ragenden Pflanzen, 4.6.2013, leg. LANGE. (3)

Clambidae

Clambus pallidulus REITTER: Wiesbaden–Biebrich, Schloßpark (MA 44), 1 Expl. in der Streu am Boden, 8.2.2011, leg. LANGE. Deutsche Funde dieser Art lagen bislang von Bayern, der Pfalz, dem Rheinland, dem Saarland, vom Nordrhein, Westfalen, Hannover, dem Niederelbegebiet, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern

und Sachsen vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, KÖHLER 2000, 2011). Da bislang keine hessischen Funde bekannt waren, stellt das Exemplar von Wiesbaden einen **Neunachweis in Hessen** dar! (2)

Scirtidae

Elodes pseudominuta KLAUSNITZER: Schotten–Breungeshain, Forellenteiche (NA 19), 1 Expl. auf Vegetation am Ufer eines Teichs, 6.7.2013, leg. HOFMANN.

Elmidae

Esolus angustatus (MÜLLER): Schmitten–Niederreifenberg, Reifenberger Wiese (MA 66), 2 Expl. unter Stein im Wasser der Weil, 18.5.2013, leg. HÖHNER.

Dermestidae

Attagenus schaefferi (HERBST): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. unter der toten Rinde einer Buche, 15.6.2013, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Wohnung, 27.1.2013, leg. LANGE.

Trogoderma versicolor (CREUTZER): Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 1 Expl. in Hausgarten fliegend, 21.7.2013, leg. BRENNER. – Aßlar, Kanhard (MB 60), 5 Expl. hinter Dachspeicherfenster in Wohnhaus (Totfund), 13.11.2013, leg. RUPP.

Globicornis nigripes (FABRICIUS): Wetzlar–Nauborn, Wetzbachtal, Dickesmühle (MA 69), 1 Expl. auf Vegetation am Rand eines Wegs, 15.6.2013, leg. RUPP. – Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese, 24.5.-11.6.2013, leg. RUPP. – Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. auf Linden-Ast, 11.6.2013, leg. RUPP. (3)

Megatoma undata (LINNAEUS): Hanau, Innenstadt (MA 95), 1 Expl. an Haus angeflogen, 22.9.2013, leg. BERGER. – Hanau–Steinheim, Gailenberg (MA 95), 1 Expl. in der Laubstreu in Mischwald, 17.4.2013, leg. BERGER. – Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese, 24.5.-11.6.2013, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 28.6.-19.7.2013, leg. RUPP. (3)

Trinodes hirtus (FABRICIUS): Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 28.6.-19.7.2013, leg. RUPP. – Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), je 3 Expl. 11.-28.6.2013 und 28.6.-19.7.2013 in Fensterfalle an Eiche, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), je 1 Expl. 11.-28.6.2013 und 28.6.-19.7.2013 in Fensterfalle an Bruchweide, leg. RUPP. (3)

Anthrenocerus australis (HOPE): Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Wohnung, 1.3.2013, leg. LANGE.

Nosodendridae

Nosodendron fasciculare (OLIVIER): Beerfelden–Olfen, NSG „Rotes Wasser" (MV 99), 1 Expl. in Barberfalle in Zwischenmoor, 12.-17.6.2013, leg. HORN. (3)

Byrrhidae

Byrrhus arietinus STEFFAN: Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 2 Expl. in der Bodenstreu, 10.11.2013, leg. LANGE.

Cerylonidae

Philothermus evanescens REITTER: Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue, Nähe Schwedensäule (MA 51), 5 Expl. unter der Rinde und im weißfaulen Holz eines

liegenden Pappel-Stamms, 14.4.2013, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 15 Expl. im weißfaulen Holz eines liegenden, rindenlosen Pappel-Stamms, 31.3.2013, leg. LANGE. (1)

Nitidulidae

Meligethes obscurus ERICHSON: Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf *Teucrium scorodonia* LINNAEUS (Salbei-Gamander) in Eichen-Niederwald, 8.6.2013, leg. HOFMANN. (3)

Epuraea distincta (GRIMMER): Wetzlar, Weinberg (MA 69), 7 Expl. an *Trametes versicolor* (LINNAEUS ex FRIES) PILÁT (?) (Schmetterlings-Tramete) an Bruchweide, 15.5.2013; am selben Fundort 4 Expl. unter der toten Rinde einer Bruchweide, 3.6.2013, leg. RUPP. Bis vor einiger Zeit waren aktuelle deutsche Funde dieser Art nur von Bayern, dem Rheinland und vom Nordrhein bekannt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). In den letzten Jahren jedoch wurde sie zusätzlich von Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Westfalen gemeldet (KÖHLER 2011). Darüber hinaus zeigt das Verzeichnis der Käfer Deutschlands im Internet (www.colkat.de), dass mittlerweile aus fast allen Bundesländern mit Ausnahme des Saarlands und Mecklenburg-Vorpommerns Nachweise vorliegen. Die Art scheint also in der Ausbreitung begriffen zu sein. Da bislang keine hessischen Funde bekannt waren, stellen die Tiere von Wetzlar einen **Neunachweis in Hessen** dar! (3)

Stelidota geminata (SAY): Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. in der Laubstreu eines Eichenwalds, 8.6.2013, leg. LANGE. – Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. im Mulm einer Höhle in Buchen-Stamm, 19.10.2013, leg. BERGER, vid. HÖHNER. Diese aus Amerika stammende Adventivart wurde in Deutschland im Jahr 2007 erstmals in Baden in der Nähe des Kaiserstuhls nachgewiesen (KÖHLER 2007). Vorher wurde sie nach Asien und danach ins Mittelmeergebiet verschleppt; auch in Österreich (Kärnten) wurde sie inzwischen gefunden. Mittlerweile wurden weitere Funde aus Baden, Württemberg, der Pfalz und aus Hessen gemeldet (KÖHLER 2007, 2011). Darüber hinaus zeigt das Verzeichnis der Käfer Deutschlands im Internet (www.colkat.de) einen weiteren Nachweis aus Bayern.

Ipidia binotata REITTER: Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. unter der toten Rinde einer liegenden Kiefer, 4.10.2013, leg. BERGER. KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) sowie KÖHLER (2011) kennen deutsche Funde aus Bayern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Aus Hessen war bislang kein Fund bekannt geworden, so dass das Tier von Rüsselsheim einen **Neunachweis in Hessen** darstellt! (1)

Cychramus variegatus (HERBST): Beerfelden–Olfen, NSG „Rotes Wasser" (MV 99), 1 Expl. Flugeklektor an Eiche in Zwischenmoor, 5.-12.6.2013, leg. HORN. KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) sowie KÖHLER (2011) kennen deutsche Funde aus Bayern, Baden, Württemberg, der Pfalz, dem Rheinland, vom Nordrhein und Westfalen sowie von Thüringen und Sachsen. Aus Hessen war bislang kein Fund bekannt geworden, so dass das Exemplar von Olfen einen **Neunachweis in Hessen** darstellt!

Cybocephalidae

Cybocephalus fodori ENDRÖDY-YOUNGA: Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. 28.6.-8.7.2013 und 3 Expl. 8.-19.7.2013 in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, leg. RUPP. (3)

Erotylidae

Triplax lepida (FALDERMANN): Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 2 Expl. im Mulm einer Höhle in Buchen-Stamm mit Baumpilz im Inneren, 15.6.2013, leg. BERGER. (2)

Triplax rufipes (FABRICIUS): Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf totem Laubholz-Ast, 8.6.2013, leg. LANGE. (1)

Cryptophagidae

55-.008-.020-. *Cryptophagus micaceus* REY: Gießen, Philosophenwald (MB 70), 2 Expl. 19.7.-16.8.2013, 1 Expl. 16.8.-10.9.2013 und 1 Expl. 10.9.-9.10.2013 in Fensterfalle an Linde, leg. RUPP. (2)

Antherophagus similis CURTIS: Im 13. Bericht dieser Serie (BRENNER 2006) wurde folgender Fund der Art gemeldet: *Antherophagus pallens* (LINNAEUS): Schotten (NA 19), 1 Expl. an Grashalm auf Feuchtwiese, 20.7.2002, leg. LANGE. LOHSE (1967) verwendet den Namen *A. pallens* (OLIVIER) (Codenummer 3). KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) sprechen die Autorenschaft allerdings LINNAEUS (in Klammern) zu (ebenfalls Codenummer 3). Im Verzeichnis der Käfer Deutschlands im Internet (www.colkat.de) wird der Name *A. pallens* LINNAEUS nun freilich für die Art mit dem EDV-Code 001-. verwandt; der ehemalige *A. pallens* (OLIVIER) heißt dort nun *A. similis* CURTIS. Da sich die Nomenklatur der Arten der Gattung *Antherophagus* offenbar geändert hat, lässt sich nunmehr ohne den Zusatz der Quelle des Namens bzw. ohne den EDV-Code nicht mehr erkennen, um welche Art es sich bei *A. pallens* (LINNAEUS) handelt. Um die Artzugehörigkeit des Funds von Schotten eindeutig zuzuordnen, sei hier vermerkt, dass es sich um die nun *A. similis* CURTIS genannte Art handelt. Die dritte in Deutschland vorkommende Art (Codenummer 002-.) heißt nun *A. silaceus* HERBST (www.colkat.de, ESSER 2014). Es wäre wünschenswert, die Namen so umzugestalten, dass eine Eindeutigkeit wieder gewährleistet ist. Die Nomenklaturregeln geben dies sicher her.

Languriidae

Cryptophilus integer (HEER): Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 6 Expl. in feuchtem, verpilztem Heu in teilweise eingestürzter Hütte, 4.5.2013, leg. LANGE.

Phalacridae

Phalacrus corruscus (PANZER): Kiedrich (MA 34), 1 Expl. auf Blüte von *Anthemis arvensis* LINNAEUS (Acker-Hundskamille), 28.5.2013, leg. LANGE.

Laemophloeidae

Cryptolestes spartii (CURTIS): Babenhausen, In den Rödern (MA 93), 1 Expl. auf trockenem Ast von *Cytisus scoparius* (LINNAEUS) LINK (= *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH) (Besenginster) in Sandgebiet, 29.8.2013, leg. HÖHNER. (3)

Latridiidae

Enicmus brevicornis (MANNERHEIM): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Kirschbaum, 17.7.-14.8.2013, leg. RUPP. (3)

Enicmus testaceus (STEPHENS): Gießen, Philosophenwald (MB 70), je 1 Expl. 24.5.-11.6.2013 und 28.6.-19.7.2013 in Fensterfalle an Linde, leg. RUPP. (2)

Mycetophagidae

Triphyllus bicolor (FABRICIUS): Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 16.8.-10.9.2013, leg. RUPP. (3)

Mycetophagus piceus (FABRICIUS): Braunfels, Tiergarten (MA 59), 1 Expl. unter Buchen-Rinde, 7.6.2013, leg. RUPP. (3)

Mycetophagus multipunctatus FABRICIUS: Bensheim, Pfaffenrech (MA 70), 31 Expl. an *Polyporus squamosus* (HUDSON) FRIES (Schuppiger Stiel-Porling) in Buchen-Stammhöhle, 4.5.2013, leg. RUPP. – Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. an Fruchtkörper von *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) an Weide, 28.12.2013, leg. LANGE. (3)

Berginus tamarisci WOLLASTON: Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), je 1 Expl. 4.-18.6.2013 und 17.7.-14.8.2013 in kleinem Flug-Eklektor an Kirschbaum, leg. RUPP. – Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. 28.6.-8.7.2013 und 2 Expl. 16.8.-10.9.2013 in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese sowie 1 Expl. 24.5.-11.6.2013 in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 2 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 24.5.-11.6.2013, leg. RUPP.

Colydiidae

Rhopalocerus rondanii (VILLA): Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue, Nähe Schwedensäule (MA 51), 13 Expl. unter der Rinde und im morschen Holz eines liegenden, weißfaulen Pappel-Stamms, 14.4.2013, leg. LANGE. (1)

Coxelus pictus (STURM): Rüdesheim, Niederwalddenkmal (MA 23), 1 Expl. auf totem Eichen-Ast, 9.11.2013, leg. LANGE. (1)

Cicones variegatus (HELLWIG): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Walnussbaum, 8.9.-15.10.2013, leg. RUPP. – Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 28.6.-19.7.2013, leg. RUPP. (3)

Cicones undatus (GUÉRIN): Hofheim am Taunus–Wildsachsen (MA 55), 3 Expl. unter der trockenen Rinde eines toten Bergahorn-Stamms, 3.2.2013, leg. LANGE. – Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. (3)

Colydium elongatum (FABRICIUS): Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. auf der Schnittfläche eines gefällten Eichen-Stamms, 6.6.2013, leg. BERGER. (3)

Corylophidae

Corylophus cassidoides (MARSHAM): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. an einem bei Rheinhochwasser aus dem Wasser ragenden Holzstück, 3.6.2013, leg. LANGE.

Orthoperus nigrescens STEPHENS: Wiesbaden–Biebrich, Schloßpark (MA 44), 1 Expl. in der Streu am Boden, 17.11.2013, leg. LANGE. (2)

Endomychidae

Symbiotes gibberosus (Lucas): Nauheim (MA 53), 1 Expl. in mit Pferdekot durchsetztem Strohhaufen, 31.5.2013, leg. LANGE. – Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), je 1 Expl. 11.-28.6.2013 und 28.6.-8.7.2013 in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, leg. RUPP. (2)

Coccinellidae

Cynegetis impunctata (LINNAEUS): Hofheim am Taunus–Wallau (MA 54), 2 Expl. auf Gebüsch neben Autobahnkreuz (A3/A66), 14.5.2013, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER (1 Expl.). – Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Bodenfalle in einem Bestand von *Polygonum bistorta* LINNAEUS (Schlangen-Knöterich), 25.-27.4.2013, leg. LANGE.

Scymnus ater KUGELANN: Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 24.5.-11.6.2013, leg. RUPP. (2)

Nephus quadrimaculatus (HERBST): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 2 Expl. auf Gebüsch neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. LANGE. (3)

Hyperaspis campestris (HERBST): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 2 Expl. in der Streu unter Heidelbeer-Sträuchern, 21.12.2013, leg. LANGE.

Halyzia sedecimguttata (LINNAEUS): Steinau an der Straße, Weinberg (NA 37), 1 Expl. im Moos unter Gebüsch, 14.4.2013, leg. BERGER. (3)

Cisidae

Ropalodontus perforatus (GYLLENHAL): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl. an altem *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an abgestorbener Hybridpappel, 25.5.2013, leg. HOFMANN, leg. RUPP. – Braunfels, Tiergarten (MA 59), 2 Expl. an altem Pilz an Rosskastanie, 20.4.2013; am selben Fundort 1 Expl. 16.4.2013 und 4 Expl. 7.6.2013 an altem Baumpilz an Eiche, leg. RUPP. (3)

Sulcacis bidentulus (ROSENHAUER): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Eiche, 17.7.-14.8.2013, leg. RUPP. (2)

Cis fagi WALTL: Wetzlar, Weinberg (MA 69), 2 Expl. an *Trametes versicolor* (LINNAEUS ex FRIES) PILÁT (Schmetterlings-Tramete) an Bruchweide, 3.6.2013, leg RUPP.

Orthocis vestitus (MELLIÉ): Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf Eichen-Ast in Eichen-Niederwald, 8.6.2013, leg. HOFMANN.

Anobiidae

Hedobia regalis (DUFTSCHMID): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf Laubbaum-Ast, 11.6.2013, leg. LANGE. (2)

Dryophilus anobioides CHEVROLAT: Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf blühendem *Cytisus scoparius* (LINNAEUS) LINK (= *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH) (Besenginster) auf Waldlichtung, 25.5.2013, leg. HÖHNER. (2)

Homophthalmus rugicollis (MULSANT & REY) (= *Dryophilus rugicollis* MULSANT & REY): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 13 Expl. auf alten Ranken von *Clematis vitalba* LINNAEUS (Gemeine Waldrebe) an Waldrand auf Weinberg, 8.6.2013, leg. KUNZ (2 Expl.), leg. LANGE (11 Expl.); am selben Fundort 2 Expl. an *Rosa canina* LINNAEUS (Hunds-Rose) oder an *Clematis vitalba* LINNAEUS, die dicht vergesellschaftet am Stamm einer *Prunus avium* LINNAEUS (Süß-Kirsche) neben einem Weg auf einem Weinberg wuchsen, 8.6.2013, leg. RUPP.

Ochina ptinoides (MARSHAM): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 15 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. KUNZ (3 Expl.), leg. LANGE (4 Expl.), leg. RUPP (9 Expl.). (3)

Oligomerus brunneus (OLIVIER): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 2 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Kirschbaum, 2.-17.7.2013, leg. RUPP. – Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 3 Expl. 8.-19.7.2013 und 1 Expl. 19.-27.7.2013 in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese, leg. RUPP. – Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. (3)

Gastrallus immarginatus (MÜLLER): Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. (3)

Gastrallus laevigatus (OLIVIER): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. 17.7.-14.8.2013 in kleinem Flug-Eklektor an Eiche; am selben Fundort je 1 Expl. 17.7.-14.8.2013 und 14.8.-8.9.2013 in kleinem Flug-Eklektor an Walnussbaum, leg. RUPP. (2)

Anobium denticolle (CREUTZER): Bensheim, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. unter toter Buchen-Rinde, 4.5.2013, leg. RUPP. – Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. unter Moos, 25.12.2013, leg. LANGE. – Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. unter der toten Rinde eines Walnussbaums, 24.4.2013; am selben Fundort 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Walnussbaum, 2.-17.7.2013, leg. RUPP. – Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 1 Expl. in Hausgarten nachts ans Licht geflogen, 13.7.2013, leg. BRENNER. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 28.6.-19.7.2013, leg. RUPP. – Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 11.-28.6.2013, leg. RUPP. (3)

Xyletinus ater (CREUTZER): Friedewald, Dreienberg (NB 63), 1 Expl. auf Laubwaldwiese, 1.6.2008, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER. – Morschen–Neumorschen, Halberg (NB 45), 6 Expl. in Malaisefallen auf Kalk-Magerrasen, 28.6.-10.7.2012 (1 Expl.), 3.5.-1.6.2013 (2 Expl.), 1.-10.6.2013 (1 Expl.), 10.6.-1.7.2013 (2 Expl.), leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER (1 Expl.). – Cornberg–Rockensüß, Eschkopf (NB 55), 1 Expl. in Malaisefalle auf Kalk-Magerrasen, 28.5.-28.6.2012, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER. Die einzigen bekannt gewordenen Funde aus Hessen scheinen die alten von HEYDEN (1904) genannten aus Frankfurt zu sein. Deshalb stellen die Tiere von Friedewald, Neumorschen und Rockensüß **Wiederfunde in Hessen seit mehr als 100 Jahren** dar!

Mesocoelopus niger (MÜLLER): Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 1 Expl. in Hausgarten fliegend, 20.7.2013, leg. BRENNER. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. (3)

Dorcatoma setosella MULSANT & REY: Braunfels, Tiergarten (MA 59), 6 Expl. an *Phellinus robustus* (KARSTEN) BOURDOT & GALZIN (Eichen-Feuerschwamm) an Eiche, 29.10.2013, leg. RUPP. – Wetzlar, Weinberg (MA 69), 2 Expl. an *Phellinus* (?) (Feuerschwamm) an Apfelbaum, 3.6.2013, leg. RUPP. – Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 2 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 4 Expl. 11.-28.6.2013 und 10 Expl. 28.6.-19.7.2013 in Fensterfalle an Bruchweide, leg. RUPP. (2)

Dorcatoma chrysomelina STURM: Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. 24.5.-11.6.2013, 1 Expl. 28.6.-8.7.2013, 2 Expl. 8.-19.7.2013 und 2 Expl. 19.-27.7.2013 in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese; am selben Fundort 1 Expl. in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, 19.-27.7.2013, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 6 Expl. 11.-28.6.2013 und 3 Expl. 28.6.-19.7.2013 in Fensterfalle an Bruchweide, leg. RUPP. (3)

Dorcatoma substriata HUMMEL: Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. (2)

Dorcatoma minor ZAHRADNIK: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. unter Pappel-Rinde, 25.5.2013, leg. RUPP. – Braunfels, Tiergarten (MA 59), 3 Expl. an Pilzresten (*Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (?) (Schwefelporling)) an Eiche, 16.3.2013; 28 weitere Expl. schlüpften vom 16.4.2013 bis Ende Mai 2013 aus den eingetragenen Pilzen, leg. RUPP.

Dorcatoma punctulata MULSANT & REY: Schmitten–Niederreifenberg, Reifenberger Wiese (MA 66), 1 Expl. auf *Fomitopsis pinicola* (SWARTZ ex FRIES) KARSTEN

(Rotrandiger Baumschwamm) an Buche in Mischwald, 22.6.2013, leg. HÖHNER. (2)

Dorcatoma dresdensis HERBST: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. an altem *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Pappel, 25.5.2013, leg. RUPP. – Braunfels, Tiergarten (MA 59), 15 Expl. an Pilzresten (*Fomes fomentarius* ?) an Buche, 16.4.2013, leg. RUPP. – Wetzlar, Weinberg (MA 69), 6 Expl. im Mulm unter Weiden-Rinde, 3.6.2013, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. 24.5.-11.6.2013 und 2 Expl. 11.-28.6.2013 in Fensterfalle an Bruchweide, leg. RUPP. (3)

Dorcatoma robusta STRAND: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 3 Expl. an altem *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Pappel, 25.5.2013, leg. RUPP; am selben Fundort 1 Expl. auf Gras neben gefällter Hybridpappel, 25.5.2013, leg. HOFMANN. – Braunfels, Tiergarten (MA 59), 57 Expl. schlüpften vom 16.4.2013 bis Ende Mai 2013 aus einem am 16.3.2013 eingetragenem altem Pilz (*Fomes*?, *Phellinus*?), der am Boden lag, leg. RUPP. (2)

Ptinidae

Ptinus pilosus MÜLLER: Rüdesheim, Niederwalddenkmal (MA 23), 5 Expl. auf toten Eichen-Ästen, 9.11.2013, leg. LANGE. (3)

Oedemeridae

Nacerdes carniolica (GISTL): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), je 1 Expl. in kleinen Flug-Eklektoren an Eiche und Kirschbaum, 17.7.-14.8.2013, leg. RUPP. – Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. auf Eichen-Ast an Waldrand, 11.7.2013, leg. KUNZ. (3)

Ischnomera sanguinicollis (FABRICIUS): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf Zitterpappel-Ast auf Waldlichtung, 25.5.2013, leg. HÖHNER. (3)

Ischnomera caerulea (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 25.5.2013, leg. RUPP. – Schotten–Breungeshain, Forellenteiche (NA 19), 1 Expl. auf Gebüsch neben Waldweg, 6.7.2013, leg. HOFMANN. – Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 24.5.-11.6.2013, leg. RUPP. (3)

Oedemera femoralis (OLIVIER): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. RUPP. – Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), je 1 Expl. auf Gebüsch in Eichen-Niederwald und auf Gebüsch am Waldrand, 8.6.2013, leg. HOFMANN. (2)

Scraptiidae

Scraptia fuscula MÜLLER: Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Kirschbaum, 14.8.-8.9.2013, leg. RUPP. – Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. auf der Vegetation einer Streuobstwiese, 30.5.2013; am selben Fundort 9 Expl. 28.6.-8.7.2013, 26 Expl. 8.-19.7.2013, 6 Expl. 19.-27.7.2013, 2 Expl. 27.7.-16.8.2013 und 1 Expl. 16.8.-10.9.2013 in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese, leg. RUPP. – Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. – Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 9 Expl. 28.6.-19.7.2013 und 5 Expl. 19.7.-16.8.2013 in Fensterfalle an Bruchweide, leg. RUPP. (3)

Cyrtanaspis phalerata (GERMAR): Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 28.6.-19.7.2013, leg. RUPP. (2)

Anaspis lurida STEPHENS: Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. an trockenem Kirschbaum-Ast, 2.7.2013, leg. RUPP. (3)

Anaspis ruficollis (FABRICIUS): Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. (2)

Anaspis pulicaria COSTA: Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 2 Expl. auf Gebüsch an Waldrand auf Weinberg, 8.6.2013, leg. HOFMANN, leg. LANGE. (3)

Anaspis regimbarti SCHILSKY: Hadamar, Galgenberg (MA 38), 1 Expl. auf Apfelbaum-Ast auf Streuobstwiese, 20.7.2013, leg. KUNZ.

Aderidae

Aderus populneus (CREUTZER): Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 16.8.-10.9.2013, leg. RUPP. (3)

Euglenes oculatus (PAYKULL): Wetzlar, Nähe Ruine Kalsmunt (MA 69), 1 Expl. in Wintergarten geflogen, 8.7.2013, leg. RUPP. – Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 11.-28.6.2013, leg. RUPP. (2)

Meloidae

Meloe decorus BRANDT & ERICHSON: Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue, Nähe Schwedensäule (MA 51), 1 Expl. auf Hochwasserschutzdamm im Auwald, 14.4.2013, leg. LANGE. – Riedstadt–Erfelden, Kühkopf, Krappenschlag (MA 62), 1 Expl. auf Wiesenweg, 21.4.2013; am selben Fundort 1 Expl. in Bodenfalle auf Wiese, 24.4.-1.5.2013, leg. BERGER. (1)

Meloe rugosus MARSHAM: Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 5 Expl. auf besonntem Weg an Mischwaldrand laufend, 19.10.2013, leg. BERGER (4 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.). (1)

Mordellidae

Hoshihananomia perlata (SULZER): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf Blüte neben gefällter Hybridpappel, 25.5.2013, leg. HOFMANN. (2)

Curtimorda maculosa (NAEZEN): Freiensteinau–Ober-Moos (NA 28), 3 Expl. in Malaisefalle auf Mischwald-Windwurffläche, 21.-29.5.2012 (2 Expl.) und 29.5.-18.6. 2012 (1 Expl.), leg. FLÜGEL, det. HÖHNER. – Kirchhain–Stausebach (MB 93), 1 Expl. auf Kalk-Magerrasen, 5.5.2013, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER (1 Expl.). (3)

Mordellistena weisei SCHILSKY: Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 3 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris* LINNAEUS (Gemeiner Beifuß) an Waldrand, die Stängel wurden am 11.2.2013 eingetragen und danach in beheiztem Raum gelagert, die Käfer schlüpften vom 15.-20.3.2013, leg. KUNZ. (3)

Mordellistena purpureonigrans ERMISCH: Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf krautiger Vegetation an Wegrand, 8.6.2013, leg. LANGE, det. HOFMANN.

Mordellistena acuticollis SCHILSKY: Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 14 Expl. in Stängeln von *Artemisia vulgaris* LINNAEUS (Gemeiner Beifuß) an Waldrand, die Stängel wurden am 11.2.2013 eingetragen und danach in beheiztem Raum gelagert, die Käfer schlüpften vom 15.-20.3.2013, leg KUNZ. (3)

Melandryidae

Orchesia luteipalpis MULSANT: Rüsselsheim, Mönchbruch (MA 63), 8 Expl. in Fruchtkörpern von *Inonotus radiatus* (SOWERBY ex FRIES) KARSTEN (Erlen-Schillerporling) an totem Erlen-Stamm, 3.10.2013, leg. LANGE. (2)

Anisoxya fuscula (ILLIGER) Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Apfelbaum auf Streuobstwiese, 8.-19.7.2013; am selben Fundort 1 Expl. 27.7.-16.8.2013 und 3 Expl. 16.8.-10.9.2013 in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese, leg. RUPP. – Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 16.8.-10.9.2013, leg. RUPP. (3)

Phloiotrya rufipes (GYLLENHAL): Braunfels–Neukirchen, Weipersgrund (MA 59), 1 Expl. an Eichen-Holz auf Klafterholzstapel, 30.6.2013, leg. RUPP. – Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 19.7.-16.8.2013, leg. RUPP. (3)

Hypulus quercinus (QUENSEL): Rüsselsheim, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 1 Expl. in der Bodenstreu in Laubwald, 1.5.2013, leg. BERGER. (2)

Melandrya caraboides (LINNAEUS): Beerfelden–Olfen, NSG „Rotes Wasser" (MV 99), 1 Expl. in Flugklektor an Moorbirke in Zwischenmoor, 5.-12.6.2013, leg. HORN. – Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf Gebüsch neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. BERGER. – Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 6.6.2013, leg. BERGER. – Schotten–Breungeshain, Forellenteiche (NA 19), 1 Expl. in Buchenwald fliegend, 6.7.2013, leg. KUNZ. – Wetzlar, Weinberg (MA 69), 1 Expl. unter der toten Rinde einer Bruchweide, 15.5.2013, leg. RUPP. (3)

Conopalpus brevicollis KRAATZ: Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 10 Expl. auf Eichen-Ästen in Eichen-Niederwald, 8.6.2013, leg. HOFMANN (4 Expl.), leg. LANGE (6 Expl.); am selben Fundort 2 Expl. auf Sträuchern neben Weg, 8.6.2013, leg. KUNZ; am selben Fundort 1 Expl. unter der trockenen Rinde einer Buche, 8.6.2013, leg. RUPP. (2)

Osphya bipunctata (FABRICIUS): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf Zitterpappel-Ast auf Waldlichtung, 25.5.2013, leg. HÖHNER. (2)

Tetratomidae

Tetratoma desmarestii LATREILLE: Rüdesheim, Niederwalddenkmal (MA 23), 2 Expl. auf dem verpilzten Stamm einer toten, stehenden Eiche, 9.11.2013, leg. LANGE. (1)

Alleculidae

Allecula rhenana BACH: Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Walnussbaum, 17.7.-14.8.2013, leg. RUPP. (2)

Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus (LINNAEUS): Bensheim–Hochstädten (MA 70), 3 Expl. im rotfaulen Holz einer Buche an der Kante eines Steinbruchs, 6.3.2013, leg. HORN. – Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl. an altem *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an abgestorbener Hybridpappel, 25.5.2013, leg. HOFMANN. – Braunfels, Tiergarten (MA 59), 1 Expl. an altem Baumpilz an Eiche, 16.4.2013, leg. RUPP. (3)

Neomida haemorrhoidalis (FABRICIUS): Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue, Nähe Schwedensäule (MA 51), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden, weißfaulen Pappel-Stamms, 14.4.2013, leg. LANGE. (1)

Platydema violaceum (FABRICIUS): Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. unter toter Rinde einer Eiche in Eichen-Niederwald, 8.6.2013, leg. HOFMANN. – Wetzlar, Weinberg (MA 69), 1 Expl. am 5.5.2013 und 2 Expl. am 15.5.2013 unter der toten Rinde einer Eiche, leg. RUPP. (3)

Pentaphyllus testaceus (HELLWIG): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl. im Mulm unter toter Pappel-Rinde, 25.5.2013, leg. RUPP. – Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Walnussbaum, 18.6.-2.7.2013, leg. RUPP. – Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese, 28.6.-8.7.2013, leg. RUPP. – Gießen, Philosophenwald (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Linde, 28.6.-19.7.2013, leg. RUPP. (3)

Corticeus longulus GYLLENHAL: Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. unter Kiefern-Rinde in Mischwald, 4.10.2013, leg. HÖHNER. (2)

Corticeus bicolor (OLIVIER): Gießen, Lahnaue südl. Wieseck-Mündung (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Bruchweide, 24.5.-11.6.2013, leg. RUPP. (3)

Diaclina fagi (PANZER): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl. unter der Rinde gefällter Hybridpappeln, 25.5.2013, leg. HOFMANN. – Wiesbaden–Heßloch (MA 45), 1 Expl. in Misthaufen auf Streuobstwiese, 19.4.2013, leg. LANGE. (2)

Uloma culinaris (LINNAEUS): Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. unter der losen Rinde eines alten am Boden liegenden Hainbuchen-Stamms in Hangwald, 8.6.2013, leg. KUNZ. – Bensheim, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. unter der Rinde einer toten Buche, 4.5.2013, leg. RUPP. – Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. unter der toten Rinde einer liegenden Kiefer, 4.10.2013, leg. BERGER. – Hofheim am Taunus–Wildsachsen (MA 55), 2 Expl. im weißfaulen Holz eines Buchen-Stamms, 3.2.2013, leg. LANGE. (2)

Uloma rufa (PILLER & MITTERPACHER): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. unter der toten Rinde einer Buche, 15.6.2013, leg. BERGER. – Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. unter der toten Rinde einer liegenden Kiefer, 4.10.2013, leg. BERGER. (2)

Neatus picipes (HERBST): Nauheim (MA 53), 2 Expl. im hohlen Stamm eines Apfel-Baums, 27.4.2013, leg. LANGE. (1)

Stenomax aeneus (SCOPOLI): Gießen, Grünanlage am Lutherberg (MB 70), 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 11.-28.6.2013, leg. RUPP.

Scarabaeidae

Aphodius biguttatus GERMAR: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 3 Expl. auf bei Rheinhochwasser aus dem Wasser ragenden Holzstücken, 3.6.2013, leg. LANGE. (2/3)

Psammodius asper (FABRICIUS): Riedstadt–Erfelden, Knoblochsaue, Karlswert (MA 51), 1 Expl. auf Sandboden am Rheinufer, 24.4.2013, leg. LANGE. (-/3)

Maladera holosericea (SCOPOLI): Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. in der Bodenstreu auf Kalk-Magerrasen, 4.5.2013, leg. BERGER. (3)

Rhizotrogus marginipes MULSANT: Bruchköbel (MA 95), 1 Expl. abends in Kleingartenanlage ans Licht einer Laterne geflogen, 8.5.2013, leg. BERGER. (1)

Rhizotrogus aestivus (OLIVIER): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl. auf einem bei Rheinhochwasser aus dem Wasser ragendem Holzstück, 4.6.2013, leg. LANGE. (3)

Oxythyrea funesta (PODA): Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79), 1 Expl. auf *Achillea millefolium* LINNAEUS (Gemeine Schafgarbe) auf Streuobstwiese, 19.7.2013, leg. RUPP. (2/3)

Protaetia aeruginosa (DRURY): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Kirschbaum, 17.7.-14.8.2013, leg. RUPP. (1/2)

Lucanidae

Sinodendron cylindricum (LINNAEUS): Braunfels, Tiergarten (MA 59), 2 Expl. im weißfaulen Holz einer toten Buche, 20.4.2013, leg. RUPP. (3)

Aesalus scarabaeoides (PANZER): Braunfels, Tiergarten (MA 59), 1 Expl. 20.4.2013, 1 Expl. 30.4.2013 und 5 Expl. 29.10.2013 im rotfaulen Holz einer liegenden, toten Eiche, leg. RUPP. (1)

Cerambycidae

Stictoleptura scutellata (FABRICIUS) (= *Corymbia scutellata* (FABRICIUS)): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. (Puppe) unter der Rinde einer gefällten Hybridpappel, 25.5.2013, leg. HOFMANN. Als Entwicklungssubstrat dieses Bocks gelten Hölzer verschiedener Laubbaumarten, wobei Buchen-Holz als hauptsächliches Substrat anzusehen ist (KOCH 1992). Pappeln wurden bislang nur sehr selten als Brutbaum angegeben. So nennt z. B. HRBEK (2014) *Populus* ohne nähere Spezifikation, während HOSKOVEC & REJZEK (2014) *Populus alba* LINNAEUS (Silberpappel) angeben. (3)

Cerambyx cerdo LINNAEUS: Darmstadt–Arheilgen, Kranichsteiner Forst, Dianaschneise 200 m östlich der Dianaburg (MA 73), zahlreiche Fraßspuren in ca. 15 gefällten und gelagerten Eichen-Stämmen, 23.3.2013, vid. SCHROTH. Das Forstamt Darmstadt hatte Eichen-Stämme, die an der Rheinstraße in Darmstadt aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden mussten, an dieser Stelle des Kranichsteiner Forsts abgelegt (Abb. 1). Statt die Stämme zu verheizen, wurden sie in den Wald in ein bekanntes Heldbockrevier geschleppt, um die Käfer zu retten, die noch in den Stämmen saßen (Dr. Mathias ERNST, RP Darmstadt, in litt. 2013). Ein für Forstbeamte vorbildliches und nachahmens-wertes Verhalten! (1)

Abb. 1a: Fraßspuren der Heldbocklarven. 1b: Die verfrachteten Heldbock-Eichen im Kranichsteiner Forst bei Darmstadt. (Fotos: M. SCHROTH)

Cerambyx scopolii FÜSSLY: Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. an Wegrain auf Gebüsch, 4.5.2013, vid. KOCH. – Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 1 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Kirschbaum, 4.-18.6.2013, leg. RUPP. (3)

Obrium cantharinum (LINNAEUS): Friedberg–Ockstadt, Kirschenberg, Hollerkapelle (MA 77), 2 Expl. in kleinem Flug-Eklektor an Eiche, 17.7.-14.8.2013, leg. RUPP. (2)

Callimus angulatus (SCHRANK): Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. an Grashalm auf Kalk-Magerrasen, 4.5.2013, leg. LANGE. (2)

Ropalopus femoratus (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf *Urtica dioica* LINNAEUS (Große Brennnessel) neben gefällter Hybridpappel, 25.5.2013, leg. HOFMANN. (3)

Xylotrechus rusticus (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl.unter der Rinde gefällter Hybridpappeln, 25.5.2013, leg. HOFMANN. – Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 6.6.2013, leg. BERGER. (2)

Mesosa nebulosa (FABRICIUS): Bensheim, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. auf trockenem Obstbaum-Reisig, 4.5.2013, leg. RUPP. (3)

Leiopus linnei WALLIN, NYLANDER & KVAMME: Schotten–Breungeshain, Forellenteiche (NA 19), 1 Expl. auf Gebüsch neben Waldweg, 6.7.2013, leg. KUNZ.

Exocentrus adspersus MULSANT: Braunfels, Lustwäldchen (MA 59), 3 Expl. auf trockenem Ast-Schnitt, 10.7.2013, leg. RUPP. (3)

Agapanthia cardui (LINNAEUS): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf der Krautvegetation neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. KUNZ. (2)

Menesia bipunctata (ZOUBKOFF): Beerfelden–Olfen, NSG „Rotes Wasser" (MV 99), 1 Expl. in Flugeklektor an Eiche in Zwischenmoor, 22.-30.6.2013, leg. HORN. (3)

Phytoecia nigricornis (FABRICIUS): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 1 Expl. auf krautiger Vegetation neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. LANGE. (3)

Phytoecia pustulata (SCHRANK): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl. auf *Achillea millefolium* LINNAEUS (Schafgarbe) auf Auwiese, 25.5.2013, leg. HOFMANN. – Hofheim am Taunus–Wallau (MA 54), 2 Expl. auf Erdwall neben Autobahnkreuz (A3/A66), 5.5.2013, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER (1 Expl.). (2)

Opsilia coerulescens (SCOPOLI) (= *Phytoecia coerulescens* (SCOPOLI)): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. an Vegetation auf Hochwasserschutzdamm, 4.6.2013, leg. LANGE. – Nauheim (MA 53), 2 Expl. auf *Cynoglossum officinale* LINNAEUS (Echte Hundszunge), 31.5.2013, leg. LANGE.

Tetrops starkii CHEVROLAT: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 4 Expl. auf Eschen-Ast, 25.5.2013, leg. HOFMANN.

Chrysomelidae

Donacia marginata HOPPE: Bad Nauheim, Kurpark, Großer Teich (MA 88), 6 Expl. am Rand des Teichs an *Sparganium erectum* LINNAEUS (Ästiger Igelkolben), 24.8.2013, leg. LANGE.

Lema cyanella (LINNAEUS): Cornberg–Rockensüß, Eschkopf (NB 55), 1 Expl. in Malaisefalle auf Kalk-Magerrasen, 7.4.-4.5.2013, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER.

Cryptocephalus imperialis LAICHARTING: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch an Weinbergsmauer, 13.6.2009, leg. KOCH.
KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) sowie KÖHLER (2011) kennen aktuelle deutsche Funde (seit 1950) aus Bayern, Baden, dem Rheinland, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen, alte Funde auch aus Mecklenburg-Vorpommern. Aus Hessen war bislang kein Fund bekannt, weshalb das Tier von Lorch einen

Neunachweis in Hessen darstellt! Die bei HEYDEN (1904) genannten Funde liegen in Rheinland-Pfalz. (2)

Oomorphus concolor (STURM): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 6 Expl. auf *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. KUNZ.

Sclerophaedon orbicularis (SUFFRIAN): Gedern–Ober-Seemen (NA 18), 1 Expl. auf *Stellaria nemorum* LINNAEUS (Hain-Sternmiere) in Buchen-Wald, 5.6.2013, leg. BRENNER. – Schotten–Breungeshain, Forellenteiche (NA 19), 3 Expl. in Wald auf *Stellaria nemorum* LINNAEUS, 6.7.2013, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.).

Timarcha tenebricosa (FABRICIUS): Riedstadt–Erfelden, Bruderlöcher (MA 52), 3 Expl. auf grasbewachsenem Hochwasserschutzdamm, 15.9.2013, leg. LANGE. (3)

Timarcha metallica (LAICHARTING): Beerfelden–Olfen, NSG „Rotes Wasser" (MV 99), 1 Expl. an Wegrand in Zwischenmoor, 15.5.2013, leg. HORN.

Galeruca interrupta ILLIGER: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf Sandfläche, 15.6.2013, leg. BERGER. (2)

Calomicrus circumfusus (MARSHAM): Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 17 Expl. an *Genista tinctoria* LINNAEUS (Färber-Ginster) auf xerothermem Hang, 8.6.2013, leg. HOFMANN (6 Expl.), leg. LANGE (11 Expl.). – Herborn–Uckersdorf, Vogelpark (MB 41), 1 Expl. auf *Genista* (Ginster) am Rande eines Kiefernwalds, 12.7.2013, leg. KUNZ. (3)

Aphthona pallida (BACH): Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Wohnung, 6.9.2013, leg. LANGE. (3)

Longitarsus kutscherae RYE: Groß-Rohrheim, Hammer Aue (MA 60), 1 Expl. auf *Plantago major* LINNAEUS (Breit-Wegerich) auf Feldweg, 3.5.2009, leg. KOCH.

Longitarsus dorsalis (FABRICIUS): Bensheim–Zell, Nähe Friedhof (MA 70), 1 Expl. auf *Senecio jacobaea* LINNAEUS (Jakobs-Greiskraut) an Wegrand neben Magerrasen, 4.5.2013, leg. KOCH. – Bensheim–Gronau, Pfaffenrech (MA 70), 1 Expl. auf Wiese auf *Senecio* (Greiskraut), 4.5.2013, leg. KOCH. – Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 4 Expl. lebend auf der Wasseroberfläche einer Pfütze auf einem Weg, an *Senecio inaequidens* DE CANDOLLE (Schmalblättriges Greiskraut) konnten ebenfalls aktive Käfer beobachtet werden, 25.12.2013, leg. LANGE. (2)

Longitarsus quadriguttatus (PONTOPPIDAN): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 3 Expl. auf *Cynoglossum officinale* LINNAEUS (Echte Hundszunge) auf Hochwasserschutzdamm, 9.6.2013, leg. LANGE; am selben Fundort noch einmal unter gleichartigen Fundumständen 2 Expl. am 11.6.2013 und 4 Expl. am 14.6.2013, leg. LANGE. (1)

Longitarsus echii (KOCH): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 4 Expl. auf *Anchusa officinalis* LINNAEUS (Gebräuchliche Ochsenzunge), 25.5.2013, leg. HOFMANN. (3)

Asiorestia nigritula (GYLLENHAL): Beerfelden–Olfen, NSG „Rotes Wasser" (MV 99), 1 Expl. in Barberfalle in Zwischenmoor, 25.4.-2.5.2013, leg. HORN. (3)

Mantura obtusata (GYLLENHAL): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. auf Auwiese, 25.5.2013, leg. HOFMANN.

Mniophila muscorum (KOCH): Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 4 Expl. in der Bodenstreu, 10.11.2013, leg. LANGE.

Bruchidae

Bruchidius varius (OLIVIER): Wetzlar–Dutenhofen, Lahnschlinge (MB 70), 1 Expl. auf Wiese, 18.6.2012, leg. SCHMIDT. – Gießen–Allendorf, Judenberg (MA 79),

1 Expl. in Fensterfalle an Birnbaum auf Streuobstwiese, 16.8.-9.10.2013 (mit der selben Falle wurde ein weiteres Expl. gefangen: 15.-28.4.2014), leg. RUPP. (1)

Bruchidius cisti (FABRICIUS): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf *Helianthemum nummularium* LINNAEUS (MILLER) (Gemeines Sonnenröschen) an Wegrand neben Silikat-Magerrasen, 13.6.2010, leg. KOCH. KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) sowie KÖHLER (2011) kennen aktuelle deutsche Funde (seit 1950) aus allen deutschen Gebieten mit Ausnahme des äußersten Nordens (Niederelbegebiet und Schleswig-Holstein) und Hessens. HEYDEN (1904) nennt jedoch unter dem Namen *Laria cisti* FABRICIUS alte hessische Nachweise von Offenbach (dort Bieberer Höhe genannt) und Frankfurt. Der Fund von Lorch stellt somit einen **Wiederfund in Hessen seit mehr als 100 Jahren** dar!

Anthribidae

Rhaphitropis marchica (HERBST): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 2 Expl. an dürren Zweigen einer toten Ulme, 11.6.2013, leg. LANGE.

Choragus sheppardi KIRBY: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. an dickem, abgestorbenem *Crataegus*-Ast (Weißdorn), 25.12.2013, leg. LANGE. (3)

Scolytidae

Kissophagus hederae (SCHMITT): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), 2 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. KUNZ (1 Expl.), leg. RUPP (1 Expl.). – Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 2 Expl. an *Hedera helix* LINNAEUS neben Weg auf Weinberg, 8.6.2013, leg. LANGE. – Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf *Hedera helix* LINNAEUS an Felsen, 5.5.2013, leg. LANGE. (3)

Orthotomicus proximus (EICHHOFF): Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. unter loser Kiefern-Rinde in Mischwald, 4.10.2013, leg. HÖHNER. Der einzige bekannt gewordene Fund aus Hessen scheint der aus dem Jahr 1901 stammende von KÖHLER (2000) genannte aus der zu Neu-Isenburg–Zeppelinheim gehörenden Gemarkung Mitteldick zu sein. Deshalb stellt das Tier von Rüsselsheim einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar!

Rhynchitidae

Caenorhinus aeneovirens (MARSHAM): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf Zitterpappel-Ast am Rand eines Laubwalds, 25.5.2013, leg. HÖHNER.

Apionidae

Exapion formaneki (WAGNER): Herborn–Uckersdorf, Vogelpark (MB 41), 3 Expl. auf *Genista* (Ginster) am Rande eines Kiefernwalds, 12.7.2013, leg. KUNZ. (3)

Curculionidae

Rhinomias forticornis (BOHEMAN): Gedern–Ober-Seemen (NA 18), 1 Expl. auf welkem Blatt in Buchen-Wald, 4.6.2013, leg. BRENNER.

Barypeithes tenex (BOHEMAN): Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 16 Expl. in der Laubstreu eines Eichen-Walds, 8.6.2013, leg. LANGE.

Barypeithes trichopterus (GAUTIER): Bensheim–Auerbach, Orbis-Höhe (MA 70), 2 Expl. in der Laubstreu eines Eichen-Walds, 8.6.2013, leg. LANGE.

Strophosoma sus STEPHENS: Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 14 Expl. in der Bodenstreu unter *Calluna vulgaris* (LINNAEUS) HULL, 4.10.2013, leg. BERGER (13 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.).

Philopedon plagiatum (SCHALLER): Nauheim (MA 53), 3 Expl. auf spärlich bewachsenem Sandboden, 31.5.2013, leg. LANGE.

Lixus filiformis (FABRICIUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 9 Expl. am 11.6.2013 und noch einmal 3 Expl. am 14.6.2013 auf Disteln, leg. LANGE.

Cossonus parallelepipedus (HERBST): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 12 Expl. im noch festen Holz an der Innenwand eines hohlen Stamms einer umgestürzten Weide, dort kamen Käfer, Puppen (nur vereinzelt) und sehr viele Larven nebeneinander vor, 28.12.2013, leg. LANGE. (3)

Grypus brunnirostris (FABRICIUS): Mühlheim–Dietesheim, Oberwald (MA 95), 1 Expl. auf Grasbulte in Wasser auf Sumpfwiese, 20.4.2013, leg. HÖHNER.

Tychius junceus (REICH): Zwingenberg, Weinberge am Hang der Orbis-Höhe (MA 70), je 1 Expl. auf krautiger Vegetation neben Weg auf Weinberg und auf einer Weinbergsbrache, 8.6.2013, leg. LANGE.

Tychius pusillus GERMAR: Herborn–Uckersdorf, Vogelpark (MB 41), 1 Expl. auf Magerrasen, 12.7.2013, leg. KUNZ. (3)

Anthonomus conspersus DESBROCHERS: Schotten–Breungeshain, Forellenteiche (NA 19), 1 Expl. auf dem Ast einer Eberesche (*Sorbus aucuparia* LINNAEUS) neben Waldweg, 6.7.2013, leg. KUNZ.

Liparus coronatus (GOEZE): Hofheim am Taunus–Wallau (MA 54), 2 Expl. in Barberfallen auf Randsaum neben Autobahnkreuz (A3/A66), 14.5.-21.6.2013, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER (1 Expl.).

Sphenophorus striatopunctatus (GOEZE): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Weg, 5.5.2013, leg. LANGE. Die Gruppe, zu der diese Art gehört, wird von einigen Autoren als Familie Dryophthoridae von den Curculionidae getrennt (RHEINHEIMER & HASSLER 2010), hier aber als der Unterfamilie Dryophthorinae der Familie Curculionidae zugehörig angesehen. (2)

Dryophthorus corticalis (PAYKULL): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 1 Expl. im weißfaulen Holz eines liegenden, rindenlosen Pappel-Stamms, 31.3.2013, leg. LANGE. – Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. unter loser Kiefern-Rinde in Mischwald, 12.10.2013, leg. HÖHNER. Ebenso wie *Sphenophorus striatopunctatus* (GOEZE) (siehe dort) wird die Art hier RHEINHEIMER & HASSLER (2010) folgend als der Unterfamilie Dryophthorinae zugehörig angesehen. (3)

Acalles ptinoides (MARSHAM): Mainhausen–Zellhausen (MA 94), 5 Expl. in der Bodenstreu unter *Calluna vulgaris* (LINNAEUS) HULL, 22.10.2013, leg. BERGER. – Hanau–Steinheim, Gailenberg (MA 95), 1 Expl. in der Laubstreu in Mischwald, 17.4.2013, leg. BERGER, det. HÖHNER.

Marmaropus besseri GYLLENHAL: Nauheim (MA 53), 14 Expl. an *Rumex*-Blättern (Ampfer), 31.5.2013, leg. LANGE. (3)

Mogulones abbreviatulus (FABRICIUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 53), 5 Expl. am 4.6.2013, 2 Expl. am 11.6.2013 und noch einmal 3 Expl. am 14.6.2013 an *Symphytum officinale* LINNAEUS (Gemeiner Beinwell) auf Hochwasserschutzdamm, leg. LANGE.

Mogulones crucifer (PALLAS) (= *Mogolones cruciger* (HERBST)): Nauheim (MA 53), 10 Expl. auf *Cynoglossum officinale* LINNAEUS (Echte Hundszunge), 31.5.2013, leg. LANGE.

Cionus olens (FABRICIUS): Geisenheim, Monrepos-Park (MA 23), 2 Expl. an *Verbascum* (Königskerze), 28.4.2013, leg. LANGE. (3)

Rhynchaenus xylostei CLAIRVILLE (= *Rhynchaenus lonicerae* (FABRICIUS): Morschen–Neumorschen, Halberg (NB 45), 2 Expl. in Malaisefalle auf Kalk-Magerrasen, 3.5.-1.6.2013, leg. FLÜGEL, det. HÖHNER, in coll. HÖHNER (1 Expl.). (3)

Literatur

BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTTKE & P. PRETSCHER (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenr. Landschaftspfl. Natursch., Bonn-Bad Godesberg, **55**: 3–434.

BRENNER, U. (2006): Käferfunde der Jahre 2002 und 2003 aus Hessen. – Hess. Faun. Briefe **24**(3): 41–62, Darmstadt.

BÜCKING, H. (1930-32): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. Erster Nachtrag zur II. Auflage des Hauptverzeichnisses von Lucas von HEYDEN (1904). – Entomol. Bl. **26**: 145–163; **27**: 39–42, 83–89, 122–128, 174–183; **28:** 73–80, 122–125, 167–170, Berlin.

ESSER, J. (2014): Type catalogue of the mould beetles (Coleoptera, Cryptophagidae) preserved in the Museum für Naturkunde in Berlin, with notes on systematics and taxonomy. – Entomol. Bl. **110**: 39–66, Schwanfeld.

HEYDEN, L. von (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – Frankfurt am Main.

HORION, A. (1941): Faunistik der deutschen Käfer. Band I: Adephaga – Caraboidea. – Wien.

HORION, A. (1963): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. **9**: Staphylinidae, 1. Teil: Micropeplinae bis Euaesthetinae. – Überlingen.

HOSKOVEC, M. & M. REJZEK (2014): Longhorn Beetles (Cerambycidae) of the West Palearctic Region. – http://www.cerambyx.uochb.cz/cerambyx.htm.

HRBEK, J. (2014): Tesaříkovití (*Cerambycidae*). – http://www.cerambycidae-hrbek.cz/index.htm

KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands". – Entomol. Nachr. Ber. **44**(1): 60–84, Dresden.

KÖHLER, F. (2007): *Stelidota geminata* Say, 1825 (Olivier, Nitidulidae) – eine neue Adventivart in Deutschland. – http://www.koleopterologie.de/arbeitsgemeinschaft/beitraege/koehler/stelidota-geminata.html.

KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands" (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) (Coleoptera) Teil 1. – Entomol. Nachr. Ber. **55**: 109–174, Dresden.

KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomol. Nachr. Ber., Beiheft **4**: 1–185, Dresden.

LOHSE, G. A. (1967): 55. Familie: Cryptophagidae. – In: FREUDE, HARDE, LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas, Band 7: 110–158, Krefeld.

MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz: Natur in Hessen).

RHEINHEIMER, J. & M. HASSLER (2010): Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. – Naturschutz-Spektrum, Themen 99, 944 S., Karlsruhe.

SCHAFFRATH, U. (2003): Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens (Coleoptera: Familienreihen Scarabaeoidea und Lucanoidea). – 47 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten: Natur in Hessen).

Verfasser

Uli Brenner, Strauchweg 2, 36381 Schlüchtern

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hessische Faunistische Briefe

Jahr/Year: 2015

Band/Volume: 34

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: Käferfunde des Jahres 2013 aus Hessen 22. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen 43-68