Ökologische Charakterisierung von Kalkhängen anhand von Gastropodengemeinschaften

A. DREWS, A. v. LOSSAU und J. F. MOLTMANN, Frankfurt a. M.

Die kleinräumige Biotopstruktur im deutschen Mittelgebirge wird bisher weitgehend floristisch beschrieben. Hierbei bleibt der Indikatorwert der Fauna unberücksichtigt.

Im Rahmen der Diplomarbeit der Autoren wurde der Versuch unternommen, Gastropodengemeinschaften als Indikator für Standortsqualitäten zu benutzen. Schnecken eignen sich für diesen Zweck, da ihre Mobilität gering ist und die Öko- und Verbreitungstypen der meisten Arten bekannt sind.

Bei faunistischen Untersuchungen wird als Kriterium für die Beurteilung der Standortsqualität häufig die Diversität verwendet. Diversitätsberechnungen an sich erlauben jedoch keine ökologischen Einschätzungen. Diese werden erst durch den Vergleich ähnlicher Standorte möglich. Dazu wurden Ähnlichkeitsanalysen auf der Basis der Diversität, der Artenzusammensetzung sowie der Öko- und Verbreitungstypen durchgeführt.

Um die Einschätzung der Standorte zu vervollständigen, wurden zusätzlich Vegetation, Böden und Klima untersucht.

Methoden

Acht Muschelkalkhänge im Schlüchterner Raum (oberes Kinzigtal, Abb. 1 und 2), die sich in Exposition, Nutzung und Verbuschung unterscheiden, wurden von Mai bis Oktober 1981 untersucht.

Zur Erfassung der Gastropodengemeinschaften wurden monatlich an jeder der 28 Aufnahmeflächen (UF) ein Quadratmeter abgesammelt und eine Bodenprobe von 25×25×10 cm ausgestochen. Insgesamt wurden an der Oberfläche 1937 lebende und 6755 tote Individuen gefunden, die sich auf 52 Arten verteilen.

Die Bodenproben wurden gesiebt und die kleinste Fraktion (≤ 3 mm) nach der Methode VAGVÖLGYI (1952) aufgeschwemmt. Eine Auftrennung in lebende und tote Individuen war nicht möglich. Daher ist die Aussagekraft der Daten aus den Bodenproben stark eingeschränkt. Es wurde nur der Monat August mit insgesamt 10 204 Individuen und 26 Arten ausgewertet.

Ein Schwerpunkt der Diplomarbeit war die Untersuchung der Sammelmethoden, im Hinblick auf die Entwicklung einer Standardmethode.

Die Pflanzengemeinschaften wurden nach der Methode BRAUN-BLANQUET (1964) aufgenommen.

Abb. 1. Lage der Untersuchungsflächen. Vgl. hierzu TK 1:50 000, Blatt L 5722 (Schlüchtern). ▶

Abb. 2. Untersuchungsflächen am Ebertsberg und Weinberg bei Elm. Vgl. hierzu TK 1:25 000, Blatt 5623 (Schlüchtern). ▶

Ergebnisse

Mit Hilfe der oben erwähnten Analyseverfahren lassen sich drei Standortstypen charakterisieren:

Typ 1: naturnahe xerotherme Reliktstandorte

- Ebertsberg-Elm, SSW-Hang (offener Halbtrockenrasen, UF 2 und UF 3).
- Weinberg-Elm, SW-Oberhang (Schlehenbuschgesellschaft, UF 18).
- Weinberg-Kressenbach, SSW-Hang (offener Halbtrockenrasen, UF 60).

An diesen Standorten existiert eine *Abida-frumentum-Zebrina-detrita*-Gesellschaft, die nach KÖRNIG (1966) für Felsheiden charakteristisch ist. Die geringen Arten- und Individuendichten und der hohe Anteil an stenöken Feldarten mit südeuropäischem Verbreitungsschwerpunkt (Tab. 1) weisen auf die für Schnecken extremen Lebensbedingungen hin:

Exposition, Neigung ($> 15^\circ$) und die Lückigkeit der Krautschicht bewirken sowohl große Temperaturschwankungen im Tages- und Jahresgang als auch eine geringe Luftfeuchtigkeit in Bodennähe.

Der kleinflächige Wechsel von tiefgründigen Rendzinen und bis an die Oberfläche tretenden Kalkbänken spiegelt sich im heterogenen Vegetationsbild der Flächen wider. Neben tiefwurzelnden Gebüscharten treten für Felsrasengesellschaften typische Pflanzen auf. Dies ist charakteristisch für die Steppenheide (im Sinne von GRADMANN) der mitteleuropäischen Kalkgebirge (ELLENBERG 1978).

Das Auftreten von überwiegend südeuropäisch verbreiteten Schneckenarten weist auf eine Parallelität der Besiedlungsgeschichte von Gastropoden und Flora hin. Dies kennzeichnet die Flächen dieser Gruppe als xerotherme Reliktstandorte.

Typ 2: ruderal beeinflusste, heterogene Standorte

- Weinberg-Elm, SSO-Hang (vergraster Halbtrockenrasen, UF 13 und UF 14; und Glatthaferwiese UF 15).
- Weinberg-Elm, SW-Unterhang (vergraster Halbtrockenrasen, UF 19).
- Unnütz, W-Hang (vergraster Halbtrockenrasen, UF 30).
- Weinberg-Hohenzell, SSW-Hang (vergraster Halbtrockenrasen, UF 50).

Im Gegensatz zu den obengenannten Flächen besitzen die Standorte dieser Gruppe – ungenutzte Wiesen- und Rasengesellschaften unterschiedlichen Verbuschungsgrades – keine charakteristische Artenzusammensetzung, sondern sie gleichen sich in der Struktur ihrer Gastropodengemeinschaft. Sie sind gekennzeichnet durch Arten- und Individuenreichtum, die hohen Diversitätswerte und das ausgeglichene Spektrum der Öko- und Verbreitungstypen (Tab. 2).

Neben der wärme-klimatisch günstigen Lage führt die Verfilzung der Grasnarbe – eine Folge der nicht mehr stattfindenden Nutzung – zu günstigen Lebensbedingungen für die Schnecken, d. h. relativ hohe Luftfeuchtigkeit in Bodennähe innerhalb der Vegetationspolster.

In unmittelbarer Nachbarschaft der Flächen befinden sich Gehölze, Hecken, Äcker, Mäh- und Streuobstwiesen. Die Heterogenität der Umgebung und die starke räumliche Struktur der Vegetation auf den Flächen selbst bieten einer Vielfalt von Arten mit

Tabelle 1. Gastropodengemeinschaften naturnaher, xerothermer Reliktstandorte.

Art	VT	Ökotyp	G	UF: 2		UF: 3		UF: 18		UF: 60			
				Ind.	%	Ind.	%	Ind.	%	Ind.	%	Ind.	%
<i>Abida frumentum</i>	SE	stenöke	F.	3	19	32,8	D	29	37,7	D	48	38,7	D
<i>Pupilla muscorum</i>	H	stenöke	F.	-	-	-	-	-	-	-	1	0,8	+
<i>Vallonia pulchella</i>	H	euryöke	F.	-	1	1,7	+	-	-	-	1	3,6	+
<i>Zebirina detrita</i>	SE	stenöke	F.	1	26	44,8	D	46	59,7	D	23	18,5	S
<i>Ceciloides acicula</i>	SE	euryöke	F.	1	1	1,7	+	-	-	-	-	-	-
<i>Clausilia parvula</i>	ME	stenöke	F.	-	9	15,5	S	-	-	-	10	8,1	S
<i>Helicella itala</i>	WE	stenöke	F.	3	-	-	-	1	1,3	+	5	4,0	+
<i>Helicella obvia</i>	SE	stenöke	F.	1	-	-	-	1	1,3	+	2	1,6	+
<i>Helix pomatia</i>	SE	euryöke	F.	1	2	3,4	+	-	-	-	2	7,1	S
Shannon-Div.					1,27			0,79			0,86		1,21

Erläuterungen zu den Tabellen 1–4

Taxonomie und Systematik der Gastropoden nach KERNEY et al. (1979).

Daten: Oberfläche lebend, Summe aus 6 qm.

UF = Untersuchungsfläche

Ind. = absolute Individuenzahl

% = relative Individuenzahl

VT = Verbreitungstyp:

- H = holarktisch
- P = palaearktisch
- E = europäisch
- ME = mitteleuropäisch
- NE = nordeuropäisch
- SE = südeuropäisch
- WE = westeuropäisch
- OE = osteuropäisch

G = Gefährdungsgrad nach ANT (1976):

- = ungefährdet
- 1 = lokal gefährdet
- 2 = regional gefährdet
- 3 = stark gefährdet
- 4 = vom Aussterben bedroht
- 5 = ausgestorben

DK = Dominanzklasse:

- E = eudominant (mehr als 60 %)
- D = dominant (mehr als 20 %)
- S = subdominant (mehr als 6 %)
- + = rezedent (weniger als 6 %)

Ökotyp:

- F. = Feldart
- W. = Waldart

Tabelle 2. Gastropodengemeinschaften ruderal beeinflüster, heterogener Standorte.

Art	VT	Ökotyp	G	UF: 13		UF: 14		UF: 15		UF: 19		UF: 30		UF: 50	
				Ind.	%										
<i>Succinea oblonga</i>	P	euryöke	F.	-	-	13	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cochlicopa lubrica</i>	H	eurytop	-	12	5,3	22	11,2	-	-	3	3,0	-	-	-	-
<i>Truncatellina cylindrica</i>	SE	stenöke	F.	-	-	1	0,5	-	-	6	6,1	-	-	-	-
<i>Vertigo pygmaea</i>	H	euryöke	F.	-	0,4	7	3,6	-	-	2	1,3	-	-	-	-
<i>Abida frumentum</i>	SE	stenöke	F.	3	6,2	4	2,0	6,3	S	46	29,7	D	-	-	-
<i>Pupilla muscorum</i>	H	stenöke	F.	-	41,9	17	8,6	43	27,2	15	9,7	S	25	25,3	D
<i>Vallonia costata</i>	H	euryöke	F.	-	56	24,7	12	6,1	S	58	36,7	D	37	23,9	D
<i>Vallonia pulchella</i>	H	euryöke	F.	-	4,8	7	3,6	5	3,2	21	13,5	S	13	13,1	S
<i>Ena obscura</i>	H	stenöke	W.	3	1,3	1	0,5	4	2,5	2	1,3	+	-	-	-
<i>Zebrina detrita</i>	SE	stenöke	F.	-	-	1	0,5	+	-	5	3,2	+	-	-	-
<i>Punctum pygmaeum</i>	P	eurytop	-	-	-	2	1,0	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Arion circumscriptus</i>	NE	euryöke	W.	-	-	-	-	-	-	1	1,0	+	-	-	-
<i>Arion hortensis</i>	SE	eurytop	-	-	-	-	-	-	-	1	0,6	+	-	-	-
<i>Vitrina pellucida</i>	P	eurytop	-	10	4,4	23	11,7	S	-	2	1,3	+	3	3,0	+
<i>Oxychilus cellarius</i>	E	euryöke	W.	-	-	7	3,6	+	2	1,3	+	-	-	-	-
<i>Boettgerilla pallens</i>	OE	eurytop	-	-	-	1	0,5	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Limax tenellus</i>	NE	euryöke	W.	-	-	-	-	-	-	2	1,3	+	-	-	-
<i>Deroceras laeve</i>	E	eurytop	-	-	-	1	0,5	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Deroceras agreste</i>	P	euryöke	W.	-	5,3	6	3,0	+	1	0,6	+	1	0,6	+	+
<i>Deroceras reticulatum</i>	E	eurytop	-	2	0,9	2	1,0	+	1	0,6	+	-	-	-	-
<i>Cecilioides acicula</i>	SE	euryöke	F.	1	-	3	1,5	+	-	2	1,3	+	-	-	-
<i>Cochlodina laminata</i>	E	euryöke	W.	1	0,4	-	-	-	-	12	7,7	S	-	-	-
<i>Clausilia parvula</i>	ME	stenöke	F.	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Candicula unifasciata</i>	WE	stenöke	F.	3	-	-	-	-	-	1	1,0	+	-	-	-
<i>Helicella itala</i>	WE	stenöke	F.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Helicella obvia</i>	SE	stenöke	F.	1	-	-	-	-	5	3,2	+	-	-	-	-
<i>Trochoidea geyeri</i>	WE	stenöke	F.	3	-	3	1,5	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Trichia plebeia</i>	ME	eurytop	-	9	4,0	59	29,9	D	26	16,5	S	3	1,9	+	+
<i>Cepaea nemoralis</i>	WE	euryöke	F.	-	-	3	1,5	+	2	1,3	+	1	0,6	+	+
<i>Cepaea hortensis</i>	WE	euryöke	F.	-	-	1	0,5	+	1	0,6	+	-	-	-	-
<i>Helix pomatia</i>	SE	euryöke	F.	1	-	1	0,5	+	-	-	-	-	-	-	-
Shannon-Div.				1,78		2,43			1,71	2,05			1,47		1,75

Tabelle 3. Gastropodengemeinschaften landwirtschaftlich genutzter Wiesen und Weiden.

Art	VT	Ökotyp	G	UF: 10		UF: 11		UF: 16		UF: 17		UF: 20	
				Ind.	%								
<i>Succinea oblonga</i>	.P	euryöke	F.	1	0,8	3	1,5	1	0,9	1	—	1	—
<i>Truncaellina cylindrica</i>	SE	stenöke	F.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Vertigo pygmaea</i>	H	euryöke	F.	—	—	1	0,5	6	5,6	5	7,7	—	—
<i>Abida frumentum</i>	SE	stenöke	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Pupilla muscorum</i>	H	stenöke	F.	—	—	128	62,7	26	24,3	7	10,8	37	80,4
<i>Vallonia costata</i>	H	euryöke	F.	80	64,0	46	22,5	65	60,7	7	10,8	1	2,2
<i>Vallonia pulchella</i>	H	euryöke	F.	25	20,0	9	4,4	2	1,9	43	66,2	—	—
<i>Ena obscura</i>	E	stenöke	W.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Arion subfuscus</i>	E	euryöke	W.	1	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Arion circumscriptus</i>	NE	euryöke	W.	5	4,0	1	0,5	1	0,9	—	—	—	—
<i>Arion hortensis</i>	SE	eurytop	—	—	—	—	—	—	—	1	1,5	—	—
<i>Vitrina pellicida</i>	P	eurytop	—	3	2,4	1	0,5	—	—	—	—	—	—
<i>Phenacollimax major</i>	WE	stenöke	W.	—	—	—	—	—	—	1	1,5	—	—
<i>Milax budapestensis</i>	E	eurytop	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Deroceras agreste</i>	P	euryöke	W.	1	0,8	3	1,5	—	—	—	—	1	2,2
<i>Deroceras reticulatum</i>	E	eurytop	—	3	2,4	2	1,0	2	1,9	1	1,5	5	10,9
<i>Candidula unifasciata</i>	WE	stenöke	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Helicella itala</i>	WE	stenöke	F.	3	—	—	—	—	—	—	—	1	2,2
<i>Helicella obvia</i>	SE	stenöke	F.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2,2
<i>Trochoides geyeri</i>	WE	stenöke	F.	3	—	2	1,0	—	—	—	—	—	—
<i>Trichia plebeia</i>	ME	eurytop	—	6	4,8	7	3,4	1	0,9	—	—	—	—
Shannon-Div.					1,18		1,20		1,22		1,14		0,75

Tabelle 4. Gastropodengemeinschaften der übrigen Flächen.

Art	VT	Ökotyp	G	UF: 6		UF: 7		UF: 8		UF: 40	
				Ind.	%	Ind.	%	Ind.	%	Ind.	%
<i>Cochlicopa lubricella</i>	H	euryöke	F.	—	—	—	—	—	—	2	4,9
<i>Vertigo pygmaea</i>	H	euryöke	F.	3	33,3	—	—	1	11,1	1	2,4
<i>Abida frumentum</i>	SE	stenöke	F.	2	22,2	—	—	2	22,2	4	9,8
<i>Vallonia costata</i>	H	euryöke	F.	2	22,2	—	—	—	—	—	—
<i>Vallonia pulchella</i>	H	euryöke	F.	—	—	—	—	1	11,1	2	4,9
<i>Zebrina detrita</i>	SE	stenöke	F.	1	—	—	—	1	11,1	—	—
<i>Punctum pygmaeum</i>	P	eurytop	—	1	11,1	1	5,0	—	—	—	—
<i>Vitrina pellicida</i>	P	eurytop	—	5	25,0	—	—	—	—	4	9,8
<i>Nesovirena hammonis</i>	H	eurytop	—	—	—	—	—	—	—	2	4,9
<i>Deroceras laeve</i>	E	eurytop	—	1	11,1	1	5,0	—	—	—	—
<i>Deroceras agreste</i>	P	euryöke	W.	—	—	9	45,0	—	—	—	—
<i>Coclioides acicula</i>	SE	euryöke	F.	1	—	3	15,0	4	44,4	9	22,0
<i>Cochlodina laminata</i>	E	euryöke	W.	—	—	—	—	—	—	2	4,9
<i>Helicella itala</i>	WE	stenöke	F.	3	—	—	—	—	—	1	2,4
<i>Perforatella incaranta</i>	ME	euryöke	W.	—	—	—	—	—	—	1	2,4
<i>Trichia plebeia</i>	ME	eurytop	—	—	—	—	—	—	—	1	2,4
<i>Helix pomatia</i>	SE	euryöke	F.	1	—	1	5,0	—	—	—	—

unterschiedlichen Ansprüchen ausreichend Lebensraum. Daher konnten sich in relativ kurzer Zeit derart unterschiedliche Gastropodengemeinschaften entwickeln, obwohl ein Teil dieser Flächen bis vor 30 Jahren ackerbaulich genutzt wurde. Dies zeigt sich auch in der ruderalen Komponente der Flora und dem Auftreten synanthroper Schneckenarten.

Diese Standorte werden also nicht – wie die des Typs 1 – durch extreme abiotische Faktoren bestimmt, sondern vielmehr sind biotische Beziehungen z. B. Konkurrenz für die Gastropodengemeinschaft ausschlaggebend.

Typ 3: landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Weiden

- Ebertsberg-Elm, WNW-Unterhang (Weißkleeweide, UF 10; und Glatthaferwiese, UF 11).
- Weinberg-Elm, SSO-Unterhang (Weißkleeweide, UF 16).
- Weinberg-Elm, SW-Kuppe (Weißkleeweide, UF 17).
- Weinberg-Elm, SW-Unterhang (Weißkleeweide, UF 20).

Die Flächen dieser Gruppe werden als Mäh- und Weidewiesen im Wechsel genutzt. Die Flächen sind hinsichtlich der Intensität der Nutzung, der Zusammensetzung der Pflanzengesellschaft und des Bodentyps unterschiedlich, zeigen aber eine große Ähnlichkeit in der Struktur ihrer Gastropodengemeinschaften.

Es tritt eine Art eudominant gegenüber den anderen Arten auf. Diese eudominante Art ist jedoch nicht konstant, sondern wird auf den einzelnen Flächen entweder von *Vallonia costata*, *Vallonia pulchella* oder *Pupilla muscorum* gestellt. Dies sind weitverbreitete euryöke Feldarten (Tab. 3).

Von HEMPEL (1971) wird bei seinen Untersuchungen der Arachniden- und Carabidenfauna beweideter Standorte ebenfalls die hohe Dominanz weitverbreiteter euryöker Arten betont. Er nimmt als Ursache Konkurrenzbeziehungen an.

Übrige Flächen

Die folgenden Flächen konnten aufgrund ihrer geringen Individuenzahlen keinem der drei Typen zugeordnet werden.

Am NW-exponierten Hang des Ebertsberges (UF 6, 7 und 8) finden sich nur wenige Individuen und Arten. Aufgrund der Analyse der Öko- und Verbreitungstypen kann dieser Hang als Mischbiotop angesehen werden (Tab. 4).

Die Gastropodengemeinschaft des ebenfalls NW-exponierten Gerlingsberges (UF 40) weist vorwiegend Arten mit paläarktischer Verbreitung auf. Außerdem wurden Arten nachgewiesen, die auf die Frische des Standorts hindeuten (Tab. 4). Diese Artenzusammensetzung läßt sich durch Tonbänke im Muschelkalk und die expositionsbedingt geringe Einstrahlung erklären. Im Gegensatz zur Vegetation (frischer Halbtrockenrasen) spiegelt die Gastropodengemeinschaft das Regionalklima wider.

Zur Schutzwürdigkeit der untersuchten Flächen

Der Plan, den Ebertsberg unter Naturschutz zu stellen, kann aufgrund der vorliegenden Ergebnisse gestützt werden. Die Charakterisierung des SSW-exponierten Hanges als *Abida-frumentum-Zebrina-detrita*-Gesellschaft weist ihn als xerothermen Reliktstandort aus, der als solcher schützenswert ist. Die meisten der vorkommenden Arten sind lokal oder regional stark gefährdet (siehe Tab. 1; Gefährdungsklassen nach ANT 1976).

Der Elmer Weinberg ist in seiner Gesamtheit aufgrund der Heterogenität der Gastropodengemeinschaften und der Flora ebenfalls ein schützenswertes Gebiet. Nur durch die Beibehaltung der aktuellen Bewirtschaftung kann diese Heterogenität erhalten bleiben.

Auf den ungenutzten Wiesen- und Rasengesellschaften sind Pflegemaßnahmen notwendig, um die für Halbtrockenrasen typischen Gastropodengemeinschaften zu erhalten. Durch die zunehmende Verbuschung und Verfilzung der Grasschicht werden die lichtliebenden Arten der Familie der Helicidae zurückgedrängt. Diese Arten sind nach ANT (1976) in Mitteleuropa lokal bis regional stark gefährdet. Als Pflegemaßnahme ist eine zeitlich begrenzte Beweidung notwendig.

Zusammenfassung

Im Rahmen der Diplomarbeit der Autoren wurden an der Ökologischen Außenstelle der Universität Frankfurt/M. in Schlüchtern methodische, statistische und ökologische Untersuchungen der Gastropodengemeinschaften auf Kalkhängen unterschiedlicher Exposition, Nutzung und Verbuschung durchgeführt. Diversitäts- und Ähnlichkeitsanalysen ermöglichten auf den Hängen eine differenzierte Charakterisierung der Flächen. Es konnten drei Standortstypen unterschieden werden und es ergaben sich Hinweise auf ihre Schutzwürdigkeit.

Literatur

- ANT, H. (1976): Arealveränderungen und gegenwärtiger Stand der Gefährdung mitteleuropäischer Land- und Süßwassermollusken. – Schriftenr. Vegetationskde. **10**, 309–339, Bonn-Bad Godesberg.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1964): Pflanzensoziologie. – 3. Aufl., 865 S., Wien & New York (Springer).
- ELLENBERG, H. (1978): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. – 2. Aufl., 982 S., Stuttgart (Ulmer).
- HEMPEL, W. (1971): Zum Einfluß der Weidewirtschaft auf die Arthropodenfauna im Mittelgebirge. – Faunist. Abh. Veröff. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden **3**, 235–281, Leipzig.
- KERNEY, M. P., R. A. D. CAMERON & G. RILEY (1979): A field guide to the land snails of Britain and North-west Europe. – 288 S., London (Collins).
- KÖRNIG, G. (1966): Die Molluskengesellschaft des mitteleutschen Hügellandes. – Malakolog. Abh. Staatl. Mus. Tierkde. Dresden **2**, 1–112, Leipzig.
- MOLTMANN, J. F., A. DREWS & A. v. LOSSAU (1982): Ökologische Charakterisierung von Kalktrockenhängen im Raum Schlüchtern anhand von Gastropodengemeinschaften. – 260 S. + 123 S. Tabellen, Diplomarbeit am FB Biologie der Universität Frankfurt/M., unveröffentlicht.
- OWESEN, H. A. (1976): Artendiversität in der Ökologie. Ein Vergleich verschiedener Diversitätskonzepte unter besonderer Berücksichtigung mathematischer Gesichtspunkte. – Rep. Sonderforschungsbereich 95, Univ. Kiel, **16**, 178 S., Kiel–Altenholz.
- VAGVÖLGYI, J. (1952): A new sorting method for snails, applicable also for quantitative researches. – Ann. hist. nat. Mus. nation. Hung. **3**, 101–104, Budapest.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Drews A., Lossau A. v., Moltmann J. F.

Artikel/Article: [Ökologische Charakterisierung von Kalkhängen anhand von Gastropodengemeinschaften 38-45](#)