

Käferfunde der Jahre 1985 und 1986 aus Hessen

3. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen,

Teil II

H. BATHON, Roßdorf

Cybocephalidae

51.001.004 – *Cybocephalus politus* (GYLLENHAL): Schloßborn/Taunus, am Fuß der Blockhalde des NSG „Rentmuer“ (MA 56), 1 Expl. von Gebüsch, 15. 6. 1985 leg. HÖHNER.

Cucujidae

53.001.004 – *Monotoma spinicollis* AUBÉ: Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 1 Expl. am 18. 11. und 4 Expl. am 16. 12. 1985 in schimmeligem Heuhaufen, leg. BRENNER.

53.001.006 – *Monotoma brevicollis* AUBÉ: Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 29. 10. und 18. 11. 1985 je 1 Expl., 10. 5. (2 Expl.) und 27. 9. 1986 (3 Expl.) in einem schimmeligen Heuhaufen, leg. BRENNER.

53.001.007 – *Monotoma bicolor* VILLA: Wettenberg b. Gießen (MB 70) in trockenem Stallmist in Anzahl, 1. 3. 1986; – Großen-Linden (MA 79), 2 ♂♂/9 ♀♀ aus Strohresten und Bodenstreu eines alten Schafstalles gesiebt, 18. 2. 1986, beide leg. KÖHLER.

53.001.008 – *Monotoma testacea* MOTSCHULSKY: Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 1 Expl. in schimmeligem Heuhaufen, 27. 9. 1986 leg. BRENNER. (3)

Erotylidae

54.003.003 – *Dacne rufifrons* (FABRICIUS): Groß-Gerauer Wald (MA 63), zusammen mit *D. bipustulata* (THUNBERG) von trockenen Buchenästen geklopft, 27. 5. 1985 leg. BECKER. Aus Hessen liegen bislang nur alte Funde vor. Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am 4. 7. 1985 an einem Baumschwamm, leg. LUCHT. (2)

Cryptophagidae

55.008.027 – *Cryptophagus dentatus* (HERBST): Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 4 ♀♀ aus anbrüchigen Salweiden gesiebt, 21. 3. 1986; – Marburg (Truppenübungsplatz, MB 82), 2 ♂♂/4 ♀♀ aus Holz, Rindenteilen usw. einer Buche gesiebt, 18. 3. 1986, beide leg. KÖHLER.

55.008.043 – *Cryptophagus cellaris* (SCOPOLI): Hof Güll bei Kloster Arnsburg/Lich (MA 89), 1 Expl. aus trockenem Mist und Stroh gesiebt, 22. 2. 1986; – Großen-Linden (MA 79), 4 Expl. aus Strohresten und Bodenstreu eines alten Schafstalles gesiebt, 18. 2. 1986, beide leg. KÖHLER.

55.014.015 – *Atomaria zetterstedti* ZETTERSTEDT: Groß-Krotzenburg (MA 94), 10 Expl. von blühenden Weiden im Krotzenburger Moor. 25. 4. 1985 leg. HÖHNER.

- 55.014.016 – *Atomaria lewisi* REITTER: Hof Güll bei Kloster Arnburg/Lich (MA^A 89), 1 Expl. aus weißfaulem Mulm einer Esche gesiebt, 22. 2. 1986; – Ohmniederung bei Marburg (MB 92), aus anbrüchigen Salweiden gesiebt, 21. 3. 1986; – Horlofftal bei Schotten (NA 09), 1 ♀ aus trockener Streu eines Viehunterstandes, 24. 3. 1986; – Großen-Linden (MA 79), 1 Expl. aus Strohresten und Bodenstreu eines alten Schafstalles gesiebt, 18. 2. 1986, alle leg. KÖHLER.
- 55.015.001 – *Ootypos globosus* (WALTJ): Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 2 kopulierende Expl. unter Holz in einem ausgetrockneten Graben, 22. 7. 1986 leg. BRENNER.

Lathridiidae

- 58.001.001 – *Holoparamesus caularum* (AUBÉ): Wetttenberg bei Gießen (MB 70) in trockenem Stallmist in Anzahl, 1. 3. 1986 leg. KÖHLER.
- 58.003.008 – *Lathridius bergrothi* REITTER: Hof Güll bei Kloster Arnburg/Lich (MA 89), 2 ♂♂/30 ♀♀ aus trockenem Mist und Stroh gesiebt, 22. 2. 1986; – Großen-Linden (MA 79), 8 Expl. aus Strohresten und Bodenstreu eines alten Schafstalles gesiebt, 18. 2. 1986, beide leg. KÖHLER.
- 58.004.004 – *Enicmus anthracinus* (MANNERHEIM): Horlofftal bei Schotten (NA 09), 1 Expl. aus Gesiebe unter anbrüchiger Eiche, 24. 3. 1986 leg. KÖHLER (det. K. Koch).
- 58.004.015 – *Enicmus histrio* JOY TOMLIN: Ohmniederung bei Marburg (MB 92), in Anzahl aus anbrüchigen Salweiden gesiebt, 21. 3. 1986 leg. KÖHLER.
- 58.006.001 – *Adistemia watsoni* (WOLLASTON): Frankfurt-Eschersheim (MA 75), in Anzahl in einem Badezimmer, 18. 8. 1986 leg. K. HIEKMANN in coll. SMF und coll. BATHON. **Neu für Hessen.** Die Art dürfte in Haushaltungen oder auch in Vogelneestern (z. B. von Tauben) weiter verbreitet sein.

Mycetophagidae

- 59.002.001 – *Triphyllus bicolor* (FABRICIUS) (Abb. 7): Groß-Gerauer Forst (MA 63), am 4. 7. 1985 und 16. 7. 1986 je 1 Expl. von Baumpilzen geklopft, leg. LUCHT. (3)
- 59.004.002 – *Mycetophagus ater* (REITTER) (Abb. 8): Wald bei Groß-Gerau (MA 64) an einem liegenden, alten Stamm. 2 Expl., 15. 5. 1985 leg. BECKER. – Groß-Gerauer Forst (MA 63), am 3. 7. 1985, 21. 7. und 11. 8. 1986 je 1 Expl. unter Holzschuppen einer alten, abgestorbenen Eiche bzw. von Baumschwämmen geklopft, leg. LUCHT. – Es handelt sich um eine sibirisch-mandschurische Art, deren Westgrenze von den polnischen Beskiden über die Ostslowakei und das Burgenland nach Nordjugoslawien verläuft. Abgesehen von der Meldung eines Einzelexemplares aus Ostfrankreich, stellt das Vorkommen im Groß-Gerauer Forst den westlichsten, in Deutschland einzigen, isolierten Standort dar, der bereits 1902 von SATTLER nachgewiesen wurde (BÜCKING 1931).

Colydiidae

- 60.001.002 – *Myrmecoxenus vaporariorum* (GUÉRIN): Wetttenberg bei Gießen (MB 70), 23 Expl. in trockenem Stallmist, 1. 3. 1986 leg. KÖHLER.
- 60.003.001 – *Pycnomerus terebrans* (OLIVIER): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am 3. 7. 1985 am Fuß einer alten Eiche von Gebüsch geklopft, leg. LUCHT. (2)




Abb. 7. *Triphyllus bicolor* (FABRICIUS), Länge: 3,6 mm. – Abb. 8. *Mycetophagus ater* (REITTER), Länge: 4,4 mm. – Abb. 9. *Teredus cylindricus* (OLIVIER), Länge: 4,5 mm. – Abb. 10. *Lyctus brunneus* (STEPHENS), Länge: 4,1 mm.

60.013.001 – *Synchita humeralis* (FABRICIUS): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 3 Expl. am 26. 6. und 11. 8. 1986 von morschen, verpilzten Ästen geklopft, leg. LUCHT.

60.020.001 – *Teredus cylindricus* (OLIVIER) (Abb. 9): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. unter loser Rinde eines am Boden liegenden Eichenastes, 4. 7. 1985 leg. LUCHT. (1)

Endomychidae

61.002.001 – *Mycetaea hirta* (MARSHAM): Horlofftal bei Schotten (NA 09), 100 Expl. aus der Streu eines Viehunterstandes gesiebt, 24. 3. 1986 leg. KÖHLER.

61.003.002 – *Symbiotes gibberosus* (LUCAS): Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 1 Expl. in einem schimmeligen Heuhaufen, 27. 9. 1986 leg. BRENNER. (1)

Coccinellidae

62.006.001 – *Rhyzobius litura* (FABRICIUS): Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 1 Expl. in einer Bodenfalle zwischen Kräutern unter einem Gebüsch am Rande eines Feldgehölzes, 4. – 11. 9. 1986 leg. BRENNER.

Cisidae

65.006.022 – *Cis alni* GYLLENHAL: Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am 9. 7. 1985 aus einem Baumschwamm, in dem die Tiere gesellschaftlich lebten, leg. LUCHT.

65.007.002 – *Ennearthron cornutum* (GYLLENHAL): Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 5 Expl. aus anbrüchigen Salweiden gesiebt, 21. 3. 1986 leg. KÖHLER.

Lyctidae

66.002.002 – *Lyctus africanus* LESNE: Darmstadt (MA 72), in Arztpraxis in Massen aus Türzargen, die aus Abachi (einem afrikanischen Hartholz) gefertigt waren, 3. 6. 1986 coll. BATHON. Die Modeerscheinung, afrikanische Harthölzer zum Innenausbau von Wohnhäusern oder Repräsentationsräumen zu verwenden, führte z. T. zu erheblichen

Schäden durch eingeschleppte Lyctiden (s. a. CYMOREK 1979). So mußten auch die gesamten Abachi-Einbauten in den o. g. Praxisräumen durch einheimische Hölzer ersetzt werden. Neben *L. africanus* tritt in den letzten Jahren in Darmstadt und Umgebung auch verstärkt *L. brunneus* (STEPHENS) (Abb. 10) auf; 2 Expl. 7. 7. 1986 aus Darmstadt in coll. BATHON.


Anobiidae

- 68.008.002 – *Oligomerus brunneus* (OLIVIER) (Abb. 11): Groß-Gerauer Forst (MA 63), am 21. und 28. 7. 1986 je 1 ♂ und ♀ von trockenen Ästen geklopft, leg. LUCHT. (2)
 68.012.011 – *Anobium denticolle* (CREUTZER): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 12. und 14. 7. 1985 sowie 17. 7. 1986 je 1 Expl. von morschen Ästen geklopft, leg. LUCHT. Zusammen mit diesem wurden häufig auch *A. costatum* ARRAG. und *A. fulvicorne* STURM beobachtet. – Wettenberg bei Gießen (MB 70), unter loser Eichenrinde, 1 Expl., 1. 3. 1986 leg. KÖHLER. (2)
 68.022.007 – *Dorcatoma robusta* STRAND (Abb. 12): Groß-Gerauer Forst (MA 63). Die 1980 für Hessen erstmalig nachgewiesene Art konnte am 28. 7. 1986 in 1 Expl. von einem Buchenast geklopft werden, leg. LUCHT.

Ptinidae

- 69.008.010 – *Ptinus villiger* REITTER: Marburg (Truppenübungsplatz, MB 82), 1 ♂ aus Holz, Rindenteilen usw. einer Eiche gesiebt, 18. 3. 1986 leg. KÖHLER.

Abb. 11. *Oligomerus brunneus* (OLIVIER), Länge: 5,3 mm. – Abb. 12. *Dorcatoma robusta* STRAND, Länge: 3,9 mm. – Abb. 13. *Orchesia fasciata* (ILLIGER), Länge: 4,1 mm.



Oedemeridae

- 70.001.001 – *Calopus serraticornis* (LINNÉ): Frankfurt/Main, Innenstadt, Senckenberg-anlage (MA 75). 1 Expl. 29. 4. 1987 leg. KLINGER. Aus der näheren Umgebung von Frankfurt ist bis jetzt nur ein Exemplar aus dem Schwanheimer Wald von 1932 belegt (s. a. BATHON 1981 und 1985). Eine Entwicklung im bebauten Stadtgebiet ist recht unwahrscheinlich. Eher dürfte das 1987 gefangene Exemplar mit Holz eingeschleppt oder vom Licht angelockt in die Stadt zugeflogen sein. (3)
- 70.009.001 – *Oncomera femorata* (FABRICIUS): Mäusberg, Nähe Wiesenfeld (NA 53), 1 Expl. beim Lichtfang auf einem Trockenrasen angeflogen. 6. 6. 1981 leg. BRENNER. (2)

Pythidae

- 71.002.002 – *Lissodema quadripustulatum* (MARSHAM): Groß-Gerauer Forst (MA 63), am 3. und 4. 7. 1985 sowie am 16. 7. 1986 je 1 Expl. von trockenen Ästen geklopft, leg. LUCHT.
- 71.007.001 – *Rhinosimus aeneus* OLIVIER: Horlofftal bei Schotten (NA 09), 1 Expl. aus Gesiebe der Streu unter einer anbrüchigen Eiche, 24. 3. 1986 leg. KÖHLER. (1)

Scaptiidae

- 73.001.003 – *Scaptia fuscula* MÜLLER: Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 1 Expl. aus einer Stammhöhle in Spitzahorn (*Acer pseudoplatanus* LINNÉ), 4. 7. 1986 leg. BRENNER. Der letzte gemeldete Fund aus Ginnheim stammt von vor 1904 (Zusammenstellung bei BATHON 1983). (2)

Aderidae

- 74.002.006 – *Aderus pygmaeus* (DEGEER): Groß-Gerauer Forst (MA 63). 1 Expl. nahe einer alten Eiche von Gebüsch geklopft, 3. 7. 1986 leg. LUCHT. (2)
- 74.002.008 – *Aderus populneus* (CREUTZER): Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 2 Expl. am 7. 2. 1984 und 1 Expl. am 15. 3. 1986 im Mulm einer Stammhöhle in einem Spitzahorn, leg. BRENNER. (2)

Anthicidae

- 75.004.020 – *Anthicus formicarius* (GOEZE): Wettenberg bei Gießen (MB 70) in trockenem Stallmist, 7 ♂♂/50 ♀♀, 1. 3. 1986 leg. KÖHLER.
- 75.004.025 – *Anthicus bimaculatus* (ILLIGER): Pfungstadt (MA 71), auf Spargelfeldern 1986 in großer Anzahl in Bodenfallen (s. BATHON & RETHMEYER 1988). Die jahreszeitliche Verteilung der Fänge ist in Abb. 14 für zwei benachbarte Felder dargestellt. Leg. RETHMEYER in coll. BATHON. (3)

Mordellidae

- 79.006.002 – *Curtimorda bisignata* (REDTENBACHER): Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 5 Expl. Ende Juni und 2 Expl. am 13. 7. 1986 an einem Baumpilz an einem liegenden Stamm einer abgestorbenen Weide, leg. BRENNER. **Neu für Hessen.**




Abb. 14. Populationsentwicklung von *Anthicus bimaculatus* (ILLIGER) auf zwei nur durch einen Sandweg getrennten Spargelfeldern bei Pfungstadt, 1986 (s. a. RETHMEYER 1987); ● = Feld I, ○ = Feld II. Fänge mit 8 bzw. 10 Bodenfallen von etwa 10 cm Durchmesser. Die Anzahl gefangener Tiere ist gegen die wöchentlichen Leerungstermine der Fallen aufgetragen.

Serropalpidae

80.005.005 – *Orchesia fasciata* (ILLIGER) (Abb. 13): Groß-Gerauer Forst (MA 63), am 17., 22. und 28. 7. 1986 je 1 Expl. von morschen Ästen geklopft, leg. LUCHT. (2)

80.005.006 – *Orchesia undulata* KRAATZ: Frankfurt-Ginnheim (MA 75), 1 Expl. an verpilztem Holz einer Hainbuche im Ginnheimer Wäldchen, 27. 10. 1986 leg. BRENNER. (3)

Tenebrionidae

83.020.001 – *Platydemus violaceum* (FABRICIUS): Erfelden (MA 52), aus Hochwassergestank des Rheins gesiebt. 11. 1. 1984 leg. BECKER.

Scarabaeidae

85.022.001 – *Rhyssomus germanus* (LINNÉ): Groß-Gerau (MA 63) am Schlammteich der Zuckerfabrik unter einem Stein, 25. 5. 1985 leg. BECKER.

- 85.024.001 – *Pleurophorus caesus* (CREUTZER): Frankfurt-Ginnheim (MA 75), 1 Expl. am 10. 5. 1986 in schimmeligem Heuhaufen. leg. BRENNER. (2)
 85.032.003 – *Anoxia villosa* (FABRICIUS): Büttelborn (MA 62), gegen Abend an einer Hauswand sitzend. 16. 7. 1983 leg. SEIPEL in coll. BECKER.


Cerambycidae

- 87.022.001 – *Cortodera femorata* (FABRICIUS): Im „Alten Hegwald“ bei Raunheim (MA 64) auf einer gefällten Kiefer. 20. 5. 1985 leg. BECKER.
 87.075.007 – *Pogonocherus decoratus* FAIRMAIRE: Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am 17. 7. 1986 aus Reisig geklopft, zusammen mit *P. hispidus* (LINNÉ) und *P. fasciculatus* (DEGEER), leg. LUCHT.
 87.076.001 – *Calamobius filum* (ROSSI) (Abb. 15): Frankfurt (MA 75), Innerstädtische Anlage, 1985 in Anzahl, 1 ♂ und 1 ♀ leg. KLINGER (s. a. KLINGER 1985). Es handelt sich um das bislang nördlichste Vorkommen der Art. Der zuvor nördlichste Fund von 1979 aus Dossenheim (MV 77) wurde von BATHON (1981) mitgeteilt. **Neu für Hessen.** (1) Die Art ist sicherlich nicht vom Aussterben bedroht, wie die Einordnung in der Roten Liste glauben macht. Vielmehr scheint der Käfer sein Verbreitungsareal in den letzten Jahrzehnten weiter nach Norden auszudehnen. Es stellt sich hier die Frage, ob es sinnvoll ist, solche Arten, die in Deutschland ihre Verbreitungsgrenze erreichen, überhaupt in eine der höheren Kategorien der Roten Liste einzureihen.
 87.080.001 – *Exocentrus adpersus* MULSANT: Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. von einem Eichenast geklopft, 26. 6. 1986 leg. LUCHT. (3)
 87.082.004 – *Saperda scalaris* (LINNÉ): Aus Eichen-Brennholz aus der Umgebung des Forsthauses Wiesental bei Worfelden (MA 63) zusammen mit zahlreichen *Leiopus nebulosus* (LINNÉ). 9. 5. 1985 leg. BECKER.

Chrysomelidae

- 88.035.012 – *Phytodecta intermedius* HELLER: Schloßborn/Taunus (MA 56), 5 Expl. am Rande der Blockhalde am NSG „Rentmauer“ von Gebüsch geklopft. 1. 7. 1985 leg. HÖHNER.
 88.049.017 – *Phyllotreta diademata* (FOUDRAS): Frankfurt-Ginnheim (MA 75), 1 Expl. am 14. 9. 1986 auf Meerrettich, leg. BRENNER. (3)

Abb. 15. *Calamobius filum* (ROSSI), Länge (ohne Fühler): 8,3 mm.



88.050.006 – *Aphthona pallida* (BACH): Nach HORION (1951) nur alte Funde in Hessen; neuere Angaben fehlen. Roßdorf (MA 82), im September 1985 in Anzahl an verschiedenen *Geranium*-Sorten im Hausgarten, die kahlgefressen wurden, leg. BATHON. Nach HÖHNER (mdl.) bei Erlensee (MA 95) regelmäßig in Anzahl auf *Geranium pratense* (LINNÉ). (2)

Anthribidae

- 90.006.001 – *Enedreutes sepicola* (FABRICIUS): Groß-Gerauer Forst (MA 63), von trockenen Ästen geklopft. 3 Expl. am 13. 7. 1985 und 21. 07. 1986, leg. LUCHT.
 90.008.001 – *Dissoleucas niveirostris* (FABRICIUS) (Abb. 16): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am 22. 7. 1986 aus Reisig geklopft, leg. LUCHT; am 30. 7. 1986 in Anzahl beobachtet.
 90.015.002 – *Choragus sheppardi* KIRBY: Groß-Gerauer Forst (ZMA 63), 1 Expl. am 22. 7. 1985 vom Laub einer jungen Hainbuche geklopft, leg. LUCHT. (3)

Scolytidae

- 91.031.003 – *Taphrorychus bicolor* (HERBST): Marburg (Truppenübungsplatz, MB 82), 1 ♂ aus Holz, Rindenteilen usw. einer Eiche gesiebt, 18. 3. 1986 leg. KÖHLER.

Curculionidae

- 93.001.001 – *Rhinomacer attelaboides* FABRICIUS (Abb. 17): Mühlheim-Lämmerspiel (MA 95), Umgebung Gailenberg, 2 Expl. von blühenden Kiefern geklopft, 15. 5. 1982 leg. LUCHT.
 93.002.001 – *Doydirhynchus austriacus* (OLIVIER) (Abb. 18): Die in Mitteleuropa weit verbreitete Art wird meist nur selten gefunden. Heppenheim (MV 79), 6. 5. 1967 und Roßdorf (MA 82), 17. 4. 1981 je 1 Expl. leg. BATHON. – Mühlheim-Lämmerspiel (MA 95), Umgebung Gailenberg, 1 Expl. von blühender Kiefer geklopft, 15. 5. 1982 leg. LUCHT. – Neu Isenburg/Gravenbruch (MA 84), Nähe Dornsee von einer Kiefer geklopft, 20. 4. 1986 leg. KARNER. (3)
 93.013.053 – *Apion hoffmanni* WAGNER: Lorch/Rhein (MA 14), 1 Expl. am Nolling gekätschert, 28. 6. 1986 leg. HÖHNER.
 93.013.057 – *Apion sulcifrons* HERBST: Mainz (MA 44), 5 Expl. am NSG „Mainzer Sand“ von *Artemisia campestris* LINNÉ geklopft. 23. 8. 1986 leg. HÖHNER. (2)
 93.015.004 – *Otiorhynchus dieckmanni* MAGNANO: Frankfurt (MA 75), Innerstädtische Anlage, 1 Expl. 1986 det. KIPPENBERG, leg. KLINGER. **Neu für Hessen.**
 93.015.042 – *Otiorhynchus lugdunensis* BOHEMAN: Frankfurt-Ginnheim (MA 75), 1 Expl. auf einem Weg zwischen Kleingärten, 10. 4. 1982 leg. BRENNER.
 93.078.005 – *Rhyncholus punctatulus* BOHEMAN: Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 7 Expl. im morschen Holz einer Stammhöhle in einem Spitzahorn von Ende Juni bis Ende Juli 1986, leg. BRENNER.
 93.086.001 – *Dicranthus elegans* (FABRICIUS): Geinsheim (MA 52), 1 Expl. nach Treten des feuchten Bodens am Ufer eines Sees laufend. 20. 4. 1985 leg. HÖHNER. (2)
 93.112.008 – *Magdalis armigera* (FOURCROY): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am 30. 7. 86 von Gebüsch geklopft., leg. LUCHT.
 93.113.001 – *Trachodes hispidus* (LINNÉ): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am 13. 7. 1985 von einem dünnen Ast geklopft, leg. LUCHT.




Abb. 16. *Dissoleucas niveirostris* (FABRICIUS), Länge: 4,7 mm. – Abb. 17. *Rhinomacer attelaboides* FABRICIUS, Länge: 5,3 mm. – Abb. 18. *Doydirhynchus austriacus* (OLIVIER), Länge: 5,0 mm.
Alle Fotos: H. KRETSCHMER

- 93.120.001 – *Epipolaeus caliginosus* (FABRICIUS): Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Nidda-tal, 1 Expl. in einer Bodenfalle an einer Ruderalstelle inmitten einer Wiese, 5.–12. 8. 1983; 1 Expl. in einer Bodenfalle auf einer Wiese, 22.–29. 5. 1985, leg. BRENNER. – Frankfurt (MA 75), Innerstädtische Anlage, 1 Expl. 1986 leg. KLINGER. (3)
- 93.135.015 – *Acalles ptinoides* (MARSHAM): Marburg (Truppenübungsplatz, MB 82), 1 Expl. aus Holz, Rindenteilen, usw. einer Eiche gesiebt, 18. 3. 1986 leg. KÖHLER, det. K. KOCH. (3)
- 93.145.001 – *Rhinoncus albicinctus* GYLLENHAL: Geinsheim (MA 52), in Anzahl von einem im Wasser eines Sees stehenden Knöterich (*Polygonum* sp.) geklopft. 3. 8. 1985 leg. HÖHNER. (3)
- 93.110.007 – *Curculio cerasorum* HERBST: Neu Isenburg/Gravenbruch (MA 84), Nähe Dornsee, 1 Expl. am 17. 5. 1985 von einer Erle geklopft, leg. KARNER.
- 93.163.067 – *Ceutorhynchus suturalis* (FABRICIUS): Großen-Linden (MA 79), 1 Expl. aus Strohresten und Bodenstreu eines alten Schafstalles gesiebt, 18. 2. 1986 leg. KÖHLER.

Zusammenfassung

Der Bericht faßt Meldungen über 164 selten gefundene oder faunistisch bemerkenswerte Käferarten aus Hessen zusammen. Darunter befinden sich wieder eine Anzahl Tiere der „Roten Liste“: Gefährdungsgrad 1:7, Gefährdungsgrad 2 und 3: jeweils 20. Weiterhin sind einige Erstfunde für Hessen zu verzeichnen.

Summary

A compilation of 164 species of beetles (Ins., Coleoptera) of faunistic importance is provided including some species new to Hessen. 47 species of this compilation are registered in the Red Book of the Federal Republic of Germany, the so called „Rote Liste“, in the categories 1, 2 and 3.

Literatur

- BATHON, H. (1981): Käferfunde aus der weiteren Umgebung von Offenbach am Main und Darmstadt. – Ber. Offenbach. Ver. Naturkd. **82**, 21–27, Offenbach am Main.
- BATHON, H. (1983): Faunistik der hessischen Koleopteren. Achter Beitrag. Familie Scraptiidae. – Mitt. int. Entomol. Ver. **7**, 41–46, Frankfurt am Main.
- BATHON, H. (1985): Käferfunde der Jahre 1982 bis 1984 aus Hessen. 2. Bericht der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen. – Hess. faun. Briefe **5**, 20–29, Darmstadt.
- BATHON, H. & U. RETHMEYER (1988): Zur epigäischen Fauna von Spargelfeldern in Südhessen. – Mitt. dtsh. Ges. allg. angew. Entomol. **6** (im Druck), Gießen.
- BÜCKING, H. (1931): Die Käfer von Nassau und Frankfurt von Prof. Dr. Lucas von HEYDEN. Erster Nachtrag zur II. Auflage des Hauptverzeichnisses. – Entomol. Bl. **27**, 122–128, Krefeld.
- CYMOREK, S. (1979): Der Fall *Lyctus*. Skizzen über Auftreten, Bedeutung und Bekämpfung eines Holzwurms. – Der praktische Schädlingsbekämpfer **31** (5), 66–69.
- DINGLER, M. (1934): Die Tierwelt des Spargelfeldes. – Z. angew. Entomol. **21**, 291–328, Hamburg.
- FREUDE, H., K. W. HARDE & G. A. LOHSE (1964–1983): Die Käfer Mitteleuropas. Bde. **1–11**. – Krefeld (Goecke & Evers).
- GEISER, R. (1984): Rote Liste der Käfer (Coleoptera). – In: J. BLAB, E. NOWAK, W. TRAUTMANN & H. SUKOPP (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. 4. Aufl. 75–114, Greven (Kilda).
- HORION, A. (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas. – Stuttgart (Kernen).
- HORION, A. (1953): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Band 3, Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae). – Entomol. Arb. Mus. G. Frey, Sonderband, München.
- KLINGER, R. (1985): Eine städtische Grünanlage in Frankfurt am Main: Nördlichste Enklave für den Getreidebockkäfer *Calamobius filum* ROSSI (Col., Cerambycidae). – Mitt. int. entomol. Ver. **10**, 37–38, Frankfurt a. M.
- LUCHT, W. (1985): *Isorhipis marmottani* (BONV.) neu für Deutschland (Col. Eucnemidae). – Entomol. Bl. **81**, 91–94, Krefeld.
- LUCHT, W. (1987): Die Käfer Mitteleuropas. Katalog. – Krefeld (Goecke & Evers).
- MALTEN, A. (1985): *Calathus mollis* (MARSHAM 1802) (Coleoptera: Carabidae) – neu für Hessen. – Hess. faun. Briefe **5**, 71–72, Darmstadt.
- PHILIPP, E. (1968): Zur Kenntnis der Morphologie und Biologie von *Trogoderma angustum* SOLIER, 1849 (Coleoptera: Dermestidae). – Z. angew. Zool. **55**, 193–256, Berlin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Bathon Horst

Artikel/Article: [Käferfunde der Jahre 1985 und 1986 aus Hessen Teil II 38-47](#)