

der Asplenien Mitteleuropas, Ber. d. Bot. Gesellschaft 1958, LXXXI, (1), S. 11—20, desgl. 1959, LXXII, (1), S. 37—48. — Wigand, A.: Flora von Hessen und Nassau II. Teil, herausgegeben von Fr. Meigen, Marburg 1891.

Schriftenschau

- Rühl, Arthur: Über die Waldvegetation der Kalkgebieten nordwestdeutscher Mittelgebirge. Decheniana, Beiheft 8, S. 1—50 und Tabellen, Bonn, 1960. — Neben einer vergleichenden floristischen Übersicht der Höhenzüge zwischen dem Sauertal (Eifel) und dem Harz bringt der Verf. eine eingehende Betrachtung der Waldgesellschaften auf Kalkunterlage dieser Berglandschaften Nordwestdeutschlands. Nach Ansicht des Verf. ist der Kalkbuchenwald eine natürliche Gesellschaft nicht zu steiler Kalkhänge. Eine Schwierigkeit bestand darin, in den stark forstlich beeinflussten Gebieten Flächen zu finden, die den natürlichen Artenbestand aufweisen. Die Arbeit ist auch für uns von Bedeutung, weil die nordhessischen Berglandschaften (das Waldecker Hochland, die Diemelplatten, das untere Werratal) neben den angrenzenden westfälischen und niedersächsischen Gebieten ebenfalls behandelt werden. Lipser
- Strohmeyer, Dr.: Erhalten die schönen, alten „Hudebuchen“! Büdinger Kreis-Anzeiger, Nr. 256, 1960. — Die das Landschaftsbild des Vogelsberges sehr anziehend gestaltenden Buchen und Buchengruppen auf den Weideflächen sind nicht leicht zu ersetzen und verdienen deshalb besonderen Schutz. Sie sind auch für die botanische Forschung von Bedeutung. Lipser
- Ber. Bayer. Botan. Ges. 33, 1960. Gauckler, K.: Die Flaumflechten *Cystocoleus niger* und *Racodium rupestre* im fränkischen Schichtstufenland Nordbayerns. — Hohenester, A.: Grasheiden und Föhrenwälder auf Diluvial- und Dolomitsanden im nördl. Bayern (eine auch für die Sandgebiete im Rhein-Main-Gebiet Hessens wichtige Arbeit).
- „ — 32 (Nachtrag 1957/58). Florenlisten von den Exkursionen. Lipser
- Decheniana 112 (2) 1959/1960, Bonn. Lemke, W.: Über das Erkennen von Weidenbastarden. — Schwarz und Butin: Wirkkreis der Laubholz-Mistel. — Exkursionsberichte (Merzig/Saar, Hunsrück-Lothringen). Lipser
- Natur und Heimat, Münster 1960. 20 (2). Nieschalk, A.: Die Violette Sumpfwurz in Westfalen. — 20 (3). Runge, F.: Ausbreitung des Moorgreiskrautes in Nordwestdeutschland. — Hünnerbein: *Epipactis rubiginosa* und *Geum rivale* im Siegerland. — 20 (4). Jahn, H.: Pilzflora des Natsch.-Geb. „Heidesumpf an der Strothe“. — Koppe, F.: Die Vegetationsverhältnisse des Kapberges bei Sonneborn. — Runge, F.: Änderung der Vegetation im Moor an der Satzer Mühle. Lipser

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1961

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Lipser Heinrich Karl

Artikel/Article: [Schriftschau 12](#)