

HESSISCHE FLORISTISCHE BRIEFE

VERLAG

INSTITUT FÜR NATURSCHUTZ DER HESSISCHEN LANDESSTELLE
FÜR NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE DARMSTADT

SCHRIFTFLEITUNG

HEINRICH LIPSER, OFFENBACH/MAIN-BÜRGEL, OFFENBACHER STRASSE 68

Jahrgang 11

Brief 131

Seiten 49-52

Darmstadt 1962

Neuere botanische Funde aus Nordhessen

Albert und Charlotte N i e s c h a l k , Korbach

Als Nachtrag zu der GRIMMESCHEN „Flora von Nordhessen“ geben wir im folgenden eine Zusammenstellung botanischer Funde und Berichtigungen aus den Jahren 1958 bis 1961.

Equisetum pratense EHRH. Waldwiese auf dem Meißner unterhalb der Seesteine, reichlich an Waldrändern und an kleinen Wasserläufen, 1961.

Equisetum hiemale L. Laubmischwald am Südadfall des Meißners unterhalb der Kaiserstraße, zahlreich in sehr lockeren Beständen auf feucht-lehmigem Boden, 1961.

Zu der Angabe von BISKAMP „Vöhl am Homberg“: ein dichter Massenbestand in einem Quellbachtal am Homberg bei Vöhl ist noch heute vorhanden, 1960.

Lycopodium issleri ROUY. Meißner auf der Hausener Hute zusammen mit *L. alpinum* L. Bisher nicht von *L. alpinum* unterschieden und nicht als *L. issleri* erkannt, 1961.

Ophioglossum vulgatum L. Sumpfwiese bei Rhöda bei Volkmarsen, 1960.

Polystichum lobatum (HUDS.) CHEV. Karlshafen, Bergwald am Steilhang unterhalb der Hessischen Klippen, 28 gutentwickelte Stöcke, 1961.

Polystichum braunii (SP.) FÉE. Meißner, an zwei weiteren bisher unbekanntenen Stellen mit über 60 gutentwickelten Stöcken, Wedellängen bis zu 85 cm, 1961.

Dryopteris tavelii ROTHM. Kühler Buchenmischwald am Sübabhang des Meißners auf Buntsandstein über 15 gutentwickelte Stöcke, 1961.

Typha angustifolia L. Hofgeismar, Kelzer Teich, 1959; Höhnscheid bei Freienhagen, in der Verlandungszone des Höhnscheider Teiches, 1959.

Sparganium simplex HUDS. Herzhausen, am Rande des Edersees, 1959; Klosterreich bei Flechtdorf, Krs. Waldeck, 1959; Diemel bei Westheim, 1959; Stöckerteich und Jeppeteich bei Landau, 1959.

Triglochin maritimum L. Philippsthal, an der Werra, 1961.

Aira praecox L. Bad Wildungen, oberhalb des Sonderrains, 1959.

Scirpus setaceus L. Meißner, eichlich auf einem feuchten Waldweg, auf Buntsandstein, zwischen Seesteinen und Hasselbach, 1961; zahlreich im Diemelseestaubecken bei abgesunkenem Wasserstand, 1959; Wrexen, im Schweinegrund, 1959.

Scirpus acicularis L. Massenhaft im Diemelseebecken bei abgesunkenem Wasserstand, 1959.

Carex elongata L. Reinhardswald, zahlreich in einem Erlensumpf am Gahrenberg, 1960; Teichrand am Bahnhof Cornberg, Krs. Rotenburg, 1961.

Carex umbrosa HOST. Landsburg (a. d. Schwalm), 1959; Bad Wildungen, Gebüschränder im Wildetal gegenüber dem Bilstein, 1960.

Carex ornithopoda WILLD. Außerhalb des Verbreitungsgebietes im östlichen Teil von Nordhessen (Werratal—Sontra—Vorderröhn) am Kleinen Schreckenbergr bei Zierenberg an felsigen Abhängen im lichten Laubmischwald, 1958.

Allium senescens L. Sehr reichlich an Basaltfelsen unterhalb von Gut Sauerburg bei Homberg/Efze, 1960.

Allium scorodoprasum L. Rhoden ist zu streichen, da Verwechslung mit *A. rotundum* vorgelegen hat; zwischen Lamerden und Eberschütz in einem lockeren Gebüsch an den Abhängen des Diemeltales, 1961.

Allium rotundum L. Rhoden, Krs. Waldeck, auf Trockenrasen und an Ackerrändern vor dem Quast (Muschelkalk), 1957, 1960, neu für Nordhessen.

Herminium monorchis (L.) R. BR. Lamerden, reichlich in einem Trockenrasen der Diemelabhänge, 1961.

Epipactis microphylla (EHRH.) Sw. Buchenwald am Osterberg bei Zwingen, 1959.

Goodyera repens (L.) R. BR. Moosreicher lichter Kiefernwald auf Muschelkalk am Ofenberg bei Wolfhagen, zahlreich, 1961.

Asarum europaeum L. Thalitter, Krs. Frankenberg, auf einer steinig bewaldeten Bergkuppe über dem Rosengarten, reichlich, 1961, neu für das Zechsteingebiet des mittleren Waldeck.

Rumex maritimus L. Diemelsee, 1959.

Rumex palustris SM. Teich bei Schloß Wilhelmsthal bei Kassel, 1961; am Fischteich bei Selbach, Krs. Waldeck, 1961.

Viscaria vulgaris ROEHL. Basaltfelsen unterhalb Gut Sauerburg bei Homberg/Efze, 1960.

Dianthus gratianopolitanus VILL. Hemfurth, Krs. Waldeck, reichlich an einem felsigen Schieferabhang oberhalb des Ortes, 1959.

Moenchia erecta (L.) G. M. SCHERB. Hemfurth, Krs. Waldeck, Schieferhang südlich des Ortes, 1960, 1961.

Spergularia salina PRESL. Philippsthal, 1961; Wintershall, 1961.

Nigella arvensis L. Die Angabe für Bad Wildungen (SCHOOF) muß lauten „Am Warteköppel“ anstatt „Auf der Ense“; Mehlen, Krs. Waldeck, Massenbestand auf einem Lößabhang bei „Lieschens Ruh“, 1960.

Anemone silvestris L. Wacholderabhänge im Werbetal zwischen Alraft und Oberwerbe, Krs. Waldeck, 1961.

Ranunculus sceleratus L. Fischteich bei Selbach, Krs. Waldeck, 1961.

Berberis vulgaris L. An einigen Stellen auf gebüschreichen Muschelkalktriften und an Waldrändern im Gebiet Wolfhagen-Zierenberg-Laar.

Filipendula hexapetala GIL. Korbach, sehr reichlich am Hahnenberg (Dalwigker Holz) und auf einer Trift im unteren Marbecktal nach Itter zu, 1960.

Rosa pomifera HERRM. Steile Abhänge am Edersee zwischen Waldecker Schloßberg und Sperrmauer 15 bis 20 Sträucher, 1958.

Orlaya grandiflora (L.) HOFFM. Brachacker bei Renda im Ringgau, 1961.

Peucedanum cervaria (L.) CUSS. Graburg bei Netra im südöstlichen Teil der Hochfläche, 1959.

Pirola uniflora L. Gaulskopf bei Wethen, Krs. Waldeck, 1958.

Cynoglossum germanicum JACQ. Mehrfach in Linden-, Eichen-, Hainbuchenwäldern der Kahlen Hardt am Edersee bei Basdorf, Krs. Frankenberg, 1958.

Brunella alba PALL. Am Südberg zwischen Gertenbach und Witzenhausen mit Bastarden zwischen *B. alba* und *B. vulgaris*, 1961.

Teucrium montanum L. Reichlich an einigen Stellen am Dörnberg bei Zierenberg, 1961, zweites Vorkommen in Nordhessen.

Melampyrum cristatum L. Hainbuchegebüsch zwischen den Kupferhalden über Thal-Itter, Krs. Frankenberg, 1960.

Dipsacus pilosus L. Am Kleinen Schreckenbergrand bei Zierenberg und Waldrand im Warmetal in der Höhe von Laar, 1958, 1961.

Bidens radiatus THUILL. Im Diemelseestaubecken einige Pflanzen bei abgelassenem Wasser, 1959.

Senecio vernalis W. et KIT. Rhoden, 1959; Hesperinghausen, 1959.

Carlina acaulis L. Am Dörnberg bei Zierenberg, 1961.

Centaurea nigra L. Am Bahneinschnitt der Strecke Selbach—Netze, Krs. Waldeck, in Menge, 1958 und schon früher.

Kurzberichte

Auf Seite 40 des 130. H. Fl. Br. (Oktober 1962) findet sich die Bemerkung, daß „eine gedruckte Mitteilung über diesen Fund KORNECKS“ (= ein Exemplar von *Echinocystis lobata*, der Lappigen Rebschlinge, im Herbst 1953 bei Budenheim am Rhein) „(und über die ersten Nachweise der Igelgurke am Rheinufer“ sich nicht ausfindig machen ließ. Diese Angabe beruht auf einem bedauerlichen Versehen des Verfassers. Die entsprechende Mitteilung über „Die Lappige Rebschlinge und die Rosen-Melde am Mittelrhein“ von D. KORNECK findet sich in dem 59. H. Fl. Br. (November 1956) auf Seite 3. Sie war dem Verfasser bei der Zusammenstellung seiner Literatur entgangen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1962

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Nieschalk Albert, Nieschalk Charlotte

Artikel/Article: [Neuere botanische Funde aus Nordhessen 49-51](#)