

An einem Waldweg in der Nähe der Provinzialstraße kommt *Lycopodium annotinum* in kleinem Bestande vor. Im Jagen 167 stellten wir einen ca. 20 qm großen Bestand von *Lycopodium selago* L. in der f. *patens* (DESV.) TREV. fest. Dieser dürfte neu für das Gebiet sein. Der Bestand hat sich 1967 prachtvoll weiter entwickelt. In kleinerer Entfernung befindet sich im selben Jagen ein kleiner Bestand von *Lycopodium clavatum* in recht zierlicher Form.

Leider sind die beiden Bestände für die Zukunft sehr gefährdet, da der ca. 70jährige Buchenwald schlagreif ist und wohl kaum lange erhalten bleiben wird.

Orchis incarnatus L. bei Ingelheim

H. GERNER und H. OBERHAGE, Mittelheim

Im Brief Nr. 191 vom Nov. 1967 schreibt E. FISCHER (Neu-Isenburg) u. a., daß er bei wiederholt durchgeführten Begehungen der Sauerwiesen bei Frei-Weinheim sowie des Gau-Algesheimer Kopfes im Frühjahr 1965 keine *Orchis incarnatus* feststellen konnte, obwohl dieses Gebiet als Fundort angegeben und auch bekannt ist. Ebenso konnte er auch keine anderen Orchideenarten auffinden.

Dazu unsere Beobachtungen: Durch mehrere Begehungen der genannten Orte konnten wir 1967 auf den Rheinwiesen zwischen Frei-Weinheim und Heidenfahrt auf einer Sauerwiese am Zwergdamm 15 blühende *Orchis incarnatus* feststellen. Folgende weitere Orchideenarten wurden dort auf teils feuchten, teils trockengelegten Wiesen von uns aufgefunden: *Orchis latifolia* L., *Epipactis helleborine* L. und *Gymnadenia conopsea* L. Auf dem Gau-Algesheimer Kopf konnten wir 1967 feststellen: *Cephalanthera damasonium* Mill., *Gymnadenia conopsea* L. und *Ophrys insectifera* L. (3 Exemplare).

Ebenfalls ist uns aus sicherer Quelle bekannt, daß 1967 auf dem Gau-Algesheimer Kopf *Ophrys apifera* wiederaufgefunden wurde; uns selbst sind diese Fundstellen jedoch noch nicht bekannt.

Schriftenschau

KIFFMANN, R.: Schmetterlingsblütler (*Papilionatae*). In: Illustriertes Bestimmungsbuch für Wiesen- und Weidepflanzen des mitteleuropäischen Flachlandes. Teil C, 2. Auflage Freising-Weihenstephan 1966.

Das vorliegende, einzeln erhältliche Bändchen (65 Seiten, 130 Abbildungen, Kunstdruckpapier, geheftet 4,70 DM) ermöglicht auf einfache und recht anschauliche Weise das Bestimmen der Kleearten und der übrigen Dauergrünlandschmetterlingsblütler im blühenden und nichtblühenden Zustand. Es erscheint im Rahmen eines größeren Bestimmungswerkes für unsere Wiesen- und Weidepflanzen. Zu beziehen aus dem Selbstverlag des Verfassers, Dipl.-Landw. R. Kiffmann, (A-8010) Graz/Steiermark, Geidorfgürtel 34, Österreich.

R. Kiffmann

Orchis purpurea von einer Wuchsstelle bei Braunfels (Kreis Wetzlar). Aufn.: K. POHL, Wetzlar. ►

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Kiffmann R.

Artikel/Article: [Schriftschau 55-56](#)