

Literatur

- BURCK, O.: Die Flora des Frankfurt-Mainzer Beckens. II. Phanerogamen (= Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. **543**), Frankfurt a. M. 1940.
- DOSCH, L. u. J. SCRIBA: Excursions-Flora der Blüten- und höheren Sporenpflanzen des Großherzogthums Hessen. 2. Aufl. Darmstadt 1878, 3. Aufl. Gießen 1888.
- GRIMME, A.: Flora von Nordhessen (= Abh. Ver. Naturk. Kassel **61**), Kassel 1958.
- KOHL, F. G.: Excursions-Flora für Mitteldeutschland **2**, Leipzig 1896.
- PFEIFFER, L.: Flora von Niederhessen und Münden **2**, Kassel 1855.
- SCHENK, A.: Neue Mittheilungen über die Flora von Unterfranken. Verh. Phys. Med. Ges. Würzburg **1**, 213–246, Erlangen 1850.
- WIGAND, A.: Flora von Kurhessen und Nassau. 1. Aufl. Marburg 1859, 2. Aufl. Cassel 1875, 3. Aufl. Cassel 1879.
- : Flora von Hessen und Nassau. Teil 2: Fundorts-Verzeichnis, hrsg. v. F. MEIGEN, Marburg 1891.

Zur Flora des Rösbergs bei Rommerode

H. SAUER, Eschwege

Im Spätsommer 1967 war auf dem Rösberg bei Rommerode *Herminium monorchis* entdeckt worden (SAUER, 1968). Bei einer Nachschau am 26. 5. 1968 war die Vegetation auf dem Rösberg mit seiner unwirtlichen Höhenlage in ihrer Entwicklung noch weit zurück. Nur eine zwergige *Ophrys insectifera* wies eine geöffnete Blüte auf. Von *Herminium* war noch nichts zu erkennen. Knapp drei Wochen später zeigten sich zahlreiche winzige Pflänzchen von *Herminium monorchis* mit eben erkennbaren Knospen für die Blütenstände und an geschützter Stelle ein erstes recht kleines blühendes Exemplar. Die Vollblüte wurde in den letzten Junitagen erreicht. Nahe der Oberkante des Kalkbruchs wurden 79 blühende Pflanzen gezählt, westlich davon und entlang dem Nordwesthang bis in die Fichtenpflanzung hinein weitere kleinere Gruppen, insgesamt 184 Exemplare. Im warmen Sonnenschein lagerte Honigduft über den blühenden Pflänzchen.

Als Begleitflora wurden auf dem Hang außer den bereits im Herbst festgestellten *Veronica teucrium*, *Galium boreale*, *Campanula glomerata*, *Gentiana ciliata*, *Gentiana germanica* und *Gymnadenia conopea* u. a. notiert: *Antennaria dioica*, *Anemone silvestris*, *Ophrys insectifera*, *Listera ovata*, *Trifolium montanum*, *Phyteuma orbiculare*, *Onobrychis viciaefolia* und *Thesium pyrenaicum*.

Literatur

- SAUER, H.: Ein Vorkommen von *Herminium monorchis* im Nordosten Hessens. Hess. Flor. Briefe **17** (200), 44–45, Darmstadt 1968.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Sauer Helmut

Artikel/Article: [Zur Flora des Rösbergs bei Rommerode 4](#)