


Sporadisch auftretende Gräser im Werra-Meißner-Gebiet

F. HOTZLER, Frankershausen

Anläßlich einer Wanderung fiel mir im September 1969 am Südostausgang des Dorfes Oberhone bei Eschwege eine einzelstehende Gruppe kräftig gewachsener Gräser auf, die mein Interesse auf sich zog. Der Standort war ein aufgeschütteter Gartenhang eines Neubaugrundstückes am Fuße des „Steinröllchens“. Es handelte sich bei dem Fund anscheinend um eine *Panicum*-Art. Zu Hause konnte ich das Gras dann auch als die Hühner-Hirse *Panicum crus-galli* L. bestimmen. Nach GRIMME (1958) soll sie „Vereinzelt bei Eschwege“ vorkommen. Sie wurde hier m. W. aber lange nicht beobachtet.

Eine andere *Panicum*-Art, die Echte Hirse *Panicum miliaceum* L., ist seit einer Reihe von Jahren im Hofe des Bürgermeisteramtes in Frankershausen zu finden zusammen mit dem Kanariengras *Phalaris canariensis* L. Beide sind anscheinend mit Vogelfutter eingeschleppt worden. Vor einigen Jahren war *Panicum miliaceum* L. auch an der Eisenbahnschranke Strahlshausen b. Niederhone nordwestlich Eschwege zu finden.

Schließlich wurde die Grüne Borstenhirse *Setaria viridis* P. B. im vergangenen Jahr (1969) von Herrn ERNST BAIER, Witzenhausen, am Straßenrand von Werleshausen im Kreis Witzenhausen gefunden.



Aus Wildsamen durch Herrn F. MARQUARDT herangezogene Jungpflanze von *Claytonia perfoliata* in Darmstadt-Eberstadt. Die Art wird seit etwa 10 Jahren im Gebiet beobachtet. Aufn.: P. HARTMANN (Büro für Unterrichtshilfen Darmstadt, Stadtdokumentation).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Hotzler Fritz

Artikel/Article: [Sporadisch auftretende Gräser im Werra-Meißner-Gebiet 32](#)