

## **Neufund von *Goodyera repens* im oberen Kinzigtal**

H. u. D. SCHULZ, Atzbach

Anläßlich unserer Frühjahrsexkursionen in den Kreis Schlüchtern wurde von uns im Jahr 1971 ein größeres Vorkommen von *Goodyera repens* entdeckt. Nach Rücksprache mit Herrn SEIBIG (Gelnhausen) ist aus diesem Gebiet bisher kein Wuchsorit von *Goodyera repens* bekannt geworden. Es dürfte sich daher um einen Neufund handeln.

Das Vorkommen in der Gemarkung Sterbfritz (**5623**) erstreckt sich über ein Areal von ca. 3 Hektar. Es wurden 75 blühende Exemplare gezählt, so daß der Gesamtbestand auf etwa 300 bis 400 Pflanzen geschätzt wird. Das Vorkommen liegt im lichten Kiefernwald auf Muschelkalk.

## **Seltene Flechtenfunde bei Greifenstein im Westerwald**

K. POHL, Wetzlar

Nordwestlich von Greifenstein, fast am Fuße des Hinsteins, erstreckt sich eine mit zahlreichen Basaltblöcken bedeckte Heidefläche, in Greifenstein „Hamel's Heck“ genannt.

Hier entdeckte ich drei nicht häufige Flechtenarten, die seltenste davon aus der Familie der Strunkflechten, *Stereocaulon paschale*.

Als ich ein Stück des zarten Gewebes mit den kleinen braunen Früchten abbob, ahnte ich nicht, welchen lichenologischen Fund ich gemacht hatte. Erst die Bestimmung durch den bekannten Flechtenforscher und Kenner Herrn Dr. h. c. OSCAR KLEMENT bestätigte es mir. Es sei ihm an dieser Stelle für seine stete Hilfsbereitschaft beim Bestimmen der ihm von mir zugesandten Flechten herzlich gedankt.

Dr. KLEMENT teilte mir dazu mit: „Das Vorkommen von *Stereocaulon paschale* ist für Greifenstein bemerkenswert, obwohl nach Literaturangaben die Art in Hessen wiederholt gefunden wurde...“ An anderer Stelle: „Die *Stereocaulon*-Arten werden in Mitteldeutschland immer seltener und dürften, wie so viele Organismen, bald verschwunden sein.“

In der Nähe von *Stereocaulon paschale* fand ich noch *Stereocaulon dactylophyllum*. Dazu erklärte Dr. KLEMENT, es handle sich bei diesem neuen *Stereocaulon* um eine, einem meiner vorhergehenden Funde nahestehende Art, die in früheren Jahren in der Rhön noch häufig war.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: [21](#)

Autor(en)/Author(s): Schulz D., Schulz H.

Artikel/Article: [Neufund von Goodyera repens im oberen Kinzigtal](#)

[27](#)