

Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 3

(mit Nachträgen ab 1985)

- ADOLPHI, K.: Verwildernde und sich einbürgernde Kulturpflanzen; ausgewählte Beispiele – problematische Arten. Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12** (2), 39–46, Darmstadt 1987. [u.a. statt *Spiraea salicifolia* „sind mir selber aus Hessen nur Belege von *Spiraea alba* und *Spiraea* × *billardii* zu Gesicht gekommen“]
- BARTELS, H.: Jahrestagung in Göttingen vom 11. bis zum 16. Juni 1984. Mitt. Deutsche Dendrolog. Ges. **77**, 279–288, Stuttgart „1987“ [1988]. [mit Berichten über Park Wilhelmshöhe und die Karlsau in Kassel sowie über den Reinhardswald]
- BATHON, H. & G. WITTENBERGER: Die Naturdenkmale des Kreises Darmstadt-Dieburg (=Schriftenreihe Landkreis Darmstadt-Dieburg **3**), Dieburg 1986.
- BECKER, W.: Erster Nachweis des Nadelröschens, *Fumana procumbens*, im nördlichen Hessen [bei Volkmarsen auf MTB **4620/22**]. Botanik u. Naturschutz in Hessen **2**, 49–51, Frankfurt a.M. 1988.
- BERGMEIER, E.: Magerrasen und Therophytenfluren im NSG „Wacholderheiden bei Niederlemp“ (Lahn-Dill-Kreis, Hessen). Tuexenia **7**, 267–293, Göttingen 1987.
- BLAUFUSS, A.: Pflanzen der Berge im südlichen Hunsrück und der Nordpfalz (west- und nordeuropäische Florenelemente unserer Nahe-Heimat) (=Heimatkundl. Schriftenreihe des Landkreises Bad Kreuznach **23**), Bad Kreuznach 1987. [mit vielen Verbreitungskarten]
- BÖGER, K.: Vorflutgräben in der Rheinniederung südwestlich von Trebur – ihre Bedeutung als Rückzugsgebiete für gefährdete Pflanzenarten. Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12** (2), 19–28, Darmstadt 1987.
- BOHN, U.: Beobachtungen zur spontanen Grünlandregeneration auf Fichtenräumungsflächen im Naturschutzgebiet „Rotes Moor“/Hohe Rhön. Natur u. Landschaft **62** (9), 353–363, Stuttgart 1987.
- BOHN, U. & A. KRAUSE: Dr. WILHELM LOHMEYER 75 Jahre. Natur u. Landschaft **62** (9), 339–340, Stuttgart 1987.
- BREHM, J.: Der pH-Wert von Buntsandsteinquellen und -bächen. I. Waldgewässer im Knüllgebirge bei Hain- und Ersrode. Mitt. Ergänzungsstudium Ökol. Umweltsicherung **10**, 43–89, Witzenhausen „1985“ [1987]. [mit Hinweisen auf die Flora]
- BURGHause, A.: Zur Flechtenflora des „Mainzer Sandes“. Mainzer Naturwiss. Archiv **25**, 59–71, Mainz „1987“ [1988].
- BUSS, H.: Einige Neu- und Wiederentdeckungen in und bei Frankfurt. Botanik u. Naturschutz in Hessen **2**, 52–57, Frankfurt a.M. 1988.
- BUTTERFASS, TH.: Self-Taught Botanists of German Tongue. Ber. Deutsch. Bot. Ges. **100**, 347–371, Stuttgart 1987. [mit Hinweisen auf einige hessische „Liebhaberbotaniker“]
- BUTTERFASS, TH.: Liebhaberbotaniker deutscher Sprache. Ber. Bayer. Bot. Ges. **58**, 23–43, München „1987“ [1988]. [w.v.]
- BUTTLER, K. P.: Die Nelken-Sommerwurz, *Orobanche caryophyllacea* SMITH, bei Steinperf im nördlichen Gladenbacher Bergland. Botanik u. Naturschutz in Hessen **2**, 60–62, Frankfurt a.M. 1988.
- CAMPINO, I., G. HASSELBACH & R. SCHMIDT: Veränderungen einiger chemischer und biologischer Parameter des Bodens sowie der Zusammensetzung der Narbe

- einer Glatthaferwiese bei unterschiedlicher Nutzungs- bzw. Pflegeintensität – Ergebnisse zehnjähriger Versuchsdurchführung. Rasen/Turf/Gazon **17** (1), 7–14, Bonn 1986. [Untersuchungen in der Wieseckau bei Gießen]
- CONERT, H. J.: Geschichte der Botanik im Naturmuseum und Forschungsinstitut Senckenberg. Ber. Deutsch. Bot. Ges. **100**, 193–214, Stuttgart 1987.
- COX, E. J.: Has the role of the substratum been underestimated for algal distribution patterns in freshwater ecosystems? Biofouling **1** (1), 49–63, Chur usw. 1988. [mit Untersuchung der Diatomeen im Breitenbach bei Schlitz]
- DÖRFELT, H. & H. HEKLAU: Beitrag zur Systematik der Geastrales. II. Feddes Repertorium **98** (5–6), 357–368, Berlin 1987. [ausführlich „Zur Typisierung von *Geastrum calyculatum* FÜCKEL“ – Lectotyp stammt aus dem Rheingau]
- EICHHORN, J. & H. M. BRECHTEL: Ergebnisse der Waldschadenserhebung 1987 in Hessen. Forst- u. Holzwirt **42** (20), 550–553, Hannover 1987.
- ENGRABER, A.: Vorkommen bedrohter Pflanzenarten in hessischen Naturschutzgebieten. Schriftenreihe Hess. Landesanstalt f. Umwelt **64**, 88–114, Wiesbaden 1987.
- EVENARI, M.: Und die Wüste trage Frucht. Ein Lebensbericht. Gerlingen 1987. [der bekannte Botaniker berichtet auch über seine Lehr- und Wanderjahre in Buchenau, Marburg, Frankfurt und Darmstadt]
- FANGMEIER, A., L. STEUBING & J. GNITKE: Analyse der Schadstoffbelastung verschiedener Kompartimente eines Waldökosystems. Verhandl. Ges. f. Ökologie (Hohenheim 1984) **14**, 269–278, Göttingen 1986. [Untersuchungen in der Nähe des Rhein-Main-Flughafens]
- FEUSTEL, H.: Tiere und Pflanzen der Feuchtgebiete Steinbrücker Teich und Ruthsenbach. Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt N.F. **10**, 15, Darmstadt „1986“ [1987].
- FISCHER, A.: Untersuchungen zur Populationsdynamik am Beginn von Sekundärsukzessionen. Die Bedeutung von Samenbank und Samenniederschlag für die Wiederbesiedlung vegetationsfreier Flächen in Wald- und Grünlandgesellschaften (=Dissert. Bot. **110**), Berlin & Stuttgart 1987. [Untersuchungen am Schiffenberg bei Gießen, bei Unter-Widdersheim und am Mühlberg bei Niederkleen]
- FISCHER, A.: Ruderalvegetation im mittelhessischen Urbanbereich [in Gießen]. Inventar, Schutzmöglichkeiten und Schutzgrenzen. In: Ruderalvegetation – Kenntnisstand, Gefährdung und Erhaltungsmöglichkeiten. Ber. ü.d. Kolloquium Schutz- u. Erhaltungsmaßnahmen f. Ruderalvegetation Nordd. Naturschutzakad. Hof Möhr, 20.–21. 5. 1987, hrsg. v.D. BRANDES, 41–56, Braunschweig 1988.
- FISCHER, E.: Die Moosvegetation des Naturschutzgebietes „Mainzer Sand“. Mainzer Naturwiss. Archiv **25**, 73–84, Mainz „1987“ [1988].
- FLATAU, L., W. MASSNER & P. SCHIRMER: Myxomyceten aus Nordhessen – IV. Ein neuer Myxomycet aus der Umgebung von Kassel. Zeitschr. f. Mykologie **53**(1), 145–149, Schwäbisch Gmünd 1987. [*Lepidoderma crassipes* nov. spec. aus dem NSG Urwald Sababurg im Reinhardswald]
- Floristische Meldungen. Neufunde-Bestätigungen-Verluste. Botanik u. Naturschutz in Hessen **2**, 66–71, Frankfurt a.M. 1988.
- FREDE, A.: Vorkommen und Vergesellschaftung des Blaugrases (*Sesleria varia*) im Waldeckischen Zechsteingebiet. Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12** (2), 8–13, Darmstadt 1987.

- GALUNDER, R. & I. GORISSEN: Über *Littorella uniflora*, *Lepidium heterophyllum* und andere Pflanzenfunde im Bergischen Land und seiner Umgebung. Florist. Rundbr. **21** (1), 40–45, Göttingen „1987“ [1988]. [für die Fundortangabe von *Littorella* im hessischen Heisterberger Weiher fehlt der gedruckte Erstnachweis: Hess. Flor. Briefe **12** (138), 1963, S. 38]
- GARVE, E.: Atlas der gefährdeten Gefäßpflanzenarten in Niedersachsen und Bremen. Zwischenauswertung mit Nachweiskarten von 1982–1986. Teil **1** und **2**. Hrsg. Niedersächsisches Landesverwaltungsamt-Fachbehörde für Naturschutz. Hannover „1987“ [1988].
- GARVE, E. & H. E. WEBER: Verbreitung und Soziologie von *Mimulus moschatus* in Niedersachsen. Tuexenia **7**, 113–120, Göttingen 1987. [erwähnen Beleg aus dem Kaufunger Wald, 1872 gesammelt]
- GIES, TH., H. BRAUN & A. v. KÜCHLER: Die Wirkung von Luftverunreinigungen aus Verbrennungsmotoren auf den Frankfurter Stadtwald unter ökologisch-vegetationskundlichem Aspekt. Botanik u. Naturschutz in Hessen **2**, 5–48, Frankfurt a.M. 1988.
- GOERSS, H.: Die Adler-Eiche [bei Niederweidbach, Kr. Wetzlar]. Baum-Zeitung **21** (2), 51, Minden 1987.
- GOLLUB, G.: Bibliographie der Arbeiten von W. LOHMEYER. Natur u. Landschaft **62** (9), 341–343, Stuttgart 1987.
- GROSSE-BRAUCKMANN, H.: Über einige seltene resupinate Basidiomyceten. Zeitschr. f. Mykologie **53** (1), 81–92, Schwäbisch Gmünd 1987. [*Leucogyrophana montana* und *Mycoacia nothofagi* var. *australiensis* im Odenwald]
- GRUBE, A.: Ergänzungen zu „Verbreitung und Gefährdung der Orchideen in Hessen“ – Übersichtskarten. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **4** (1), 117–120, Hanau 1987.
- Grünflächenamt Landeshauptstadt Wiesbaden (Hrsg.): Landschaftsökologische Untersuchung **3**: Biotopkartierung. Wiesbaden 1986. [enthält viele floristische Angaben sowie Rasterkarten für die Stadt Wiesbaden]
- HAKES, W.: Veränderungen der Pflanzenbestandsstruktur durch natürliche Wiederbewaldungsvorgänge in nordhessischen Kalk-Halbtrockenrasen. Verhandl. Ges. f. Ökologie (Hohenheim 1984) **14**, 173–184, Göttingen 1986.
- HAKES, W.: Analyse sukzessionsbedingter Vegetationsveränderungen in nordhessischen Kalk-Halbtrockenrasen mit Hilfe multivariater Verfahren. Tuexenia **7**, 295–302, Göttingen 1987.
- HAKES, W.: Einfluß von Wiederbewaldungsvorgängen in Kalk-Magerrasen auf die floristische Artenvielfalt und Möglichkeiten der Steuerung durch Pflegemaßnahmen (=Dissert. Bot. **109**), Berlin & Stuttgart 1987. [Untersuchungen in Nordhessen]
- HANDKE, M., B. MODROW & M. NATH-ESSER: Parkpflegewerk für den Schloßpark Biebrich in Wiesbaden. Grundsätze zur Pflege, Wiederherstellung und langfristigen Erhaltung der historischen Parkanlage als Kulturdenkmal. Hrsg. Verwaltung der Staatl. Schlösser u. Gärten Hessen. Bad Homburg v.d.H. 1987. [enthält auch Abschnitte und Karten zur Flora und Vegetation]
- HANG, K.: Der Gau-Algesheimer Kopf und seine Flora (=Beitr. zur Geschichte des Gau-Algesheimer Raumes **19**), Gau-Algesheim 1986.
- HAUSNER, G.: Die Pilze im Naturschutzgebiet „Mainzer Sand“. Mainzer Naturwiss. Archiv **25**, 39–57, Mainz „1987“ [1988].
- HECKER, U.: Die Farn- und Blütenpflanzen des „Mainzer Sandes“. Mainzer Naturwiss. Archiv **25**, 85–133, Mainz „1987“ [1988].

- HEDEWIG, R.: Das Landschafts- und Naturschutzgebiet Dönche. Naturschutz u. Landschaftspflege in Kassel **5**, 2–7, Kassel 1988.
- HEDEWIG, R. & U. SCHAFFRATH: Freilandlabor Dönche. Eine Führung durch das Gelände. Kassel 1987.
- HEERDE, H.: Brutvogelbestand am Rendeler Mühlbach in der südlichen Wetterau. Beitr. Naturk. Wetterau **7** (1), 1–14, Friedberg 1987. [mit floristischen Hinweisen]
- HEGL, G.: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 2. Aufl. **6** (4): Compositae II: *Matricaria-Hieracium*. Berlin & Hamburg 1987. [S. 1353–1452: WAGENITZ, G.: „Nachträge, Berichtigungen und Ergänzungen zum Nachdruck der 1. Auflage von Band VI/2 (1928/9)“ mit bisher unveröffentlichten Angaben aus der hessischen Flora, u.a. zu *Echinops exaltatus*, *Leontodon saxatilis*, *Senecio rupestris*, *S. rupestris* × *viscosus* und *Tephrosia palustris*]
- HEINZBERGER, M., P. MEYER & TH. MEYER: Entwicklung der Gärten und Grünflächen in Frankfurt am Main (=Kleine Schriften des Historischen Museums Frankfurt am Main **38**), Frankfurt a. M. 1988.
- HELD, F. & S. SEYBOLD: Die Vegetation des Naturschutzgebiets Wüsträthenbach bei Weinheim. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. **62** (1986), 273–280, Karlsruhe 1987.
- HENSSEN, A.: *Lichenothelia*, a genus of microfungi on rocks. In: Progress and Problems in Lichenology in the Eighties (=Bibliotheca Lichenologica **25**), 257–293, Berlin & Stuttgart 1987. [mit Beschreibung einer neuen Art vom Wollenberg bei Marburg: *L. convexa* HENSSEN]
- HERBORG, J.: Die Variabilität und Sippenabgrenzung in der *Senecio nemorensis*-Gruppe (Compositae) im europäischen Teilareal (=Dissert. Bot. **107**), Berlin & Stuttgart 1987. [Neugliederung des Formenkreises unter Berücksichtigung von lebendem und Herbarmaterial aus Hessen]
- Hessische Bibliographie **9**, Berichtsjahr 1985 mit Nachträgen ab 1965. München usw. 1987. [fast 6000 Titelnachweise]
- HETZEL, G.: Notizen zur Flora von Aschaffenburg. Nachrichten Naturwiss. Mus. Stadt Aschaffenburg **93**, 58–68, Aschaffenburg „1985“ [1987].
- HILBIG, W.: Verzeichnis von Arbeiten mit floristischen Verbreitungskarten aus dem Bereich der Mitteldeutschlandkartierung und der darüber hinausreichenden Gebiete Sachsens und Sachsen-Anhalts (8). 1981–1985 und Ergänzungen. Wiss. Zeitschr. Univ. Halle, math.-naturwiss. Reihe **36** (1), 78–125, Halle 1987.
- HOFFMANN, I.: Die Grube Messel – Ein Lebensraum wird zerstört. Collurio **2**, 40–53, Darmstadt 1986. [enthält auch floristische Mitteilungen]
- HÜBSCHEN, J. & V. JOHN: Notizen zur Verbreitung epiphytischer Flechten im Sauerland. Natur u. Heimat **47** (3), 105–116, Münster 1987.
- Institut für Naturschutz Darmstadt (Hrsg.): 21. Hessischer Floristentag – Tagungsbeiträge (=Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12** [2]), Darmstadt 1987. [vgl. die Zitate unter K. ADOLPHI, K. BÖGER, A. FREDE und G. SCHADEWALDT]
- JAHN, R. & S. WENDKER: Untersuchungen zur Diatomeenflora der Werra – einem extrem salzbelasteten Biotop. Nova Hedwigia **44** (1–2), 163–173, Stuttgart 1987.
- JOCHHEIM, U.: Einfluß des Stammablaufwassers auf den Pflanzenbewuchs und den chemischen Bodenzustand im Oberboden von Altbuchenbeständen. Verhandl. Ges. f. Ökologie (Hohenheim 1984) **14**, 299–308, Göttingen 1986. [Untersuchungen in der Umgebung von Kassel]

- KÄRCHER, R. & D. SEIBT: Zur Kenntnis des *Cortinarius (Myx.) trivialis* LGE. ss. LGE., HRY. – Natterstieliger Schleimfuß. Zeitschr. f. Mykologie **53** (1), 43–48, Schwäbisch Gmünd 1987. [Material aus dem Taunus bei Kronberg]
- KANNGIESER, E.: Von der Weinbergflora bei Rotenburg an der Fulda. Hessischer Gebirgsbote **88** (1), 15–16, Melsungen 1987.
- KARAFIAT, H.: Dr. HEINZ ACKERMANN (1921–1986) zum Gedenken. Hess. Faunist. Briefe **6** (4), 60–61, Darmstadt „1986“ [1987]. [weitere Würdigungen in Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt N. F. **10**, 19–27, Darmstadt „1986“ (1987)]
- KIST, U.: Der Burgwald – eine schützenswerte Waldlandschaft. Jahrbuch 1987 Landkreis Marburg-Biedenkopf, 54–63, Marburg 1987. [mit floristischen Hinweisen]
- KLEIM, H.: Wir stellen vor HEINZ WIEDEMANN. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **32** (1), 63, 65, Kassel-Niederzwehren 1988.
- KLEIN, R.: Die Zentlinde auf dem Heiligenberg [bei Seeheim-Jugenheim]. Baum-Zeitung **21** (2), 52–53, Minden 1987.
- KLEIN, R.: Nur eine alte Dorflinde, nicht mehr und nicht weniger. Baum-Zeitung **21** (3), 92–93, Minden 1987. [über die Dorflinde in Kempfenbrunn]
- KORNECK, D.: Pflanzengesellschaften des Mainzer-Sand-Gebietes. Mainzer Naturwiss. Archiv **25**, 135–200, Mainz „1987“ [1988].
- KRAH, G.: „Mini-KIENAST“ – Synthetische Übersicht der Stadtvegetation Kassels. (=Notizbuch der Kasseler Schule **4**), Kassel 1987.
- KRIEGLSTEINER, G. J. & M. ENDERLE: Über neue, seltene, kritische Makromyzeten in der Bundesrepublik Deutschland (Mitteleuropa) IX. Zeitschr. f. Mykologie **53** (1), 3–38, Schwäbisch Gmünd 1987. [mit MTB-Rasterkarten von *Vuilleminia comedens* und *Velutaria rufo-olivacea*, die auch Hessen berücksichtigen]
- KUDRNA, O.: Die Tagsschmetterlinge der nördlichen Hohen Rhön. Oberelsbach 1988. [mit Hinweisen auf Vegetation und Nahrungspflanzen]
- KÜRSCHNER, H.: Raumverbreitungsmuster azidophiler Felsmoosgesellschaften am Beispiel des Hohen Meißners (Nord-Hessen). Herzogia **7** (3–4), 523–542, Berlin & Stuttgart 1987.
- LANDAU, G.: Das künftige Naturschutzgebiet Heisebachtal in Kassel-Oberzwehren/Nordhausen. Naturschutz u. Landschaftspflege in Kassel **5**, 27–30, Kassel 1988. [auch floristische Besonderheiten genannt]
- LIENENBECKER, H. & U. RAABE: Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten. 2. Folge. Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld **28** (1985), 331–381, Bielefeld „1986“ [1987].
- LIENENBECKER, H. & U. RAABE: Fundorte bemerkenswerter Farn- und Blütenpflanzen aus dem Herbarium Dr. WERNER HOLLBORN (1910–1984). Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld **28** (1985), 301–329, Bielefeld „1986“ [1987].
- LOCHBÜHLER, M. TH.: Zur Geschichte des Apothekenwesens in Marburg von den Anfängen bis zum Jahr 1866 (=Marburger Stadtschriften zur Geschichte u. Kultur **23**), Marburg 1987. [S. 348–357: „Der Botanische Garten des Marburger Schlosses“]
- LUDWIG, W.: Über die „Dorfpflanze“ *Leonurus cardiaca* L.s.lat. (Lamiaceae) und ihr Vorkommen in Hessen. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **138–139**, 17–29, Hanau 1987.
- LÜBCKE, W. [u. andere]: Geschichte des Naturschutzes in Waldeck (=Naturschutz in Waldeck-Frankenberg **1**), Korbach & Bad Wildungen 1987. [u. a. Mitteilungen über ehemalige Vorkommen der „Süntelbuche“ und Biographisches über ALBERT u. CHARLOTTE NIESCHALK, WILHELM ORTLOFF, FELIX PUSCH; vgl. auch Zitate unter CH. NIESCHALK und F. PUSCH]

- MARCZINSKI, R., K.-D. JUNG & H. FEUSTEL: Exkursion in den südlichen Odenwald und an die Bergstraße 22. Juni 1986. Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt N.F.**10**, 8–10, Darmstadt „1986“ [1987]. [mit floristischen Hinweisen]
- MARTEN, S.: Die Waldgesellschaften des Dreienbergs (Nördliche Kuppenrhön) in Abhängigkeit von den natürlichen Standortfaktoren. Beitr. Naturk. Osthessen **22**, 41–103, Fulda „1986“ [1987].
- MARTIN, G.P.R.: FRIEDRICH ROLLE (1827–1887). Ein vergessener Darwinist der ersten Stunde. Natur u. Museum **117** (7), 216–222, Frankfurt a.M. 1987. [zitiert weitere Literatur über den Gelehrten, der viele Aufzeichnungen und Herbarmaterial bes. aus der Umgebung von Bad Homburg hinterlassen hat]
- MEINEL, W. & M. BARLAS: Biozoenotische und hydrochemische Bestandsaufnahme der Werra und Ulster (=Schriftenreihe Hess. Landesanstalt f. Umwelt **58**), Wiesbaden 1987. [mit ausführlicher Behandlung der Diatomeenflora]
- MOHR, I.: Zur Schutzwürdigkeit einer stillgelegten Bahntrasse im Hintertaunus. Vogel u. Umwelt **4** (4–5), 281–301, Wiesbaden 1987. [zur Flora an der ehemaligen „Weiltalbahn“ bei Grävenwiesbach]
- MOLLENHAUER, D.: Der Biebergrund im Spessart. Gewässerforschung als Thema der regionalen Biologie. Mitt. Ergänzungsstudium Ökol. Umweltsicherung **10**, 9–42, Witzchenhausen „1985“ [1987].
- MOTHES-WAGNER, U.: Die naturräumliche Untereinheit Neustädter Sattel und seine potentielle Avifauna. Vogelkundl. Jahresber. Marburg-Biedenkopf **5** (1986), 118–131, Marburg 1987. [mit Angaben zur Vegetation]
- NASSAUER, K. G. & E. J. GÄRTNER: Vergleichende Ergebnisanalyse der Waldschadenserhebungen 1984 bis 1986 in Hessen (=Forschungsber. Hess. Forstl. Versuchsanstalt **2**), Hann. Münden 1987.
- Naturhistorisches Museum Mainz (Hrsg.): Der „Mainzer Sand“. Beiträge zur Monographie des Naturschutzgebietes Mainzer Sand und seiner näheren Umgebung (=Mainzer Naturwiss. Archiv **25**), Mainz „1987“ [1988].
- NEUMANN, H.: *Gymnadenia conopsea* var. *densiflora* im Westerwald [auf MTB **5314** Rennerod]. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **4** (2), 297, Hanau „1987“ [1988].
- NIESCHALK, CH.: Zur Geschichte der floristischen Forschung im Kreise Waldeck-Frankenberg. Naturschutz in Waldeck-Frankenberg **1**, 54–60, Korbach & Bad Wildungen 1987.
- NIESCHALK, CH.: Ausgestorbene oder verschollene Pflanzenarten (Gefäßpflanzen) im Kreise Waldeck-Frankenberg. Naturschutz in Waldeck-Frankenberg **1**, 66–67, Korbach & Bad Wildungen 1987.
- NOWACK, R.: Verwilderungen des Blauglockenbaums (*Paulownia tomentosa* (THUNB.) STEUD.) im Rhein-Neckar-Gebiet. Florist. Rundbr. **21** (1), 25–32, Göttingen „1987“ [1988]. [auch Vorkommen im Rheingau – nach KIERMEIER 1977 – erwähnt]
- OESAU, A.: Ackerrandstreifenprogramm des Landespflanzenschutzdienstes – Ergebnisse 1984–1986. Hrsg. Landespflanzenschutzdienst Rheinland-Pfalz. Mainz 1987.
- PEPPLER, C.: Nardetalia-Gesellschaften im Werra-Meißner-Gebiet. Tuexenia **7**, 245–265, Göttingen 1987.
- PHILIPPI, G.: Die Moosvegetation auf Buntsandsteinblöcken im östlichen Odenwald und südlichen Spessart. Carolina **44**, 67–86, Karlsruhe „1986“ [1987].

- PUSCH, F.: Pflanzen der Heimat. 37 im Edergebiet vorkommende Pflanzen stehen unter Naturschutz. Naturschutz in Waldeck-Frankenberg **1**, 61–65, Korbach & Bad Wildungen 1987. [kommentierter Nachdruck aus der Waldeckischen Landeszeitung vom 9. 10. 1943; mit Fundortangaben]
- QUINGER, B.: Zur Wiederentdeckung von *Calamagrostis stricta* (TIMM) KOELER in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. **58**, 7–22, München „1987“ [1988]. [auch Mitteilungen zum Fundort Heidenweiher bei Steinen im Westerwald; dagegen hat es „ein adventives Vorkommen bei Arheilgen nahe Darmstadt“ nie gegeben – vgl. ASCHERSON & GRAEBNER, Synopsis **2** (1), 1899, S. 207!]
- RAABE, U.: Quendel-Sommerwurz, *Orobanchе alba* STEPH. ex WILLD., und Hohe Sommerwurz, *Orobanchе elatior* SUTTON, im Raum Brilon, Hochsauerlandkreis. Florist. Rundbr. **21** (1), 51–53, Göttingen „1987“ [1988]. [*O. elatior* auch am Huxstein bei Hesperinghausen/Waldeck gefunden]
- RECHINGER, K. H.: GERHARD WAGENITZ zum sechzigsten Geburtstag. Bot. Jahrb. Syst. **108** (2/3), 145–153, Stuttgart 1987. [mit Personalbibliographie]
- RISSE, S.: *Phaeoceros carolinianus* (MICHX.) PROSK. in Nordrhein-Westfalen. Natur u. Heimat **47** (4). 121–129, Münster 1987. [Vf. hat auch drei Belege aus Hessen gesehen]
- ROHRER, B. & M. HÖLLWARTH: Anzahl und Fläche von Spaltöffnungen bei Flieder- und Forsythienblättern an städtischen Standorten unterschiedlicher Immissionsbelastung. Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt N.F. **10**, 61–66, Darmstadt „1986“ [1987]. [Untersuchungen in Darmstadt]
- RUMPF, B.: Zweihundert Jahre Botanischer Garten in Marburg. Pharmazeut. Zeitung **132** (29), 1747–1749, Frankfurt a. M. 1987.
- RUTTERT, E.: Veränderungen im Nährstoffkreislauf einer Heidefläche durch Pflegemaßnahmen am Beispiel der „Termenei“/Fuldatal (=Mitt. Ergänzungsstudium Ökol. Umweltsicherung **11**), Witzenhausen „1986“ [1987].
- SCHADEWALDT, G.: Pilzökologische Beobachtungen an Straßenbäumen im Stadtgebiet Wiesbadens. Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12** (2), 14–18, Darmstadt 1987.
- SCHNEDLER, W.: Bericht über die 36. Tagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft vom 25. bis 29. 7. 1986 in Wetzlar. Tuexenia **7**, 515–520, Göttingen 1987. [zur Vegetation und Flora im Gladenbacher Bergland, Westerwald, Ederseegebiet und Vogelsberger Oberwald]
- SCHNEIDER, K.: Floristische Kartierungsergebnisse aus dem Gebiet Hörne, Hohestein und Gobert. Fliegende Blätter, Ornitholog. Mitt. u. Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis **2** (2), 22–24, Eschwege 1987/88. [Fundorte von *Lathraea squamaria*, *Paris quadrifolia* u. *Petasites albus*]
- SCHNETTER, R.: Prof. Dr. R. KNAPP †. Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **49**, 1–2, Gießen 1987.
- SCHREINER, K.: Ackerrandstreifen- und Wiesenprogramm in Hessen: Durchführung und erste Ergebnisse. Vogel u. Umwelt **4** (4–5), 303–325, Wiesbaden 1987.
- STAFLEU, F. A. & R. S. COWAN: Taxonomic Literature. 2. Aufl. **7**: W–Z. Utrecht usw. 1988. [berücksichtigt von hessischen Botanikern u. a. G. W. F. WENDEROTH u. A. WIGAND]

- STEUBING, L.: Untersuchungen zur Empfindlichkeit der Waldbodenflora gegenüber Luftverunreinigungen im Schiffenberger Forst. Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **49**, 11–23, Gießen 1987.
- TAMM, J. & J. ROHLOFF: Biologisches Gutachten über die Wohra bei Hessisch Lichtenau. Fliegende Blätter, Ornitholog. Mitt. u. Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis **2** (2), 26–33, Eschwege 1987/88. [mit Angaben zur Flora und Vegetation]
- WAGNER, G.: Floristische und faunistische Beobachtungen im Wohrarückhaltebecken zwischen Wohratal-Wohra und Gemünden a. d. Wohra. Vogelkundl. Jahresber. Marburg-Biedenkopf **5** (1986), 132–144, Marburg 1987.
- WIEDEMANN, H.: Flora und Vegetation (=Brasselsberg **2**), Kassel 1987.
- WIEDEMANN, H.: Die Botanische Schausammlung des Kasseler Naturkundemuseums I. Das Ratzenbergersche Herbar und die Schildbachsche Holzbibliothek. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **31** (2), 31, 33–34, Kassel-Niederzwehren 1987.
- WIEDEMANN, H.: Die Botanische Schausammlung des Kasseler Naturkundemuseums II. Die Systematische Abteilung. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **31** (3), 51, 53, 55, Kassel-Niederzwehren 1987.
- WIEDEMANN, H.: Zwei Gartenunkräuter: die Wirrwenge [*Calystegia sepium*] und der Hunds Darm [*Rumex* u.a. *R. crispus*]. Ein Beitrag zum Wortschatz volkstümlicher Pflanzennamen. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **31** (4), 27, 29, Kassel-Niederzwehren 1987.
- WIEDEMANN, H.: Das Bilsenkraut. Eine alte Heil- und Zauberpflanze. Jahrbuch '88 Landkreis Kassel, 41–42, Kassel 1987. [*Hyoscyamus niger* „noch vor fünf Jahren unterhalb des Madersteins und am Hahn bei Holzhausen“]
- WIEDEMANN, H.: Wurde in Niederzwehren Hopfen angebaut? Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **32** (1), 13, 15, 17, Kassel-Niederzwehren 1988.
- WIRTH, V.: Die Flechten Baden-Württembergs. Verbreitungsatlas. Stuttgart 1987. [auch Vorkommen im angrenzenden Hessen berücksichtigt]
- WITSCH, M.: Die Verbreitung und Vergesellschaftung der Federgräser (*Stipa* L.) in Baden-Württemberg. Jahresh. Ges. Naturk. Württ. **142**, 157–196, Stuttgart „1987“ [1988].
- WITTENBERGER, G.: Der Wunderbaum von Harreshausen „Die schöne Eiche“ (=Schriftenreihe Landkreis Darmstadt-Dieburg **1**), Roßdorf 1985.
- WITTENBERGER, G.: Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 1986 nebst Nachträgen bis 1985. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **87**, 44–45, Offenbach a. M. 1987.
- WITTENBERGER, G.: Die „Dicke Tanne“ [*Pinus sylvestris*] von Dudenhofen. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **87**, 58–60, Offenbach a. M. 1987.
- WITTENBERGER, G.: *Rosa majalis* var. *foecundissima* bei Babenhausen. Botanik u. Naturschutz in Hessen **2**, 58–59, Frankfurt a. M. 1988.
- WOLFF, P. & U. HERMANN: Zur Salzbelastung der Kiesteiche und Baggerseen im Werratal. Werraland **39** (2), 39–40, Eschwege 1987. [erwähnen „zunehmende Ausbreitung der Strandsimse (*Bulboschoenus maritimus*)“]
- WÜST, M.: Orchideen auf dem Ringgau und im Richelsdorfer Gebirge. Fliegende Blätter, Ornitholog. Mitt. u. Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis **2** (2), 24–25, Eschwege 1987/88.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [37](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 3 \(mit Nachträgen ab 1985\) 25-32](#)