

## Literatur

- BAIER, E. & C. PEPPLER: Die Pflanzenwelt des Altkreises Witzenhausen mit Meißner und Kaufunger Wald. Eine erste Flora dieses Gebietes (= Schriftenreihe Werratalver. Witzenhausen **18**), Witzenhausen 1988.
- GRIMME, A.: Flora von Nordhessen (= Abh. Ver. Naturk. Kassel **61**), Kassel 1958.
- HAEUPLER, H. & P. SCHOENFELDER (Hrsg.): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart 1988.
- KALHEBER, H. & al.: Rote Liste der in Hessen ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen. 2. Fassung, Stand 31. 12. 1979. Wiesbaden 1980.
- NITSCHE, L. & al.: Flora des Kasseler Raumes **1** (= Naturschutz in Nordhessen, Sonderheft **4**), Kassel 1988.

## Verfasser:

Susanne Raehse, Neckarweg 23, 3500 Kassel

**Die großwüchsigen Melde-Arten *Atriplex micrantha* C. A. MEYER in LEDEB. (= *A. heterosperma* BUNGE), *Atriplex sagittata* BORKH. (= *A. nitens* SCHKUHR = *A. acuminata* W. & K.) und *Atriplex oblongifolia* W. & K. an den hessischen Autobahnen im Sommer 1987**

## Teil II

W. SCHNEDLER und D. BÖNSEL

**Verbreitungskarten 2, 4 und 6  
(Beobachtungsergebnisse im hessischen Autobahnnetz 1987)**







Abb. 2. Verbreitung von *Atriplex micrantha* im hessischen Autobahnnetz (1987).





Abb. 4. Verbreitung von *Atriplex sagittata* im hessischen Autobahnnetz (1987).





Abb. 6. Verbreitung von *Atriplex oblongifolia* im hessischen Autobahnnetz (1987).

**Verfasser:**

Dirk Bönsel, Zimmerseestraße 32, 6457 Maintal 2  
Wieland Schnedler, Wiesenstraße 2, 6334 Aßlar-Bechlingen

## Kurze Mitteilungen

### Zu *Salvia nemorosa* L.

Am 17. 10. 1989 bemerkte ich während einer Autofahrt nach Nordhessen an einer steilen Straßenböschung eine Pflanzenart, die mich veranlaßte, „den Rückwärtsgang einzulegen“ und genauer nachzusehen. Es handelte sich um wenige Exemplare von *Salvia nemorosa*, die dort an der B 487 südlich von Hessisch Lichtenau kurz hinter Schnellrode am Fuße des Ibergs auf Kalkschutt wachsen (MTB **4824/134**).

Der Fundort ist in den neueren nordhessischen Floren von BAIER & PEPPLER (Die Pflanzenwelt des Altkreises Witzenhausen . . ., 1988) sowie von NITSCHE & al. (Flora des Kasseler Raumes, 1988) nicht enthalten und wohl knapp außerhalb deren Gelungsbereiche. GRIMME (Flora von Nordhessen, 1958) gibt die Art von hier ebenfalls im näheren Umkreis nirgends an.

**Verfasser:**

Dr. Klaus-Dieter Jung, Umweltamt, Havelstraße 7, 6100 Darmstadt

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [39](#)

Autor(en)/Author(s): Schnedler Wieland, Bönsel Dirk

Artikel/Article: [Die großwüchsigen Melde-Arten Atriplex micrantha C. A. MEYER in LEDEB. \(= A. heterosperma BUNGE\), Atriplex sagittata BORKH. \(= A. nitens SCHKUHR = A. acuminata W. & K.\) und Atriplex oblongifolia W. & K. an den hessischen Autobahnen im Sommer 1987 Teil II 13-20](#)