

## Die Wanzenksammlung am Naturkundemuseum Erfurt

JOACHIM WILLERS

**Zusammenfassung:** Die faunistischen Veränderungen, die sich hinsichtlich der Checklisten der Wanzen Thüringens durch die Aufstellung der Wanzenksammlung im Naturkundemuseum Erfurt ergeben, werden aufgeführt und diskutiert.

Mit der Schließung des Museums für Naturkunde im Jahre 1968 wurde die von OTTO RAPP (1878-1953) als Begründer des „Thüringer naturwissenschaftlichen Heimatmuseums“ und Mitarbeitern aufgebaute Wanzenksammlung als Dauerleihgabe an das Museum für Natur in Gotha gegeben. In Erfurt verblieben nur Restbestände, die von RAPP vermutlich als Doublettensammlung verwendet worden waren. Der Etikettierung zufolge waren größere Teile des in Erfurt verbliebenen Altbestandes aus der Sammlung des bekannten Heteropterologen SINGER, Aschaffenburg, erworben worden. Für die Bestimmung/Nachbestimmung der meisten Stücke, die weitgehend mit der heutigen Auffassung übereinstimmt, zeichnete der Thüringer Entomologe HUBENTHAL (1871-1949) verantwortlich.

Durch die Wiedereröffnung des Naturkundemuseums im Jahre 1995 bestand nun die Möglichkeit, die weitgehend ungeordneten Restbestände sowie neu hinzugekommenes Material nach neuen systematischen Gesichtspunkten aufzustellen und mit Hilfe einer Computerdatenbank zu inventarisieren. Eine Liste der vorhandenen Arten wird als Anhang gegeben. Die Datenbank basiert auf dem Verzeichnis der Wanzen Mitteleuropas (GÜNTHER ♀ SCHUSTER 2000), enthält die Namen aller mitteleuropäischen Arten inklusive Verbreitungssangaben, Synonymen und Literaturhinweisen. Zusätzlich wurden die in den Check-Listen Thüringer Insekten behandelten Angaben (BELLSTEDT 1995, LICHTER ♀ SANDER 1998, LICHTER et al. 1999) eingearbeitet.

Hierbei stellte sich heraus, daß die Sammlung eine bisher noch nicht für Thüringen gemeldete Art enthält: *Chartoscirta elegantula* (FALLÉN, 1807). Acht Exemplare dieser Uferwanze mit den Funddaten „DDR 4942 I Nöda Salzstelle Luisenhall, 1987 - 1990, leg. SPARMBERG und leg. HARTMANN“, det. ARNOLD, vid. MELBER werden im NME aufbewahrt.

Weiterhin ergeben sich für folgende elf Arten aktuellere Nachweisdaten für Thüringen:

### Veränderungen gegenüber den Checklisten Thüringer Insekten 6 u. 7

<i>Globiceps (Kelidocoris) fulvicollis</i> JAKOVLEV, 1877	xxx
1 Ex. 5330 I Oberhof, NSG Beerbergmoor, LF, leg. M. HARTMANN, 26.07. 1995: det. MELBER	
<i>Galeatus spinifrons</i> (FALLÉN, 1807)	xx
2 Ex. 5035/1 Jena, Sonnenberge II FRITZLAR leg. 07.06.1993: det. WILLERS, vid. MELBER	
<i>Prostemma (Prostemma) guttula</i> (FABRICIUS, 1787)	x
1 Ex. 4633 IV, Sperlingsberg, NO Braunsroda 12.051993, leg. SPARMBERG: det. WILLERS;	
1 Ex. 4633 IV, Weidengrund nwl. Braunsroda, leg. SPARMBERG, 23.06.1993: det. WILLERS	
<i>Deraeocoris (Deraeocoris) annulipes</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1842)	xx
1 Ex. 4932 III, Tongrube Roter Berg, 03.07.1991 leg. HARTMANN, LF: det. ARNOLD	
<i>Adelphocoris quadripunctatus</i> (FABRICIUS, 1794)	x
1 Ex. DDR 5031/1 FND 4633 IV 'See' b. Apfelstädt, GS, leg. HARTMANN, 22.10.1989: det. ARNOLD	

*Emblethis denticollis* HORVÁTH, 1878

x

1 Ex. 5028 I Großenlupnitz Böber, LE 1, 29.IV. - 03.06.2000 leg. U. SCHAFFRATH: det.  
MELBER

*Megalonotus antennatus* (SCHILLING, 1829)

xxx

1 Ex. 4633 IV Braunsroda, Weidengrund, BF, 17.07.I.1993, leg. SPARMBERG: det.  
WILLERS; 1 Ex. 5130 II, Ohrdruf, Truppenübungsplatz, 22.04.1991, leg. Hartmann: det.  
ARNOLD; 1 Ex. 4832/3 Alperstedter Ried Benjeshecke, BF 10.04.1992 leg. GRIMM: det.  
WILLERS

*Plinthisus (Plinthisomus) pusillus* (SCHOLZ, 1847)

x

1 Ex. 4931 IV Erfurt Steinberg, lg. SPARMBERG 09.07.1987 BF 3: det. ARNOLD; 1 Ex.  
MTB 4632/I; Bad Frankenhausen Kattenburg, KG 4 24.06.1998, FG 4 leg.: J. WEIPERT:  
det. WILLERS, 1 Ex. MTB 4531/IV Badra, NW, KG1 Solberg 09.06.1988 FG 1 leg.: J.  
WEIPERT: det. WILLERS

*Legnotus picipes* (FALLÉN, 1807)

xxx

10 Ex. 4832/3 Alperstedter Ried Benjeshecke, BF 28.III. - 25.IV.1992, leg. GRIMM: det.  
WILLERS

*Tritomegas bicolor* (LINNAEUS, 1758)

xxx

1 Ex. 5032 III Rockhausen NE, Autobahnwiese 03.V.1995, BF leg. HARTMANN: det  
WILLERS; 1 Ex. 4931 IV, Erfurt-Nord Kühnhausen, Wehr leg. SPARMBERG, 22.V.1993: det.  
WILLERS

*Eurygaster testudinaria* (GEOFFROY, 1785)

xx

2 Ex. DDR 4931 IV Erfurt Ringelberg, KF 3.IX.1987 lg. SPARMBERG: det. ARNOLD

x, xx, xxx bedeuten: Zeithorizonte aus den Checklisten Thüringer Insekten 6 und 7.

## Danksagung

Für die vielfache Hilfe bei der Bestimmung und Nachbestimmung z. T. schwieriger Arten möchte ich mich besonders bei Herrn Dr. A. MELBER, Hannover, bedanken.

## Literatur

- BELLSTEDT, R. (1995): Checklist der Wasser- und Uferwanzen Thüringens (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha et Leptodomorpha). - Check-Listen Thüringer Insekten, Teil 3, 8-11.
- GÜNTHER, H. ♀ SCHUSTER, G. (2000): Verzeichnis der Wanzen Mitteleuropas (Insecta: Heteroptera) (2. überarbeitete Fassung). - Mitt. internat. ent. Verein, **Suppl. VII**, 1-69.
- LICHTER, D. ♀ SANDER, F.W. (1998): Checklist der Landwanzen Thüringens (Heteroptera: Cimicomorpha, Dipsocoromorpha et Pentatomorpha). - Check-Listen Thüringer Insekten, Teil 6, 5-30.
- LICHTER, D., SANDER, F.W. ♀ VOGT, K. (1999): Ergänzungen und Korrekturen zur Checklist der Landwanzen Thüringens (Heteroptera: Cimicomorpha, Dipsocoromorpha et Pentatomorpha) sowie der Checklist der Wasser- und Uferwanzen Thüringens (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha et Leptodomorpha). - Check-Listen Thüringer Insekten, Teil 7, 5-19.

Anschrift des Autors:

Joachim Willers, Naturkundemuseum Erfurt, Große Arche 14, D-99084 ERFURT

## Anhang: Bestand NME 18.9.2001

- Nepa cinerea* L., 1758  
*Ranatra linearis* (L., 1758)  
*Cymatia coleopterata* (F., 1777)  
*Corixa punctata* (Illiger, 1807)  
*Hesperocorixa linnaei* (Fieber, 1848)  
*Sigara striata* (L., 1758)  
*Sigara falleni* (Fieber, 1848)  
*Sigara fossarum* (Leach, 1817)  
*Sigara lateralis* (Leach, 1817)  
*Ilyocoris cimicoides* (L., 1758)  
*Hebrus pusillus* (Fallén, 1807)  
*Hydrometra stagnorum* (L., 1758)  
*Velia caprai* Tamanini, 1947  
*Gerris gibbifer* Schummel, 1832  
*Gerris lacustris* (L., 1758)  
*Gerris thoracicus* Schummel, 1832  
*Limnoperus rufoscutellatus* (Latreille, 1807)  
*Chartoscirta cincta* (H.-S., 1841)  
*Chartoscirta elegantula* (Fallén, 1807)  
*Macrosaldula scotica* (Curtis, 1835)  
*Macrosaldula variabilis* (H.-S., 1835)  
*Saldula arenicola* (H. Scholz, 1847)  
*Saldula c-album* (Fieber, 1859)  
*Saldula opacula* (Zetterstedt, 1838)  
*Saldula pallipes* (F., 1794)  
*Saldula saltatoria* (L., 1758)  
*Salda littoralis* (L., 1758)  
*Salda morio* Zetterstedt, 1838  
*Acalypta carinata* (Panzer, 1806)  
*Acalypta gracilis* (Fieber, 1844)  
*Acalypta marginata* (Wolff, 1804)  
*Acalypta nigrina* (Fallén, 1807)  
*Acalypta parvula* (Fallén, 1807)  
*Agramma laetum* (Fallén, 1807)  
*Campylosteira verna* (Fallén, 1826)  
*Catoplatus carthusianus* (Goeze, 1778)  
*Catoplatus fabricii* (Stål, 1868)  
*Catoplatus nigriceps* Horváth, 1905  
*Derephysia foliacea* (Fallén, 1807)  
*Dictyla echii* (Schrank, 1782)  
*Dictyla humuli* (F., 1794)  
*Dictyla rotundata* (H.-S., 1835)  
*Dictyonota fuliginosa* A. Costa, 1853  
*Dictyonota strichnocera* Fieber, 1844  
*Galeatus maculatus* (H.-S., 1838)  
*Galeatus spinifrons* (Fallén, 1807)  
*Kalama tricornis* (Schrank, 1801)  
*Lasiacantha capucina* (Germar, 1837)  
*Oncochila simplex* (H.-S., 1830)  
*Physatocheila dumetorum* (H.-S., 1838)  
*Stephanitis pyri* (F., 1775)  
*Stephanitis rhododendri* Horváth, 1905  
*Tingis ampliata* (H.-S., 1838)  
*Tingis cardui* (L., 1758)  
*Tingis crispata* (H.-S., 1838)  
*Tingis reticulata* H.-S., 1835  
*Bryocoris pteridis* (Fallén, 1807)  
*Monalocoris filicis* (L., 1758)  
*Campyloneura virgula* (H.-S., 1835)  
*Dicyphus globulifer* (Fallén, 1829)  
*Dicyphus errans* (Wolff, 1804)  
*Alloeotomus gothicus* (Fallén, 1807)  
*Deraeocoris annulipes* (H.-S., 1842)  
*Deraeocoris cordiger* (Hahn, 1834)  
*Deraeocoris ruber* (L., 1758)  
*Deraeocoris trifasciatus* (L., 1767)  
*Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)  
*Adelphocoris quadripunctatus* (F., 1794)  
*Adelphocoris seticornis* (F., 1775)  
*Calocoris nemoralis* (F., 1787)  
*Calocoris roseomaculatus* (De Geer, 1773)  
*Closterotomus biclavatus* (H.-S., 1835)  
*Closterotomus fulvomaculatus* (De Geer, 1773)  
*Dichrooscytus rufipennis* (Fallén, 1807)  
*Hadrodemus m-flavum* (Goeze, 1778)  
*Megacoelum beckeri* (Fieber, 1870)  
*Megacoelum infusum* (H.-S., 1837)  
*Mermitelocerus schmidti* (Fieber, 1836)  
*Miris striatus* (L., 1758)  
*Pantilius tunicatus* (F., 1781)  
*Phytocoris populi* (L., 1758)  
*Phytocoris tiliae* (F., 1777)  
*Stenotus binotatus* (F., 1794)  
*Apolygus limbatus* (Fallén, 1807)  
*Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843)  
*Apolygus spinolae* (Meyer-Dür, 1841)  
*Capsus ater* (L., 1758)  
*Liocoris tripustulatus* (F., 1781)  
*Lygocoris pabulinus* (L., 1761)  
*Lygocoris viridis* (Fallén, 1807)  
*Lygus gemellatus* (H.-S., 1835)  
*Lygus pratensis* (L., 1758)  
*Lygus rugulipennis* Poppius, 1911  
*Lygus wagneri* Remane, 1955  
*Orthops montanus* (Schilling, 1837)  
*Orthops basalis* (A. Costa, 1853)  
*Orthops campestris* (L., 1758)  
*Orthops kalmii* (L., 1758)  
*Pinalitus viscidola* (Puton, 1888)  
*Polymerus cognatus* (Fieber, 1858)  
*Polymerus unifasciatus* (F., 1794)  
*Capsodes gothicus* (L., 1758)  
*Horistus orientalis* (Gmelin, 1790)  
*Leptopterna dolabrata* (L., 1758)  
*Leptopterna ferrugata* (Fallén, 1807)  
*Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785)  
*Myrmecoris gracilis* (R. F. Sahlberg, 1848)  
*Notostira elongata* (Geoffroy, 1785)  
*Notostira erratica* (L., 1758)  
*Pithanus maerkelii* (H.-S., 1838)  
*Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)  
*Stenodema holsata* (F., 1787)  
*Stenodema laevigata* (L., 1758)  
*Stenodema virens* (L., 1767)  
*Trigonotylus pulchellus* (Hahn, 1834)  
*Trigonotylus ruficornis* (Geoffroy, 1785)  
*Halticus apterus* (L., 1758)  
*Halticus luteicollis* (Panzer, 1804)  
*Orthocephalus coriaceus* (F., 1777)  
*Orthocephalus saltator* (Hahn, 1835)  
*Pachytomella parallela* (Meyer-Dür, 1843)  
*Pachytomella passerinii* (A. Costa, 1842)  
*Strongylocoris leucocephalus* (L., 1758)  
*Blepharidopterus angulatus* (Fallén, 1807)

- Fieberocapsus flaveolus* (Reuter, 1870)  
*Globiceps fulvicollis* Jakovlev, 1877  
*Heterotoma merioptera* (Scopoli, 1763)  
*Malacocoris chlorizans* (Panzer, 1794)  
*Orthotylus flavinervis* (Kirschbaum, 1856)  
*Orthotylus virens* (Fallén, 1807)  
*Orthotylus adenocarpi* (Perris, 1857)  
*Orthotylus concolor* (Kirschbaum, 1856)  
*Orthotylus virescens* (Dgl. ♀ Sc., 1865)  
*Orthotylus bilineatus* (Fallén, 1807)  
*Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856)  
*Pilophorus confusus* (Kirschbaum, 1856)  
*Halldapus montandoni* Reuter, 1895  
*Chlamydatus saltitans* (Fallén, 1807)  
*Chlamydatus pulicarius* (Fallén, 1807)  
*Chlamydatus pullus* (Reuter, 1870)  
*Compsidolon salicellum* (H.-S., 1841)  
*Conostethus griseus* Dgl. ♀ Sc., 1870  
*Conostethus roseus* (Fallén, 1807)  
*Harpocera thoracica* (Fallén, 1807)  
*Lopus decolor* (Fallén, 1807)  
*Macrotylus herrichi* (Reuter, 1873)  
*Psallus betuleti* (Fallén, 1826)  
*Sthenarus rotermundi* (Scholz, 1847)  
*Alloeorhynchus flavipes* (Fieber, 1836)  
*Prostemma guttula* (F., 1787)  
*Himacerus major* (A. Costa, 1842)  
*Himacerus mirmicoides* (O. Costa, 1834)  
*Himacerus apterus* (F., 1798)  
*Nabis limbatus* Dahlbom, 1851  
*Nabis flavomarginatus* H. Scholz, 1847  
*Nabis brevis* H. Scholz, 1847  
*Nabis ericetorum* H. Scholz, 1847  
*Nabis férus* (L., 1758)  
*Nabis pseudoferus* Remane, 1949  
*Nabis rugosus* (L., 1758)  
*Acompororis alpinus* Reuter, 1875  
*Anthocoris amplicollis* Horváth, 1893  
*Anthocoris confusus* Reuter, 1884  
*Anthocoris gallarumulmi* (De Geer, 1773)  
*Anthocoris limbatus* Fieber, 1836  
*Anthocoris minki* Dohrn, 1860  
*Anthocoris nemoralis* (F., 1794)  
*Anthocoris nemorum* (L., 1761)  
*Anthocoris pilosus* (Jakovlev, 1877)  
*Anthocoris sarothonni* Dgl. ♀ Sc., 1865  
*Temnostethus pusillus* (H.-S., 1835)  
*Tetraphleps bicuspis* (H.-S., 1835)  
*Orius majusculus* (Reuter, 1879)  
*Orius minutus* (L., 1758)  
*Orius niger* (Wolff, 1811)  
*Lyctocoris campestris* (F., 1794)  
*Xylocoris cursitans* (Fallén, 1807)  
*Cimex pipistrelli* Jenyns, 1839  
*Empicoris vagabundus* (L., 1758)  
*Coranus subapterus* (De Geer, 1773)  
*Rhynocoris annulatus* (L., 1758)  
*Rhynocoris iracundus* (Poda, 1761)  
*Peirates hybridus* (Scopoli, 1763)  
*Reduvius personatus* (L., 1758)  
*Aradus betulinus* Fallén, 1829  
*Aradus cinnamomeus* Panzer, 1806  
*Aradus conspicuus* H.-S., 1835  
*Aradus depressus* (F., 1794)  
*Aradus distinctus* Fieber, 1860  
*Aradus versicolor* H.-S., 1835  
*Arocatus roeselii* (Schilling, 1829)  
*Lygaeus equestris* (L., 1758)  
*Spilostethus saxatilis* (Scopoli, 1763)  
*Nithecus jacobaeae* (Schilling, 1829)  
*Nysius ericae* (Schilling, 1829)  
*Nysius thymi* (Wolff, 1804)  
*Orsillus depressus* (Mls. ♀ Rey, 1852)  
*Ortholomus punctipennis* (H.-S., 1838)  
*Kleidocerys resedae* (Panzer, 1797)  
*Cymus glandicolor* Hahn, 1831  
*Cymus melanocephalus* Fieber, 1861  
*Dimorphopterus spinolae* (Signoret, 1857)  
*Ischnodemus sabuleti* (Fallén, 1826)  
*Henestaris halophilus* (Burmeister, 1835)  
*Geocoris ater* (F., 1787)  
*Geocoris gryloides* (L., 1761)  
*Geocoris erythrocephalus* (Lepeletier ♀ Serville, 1825)  
*Chilacis typhae* (Perris, 1857)  
*Platyplax salviae* (Schilling, 1829)  
*Macropalax fasciata* (H.-S., 1835)  
*Macropalax preysleri* (Fieber, 1837)  
*Metopoplax ditomoides* (A. Costa, 1847)  
*Metopoplax origani* (Kolenati, 1845)  
*Tropistethus holosericus* (Scholz, 1846)  
*Drymus pilicornis* (Mls. ♀ Rey, 1852)  
*Drymus brunneus* (R. F. Sahlberg, 1848)  
*Drymus ryeii* Dgl. ♀ Sc., 1865  
*Drymus sylvaticus* (F., 1775)  
*Eremocoris abietis* (L., 1758)  
*Eremocoris fenestratus* (H.-S., 1839)  
*Eremocoris plebejus* (Fallén, 1807)  
*Eremocoris podagricus* (F., 1775)  
*Gastrodes abietum* Bergroth, 1914  
*Gastrodes grossipes* (De Geer, 1773)  
*Ischnocoris hemipterus* (Schilling, 1829)  
*Lamproplax picea* (Flor, 1860)  
*Notochilus limbatus* Fieber, 1870  
*Scolopostethus affinis* (Schilling, 1829)  
*Scolopostethus decoratus* (Hahn, 1833)  
*Scolopostethus grandis* Horváth, 1880  
*Scolopostethus pictus* (Schilling, 1829)  
*Scolopostethus pilosus* Reuter, 1874  
*Scolopostethus puberulus* Horváth, 1887  
*Scolopostethus thomsoni* Reuter, 1874  
*Taphropeltus contractus* (H.-S., 1835)  
*Aphanus rolandri* (L., 1758)  
*Emblethis denticollis* Horváth, 1878  
*Emblethis griseus* (Wolff, 1802)  
*Emblethis verbasci* (F., 1803)  
*Gonianotus marginepunctatus* (Wolff, 1804)  
*Pionosomus varius* (Wolff, 1804)  
*Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829)  
*Trapezonotus anorus* (Flor, 1860)  
*Trapezonotus arenarius* (L., 1758)  
*Trapezonotus ullrichi* (Fieber, 1837)  
*Megalonotus antennatus* (Schilling, 1829)  
*Megalonotus chiragra* (F., 1794)  
*Megalonotus dilatatus* (H.-S., 1840)  
*Megalonotus hirsutus* Fieber, 1861  
*Megalonotus sabulicola* (Thomson, 1870)  
*Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807)  
*Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829)

- Pachybrachius luridus* Hahn, 1826  
*Plinthisus pusillus* (Scholz, 1847)  
*Plinthisus brevipennis* (Latreille, 1807)  
*Beosus maritimus* (Scopoli, 1763)  
*Graptopeltus lynceus* (F., 1775)  
*Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)  
*Peritrechus gracilicornis* Puton, 1877  
*Peritrechus lundii* (Gmelin, 1790)  
*Peritrechus nubilus* (Fallén, 1807)  
*Raglius alboacuminatus* Goeze, 1778  
*Rhyparochromus phoeniceus* (Rossi, 1794)  
*Rhyparochromus pini* (L., 1758)  
*Rhyparochromus vulgaris* (Schilling, 1829)  
*Xanthochilus quadratus* (F., 1798)  
*Stygnocoris fuliginous* (Geoffroy, 1785)  
*Stygnocoris rusticus* (Fallén, 1807)  
*Stygnocoris sabulosus* (Schilling, 1829)  
*Parapiesma quadratum* (Fieber, 1844)  
*Parapiesma variabile* (Fieber, 1844)  
*Piesma capitatum* (Wolff, 1804)  
*Piesma maculatum* (Laporte, 1833)  
*Neides tipularius* (L., 1758)  
*Berytinus clavipes* (F., 1775)  
*Berytinus minor* (H.-S., 1835)  
*Berytinus crassipes* (H.-S., 1835)  
*Berytinus montivagus* (Meyer-Dür, 1841)  
*Berytinus signoreti* (Fieber, 1859)  
*Gampsocoris punctipes* (Germar, 1822)  
*Metatropis rufescens* (H.-S., 1835)  
*Pyrrhocoris apterus* (L., 1758)  
*Pyrrhocoris marginatus* (Kolenati, 1845)  
*Alydus calcaratus* (L., 1758)  
*Centrocoris variegatus* Kolenati, 1845  
*Coreus marginatus* (L., 1758)  
*Enoplops scapha* (F., 1794)  
*Spathocera dalmani* (Schilling, 1829)  
*Syromastes rhombeus* (L., 1767)  
*Ceraleptus gracilicornis* (H.-S., 1835)  
*Ceraleptus lividus* Stein, 1858  
*Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763)  
*Chorosoma schillingii* (Schummel, 1829)  
*Myrmus miriformis* (Fallén, 1807)  
*Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790)  
*Stictopleurus crassicornis* (L., 1758)  
*Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze, 1778)  
*Corizus hyoscyami* (L., 1758)  
*Rhopalus parumpunctatus* (Schilling, 1829)  
*Rhopalus rufus* Schilling, 1829  
*Rhopalus subrufus* (Gmelin, 1790)  
*Dicranoccephalus agilis* (Scopoli, 1763)  
*Dicranoccephalus albipes* (F., 1781)  
*Dicranoccephalus medius* (Mls. ♀ Rey, 1870)  
*Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)  
*Microporus nigritus* (F., 1794)  
*Cydnus aterrimus* (Forster, 1771)  
*Geotomus elongatus* (H.-S., 1839)  
*Adomerus biguttatus* (L., 1758)
- Canthophorus dubius* (Scopoli, 1763)  
*Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)  
*Legnotus picipes* (Fallén, 1807)  
*Sehirus luctuosus* Mls. ♀ Rey, 1866  
*Sehirus morio* (L., 1761)  
*Tritomegas bicolor* (L., 1758)  
*Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1842)  
*Thyreocoris scarabaeoides* (L., 1758)  
*Eurygaster austriaca* (Schrank, 1778)  
*Eurygaster maura* (L., 1758)  
*Eurygaster testudinaria* (Geoffroy, 1785)  
*Odontoscelis fuliginosa* (L., 1761)  
*Odontoscelis lineola* Rambur, 1839  
*Phimodera humeralis* (Dalman, 1823)  
*Arma custos* (F., 1794)  
*Picromerus bidens* (L., 1758)  
*Rhacognathus punctatus* (L., 1758)  
*Troilus luridus* (F., 1775)  
*Zicrona caerulea* (L., 1758)  
*Aelia acuminata* (L., 1758)  
*Aelia klugii* Hahn, 1831  
*Aelia rostrata* Boheman, 1852  
*Neottiglossa leporina* (H.-S., 1830)  
*Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1789)  
*Antheminia lunulata* (Goeze, 1778)  
*Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1849)  
*Carpocoris pudicus* (Poda, 1761)  
*Carpocoris purpureipennis* (De Geer, 1773)  
*Chlorochroa juniperina* (L., 1758)  
*Chlorochroa pinicola* (Mls. ♀ Rey, 1852)  
*Dolycoris baccarum* (L., 1758)  
*Palomena prasina* (L., 1761)  
*Palomena viridissima* (Poda, 1761)  
*Peribalus vernalis* (Wolff, 1804)  
*Staria lunata* (Hahn, 1835)  
*Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)  
*Eysarcoris fabricii* Kirkaldy, 1904  
*Nezara viridula* (L., 1758)  
*Pentatomia rufipes* (L., 1758)  
*Piezodorus lituratus* (F., 1794)  
*Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)  
*Sciocoris cursitans* (F., 1794)  
*Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763)  
*Eurydema oleracea* (L., 1758)  
*Eurydema ornata* (L., 1758)  
*Eurydema ventralis* Kolenati, 1846  
*Ancyrosoma leucogrammes* (Gmelin, 1790)  
*Graphosoma lineatum* (L., 1758)  
*Podops inunctus* (F., 1775)  
*Vilpianus galii* (Wolff, 1802)  
*Acanthosoma haemorrhoidale* (L., 1758)  
*Cyphostethus tristriatus* (F., 1787)  
*Elasmostethus interstinctus* (L., 1758)  
*Elasmostethus minor* Horváth, 1899  
*Elasmucha ferrugata* (F., 1787)  
*Elasmucha grisea* (L., 1758)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe  
Mitteleuropäischer Heteropterologen](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Willers Joachim

Artikel/Article: [Die Wanzen Sammlung am Naturkundemuseum Erfurt 27-31](#)