

***Amphiareus obscuriceps* (POPPIUS, 1909) nunmehr auch in  
Nordrhein-Westfalen (NRW) / Deutschland (Heteroptera, Anthocoridae)**

HANS-JÜRGEN HOFFMANN

Nach der Erstmeldung von *Amphiareus obscuriceps* für Deutschland durch SIMON 2002 aus Rheinland-Pfalz wurde die Art auch in Berlin (DECKERT 2003), Baden-Württemberg (RIEGER 2006) und Sachsen-Anhalt (GRUSCHWITZ 2006) nachgewiesen. SIMON (2007) weist darauf hin, daß die Art offensichtlich immer häufiger gefunden wird und listet 12 eigene Fundstellen (davon 1 in Baden-Württemberg und 1 in Hessen) auf.

Die Exemplare stammen in der Regel aus Geäst u.ä., meist mit großen Mengen Psocopteren und sind oft mit der verwandten Art *Cardiastethus fasciventris* vergesellschaftet.

In Wanzen-Material aus dem NSG , das mir von H. KINKLER / Leverkusen zur Bestimmung übergeben wurde, fand sich nun auch ein Exemplar der Art, so daß *A. obscuriceps* nunmehr auch für Nordrhein-Westfalen (NRW) nachgewiesen ist. (B. AUKEMA danke ich für Überprüfung der Determination.)

1 ♀, Leverkusen, NSG Gronenborn, 23.06.-22.07.2006, Lufteklektor, H. KINKLER

Zweifelsohne erfolgt nach einer Erstmeldung eine intensivere Nachsuche, so daß üblicherweise in der Folge weitere Fundmeldungen publiziert werden. Allerdings scheint es sich bei *Amphiareus obscuriceps*, ebenso wie bei *Cardiastethus fasciventris* um eine Art mit derzeitiger allgemeiner Ausbreitung – weltweit? - zu handeln. So wurde jüngst Erstnachweise für N-Amerika (aus 14 Bundesstaaten und Canada) (HENRY et al . 2008), sowie für Belgien (AUKEMA et al. 2008) veröffentlicht. Schon vorher erfolgten Zusammenstellungen für die Tschechische Republik und den Balkan (PÉRICART & STEHLIK 1998) und Italien (BACCHI & VLACH 2000).

*A. obscuriceps* hat seinen Verbreitungsschwerpunkt in der Ostpaläarktis (Japan, Korea, China, Asiatischer Teil Russlands, Iran). Die Erstmeldung für Europa erfolgte 1989 aus Ungarn (AUKEMA 1990), nachfolgende Meldungen von PÉRICART & STEHLIK (1998) aus Bulgarien, Tschechien und der Balkan-Halbinsel, aus Italien (BACCHI & VLACH 2000), Österreich (FRIESS 2000) und Finland(>1999, Internet). Die Abfolge der Meldungen weist auf eine westwärts gerichtete Ausbreitungswelle in Europa hin. Die Art ist euryök und lebt bevorzugt in aus trockenen Blättern bestehenden Mikrohabitaten von geeignet kleinen Arthropoden, speziell wohl von Psocopteren.

#### LITERATUR

- AUKEMA, B. (1990): Additional data on the Heteroptera fauna of the Kiskunság National Park. - Folia Entomol. Hung. **51**, 5-16.
- AUKEMA, B., BOS, F., HERMES, D. & ZEINSTRAS, PH. (2005): Nieuwe en Interessante Nederlandse Wantsen II, met een geactualiseerde Naamlijst (Hemiptera: Heteroptera). – Nederlandse Faun. Mededelingen **23**, 37-76.
- AUKEMA, B., BRUERS, J. & VISKENS, G. (2008): Nieuwe en zeldzame Belgische wantsen II (Hemiptera: Heteroptera). – Bull. Koninklijke Belgische Vereniging **143**, 83-91.
- BACCHI, I. & VLACH M.R. (2000): *Amphiareus obscuriceps* (POPPIUS, 1909) in Italy: morphological, ecological and chorological notes (Heteroptera Anthocoridae). – Boll. Soc. entomol. ital. **132**, 99-103.
- DECKERT, J. (2003): Zum Vorkommen von *Amphiareus obscuriceps* (POPPIUS, 1909) (Heteroptera, Anthocoridae) in Brandenburg. – Entomol. Nachrichten und Berichte **47**, 107-108.
- FRIESS (2000): Libellen (Odonata) und Wanzen (Heteroptera) aus dem Naturschutzgebiet Gut Walterskirchen am Wörthersee. - Carinthia II **190/110**, 517-530.
- GRUSCHWITZ, W. (2006): Liste der bisher um Staßfurt (Sachsen-Anhalt) nachgewiesenen Wanzen (Insecta, Heteroptera) – 4. Nachtrag. – halophila, Mitt.-Bl. FG Faun. u. Ökol. Staßfurt **49**, 14-17.

- HENRY, TH.J., WHEELER, A.G. & STEINER W.E. Jr (2008): First North American records of *Amphiareus obscuriceps* (POPPIUS) (Hemiptera: Heteroptera: Anthocoridae), with a discussion of dead-leaf microhabitats. – Proc. Ent. Soc. Washington **110**, 402-416.
- KMENT, P., BRYJA, J., JINDRA, Z., HRADIL, K. & BANAR, P. (2003): New and interesting records of true bugs (Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia II. - Klapalekiana **39**, 257-306.
- MÜNCH, D. & MÜNCH, M. (2007): Neue und ehemals selten nachgewiesene Wanzenarten (Heteroptera) aus Sachsen. – Sächsische Entomol. Zeitschrift **2**, 13-36.
- PÉRICART, J. & STEHLIK, J.L. (1998): *Amphiareus obscuriceps* (POPP.) in the Czech Republic and in the Balkan peninsula (Heteroptera, Anthocoridae). – Acta Musei Moraviae – Scientiae biologicae **83**, 217-218.
- SIMON, H. (2002): Erstes vorläufiges Verzeichnis der Wanzen (Insecta: Heteroptera) in Rheinland-Pfalz. – Fauna Flora Rheinland-Pfalz **9**, 1379-1420, Landau.

**Anschrift des Autors:**

Dr. H.J. Hoffmann, c/o Zoologisches Institut der Universität zu Köln, Weyertal 119,  
D-50931 KÖLN, e-mail [hj.hoffmann@uni-koeln.de](mailto:hj.hoffmann@uni-koeln.de)



Abb. 1: *Amphiareus obscuriceps*, ♀, Leverkusen, NSG Gronenborn, 23.06.-22.07.2006, Luftteklektor,  
H. KINKLER

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Hans-Jürgen

Artikel/Article: [Amphiareus obscuriceps \(POPPIUS, 1909\) nunmehr auch in Nordrhein-Westfalen \(NRW\) / Deutschland \(Heteroptera, Anthocoridae\) 17-18](#)