

Philygria punctatonervosa Fll. R. Suw. 26. 6. 98 gekeschert.
Mycetaulus bipunctatus Fll. R. Suw. 30. 9. 98
 1 Expl. zwischen vielen auf faulenden
 Pilzen sitzenden *Helomyza pallida* Fll.
Spilographa abrotani Mg. R. 24. 8. 98 1 ♀
 am Fenster einer Strandveranda.

Trypeta onotrophes Lw. R. Stw. 5. 8. 98.
Urophora congrua Lw. N. 30. 5. 98 1 ♀.

Braula coeca Nitzsch. In Anzahl von
 Herrn Timm-Sellin aus dessen Bienen-
 stande.

Beitrag zur Fauna von Süd - Dalmatien.

Von G. Paganetti-Hummeler.

III.

Bathyscia Dorotkana Rtt. Einige Stücke
 in einer Höhle bei Stolivo superiore.

Bathyscia Erberi Schaaf. Das häufigste
 Siebtier in der Umgebung von Castelnuovo.
 Unter allen feuchten Laubschichten bei
 Castelnuovo, Risano und Buda während des
 ganzen Jahres zu finden.

Nargus Wilkini Spence } Vereinzelt unter
Nargus brunneus Strm. } feuchten Laub-
 schichten bei Topla.

Catomorphus orientalis Aub. In einigen
 Stücken unter Steinen, wo sich die Ameise
Aphaenogaster barbara L. vorfand.

Siodrapa Watsoni Spence. Einzelne Stücke
 bei Topla und Melinje unter Laubschichten.

Catops coracinus Keln. In einer Schlucht
 der Begowina in einigen Exemplaren mit
 Aas geködert.

Necrophorus humator Goeze. Vier Exem-
 plare in einer toten Schildkröte bei Castelnuovo
 aufgefunden.

Pseudopelta rugosa L. In einer Anzahl
 auf Aas in dem Gebiete der Sutorina.

Agathidium Brisouti Rtt. Im Mai auf
 alten Baumstämmen in der Umgebung von
 Castelnuovo.

Agathidium pallidum Gyll. In zwei
 Exemplaren ebendort.

Loricaster testaceus Muls. Unter Lor-
 beerbüschen gesiebt. Castelnuovo.

Sericoderus lateralis Ggibr. Unter Laub
 und faulenden Pflanzenstoffen. Castelnuovo.

Sericoderus Kevellieri Reitt. Ebendort,
 aber selten. Castelnuovo.

Corylophus cassidoides Mls. Unter
 faulenden Pflanzenresten. Ragusa, Castel-
 nuovo, Budua.

Kliopobius Fiorianus Matth. Unter
 Genist am Rande der Sutorina selten.

Kliopobius velox Wollast. Unter Genist
 am Rande der Sutorina und Zelenika.

Ptenidium pusillum Gyll. Überall
 unter faulenden Vegetabilien häufig.

Ptenidium punctatum Gyll. Unter aus-
 geworfenen Algen an der Meeresküste.

Actinopteryx fucicola Allib. Unter Meer-
 tang an der Küste des Letarinagebietes.

Trichopteryx atomaria Dey. } Unter Laub
Trichopteryx intermedia Gillh. } u. faulenden
Trichopteryx fascicularis Herbst } Stoffen um
 Castelnuovo,
 Ragusa,
 Cattaro und
 Budua.

Scaphosoma agaricinum L., *boleti* Panz.
 Im Mulm alter Eichenstrünke überall.

Olibrus liquidus Er., *affinis* Strm., *flavi-
 cornis* Strm. Auf Wiesen gekeschert bei
 Castelnuovo und Budua.

Triplax Marseuli Wedel. Auf Schwämmen
 im April und Mai und September bei Castel-
 nuovo nicht selten.

Aulonocochilus violaceus Germ. Unter
 der Rinde abgestorbener Bäume bei Uhli.

Hylaxia dalmatina Kaufm. und v. *ferru-
 ginea* Reitt. Unter feuchtem Eichenlaub
 bei Castelnuovo nicht selten.

Symbiotes gibberosus Lee. In Anzahl im
 Mulm von Kirschbäumen bei Castelnuovo.

Cryptophagus affinis Strm., *badius* Strm.,
dentatus Herbst, *Thomsoni* Rtt., *scanicus* L.
 Unter Holzteilen und auf den Blüten der
Cydonia (Quitte) bei Castelnuovo.

Atomaria atricapilla Steph. Aus Holz-
 teilen gesiebt.

Ephistemus exiguus Er. Aus dem Gesiebe
 im Eichenwalde bei Castelnuovo.

Lathridius angusticollis Gyll. Unter
 trockenem Eichenlaub bei Castelnuovo.

Cartodere elongata Curtis, *anatolica*
 Mannh. Unter Eichenlaub bei Castelnuovo
 vereinzelt, sehr häufig bei Mokrine.

Corticaria elongata Gyll. Im Gesiebe
 aus den Eichenwäldern bei Castelnuovo.

Melanophthalma fuscipennis Mannh. Eben-dort.

Migneauxia crassiuscula Aub. Vereinzelt im Gesiebe bei Castelnovo und Budua.

Tritoma atomaria F. Unter der Rinde alter Buchen bei Uhli.

Epurea laevicollis Steph. Bei Castelnovo von *Paliurus* geklopft.

Soronia oblonga Bris. Unter Moos auf starken Eichen bei Castelnovo.

Meligethes lumbaris Strm., *rubrugosus* Gyll., *umbrosus* Strm., *picipes* Strm., *flavipes* Strm., *bidentatus* Bris. Auf blühenden Sträuchern, hauptsächlich *Paliurus*, bei Ragusa, Castelnovo und Budua.

Rhizophagus dispar Payk. Im Mulm alter Eichen bei Castelnovo.

Langelaudia callosipennis Rtt. Äußerst selten im Gesiebe bei Castelnovo.

Endophloeus squarrosus Germ. Im Mulm unter der Rinde eines alten Eichenstrunkes bei Castelnovo.

Dritoma crenata F. Unter der Rinde abgestorbener Eichen überall häufig.

Colydium elongatum F. In Eichenstrünken bei Castelnovo und Budua.

Oxylaemus cylindricus Panz. Unter der Rinde und dem Moos am Fuße alter Eichen bei Castelnovo sehr vereinzelt.

Cerylon evanescens Rtt., *semistriatum* Pen., *fagi* Bris., *histeroides* F., *ferrugineum* Steph. Unter Eichenrinde im ganzen Gebiete.

Laemophloeus testaceus F., *ferrugineus* Steph. Unter Eichenrinde.

Laemophloeus clematidis Er. In den Gängen des *Xylocleptes bispinus* Duft, auf den *Clematis*-Ranken.

Airaphilus geminus Kr. In einem Stück aus Gräsern in einem Wassergraben des Sutorinagebietes gekeschert.

Silvanus bicornis Er. Unter abgefallenen Lorbeerblättern bei Castelnovo häufig.

Silvanus unidentatus Oliv. Unter der Rinde meist in Gesellschaft von *Laemophleus*.

Monotoma brevicollis Aub. Vereinzelt im Gesiebe aus Eichenlaub bei Budua und Castelnovo.

Dermestes vulpinus F., *Frischi* Vogel. Auf Aas überall häufig.

Globicornis picta Küst., *Anthrenus pim-pinella* F., v. *delicatus* Küst., *apicalis* Köst., *verbasci* L. Auf Blüten während des ganzen Sommers häufig.

Thorictes loricatus Payk., *grandicollis* Germ. Gesiebt aus feuchten Laubschichten bei Castelnovo.

Hister 4-maculatus L., *finetarius* Herbst, v. *Peyroni* Maes, *12-striatus*. Unter Kuhfladen bei Castelnovo und Budua.

Hister corvinus Germ. Unter Aas im Sutorinagebiet.

Epierus italicus Payk. Unter ausgeworfenem Meertang bei Castelnovo und Budua.

Saprinus furvus Er., *subnitidus* Maes, *nitidulus* Payk., *rubripes* Er., v. *subtilis* Schr., *dimidiatus* v. *Hummeleri* Müll. (in litt.). Unter Aas an der Meeresküste im Sutorinagebiet.

Saprinus virescens Payk. In Gesellschaft von *Phaedon amoraciae* auf *Amoracia*.

Onthophilus striatus Forst. In Kuhfladen bei Ragusa.

Acritus punctum Aub. Unter trockenem Meertang an der Meeresküste bei Castelnovo und Budua nicht selten.

Zusammenstellung

der aus Cynipiden gezogenen europäischen Chalcididen.

Von J. J. Kieffer in Bitsch.

(Fortsetzung aus No. 16.)

Lochites Mayri Wachtl. Aus *Aulax scorzonerae* Gir. (Wachtl, 1883).*

— *papaveris* Först. Aus *Aulax papaveris* Perr. (Förster, 1859) und *jaceae* Schenck (Mayr, 1874).*

Megastigmus dorsalis Fabr. (*Bohemanni* Rtz., *xanthopygus* Först.) Aus *Andricus fecundatrix* Hart., *trilineatus* Hart., *lucidus* Hart., *inflator* Hart., *multiplicatus*

Gir., *cydoniae* Gir., *singulus* Mayr, *grossulariae* Gir., *Cynips Kollari* Hart., *lignicola*, *caput-Medusae* Hart., *conglomerata* Gir., *coronaria* DSt., *coriaria* Haim., *polycera* Gir., *Biorrhiza pallida* Ol., *Synophrus politus* Hart., *Neuroterus glandiformis* Gir. und *macropterus* Hart. (Mayr, 1874)*, *Andricus globuli* Hart. (Giraud, 1877), *Mayri* Wachtl. (DeStefani,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Illustrierte Zeitschrift für Entomologie](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): Paganetti-Hummeler Gustav

Artikel/Article: [Beitrag zur Fauna von Süd-Dalmatien. 278-279](#)