

# Internationale Entomologische Zeitschrift

Organ des Internationalen Entomologen-Bundes.

12. Jahrgang.

30. November 1918.

Nr. 18.

Inhalt: Dipteren aus der Umgebung von Pöbneck (Thüringen). — Sitzungsberichte der Deutschen Entomol. Gesellschaft.

## Dipteren aus der Umgebung von Pöbneck (Thüringen).

von M. P. Riedel, Frankfurt (Oder).

(Fortsetzung.)

### Simuliidae (*Melusiniidae*).

*Simulium (Melusina) hirtipes* Fries. — Wernburg, 6. 5. 06; 4. 5. 05 (zu vergl. Dietrich, die Facettenaugen der Dipteren, Inaug.-Dissert., Leipzig (1909), S. 70: „Herr M. P. Riedel, Uerdingen a. Rhein, hat den Hochzeitsflug einer *Simulium*-Art (*Simulium hirtipes* Fries) Anfang Mai bei Pöbneck i. Th. beobachten können. Er schreibt darüber: An einem trüben warmen Tage fielen mir am Spätnachmittage, etwa 3 m von der Erde am niedrigsten fliegend, blitzschnell von einem Punkt zum andern in der Luft „dahinschießende“ Insekten auf. Sie flogen auf einer von hohen Fichten umstandenen Schneise; es war Dämmerlicht. Ich fing etwa 30 bis 40, mehr wollte ich nicht mitnehmen; es waren bis auf ein Weibchen alles Männchen. Die Weibchen waren anscheinend für mein Netz nicht erreichbar; sie werden, wie Sie auch annehmen, in größerer Höhe über den Männchen geflogen sein.“ Durch diese Beobachtungen gewinnt es an Wahrscheinlichkeit, daß das Scheitelauge der *Simulium*-Männchen tatsächlich ein Dämmerungsauge ist. Seine biologische Bedeutung besteht ohne Zweifel darin; beim Hochzeitsflug im Dämmerlicht bezw. gedämpften Licht die über den Männchen schwebenden Weibchen wahrzunehmen. (Dietrich.) — *S. maculatum* Mg. — Wernburg, 30. 6. 05. — *S. latipes* Mg. — Wernburg, 26. 4. 06, in großer Menge in der Luft schwebend, nur ♂ erbeutet.

### Orphnephilidae.

*Orphnephila (Thaumalea Rond.) testacea* Ruthe. — Wernburg, 11. 5. 05; 5. 7. 05; 30. 6. 05 am Wernburger Bach sehr häufig.

### Psychodidae.

*Ulomyia fuliginosa* Mg. — Wernburg, 23. 8. 05 — *Pericoma fusca* Meq. (*calceata* Mg.) — Altenburg b. P., 31. 5. 05. — *P. tristis* Mg. — Wurzbachtal bei Langenorla, 28. 6. 07.

### Rhyphidae.

*Rhyphus fenestralis* Scop. — An Fenstern häufig.

### Limnobiidae.

*Dicranomyia morio* F. — Wernburg, 25. 5. 05 ♀. — Harrasmühle, 21. 5. 07, ♂. — *Limnobia nigropunctata* Schum. — Altenburg b. P., 31. 5. 06, ♂. — *Rhypholophus haemorrhoidalis* Zett. — Wernburg, 21. 9. 05; 13. 9. 06. — *Molophilus bifidus* Verr. — Kleindembach, 18. 9. 05, ♂. — *Trichocera hiemalis* Dg. — Wernburg, 20. 10. 07. — *T. v. fuscata* Mg. — Altenburg b. P., 21. 11. 05, ♀. — *Anisomera (Perenocera Curt.) fuscipennis* Curt. — Auf Steinen in der Schwarza bei Blankenburg, 6. 05, ♂♀. — *Penthoptera chirothecta* Sep. — Wernburg, 23. 6. 05, ♂; 3. 8. 05, ♀. — *P. cimicoides* Sep. — Thüringer Wald, ohne nähere Ortsangabe. —

*Amalopsis littoralis* Mg. — Döberitz, 27. 7. 05 1 ♂. — *Pedicia rivosa* L. — Wernburg, 25. 5. 05, 1 ♀

### Tipulidae.

*Ctenophora flaveolata* F. — Schwarzburg, 6. 05, 1 ♀. — *Tipula maxima* Poda. — Wernburg. — *T. saginata* Bergr. — ich fing ein ♀ im Juni 1905 in einem Tale der Wernburger Höhen bei Pöbneck in Thüringen; das dortige Vorkommen ist das bisher bekannt gewordene nördlichste — z. vergl. Riedel, Die paläarkt. Arten der Gattung *Tipula*; Abhandl. Lehrerverein f. Naturkunde, Crefeld (1913). — *T. rubripes* Schum. — Thüringer Wald, ohne nähere Ortsangabe, 3 ♂, 2 ♀. — *T. nervosa* Mg. — desgl.

### Cylindrotomidae.

*Cylindrotoma distinctissima* Wied. — Gössitz b. Ziegenrück, 30. 5. 07, 1 ♂. —

### Orthorhapha brachycera.

#### Stratiomyidae.

*Pachygaster (Zabrachia) ater* Mg. — Hain 18. 7. 07. — *Clitellaria (Ephippiomys) ephippium* F. — Schwarzatal, 6. 05, 1 ♂. — *Nemotelus pantherinus* L. — Wurzbachtal b. Langenorla, 28. 6. 07. — Rottenbach, 6. 05. — *Hoplodonta viridula* F. — Ranis, 11. 8. 05. — *Geosargus cuprarius* L. — Schwarzatal, 6. 05. — *G. v. nubeculosus* Zett. — Wernburg, 21. 6. 05. — *Microchrysa flavicornis* Mg. — Wernburg, 10. 6. 07. — *M. polita* L. — häufig. — *Beris chalybeata* Forst. — Wernburg, 24. 5. 07. — Schwarzatal, 6. 05. — *B. clavipes* L. — Blankenburg, 2. 6. 07; Wernburg, 18. 6. 06; 31. 5. 06.

### Tabanidae.

*Chrysops coecutiens* L. — Wernburg, 21. 6. 05 ♀. — *C. quadratus* Mg. — Wernburg, 30. 6. 07, ♀. — *Haematopota pluvialis* L. — *Hexatoma (Heptatoma) pellucens* F. — Döbritz, 27. 7. 05, ♀. — *Tabanus bovinus* L. — *T. micans* Mg. — Schwarzburg, 6. 05. — *T. (aterrimus Mg.) v. lugubris* Zett. — Hummelshain, 23. 6. 07, ♀. — *T. borealis* Lw., Mg. — Friedebach, 31. 6. 06, ♀. — *T. solstitialis* Schin. — Niederkrossen, 21. 6. 06. — *T. autumnalis* L. — Salz-See b. Oberröblingen, 22. 5. 93, 1 ♂. — *T. bromius* L. — Ziegenrück, 16. 7. 05, ♀. — *T. rusticus* F. — Ziegenrück, 16. 7. 05, 2 ♂, auf Dolden.

(Fortsetzung folgt.)

## Sitzungsberichte der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, E. V.

(Berl. Entom. Verein 1856 und Deutsche Entom. Ges. 1881 in Wiedervereinigung.)

(Fortsetzung.)

Die chinesische Theorie sagt über die letztere Verwendungsart folgendes: Wer von einem tollwütigen Hunde gebissen wurde, ist dadurch ge-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Riedel Max Paul

Artikel/Article: [Dipteren aus der Umgebung von Pößneck \(Thüringen\). 137-138](#)