

hat nicht eingeschnürte Vorderschienen, eines hat gelbe Geißelwurzel. Galberg 8. 6.—11. 6. Krahnberg 11. 5. 14. Zapfengrund am Hörselberg 23. 6. 12. Seeberg 14. 6. 06. Berlach 21. 5. 13. Tabarz 7 Stück vom 15. 5.—26. 9. Friedrichroda. Grenz- wiese beim Inselberg. Die Art hat eine vertikale Ausbreitung in Thüringen also von Kösen bis Inselberg, und eine Erscheinungszeit vom 28. 4.—26. 9. Jr. Windleite 1. 5. 15 und 3. 6. 14. Müller. (Bei Bozen war die Art nicht selten im Juli. Jr.)

*Pimpla ventricosa* Tschk.

Krahnberg 21. 6. 01. Gdm. Gr. Seeberg und Tüppel 16. 8. 06 und 20. 5. 16. Jr.

*Pimpla vesicaria* Ratzb.

Kösen 21. 7. 13. Boxberg 27. 4. 14. Sömmerda ♀ und ♂ aus *Tischeria complanella*-Minen an Buche von Martini erzogen. Aus Fichtenzapfen vom Gr. Seeberg erzogen, von Brauns det. Jr.

*Pimpla viduata* Grav.

Galberg 1 ♂ vom 16. 5. 18. Jr.

## Verzeichnis Thüringer Dipteren.

— Von E. Gundermann, Gotha. —

Während über Lepidopteren und Koleopteren Thüringens genaue faunistische Verzeichnisse vorliegen, ist dies bezüglich der Dipteren noch kaum der Fall. Fritz Regels geographisches Handbuch von Thüringen enthält zwar eine von dem leider verewigten Entomologen R. Gerbing zu Schnepfenthal aufgestellte Uebersicht Thüringer Fliegen, die jedoch nach seiner eigenen Angabe nur etwa die Hälfte der vermutlich auftretenden Arten mit ganz allgemein gehaltenen Angaben des Auftretens enthält. Wesentlich ergänzen lassen sich diese Aufzeichnungen durch die Fundortnotizen der in den Besitz des hiesigen Museums übergegangenen Sammlung und durch handschriftliche mir s. Z. vom Museumskustos zur Verfügung gestellte Vermerke dieses Sammlers. — Weitere Aufzeichnungen über Thüringer Dipteren finden sich in dem Exemplar von Schiners Fauna austriaca der herzoglichen Schloßbibliothek hier als Randbemerkungen von der Hand des durch sein genaues Käferverzeichnis bekannten Entomologen A. Kellner. Eine Zusammenstellung dieser vorhandenen Aufzeichnungen mit solchen anderer auf diesem Gebiete tätiger und bei alleinigen Beobachtungen nachfolgend namhaft gemachter Sammler mit eigenen Notizen mögen schon ein etwas genaueres Bild der Thüringer Dipterenfauna geben, wenn es auch noch weit davon entfernt ist, auf Vollständigkeit Anspruch machen zu können. Namentlich sind noch die *Nemotocera* (Mücken) unvollständig verzeichnet. Aus diesem Grunde und im Hinblick darauf, daß die alten Aufzeichnungen sich an das System des Schiner anlehnen, sei auch hier mit den *Brachycera* begonnen. — Das verzeichnete Sammelgebiet erstreckt sich vorzugsweise auf den Westen Thüringens, besonders Gotha und Umgegend, im Osten bis Erfurt, im Westen bis Eisenach, im Süden auf den nordwestlichen Thüringer Wald und im Norden bis zum Kyffhäuser. Gerbings Notizen beziehen sich im besonderen auf die Umgegend des am Nordwestabhange des Thüringer Waldes gelegenen Schnepfenthal von Friedrichroda bis Waltershausen und im Gebirge aufwärts über Reinhardsbrunn, Tabarz und Winterstein bis zum Inselsberge.

## Orthorhapha Brachycera.

### Stratiomyiidae.

#### Pachygastrinae.

##### *Pachygaster*.

- P. ater* Panz. Bei Erfurt im Juli und August. Frank.  
*P. Leachii* Curt. In der Klinge (am Galberg) bei Gotha 17. 6. 05.  
*P. tarsalis* Zett. Bei Erfurt 11. 7. 86. Frank.

##### *Clitellarium*.

- Cl. ephippium* F. Bei Tabarz, Jena, Erfurt, an der Sachsenburg und am Hörselberg, April bis Juni.

##### *Nemotelus*.

- N. globuliceps* Lw. Artern Soolgraben 5. 7. 87 und 24. 7. 87. Frank.  
*N. nigrinus* Fall. Artern Soolgraben und Siebleben bei Gotha im Juni und Juli.  
*N. pantherinus* L. Bei Gotha, Siebleben, Tonna, Artern und Meiningen im Juni bis August.  
*N. plagiatus* Schin. Artern Soolgraben. Juli.  
*N. uliginosus* L. 26. 8. 05.

##### *Hypolcon (Oxycera)*.

- H. Meigenii* Stg. Bei Sättelstädt im Hörseltal, Jänner.  
*H. pardalina* Mg. Halba, Girschner. (Exemplar im Museum zu Gotha.)  
*H. trilineata* F. Hörseltal. Jänner.  
*H. analis* Mg. 4. 7. 91. Erfurt. Frank.  
*H. formosa* Mg. 10. 7. 86. Gumperda. Schmiedeknecht.  
*H. pulchella* Mg. Stadtilm und Kösen. Im Juli.

#### Stratiomyiinae.

##### *Hirtaea*.

- H. longicornis* Scop. Kleiner Seeberg bei Gotha 22. 5. 05 und 2. 5. 06.

##### *Stratiomyia*.

- Str. chamaeleon* L. Boxberg und Milchried (Aquarium) bei Gotha im Juli und August.  
*Str. cenisia* Mg. Fahnersche Höhe 20. 5. 01.  
*Str. equestris* Mg. In der Bergallee bei Gotha. Gundermann.  
*Str. furcata* F. Im Steiger bei Erfurt. Juli und August. Frank.  
*Str. potamida* Mg. Zapfengrund am Hörselberg 23. 6. 12. Jänner.  
*Str. riparia* Mg. An der Sachsenburg im Juli. Gerbing.

##### *Odontomyia*.

- O. argentata* Fabr. Im Park zu Gotha 25. 7. 02 Gundermann.  
*O. hydroleon* L. Bei Gotha auf dem Milchried (am Aquarium) auf Dolden. Juli und August.  
*O. tigrina* Fabr. An Teichrändern, Cumbacher Teich und Igelsteich auf Dolden. Mai und Juni.

##### *Haplodonta*.

- H. viridula* Fabr. Bei Gotha auf dem Milchried (am Aquarium), bei Schnepfenthal und Erfurt, auf Dolden. Juli und August.

#### Sarginae.

##### *Chrysochroma*.

- Chr. bipunctatum* Scop. Blankenburg 8. 9. 07. Jänner.

##### *Geosargus*.

- G. cuprarius* L. Im Park, Seeberg, Galberg und Boxberg bei Gotha, Hörselberg, Rödichen und Erfurt. Mai bis August.  
*G. var. nubeculosus* Zett. Im Park, Seeberg und Boxberg bei Gotha, auch bei Tabarz. Mai bis August.  
*G. iridatus* Scop. (= *infuscatus* Mg.). Tabarz 10. 6. 06. Hörselberg 17. 6. 09, auch bei Erfurt.

*Chloromyia.*

*Chl. formosa* Scop. Im Park, auf dem Galberg und Seeberg bei Gotha, Juni bis August.

*Microchrysa.*

*M. polita* L. Ueberall bei Gotha sowie Erfurt im Juni bis August.

## Beridinae.

*Beris.*

*B. chalybeata* Foerst. Bei Tabarz 31. 5. 15, Grenzwiese 15. 5. 14, Inselsberg 15. 6. 17, Reinhardsbrunn, Schnepfenthal und Gr. Seeberg bei Gotha.

*B. clavipes* L. Gebüsch bei Schnepfenthal, Georgenthal, Gumperda und Erfurt im Mai und Juni.

*B. fuscipes* Mg. 8. 6. 93 auf dem Inselsberg sowie am 23. Mai bei Schnepfenthal.

*B. Morrisei* Dl. 9. 6. 99 bei Schnepfenthal. Gerbing.

*B. vallata* Fst. Im Juni und Juli bei Erfurt. Frank.

*Actina.*

*A. nitens* Ltr. Einmal häufig auf Gebüsch an der Wachsenburg am 19. Mai. Gerbing.

*Chorisops.*

*Ch. tibialis* Mg. Im Steiger bei Erfurt im Juli und August. Frank.

**Xylophagidae.***Xylophagus.*

*X. ater* Mg. 3. 6. 99 zwischen Thal und Schwarzhäusern (Thür. W.), auch bei Erfurt.

*X. cinctus* Deg. Auf Holzklaftern am Silberberg bei Blankenburg. Schmiedeknecht.

**Coenomyiidae.***Coenomyia.*

*C. ferruginea* Scop. Vorzugsweise im Gebirge im Juli nur hier und da, dann aber meist in Menge; Inselsberg, Tanzbuche, Bärenbruchswiese, Mordflechwiese bei Stutenhaus, Paulinzella usw.

**Tabanidae.**

## Pangoniinae.

*Chrysops.*

*Chr. coecutiens* L. Bei Gotha, Tabarz und Schnepfenthal im Mai bis Juli nicht selten.

*Chr. quadratus* Mg. Einzeln bei Schnepfenthal im Juli. Gerbing.

*Chr. relictus* Mg. Bei Gotha am Aquarium, am Rödicher Teich, auch bei Artern und Erfurt im Mai bis Juli.

*Chr. rufipes* Mg. 15. 7. 87. Breitung. Girschner.

*Silvius.*

*S. vituli* F. Kommt nach Schmiedeknecht im Zeitzer Grunde vor.

## Tabaninae.

*Heptaloma (Hexatoma).*

*H. pellucens* F. 12. 6. 10, 15. 8. 15 und 26. 8. 15 Gr. Seeberg. 11. 6. 11 Tabarz.

*Haematopota.*

*H. italica* Mg. 13. 7. 99 am Hermannstein bei Schnepfenthal, auch bei Erfurt.

*H. pluvialis* L. Ueberall häufig und lästig im Juli bis August, ♂♂ jedoch selten.

*Tabanus.*

*T. autumnalis* L. 12. 7. 98 und 12. 8. 98 am Burgberg bei Waltershausen, auch bei Georgenthal.

*T. aterrimus* Mg. 17. 6. 14. Seeberg bei Gotha.

*T. var. auripilus* Mg. 26. 6. 01. Tanzbuche, auch bei Oberhof.

*T. var. lugubris* Zett. 15. 5. 15 und 7. 6. 14 Tabarz, 20. 5. 15 Kyffhäuser.

*T. bovinus* L. 15. 6. 04 Park bei Gotha, 1. 8. 14 und 6. 8. 17 Inselsberg, auch bei Erfurt.

*T. bromius* L. Häufigste Art im Gebirge, sowie auch im flachen Lande im Mai bis August.

*T. cordiger* Mg. 26. 6. 07. Boxberg bei Gotha, 30. 7. 14 Tabarz.

*T. fulvus* Mg. 9. 7. 06 und 2. 8. 06 Krahnberg bei Gotha; auch im Thür. Walde.

*T. gigas* Hbst. Nach Bechstein in Gerbings Notizen auf dem Inselsberg im Sommer in Menge; bei Erfurt 25. 5. 90.

*T. glaucopsis* Mg. 6. 8. 01 bei Tabarz. Jänner.

*T. var. cognatus* Lw. 6. 8. 11 bei Tabarz. Jänner.

*T. infuscatus* L. 8. 6. 13 bei Georgenthal. Jänner.

*T. luridus* Fall. Im Seeberg und Krahnberg b. Gotha im Mai und Juni.

*T. micans* Mg. 29. 5. 01 und 26. 6. 07 bei Tabarz, 23. 6. 01 bei Luisenthal (Thür. W.).

*T. plebejus* Fall. 30. 5. 07 Gr. Seeberg bei Gotha.

*T. quatuornotatus* Mg. Im Krahnberg, Seeberg und Boxberg bei Gotha, auch bei Erfurt im Mai bis Juli.

*T. rusticus* L. Auf Dolden im Krahnberg, Berlach und Boxberg bei Gotha und im Tambuch bei Ohrdruf im Mai bis Juli.

*T. solstitialis* Sch. Im Großen Seeberg und Boxberg bei Gotha, bei Rödichen, Georgenthal und am Rennstieg im Mai bis Juni.

*T. spodopterus* Mg. Berlach und Krahnberg bei Gotha, Inselsberg und Tambuch im Juli und August.

*T. sudeticus* Zett. Im Park zu Gotha, Inselsberg, Tambach und Tabarz im Juli bis August.

*T. tropicus* Mg. Im Park, Krahnberg und Berlach bei Gotha, Friedrichswerth und Oberhof im Mai bis Juli oft in großer Anzahl.

**Leptididae.**

## Leptidinae.

*Atheria.*

*A. crassipes* Mg. Im Thür. Wald selten. Kellner.

*A. ibis* F. Am Hörselberg, bei Tabarz, Meiningen und Erfurt im Mai bis Juli.

*A. marginata* F. 23. 7. 06. Im Lauchgrund bei Tabarz, auch bei Schnepfenthal.

*Leptis.*

*L. annulata* Deg. Im Boxberg bei Gotha, bei Tabarz und Erfurt im Mai bis August.

*L. chryso stigma* Lw. 8. 6. 95 bei Schnepfenthal auf Gebüsch. Gerbing.

*L. latipennis* Lw. Auf dem Inselsberg, der Grenzwiese, bei Tabarz und Friedrichroda Ende Juli und Anfang August.

*L. lineola* F. Bei Gotha, Tabarz, Reinhardsbrunn, Inselsberg im Juni bis August.

*L. var. monticola* Egg. Bei Friedrichroda, Winterstein und am Inselsberg im Juni bis August.

*L. notata* Mg. Lange Wiese bei Reinhardsbrunn, Sempach bei Winterstein, Grenzwiese und Inselsberg im Juni bis August.

*L. scolopacea* L. In der Klinge und dem Boxberg bei Gotha, bei Schnepfenthal, Tabarz, Gräfenroda, Georgenthal, Saalfeld und Erfurt im Mai bis Juli häufig.

*L. strigosa* Mg. Hörselberg, Schnepfenthal, Meiningen und Erfurt, Mai bis Anfang September.

*L. tringaria* L. Boxberg bei Gotha, Hörselberg, Schnepfenthal und Tabarz, Ende Mai bis Ende August.

Desgl. auch var. *vanellus* F.

*L. vitripennis* Mg. Bei Gotha, Schnepfenthal, Tabarz, Georgenthal, Gräfenroda und am Hörselberg Ende Mai bis Anfang August.

*L. maculata* Deg. Boxberg bei Gotha, Lange Wiese bei Reinhardbrunn und Erfurt Ende Mai bis Anfang August.

*Chrysopilinae.*

*Chrysopilus.*

*Chr. auratus* F. Boxberg bei Gotha, Schnepfenthal, Reinhardbrunn, Tabarz, Georgenthal, Hörselberg und Ilmenau Ende Mai bis Anfang August.

*Chr. aureus* Mg. Bei Friedrichroda und Erfurt im Juli.

*Chr. erythrophthalmus* Lw. Bei Schnepfenthal, Gerbing.

*Chr. flaveolus* Mg. 12. 6. 98. Schnepfenthal. Gerbing.

*Chr. nubeculus* Fll. Lange Wiese bei Reinhardbrunn, Tabarz, Meiningen und Erfurt, Mitte Juli bis Anfang August.

*Symphoromyia.*

*S. immaculata* Mg. Gräfenroda und Schnepfenthal im Juni.

*S. crassicornis* Pz. 23. 7. 02. Lange Wiese, Reinhardbrunn und Inselsberg im Juni bis September.

*Spania.*

*Sp. nigra* Mg. Tanzbuchensumpf 12. 6. 00.

**Acroceridae.**

*Acrocerinae.*

*Acrocera.*

*A. globulus* L. Im Steiger bei Erfurt 7. 7. 90 und 28. 7. 91. Frank.

*Oncodes.*

*O. gibbosus* L. Gumperda. Schmiedeknecht.

*O. zonatus* Erichs. Bei Gotha, Erfurt und Gumperda, im Juli.

**Asilidae.**

*Dasypogoninae.*

*Gonypes (Leptogaster).*

*G. cylindricus* Deg. Bei Gotha, Erfurt, Fahnersche Höhe und Tambuch im Juni und Juli.

*G. guttiventris* Zett. Bei Tabarz und Meiningen, Mitte Juni bis August.

*Dioctria.*

*D. atricapilla* Mg. Bei Gotha, Erfurt und am Hörselberg im Mai und Juni.

*D. aurifrons* Mg. Erfurt und Heldringen im Mai und Juni. Frank.

*D. bicincta* Mg. Bei Gotha, Schnepfenthal und Reinhardbrunn im Mai bis Juli.

*D. flavipes* M. Um Gotha selten. Kellner.

*D. harcyniae* Lw. Heldringen 4. 7. 07. Frank.

*D. hyalipennis* F. Bei Gotha, Tabarz und Erfurt im Juni und Juli.

*D. linearis* F. Im Steiger bei Erfurt 2. 8. 87. Frank.

*D. lateralis* Mg. Bei Erfurt, Heldringen und Artern im Mai bis Juli. Frank.

*D. oelandica* L. Im Boxberg und Krahnberg bei Gotha und Steiger bei Erfurt im Juni und Juli.

*D. Reinhardi* Wied. Bei Sondra, Tabarz, Schnepfenthal, Schmalkalden und Blankenburg im Juni bis August.

*D. rufipes* Deg. Bei Gotha, Tabarz, Eisenach, Erfurt, Heldringen, Tonna, am Hörselberg und auf der Grenzwiese im Mai bis Juli.

*Dasypogon.*

*D. leuonius* L. Großer Seeberg 15. 6. 17. Gundermann. Bei Gumperda. Schmiedeknecht.

*Leptarthrus (Isopogon).*

*L. breviostris* Mg. Bei Tabarz, der Tanzbuche, Schmücke und auf dem Dolmar im Mai bis Juli.

*L. vitripennis* Mg. Großer Seeberg bei Gotha im Juli.

*Holopogon.*

*H. fumiipennis* Mg. Bei Erfurt im Juni und Juli. Frank.

*H. nigripennis* Mg. Bei Erfurt und Artern im Soolgraben im Juni und Juli. Frank.

*Lasiopogon.*

*L. cinctus* F. Bei Tabarz, Saalfeld und am Galberg bei Gotha im Mai und Juni.

*Cyrtopogon.*

*C. flavimannus* Mg. Bei Tambach 23. 6. 15 und 1. 7. 15. Gundermann.

*C. lateralis* Fall. Bei Tambach, Tabarz, der Leinaquelle und Braunsdorf im Juni und Juli.

*C. maculipennis* Macq. Bei Tambach, Reinhardbrunn, der Tanzbuche, am Rennstieg, am Schneekopf, Beerberg und der Möst im Juni und Juli.

*C. ruficornis* F. Bei Tabarz, Schnepfenthal, Meiningen, auf dem Inselsberg, gr. Seeberg bei Gotha, Hörselberg, im Freudenthal und Tambuch im Juni und Juli.

*Laphriinae.*

*Laphria.*

*L. ephippium* F. Auf dem Inselsberg, Possen, Zella und bei Gumperda im August.

*L. flava* L. Auf dem gr. Seeberg, Krahnberg und Boxberg bei Gotha, bei Schnepfenthal, Friedrichroda, Tabarz, Dörnberg, Ilmenau, Mambach am Rennstieg und Hörselberg im Mai bis August.

*L. fimbriata* Mg. Um Gotha selten. Kellner.

Schluß folgt.

**Bücherbesprechungen.**

**Entomologisches Jahrbuch. 28. Jahrgang.** Kalender für alle Insekten-Sammler auf das Jahr 1919. Herausgegeben von Prof. Dr. O. Krancher, Leipzig. Mit Original-Abbildungen und einem Anzeigen-Anhange. Frankestein & Wagner, Leipzig, 1919. Preis 2,40 Mark.

Etwas später als sonst stellte sich der allen Insekten sammelern bestens bekannte „Krancher“ diesmal ein, wurde aber, wie seine Vorgänger, freundlichst begrüßt und erwartungsvoll durchblättert. Dabei fiel zuerst die schöne Eingangstafel in die Augen, welche 20 verschiedene Formen der Schaumzirpe *Philaenus graminis* Deg. zur Darstellung bringt. Weiter zeigte sich, daß der neue (28) Jahrgang hinter den früheren an Reichhaltigkeit des Inhaltes nicht zurücksteht. Selbstverständlich beanspruchen die Arbeiten über Lepidopteren und Coleopteren den größten Raum; doch auch die Hymenopteren, Rhynchoten und selbst die Proturen, welche vielen Entomologen noch unbekannt sein dürften, werden mehr oder weniger eingehend berücksichtigt. Bei tieferem Eindringen in den Inhalt des Jahrbuches, wozu die langen Winterabende willkommene Gelegenheit bieten, offenbart sich die Gediegenheit der Aufsätze, deren Verfasser zu den hervorragendsten Entomologen Deutschlands und Oesterreichs gehören. So berechtigt der vortreffliche und vielseitige Inhalt des 28. Jahrganges zu der Erwartung, daß das „Entomologische Jahrbuch“ zahlreiche neue Freunde zu dem alten Stamme treuer Abnehmer hinzugewinnen wird. Und wie es seinen Lesern und dazu allen Entomologen „ein herzliches Glück auf 1919!“ wünscht, so geben wir seinem neuen Jahrgange ein ebenso herzliches „Glückauf!“ mit auf den Weg.

P. H.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Gundermann E.

Artikel/Article: [Verzeichnis Thüringer Dipteren. 195-200](#)