

Beiträge zur elsässischen Lepidopteren-fauna unter hauptsächlichlicher Berücksichtigung der näheren Umgebung von Straßburg.

Von Ernst Brombacher, Freiburg (Breisgau).
(Fortsetzung.)

Papilionidae.

1. *Papilio* L. *podalirius* L. Im Neuhöfler Wald einzeln, in andere Wäldern bei Straßburg nicht beobachtet. In den Vorbergen häufig.
2. *machaon* L. Ueberall in der Umgebung von Straßburg in mehreren Generationen.
3. ab. *sphyrus* Hb. Von Busch 1914 auf dem Dreispitz bei Mutzig gefangen.
4. v. *aurantiaca* Spr. Auf dem Bollenberg bei Rufach zahlreich im Juli und August.
5. *Parnassius* Latr. *apollo* L. v. *meridionalis*. Am Alteldsee bei Sewen im Juli einzeln. In früheren Jahren dort sehr häufig, leider durch Massenfäng fast ausgerottet.
6. ab. *pseudonimion* Christ. Von Busch 1906 bei Pfirt, Ober-Elsaß (Jura) gefangen. *

Pieridae.

7. *Aporia* Hb. *crataegi* L. In der Umgebung von Straßburg einzeln im Mai, in den Vorbergen und hohen Vogesen häufig bis Juli.
8. ab. *marginata* Tutt. Bei Barr und auf dem Dreispitz bei Mutzig gefangen.
9. *Pieris* Schr. *brassicae* L. Ueberall gemein. 1915 ein dunkel bestäubtes ♂ bei Lichtenberg gefangen.
10. ab. *lutea* Röber, ober- und unterseits gelb. Im Ruprechtsauer Wald gefangen.
11. *rapae* L. Gemein in der Umgebung von Straßburg. 1915 ein ♂ in *Lyc. icarus* - Größe im Herrenwald gefangen.
12. *napi* L. Ueberall gemein in mehreren Generationen.
13. v. *nepaeae* Esp. Einzeln im Herrenwald, in den hohen Vogesen häufiger.
14. v. *bryoniae* Ochs. 1902 von meinem Schwager am Weißen See, am 31. Juli 1911 von mir am Fischbödle gefangen.
15. *daphidice* L. In der Umgebung von Straßburg vereinzelt, früher auf der Sporeninsel zahlreich.
16. v. *bellidice* O. Auf dem Bollenberg bei Rufach einzeln.
17. *Euchloë* Hb. *cardamines* L. Ueberall auf Waldwiesen bei Straßburg häufig im April, Mai.
18. ab. *turritis* Ochs. Aus dem Neuhöfler Wald mehrere Exemplare.
19. *Leptidia* Billb. *sinapis* L. In den Wäldern bei Straßburg gemein.
20. ab. *lathyri* Hb. Wie Stammform, häufig im März, April.
21. *Golias* F. *palaeno* v. *europome* Esp. Nach Dr. Fuchs am Weißen See, wir haben sie dort noch nicht gefunden.
22. *hyale* L. Ueberall bis ins höhere Gebirge gemein in mehreren Generationen.
23. *chrysotheme* Esp. Am 6. August 1911 wurden von Huber und mir je ein ♂ auf dem Bollenberg gefangen. *
24. *edusa* F. In manchen Jahren, wie 1911, bei Straßburg ungemein häufig, sonst spärlich. Huber fing 1908 beim Fort Fransecki ein zitronengelbes ♂. Exemplar in meiner Sammlung.

25. ab. *helice* Hb. Von mir 1911 ein Exemplar auf der Sporeninsel gefangen.
26. *Gonepteryx* Leach *rharni* L. Gemein in der Umgebung von Straßburg.

Nymphalidae.

27. *Apatura* F. *iris* L. In den Wäldern bei Straßburg zahlreich an feuchten Stellen und Pferdeexcrementen Juni, Juli. 1910 im Neuhöfler Wald an Marderkot *iris*, *ilia* und ab. *clytie* gefangen. Die Falter kamen in Mengen an diese Stelle, die sonst so scheuen Tiere ließen sich da mit der Hand abnehmen.
28. *ilia* Schiff. Wie vorige verbreitet, etwas seltener.
29. ab. *clytie* Schiff. Ueberall zahlreicher als die Stammform. Im Juli 1911 ein schillerndes ♀ im Brumather Wald gefangen.
30. ab. *eos* Rossi. Im Neuhöfler und Brumather Wald je ein Exemplar gefangen.
31. *Limenitis* F. *camilla* Schiff. Bei Barr (Mönkalb) einzeln, im Andlauer Tal zahlreich im Juli.
32. *populi* L. Im Neuhöfler Wald, im Herren- und Brumather Wald einzeln im Mai und Juni. Am Alteldsee im Juli gefangen.
33. ab. *tremulae* Esp. Unter der Stammart, im Neuhöfler und Herrenwald einzeln.
34. *sibylla* L. In den Wäldern bei Straßburg häufig im Juni, Juli.
35. ab. *nigrina* Weym. Von Huber 1906 im Brumather Wald gefangen. Exemplar in meiner Sammlung.
36. *Pyrameis* Hb. *atalanta* L. Ueberall in der Umgebung von Straßburg in zwei Generationen.
37. ab. *nana* Schultz. Aus Zucht erhalten, Raupe aus dem Ruprechtsauer Wald.
38. *cardui* L. Ueberall in der Umgebung von Straßburg in manchen Jahren häufig.
39. ab. *elymi* Rbr. Ein annäherndes Exemplar 1913 auf dem Bollenberg gefangen.
40. *Vanessa* F. *io* L. Ueberall gemein bei Straßburg.
41. ab. *ioides* Ochs. Mehrmals aus Zucht erhalten, Raupe aus der Umgebung von Straßburg.
42. *urticae* L. Ueberall gemein, noch in 1300 m Höhe häufig angetroffen.
43. *polychioros* L. Früher in den Rheinwaldungen bei Straßburg häufig, jetzt sehr vereinzelt. In den Vorbergen häufiger.
44. *antiopa* L. In den Rheinwaldungen bei Straßburg einzeln. In den Vorbergen häufig.
45. *Polygonia* Hb. *c-album* L. Ueberall häufig in mehreren Generationen.
46. ab. *reichenstettensis* Rühl. Im Juli 1915 im Herrenwald gefangen.
47. ab. *f-album* Esp. Im Juli 1918 bei Alberschweiler in Lothringen gefangen.
48. *Nraschnia* Hb. *levana* L. Im Herren- und Brumather Wald im Mai.
49. v. *prorsa* L. Wie vorige verbreitet, nur häufiger.
50. ab. *porima* Ochs. Aus Zucht erhalten, Raupe aus dem Herrenwald.
51. *Melitaea* F. *maturna* L. 1909 im Mai die Raupen in Anzahl im Neuhöfler Wald an jungen Eschen gefunden. Den Falter wiederholt dort gefangen. 1916 von Busch eine Puppe bei Gerstheim an Esche gefunden.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1920

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Brombacher Ernst

Artikel/Article: [Beiträge zur elsässischen Lepidopterenfauna unter hauptsächlicher Berücksichtigung der näheren Umgebung von Straßburg. 181-182](#)