

mondförmige 6. Fleck bis auf ganz geringe, kaum sichtbare, durch die schwarzen Adern zerteilte rote Spuren verschwunden. Dieses Merkmal besitzt das männliche Geschlecht dieser Rasse ausschließlich, das weibliche zu einem großen Prozentsatz. Fleck 3 und 4 fast ausnahmslos getrennt. Fleck 5 und 6 einzelnstehend. Starker Metallglanz der Vorderflügel auf der Oberseite. Der weiße Halskragen fast verschwunden. Der Hinterleib zeigt bei der Mehrzahl der Tiere Spuren eines roten Ringes. Hinterflügel ziemlich breit schwarz umrandet, viel stärker wie bei der Wiener *carniolica*-Rasse. Ich benenne diese gut ausgeprägte Rasse nach dem liebenswürdigen Entomologen Herrn Leonhard in Dresden-Blasewitz. Herr Leonhard teilt auf Anfrage mit, daß er die Tiere in Anzahl auf den Abhängen des Kapellenberges bei Kronstadt, Transsylvanische Alpen in 600—800 m Höhe im Juli 1890 gefangen habe und daß ihm schon damals diese besondere Rasse aufgefallen sei. Herr Leonhard glaubt bestimmt, daß diese Rasse in den ganzen Transsylvanischen Alpen verbreitet ist.

5. *Zyg. carniolica* v. *siciliana* var. nova. Die sizilianische *carniolica*-Form, die ich leider nur in weiblichen Exemplaren von Herrn Faller, Freiburg, besitze, zeigt helleres Rot wie v. *amanda* Reiß aus Mittelitalien, ist beinahe so groß wie *carniolica*-Stammform. Die Vorderflügel glänzen stahlblau. Die 6 roten Flecke sind schwach, beinahe rudimentär weiß umrandet. Fleck 3 mit Fleck 4 leicht verbunden, Fleck 5 und 6 alleinstehend. Hinterflügel gleichmäßig schmal schwarz umrandet. Hinterleib zeigt deutlich sichtbare Spuren eines ziemlich breiten roten Ringes. Weitere Erläuterungen vermag ich erst zu geben wenn mir mehr Material vorliegt. Es ist anzunehmen, daß die ♂♂ der v. *siciliana* eine stärkere Reduktion der hellen Umrandung der roten Vorderflügel Flecke zeigen werden.

9. *Zyg. carniolica* v. *albarracina* Stgr. In meinem Besitze sind nur 2 ♀♀ der Rasse, die Herr Faller, Freiburg, in Granada, Südspanien gesammelt hat. Sie zeigen die von Herrn Staudinger beschriebene rudimentäre weiße Umrandung der roten Vorderflügel Flecke. Die roten Spuren der Hinterleibsgürtel sind bei meinen Tieren nicht nur mit der Lupe, sondern mit bloßem Auge sichtbar.

7. *Zyg. carniolica* v. *graeca* Stgr. Von Herrn Wagner, Wien, wird in seiner Abhandlung über *Zyg. carniolica*-Rassen in Band VIII Nr. 10/12 v. 26. 11. 19 der Entom. Mitteilungen des Deutschen Entom. Museums empfohlen, v. *graeca* Stgr. als Synonym zu *carniolica* Scop. zu ziehen. Schon meine bulgarischen *carniolica* (aus Maylige 1912) zeigen durchweg einheitlich starken roten Gürtel und hellere rote Grundfarbe. Die griechischen *carniolica* zeigen dasselbe Bild. Ich kann mich deshalb der Ansicht des Herrn Wagner über Einziehung des Rassennamens v. *graeca* Stgr. nicht anschließen.

8. *Zyg. occitanica* Vill. v. *iberica* Stgr. ab. *nigra* ab. nova: Die Hinterflügel sind mehr wie doppelt so breit schwarz gerandet wie bei *iberica*. Außerdem springt die verbreiterte schwarze Umrandung in die Flügelmitte und darüber hinaus vor und erzeugt ein schwarzes Querband, dem vom Vorderrande ein schwarzer Vorsprung entgegenkommt. 1 ♂ von Barcelona 17. 6. 19 von Herrn Faller, Freiburg Br., gefangen.

9. *Zyg. occitanica* Vill. v. *iberica* Stgr. ab. *cataloniae* ab. nova ist gekennzeichnet durch

vollständiges Verschwinden des weißen 6. Fleckes und der weißen Umrandung der 5 übrigen Vorderflügel Flecke. Bei einigen Exemplaren erscheint die weiße Umrandung in einzelnen weißen Schuppen. Der weiße Halskragen ist verschwunden bis auf ganz geringe Spuren. Bei ungefähr ein Drittel der mir vorliegenden Exemplare ist der Hinterflügel viel schmaler schwarz umrandet wie bei v. *iberica*. Hinterleib mit deutlichem, manchmal breitem rotem Gürtel. Stücke ohne jede Spur eines roten Gürtels scheinen unter der ab. *cataloniae* Reiß sehr selten vorzukommen. Die Tiere wurden sämtlich von Herrn Faller, Freiburg, in der Umgebung von Barcelona gesammelt. Ungefähr ein Drittel der mir vorliegenden *iberica* aus Barcelona gehören zur ab. *cataloniae* m.

10. *Zyg. occitanica* v. *albicans* ab. *pseudodisjuncta* Spuler sind der *occitanica disjuncta* Spuler ähnliche Stücke der südspanischen *albicans*-Rasse aus Granada, die im Mai 1914 von Herrn Faller, Freiburg, mitgebracht wurden.

### Beiträge zur elsässischen Lepidopterenfauna unter hauptsächlichlicher Berücksichtigung der näheren Umgebung von Straßburg.\*)

Von Ernst Brombacher, Freiburg (Breisgau).

(Fortsetzung.)

85. ab. *nelamus* Boisd. Am Hexenweiher und bei den Spitzköpfen in den hohen Vogesen einzeln.
86. *pharte* Hb. Am 4. Juli 1911 auf dem Kastelberg 1200 m mit *epiphron* gefangen.
87. *manto* Esp. v. *vogesiaca* Christ. An den steilen Hängen der Spitzköpfe und des Batteriekopfes im August zahlreich. Von Busck am Weißen See und Forellenweiher gefangen.
88. *medusa* F. Bei Barr, Andlau, Lichtenberg und Dreispitz bei Mutzig einzeln. Am Alfeldsee zahlreicher.
89. *stygne* Ochs Bei Barr und auf dem Dreispitz vereinzelt. In den hohen Vogesen überall, besonders vom Sternsee bis zum Welschen Belchen ungemein häufig. Am Alfeldsee fanden wir eine Form an einer besonderen Stelle, deren Binde in Keilflecke aufgelöst ist. 1914 die Eier an Gräsern dort gefunden, leider konnte ich die Zucht nicht durchführen wegen Kriegausbruch.
90. *acthiops* Esp. Bei Barr, auf dem Dreispitz und am Alfeldsee zahlreich im Juli und August.
91. *ligea* L. Bei Barr einzeln, in den Hochvogesen häufig im Juli und August.
92. *Satyrus* Latr. *circe* F. Bei Barr, Rappottsweiher und auf dem Bollenberg nicht häufig. Einmal im Herrenwald gefangen.
93. *hermione* L. Fundorte wie vorige, häufiger.
94. *alcyone* Schiff. Im Andlauer Tal einzeln. Von Busch bei Pfirt, Ober-Elsaß (Jura) häufig angetroffen.
95. *briseis* L. Auf dem Bollenberg bei Rufach sehr häufig im Juli und August.

\*) Berichtigung: Bei 5. *Parnassius apollo* ist die Form v. *meridionalis* zu streichen und dafür v. *sevensis* Ksh. zu setzen. — v. *meridionalis* ist zu 6 vor ab. *pseudonomion* zu setzen.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Brombacher Ernst

Artikel/Article: [Beiträge zur elsässischen Lepidopterenfauna unter hauptsächlicher Berücksichtigung der näheren Umgebung von Straßburg. 40](#)