© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Internationale Entomologische Zeitschrift

Organ des Internationalen Entomologen-Bundes.

15. Jahrgang. 9. Juli 1921. Nr. 8.

Inhalt: Ueber das Vorkommen fremdländischer Coleopteren im mitteleuropäischen Gebiet. Ein Beitrag zur Akklimatisation der Tiere und im besonderen der Käfer in fremden Regionen. (Fortsetzung.) — Neue afrikanische Lepidopteren aus der Ertlschen Sammlung. (Fortsetzung.) — Ueber die Makrolepidopterenfauna des höheren Riesen- und Isergebirges. — Die gelben Formen von Celerio euphorbiae L. — Beiträge zur elsässischen Lepidopterenfauna unter hauptsächlicher Berücksichtigung der näheren Umgebung von Straßburg. (Fortsetzung.)

Ueber das Vorkommen fremdländischer Coleopteren im mitteleuropäischen Gebiet.

Ein Beitrag zur Akklimatisation der Tiere und im besonderen der Käfer in fremden Regionen.

— Von *Emil Ross*-Berlin N. 113, Dunckerstraße 64. —

(Fortsetzung.)

592. *Melasoma aenea L.*,
Japan, Sibirien und Europa.

593. *Melas. lapponica L.*,
Nord- und Mitteleuropa, Sibirien, China, Japan und Nordamerika.

594. *Melas. populi L.*,
Europa, Nordafrika, West- und Nordasien, China und Japan.

595. *Melas. tremulae Fabr.*,
Europa, Sibirien und Nordamerika.

596. *Melas. vigintipunctata Scop.*,
Mitteleuropa, Sibirien und Japan.

597. *Pachnephorus bistriatus Muls.*,
Südeuropa, Afrika, Madagaskar, Ostindien, Philippinen, Makassar.

598. *Pachn. tessalatus Daftschm.*,
Mittel- und Südeuropa, Zentralasien, Mongolei.

599. *Phaedon armoraciae L.*,
Europa, Sibirien, Japan, Nordamerika.

600. *Phyllodecta vitellinae L.*,
Europa, Sibirien und Nordamerika.

601. *Phytodecta affinis Gyll.*,
Norwegen, Schweden. Finnland, Sibirien, Nordamerika.

602. *Phytod. rufipes Deg.*,
Nord- und Mitteleuropa, Sibirien, Japan und Nordamerika.

603. *Phytod. viminalis L.*,
Fundorte wie bei voriger Art.

604. *Plagiodera versicolora Laich.*,
Europa, Nordafrika, Sibirien und Japan sind als Fundorte bekannt.

605. *Plateumaris braccata Scop.*,
Nord- und Mitteleuropa, Kaukasus, Sibirien und Turkestan.

606. *Plat. consimilis Schrank*,
Nord- und Mitteleuropa, Sibirien und Japan.

607. *Plat. sericea L.*,
ganz Europa, Transcaspica, Sibirien und Japan.

608. *Plectroscelis spec.*,
Europa, 1 Exemplar an getrockneten Birnen von Californien nach Hamburg verschleppt. (*Kraepelin.*)

609. *Prasocuris phellandrii L.*,
in der ganzen paläarktischen Zone und in Nordamerika heimisch.

610. *Prasoc. vittata Ol.*,
Nordamerika, soll einmal in St. Petersburg gefangen worden sein. (*Calwer*, p. 957.)

611. *Psyllobora taedata Lec.*,
Amerika, 1 Expl. an getrockneten Nectarinien von Californien nach Hamburg verschleppt. (*Kraepelin.*)

612. *Spartophila pallidus L.*,
Nord- und Mitteleuropa, Sibirien und Nordamerika.

43. Lariidae = Bruchidae (Samenkäfer).

613. *Acanthoscelides caliginosus Baudi*,
Tropentier, mit Handelsgütern nach Hamburg und anderen deutschen Häfen gelangt. Hat sich eingebürgert.

614. *Acanth. Lallemanti Mars.*,
aus Amerika mit Getreide und anderen Ladungen nach südfranzösischen Häfen gekommen. Die Akklimatisation ist rasch erfolgt.

615. *Acanth. mimosae Fabr.*,
aus fremden Gegenden in Hamburg eingebürgert.

616. *Acanth. obtectus Say.*,
mit nordamerikanischen Schiffsladungen (Bohnen und Erbsen) nach Europa eingeschleppt, wo sich das Tier bald eine neue Heimat gegründet hat.

Alle genannten *Acanthoscelides*-Arten haben sich verhältnismäßig schnell den neuen Verhältnissen angepaßt.

617. *Bruchidius trifolii Motsch.*,
in den Samen von Trifolium pratense aus Aegypten nach Frankreich und Holland verschleppt.

618. *Bruchus Baudoni Caillol.*,
Guinea, nach Südfrankreich eingeschleppt.

619. *Br. caliginosus Baudi*,
aus überseeischen Plätzen nach Hamburg eingeschleppt.

620. *Br. chinensis L.*,
China, Japan, Indien, Syrien, Aegypten, Kapland, Madagaskar, Nord-, Mittel- und Südamerika, Kuba, nach Europa, zeitweise in größeren Mengen, eingeschleppt.

621. *Br. incarnatus Boh.*,
Kanarische Inseln, Nordafrika, nach Frankreich und Portugal eingeführt.

622. *Br. mimosae F.*,
Südamerika, nach den Mittelmeerländern und selbst nach Hamburg eingeschleppt.

623. *Br. nigrorufus Motsch.*,
aus den Tropen nach Triest eingeschleppt.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: 15

Autor(en)/Author(s): Ross Emil

Artikel/Article: Ueber das Vorkommen fremdländischer Coleopteren im mitteleuropäischen Gebiet. 57-58