© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at


## Neue afrikanische Lepidopteren aus der Ertlschen Sammlung.

Beschrieben von Wichgraf.

(Fortsetzung.)

Hinterflügel hat bei trüb dottergelbem Grundton eine dunkelbraune breite, von der Mitte des Vorderrandes beginnende Randbinde, die nach innen durch dunklere Halbmonde sich scharf gegen das gelbe Mittelfeld absetzt und in Feld 4 am schmalsten ist (4 mm). In Feld 1 c biegt sie zum Außenrande ab und endigt in stumpfer Spitze an Rippe 1 a. Der dunkelbraune Fleck am Schluß der Zelle ist ziemlich groß, nierenförmig und sendet seine Spitzen bis Rippe 4 und nach vorn bis fast zur Randbinde, die dort 7 mm breit ist.

Unterseite. Vorderflügel: Bis auf das Außenranddrittel dottergelb mit besonders am Vorderrande eingestreuten grauen Schuppen. Zellfleck klar nierenförmig in hellem Grunde. Auch die Halbmonde der Außenbinde von Feld 4 bis 8 deutlich und zwar zu je einem Längsfleck zusammengeflossen. Der übrige Teil gelblich grau.

Hinterflügel. Der Innenteil dottergelb, nach vorn und außen grau gesprenkelt. Der Zellfleck dunkel, scharf und rundlich ohne Spitzen, halb so groß als im Vorderflügel. Thorax am Rücken grau. Hinterleib gelb, an allen Segmenten, besonders am Analende, deutlich dunkelbraun gesäumt.

Flügelspannung 55, Vorderflügel 25, Körperlänge 22 mm ohne Kopf. Moyamba (Sierra Leone), coll. Ertl.

13. **Euproctis bipunctata** n. sp.

Ein zart cremegelb gefärbtes Tier in der Art von *pallida*, aber größer und mit zwei deutlich markierten orangegelben Flecken im Vorderflügel.

Oberseite. Vorderflügel: Gesamtton helles Cremegelb mit leichter gelber Tönung des Vorderrandes. Im Wurzelteil der Felder 2 und 3 die beiden lebhaft orangegelb gefärbten runden Flecke.

Hinterflügel einfarbig, um einige Nuancen heller und weißlicher getönt als der Vorderflügel.

Unterseite gleichmäßig weißlich gelb, wie die Oberseite des Hinterflügels. Im Vorderflügel die gelben Flecke deutlich durchschimmernd, ebenso deutlich das Gelb des Vorderrandes.

Fühler rötlich gelb. Ein dottergelber Haarbusch am Kopf; Augen schwarz; Schulterdecken heller gelb. Füße auch an den Tarsen dünn gelblich behaart. Thorax und Hinterleib gelb behaart; längerer und hellerer Haarbusch am Analende.

Flügelspannung 33, Vorderflügel 17, Körperlänge 13 mm. Kigonsera (D.-O.-Afrika), coll. Ertl.

14. **Euproctis distincta** n. sp.

Zwischen der vorigen und *pallida* der Größe nach steht diese *pallida* sich nähernde Form, welche aber die bei letzterer nur angedeuteten Zeichnungselemente in schönem Dottergelb sehr bestimmt ausspricht und sich auch von ihr durch den dottergelb gefärbten Hinterflügel unterscheidet.

Oberseite. Vorderflügel. Von dem hellgelb gefärbten Grundton bleiben nur drei ziemlich gleich breite Querbinden übrig, da erstens das Basaldrittel dottergelb ist, wie zweitens die Umgebung des sehr deutlichen orangegelben etwas hellgelb geringelten Zellfleckes, die als ein das zweite Drittel am Vorderrande füllender und nach der Mitte des Hinterrandes sich zuspitzender Keil erscheint. Drittens ist gelb eine Reihe gleichbreiter Flecke in allen Feldern mit Ausnahme des freibleibenden Feldes 5 und endlich eine den Außenrand begleitende schmale in Feld 5 und 2 nach innen vorspringende Binde, so daß fast der ganze Flügel dottergelb erscheint. Eine feine helle Randlinie trennt die letzte Binde von den etwas heller gelben Fransen.

Hinterflügel gleichmäßig glänzendes Gelb, etwas heller als die Binden des Vorderflügels, Fransen heller.

Unterseite bei beiden Flügeln schön gelb, etwas dunkler am Vorderrande des Vorderflügels.

Fühler dottergelb. Augen schwarz. Beine behaart. Thorax und Hinterleib dottergelb.

Flügelspannung 23, Vorderflügel 12, Körperlänge 11 mm. Kigonsera, coll. Ertl.

15. **Euproctis xanthypopteros** n. sp.

Eine durch den dichtbeschuppten stumpfdottergelben Hinterflügel gegenüber dem hell cremefarbenen Vorderflügel markante Art.

Oberseite. Vorderflügel ziemlich gleichmäßig hellgelb, nur gegen die Basis etwas verdunkelt. Kein Zellfleck, nur am oberen und unteren Zellabschluß ein paar braune Schuppen zerstreut. Im äußeren Drittel zwei gelbe Querlinien. Unmittelbar am Außenrande acht feine strichförmige Flecke, zwei in Feld 1 a, in jedem folgenden einer.

Hinterflügel: Gleichmäßig stumpf dottergelb ohne Zeichnung. Fransen heller gelb.

Unterseite. Ebenfalls gleichmäßig dottergelb, aber etwas heller als die Oberseite des Hinterflügels. Im Hinterflügel diesmal am Zellabschluß ein Rest von braunen Streuschuppen und vom Vorderrande beginnend eine 2 mm vom Außenrande demselben parallel laufende feine gelbe, sich nach hinten verlierende Binde. Fühler braungelb, Augen schwarz, Füße und Körper gelb behaart.

Flügelspannung 34, Vorderflügel 17, Körperlänge 14 mm. Kigonsera, coll. Ertl.

Fortsetzung folgt.

---

## Ueber die Makrolepidopterenfauna des höheren Riesen- und Isergebirges.

Von G. Warnecke, Altona (Elbe).

### II. Boarmia repandata L. u. var. monticola.

Am 18. Juli 1919 fing ich am Rande des Isermoors im Isergebirge in etwa 830 m Höhe eine kleinere dunkle *repandata*-Form in einem männlichen Stück, das ich zunächst für eine Individualaberration hielt. Aber am 26. Juli fing Herr Marschner-Hirschberg ein zweites, übereinstimmendes ♂ ebenfalls bei Groß-Iser, und als Herr Leonhard-Hamburg mir ein damit übereinstimmendes, im Sommer 1919 im badischen Schwarzwald gefundenes ♂ vorlegte, hatte ich keinen Zweifel mehr, daß hier eine gut ausgeprägte Höhenform vorliegt.

Die 3 ♂, die mir vorliegen, sind kleiner als die Form des deutschen Tieflandes; die Länge des Vorderrandes beträgt bei 2 Stücken 19 mm, bei dem dritten 20 mm; Rebel gibt für *repandata* 21—24 mm an, womit die Maße meiner 24 deutschen *repandata* übereinstimmen.

Der Falter unterscheidet sich auf den ersten Blick von der gewöhnlichen Form durch zwei Merkmale, nämlich die grauschwarze Färbung, die nur einen schwachen, kaum wahrnehmbaren

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: 15

Autor(en)/Author(s): Wichgraf F.

Artikel/Article: Neue afrikanische Lepidopteren aus der Ertlschen Sammlung. 59-60