

## Beiträge zur elsässischen Lepidopterenfauna unter hauptsächlichlicher Berücksichtigung der näheren Umgebung von Straßburg.

Von Ernst Brombacher, Freiburg (Breisgau).  
(Fortsetzung.)

192. ab. *suffusa* Tutt. Die Vorderflügel sind stark schwarz bestäubt. Aus dem Herrenwald.
193. ab. *mediofasciata* Mayer. Vorderflügel mit einem bindenartigen dunklen Medianstreifen. Aus der Weißenburger Gegend.
194. ab. *bilinea* Schultz. Hinterflügel noch mit einem schwarzen Schattenstreifen in der Mitte. Wie vorige.
195. ab. *helioscopiae* Selys. Hinterflügel ohne schwarze Saumbinde. Aus dem Herrenwald.
196. ab. *rubescens* Garb. Vorderflügel stark rosenschwarz überflogen. In vielen Exemplaren aus der Umgebung von Straßburg.
197. ab. *cuspidata* Rbl. mit feiner scharf gezackter Antemarginalbinde der Hinterflügel. Aus dem Herrenwald.
198. *livornica* Esp. 1904 wurden in der Stadt am Schirmeckertor 11 Raupen an Galium gefunden und schöne Falter daraus gezogen.
199. *Chaerocampa* Dnp. *celerio* L. 1906 von Huber in seiner Wohnung (Ruprechtsau) ein ♀ am Licht gefangen.
200. *Pergesa* Wlk. *elpenor* L. In der Umgebung von Straßburg zahlreich, bisweilen häufig an Echium und Geißblatt schwärmend, mehrmals am Köder beobachtet.
201. *porcellus* L. Wie vorige verbreitet, nicht selten, auch am Köder gefangen.
202. *Proserpinus* Hb. *proserpina* Pall. Juli 1914 von Busch eine Raupen an Alfeldsee gefunden.
203. *Macroglossum* Sc. *stellatarum* L. Ueberall in der Umgebung von Straßburg gemein.
204. *Helmaris* Dalm. *fuclformis* L. In den Rheinwäldern bei Straßburg zahlreich an Salbeiblüten schwärmend im Mai und Juni.
205. *scabiosae* Z. Wie vorige verbreitet, doch mehr in den Vorbergen.

### Notodontidae.

206. *Cerura* Schrank *bicuspis* Bkh. Juli 1918 an Buche bei Alberschweiler ein abgeflogenes ♂ gefunden.\*
207. *furcula* Cl. Den Falter am Wacken im Mai an Pappeln, die Raupen dort an Eschen gefunden.
208. *bifida* Hb. Ueberall häufiger als vorige. Die Raupen im Spätjahr an den Rheinufern häufig auf Pappeln.
209. *Dicranura* B. *erminea* Esp. Den Falter öfters in der Ruprechtsau an Straßenlaternen im Mai. Die Raupen im Herrenwald auf Pappeln gefunden.
210. *vinula* L. Ueberall in der Umgebung von Straßburg häufig.
211. *Stauropus* Germ. *fagi* L. Bei Barr 1904 an Buchen. 1918 bei Alberschweiler mehrere Exemplare.
212. *Xoplitis* Hb. *milhauseri* F. Anf der Sporensinsel ein Pärchen an einem Eichenstamme in

- Begattung gefunden. Von Müller dort eine Raupe beim Futterholen eingetragen.
213. *Gluphisia* B. *crenata* Esp. Im Mai am Rhein an Pappeln ruhend. Die Raupen im Spätjahr dort auf Schwarzpappeln, auch am Wacken sehr vereinzelt.
  214. *Drymonia* Hb. *trimacula* Esp. Im Neuhöfler Wald am Licht gefangen. Von Voigt im Herrenwald ein ♀ an Tanne abgelesen.
  215. *chaonia* Hb. Im April den Falter in der Umgebung von Straßburg an Laternen gefunden.
  216. *Pheosia* Hb. *tremula* Cl. Ueberall häufig an Laternen; die Raupen im Spätjahr auf Pappeln und Weiden am Rhein.
  217. *dictaeoides* Esp. Auf der Sporensinsel die Raupe an Birke, den Falter in der Ruprechtsau an Laterne gefunden.
  218. *Notodonta* Ochs. *ziczac* L. Ueberall in der Umgebung von Straßburg in zwei Generationen.
  219. *dromedarius* L. Bei Barr und im Herrenwald einzeln im Mai.
  220. *phoebe* Sieb. In der Umgebung von Straßburg gerade nicht selten an Laternen und an Grashalmen hängend um Pappeln. Die Puppen öfter gegraben.
  221. *tritophus* Esp. Mehr in den Vorbergen, so bei Barr aber doch selten.
  222. *anceps* Goeze. Bei Barr mehrmals im Mai am Licht gefangen. Von Busch in der Musau bei Straßburg an Laterne gefunden.
  223. *Spatalia* Hb. *argentina* Schiff. August 1913 ein ♂ am Rhein am Weidenzweig gefunden.
  224. *Leucodonta* Stgr. *bicolorata* Schiff. Am Bahnhof Straßburg am Licht und bei Vendenheim an Telegraphenstange im Mai. Von Busch bei Mühlhausen am Licht gefangen.
  225. *Ochrostima* Hb. *velitarsis* Rott. 1908 bei Barr eine Anzahl Raupen an niederen Ausschlägen einer Eiche gefunden.
  226. *melagona* Rkh. Bei Barr im Juni, am Alfeldsee im Juli am Licht und bei Alberschweiler an Buche gefunden.
  227. *Odontosis* Hb. *carmelita* Esp. 1906 bei Barr an einer Birke und 1907 am Licht (Bahnhof) gefangen. Von Textor im April 1913 bei Laubenheim im Mageltal am Fuße einer Erle gefunden.
  228. *Lophopteryx* Stph. *camelina* L. Ueberall in der Umgebung von Straßburg im Mai.
  229. ab. *giraffina* Hb. In Anzahl aus gegrabenen Puppen.
  230. *cuculla* Esp. Juli 1913 ♂♀ am Rhein-Marnekanal bei Vendenheim, 1918 bei Alberschweiler unter Ahorn im Gras gefunden. Von Busch 1914 eine Raupe in der Orangerie auf Ahorn gefunden.
  231. *Pterostoma* Germ. *palpina* L. Ueberall in der Umgebung von Straßburg häufig.
  232. *Ptilophora* Stph. *plumigera* Esp. November 1913 bei Barr an Ahornausschlägen ein ♂ gefunden. Von Busch in Straßburg an Laterne gefunden.
  233. *Phalera* Hb. *bucephala* L. Ueberall gemein bei Straßburg.
  234. *Pygaera* O. *anastomosis* L. Den Falter auf der Sporensinsel an Laterne gefunden. Die Raupen am Rhein auf Weiden und Pappeln.

Fortsetzung folgt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Brombacher Ernst

Artikel/Article: [Beiträge zur elsässischen Lepidopterenfauna unter hauptsächlicher Berücksichtigung der näheren Umgebung von Straßburg. 111-112](#)