

# INTERNATIONALE ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

Herausgegeben unter Mitarbeit bedeutender Entomologen.

Die „Internationale Entomologische Zeitschrift“ erscheint jeden Sonnabend.

Abonnements nehmen alle Postanstalten und Buchhandlungen zum Preise von 1,50 M. vierteljährlich an, ebenso der Verlag in Guben bei direkter portofreier Kreuzband-Zusendung.

Insertionspreis für die 3 gespaltene Petitzeile oder deren Raum 20 Pf. Abonnenten haben für ihre entomologischen Anzeigen vierteljährlich 25 Zeilen frei.

**Schluss der Inseraten-Aannahme jeden Mittwoch früh 7 Uhr.**

**Inhalt:** Eine neue Pieride aus Südamerika. — Ueber eine verdunkelte Form von *Deilephila dahlia* H. G. (*praenubila* m.). Die Mimikry-Theorie. (Fortsetzung.) — Vorkommen von *Perisomena caecigena* Kupido in Bosnien (Sarajevo). — Abnorme Begattungen bei Insekten.

## Eine neue Pieride aus Südamerika.

— Von H. Fruhstorfer. —


### *Hesperocharis praeclara* Fruhstorfer.

(Mit Figur ♀ Unterseite.)

♂. Oberseite: Vorderflügel hell-, Hinterflügel zitronengelb mit leicht transparenter roter Binde der Unterseite. Der schwarze, nach innen gezähnte Distalsaum durch eine Binde lockerer Schuppen mit dem Fleck am Zellapex verbunden.

Hinterflügel fein schwarz umrandet, Adern nahe dem Distalsaum leicht schwarz angelaufen.

Unterseite: Der Apikalsaum durch eine gelbe Region von der schwarzen, von der Zelle ausgehenden Transversalbinde getrennt. Adern an den Medianen in Form viereckiger Flecken mit schwarzen Schuppen belegt.



Hinterflügel mit einer bereits in der Mitte des Kostalrandes beginnenden, hellzinnroten Submarginalbinde, die proximal und distal von schwarzen Parallelbinden begrenzt wird. Von der oberen und unteren Zellwand laufen im Diskalteil der Flügel schwarze Binden bis zur proximalen Submarginalbinde, mit der sie sich vereinigen. Die untere Binde verbreitert sich in der Mitte etwas und entsendet in analer Richtung 3 schwarze Strahlen.

Das ♀ zeigt die Abbildung.

Patria: Espiritu-Santo ♂♀ (Coll. Fruhst.)

*Praeclara* ist entfernt verwandt mit *fulvinota* Butl. von Rio de Janeiro, und es ist mir noch nicht klar, ob etwa beide als Lokalrassen mit *hirlanda* Stoll, vermutlich aus Surinam, vereinigt werden dürfen.

Von *hirlanda* beschrieb ich Stettiner Ent. Ztg. 1907, Heft 1 folgende Ausläufer:

*hirlanda hirlanda* Stoll, Surinam (?) Rio Uaupés (Coll. Fruhst.),

*hirlanda ninguida* Fruhst., Venezuela,

*hirlanda obnubila* Fruhst., Süd-Peru.

Aus Columbien sind 2 ♂♂ in meiner Sammlung von *helvia* Latreille. Erst mit Kenntnis der ♀♀ ließe sich entscheiden, ob *helvia* Artrechte zukommen.

## Ueber eine verdunkelte Form von *Deilephila dahlia* H. G. (*praenubila* m.).

— Von Oskar Schultze. —

Von *Deilephila euphorbiae* L. befindet sich in dem Tring-Museum ein aberratives ♂, welches in der Revision of the Lep. Fam. Sphingidae von Rothschild-Jordan (Nov. Zool. 1903. 9. 1. Suppl. p. 720) als ab. nov. *restricta* wie folgt beschrieben wird: The forewing entirely tawny-olive above, except a small spot at end of cell, and a series of small elongate, hastate or linear spots on the disc upon the veins; fringe of hinder margin buffish white, that of distal margin clay-colour; marginal band deeper brown. Disc of hindwing, above, yellowish red, far less bright than in ordinary *euphorbiae*. Underside of body and wings much shaded and speckled with brown, especially the wings; forewing with very little red, hindwing yellow-red on disc.

Ein Exemplar der gleichen Art, welches von mir in der Ent. Zeitschr. Guben XVII No. 17 beschrieben wurde (aus der Sammlung des Herrn A. Pilz in Heinrichau), geht über das vorstehend erwähnte aberrative Exemplar noch hinaus, sofern die

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Fruhstorfer Hans

Artikel/Article: [Eine neue Pieride aus Südamerika. 25](#)