Nachtrag zu Dianth. Gueneei Stgr.

Nach Fertigstellung der Arbeit und erfolgtem Reindruck der ersten Teile erhielt ich von Herrn Dr. Schawerda-Wien aus dessen Sammlung ein & dieser Art, welches vom verstorbenen Sammler F. R. v. Meissl bereits vor Jahren am Maklenpass in Bosnien erbeutet, jedoch als armeriae angesprochen wurde. Das Stück stimmt mit der Type Staudingers vollkommen überein. Gueneei erscheint also demnach auch für das südöstliche Mitteleuropa nachgewiesen.

Druckfehler-Berichtigung.

```
Seite 468 Zeile 2 von unten lies Himmelsrichtungen statt Himmelrichtungen , 471 , 11 ,, ,, ,, sareptensis statt sareptanais , 483 , 11 ,, ,, ... Calb. statt Calb , 485 ,, 6 ... oben ... auszeichnet statt ausgezeichnet.
```

Zusammenstellung der in Württemberg und Hohenzollern neuaufgefundenen Noctuiden.

Von Carl Schneider, Cannstatt.

I. Nachtrag.

Im 23. Jahrgang der "Gubener" erschien bereits unter obigem Titel eine Aufstellung neuer Noctuiden für Württemberg. Heute bin ich in der Lage, weitere Neufunde zu veröffentlichen. Durch die Liebenswürdigkeit des Vorsitzenden des E. V. in Ulm a. Donau kam ich in den Besitz eines "Verzeichnisses der in der Umgebung von Ulm auftretenden Schmetterlinge" zusammengestellt 1920 von dem † Generalmajor Heinl in Ulm. Dieses Verzeichnis bildet in der Hauptsache die Grundlage dieses Nachtrages, dazu kommen noch einige persönliche und schriftliche Mitteilungen, sowie einige früher vergessene Notizen. Allen Herren, insbesondere Herrn Oberlehrer Pfetsch in Ulm, die diesen Nachtrag ermöglichten, auch an dieser Stelle besten Dank.

Nachzutragen ist bei:

1. Acronycta abscondita Tr. Ulm-Schammertal.

4. Agrotis castanea Esp. Ulm-Thalfingen.

13. Mamestra albicolon Sepp. Ulm-Obereselberg.

- 16. Mianna ophiogramma Esp. Ulm-Thalfingen, Friedrichshafen.
- 17. Mianna literosa Hw. Ulm-Kiesental.

24. Hadena sublustris Esp. Ulm.

- 29. Trachea atriplicis L. In ganz Württemberg verbreitet und nicht selten. Eine ganze Reihe von Fundorten seither festgestellt.
- 40. Amphipyra livida F. Ulm-Obereselberg. Damit gewinnt die von mir ausgesprochene Vermutung des Vorkommens bei Blaubeuren an Wahrscheinlichkeit. (I. Zusammenstellung.)

43. Xanthia sulphurago F. Ulm-Thalfingen.

- 46. Xylina ingrica H. S. Bronnen bei Biberach (G. Reich). Mittlg. v. Gerstner.
- 49. Cucullia prenanthis B. Auch von Vogt, Stuttgart, schon 1925 erbeutet, mit verbasci verwechselt, dürfte noch weiter in W. verbreitet sein.

50. Cucullia lychnitis Rbr. Ulm-Lautern.

52. C. campanulae Frr. Friedrichshafen, Ulm. 56. Plusia modesta Hb. Ulm-Klingenstein.

57. Pl. gutta Gn. Friedrichshafen.

- 58. Pl. pulchrina Hw. Ulm-Steinhäule. Friedrichshafen 1919 sehr häufig.
- 61. Hypena obesalis Tr. Heidenheim (Löffler).

Als neu sind nachzutragen:

62. Agrotis orbona Hufn. (subsequa Schiff.). 1930 zahlreich an Licht und Köder im Rotenackerwald. (Wochenendheim des E. V. Stuttgart.)

63. Agrotis margaritacea Vill. Ulm-Friedrichsau (Heinl.). Sigmaringen 3 33 1908 (Dr. Dressel).

64. Agrotis signifera F. Ulm-Obereselberg (Heinl). [?].

65. Hadena ochroleuca Esp. Vorbachtal (nördl. Württemberg) laut einer freundlichen Mitteilung von A. Hepp, Frankfurt a. M. dort gefangen.

66. Aporophila nigra Hw. Ulm-Obereselberg (Heinl).

67. Leucania evidens Hbn. Ulm-Thalfingen (Heinl). [?]. 68. Mesogona oxalina Hbn. Ulm-Obereselberg (Heinl).

69. Amphipyra cinnamomea Goeze. Ulm-Obereselberg (Heinl).

70. Orrhodia veronicae Hbn. Ulm-Obereselberg (Heinl). 71. Cucullia xeranthemi B. Ulm-Lautern (Heinl). [?]

Weitere Mitteilungen an dieser Stelle oder an mich direkt sehr erwünscht, namentlich über die von mir mit [?] versehenen Arten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Internationale Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: 24

Autor(en)/Author(s): Schneider Carl

Artikel/Article: Zusammenstellung der in Württemberg und Hohenzollern neuaiifgefündenen Noctuiden. 493-494