

Beitrag zur Kenntniss der Gross-Schmetterlingsfauna von Vorpommern und Rügen, insbesondere der Umgebung von Greifswald.

Von Wilhelm Lommatzsch, Tharandt (Sa.).

(Fortsetzung.)

373. *L. albulata* Schiff. (3465.) Nur ein Stück 31. 5. 12 Steffenhagen (P.). — Nach Spormann zuweilen sehr zahlreich auf den Ryckwiesen und bei Kieshof und Jeaser.
374. *L. testaceata* Don. (3471.) Nur zwei Falter: 7. 6. 30 Potthagen, 2. 7. 27 Wampener Wald (L.). — Nach Pietsch auch bei Kieshof
375. *L. oblitterata* Hufn. (3474.) Nach Spormann bei Greifswald, Eldena, Potthagen, Kieshof, Jeaser.
376. *L. luteata* Schiff. (3475.) Ich fing nur ein ♂ am 29. 5. 28 auf der Rehwiese im Elisenhain.
377. *L. flavofasciata* Thnbg. (3476.) Von Pietsch bei Kieshof erbeutet (Spormann).
378. *L. bilineata* L. (3481.) 11. 6. bis 1. 8. Greifswald-Stadt, Kieshofer Moor, Potthagen, Wampener Wald, Lubmin.
f. *infuscata* Gmppb. unter der Stammform (L.).
379. *L. sordidata* F. (3485.) Ein Falter 26. 6. 14 Steffenhagen (P.). — Nach Spormann bei Greifswald (am Licht), Lubmin.
380. *L. autumnalis* Ström. (3486.) 25. 5. bis 30. 6. Wampener Wald, Kieshof, Elisenhain, Potthagen, Goor bei Putbus.
f. *obsoletaria* Schille neben dem Typus (L.).
381. *L. capitata* H. S. (3488.) fand Pietsch im Mai und Juni 1898 bei Eldena.
382. *L. siliceata* Hb. (3489.) Ein Falter 5. 6. 30 Elisenhain (L.). — Hier auch schon von Pietsch festgestellt.
383. *L. corylata* Thnbg. (3491.) 22. 5. bis 8. 7. Potthagen, Steffenhagen, Kieshofer Moor, Wampener Wald, Stubnitz. Meist nicht selten. — Nach Spormann auch bei Jeaser und Ludwigsburg.
f. *effusaria* Stgr. Ein ♀ 8. 6. 27 Wampener Wald, ein weiteres Stück 9. 6. 30 Stubbenkammer (L.).
384. *L. badiata* Hb. (3494.) Von Pietsch sehr selten in Greifswald am Licht gefangen.
385. *L. berberata* Schiff. (3498.) Ein Falter am 31. 7. 25 im Kieshofer Moor (P.). Bisher in Neuvorpommern nur zweimal gefunden (Demmin, Splietsdorf [Spormann]).
386. *L. comitata* L. (3503.) Nur zwei Falter. Ein Stück Anfang September 1912 (P.) und ein ♀ 25. 7. 27 am Licht in Greifswald (L.). — Nach Pietsch bei Greifswald selten. — Prof. Peter fand die Art im August 1918 viel auf Hiddensee an *Echium vulgare* L. und im August 1924 bei Koserow.
387. *Asthena candidata* Schiff. (3505.) Vielleicht in letzter Zeit übersehen. Nach Spormann nicht selten bei Greifswald, Grubenhagen, Potthagen, Kieshof.

388. *Tephroclystia oblongata* Thnbg. (3511.) Ziemlich häufig bei Greifswald (Spormann).
389. *T. pusillata* F. (3535.) 24. 5. 12 Steffenhagen (P.), häufig am 7. 6. 30 bei Pothagen in Fichtenbeständen (L.). — Nach Pfau auch bei Buddenhagen. — Die Angabe I. E. Z. XXIII (1929), Seite 82 für Diedrichshagen ist zu streichen.
390. *T. indigata* Hb. (3537.) Ein ♀ 13. 5: 28 an einer Kiefer bei Diedrichshagen (L.). — Pietsch fand die Art mehrmals bei Jeerer (Spormann).
391. *T. bilunulata* Zett. (3538.) = *strobilata* Hb. nec Bkh. Nach Spormann bei Greifswald, Jeerer, Kieshof vereinzelt, doch nicht gerade selten, Ende Mai, Juni.
392. *T. pimpinellata* Hb. (3553.) Nach Spormann selten bei Greifswald. Mai bis August.
393. *T. assimilata* Gn. (3559.) Von Pietsch bei Greifswald, Kieshof, Jeerer Mitte Juni bis Juli gefunden.
394. *T. absinthiata* Cl. (3560.) Bei Greifswald ziemlich selten (Spormann). — Angabe I. E. Z. XXIII (1929), S. 83 ist zu streichen.
395. *T. vulgata* Hw. (3569.) Ende April bis Juli nicht selten bei Greifswald (Spormann).
396. *T. trisignaria* H. S. (3573.) Nicht selten bei Greifswald, Ende Juli (Spormann).
397. *T. castigata* Hb. (3575.) Mai, Juni, bei Greifswald, zuweilen häufig (Spormann).
398. *T. subnotata* Hb. (3580.) Von Pietsch mehrfach bei Greifswald gefunden. Juli.
399. *T. helveticaria* B. (3592.) fand Pietsch im Juni bei Jeerer.
400. *T. satyrata* Hb. (3595.) Mai, Juni. Bei Greifswald meist häufig (Spormann).
401. *T. succenturiata* L. (3600.) Von Mai bis Ende Juni ziemlich selten: Greifswald, Pothagen, Kieshof, Neuenkirchen (Spormann).
f. *subfulvata* Hw. und
f. *oxydata* Tr. unter der Art.
402. *T. scabiosata* Bkh. (3604.) Juni. Pietsch fand die Art vereinzelt bei Kieshof.
403. *T. pygmaeata* Hb. (3627.) Fliegt nach briefl. Mitteilung von Pfau am Rande des Buchwaldes bei Jeerer, im Juni. — Von Plötz häufig bei Eldena gefangen. Anscheinend recht lokal in Pommern.
404. *T. nanata* Hb. (3634.) Pietsch fing die Art in Greifswald (Spormann).
405. *T. innotata* Hufn. (3636.) Raupen ziemlich häufig bei Pothagen und Gristow im Herbst an *Artemisia campestris* L. gefunden. Falter von Mai bis Ende August (Spormann).
f. *fraxinata* Crewe und
f. *tamarisciata* Frr. nach Spormann unter der Art.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Internationale Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Lommatzsch Wilhelm

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntnis der Gross-Schmetterlingsfauna von Vorpommern und Rügen, insbesondere der Umgebung von Greifswald. 239-240](#)